

主编单位 南京中医学院

主编 彭怀仁

中医方剂大辞典

第四册



人民卫生出版社

中医方剂大辞典

第四册

主编单位 南京中医学院

主 编 彭怀仁

人民卫生出版社

(京)新登字 081 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中医方剂大辞典 第四册/彭怀仁主编. —北京:人民卫生出版社, 1995.
ISBN 7-117-02054-7

I. 中… I. 彭… III. 方剂学-词典 IV. R289-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 00071 号

中医方剂大辞典

第 四 册

主编单位 南京中医学院

主 编 彭 怀 仁

人 民 卫 生 出 版 社 出 版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 16开本 70印张 4插页 1672千字
1995年2月第1版 1995年2月第1版第1次印刷
印数: 00 001—2 000

ISBN 7-117-02054-7/R·2055 定价: 92.30 元

[科技新书目 325--194]

《中医方剂大辞典》顾问委员会

(以姓氏笔划为序)

万友生	王绵之	白永波	吴考槃
何 任	张瑞祥	欧阳琦	周仲瑛
施奠邦	钱伯文	徐国仟	董建华

编 写 单 位

主编单位：	南京中医学院
协编单位：	山东中医学院
	上海中医学院
	江西中医学院
	湖南中医学院
	江西省中医药研究所
	湖南省中医药研究院

《中医方剂大辞典》第四分册

编委会及编写人员

(以姓氏笔划为序)

主 编:	彭怀仁					
副 主 编:	万少菊	王旭东	田代华	史欣德	史慕山	孙世发
	孙光荣	李 飞	沙凤桐	张民庆	张浩良	陈 伟
	陈子德	赵国平	洪广祥	傅瑞卿		
常务编委:	王旭东	史欣德	史慕山	成德水	孙世发	李 飞
	张民庆	赵国平	彭怀仁			
编 委:	万少菊	王旭东	石历闻	田代华	史欣德	史慕山
	成德水	朱华德	孙世发	孙光荣	孙美珍	李 飞
	吴永贵	吴承艳	吴跃进	沙凤桐	张民庆	张浩良
	陈 伟	陈子德	陈德兴	赵文业	赵国平	柳长华
	洪广祥	顾保群	郭君双	郭国华	巢因慈	彭怀仁
	傅幼荣	傅瑞卿	谢文光	虞胜清	路振平	蔡铁如
	谭兴贵	樊巧玲				
撰 稿 人:	万少菊	王龙章	王旭东	毛 平	石历闻	田代华
	史欣德	史慕山	包明蕙	匡弈璜	朱华德	华浩明
	刘更生	刘学华	汤希孟	阳 立	孙世发	孙光荣
	孙迎节	孙美珍	杨 虎	杨俊杰	李 飞	李春英
	吴永贵	吴承艳	吴跃进	肖德发	何清湖	辛增平
	宋经中	张 昱	张为群	张民庆	张炳填	张浩良
	陈 伟	陈卫星	陈涤平	陈家玉	陈德兴	赵文业
	赵国平	柳长华	姜静娴	洪广祥	顾保群	徐春波
	郭君双	郭国华	郭建生	郭瑞华	龚志南	巢因慈
	彭怀仁	韩育明	蒋玉珍	程淑娟	傅幼荣	傅瑞卿
	谢凤英	谢文光	虞胜清	路振平	蔡铁如	廖云龙
	谭兴贵	樊巧玲	薛建国	戴 慎	魏飞跃	

前 言

中医方剂，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病治病的主要手段。纵观周、秦以来，新方创制不断增加，载方文献汗牛充栋，组方理论渐趋完善，为炎黄子孙的健康和中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。在方书的编撰方面，唐以前的方书多出私人之手。如被尊为“方书之祖”的《伤寒论》与《金匱要略》；集简、便、验方而成书的《肘后方》；采集群经，删繁就简的《千金要方》、《千金翼方》；上自神农，下迄唐世，无不采摭的《外台秘要》等，均为私人所编著。由于医药学之发展，与民族之强弱、国家之兴衰有着密切的关系，故自宋代以后，方书之编撰受到了官方的关注，如宋·王怀隐主编的《太平圣惠方》、陈承等主编的《太平惠民和剂局方》、赵佶主编的《圣济总录》、明·朱橚主编的《普济方》、清·吴谦主编的《医宗金鉴》、陈梦雷主编的《古今图书集成·医部全录》等，均为国家级的载方名著，其中《太平惠民和剂局方》是我国官方颁布的第一部成药制剂规范，而《普济方》收载明初以前之方剂达 61739 首之多，《四库全书提要》称为“集方书之大全者”。由于历代王朝关心医药，重视方书，亦促进了民间医药之发展。据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著的各种方书多达 1400 余种。民国迄今，医药科学突飞猛进，中医方剂学亦随着时代的步伐而不断前进。尤其是在中华人民共和国成立以后，党和政府重视中医中药，中医的古籍与新著不断出版，方剂的实验研究相继开展，中医方剂学已成为全国各中医学院主要课程之一。《中华人民共和国药典》收录的名方验方和复方新制剂，对于中医方剂的推广运用，起到了积极的作用。

在制方理论方面，在宋以前多有方而无论，制方之义不明，后人难以掌握，用之稍有不当地，不免影响疗效。金·成无己著《伤寒明理论》，对《伤寒论》中 20 首方剂分析主治之证情，阐述配伍之奥义，开创了方论之先河。自此以后，有自创新方，自释方义者，如金·李杲《脾胃论》、《兰室秘藏》，元·罗谦甫《卫生宝鉴》等；有为前人成方撰写方义者，如明·许宏《金镜内台方议》、洪九有《摄生秘剖》；清·罗美《古今名医方论》、汪昂《医方集解》、吴仪洛《成方切用》、王晋三《古方选注》、张秉成《成方便读》等。尤其值得一提的是，清·吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》，是我国第一部由官方修订刊行的方论专著。目前全国各中医院校教材《方剂学》，《中国医学百科全书·方剂学》等著作中的古今名方验方，均由当代名医撰写了方论，对研究方剂配伍原理及临床运用有一定参考价值。

在我国对外文化交往中，中医方书是其内容之一。在日本，成书于公元 984 年的《医心方》，收载了我国唐以前方书中的方剂。在朝鲜，成书于公元 1445 年的《医方类聚》、成书于公元 1610 年的《东医宝鉴》，均引载了我国明代以前方书中的方剂，足见中医方剂在我近邻各国中有着深远的影响。

据近 2000 种中医药文献的不完全统计, 中医各科有名称和无名称的方剂已达 13 万首以上, 虽然历经王怀隐、赵佶、朱橚等整理, 但存在的问题仍然很多。例如古籍所载之方, 均据病证分类, 方随病证而列, 多无方名目录, 欲检一方, 殊非易事; 同一方剂的出处, 众说纷纭, 令人莫衷一是, 无所适从; 同一方剂的名称, 因载方文献或版本不同而命名各异, 孰先孰后, 仓卒难别; 有相当一部分方剂的内容, 由于辗转传抄刻印, 脱、衍、倒、讹比比皆是, 以讹传讹, 影响疗效; 有些常用的名方与验方的不同功效、主治、方论、临证验案、实验研究等资料, 分散于各种文献中, 汇集不易, 难窥全豹; 诸如此类, 不胜枚举。综上所述, 对中医方剂进行一次划时代的、全面的、系统的整理, 是一项具有历史意义而又刻不容缓的工作。

《中医方剂大辞典》, 对我国上自秦、汉, 下迄现代 (1966 年) 的所有有方名的方剂进行了一次系统的整理, 力求使上述各种问题得到合理的解决。以方剂检索而言, 本书汇集古今有方名的医方, 按照辞书形式编纂, 既有目录, 又有索引, 从而解决检方的难题。以方源而言, 本书参考古今各种中医药文献, 对每一首方剂的方源进行认真的考证, 而注明其原始出处, 这对研究方剂的历史, 澄清方剂的源流, 是十分必要的。以一方多名而言, 凡属同方异名, 经过反复考证, 依据载方文献成书年代之先后, 确定正名与异名, 并将二者相互挂钩, 查正名即可知道异名, 查异名即可知道正名, 这对了解一方多名和准确地统计方数, 有着极大的裨益。以方剂的质量而言, 本书尽可能地进行仔细的校勘, 使脱者补之, 衍者删之, 倒、讹者正之, 使方剂的内容经过这次整理而准确无误。以方剂容纳的资料而言, 本书对所有方剂分散在各种文献中的不同主治、方论、验案以及现代实验研究资料分别设项进行整理筛选, 汇集于各方之下, 为读者全面了解方剂提供了极大的便利。

早在 1958 年, 南京中医学院即开始组织人力, 筹备编撰本书, 并得到当时的中华人民共和国卫生部的大力支持。到 1961 年底, 已从 1700 余种中医药文献中, 收集了大量的方剂、并进行了初步的筛选整理, 此后因故而停顿。1983 年原中医古籍办公室又将编撰本书的任务下达给南京中医学院, 1985 年本书的筹备工作开始恢复, 1986 年成立课题协作组。1988 年国家中医药管理局成立以后, 又将本书列为局级课题。在编撰过程中, 得到了有关各级主管部门的热情关怀, 在此表示衷心的感谢!

我们的主观愿望, 是将本书编撰成载方最多、资料最全、考证最精的划时代的方剂大典。但由于本书所收资料涉及文献甚多, 考证难度极大, 撰审任务非常艰巨, 加之我们的水平不够和种种客观条件所限制, 错误缺点在所难免, 敬请读者指正, 以便再版时修改。

编 者

凡 例

一、本辞典共收载上自秦、汉，下迄 1986 年底 1800 余种中医药及有关文献中有方名的方剂 9 万余首。其中以 1911 年以前的方剂为收集重点，1911 年以后的方剂则择优选录。

二、本辞典以方剂名称作为辞目。辞目又分为正辞目与副辞目。同一方剂而有不同名称者，以最早出现的方名为正辞目，其余为副辞目。但在有些文献中，先见的方名仅有主治，而无组成、用法，后见的方名有组成、用法、主治者，则以后见的方名作正辞目，先见的方名作副辞目。

三、正、副辞目按方名首字笔划、笔顺排列；方名首字相同的辞目，先按方名字数归类，字数少者排前，多者排后；方名首字、字数均同者，再按第二字之笔划、笔顺排列，依次类推；同名方则按各方方源的成书年代或创方者生卒年代先后排列。

四、凡经增补的文献，因其原著的方剂与增补的方剂年代不同，故均区别开来确定年代，并尽可能在出处中注明。

五、凡正辞目方名有误者，根据始载书的不同版本及有关转载书径予订正，并在备考中加以说明。副辞目方名有误者，径删不录。

六、正辞目内设方源、异名、组成、用法、功用、主治、宜忌、加减、方论选录、临证举例、现代研究、备考等十二项。

1. 方源：叙述正辞目的原始出处。如始载书存在者，注始载书的书名和卷次；始载书已佚者，注现存最早转载书引始载书。若系转引的人名，经追考创方者的著作中有此方者，改从原著收录；原著已佚或创方人无著作传世者，乃转载书引某某人方。始载书无方名，后世文献补立方名者，注“方出始载书卷 X，名见转载书卷 X”。

2. 异名：收录各方异名的名称及其出处。如一方有多种异名者，则按所载异名的文献年代先后排列。若仅有始载书的异名者，不注出处。

3. 组成：收录始载书中各方的具体成分，包括药物名称、炮制、用量等内容。方中药物计量单位，1979 年前的方剂概用旧制，1979 年后新创方均用公制。方中诸药原无用量者，不予增补；后世转载文献已补用量者，则收录于“备考”中。如组成中个别药物无用量，则在备考项说明：“方中某药用量原缺。”如上述某药原无用量，转载书中有用量者，则根据转载文献补入，亦在备考项说明。

4. 用法：收录方剂的制剂、剂型、服用方法与用量等内容。如原书无用法，转载文献已补用法者，则收录于备考项。

5. 功用、主治、宜忌：分别设项收录、叙述各方的功效、主治病证、组方用方的注意事项。凡收录两种以内不同文献的引文资料，均直接摘收引文；凡收录三种以上不同文献的资料，先由编者根据引文内容归纳成主文，然后下列引文。

宜忌项归纳主文，须有三种以上关于疾病、体质、妊娠宜忌和毒副反应的文献资料。若关于药物配伍宜忌、炮制与煎煮药物器皿宜忌、服药时的饮食宜忌等，均只用引文，不写主文。

6. 加减：仅收录始载书的资料。如加减药物占原方用药比例过多者不录；现代方剂加减不严谨者不录；后世转载书的加减一概不录。

7. 方论选录：择用古今名医对各方组成结构、配伍原理、综合功效、辨证运用、方名释义、类方比较等论述，而有独到见解者。原文精简者，录其全文；文字冗长者，择要摘录。

8. 临证举例：选录古今医家运用各方治疗疾病的实际案例。文字简短者全文照录，文字较长者择要摘录。

9. 现代研究：收摘用现代方法与手段对方剂进行实验研究和剂型改革的资料，包括复方药理作用和主要成分的研究，将传统的成方剂型改造成现代剂型等内容，均以摘要或综述方式撰写。对实验资料，摘录其实验结果，不详述实验方法与操作步骤；对剂型改革，不详述制剂的工艺流程。

10. 备考：凡古今医方中的资料，有不宜收入前述各项而确具参考价值又必须收录者，均在本项叙述。有些方剂经编者研究考证，有必要加以说明者，均在本项加“按”说明之。

11. 自功用以下各项，其内容出处与方源项一致者，所录引文不注出处；如上述各项收录有方源以外其它文献引文者，均分别注明出处。凡两条以上引文均根据文献年代排列，并编有顺序号。

以上十二项，以方源、组成、功用或主治为必备项，其余各项有资料则设，无资料则从缺。

七、引文筛选与整理：所有引文资料，均经过编者去同存异，精心筛选。相同的引文，一般从最早的文献中收录；若后世文献论述精辟者，择用后世文献的资料。凡引文中的封建迷信内容一概不录。引文文义不顺或重复者，在不违背原意前提下，由编者作适当的加工整理。

八、副辞目：凡属副辞目，仅写副辞目的名称与出处，及与相关正辞目的关系。并在相关正辞目的有关项目中与之挂钩呼应：如写作“为某某方之异名”的副辞目，在正辞目异名项挂钩；写作“即某某方加（减）某某药”的副辞目，在正辞目加减项挂钩；其余副辞目，均在正辞目的备考项挂钩。

九、出处标注：正辞目除方源、异名二项标明书名和卷次外，其余诸项均只注书名，不注卷次。副辞目的出处亦标明书名和卷次。

期刊注法统一采用：刊名年；（卷）期：起页。

十、药名统一：凡首字不同的中药异名仍保持原貌，如“瓜蒌”不改“栝楼”，“薯蓣”不改“山药”，“玄胡索”、“元胡索”不改“延胡索”。首字相同的中药异名，第二字以下诸字与《中药大辞典》的正名系同音字者，一律改用《中药大辞典》的正名，如“黄芪”改“黄耆”，“芒硝”改“芒消”，“白藓皮”改“白鲜皮”；若非同音字者，仍保留此异名。凡辞目中含有药名者，处理方法同此。

十一、书名统一：为了压缩篇幅，我们根据历代文献的引用情况，对某些常用方书的书名进行了简化。如《备急千金要方》简称《千金》，《太平圣惠方》简称《圣惠》。未经简化者仍用全称。一书多名者，选用一种常用名，如《人己良方》又名《寿世良方》，则统一用《入

己良方》。

十二、文字统一：本辞典所用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》（1964年第二版）为主要依据。根据中医药学名词术语的要求，少数繁体字如癥瘕之“癥”，橘皮之“橘”等，仍予保留。

十三、文献版本：凡一书有多种版本者，选用善本、足本；无善本者，选用最佳的通行本；其它不同的版本作为校勘、补充。若同一方剂在不同的版本中方名有差异者，以善本、最佳通行本或较早版本之方名作正辞目，其它版本的方名作副辞目。

十四、本辞典分11册出版。1~10册为正编，书前均设该册“方名目录”，按方名笔划顺序编排。第11册为附编，设有全书方名总目录、病证名称索引、参考书目索引、古今度量衡对照表等，以利读者检索。

目 录

六 画

【一】

戎

30067	戎盐丸	1
30068	戎盐丸	1
30069	戎盐方	1
30070	戎盐汤	1
30071	戎盐汤	1
30072	戎盐汤	1
30073	戎盐汤	1
30074	戎盐散	1
30075	戎盐散	1
30076	戎盐散	1
30077	戎盐散	2
30078	戎盐涂敷方	2
30079	戎盐涂敷方	2

巩

30080	巩堤丸	2
-------	-----	---

地

30081	地丁汤	2
30082	地丁饮	2
30083	地丁饮	2
30084	地丁饮	2
30085	地丁散	2
30086	地丁散	3
30087	地丁膏	3
30088	地干丸	3
30089	地六汤	3
30090	地龙丸	3

30091	地龙丸	3	30125	地龙散	6
30092	地龙丸	3	30126	地龙散	6
30093	地龙丸	3	30127	地龙散	7
30094	地龙丸	4	30128	地龙膏	7
30095	地龙丸	4	30129	地龙膏	7
30096	地龙片	4	30130	地龙膏	7
30097	地龙水	4	30131	地龙膏	7
30098	地龙汤	4	30132	地龙膏	7
30099	地龙汤	4	30133	地仙丸	7
30100	地龙汤	4	30134	地仙丸	7
30101	地龙汤	4	30135	地仙丸	7
30102	地龙饮	4	30136	地仙丹	7
30103	地龙油	4	30137	地仙丹	8
30104	地龙酒	4	30138	地仙丹	8
30105	地龙散	4	30139	地仙丹	8
30106	地龙散	5	30140	地仙丹	8
30107	地龙散	5	30141	地仙饮	8
30108	地龙散	5	30142	地仙酒	8
30109	地龙散	5	30143	地仙散	8
30110	地龙散	5	30144	地仙散	8
30111	地龙散	5	30145	地仙散	9
30112	地龙散	5	30146	地仙散	9
30113	地龙散	5	30147	地仙散	9
30114	地龙散	5	30148	地仙煎	9
30115	地龙散	6	30149	地仙膏	9
30116	地龙散	6	30150	地芝丸	9
30117	地龙散	6	30151	地芝丸	9
30118	地龙散	6	30152	地耳散	10
30119	地龙散	6	30153	地血散	10
30120	地龙散	6	30154	地血散	10
30121	地龙散	6	30155	地芩饮	10
30122	地龙散	6	30156	地连丸	10
30123	地龙散	6	30157	地连散	10
30124	地龙散	6	30158	地罗汤	10

30159 地金丸	10	30202 地黄丸	19	30245 地黄丸	25
30160 地金汤	10	30203 地黄丸	19	30246 地黄丸	25
30161 地肤丸	11	30204 地黄丸	19	30247 地黄丸	25
30162 地肤汤	11	30205 地黄丸	19	30248 地黄丸	25
30163 地肤汤	11	30206 地黄丸	19	30249 地黄丸	25
30164 地肤汤	11	30207 地黄丸	19	30250 地黄丸	25
30165 地肤饮	11	30208 地黄丸	20	30251 地黄丸	25
30166 地肤饮	11	30209 地黄丸	20	30252 地黄丸	25
30167 地肤酒	11	30210 地黄丸	20	30253 地黄丸	25
30168 地肤散	12	30211 地黄丸	20	30254 地黄丸	25
30169 地肤煎	12	30212 地黄丸	20	30255 地黄丸	26
30170 地柏散	12	30213 地黄丸	20	30256 地黄丸	26
30171 地骨酒	12	30214 地黄丸	20	30257 地黄丸	26
30172 地骨酒	12	30215 地黄丸	20	30258 地黄丸	26
30173 地骨散	12	30216 地黄丸	20	30259 地黄丸	26
30174 地骨散	12	30217 地黄丸	21	30260 地黄汁	26
30175 地骨散	12	30218 地黄丸	21	30261 地黄汤	26
30176 地骨散	12	30219 地黄丸	21	30262 地黄汤	26
30177 地骨膏	12	30220 地黄丸	21	30263 地黄汤	26
30178 地胆丸	12	30221 地黄丸	22	30264 地黄汤	26
30179 地胆散	13	30222 地黄丸	22	30265 地黄汤	27
30180 地胆膏	13	30223 地黄丸	22	30266 地黄汤	27
30181 地黄丸	13	30224 地黄丸	22	30267 地黄汤	27
30182 地黄丸	13	30225 地黄丸	23	30268 地黄汤	27
30183 地黄丸	13	30226 地黄丸	23	30269 地黄汤	27
30184 地黄丸	13	30227 地黄丸	23	30270 地黄汤	27
30185 地黄丸	13	30228 地黄丸	23	30271 地黄汤	27
30186 地黄丸	14	30229 地黄丸	23	30272 地黄汤	27
30187 地黄丸	14	30230 地黄丸	23	30273 地黄汤	28
30188 地黄丸	14	30231 地黄丸	23	30274 地黄汤	28
30189 地黄丸	14	30232 地黄丸	23	30275 地黄汤	28
30190 地黄丸	14	30233 地黄丸	24	30276 地黄汤	28
30191 地黄丸	14	30234 地黄丸	24	30277 地黄汤	28
30192 地黄丸	15	30235 地黄丸	24	30278 地黄汤	28
30193 地黄丸	15	30236 地黄丸	24	30279 地黄汤	28
30194 地黄丸	15	30237 地黄丸	24	30280 地黄汤	28
30195 地黄丸	18	30238 地黄丸	24	30281 地黄汤	28
30196 地黄丸	18	30239 地黄丸	24	30282 地黄汤	29
30197 地黄丸	18	30240 地黄丸	24	30283 地黄汤	29
30198 地黄丸	18	30241 地黄丸	24	30284 地黄汤	29
30199 地黄丸	18	30242 地黄丸	24	30285 地黄汤	29
30200 地黄丸	19	30243 地黄丸	24	30286 地黄汤	29
30201 地黄丸	19	30244 地黄丸	24	30287 地黄汤	29

30288 地黄汤	29	30331 地黄汤	33	30374 地黄酒	38
30289 地黄汤	29	30332 地黄汤	34	30375 地黄酒	39
30290 地黄汤	30	30333 地黄汤	34	30376 地黄酒	39
30291 地黄汤	30	30334 地黄汤	34	30377 地黄酒	39
30292 地黄汤	30	30335 地黄汤	34	30378 地黄酒	39
30293 地黄汤	30	30336 地黄汤	34	30379 地黄散	39
30294 地黄汤	30	30337 地黄汤	34	30380 地黄散	39
30295 地黄汤	30	30338 地黄汤	34	30381 地黄散	39
30296 地黄汤	30	30339 地黄饮	34	30382 地黄散	39
30297 地黄汤	30	30340 地黄饮	34	30383 地黄散	39
30298 地黄汤	30	30341 地黄饮	34	30384 地黄散	40
30299 地黄汤	31	30342 地黄饮	34	30385 地黄散	40
30300 地黄汤	31	30343 地黄饮	34	30386 地黄散	40
30301 地黄汤	31	30344 地黄饮	34	30387 地黄散	40
30302 地黄汤	31	30345 地黄饮	35	30388 地黄散	40
30303 地黄汤	31	30346 地黄饮	35	30389 地黄散	40
30304 地黄汤	31	30347 地黄饮	36	30390 地黄散	40
30305 地黄汤	31	30348 地黄饮	36	30391 地黄散	40
30306 地黄汤	31	30349 地黄饮	36	30392 地黄散	40
30307 地黄汤	32	30350 地黄饮	36	30393 地黄散	41
30308 地黄汤	32	30351 地黄饮	36	30394 地黄散	41
30309 地黄汤	32	30352 地黄饮	36	30395 地黄散	41
30310 地黄汤	32	30353 地黄饮	36	30396 地黄散	41
30311 地黄汤	32	30354 地黄饮	36	30397 地黄散	41
30312 地黄汤	32	30355 地黄饮	36	30398 地黄散	41
30313 地黄汤	32	30356 地黄饮	37	30399 地黄散	41
30314 地黄汤	32	30357 地黄饮	37	30400 地黄散	42
30315 地黄汤	33	30358 地黄饮	37	30401 地黄散	42
30316 地黄汤	33	30359 地黄饮	37	30402 地黄散	42
30317 地黄汤	33	30360 地黄饮	37	30403 地黄散	42
30318 地黄汤	33	30361 地黄饮	37	30404 地黄散	42
30319 地黄汤	33	30362 地黄饮	37	30405 地黄散	42
30320 地黄汤	33	30363 地黄面	37	30406 地黄散	42
30321 地黄汤	33	30364 地黄饼	37	30407 地黄散	42
30322 地黄汤	33	30365 地黄酒	37	30408 地黄散	42
30323 地黄汤	33	30366 地黄酒	37	30409 地黄散	42
30324 地黄汤	33	30367 地黄酒	37	30410 地黄散	42
30325 地黄汤	33	30368 地黄酒	38	30411 地黄散	43
30326 地黄汤	33	30369 地黄酒	38	30412 地黄散	43
30327 地黄汤	33	30370 地黄酒	38	30413 地黄散	43
30328 地黄汤	33	30371 地黄酒	38	30414 地黄散	43
30329 地黄汤	33	30372 地黄酒	38	30415 地黄散	43
30330 地黄汤	33	30373 地黄酒	38	30416 地黄散	43

30417 地黄散	43	30460 地黄煎	48	30503 地黄膏	54
30418 地黄散	43	30461 地黄煎	48	30504 地黄膏	54
30419 地黄散	44	30462 地黄煎	48	30505 地黄膏	54
30420 地黄散	44	30463 地黄煎	48	30506 地黄膏	54
30421 地黄散	44	30464 地黄煎	49	30507 地黄膏	54
30422 地黄散	44	30465 地黄煎	49	30508 地黄膏	54
30423 地黄散	44	30466 地黄煎	49	30509 地黄膏	54
30424 地黄散	44	30467 地黄煎	49	30510 地黄膏	54
30425 地黄散	44	30468 地黄煎	49	30511 地黄膏	54
30426 地黄散	44	30469 地黄煎	49	30512 地黄膏	55
30427 地黄散	44	30470 地黄煎	49	30513 地黄膏	55
30428 地黄散	45	30471 地黄煎	50	30514 地黄膏	55
30429 地黄散	45	30472 地黄煎	50	30515 地黄膏	55
30430 地黄散	45	30473 地黄煎	50	30516 地黄膏	55
30431 地黄散	45	30474 地黄煎	50	30517 地黄膏	55
30432 地黄散	45	30475 地黄煎	50	30518 地黄膏	55
30433 地黄散	45	30476 地黄煎	50	30519 地黄膏	55
30434 地黄散	45	30477 地黄煎	50	30520 地黄膏	55
30435 地黄散	45	30478 地黄煎	50	30521 地黄膏	56
30436 地黄散	45	30479 地黄煎	51	30522 地黄膏	56
30437 地黄散	45	30480 地黄煎	51	30523 地黄膏	56
30438 地黄散	45	30481 地黄煎	51	30524 地黄膏	56
30439 地黄散	46	30482 地黄煎	51	30525 地黄膏	56
30440 地黄散	46	30483 地黄煎	51	30526 地黄膏	56
30441 地黄散	46	30484 地黄煎	51	30527 地黄膏	56
30442 地黄散	46	30485 地黄煎	51	30528 地黄膏	56
30443 地黄散	46	30486 地黄煎	52	30529 地黄膏	56
30444 地黄散	46	30487 地黄煎	52	30530 地榆丸	57
30445 地黄散	46	30488 地黄煎	52	30531 地榆丸	57
30446 地黄散	46	30489 地黄煎	52	30532 地榆丸	57
30447 地黄散	46	30490 地黄煎	52	30533 地榆丸	57
30448 地黄散	46	30491 地黄煎	52	30534 地榆丸	57
30449 地黄粥	46	30492 地黄煎	52	30535 地榆丸	57
30450 地黄粥	46	30493 地黄煎	52	30536 地榆丸	57
30451 地黄粥	47	30494 地黄煎	53	30537 地榆丸	57
30452 地黄粥	47	30495 地黄煎	53	30538 地榆丸	57
30453 地黄粥	47	30496 地黄煎	53	30539 地榆丹	57
30454 地黄粥	47	30497 地黄煎	53	30540 地榆水	58
30455 地黄粥	47	30498 地黄煎	53	30541 地榆汤	58
30456 地黄煎	47	30499 地黄煎	53	30542 地榆汤	58
30457 地黄煎	47	30500 地黄煎	53	30543 地榆汤	58
30458 地黄煎	48	30501 地黄膏	53	30544 地榆汤	58
30459 地黄煎	48	30502 地黄膏	53	30545 地榆汤	58

30546 地榆汤	58	30589 地榆散	63	30632 地髓汤	67
30547 地榆汤	58	30590 地榆散	63	30633 地髓汤	67
30548 地榆汤	58	30591 地榆散	63	30634 地髓汤	67
30549 地榆汤	59	30592 地榆散	63	30635 地髓散	67
30550 地榆汤	59	30593 地榆散	63	30636 地髓煎	67
30551 地榆汤	59	30594 地榆散	63	30637 地龙饼子	68
30552 地榆汤	59	30595 地榆散	64	30638 地龙浸液	68
30553 地榆汤	59	30596 地榆散	64	30639 地龙粪散	68
30554 地榆汤	59	30597 地榆散	64	30640 地龙粪散	68
30555 地榆汤	59	30598 地榆散	64	30641 地松涂方	68
30556 地榆汤	59	30599 地榆散	64	30642 地肤子丸	68
30557 地榆汤	60	30600 地榆散	64	30643 地肤子丸	68
30558 地榆汤	60	30601 地榆散	64	30644 地肤子丸	68
30559 地榆汤	60	30602 地榆散	64	30645 地肤子丸	68
30560 地榆汤	60	30603 地榆散	64	30646 地肤子丸	69
30561 地榆汤	60	30604 地榆散	65	30647 地肤子丸	69
30562 地榆汤	60	30605 地榆散	65	30648 地肤子汤	69
30563 地榆汤	60	30606 地榆散	65	30649 地肤子汤	69
30564 地榆饮	60	30607 地榆散	65	30650 地肤子汤	69
30565 地榆饮	60	30608 地榆散	65	30651 地肤子汤	69
30566 地榆饮	60	30609 地榆散	65	30652 地肤子散	69
30567 地榆饮	60	30610 地榆散	65	30653 地肤子散	69
30568 地榆饮	60	30611 地榆散	65	30654 地肤子散	69
30569 地榆饮	61	30612 地榆散	65	30655 地肤子散	69
30570 地榆饮	61	30613 地榆散	65	30656 地肤子散	70
30571 地榆饮	61	30614 地榆散	66	30657 地肤子散	70
30572 地榆饮	61	30615 地榆散	66	30658 地肤草汤	70
30573 地榆散	61	30616 地榆散	66	30659 地骨皮丸	70
30574 地榆散	61	30617 地榆散	66	30660 地骨皮丸	70
30575 地榆散	61	30618 地榆散	66	30661 地骨皮丸	70
30576 地榆散	61	30619 地榆散	66	30662 地骨皮丸	70
30577 地榆散	61	30620 地榆散	66	30663 地骨皮丸	70
30578 地榆散	62	30621 地榆散	66	30664 地骨皮丸	70
30579 地榆散	62	30622 地榆散	66	30665 地骨皮丸	71
30580 地榆散	62	30623 地榆散	66	30666 地骨皮丸	71
30581 地榆散	62	30624 地榆散	67	30667 地骨皮丸	71
30582 地榆散	62	30625 地榆散	67	30668 地骨皮汤	71
30583 地榆散	62	30626 地榆膏	67	30669 地骨皮汤	71
30584 地榆散	62	30627 地锦汤	67	30670 地骨皮汤	71
30585 地榆散	62	30628 地熏散	67	30671 地骨皮汤	71
30586 地榆散	62	30629 地魄汤	67	30672 地骨皮汤	71
30587 地榆散	63	30630 地鳖散	67	30673 地骨皮汤	72
30588 地榆散	63	30631 地髓汤	67	30674 地骨皮汤	72

30675 地骨皮汤	72	30718 地骨皮散	76	30761 地骨皮散	82
30676 地骨皮汤	72	30719 地骨皮散	77	30762 地骨皮散	82
30677 地骨皮汤	72	30720 地骨皮散	77	30763 地骨皮散	82
30678 地骨皮汤	72	30721 地骨皮散	77	30764 地骨皮散	82
30679 地骨皮汤	72	30722 地骨皮散	77	30765 地骨皮散	82
30680 地骨皮汤	72	30723 地骨皮散	77	30766 地骨皮散	82
30681 地骨皮汤	72	30724 地骨皮散	77	30767 地骨皮散	82
30682 地骨皮汤	72	30725 地骨皮散	77	30768 地骨皮散	82
30683 地骨皮汤	73	30726 地骨皮散	77	30769 地骨皮散	83
30684 地骨皮汤	73	30727 地骨皮散	78	30770 地骨皮散	83
30685 地骨皮汤	73	30728 地骨皮散	78	30771 地骨皮散	83
30686 地骨皮汤	73	30729 地骨皮散	78	30772 地骨皮散	83
30687 地骨皮汤	73	30730 地骨皮散	78	30773 地骨皮散	83
30688 地骨皮汤	73	30731 地骨皮散	78	30774 地骨皮散	83
30689 地骨皮汤	73	30732 地骨皮散	78	30775 地骨皮散	83
30690 地骨皮汤	73	30733 地骨皮散	78	30776 地骨皮露	83
30691 地骨皮汤	74	30734 地骨皮散	78	30777 地扁竹散	83
30692 地骨皮汤	74	30735 地骨皮散	79	30778 地菰苗散	83
30693 地骨皮汤	74	30736 地骨皮散	79	30779 地黄小煎	83
30694 地骨皮汤	74	30737 地骨皮散	79	30780 地黄汁汤	84
30695 地骨皮汤	74	30738 地骨皮散	79	30781 地黄汁汤	84
30696 地骨皮汤	74	30739 地骨皮散	79	30782 地黄花粥	84
30697 地骨皮汤	74	30740 地骨皮散	79	30783 地黄饮子	84
30698 地骨皮汤	74	30741 地骨皮散	79	30784 地黄饮子	84
30699 地骨皮汤	74	30742 地骨皮散	80	30785 地黄饮子	84
30700 地骨皮汤	74	30743 地骨皮散	80	30786 地黄饮子	84
30701 地骨皮汤	75	30744 地骨皮散	80	30787 地黄饮子	84
30702 地骨皮汤	75	30745 地骨皮散	80	30788 地黄饮子	85
30703 地骨皮汤	75	30746 地骨皮散	80	30789 地黄饮子	85
30704 地骨皮汤	75	30747 地骨皮散	80	30790 地黄饮子	85
30705 地骨皮汤	75	30748 地骨皮散	80	30791 地黄饮子	85
30706 地骨皮饮	75	30749 地骨皮散	80	30792 地黄饼子	85
30707 地骨皮饮	75	30750 地骨皮散	81	30793 地黄酒酥	85
30708 地骨皮饮	75	30751 地骨皮散	81	30794 地黄蒸丸	85
30709 地骨皮饮	75	30752 地骨皮散	81	30795 地黄罍方	85
30710 地骨皮饮	75	30753 地骨皮散	81	30796 地黄傅饪	85
30711 地骨皮饮	76	30754 地骨皮散	81	30797 地黄煎丸	86
30712 地骨皮散	76	30755 地骨皮散	81	30798 地黄煎丸	86
30713 地骨皮散	76	30756 地骨皮散	81	30799 地黄煎丸	86
30714 地骨皮散	76	30757 地骨皮散	81	30800 地黄煎丸	87
30715 地骨皮散	76	30758 地骨皮散	81	30801 地黄煎丸	87
30716 地骨皮散	76	30759 地骨皮散	81	30802 地黄煎丸	87
30717 地骨皮散	76	30760 地骨皮散	82	30803 地黄煎丸	87

30928	朴梔散	103
30929	朴香丸	103
30930	朴姜汤	103
30931	朴消丸	103
30932	朴消丸	103
30933	朴消丸	103
30934	朴消丸	103
30935	朴消丸	104
30936	朴消汤	104
30937	朴消汤	104
30938	朴消汤	104
30939	朴消汤	104
30940	朴消汤	104
30941	朴消散	104
30942	朴消散	104
30943	朴消散	104
30944	朴消散	105
30945	朴消散	105
30946	朴消散	105
30947	朴消散	105
30948	朴消散	105
30949	朴消散	105
30950	朴消散	105
30951	朴消散	105
30952	朴消散	105
30953	朴消散	105
30954	朴消散	105
30955	朴消散	105
30956	朴消煎	106
30957	朴消膏	106
30958	朴消膏	106
30959	朴消膏	106
30960	朴黄丸	106
30961	朴黄丸	106
30962	朴黄丸	106
30963	朴黄汤	107
30964	朴黄汤	107
30965	朴黄汤	107
30966	朴槲丸	107
30967	朴麝散	107
30968	朴沉化郁丸	107
30969	朴附二陈汤	107
30970	朴果四皮饮	107

30971	朴实六合汤	107
30972	朴消大黄煎	107
30973	朴消牛膝汤	108
30974	朴消荡胞汤	108
30975	朴消急救饮	108

权

30976 榎木丸 108

卒

30977	芋粥	108
30978	芋茺丸	109
30979	芋茺粥	109

苟

30980	芍甘汤	109
30981	芍苓汤	109
30982	芍药丸	109
30983	芍药丸	109
30984	芍药丸	109
30985	芍药丸	109
30986	芍药丸	109
30987	芍药丸	110
30988	芍药丸	110
30989	芍药丸	110
30990	芍药丸	110
30991	芍药丸	110
30992	芍药丸	110
30993	芍药丸	110
30994	芍药丸	110
30995	芍药丸	111
30996	芍药丸	111
30997	芍药丸	111
30998	芍药丸	111
30999	芍药丸	111
31000	芍药汤	111
31001	芍药汤	111
31002	芍药汤	111
31003	芍药汤	112
31004	芍药汤	112
31005	芍药汤	112
31006	芍药汤	112
31007	芍药汤	112

31008	芍药汤	112
31009	芍药汤	112
31010	芍药汤	113
31011	芍药汤	113
31012	芍药汤	113
31013	芍药汤	113
31014	芍药汤	113
31015	芍药汤	113
31016	芍药汤	113
31017	芍药汤	113
31018	芍药汤	113
31019	芍药汤	113
31020	芍药汤	114
31021	芍药汤	114
31022	芍药汤	114
31023	芍药汤	114
31024	芍药汤	114
31025	芍药汤	114
31026	芍药汤	114
31027	芍药汤	114
31028	芍药汤	115
31029	芍药汤	115
31030	芍药汤	115
31031	芍药汤	115
31032	芍药汤	115
31033	芍药汤	115
31034	芍药汤	115
31035	芍药汤	115
31036	芍药汤	115
31037	芍药汤	116
31038	芍药汤	116
31039	芍药汤	116
31040	芍药汤	116
31041	芍药汤	116
31042	芍药汤	116
31043	芍药汤	116
31044	芍药汤	116
31045	芍药汤	117
31046	芍药汤	117
31047	芍药汤	117
31048	芍药汤	117
31049	芍药汤	117
31050	芍药汤	117

31051 芍药汤	117	31094 芍药饮	123	31137 芍药干姜汤	127
31052 芍药汤	117	31095 芍药饮	123	31138 芍药木香汤	127
31053 芍药汤	118	31096 芍药饮	123	31139 芍药化毒汤	127
31054 芍药汤	118	31097 芍药饮	123	31140 芍药六合汤	128
31055 芍药汤	118	31098 芍药散	123	31141 芍药甘草汤	128
31056 芍药汤	118	31099 芍药散	123	31142 芍药甘草汤	129
31057 芍药汤	118	31100 芍药散	123	31143 芍药甘草汤	129
31058 芍药汤	118	31101 芍药散	124	31144 芍药甘草汤	129
31059 芍药汤	118	31102 芍药散	124	31145 芍药地黄汤	129
31060 芍药汤	118	31103 芍药散	124	31146 芍药地黄汤	130
31061 芍药汤	119	31104 芍药散	124	31147 芍药地黄汤	130
31062 芍药汤	119	31105 芍药散	124	31148 芍药地榆汤	130
31063 芍药汤	119	31106 芍药散	124	31149 芍药竹茹汤	131
31064 芍药汤	119	31107 芍药散	124	31150 芍药防风汤	131
31065 芍药汤	119	31108 芍药散	124	31151 芍药防风汤	131
31066 芍药汤	119	31109 芍药散	125	31152 芍药补气汤	131
31067 芍药汤	119	31110 芍药散	125	31153 芍药虎骨散	131
31068 芍药汤	119	31111 芍药散	125	31154 芍药和中汤	131
31069 芍药汤	119	31112 芍药散	125	31155 芍药知母汤	131
31070 芍药汤	121	31113 芍药散	125	31156 芍药枳术丸	131
31071 芍药汤	121	31114 芍药散	125	31157 芍药枳实散	131
31072 芍药汤	121	31115 芍药散	125	31158 芍药柏皮丸	132
31073 芍药汤	121	31116 芍药散	125	31159 芍药柏皮丸	132
31074 芍药汤	121	31117 芍药散	126	31160 芍药柏皮丸	132
31075 芍药汤	121	31118 芍药散	126	31161 芍药柏皮丸	132
31076 芍药汤	121	31119 芍药散	126	31162 芍药梔豉汤	132
31077 芍药汤	121	31120 芍药散	126	31163 芍药香连汤	132
31078 芍药汤	121	31121 芍药散	126	31164 芍药香附丸	132
31079 芍药汤	121	31122 芍药散	126	31165 芍药香附汤	132
31080 芍药汤	121	31123 芍药散	126	31166 芍药健脾汤	132
31081 芍药汤	122	31124 芍药散	126	31167 芍药润燥丹	132
31082 芍药汤	122	31125 芍药散	126	31168 芍药黄土汤	132
31083 芍药汤	122	31126 芍药散	126	31169 芍药黄芩汤	133
31084 芍药汤	122	31127 芍药散	127	31170 芍药黄芩汤	133
31085 芍药汤	122	31128 芍药散	127	31171 芍药黄连汤	133
31086 芍药汤	122	31129 芍药散	127	31172 芍药黄连汤	133
31087 芍药汤	122	31130 芍药散	127	31173 芍药黄连汤	133
31088 芍药汤	122	31131 芍药散	127	31174 芍药黄芩汤	133
31089 芍药汤	122	31132 芍药散	127	31175 芍药黄芩汤	133
31090 芍药汤	122	31133 芍药散	127	31176 芍药黄芩汤	133
31091 芍药汤	122	31134 芍药膏	127	31177 芍药黄芩汤	134
31092 芍药饮	122	31135 芍药饮子	127	31178 芍药黄芩汤	134
31093 芍药饮	123	31136 芍药浸酒	127	31179 芍药黄芩散	134

31180 芍药清肝散	134
31181 芍药蒺藜煎	134
31182 芍药解肌汤	134
31183 芍药槟榔散	134
31184 芍药甘草附子汤 ...	134
31185 芍药四物解肌汤 ...	135
31186 芍药汤加芒消方 ...	135
31187 芍药芩连葛根汤 ...	135
31188 芍药附子甘草汤 ...	135
31189 芍药枣仁柴胡汤 ...	135
31190 芍药桂苓胶地汤 ...	135

芩

31191 芩柏散	135
-----------------	-----

芒

31192 芒消丸	135
31193 芒消丸	135
31194 芒消丸	135
31195 芒消丸	136
31196 芒消汤	136
31197 芒消汤	136
31198 芒消汤	136
31199 芒消汤	136
31200 芒消汤	136
31201 芒消汤	136
31202 芒消汤	137
31203 芒消汤	137
31204 芒消汤	137
31205 芒消饮	137
31206 芒消散	137
31207 芒消散	137
31208 芒消散	137
31209 芒消散	137
31210 芒消散	137
31211 芒消散	138
31212 芒消散	138
31213 芒消紫丸	138
31214 芒消甘草汤	138
31215 芒消猪胆膏	138

芩

31216 芩麻酒	138
-----------------	-----

31217 芩麻仁汤	138
------------------	-----

芩

31218 芩汤	138
31219 芩乌散	138
31220 芩乌散	138
31221 芩术丸	139
31222 芩术丸	139
31223 芩术丹	139
31224 芩术汤	139
31225 芩术汤	139
31226 芩术汤	139
31227 芩术汤	139
31228 芩术汤	139
31229 芩术散	139
31230 芩术散	139
31231 芩术散	140
31232 芩术散	140
31233 芩归丸	140
31234 芩归汤	140
31235 芩归汤	140
31236 芩归汤	140
31237 芩归汤	140
31238 芩归汤	140
31239 芩归汤	140
31240 芩归汤	140
31241 芩归汤	141
31242 芩归汤	141
31243 芩归汤	141
31244 芩归汤	141
31245 芩归汤	141
31246 芩归汤	141
31247 芩归汤	141
31248 芩归汤	141
31249 芩归汤	141
31250 芩归汤	141
31251 芩归汤	141
31252 芩归饮	141
31253 芩归饮	142
31254 芩归饮	142
31255 芩归饮	142
31256 芩归饮	142
31257 芩归散	142

31258 芩归散	142
31259 芩归散	142
31260 芩归散	142
31261 芩归散	142
31262 芩归散	142
31263 芩归散	142
31264 芩归散	142
31265 芩仙丸	142
31266 芩皮散	143
31267 芩朴丸	143
31268 芩当散	143
31269 芩防汤	143
31270 芩芷丸	143
31271 芩芷汤	143
31272 芩芷汤	143
31273 芩芷散	143
31274 芩芷散	143
31275 芩芷散	144
31276 芩芷散	144
31277 芩芷散	144
31278 芩芷膏	144
31279 芩苏饮	144
31280 芩苏饮	144
31281 芩苏饮	144
31282 芩苏饮	144
31283 芩苏散	144
31284 芩苏散	145
31285 芩苏散	145
31286 芩苏散	145
31287 芩苏散	145
31288 芩苏散	145
31289 芩连散	145
31290 芩辛丸	145
31291 芩辛丸	146
31292 芩辛丸	146
31293 芩辛丸	146
31294 芩辛汤	146
31295 芩辛汤	146
31296 芩辛汤	147
31297 芩辛汤	147
31298 芩辛汤	147
31299 芩辛汤	147
31300 芩辛汤	147

31301 芎辛汤	147	31344 芎蒭丸	152	31387 芎蒭汤	158
31302 芎辛散	147	31345 芎蒭丸	153	31388 芎蒭汤	159
31303 芎辛散	147	31346 芎蒭丸	153	31389 芎蒭汤	159
31304 芎辛散	147	31347 芎蒭丸	153	31390 芎蒭汤	159
31305 芎辛散	148	31348 芎蒭丸	153	31391 芎蒭汤	159
31306 芎辛散	148	31349 芎蒭丸	153	31392 芎蒭汤	159
31307 芎辛散	148	31350 芎蒭丸	153	31393 芎蒭汤	159
31308 芎辛散	148	31351 芎蒭丸	153	31394 芎蒭汤	159
31309 芎辛煎	148	31352 芎蒭丸	153	31395 芎蒭汤	159
31310 芎羌汤	148	31353 芎蒭丸	154	31396 芎蒭汤	160
31311 芎羌散	148	31354 芎蒭丸	154	31397 芎蒭汤	160
31312 芎羌散	148	31355 芎蒭汤	154	31398 芎蒭汤	160
31313 芎附汤	149	31356 芎蒭汤	154	31399 芎蒭汤	160
31314 芎附汤	149	31357 芎蒭汤	154	31400 芎蒭汤	160
31315 芎附汤	149	31358 芎蒭汤	154	31401 芎蒭汤	160
31316 芎附饮	149	31359 芎蒭汤	155	31402 芎蒭汤	160
31317 芎附散	149	31360 芎蒭汤	155	31403 芎蒭汤	160
31318 芎附散	150	31361 芎蒭汤	155	31404 芎蒭汤	160
31319 芎附散	150	31362 芎蒭汤	155	31405 芎蒭汤	160
31320 芎枳丸	150	31363 芎蒭汤	155	31406 芎蒭汤	161
31321 芎梔汤	150	31364 芎蒭汤	155	31407 芎蒭汤	161
31322 芎胡饮	150	31365 芎蒭汤	156	31408 芎蒭汤	161
31323 芎胡散	150	31366 芎蒭汤	156	31409 芎蒭汤	161
31324 芎荆散	150	31367 芎蒭汤	156	31410 芎蒭汤	161
31325 芎草散	150	31368 芎蒭汤	156	31411 芎蒭汤	161
31326 芎茶汤	150	31369 芎蒭汤	156	31412 芎蒭汤	161
31327 芎香散	150	31370 芎蒭汤	156	31413 芎蒭饮	161
31328 芎香散	151	31371 芎蒭汤	157	31414 芎蒭饮	161
31329 芎活汤	151	31372 芎蒭汤	157	31415 芎蒭饮	161
31330 芎活汤	151	31373 芎蒭汤	157	31416 芎蒭酒	161
31331 芎活汤	151	31374 芎蒭汤	157	31417 芎蒭酒	162
31332 芎活散	151	31375 芎蒭汤	157	31418 芎蒭酒	162
31333 芎桂散	151	31376 芎蒭汤	157	31419 芎蒭粉	162
31334 芎桂散	151	31377 芎蒭汤	157	31420 芎蒭散	162
31335 芎桂散	151	31378 芎蒭汤	157	31421 芎蒭散	162
31336 芎蒭丸	151	31379 芎蒭汤	157	31422 芎蒭散	163
31337 芎蒭丸	151	31380 芎蒭汤	158	31423 芎蒭散	163
31338 芎蒭丸	152	31381 芎蒭汤	158	31424 芎蒭散	163
31339 芎蒭丸	152	31382 芎蒭汤	158	31425 芎蒭散	163
31340 芎蒭丸	152	31383 芎蒭汤	158	31426 芎蒭散	163
31341 芎蒭丸	152	31384 芎蒭汤	158	31427 芎蒭散	163
31342 芎蒭丸	152	31385 芎蒭汤	158	31428 芎蒭散	163
31343 芎蒭丸	152	31386 芎蒭汤	158	31429 芎蒭散	164

31430 芎藭散	164	31473 芎藭散	169	31516 芎黄散	173
31431 芎藭散	164	31474 芎藭散	169	31517 芎黄散	173
31432 芎藭散	164	31475 芎藭散	169	31518 芎麻汤	173
31433 芎藭散	164	31476 芎藭散	169	31519 芎葛汤	173
31434 芎藭散	164	31477 芎藭散	169	31520 芎粟散	174
31435 芎藭散	164	31478 芎藭散	169	31521 芎犀丸	174
31436 芎藭散	165	31479 芎藭散	170	31522 芎犀丸	174
31437 芎藭散	165	31480 芎藭散	170	31523 芎犀散	174
31438 芎藭散	165	31481 芎藭散	170	31524 芎犀散	174
31439 芎藭散	165	31482 芎藭散	170	31525 芎蝎散	174
31440 芎藭散	165	31483 芎藭散	170	31526 芎藭饮子	174
31441 芎藭散	165	31484 芎藭散	170	31527 芎藭饮子	175
31442 芎藭散	165	31485 芎藭散	170	31528 芎藭煮散	175
31443 芎藭散	165	31486 芎藭散	170	31529 芎术香苏散	175
31444 芎藭散	166	31487 芎藭散	170	31530 芎术香连丸	175
31445 芎藭散	166	31488 芎藭散	170	31531 芎术除眩汤	175
31446 芎藭散	166	31489 芎藭散	170	31532 芎术除眩散	175
31447 芎藭散	166	31490 芎藭散	170	31533 芎术除湿汤	175
31448 芎藭散	166	31491 芎藭散	170	31534 芎归二术汤	175
31449 芎藭散	166	31492 芎藭膏	171	31535 芎归二陈汤	175
31450 芎藭散	167	31493 芎藭膏	171	31536 芎归二陈汤	175
31451 芎藭散	167	31494 芎藭膏	171	31537 芎归人参散	176
31452 芎藭散	167	31495 芎藭膏	171	31538 芎归内托散	176
31453 芎藭散	167	31496 芎膏丸	171	31539 芎归加桂汤	176
31454 芎藭散	167	31497 芎夏汤	171	31540 芎归芍药汤	176
31455 芎藭散	167	31498 芎胶散	171	31541 芎归百草饮	176
31456 芎藭散	167	31499 芎粉丸	171	31542 芎归托里散	176
31457 芎藭散	168	31500 芎菊汤	171	31543 芎归血余散	176
31458 芎藭散	168	31501 芎菊散	172	31544 芎归安心汤	176
31459 芎藭散	168	31502 芎菊散	172	31545 芎归均气饮	176
31460 芎藭散	168	31503 芎菊散	172	31546 芎归苏苓汤	177
31461 芎藭散	168	31504 芎黄丸	172	31547 芎归两和汤	177
31462 芎藭散	168	31505 芎黄汤	172	31548 芎归补中汤	177
31463 芎藭散	168	31506 芎黄汤	172	31549 芎归补中汤	177
31464 芎藭散	168	31507 芎黄汤	172	31550 芎归补中汤	177
31465 芎藭散	168	31508 芎黄汤	172	31551 芎归补血汤	177
31466 芎藭散	168	31509 芎黄汤	172	31552 芎归补血汤	177
31467 芎藭散	169	31510 芎黄汤	173	31553 芎归补血汤	177
31468 芎藭散	169	31511 芎黄散	173	31554 芎归补血饮	177
31469 芎藭散	169	31512 芎黄散	173	31555 芎归阿胶汤	177
31470 芎藭散	169	31513 芎黄散	173	31556 芎归枣仁汤	177
31471 芎藭散	169	31514 芎黄散	173	31557 芎归明目丸	178
31472 芎藭散	169	31515 芎黄散	173	31558 芎归泻心汤	178

31559	芎归泻肝汤	178
31560	芎归定喘汤	178
31561	芎归保元汤	178
31562	芎归独活汤	178
31563	芎归首乌饮	178
31564	芎归养荣汤	179
31565	芎归养荣汤	179
31566	芎归养荣汤	179
31567	芎归养荣汤	179
31568	芎归桂朴汤	179
31569	芎归桂朴汤	179
31570	芎归胶艾汤	179
31571	芎归胶艾汤	180
31572	芎归益母丸	180
31573	芎归调血饮	180
31574	芎归理中汤	180
31575	芎归理中汤	180
31576	芎归寄生汤	181
31577	芎归寄生散	181
31578	芎归葱白汤	181
31579	芎归疏肝汤	181
31580	芎归愈痛汤	181
31581	芎归鳖甲汤	181
31582	芎归鳖甲饮	181
31583	芎归鳖甲散	181
31584	芎归鳖甲散	181
31585	芎当泻心汤	181
31586	芎芷正气散	182
31587	芎芷石膏汤	182
31588	芎芷香苏饮	182
31589	芎芷香苏饮	182
31590	芎芷香苏散	182
31591	芎芷香苏散	182
31592	芎芷香苏散	182
31593	芎芷香苏散	182
31594	芎芷香苏散	182
31595	芎芷香苏散	182
31596	芎芷香苏散	182
31597	芎芷透毒汤	183
31598	芎芷藿苏散	183
31599	芎苏五苓饮	183
31600	芎苏五苓饮	183
31601	芎苏泻白散	183
31602	芎苏香葛散	183
31603	芎苏柴陈汤	184
31604	芎辛导痰汤	184
31605	芎辛益气汤	184
31606	芎辛菊花散	184
31607	芎蒡三棱汤	184
31608	芎蒡天麻丸	184
31609	芎蒡补中汤	184
31610	芎蒡补血汤	184
31611	芎蒡附子汤	185
31612	芎蒡前胡汤	185
31613	芎蒡温中汤	185
31614	芎菊上清丸	185
31615	芎菊茶调散	185
31616	芎菊茶调散	185
31617	芎椒白术散	185
31618	芎归六君子汤	185
31619	芎归四君子汤	185
31620	芎归加古拜汤	185
31621	芎归加芍药汤	185
31622	芎归加黑豆汤	186
31623	芎芷香苏灵散	186
31624	芎蒡加芍药汤	186
31625	芎术姜栀二陈汤	...	186
31626	芎蒡汤加芍药方	...	186
31627	芎蒡当归加芍药汤	186
吉			
31628	吉利散	186
31629	吉利散	186
31630	吉祥丸	186
31631	吉祥丸	187
31632	吉祥油	187
31633	吉州醒脾散	187
31634	吉州醒脾散	187
老			
31635	老龙丸	187
31636	老奴丸	187
31637	老军散	187
31638	老君丹	187
31639	老君丹	188
31640	老鸡丸	188
31641	老疟丸	188
31642	老疟丹	188
31643	老疟丹	188
31644	老疟饮	188
31645	老鸦丹	188
31646	老姜丸	188
31647	老鸭果	189
31648	老鼠屎	189
31649	老痰丸	189
31650	老蔻丸	189
31651	老膜散	189
31652	老膜散	189
31653	老子乳丹	189
31654	老柏皮散	189
31655	老鸛草膏	190
31656	老年白带方	190
31657	老年延寿丹	190
31658	老君长命丹	190
31659	老君神白散	190
31660	老君神明散	190
31661	老君益寿散	190
31662	老翁神杖散	190
31663	老君神明白散	191
31664	老君神明白术散	...	191
西			
31665	西瓜膏	191
31666	西瓜霜	191
31667	西瓜霜	191
31668	西瓜霜	191
31669	西圣丸	192
31670	西来方	192
31671	西黄丸	192
31672	西黄丸	192
31673	西清汤	192
31674	西礞散	192
31675	西台金丹	192
31676	西洋参酒	192
31677	西洋药酒	192
31678	西风暴雨方	192
31679	西圣复煎丸	193
31680	西州续命汤	193

31681	西州续命汤	193
31682	西州续命汤	193
31683	西州续命汤	193
31684	西来甘露饮	194
31685	西岳华峰方	194
31686	西洋十宝散	194
31687	西域黄灵膏	194
31688	西黄化毒丹	194
31689	西黄化毒丹	194
31690	西黄醒消丸	194
31691	西王母四童散	194
31692	西川石刻安肾丸	195
31693	西王母玉壶赤丸	195
31694	西岳真人灵飞散	196
31695	西蜀石刻安肾丸	197
31696	西川罗赤脚仙还少 丹	197
31697	西岳蓬华峰神传齿 药	197

亚

31698	亚圣膏	197
-------	-----	-----

再

31699	再生丸	197
31700	再生丸	197
31701	再生丸	198
31702	再生丹	198
31703	再生丹	198
31704	再生丹	198
31705	再生丹	198
31706	再生丹	198
31707	再生丹	198
31708	再生散	198
31709	再生散	198
31710	再生散	198
31711	再仙丹	198
31712	再攻饮	199
31713	再苏丸	199
31714	再苏丹	199
31715	再苏丹	199
31716	再苏散	199
31717	再造丸	199

31718	再造丸	199
31719	再造丸	199
31720	再造丸	200
31721	再造丸	200
31722	再造丸	200
31723	再造丹	201
31724	再造丹	201
31725	再造汤	201
31726	再造汤	201
31727	再造饮	202
31728	再造散	202
31729	再造散	202
31730	再造散	202
31731	再造膏	202
31732	再造膏	203
31733	再黑膏	203
31734	再合宁心丹	203
31735	再造至宝丹	203
31736	再造还明丸	203
31737	再造紫金丹	203
31738	再生活血止痛散	204

耳

31739	耳膏	204
31740	耳疳散	204
31741	耳鸣丸	204
31742	耳鸣丸	204
31743	耳底油	204
31744	耳底散	204
31745	耳炎散	204
31746	耳桃煎	205
31747	耳脓散	205
31748	耳疳散	205
31749	耳疳散	205
31750	耳疳散	205
31751	耳聋丸	205
31752	耳聋丸	205
31753	耳痛散	205
31754	耳聋神丹	205
31755	耳底八宝油	205
31756	耳底白龙散	206
31757	耳脓独龙丹	206
31758	耳聋左慈丸	206

31759	耳聋左慈丸	206
31760	耳聋故纸丸	206
31761	耳聋烧肾散	206
31762	耳聋鼠胆丹	206
31763	耳聋开窍神效丹	206

共

31764	共殿香	207
-------	-----	-----

列

31765	列节浸酒	207
-------	------	-----

夺

31766	夺命丹	207
31767	夺天丹	207
31768	夺关散	207
31769	夺郁汤	207
31770	夺命丸	207
31771	夺命丸	207
31772	夺命丸	208
31773	夺命丸	208
31774	夺命丸	208
31775	夺命丸	208
31776	夺命丸	208
31777	夺命丸	208
31778	夺命丸	208
31779	夺命丹	208
31780	夺命丹	208
31781	夺命丹	208
31782	夺命丹	209
31783	夺命丹	209
31784	夺命丹	209
31785	夺命丹	209
31786	夺命丹	209
31787	夺命丹	209
31788	夺命丹	209
31789	夺命丹	210
31790	夺命丹	210
31791	夺命丹	210
31792	夺命丹	210
31793	夺命丹	210
31794	夺命丹	210
31795	夺命丹	210

31796 夺命丹	211	31839 夺命丹	216	31882 夺命散	221
31797 夺命丹	211	31840 夺命丹	216	31883 夺命散	221
31798 夺命丹	211	31841 夺命丹	216	31884 夺命散	221
31799 夺命丹	211	31842 夺命丹	217	31885 夺命散	221
31800 夺命丹	211	31843 夺命丹	217	31886 夺命散	221
31801 夺命丹	211	31844 夺命丹	217	31887 夺命散	221
31802 夺命丹	212	31845 夺命丹	217	31888 夺命散	222
31803 夺命丹	212	31846 夺命汤	217	31889 夺命散	222
31804 夺命丹	212	31847 夺命汤	217	31890 夺命散	222
31805 夺命丹	212	31848 夺命汤	217	31891 夺命散	222
31806 夺命丹	212	31849 夺命汤	217	31892 夺命散	222
31807 夺命丹	212	31850 夺命饮	217	31893 夺命散	222
31808 夺命丹	212	31851 夺命饮	217	31894 夺命散	222
31809 夺命丹	213	31852 夺命散	218	31895 夺命散	222
31810 夺命丹	213	31853 夺命散	218	31896 夺命散	222
31811 夺命丹	213	31854 夺命散	218	31897 夺命煎	222
31812 夺命丹	213	31855 夺命散	218	31898 夺命膏	223
31813 夺命丹	213	31856 夺命散	218	31899 夺命膏	223
31814 夺命丹	213	31857 夺命散	218	31900 夺真丹	223
31815 夺命丹	213	31858 夺命散	218	31901 夺痒散	223
31816 夺命丹	214	31859 夺命散	218	31902 夺魂汤	223
31817 夺命丹	214	31860 夺命散	218	31903 夺魂散	223
31818 夺命丹	214	31861 夺命散	218	31904 夺魂散	223
31819 夺命丹	214	31862 夺命散	218	31905 夺魄散	223
31820 夺命丹	214	31863 夺命散	219	31906 夺命方丹	224
31821 夺命丹	214	31864 夺命散	219	31907 夺命坐丹	224
31822 夺命丹	214	31865 夺命散	219	31908 夺命金丹	224
31823 夺命丹	214	31866 夺命散	219	31909 夺天造化丸	224
31824 夺命丹	214	31867 夺命散	219	31910 夺关将军散	224
31825 夺命丹	215	31868 夺命散	219	31911 夺命川附汤	224
31826 夺命丹	215	31869 夺命散	219	31912 夺命无忧散	225
31827 夺命丹	215	31870 夺命散	219	31913 夺命五毒丹	225
31828 夺命丹	215	31871 夺命散	220	31914 夺命回生散	225
31829 夺命丹	215	31872 夺命散	220	31915 夺命红枣丹	225
31830 夺命丹	215	31873 夺命散	220	31916 夺命更生散	225
31831 夺命丹	215	31874 夺命散	220	31917 夺命还真丹	226
31832 夺命丹	215	31875 夺命散	220	31918 夺命返魂散	226
31833 夺命丹	216	31876 夺命散	220	31919 夺命沉香散	226
31834 夺命丹	216	31877 夺命散	220	31920 夺命抽刀散	226
31835 夺命丹	216	31878 夺命散	221	31921 夺命轻粉散	226
31836 夺命丹	216	31879 夺命散	221	31922 夺命保生丹	226
31837 夺命丹	216	31880 夺命散	221	31923 夺命追魂散	226
31838 夺命丹	216	31881 夺命散	221	31924 夺命独参汤	226

31925	夺命神效膏	227
31926	夺命神蛇散	227
31927	夺命通关散	227
31928	夺命通关散	227
31929	夺命接骨丹	227
31930	夺命救生散	227
31931	夺命救痢饮	228
31932	夺命象皮丸	228
31933	夺命雄朱丹	228
31934	夺命紫金丹	228
31935	夺命箸头散	228
31936	夺命褐散子	228
31937	夺命大青金丹	229
31938	夺命将军一枝花	229

压

31939	压气散	229
31940	压风汤	229
31941	压惊丸	229
31942	压惊汤	229
31943	压掌散	229
31944	压热饮子	229
31945	压热饮子	230
31946	压气木香丸	230
31947	压热袍龙丸	230
31948	压热神白膏	230
31949	压惊扶神散	230
31950	压惊犀角饮子	230

戾

31951	戾生方	230
31952	戾红温胃饮	230

有

31953	有名漏紫散	230
31954	有腐生肌散	231

灰

31955	灰煎	231
31956	灰水膏	231
31957	灰米膏	231
31958	灰皂散	231
31959	灰矿散	231

31960	灰草散	231
31961	灰韭散	231
31962	灰浆膏	232
31963	灰弹散	
31964	灰糖水	232
31965	灰藟膏	232
31966	灰藟涂方	232

存

31967	存安曲	232
31968	存阴汤	232
31969	存命汤	232
31970	存注丹	233

达

31971	达生丹	233
31972	达生汤	233
31973	达生散	233
31974	达生散	234
31975	达生散	234
31976	达生散	234
31977	达生散	234
31978	达生散	234
31979	达生散	234
31980	达生散	234
31981	达生散	234
31982	达郁汤	235
31983	达郁汤	235
31984	达郁汤	235
31985	达原丸	235
31986	达原饮	235
31987	达原饮	235
31988	达原散	236
31989	达营丸	236
31990	达营汤	236
31991	达气和中汤	236
31992	达气养营汤	236
31993	达原败毒散	236
31994	达原解毒汤	236

戊

31995	戊药	237
31996	戊油膏	237

31997	戊毒丹	237
31998	戊骨丹	237
31999	戊粮至宝丹	237

成

32000	成膏	237
32001	成炼钟乳粉	237
32002	成炼钟乳散	238

百

32003	百一膏	238
32004	百二散	238
32005	百子酒	238
32006	百五散	238
32007	百中汤	238
32008	百中饮	238
32009	百中散	239
32010	百中散	239
32011	百中散	239
32012	百中散	239
32013	百风汤	239
32014	百水散	239
32015	百生丸	239
32016	百生方	239
32017	百当膏	239
32018	百岁丸	239
32019	百岁酒	240
32020	百伤饮	240
32021	百全丸	240
32022	百合丸	240
32023	百合丸	240
32024	百合丸	240
32025	百合丹	240
32026	百合丹	240
32027	百合汤	241
32028	百合汤	241
32029	百合汤	241
32030	百合汤	241
32031	百合汤	241
32032	百合汤	241
32033	百合汤	242
32034	百合汤	242
32035	百合汤	242

32036 百合汤	242	32079 百花煎	247	32122 百和香	252
32037 百合汤	242	32080 百花煎	247	32123 百沸汤	252
32038 百合汤	242	32081 百花膏	247	32124 百宝丸	252
32039 百合汤	242	32082 百花膏	247	32125 百宝散	252
32040 百合汤	242	32083 百花膏	248	32126 百草丸	253
32041 百合汤	242	32084 百花膏	248	32127 百草散	253
32042 百合汤	243	32085 百花膏	248	32128 百草散	253
32043 百合汤	243	32086 百花膏	248	32129 百草煎	253
32044 百合饮	243	32087 百劳丸	248	32130 百草膏	253
32045 百合饮	243	32088 百劳散	248	32131 百草膏	253
32046 百合散	243	32089 百劳散	248	32132 百草膏	253
32047 百合散	243	32090 百劳煎	248	32133 百草霜	254
32048 百合散	243	32091 百两金	248	32134 百药长	254
32049 百合散	243	32092 百足散	249	32135 百药散	254
32050 百合散	243	32093 百谷丸	249	32136 百药煎	254
32051 百合散	244	32094 百应丸	249	32137 百点膏	254
32052 百合散	244	32095 百应膏	249	32138 百畏丸	254
32053 百合散	244	32096 百补丸	249	32139 百钟丸	254
32054 百合散	244	32097 百补汤	249	32140 百钟丸	255
32055 百合散	244	32098 百补汤	249	32141 百顺丸	255
32056 百合散	244	32099 百补膏	249	32142 百顺散	255
32057 百合散	244	32100 百灵丸	249	32143 百顺散	255
32058 百合散	245	32101 百灵丸	250	32144 百顺膏	255
32059 百合散	245	32102 百灵丸	250	32145 百神散	255
32060 百合散	245	32103 百灵丸	250	32146 百损丸	255
32061 百合散	245	32104 百灵丹	250	32147 百倍丸	256
32062 百合散	245	32105 百灵丹	250	32148 百效丸	256
32063 百合散	245	32106 百灵丹	250	32149 百效丸	256
32064 百合粥	245	32107 百灵汤	250	32150 百效丸	256
32065 百合煎	245	32108 百灵粉	250	32151 百效丸	256
32066 百何方	245	32109 百灵散	250	32152 百效丸	257
32067 百寿丸	245	32110 百灵膏	251	32153 百效汤	257
32068 百寿散	245	32111 百灵膏	251	32154 百效饮	257
32069 百花丸	246	32112 百枝膏	251	32155 百效散	257
32070 百花丸	246	32113 百枝膏	251	32156 百效膏	257
32071 百花丸	246	32114 百杯丸	251	32157 百效膏	258
32072 百花丸	246	32115 百杯丸	251	32158 百部丸	258
32073 百花汤	246	32116 百杯丸	251	32159 百部丸	258
32074 百花散	246	32117 百杯丸	252	32160 百部丸	258
32075 百花散	246	32118 百杯散	252	32161 百部丸	258
32076 百花散	247	32119 百枣丹	252	32162 百部丸	258
32077 百花散	247	32120 百果酒	252	32163 百部丸	258
32078 百花煎	247	32121 百和汤	252	32164 百部丸	259

32165 百部丸	259	32208 百粒丸	263	32251 百部根酒	269
32166 百部丸	259	32209 百粒丸	263	32252 百病饮子	269
32167 百部汤	259	32210 百御丸	263	32253 百疾消散	269
32168 百部汤	259	32211 百解丸	264	32254 百一快斑汤	269
32169 百部汤	259	32212 百解汤	264	32255 百一羌活饼	269
32170 百部汤	259	32213 百解散	264	32256 百子归附丸	269
32171 百部汤	259	32214 百解散	264	32257 百子附归丸	269
32172 百部汤	259	32215 百解散	265	32258 百子建中丸	270
32173 百部汤	259	32216 百解散	265	32259 百子建中丸	270
32174 百部汤	260	32217 百解散	265	32260 百日咳新药	270
32175 百部汤	260	32218 百解散	265	32261 百日咳新药	270
32176 百部饮	260	32219 百解散	265	32262 百岁铁娃丹	270
32177 百部饮	260	32220 百解散	265	32263 百合二母汤	270
32178 百部饮	260	32221 百解散	265	32264 百合五味汤	270
32179 百部酊	260	32222 百霜丸	265	32265 百合代赭汤	271
32180 百部酒	260	32223 百嚼丸	265	32266 百合半夏汤	271
32181 百部酒	260	32224 百嚼丸	266	32267 百合地黄汤	271
32182 百部散	260	32225 百日还丹	266	32268 百合鸡子汤	271
32183 百部散	260	32226 百发神针	266	32269 百合茅根汤	271
32184 百部散	261	32227 百合饮子	266	32270 百合固金丸	271
32185 百部散	261	32228 百合洗方	266	32271 百合固金丸	271
32186 百部散	261	32229 百花煎丸	266	32272 百合固金汤	271
32187 百部散	261	32230 百应神膏	267	32273 百合知母汤	272
32188 百部散	261	32231 百灵藤酒	267	32274 百合前胡汤	273
32189 百部散	261	32232 百灵藤粥	267	32275 百合柴胡汤	273
32190 百部散	261	32233 百灵藤煎	267	32276 百合消胀汤	273
32191 百部散	261	32234 百果仙胶	267	32277 百合紫菀汤	273
32192 百部散	261	32235 百草霜丸	267	32278 百合滑石散	273
32193 百部散	262	32236 百草霜方	267	32279 百合滑精汤	273
32194 百部煎	262	32237 百草霜散	267	32280 百花拔毒散	273
32195 百部膏	262	32238 百草霜散	267	32281 百花定喘丸	273
32196 百部膏	262	32239 百草霜散	268	32282 百劳猪肚丸	273
32197 百部膏	262	32240 百草霜散	268	32283 百补全鹿丸	274
32198 百病丹	262	32241 百草霜散	268	32284 百补交精丸	274
32199 百病汤	262	32242 百草霜散	268	32285 百补枸精丸	274
32200 百消丸	262	32243 百草霜膏	268	32286 百补保真丸	274
32201 百消丸	262	32244 百药煎散	268	32287 百补养原丸	274
32202 百消丸	262	32245 百段棉散	268	32288 百补济阴丸	274
32203 百消丸	263	32246 百部洗方	268	32289 百补鹿胎丸	275
32204 百消散	263	32247 百部洗剂	268	32290 百补增力丸	275
32205 百粉丸	263	32248 百部根方	268	32291 百补增力丹	275
32206 百祥丸	263	32249 百部根汤	268	32292 百灵藤酿酒	275
32207 百祥丸	263	32250 百部根饮	269	32293 百药煎油膏	275

32294	百选肥儿丸	275
32295	百部清金汤	275
32296	百部紫菀丸	275
32297	百病无忧散	275
32298	百病钦丹丸	275
32299	百疾薯蓣丸	276
32300	百益镇惊丸	276
32301	百解发汗散	276
32302	百解绿蜡丸	276
32303	百合生地黄汤	276
32304	百合鸡子黄汤	276
32305	百灵藤牛膝煎	276
32306	百合五味姜附汤	276
32307	百合桔梗鸡子汤	276
32308	百合滑石代赭汤	276
32309	百花如意酣春酩	276
32310	百草血余棕灰散	276

死

32311	死鼠膏	276
32312	死人枕煎	277
32313	死蛇鼠膏	277

夹

32314	夹攻饮	277
32315	夹纸膏	277
32316	夹纸膏	277
32317	夹纸膏	277
32318	夹纸膏	277
32319	夹纸膏	277
32320	夹纸膏	277
32321	夹纸膏	278
32322	夹纸膏	278
32323	夹纸膏	278
32324	夹纸膏	278
32325	夹纸膏	278
32326	夹纸膏	278
32327	夹纸膏	278
32328	夹纸膏	278
32329	夹纸膏	279
32330	夹纸膏	279
32331	夹纸膏	279
32332	夹钟丸	279

32333	夹食丸	279
32334	夹盐散	279
32335	夹袋散	279
32336	夹棍神方	279
32337	夹棍软骨神方	279

托

32338	托药	279
32339	托中散	280
32340	托外膏	280
32341	托邪饮	280
32342	托里汤	280
32343	托里汤	280
32344	托里散	280
32345	托里散	280
32346	托里散	280
32347	托里散	280
32348	托里散	281
32349	托里散	281
32350	托里散	281
32351	托里散	281
32352	托里散	281
32353	托里散	281
32354	托里散	281
32355	托里散	281
32356	托里散	281
32357	托里散	282
32358	托里散	282
32359	托里散	282
32360	托里散	282
32361	托里散	282
32362	托里散	282
32363	托里散	282
32364	托里散	282
32365	托里散	282
32366	托里散	282
32367	托里散	283
32368	托里散	283
32369	托里散	283
32370	托里散	283
32371	托里散	283
32372	托里散	283
32373	托里散	283

32374	托里散	283
32375	托里散	284
32376	托里散	284
32377	托里煎	284
32378	托毒丸	284
32379	托毒汤	284
32380	托毒饮	284
32381	托毒散	284
32382	托胎丸	284
32383	托养丸	285
32384	托珠丹	285
32385	托脐饼	285
32386	托杨梅方	285
32387	托里十补散	285
32388	托里十宣散	285
32389	托里千金散	285
32390	托里无忧散	285
32391	托里内补散	285
32392	托里内补散	285
32393	托里化毒汤	285
32394	托里化毒散	286
32395	托里六倍散	286
32396	托里生肌汤	286
32397	托里生肌散	286
32398	托里玄参散	286
32399	托里地脉散	286
32400	托里当归汤	286
32401	托里回生散	286
32402	托里回阳汤	286
32403	托里冲和汤	286
32404	托里抑青汤	286
32405	托里护心丸	286
32406	托里护心散	287
32407	托里护心散	287
32408	托里连翘散	287
32409	托里快斑汤	287
32410	托里快斑汤	287
32411	托里完脏汤	287
32412	托里败毒散	287
32413	托里和中汤	287
32414	托里定痛汤	287
32415	托里定痛散	287
32416	托里建中汤	287

32417 托里建中汤	288	32460 托里越鞠汤	292	32501 扫尽曹家百万兵 ...	297
32418 托里茯苓汤	288	32461 托里温中汤	292		
32419 托里荣卫汤	288	32462 托里温中汤	293	扬	
32420 托里复煎散	288	32463 托里温中汤	293	32502 扬肺利湿汤	298
32421 托里养荣汤	288	32464 托里温中散	293		
32422 托里举斑汤	288	32465 托里温经汤	293	邪	
32423 托里举斑汤	288	32466 托里解毒汤	293	32503 邪滞双解散	298
32424 托里透脓汤	288	32467 托里解毒汤	293		
32425 托里健中汤	289	32468 托里解毒汤	293	过	
32426 托里健中汤	289	32469 托里解毒汤	294	32504 过气丸	298
32427 托里消毒汤	289	32470 托骨大黄散	294	32505 过关散	298
32428 托里消毒汤	289	32471 托痘花蛇散	294	32506 过夜消	298
32429 托里消毒饮	289	32472 托里金银地丁散 ...	294	32507 过期饮	298
32430 托里消毒饮	289	32473 托里排脓生肌散 ...	294	32508 过期饮	298
32431 托里消毒饮	289	32474 托里排脓消毒散 ...	294	32509 过街笑	299
32432 托里消毒散	289	32475 托里救苦神应丸 ...	294	32510 过街笑	299
32433 托里消毒散	289	32476 托毒清热安胎汤 ...	294		
32434 托里消毒散	289			至	
32435 托里消毒散	290	扫		32511 至仁丹	299
32436 托里消毒散	290	32477 扫云丹	294	32512 至仁汤	299
32437 托里消毒散	290	32478 扫气汤	294	32513 至圣丸	299
32438 托里流气饮	290	32479 扫风丸	295	32514 至圣丸	299
32439 托里流气饮	290	32480 扫风汤	295	32515 至圣丸	300
32440 托里益中汤	290	32481 扫虫汤	295	32516 至圣丸	300
32441 托里益气汤	290	32482 扫虫散	295	32517 至圣丸	300
32442 托里益气汤	290	32483 扫虫煎	295	32518 至圣丸	300
32443 托里益青汤	290	32484 扫虫煎	295	32519 至圣丹	300
32444 托里益黄汤	291	32485 扫红煎	295	32520 至圣丹	300
32445 托里益黄汤	291	32486 扫疔丹	296	32521 至圣丹	300
32446 托里益黄汤	291	32487 扫毒丸	296	32522 至圣汤	300
32447 托里黄耆汤	291	32488 扫胃汤	296	32523 至圣散	301
32448 托里黄耆汤	291	32489 扫疥散	296	32524 至圣散	301
32449 托里黄耆汤	291	32490 扫雪散	296	32525 至圣散	301
32450 托里黄耆汤	291	32491 扫雪膏	296	32526 至圣散	301
32451 托里黄耆汤	291	32492 扫瘤丸	296	32527 至圣散	301
32452 托里黄耆散	291	32493 扫雾丹	296	32528 至圣散	301
32453 托里排脓汤	291	32494 扫霞散	297	32529 至圣散	301
32454 托里排脓汤	291	32495 扫翳散	297	32530 至圣膏	301
32455 托里排脓散	292	32496 扫瘡丸	297	32531 至圣膏	301
32456 托里清中汤	292	32497 扫癰丹	297	32532 至圣膏	302
32457 托里清中汤	292	32498 扫癰丹	297	32533 至灵散	302
32458 托里清肝散	292	32499 扫云开光散	297	32534 至灵散	302
32459 托里清补汤	292	32500 扫凝立效丹	297	32535 至灵散	302

32536	至妙丹	302
32537	至明膏	302
32538	至宝丸	302
32539	至宝丸	302
32540	至宝丸	303
32541	至宝丸	303
32542	至宝丸	303
32543	至宝丹	303
32544	至宝丹	304
32545	至宝丹	304
32546	至宝丹	304
32547	至宝丹	304
32548	至宝丹	305
32549	至宝丹	305
32550	至宝丹	305
32551	至宝丹	305
32552	至宝丹	305
32553	至宝丹	306
32554	至宝丹	306
32555	至宝丹	306
32556	至宝丹	306
32557	至宝丹	306
32558	至宝丹	306
32559	至宝丹	307
32560	至宝丹	307
32561	至宝丹	307
32562	至宝丹	307
32563	至宝丹	308
32564	至宝丹	308
32565	至宝汤	308
32566	至宝饮	308
32567	至宝饮	308
32568	至宝散	308
32569	至宝散	308
32570	至宝散	309
32571	至宝錠	309
32572	至宝膏	309
32573	至真散	309
32574	至效散	309
32575	至慈汤	309
32576	至妙症丹	309
32577	至宝錠子	310
32578	至圣一醉膏	310

32579	至圣木星饮	310
32580	至圣太一散	310
32581	至圣宁心丹	310
32582	至圣宁心丹	310
32583	至圣夺命丹	310
32584	至圣达原丸	311
32585	至圣来复丹	311
32586	至圣青金丸	311
32587	至圣青金丹	311
32588	至圣保元丹	312
32589	至圣保命丸	312
32590	至圣保命丹	312
32591	至圣保命丹	312
32592	至圣保命丹	313
32593	至圣保命丹	313
32594	至圣保命丹	313
32595	至圣保命丹	313
32596	至圣保命丹	313
32597	至圣既济丹	313
32598	至圣黑龙丹	313
32599	至圣黑龙膏	313
32600	至圣缠金丹	313
32601	至妙立消膏	313
32602	至妙通神丸	314
32603	至宝玉连膏	314
32604	至宝回生丹	314
32605	至宝金丝膏	314
32606	至宝健脾丸	314
32607	至宝得生丹	314
32608	至效十精丹	314
32609	至效石绿散	315
32610	至效独乌膏	315
32611	至验金针散	315
32612	至圣保命金丹	315
32613	至圣麝香饼子	315
32614	至宝琥珀錠子	315
32615	至圣真人全攻饮	315

夷

32616	夷则丸	316
-------	-----	-----

【1】

此

32617	此君丹	316
-------	-----	-----

贞

32618	贞元饮	316
32619	贞元散	316

当

32620	当风散	316
32621	当术散	316
32622	当归丸	316
32623	当归丸	317
32624	当归丸	317
32625	当归丸	317
32626	当归丸	317
32627	当归丸	317
32628	当归丸	317
32629	当归丸	317
32630	当归丸	318
32631	当归丸	318
32632	当归丸	318
32633	当归丸	318
32634	当归丸	318
32635	当归丸	318
32636	当归丸	318
32637	当归丸	318
32638	当归丸	319
32639	当归丸	319
32640	当归丸	319
32641	当归丸	319
32642	当归丸	319
32643	当归丸	319
32644	当归丸	319
32645	当归丸	319
32646	当归丸	320
32647	当归丸	320
32648	当归丸	320
32649	当归丸	320
32650	当归丸	320
32651	当归丸	320
32652	当归丸	320
32653	当归丸	321
32654	当归丸	321
32655	当归丸	321
32656	当归丸	321

32786 当归汤	337	32829 当归饮	341	32872 当归散	347
32787 当归汤	337	32830 当归饮	341	32873 当归散	348
32788 当归汤	337	32831 当归饮	342	32874 当归散	348
32789 当归汤	337	32832 当归饮	342	32875 当归散	348
32790 当归汤	337	32833 当归饮	342	32876 当归散	348
32791 当归汤	337	32834 当归贴	342	32877 当归散	348
32792 当归汤	337	32835 当归贴	342	32878 当归散	348
32793 当归汤	337	32836 当归饼	342	32879 当归散	348
32794 当归汤	337	32837 当归酒	342	32880 当归散	348
32795 当归汤	338	32838 当归酒	342	32881 当归散	349
32796 当归汤	338	32839 当归酒	342	32882 当归散	349
32797 当归汤	338	32840 当归酒	342	32883 当归散	349
32798 当归汤	338	32841 当归粉	343	32884 当归散	349
32799 当归汤	338	32842 当归散	343	32885 当归散	349
32800 当归汤	338	32843 当归散	343	32886 当归散	349
32801 当归汤	338	32844 当归散	344	32887 当归散	349
32802 当归汤	338	32845 当归散	344	32888 当归散	350
32803 当归汤	338	32846 当归散	344	32889 当归散	350
32804 当归汤	339	32847 当归散	344	32890 当归散	350
32805 当归汤	339	32848 当归散	344	32891 当归散	350
32806 当归汤	339	32849 当归散	344	32892 当归散	350
32807 当归汤	339	32850 当归散	344	32893 当归散	350
32808 当归汤	339	32851 当归散	344	32894 当归散	350
32809 当归饮	339	32852 当归散	345	32895 当归散	351
32810 当归饮	339	32853 当归散	345	32896 当归散	351
32811 当归饮	339	32854 当归散	345	32897 当归散	351
32812 当归饮	340	32855 当归散	345	32898 当归散	351
32813 当归饮	340	32856 当归散	345	32899 当归散	351
32814 当归饮	340	32857 当归散	345	32900 当归散	351
32815 当归饮	340	32858 当归散	346	32901 当归散	351
32816 当归饮	340	32859 当归散	346	32902 当归散	351
32817 当归饮	340	32860 当归散	346	32903 当归散	352
32818 当归饮	340	32861 当归散	346	32904 当归散	352
32819 当归饮	340	32862 当归散	346	32905 当归散	352
32820 当归饮	340	32863 当归散	346	32906 当归散	352
32821 当归饮	341	32864 当归散	346	32907 当归散	352
32822 当归饮	341	32865 当归散	346	32908 当归散	352
32823 当归饮	341	32866 当归散	347	32909 当归散	352
32824 当归饮	341	32867 当归散	347	32910 当归散	353
32825 当归饮	341	32868 当归散	347	32911 当归散	353
32826 当归饮	341	32869 当归散	347	32912 当归散	353
32827 当归饮	341	32870 当归散	347	32913 当归散	353
32828 当归饮	341	32871 当归散	347	32914 当归散	353

32915	当归散	353	32958	当归散	358	33001	当归散	363
32916	当归散	353	32959	当归散	359	33002	当归散	363
32917	当归散	354	32960	当归散	359	33003	当归散	363
32918	当归散	354	32961	当归散	359	33004	当归散	364
32919	当归散	354	32962	当归散	359	33005	当归散	364
32920	当归散	354	32963	当归散	359	33006	当归散	364
32921	当归散	354	32964	当归散	359	33007	当归散	364
32922	当归散	354	32965	当归散	359	33008	当归散	364
32923	当归散	354	32966	当归散	359	33009	当归散	364
32924	当归散	354	32967	当归散	359	33010	当归散	364
32925	当归散	355	32968	当归散	359	33011	当归散	364
32926	当归散	355	32969	当归散	360	33012	当归散	364
32927	当归散	355	32970	当归散	360	33013	当归散	364
32928	当归散	355	32971	当归散	360	33014	当归散	364
32929	当归散	355	32972	当归散	360	33015	当归散	364
32930	当归散	355	32973	当归散	360	33016	当归散	364
32931	当归散	355	32974	当归散	360	33017	当归散	364
32932	当归散	355	32975	当归散	361	33018	当归散	364
32933	当归散	356	32976	当归散	361	33019	当归散	365
32934	当归散	356	32977	当归散	361	33020	当归散	365
32935	当归散	356	32978	当归散	361	33021	当归散	365
32936	当归散	356	32979	当归散	361	33022	当归散	365
32937	当归散	356	32980	当归散	361	33023	当归散	365
32938	当归散	356	32981	当归散	361	33024	当归散	365
32939	当归散	356	32982	当归散	361	33025	当归散	365
32940	当归散	357	32983	当归散	361	33026	当归散	365
32941	当归散	357	32984	当归散	361	33027	当归散	365
32942	当归散	357	32985	当归散	361	33028	当归散	365
32943	当归散	357	32986	当归散	362	33029	当归散	366
32944	当归散	357	32987	当归散	362	33030	当归散	366
32945	当归散	357	32988	当归散	362	33031	当归散	366
32946	当归散	357	32989	当归散	362	33032	当归散	366
32947	当归散	357	32990	当归散	362	33033	当归散	366
32948	当归散	357	32991	当归散	362	33034	当归散	366
32949	当归散	358	32992	当归散	362	33035	当归散	366
32950	当归散	358	32993	当归散	362	33036	当归散	366
32951	当归散	358	32994	当归散	362	33037	当归散	366
32952	当归散	358	32995	当归散	362	33038	当归散	366
32953	当归散	358	32996	当归散	363	33039	当归散	366
32954	当归散	358	32997	当归散	363	33040	当归散	367
32955	当归散	358	32998	当归散	363	33041	当归散	367
32956	当归散	358	32999	当归散	363	33042	当归散	367
32957	当归散	358	33000	当归散	363	33043	当归散	367

33044 当归散	367	33087 当归须散	372	33130 当归六黄汤	377
33045 当归散	367	33088 当归洗汤	372	33131 当归龙荟丸	377
33046 当归散	367	33089 当归煮散	372	33132 当归龙荟丸	377
33047 当归散	367	33090 当归煎丸	372	33133 当归龙荟丸	377
33048 当归散	367	33091 当归煎丸	372	33134 当归龙荟丸	377
33049 当归散	367	33092 当归煎丸	373	33135 当归龙荟丸	378
33050 当归散	368	33093 当归膏子	373	33136 当归龙骨丸	378
33051 当归散	368	33094 当归摩膏	373	33137 当归龙胆丸	378
33052 当归散	368	33095 当门吹鼻丹	373	33138 当归龙胆汤	378
33053 当归散	368	33096 当归一味散	373	33139 当归龙胆散	378
33054 当归散	368	33097 当归一物汤	373	33140 当归四圣散	378
33055 当归散	368	33098 当归二香汤	373	33141 当归四逆汤	378
33056 当归散	368	33099 当归二黄汤	373	33142 当归四逆汤	379
33057 当归煎	368	33100 当归二黄散	373	33143 当归四逆汤	379
33058 当归煎	368	33101 当归卜味丸	373	33144 当归四逆汤	379
33059 当归煎	369	33102 当归人参汤	374	33145 当归四逆汤	380
33060 当归煎	369	33103 当归人参汤	374	33146 当归失笑散	380
33061 当归煎	369	33104 当归人参散	374	33147 当归白术丸	380
33062 当归膏	369	33105 当归干姜汤	374	33148 当归白术汤	380
33063 当归膏	369	33106 当归大黄丸	374	33149 当归白术汤	380
33064 当归膏	369	33107 当归大黄汤	374	33150 当归白术汤	380
33065 当归膏	369	33108 当归大黄汤	374	33151 当归白术散	380
33066 当归膏	369	33109 当归大黄汤	374	33152 当归立效散	380
33067 当归膏	370	33110 当归大黄汤	375	33153 当归地黄丸	381
33068 当归膏	370	33111 当归大黄汤	375	33154 当归地黄丸	381
33069 当归膏	370	33112 当归大黄汤	375	33155 当归地黄丸	381
33070 当归膏	370	33113 当归川芎汤	375	33156 当归地黄汤	381
33071 当归膏	370	33114 当归川芎散	375	33157 当归地黄汤	381
33072 当归膏	371	33115 当归川芎散	375	33158 当归地黄汤	381
33073 当归膏	371	33116 当归元参饮	375	33159 当归地黄汤	381
33074 当归膏	371	33117 当归木香丸	375	33160 当归地黄汤	381
33075 当归膏	371	33118 当归木香汤	375	33161 当归地黄汤	382
33076 当归膏	371	33119 当归木香汤	376	33162 当归地黄汤	382
33077 当合丸	371	33120 当归木香散	376	33163 当归地黄饮	382
33078 当面可	371	33121 当归止血汤	376	33164 当归地黄散	382
33079 当归头散	371	33122 当归止血汤	376	33165 当归地黄膏	382
33080 当归含丸	371	33123 当归止痛汤	376	33166 当归芍药片	382
33081 当归饮子	371	33124 当归内补丸	376	33167 当归芍药汤	382
33082 当归饮子	371	33125 当归化毒汤	376	33168 当归芍药汤	382
33083 当归饮子	371	33126 当归六黄汤	376	33169 当归芍药汤	382
33084 当归饮子	371	33127 当归六黄汤	377	33170 当归芍药汤	383
33085 当归饮子	372	33128 当归六黄汤	377	33171 当归芍药汤	383
33086 当归饮子	372	33129 当归六黄汤	377	33172 当归芍药汤	383

33173 当归芍药汤	383	33216 当归连翘散	388	33259 当归和血散	393
33174 当归芍药汤	383	33217 当归连翘散	388	33260 当归和血散	394
33175 当归芍药汤	383	33218 当归连翘散	388	33261 当归和血散	394
33176 当归芍药汤	383	33219 当归没药丸	388	33262 当归泽兰丸	394
33177 当归芍药汤	383	33220 当归没药丸	389	33263 当归泽兰汤	394
33178 当归芍药汤	383	33221 当归没药丸	389	33264 当归治痛饮	394
33179 当归芍药汤	384	33222 当归羌活汤	389	33265 当归建中汤	394
33180 当归芍药汤	384	33223 当归羌活汤	389	33266 当归建中汤	394
33181 当归芍药汤	384	33224 当归羌活汤	389	33267 当归建中散	394
33182 当归芍药汤	384	33225 当归羌活汤	389	33268 当归承气汤	395
33183 当归芍药汤	384	33226 当归补中汤	389	33269 当归承气汤	395
33184 当归芍药汤	384	33227 当归补血汤	389	33270 当归承气汤	395
33185 当归芍药饮	384	33228 当归补血汤	389	33271 当归枳壳汤	395
33186 当归芍药散	384	33229 当归补血汤	390	33272 当归枳壳汤	395
33187 当归芍药散	385	33230 当归补血汤	390	33273 当归荆芥散	395
33188 当归芍药汤	385	33231 当归补血汤	390	33274 当归茵陈汤	395
33189 当归百合汤	385	33232 当归补血汤	391	33275 当归茴香散	396
33190 当归百解散	385	33233 当归补血汤	391	33276 当归茺莢汤	396
33191 当归血竭丸	385	33234 当归补血汤	391	33277 当归茯苓散	396
33192 当归血竭散	385	33235 当归补血汤	391	33278 当归厚朴汤	396
33193 当归合气散	385	33236 当归补血汤	391	33279 当归钩藤汤	396
33194 当归羊肉汤	385	33237 当归补血汤	391	33280 当归复元汤	396
33195 当归羊肉汤	386	33238 当归补血汤	391	33281 当归独活汤	396
33196 当归羊肉汤	386	33239 当归补血汤	391	33282 当归独活汤	396
33197 当归导气汤	386	33240 当归补血汤	391	33283 当归活血丸	396
33198 当归导气汤	386	33241 当归补血汤	391	33284 当归活血丸	396
33199 当归导气散	386	33242 当归补血汤	392	33285 当归活血汤	396
33200 当归导滞汤	386	33243 当归补血散	392	33286 当归活血汤	396
33201 当归导滞汤	386	33244 当归良姜散	392	33287 当归活血汤	397
33202 当归导滞汤	387	33245 当归灵没丸	392	33288 当归活血汤	397
33203 当归导滞散	387	33246 当归阿胶汤	392	33289 当归活血汤	397
33204 当归导滞散	387	33247 当归阿胶散	392	33290 当归活血汤	397
33205 当归防风散	387	33248 当归附子汤	392	33291 当归活血汤	397
33206 当归防葵丸	387	33249 当归附子汤	392	33292 当归活血汤	397
33207 当归红花汤	387	33250 当归拈痛汤	392	33293 当归活血汤	397
33208 当归红花饮	387	33251 当归拈痛汤	393	33294 当归活血汤	397
33209 当归红花酊	387	33252 当归拈痛汤	393	33295 当归活血汤	397
33210 当归赤芍汤	387	33253 当归拈痛散	393	33296 当归活血饮	398
33211 当归连翘汤	387	33254 当归拈痛散	393	33297 当归活血饮	398
33212 当归连翘汤	387	33255 当归和血汤	393	33298 当归活血散	398
33213 当归连翘汤	388	33256 当归和血汤	393	33299 当归活血散	398
33214 当归连翘饮	388	33257 当归和血饮	393	33300 当归活血散	398
33215 当归连翘散	388	33258 当归和血饮	393	33301 当归活血散	398

33302 当归活血散	398	33345 当归黄连丸	403	气汤	409
33303 当归活血散	398	33346 当归黄连汤	403	33386 当归四逆加吴茱萸生	
33304 当归活血煎	398	33347 当归黄连汤	403	姜汤	409
33305 当归养心汤	399	33348 当归黄连汤	403	33387 当归补血汤加防风连	
33306 当归养血丸	399	33349 当归黄耆汤	403	翘方	411
33307 当归养血丸	399	33350 当归黄耆汤	403		
33308 当归养血丸	399	33351 当归黄耆汤	404	光	
33309 当归养血汤	399	33352 当归黄耆汤	404	33388 光明丸	411
33310 当归养血汤	399	33353 当归黄耆汤	404	33389 光明丸	411
33311 当归养血汤	399	33354 当归黄耆汤	404	33390 光明丸	411
33312 当归养血汤	399	33355 当归黄耆汤	404	33391 光明丹	411
33313 当归养血汤	400	33356 当归黄耆饮	404	33392 光明丹	411
33314 当归养荣汤	400	33357 当归黄耆饮	404	33393 光明丹	411
33315 当归养荣汤	400	33358 当归黄耆散	404	33394 光明丹	411
33316 当归养荣汤	400	33359 当归银花汤	404	33395 光明丹	412
33317 当归养荣汤	400	33360 当归鹿茸散	404	33396 光明丹	412
33318 当归秦艽丸	400	33361 当归清营汤	405	33397 光明丹	412
33319 当归秦艽散	400	33362 当归寄生汤	405	33398 光明汤	412
33320 当归桂枝汤	400	33363 当归续断丸	405	33399 光明油	412
33321 当归桂枝汤	400	33364 当归续断膏	405	33400 光明散	412
33322 当归桂枝汤	401	33365 当归葱白汤	405	33401 光明散	412
33323 当归桃仁汤	401	33366 当归黑豆汤	405	33402 光明散	412
33324 当归桃仁汤	401	33367 当归腊茶散	405	33403 光明散	412
33325 当归柴胡汤	401	33368 当归温疟汤	405	33404 光明散	412
33326 当归柴胡汤	401	33369 当归葵藜煎	405	33405 光明散	413
33327 当归胶艾汤	401	33370 当归蒲延散	406	33406 光明散	413
33328 当归凉血汤	401	33371 当归解毒汤	406	33407 光明散	413
33329 当归凉血饮	401	33372 当归鹤虱散	406	33408 光明散	413
33330 当归消毒饮	401	33373 当归薄梗汤	406	33409 光明散	413
33331 当归消毒散	401	33374 当归玄胡索汤	406	33410 光明散	413
33332 当归流气饮	401	33375 当归赤小豆散	406	33411 光明散	414
33333 当归流浸膏	402	33376 当归郁李仁汤	406	33412 光明散	414
33334 当归润肠汤	402	33377 当归贝母苦参丸	407	33413 光明散	414
33335 当归润燥汤	402	33378 当归生姜羊肉汤	407	33414 光明膏	414
33336 当归润燥汤	402	33379 当归芍药和疟汤	408	33415 光明砂丸	414
33337 当归润燥汤	402	33380 当归保命承气汤	408	33416 光明眼药	414
33338 当归润燥汤	402	33381 当归桃仁承气汤	408	33417 光明眼药	414
33339 当归益荣丸	402	33382 当归黄芩芍药汤	408	33418 光明眼药	414
33340 当归益荣散	402	33383 当归补血加葱白		33419 光明眼药	414
33341 当归调中汤	403	汤	408	33420 光明散子	414
33342 当归调血汤	403	33384 当归补血汤合桂枝		33421 光明水眼药	415
33343 当归黄连丸	403	汤	409	33422 光明夜灵散	415
33344 当归黄连丸	403	33385 当归拈痛合苏子降		33423 光明洗眼方	415

33424	光明眼药水	415
33425	光明眼药水	415
33426	光明燥眼药	415
33427	光明拨云锭子	415

吐

33428	吐风散	416
33429	吐血丹	416
33430	吐血散	416
33431	吐乳散	416
33432	吐泻丸	416
33433	吐涎散	416
33434	吐涎散	416
33435	吐津丸	416
33436	吐瘟散	416
33437	吐痰丸	417
33438	吐痰丹	417
33439	吐痰散	417
33440	吐痰散	417
33441	吐痰散	417
33442	吐疟妙方	417
33443	吐血神效方	417
33444	吐血猪肺汤	417
33445	吐血紫云膏	417
33446	吐血除根奇方	417

吃

33447	吃疔虎	418
33448	吃力伽丸	418
33449	吃药即效散	420

吸

33450	吸散	420
33451	吸筒	420
33452	吸针丸	420
33453	吸烟散	420
33454	吸毒仙膏	420
33455	吸毒竹筒	420
33456	吸药仙丹	420
33457	吸药如神散	421

岁

33458	岁桃浆	421
-------	-----	-----

33459	岁旦屠苏酒	421
-------	-------	-----

吕

33460	吕雪丹	421
33461	吕雪丹	421
33462	吕祖仙膏	421
33463	吕祖一枝梅	421
33464	吕祖发背方	421
33465	吕祖奇灵膏	421
33466	吕祖塞鼻丹	421
33467	吕祖师如意丸	422
33468	吕祖师铁拐杖	422
33469	吕祖发背灵宝膏	422
33470	吕祖师清瘟神方	422
33471	吕祖紫金夺命膏	422
33472	吕洞宾仙传化毒 汤	422
33473	吕洞宾仙传芦吸 散	423

吊

33474	吊药	423
33475	吊药	423
33476	吊肠丸	423
33477	吊肾丹	423
33478	吊筋药	423
33479	吊痰膏	423

早

33480	早夺汤	423
33481	早起避秽丹	424

同

33482	同气散	424
33483	同归汤	424
33484	同春丸	424

团

33485	团鱼丸	424
33486	团鱼汤	425
33487	团参丸	425
33488	团参丸	425
33489	团参丸	425

33490	团参丸	425
33491	团参丸	425
33492	团参汤	425
33493	团参汤	425
33494	团参汤	425
33495	团参汤	425
33496	团参散	425
33497	团参散	425
33498	团参散	426
33499	团参散	426
33500	团参散	426
33501	团参散	426
33502	团参散	426
33503	团参饮子	426
33504	团参饮子	426
33505	团参饮子	426
33506	团参太一丹	426
33507	团参补气丸	427
33508	团参阿胶煎	427
33509	团参黄耆散	427

回

33510	回元汤	427
33511	回元饮	427
33512	回正散	427
33513	回令丸	427
33514	回令丸	427
33515	回生丸	427
33516	回生丸	428
33517	回生丸	428
33518	回生丸	428
33519	回生丸	428
33520	回生丹	428
33521	回生丹	429
33522	回生丹	429
33523	回生丹	429
33524	回生丹	429
33525	回生丹	429
33526	回生丹	429
33527	回生丹	429
33528	回生丹	430
33529	回生丹	430
33530	回生丹	430

33531 回生丹	430	33574 回阳丹	437	33617 回金丸	441
33532 回生丹	430	33575 回阳丹	437	33618 回毒散	441
33533 回生丹	430	33576 回阳丹	437	33619 回毒膏	441
33534 回生丹	431	33577 回阳丹	437	33620 回春丸	441
33535 回生丹	431	33578 回阳丹	437	33621 回春丸	441
33536 回生丹	431	33579 回阳丹	437	33622 回春丹	442
33537 回生丹	431	33580 回阳汤	437	33623 回春丹	442
33538 回生丹	432	33581 回阳汤	437	33624 回春方	442
33539 回生丹	432	33582 回阳汤	438	33625 回春酒	442
33540 回生丹	432	33583 回阳汤	438	33626 回春散	442
33541 回生丹	433	33584 回阳汤	438	33627 回春散	442
33542 回生丹	433	33585 回阳汤	438	33628 回脉散	442
33543 回生丹	433	33586 回阳汤	438	33629 回音饮	442
33544 回生丹	433	33587 回阳汤	438	33630 回疮錠	442
33545 回生丹	433	33588 回阳饮	438	33631 回津丸	442
33546 回生汤	433	33589 回阳饮	438	33632 回首散	443
33547 回生饮	434	33590 回阳饮	438	33633 回神膏	443
33548 回生饮	434	33591 回阳酒	438	33634 回素散	443
33549 回生酒	434	33592 回阳酒	438	33635 回脓散	443
33550 回生散	434	33593 回阳散	438	33636 回痞散	443
33551 回生散	434	33594 回阳散	439	33637 回浆饮	443
33552 回生散	434	33595 回阳散	439	33638 回浆散	443
33553 回生散	434	33596 回阳散	439	33639 回浆散	443
33554 回生散	435	33597 回阳散	439	33640 回稍散	443
33555 回生散	435	33598 回阳散	439	33641 回魂散	443
33556 回生散	435	33599 回阳散	439	33642 回魂煎	443
33557 回生散	435	33600 回阳散	439	33643 回蒸膏	444
33558 回生散	435	33601 回阳散	439	33644 回痹方	444
33559 回生散	435	33602 回阳散	439	33645 回燕膏	444
33560 回生散	435	33603 回阳散	439	33646 回燕膏	444
33561 回生散	435	33604 回阳散	440	33647 回瀾汤	444
33562 回生錠	435	33605 回阳膏	440	33648 回瀾饮	445
33563 回生膏	435	33606 回阳膏	440	33649 回瀾汤	445
33564 回生膏	436	33607 回阳膏	440	33650 回生神丹	445
33565 回生膏	436	33608 回苏散	440	33651 回生神膏	445
33566 回生膏	436	33609 回疔丹	440	33652 回生錠子	445
33567 回头散	436	33610 回疔丹	440	33653 回阳煮散	445
33568 回光丸	436	33611 回疔饮	441	33654 回声饮子	445
33569 回光散	436	33612 回疔散	441	33655 回香草散	445
33570 回阳丸	436	33613 回乳方	441	33656 回疮錠子	445
33571 回阳丸	436	33614 回乳方	441	33657 回天大补膏	445
33572 回阳丹	436	33615 回乳汤	441	33658 回天甘露饮	446
33573 回阳丹	436	33616 回命散	441	33659 回天再造丸	446

33660 回风外解汤	446	33703 回阳救产汤	454	33744 曲术丸	459
33661 回风养脏汤	446	33704 回阳救阴丹	454	33745 曲术汤	459
33662 回生再造丸	447	33705 回阳救阴汤	454	33746 曲术散	459
33663 回生再造丹	447	33706 回阳救胃汤	454	33747 曲芎丸	459
33664 回生再造饮	447	33707 回阳救急丹	454	33748 曲米丸	459
33665 回生夺命丹	447	33708 回阳救急汤	454	33749 曲米粥	460
33666 回生至圣丹	447	33709 回阳救急酒	455	33750 曲芽丸	460
33667 回生至宝丹	448	33710 回阳散痞汤	455	33751 曲附丸	460
33668 回生至宝丹	448	33711 回灵化毒汤	455	33752 曲直汤	460
33669 回生至宝丹	448	33712 回乳四物汤	455	33753 曲鱼膏	460
33670 回生至宝膏	448	33713 回毒即消丹	455	33754 曲香散	460
33671 回生至神汤	448	33714 回毒银花散	455	33755 曲桂汤	460
33672 回生保命丹	448	33715 回春再造丹	455	33756 曲麝丸	460
33673 回生养胃丹	448	33716 回春再造散	455	33757 曲麝丸	461
33674 回生起死丹	449	33717 回春泻痢膏	456	33758 曲麝丸	461
33675 回生消毒散	449	33718 回春健脾丹	456	33759 曲麝丸	461
33676 回生救急散	449	33719 回春凉膈散	456	33760 曲麝汤	461
33677 回生第一丹	449	33720 回春脱疳散	456	33761 曲麝汤	461
33678 回生续命丹	449	33721 回春辟邪丹	456	33762 曲麝散	461
33679 回生续命丹	449	33722 回急保生丹	456	33763 曲囊丸	461
33680 回生续命丹	450	33723 回疮银花汤	456	33764 曲末索饼	462
33681 回阳三建汤	450	33724 回浆合宜散	456	33765 曲末索饼子	462
33682 回阳大附散	450	33725 回鹑五神散	456	33766 曲术香棱丸	462
33683 回阳升陷汤	450	33726 回生夺命神丹	456	33767 曲麦二陈汤	462
33684 回阳化毒汤	451	33727 回生第一仙丹	457	33768 曲麦补中汤	462
33685 回阳玉龙丹	451	33728 回阳生肌药捻	457	33769 曲麦枳术丸	462
33686 回阳玉龙膏	451	33729 回毒金银花汤	457	33770 曲麝二姜丸	462
33687 回阳玉龙膏	452	33730 回毒金银花汤	457	33771 曲麝枳术丸	462
33688 回阳正气饮	452	33731 回疮金银花汤	457	33772 曲麝枳术丸	462
33689 回阳生肌散	452	33732 回疮金银花散	457	33773 曲麦山楂地骨知母 汤	463
33690 回阳生肌散	452	33733 回疮蟾酥锭子	457		
33691 回阳发表汤	452	33734 回生保产至宝丹	458		
33692 回阳返本汤	452	33735 回生保命玉咽丹	458		
33693 回阳返本汤	452	33736 回生保命黑龙丹	458		
33694 回阳返本汤	452	33737 回生救苦上清丹	458		
33695 回阳返本汤	453	33738 回阳无价至宝丹	458		
33696 回阳返本汤	453				
33697 回阳软坚汤	453				
33698 回阳固精丸	453				
33699 回阳急救汤	453				
33700 回阳急救汤	453				
33701 回阳急救散	453				
33702 回阳救产汤	453				

曲

33739 曲末酒	458
33740 曲末粥	459
33741 曲术丸	459
33742 曲术丸	459
33743 曲术丸	459

虫

33774 虫牙散	463
33775 虫积丸	463
33776 虫积串	463
33777 虫糖散	463
33778 虫牙漱方	463
33779 虫心痛汤	463

肉

33780 肉丹	463
33781 肉汁汤	463

33782 肉汤丸	464	33825 肉豆蔻丸	469	33868 肉豆蔻散	474
33783 肉红膏	464	33826 肉豆蔻丸	469	33869 肉豆蔻散	474
33784 肉附丸	464	33827 肉豆蔻丸	469	33870 肉豆蔻散	474
33785 肉枣丸	464	33828 肉豆蔻丸	469	33871 肉豆蔻散	475
33786 肉果饮	464	33829 肉豆蔻丸	469	33872 肉豆蔻散	475
33787 肉果散	464	33830 肉豆蔻丹	470	33873 肉豆蔻散	475
33788 肉桂丸	464	33831 肉豆蔻丹	470	33874 肉豆蔻膏	475
33789 肉桂片	464	33832 肉豆蔻方	470	33875 肉苁蓉丸	475
33790 肉桂汤	464	33833 肉豆蔻汤	470	33876 肉苁蓉丸	475
33791 肉桂酒	464	33834 肉豆蔻汤	470	33877 肉苁蓉丸	475
33792 肉桂散	464	33835 肉豆蔻汤	470	33878 肉苁蓉丸	476
33793 肉桂散	465	33836 肉豆蔻汤	470	33879 肉苁蓉丸	476
33794 肉桂散	465	33837 肉豆蔻汤	470	33880 肉苁蓉丸	476
33795 肉桂散	465	33838 肉豆蔻饮	470	33881 肉苁蓉丸	476
33796 肉桂膏	465	33839 肉豆蔻散	471	33882 肉苁蓉丸	476
33797 肉核油	465	33840 肉豆蔻散	471	33883 肉苁蓉丸	477
33798 肉蔻丸	466	33841 肉豆蔻散	471	33884 肉苁蓉丸	477
33799 肉蔻散	466	33842 肉豆蔻散	471	33885 肉苁蓉丸	477
33800 肉豆蔻丸	466	33843 肉豆蔻散	471	33886 肉苁蓉丸	477
33801 肉豆蔻丸	466	33844 肉豆蔻散	471	33887 肉苁蓉丸	477
33802 肉豆蔻丸	466	33845 肉豆蔻散	471	33888 肉苁蓉丸	477
33803 肉豆蔻丸	466	33846 肉豆蔻散	472	33889 肉苁蓉丸	478
33804 肉豆蔻丸	466	33847 肉豆蔻散	472	33890 肉苁蓉丸	478
33805 肉豆蔻丸	466	33848 肉豆蔻散	472	33891 肉苁蓉丸	478
33806 肉豆蔻丸	466	33849 肉豆蔻散	472	33892 肉苁蓉丸	478
33807 肉豆蔻丸	466	33850 肉豆蔻散	472	33893 肉苁蓉丸	479
33808 肉豆蔻丸	467	33851 肉豆蔻散	472	33894 肉苁蓉丸	479
33809 肉豆蔻丸	467	33852 肉豆蔻散	472	33895 肉苁蓉丸	479
33810 肉豆蔻丸	467	33853 肉豆蔻散	472	33896 肉苁蓉丸	479
33811 肉豆蔻丸	467	33854 肉豆蔻散	473	33897 肉苁蓉丸	479
33812 肉豆蔻丸	467	33855 肉豆蔻散	473	33898 肉苁蓉丸	479
33813 肉豆蔻丸	467	33856 肉豆蔻散	473	33899 肉苁蓉丸	480
33814 肉豆蔻丸	467	33857 肉豆蔻散	473	33900 肉苁蓉丸	480
33815 肉豆蔻丸	468	33858 肉豆蔻散	473	33901 肉苁蓉丸	480
33816 肉豆蔻丸	468	33859 肉豆蔻散	473	33902 肉苁蓉丸	480
33817 肉豆蔻丸	468	33860 肉豆蔻散	473	33903 肉苁蓉丸	480
33818 肉豆蔻丸	468	33861 肉豆蔻散	473	33904 肉苁蓉丸	480
33819 肉豆蔻丸	468	33862 肉豆蔻散	473	33905 肉苁蓉丸	480
33820 肉豆蔻丸	468	33863 肉豆蔻散	474	33906 肉苁蓉丸	481
33821 肉豆蔻丸	468	33864 肉豆蔻散	474	33907 肉苁蓉丸	481
33822 肉豆蔻丸	468	33865 肉豆蔻散	474	33908 肉苁蓉丸	481
33823 肉豆蔻丸	468	33866 肉豆蔻散	474	33909 肉苁蓉丸	481
33824 肉豆蔻丸	469	33867 肉豆蔻散	474	33910 肉苁蓉丸	481

33911 肉苁蓉丸	481	33951 竹叶汤	486	33994 竹叶汤	492
33912 肉苁蓉丸	481	33952 竹叶汤	487	33995 竹叶汤	493
33913 肉苁蓉丸	482	33953 竹叶汤	487	33996 竹叶汤	493
33914 肉苁蓉丸	482	33954 竹叶汤	487	33997 竹叶汤	493
33915 肉苁蓉汤	482	33955 竹叶汤	487	33998 竹叶汤	493
33916 肉苁蓉汤	482	33956 竹叶汤	487	33999 竹叶汤	493
33917 肉苁蓉汤	482	33957 竹叶汤	488	34000 竹叶汤	493
33918 肉苁蓉散	482	33958 竹叶汤	488	34001 竹叶汤	493
33919 肉苁蓉散	482	33959 竹叶汤	488	34002 竹叶汤	493
33920 肉苁蓉散	482	33960 竹叶汤	488	34003 竹叶汤	493
33921 肉苁蓉散	483	33961 竹叶汤	488	34004 竹叶汤	493
33922 肉苁蓉散	483	33962 竹叶汤	488	34005 竹叶汤	493
33923 肉苁蓉散	483	33963 竹叶汤	489	34006 竹叶汤	494
33924 肉苁蓉散	483	33964 竹叶汤	489	34007 竹叶汤	494
33925 肉苁蓉散	483	33965 竹叶汤	489	34008 竹叶汤	494
33926 肉苁蓉散	484	33966 竹叶汤	489	34009 竹叶汤	494
33927 肉苁蓉散	484	33967 竹叶汤	489	34010 竹叶汤	494
33928 肉苁蓉散	484	33968 竹叶汤	489	34011 竹叶汤	494
33929 肉苁蓉粥	484	33969 竹叶汤	489	34012 竹叶汤	494
33930 肉苁蓉膠	484	33970 竹叶汤	490	34013 竹叶汤	494
33931 肉鹿茸丸	484	33971 竹叶汤	490	34014 竹叶汤	494
33932 肉豆蔻散子	484	33972 竹叶汤	490	34015 竹叶饮	494
33933 肉苁蓉煎丸	485	33973 竹叶汤	490	34016 竹叶饮	495
33934 肉果理中汤	485	33974 竹叶汤	490	34017 竹叶饮	495
33935 肉桂七味丸	485	33975 竹叶汤	490	34018 竹叶饮	495
33936 肉桂三棱散	485	33976 竹叶汤	490	34019 竹叶酒	495
33937 肉桂理中丸	485	33977 竹叶汤	490	34020 竹叶散	495
33938 肉豆蔻猪肝丸	485	33978 竹叶汤	491	34021 竹叶散	495
33939 肉苁蓉牛膝丸	485	33979 竹叶汤	491	34022 竹叶散	495
		33980 竹叶汤	491	34023 竹叶粥	495
		33981 竹叶汤	491	34024 竹叶粥	496
		33982 竹叶汤	491	34025 竹叶煎	496
		33983 竹叶汤	491	34026 竹叶膏	496
		33984 竹叶汤	491	34027 竹叶膏	496
		33985 竹叶汤	491	34028 竹皮汤	496
		33986 竹叶汤	492	34029 竹皮汤	496
		33987 竹叶汤	492	34030 竹皮汤	497
		33988 竹叶汤	492	34031 竹皮汤	497
		33989 竹叶汤	492	34032 竹皮汤	497
		33990 竹叶汤	492	34033 竹皮汤	497
		33991 竹叶汤	492	34034 竹皮汤	497
		33992 竹叶汤	492	34035 竹皮散	497
		33993 竹叶汤	492	34036 竹麦饮	497

【J】

竹

33940 竹一	486
33941 竹二	486
33942 竹七	486
33943 竹八	486
33944 竹三	486
33945 竹五	486
33946 竹六	486
33947 竹四	486
33948 竹节丸	486
33949 竹节霜	486
33950 竹龙散	486

34037 竹豆汤	497	34080 竹沥膏	503	34123 竹菇汤	508
34038 竹沥丸	497	34081 竹沥膏	503	34124 竹菇汤	508
34039 竹沥丸	498	34082 竹沥膏	503	34125 竹菇汤	508
34040 竹沥水	498	34083 竹菇丸	503	34126 竹菇饮	508
34041 竹沥曲	498	34084 竹菇丸	504	34127 竹菇饮	508
34042 竹沥汤	498	34085 竹菇丸	504	34128 竹菇饮	508
34043 竹沥汤	498	34086 竹菇丹	504	34129 竹菇饮	509
34044 竹沥汤	498	34087 竹菇汤	504	34130 竹菇酒	509
34045 竹沥汤	498	34088 竹菇汤	504	34131 竹菇散	509
34046 竹沥汤	498	34089 竹菇汤	504	34132 竹菇散	509
34047 竹沥汤	499	34090 竹菇汤	504	34133 竹菇散	509
34048 竹沥汤	499	34091 竹菇汤	505	34134 竹菇散	509
34049 竹沥汤	499	34092 竹菇汤	505	34135 竹菇散	509
34050 竹沥汤	499	34093 竹菇汤	505	34136 竹菇散	509
34051 竹沥汤	500	34094 竹菇汤	505	34137 竹菇散	510
34052 竹沥汤	500	34095 竹菇汤	505	34138 竹菇散	510
34053 竹沥汤	500	34096 竹菇汤	505	34139 竹菇散	510
34054 竹沥汤	500	34097 竹菇汤	505	34140 竹菇散	510
34055 竹沥汤	500	34098 竹菇汤	506	34141 竹菇散	510
34056 竹沥汤	500	34099 竹菇汤	506	34142 竹菇散	510
34057 竹沥汤	500	34100 竹菇汤	506	34143 竹菇散	510
34058 竹沥汤	500	34101 竹菇汤	506	34144 竹菇膏	510
34059 竹沥汤	501	34102 竹菇汤	506	34145 竹菇醋	510
34060 竹沥汤	501	34103 竹菇汤	506	34146 竹根汤	510
34061 竹沥汤	501	34104 竹菇汤	506	34147 竹根汤	511
34062 竹沥汤	501	34105 竹菇汤	506	34148 竹根汤	511
34063 竹沥汤	501	34106 竹菇汤	506	34149 竹蚰散	511
34064 竹沥汤	501	34107 竹菇汤	506	34150 竹屑散	511
34065 竹沥汤	501	34108 竹菇汤	507	34151 竹黄汤	511
34066 竹沥汤	501	34109 竹菇汤	507	34152 竹蛙散	511
34067 竹沥汤	502	34110 竹菇汤	507	34153 竹笼散	511
34068 竹沥汤	502	34111 竹菇汤	507	34154 竹叶饮子	511
34069 竹沥汤	502	34112 竹菇汤	507	34155 竹叶饮子	511
34070 竹沥汤	502	34113 竹菇汤	507	34156 竹叶饮子	512
34071 竹沥汤	502	34114 竹菇汤	507	34157 竹皮大丸	512
34072 竹沥汤	502	34115 竹菇汤	507	34158 竹沥饮子	513
34073 竹沥饮	502	34116 竹菇汤	507	34159 竹沥饮子	513
34074 竹沥饮	502	34117 竹菇汤	508	34160 竹沥饮子	513
34075 竹沥饮	503	34118 竹菇汤	508	34161 竹沥饮子	513
34076 竹沥饮	503	34119 竹菇汤	508	34162 竹沥饮子	513
34077 竹沥饮	503	34120 竹菇汤	508	34163 竹菇饮子	513
34078 竹沥粥	503	34121 竹菇汤	508	34164 竹菇饮子	513
34079 竹沥膏	503	34122 竹菇汤	508	34165 竹菇饮子	513

34166 竹茹饮子	513	34209 竹叶泻经汤	519	34252 竹沥涤痰汤	526
34167 竹茹饮子	513	34210 竹叶柳蒡汤	520	34253 竹沥涤痰汤	526
34168 竹根饮子	514	34211 竹叶茯苓汤	520	34254 竹沥葛根汤	526
34169 竹叶玉女煎	514	34212 竹叶茯苓汤	520	34255 竹沥解疫煎	526
34170 竹叶石膏汤	514	34213 竹叶恒山汤	520	34256 竹茹二陈汤	526
34171 竹叶石膏汤	515	34214 竹叶黄芩汤	520	34257 竹茹石膏汤	526
34172 竹叶石膏汤	515	34215 竹叶黄芩汤	520	34258 竹茹石膏汤	526
34173 竹叶石膏汤	516	34216 竹叶黄芩汤	520	34259 竹茹石膏汤	526
34174 竹叶石膏汤	516	34217 竹叶黄芩汤	520	34260 竹茹石膏汤	527
34175 竹叶石膏汤	516	34218 竹叶黄芩汤	521	34261 竹茹石膏汤	527
34176 竹叶石膏汤	516	34219 竹叶黄芩汤	521	34262 竹茹石膏汤	527
34177 竹叶石膏汤	516	34220 竹叶黄芩汤	521	34263 竹茹龙胆汤	527
34178 竹叶石膏汤	516	34221 竹叶黄芩汤	521	34264 竹茹地黄汤	527
34179 竹叶石膏汤	517	34222 竹叶黄芩汤	522	34265 竹茹麦冬汤	527
34180 竹叶石膏汤	517	34223 竹叶黄芩汤	522	34266 竹茹麦冬汤	527
34181 竹叶石膏汤	517	34224 竹叶黄芩汤	522	34267 竹茹阿胶汤	527
34182 竹叶石膏汤	517	34225 竹叶黄芩汤	522	34268 竹茹柿蒂汤	527
34183 竹叶石膏汤	517	34226 竹叶黄芩汤	522	34269 竹茹柿蒂汤	527
34184 竹叶石膏汤	517	34227 竹叶常山汤	522	34270 竹茹浸膏片	527
34185 竹叶石膏汤	517	34228 竹叶清心汤	522	34271 竹茹寄生汤	528
34186 竹叶石膏汤	517	34229 竹叶橘皮汤	522	34272 竹茹紫菀汤	528
34187 竹叶石膏汤	517	34230 竹皮通散	522	34273 竹茹温胆汤	528
34188 竹叶石膏汤	517	34231 竹衣麦冬汤	522	34274 竹茹橘皮汤	528
34189 竹叶石膏汤	517	34232 竹沥二陈汤	523	34275 竹筴下气汤	528
34190 竹叶石膏汤	518	34233 竹沥二陈汤	523	34276 竹叶加生姜汤	528
34191 竹叶石膏汤	518	34234 竹沥化痰丸	523	34277 竹衣麦门冬汤	528
34192 竹叶石膏汤	518	34235 竹沥化痰丸	523	34278 竹茹麦门冬汤	528
34193 竹叶石膏汤	518	34236 竹沥化痰丸	523	34279 竹沥磨犀角饮子	528
34194 竹叶石膏汤	518	34237 竹沥化痰丸	523		
34195 竹叶石膏汤	518	34238 竹沥石膏汤	523		
34196 竹叶归耆汤	518	34239 竹沥四物汤	523		
34197 竹叶芍药汤	518	34240 竹沥达痰丸	524		
34198 竹叶芍药散	519	34241 竹沥达痰丸	524		
34199 竹叶灯心汤	519	34242 竹沥导痰丸	524		
34200 竹叶安胎饮	519	34243 竹沥导痰丸	525		
34201 竹叶安胎饮	519	34244 竹沥导痰汤	525		
34202 竹叶导赤散	519	34245 竹沥运痰丸	525		
34203 竹叶防风汤	519	34246 竹沥泄热汤	525		
34204 竹叶防风汤	519	34247 竹沥泄热汤	525		
34205 竹叶麦冬汤	519	34248 竹沥泻热汤	525		
34206 竹叶麦冬汤	519	34249 竹沥枳术丸	525		
34207 竹叶泻肝汤	519	34250 竹沥枳术丸	526		
34208 竹叶泻肝散	519	34251 竹沥枳实丸	526		

舌

34280 舌化丹	528
34281 舌恬散	529

先

34282 先期丸	529
34283 先期汤	529
34284 先锋散	529
34285 先解汤	529
34286 先天一气丹	529
34287 先天一气汤	529
34288 先天一气酒	530
34289 先天大造丸	530
34290 先天大造丸	530

34291	先天大造丸	530
34292	先天大造丸	530
34293	先天归一汤	531
34294	先天补胎丸	531
34295	先天青龙散	531
34296	先天真一丹	531
34297	先锋开路散	531

乔

34298	乔氏阴阳攻积丸	532
-------	---------	-----

年

34299	年分散	532
34300	年大将军洗痛方	532

朱

34301	朱子丸	532
34302	朱连散	532
34303	朱沉丹	532
34304	朱沉煎	532
34305	朱君散	532
34306	朱附丸	532
34307	朱附丸	532
34308	朱附丸	533
34309	朱附丹	533
34310	朱鸡蛋	533
34311	朱矾散	533
34312	朱矾散	533
34313	朱明丸	533
34314	朱金汤	533
34315	朱珀散	533
34316	朱珀膏	533
34317	朱砂丸	533
34318	朱砂丸	534
34319	朱砂丸	534
34320	朱砂丸	534
34321	朱砂丸	534
34322	朱砂丸	534
34323	朱砂丸	534
34324	朱砂丸	535
34325	朱砂丸	535
34326	朱砂丸	535
34327	朱砂丸	535

34328	朱砂丸	535
34329	朱砂丸	535
34330	朱砂丸	535
34331	朱砂丸	536
34332	朱砂丸	536
34333	朱砂丸	536
34334	朱砂丸	536
34335	朱砂丸	536
34336	朱砂丸	536
34337	朱砂丸	536
34338	朱砂丸	537
34339	朱砂丸	537
34340	朱砂丸	537
34341	朱砂丸	537
34342	朱砂丸	537
34343	朱砂丸	537
34344	朱砂丸	537
34345	朱砂丸	538
34346	朱砂丸	538
34347	朱砂丸	538
34348	朱砂丸	538
34349	朱砂丸	538
34350	朱砂丸	538
34351	朱砂丸	538
34352	朱砂丸	538
34353	朱砂丸	539
34354	朱砂丸	539
34355	朱砂丸	539
34356	朱砂丸	539
34357	朱砂丸	539
34358	朱砂丸	539
34359	朱砂丸	539
34360	朱砂丸	540
34361	朱砂丸	540
34362	朱砂丸	540
34363	朱砂丸	540
34364	朱砂丸	540
34365	朱砂丸	540
34366	朱砂丸	540
34367	朱砂丸	540
34368	朱砂丸	541
34369	朱砂丸	541
34370	朱砂丸	541

34371	朱砂丸	541
34372	朱砂丸	541
34373	朱砂丸	541
34374	朱砂丸	541
34375	朱砂丸	541
34376	朱砂丸	541
34377	朱砂丸	542
34378	朱砂丸	542
34379	朱砂丸	542
34380	朱砂丸	542
34381	朱砂丸	542
34382	朱砂丸	542
34383	朱砂丸	542
34384	朱砂丸	543
34385	朱砂丸	543
34386	朱砂丸	543
34387	朱砂丸	543
34388	朱砂丸	543
34389	朱砂丸	543
34390	朱砂丸	543
34391	朱砂丸	543
34392	朱砂丸	544
34393	朱砂丸	544
34394	朱砂丸	544
34395	朱砂丸	544
34396	朱砂丸	544
34397	朱砂丸	544
34398	朱砂丸	544
34399	朱砂丸	544
34400	朱砂丸	544
34401	朱砂丸	544
34402	朱砂丸	545
34403	朱砂丸	545
34404	朱砂丸	545
34405	朱砂丸	545
34406	朱砂丸	545
34407	朱砂丸	545
34408	朱砂丸	545
34409	朱砂丸	545
34410	朱砂丸	545
34411	朱砂丸	545
34412	朱砂丸	546
34413	朱砂丸	546

34414 朱砂丸	546	34457 朱砂散	551	34500 朱砂膏	556
34415 朱砂丸	546	34458 朱砂散	551	34501 朱砂膏	556
34416 朱砂丹	546	34459 朱砂散	551	34502 朱砂膏	557
34417 朱砂丹	546	34460 朱砂散	551	34503 朱砂膏	557
34418 朱砂丹	546	34461 朱砂散	552	34504 朱砂膏	557
34419 朱砂丹	546	34462 朱砂散	552	34505 朱砂散	557
34420 朱砂丹	546	34463 朱砂散	552	34506 朱粉丹	557
34421 朱砂丹	547	34464 朱砂散	552	34507 朱粉丹	557
34422 朱砂丹	547	34465 朱砂散	552	34508 朱粉丹	557
34423 朱砂丹	547	34466 朱砂散	552	34509 朱粉散	557
34424 朱砂丹	547	34467 朱砂散	552	34510 朱粉散	557
34425 朱砂丹	547	34468 朱砂散	552	34511 朱粉散	557
34426 朱砂丹	547	34469 朱砂散	552	34512 朱粉散	557
34427 朱砂丹	547	34470 朱砂散	552	34513 朱粉散	557
34428 朱砂汤	547	34471 朱砂散	552	34514 朱黄丹	558
34429 朱砂顶	548	34472 朱砂煎	552	34515 朱黄丹	558
34430 朱砂顶	548	34473 朱砂煎	553	34516 朱黄散	558
34431 朱砂散	548	34474 朱砂煎	553	34517 朱雀丸	558
34432 朱砂散	548	34475 朱砂煎	553	34518 朱雀丹	558
34433 朱砂散	548	34476 朱砂煎	553	34519 朱雀汤	558
34434 朱砂散	548	34477 朱砂煎	553	34520 朱雀汤	558
34435 朱砂散	548	34478 朱砂煎	553	34521 朱银丸	558
34436 朱砂散	548	34479 朱砂膏	553	34522 朱雄丸	559
34437 朱砂散	549	34480 朱砂膏	553	34523 朱雄丸	559
34438 朱砂散	549	34481 朱砂膏	553	34524 朱雄丸	559
34439 朱砂散	549	34482 朱砂膏	554	34525 朱犀散	559
34440 朱砂散	549	34483 朱砂膏	554	34526 朱竭膏	559
34441 朱砂散	549	34484 朱砂膏	554	34527 朱蛭丸	559
34442 朱砂散	549	34485 朱砂膏	554	34528 朱墨丸	559
34443 朱砂散	549	34486 朱砂膏	554	34529 朱魏丹	559
34444 朱砂散	549	34487 朱砂膏	554	34530 朱露散	560
34445 朱砂散	550	34488 朱砂膏	555	34531 朱麝丹	560
34446 朱砂散	550	34489 朱砂膏	555	34532 朱麝散	560
34447 朱砂散	550	34490 朱砂膏	555	34533 朱麝散	560
34448 朱砂散	550	34491 朱砂膏	555	34534 朱麝散	560
34449 朱砂散	550	34492 朱砂膏	555	34535 朱衣使者	560
34450 朱砂散	550	34493 朱砂膏	555	34536 朱砂饼子	560
34451 朱砂散	550	34494 朱砂膏	555	34537 朱砂饼子	560
34452 朱砂散	550	34495 朱砂膏	556	34538 朱砂消丸	560
34453 朱砂散	550	34496 朱砂膏	556	34539 朱蜡妙丸	560
34454 朱砂散	551	34497 朱砂膏	556	34540 朱千户膏药	560
34455 朱砂散	551	34498 朱砂膏	556	34541 朱子读书丸	560
34456 朱砂散	551	34499 朱砂膏	556	34542 朱氏洗心散	561

34543 朱衣滚痰丸	561	34586 朱砂斑蝥丸	566	34622 伏翼散	572
34544 朱附钟乳丸	561	34587 朱砂解毒丸	567	34623 伏牛花丸	572
34545 朱珀镇神丹	561	34588 朱砂滚涎丸	567	34624 伏牛花散	572
34546 朱珀镇惊散	561	34589 朱砂滚痰丸	567	34625 伏龙肝丸	572
34547 朱赭琥珀散	561	34590 朱砂滚痰丸	567	34626 伏龙肝丸	572
34548 朱砂人牙散	561	34591 朱砂鹤顶丹	567	34627 伏龙肝丸	572
34549 朱砂三棱丸	561	34592 朱雀交泰丸	567	34628 伏龙肝丸	572
34550 朱砂万亿丸	561	34593 朱僧热翳方	567	34629 伏龙肝汤	572
34551 朱砂万应丸	562	34594 朱橘元青露	567	34630 伏龙肝汤	573
34552 朱砂万应丸	562	34595 朱氏神效吹药	568	34631 伏龙肝汤	573
34553 朱砂五苓散	562	34596 朱翰林白术煎	568	34632 伏龙肝汤	573
34554 朱砂水银煎	562	34597 朱砂金银饰物汤	568	34633 伏龙肝汤	573
34555 朱砂甘遂丸	562	34598 朱砂酸枣仁乳香 散	568	34634 伏龙肝汤	573
34556 朱砂守病丸	562			34635 伏龙肝汤	573
34557 朱砂守病丸	562			34636 伏龙肝汤	574
34558 朱砂守病丸	562			34637 伏龙肝汤	574
34559 朱砂安神丸	562			34638 伏龙肝汤	574
34560 朱砂安神丸	564	34599 传尸丸	568	34639 伏龙肝汤	574
34561 朱砂安神丸	564	34600 传春散	569	34640 伏龙肝饮	574
34562 朱砂安神丸	564	34601 传信散	569	34641 伏龙肝饮	574
34563 朱砂安神丸	564	34602 传尸将军丸	569	34642 伏龙肝饮	574
34564 朱砂安神丸	564	34603 传尸神授丸	569	34643 伏龙肝散	574
34565 朱砂安神丸	564			34644 伏龙肝散	574
34566 朱砂安神丸	564			34645 伏龙肝散	574
34567 朱砂安神丸	564			34646 伏龙肝散	574
34568 朱砂红丸子	565			34647 伏龙肝散	575
34569 朱砂芦荟丸	565			34648 伏龙肝散	575
34570 朱砂沉香丸	565			34649 伏龙肝散	575
34571 朱砂备急膏	565			34650 伏龙肝散	575
34572 朱砂定惊丸	565			34651 伏龙肝散	575
34573 朱砂指甲散	565			34652 伏龙肝散	575
34574 朱砂莲心散	565			34653 伏龙肝散	575
34575 朱砂柴胡丸	565			34654 伏龙肝散	575
34576 朱砂铁粉散	565			34655 伏龙肝散	576
34577 朱砂透红丸	565			34656 伏龙肝散	576
34578 朱砂凉肺丸	566			34657 伏龙肝散	576
34579 朱砂凉膈丸	566			34658 伏龙肝散	576
34580 朱砂凉膈丸	566			34659 伏龙肝散	576
34581 朱砂消痰饮	566			34660 伏龙肝散	576
34582 朱砂益元散	566			34661 伏龙肝散	576
34583 朱砂黄连丸	566			34662 伏龙肝散	576
34584 朱砂鹿茸丸	566			34663 伏龙肝散	577
34585 朱砂琥珀丸	566			34664 伏龙肝散	577

传

休

伏

34665	伏龙肝散	577
34666	伏龙肝散	577
34667	伏龙肝散	577
34668	伏龙肝散	577
34669	伏龙肝散	577
34670	伏龙肝散	577
34671	伏龙肝散	577
34672	伏龙肝散	577
34673	伏龙肝散	577
34674	伏龙肝散	577
34675	伏龙肝散	577
34676	伏龙肝散	577
34677	伏龙肝散	578
34678	伏龙肝散	578
34679	伏龙肝散	578
34680	伏龙肝散	578
34681	伏龙肝散	578
34682	伏龙肝散	578
34683	伏龙肝散	578
34684	伏龙肝散	578
34685	伏龙肝膏	578
34686	伏龙肝膏	578
34687	伏龙肝膏	578
34688	伏翼粪丸	578
34689	伏火二气丹	579
34690	伏火太阳丹	579
34691	伏火四神丹	579
34692	伏火雄黄丸	579
34693	伏龙肝汤丸	579
34694	伏火四神玉粉丹	580
34695	伏火玄石柜灵砂 丹	580
34696	伏火水银硫黄紫粉 丹	580

伐

34697	伐木丸	580
34698	伐木汤	580
34699	伐毛丹	581
34700	伐邪汤	581
34701	伐阴汤	581
34702	伐铁散	581
34703	伐肝补脾汤	581

仲

34704	仲吕丸	581
34705	仲景百劳丸	581

任

34706	任督两滋汤	581
-------	-------	-----

伤

34707	伤丸	581
34708	伤膏	582
34709	伤中汤	582
34710	伤中汤	582
34711	伤心汤	582
34712	伤油膏	582
34713	伤药方	582
34714	伤药膏	582
34715	伤寒汤	583
34716	伤煎散	583
34717	伤筋药水	583
34718	伤痛宁片	583
34719	伤湿涂膜	583
34720	伤后清脑汤	583
34721	伤科十宝丹	584
34722	伤科紫金丹	584
34723	伤原活血汤	584
34724	伤损神效散	584
34725	伤湿止痛膏	584
34726	伤湿止痛膏	585
34727	伤寒应验方	585
34728	伤寒通用膏	585
34729	伤风咳嗽吞剂	585
34730	伤水张南川消癖 膏	585
34731	伤科回生第一仙 丹	586

华

34732	华佗散	586
34733	华盖丹	586
34734	华盖汤	586
34735	华盖汤	587
34736	华盖汤	587

34737	华盖饮	587
34738	华盖散	587
34739	华盖散	587
34740	华盖散	587
34741	华盖散	587
34742	华盖散	587
34743	华盖散	587
34744	华盖散	587
34745	华盖散	588
34746	华盖散	588
34747	华盖散	588
34748	华盖散	588
34749	华盖散	588
34750	华盖散	588
34751	华盖散	588
34752	华盖散	588
34753	华佗赤散	588
34754	华盖煮散	589
34755	华山五子丹	589
34756	华山石刻散	589
34757	华山碑记丸	589
34758	华山碑记丹	589
34759	华佗顺生丹	590
34760	华佗累效散	590
34761	华佗愈风散	590
34762	华佗接骨神方	590
34763	华佗救脱阳方	590

延

34764	延仁汤	590
34765	延生丹	590
34766	延生丹	590
34767	延生方	590
34768	延生膏	591
34769	延年丸	591
34770	延年丸	591
34771	延年草	591
34772	延年草	591
34773	延年散	591
34774	延寿丸	592
34775	延寿丸	592
34776	延寿丸	592
34777	延寿丸	592

34778 延寿丹	592	34821 延龄汤	597	34864 延胡索散	602
34779 延寿丹	592	34822 延龄酒	597	34865 延龄煮散	602
34780 延寿丹	593	34823 延龄散	597	34866 延乌二陈汤	603
34781 延寿丹	593	34824 延龄散	598	34867 延生第一方	603
34782 延寿丹	593	34825 延龄散	598	34868 延生护宝丹	603
34783 延寿丹	593	34826 延龄膏	598	34869 延年却病方	603
34784 延寿丹	593	34827 延嗣酒	598	34870 延年护命丹	603
34785 延寿丹	593	34828 延寿饮子	598	34871 延年益寿丹	604
34786 延寿丹	593	34829 延胡索丸	598	34872 延年益嗣丹	604
34787 延寿丹	593	34830 延胡索丸	599	34873 延年益嗣丹	604
34788 延寿丹	594	34831 延胡索丸	599	34874 延年断汗汤	604
34789 延寿丹	594	34832 延胡索汤	599	34875 延寿不老丹	604
34790 延寿丹	594	34833 延胡索汤	599	34876 延寿内固丹	604
34791 延寿丹	594	34834 延胡索汤	599	34877 延寿水仙丹	604
34792 延寿丹	594	34835 延胡索汤	599	34878 延寿水仙丹	604
34793 延寿丹	594	34836 延胡索汤	600	34879 延寿补益汤	605
34794 延寿丹	594	34837 延胡索汤	600	34880 延寿固本丹	605
34795 延寿丹	595	34838 延胡索饮	600	34881 延寿固精丸	605
34796 延寿汤	595	34839 延胡索散	600	34882 延寿瓮头春	605
34797 延寿酒	595	34840 延胡索散	600	34883 延寿济世膏	605
34798 延寿酒	595	34841 延胡索散	600	34884 延寿获嗣酒	605
34799 延寿散	595	34842 延胡索散	600	34885 延寿睡惊丸	606
34800 延寿散	595	34843 延胡索散	600	34886 延命牛黄丸	606
34801 延寿膏	595	34844 延胡索散	600	34887 延胡丁香丸	606
34802 延灵丹	595	34845 延胡索散	601	34888 延胡止痛散	606
34803 延附汤	595	34846 延胡索散	601	34889 延胡四物汤	606
34804 延命丹	595	34847 延胡索散	601	34890 延胡生化汤	606
34805 延胡丸	595	34848 延胡索散	601	34891 延胡苦楝丸	606
34806 延胡散	596	34849 延胡索散	601	34892 延胡苦楝汤	606
34807 延胡散	596	34850 延胡索散	601	34893 延龄广嗣丸	606
34808 延胡散	596	34851 延胡索散	601	34894 延龄广嗣丸	606
34809 延胡散	596	34852 延胡索散	601	34895 延龄广嗣丸	606
34810 延胡散	596	34853 延胡索散	601	34896 延龄广嗣酒	607
34811 延胡散	596	34854 延胡索散	602	34897 延龄至骨丹	607
34812 延胡散	596	34855 延胡索散	602	34898 延龄护宝丸	607
34813 延香散	596	34856 延胡索散	602	34899 延龄护宝丹	608
34814 延真膏	596	34857 延胡索散	602	34900 延龄固本丸	608
34815 延息汤	596	34858 延胡索散	602	34901 延龄固本丸	608
34816 延息汤	596	34859 延胡索散	602	34902 延龄固本丹	608
34817 延龄丹	596	34860 延胡索散	602	34903 延龄育子丸	608
34818 延龄丹	597	34861 延胡索散	602	34904 延龄育子丸	609
34819 延龄丹	597	34862 延胡索散	602	34905 延龄育子方	609
34820 延龄丹	597	34863 延胡索散	602	34906 延龄育子方	609

34907	延龄益寿丹	609
34908	延龄益寿丹	610
34909	延龄聚宝丹	610
34910	延龄聚宝酒	610
34911	延寿酒药仙方	610
34912	延龄广嗣仙方	611
34913	延龄种子仙方	611
34914	延年益寿不老丹	611
34915	延年益寿不老丹	611

自

34916	自生饮	612
34917	自汗汤	612
34918	自汗汤	612
34919	自沸汤	612
34920	自适汤	612
34921	自汗主方	612
34922	自制坤方	612
34923	自制乾方	613
34924	自然铜散	613
34925	自然铜散	613
34926	自然铜散	613
34927	自然铜散	613
34928	自然铜膏	613
34929	自拟降压汤	613
34930	自拟前胡汤	614
34931	自制三仙丹	614
34932	自制坚阴汤	614
34933	自制离骨丹	614
34934	自制霹雳丸	614
34935	自焚急救汤	614
34936	自拟藉节地黄汤	614
34937	自制四逆承气汤	614
34938	自制芙蓉截流丸	615
34939	自制吹鼻通关散	615
34940	自制经验大枣汤	615
34941	自制保赤扶元散	615

血

34942	血见宁	615
34943	血气汤	615
34944	血分丸	615
34945	血风汤	615

34946	血风汤	615
34947	血风散	615
34948	血风散	615
34949	血灰散	616
34950	血极膏	616
34951	血余丸	616
34952	血余散	616
34953	血余散	616
34954	血余散	616
34955	血余散	616
34956	血余散	616
34957	血余散	616
34958	血余散	616
34959	血余散	616
34960	血余散	616
34961	血余散	617
34962	血余散	617
34963	血余膏	617
34964	血没散	617
34965	血郁汤	617
34966	血郁汤	617
34967	血结膏	617
34968	血晕饮	617
34969	血崩丸	617
34970	血淋散	618
34971	血痢汤	618
34972	血痹汤	618
34973	血瘀散	618
34974	血溢汤	618
34975	血竭丸	618
34976	血竭丸	618
34977	血竭丹	618
34978	血竭汤	618
34979	血竭散	618
34980	血竭散	619
34981	血竭散	619
34982	血竭散	619
34983	血竭散	619
34984	血竭散	619
34985	血竭散	619
34986	血竭散	619
34987	血竭散	619
34988	血竭散	619

34989	血竭散	619
34990	血竭散	620
34991	血竭散	620
34992	血竭散	620
34993	血竭散	620
34994	血竭散	620
34995	血竭膏	620
34996	血竭膏	620
34997	血竭膏	620
34998	血竭膏	620
34999	血醒散	621
35000	血鳖串	621
35001	血癥丸	621
35002	血癥丸	621
35003	血分椒仁丸	621
35004	血分芩苈丸	621
35005	血府逐瘀丸	621
35006	血府逐瘀汤	621
35007	血实柴胡汤	623
35008	血虚柴胡汤	623
35009	血崩神效方	623
35010	血滞刀环汤	623
35011	血竭大红膏	624
35012	血竭内消丸	624
35013	血竭冰硼散	624
35014	血竭香附散	624
35015	血竭活血散	624
35016	血竭破经丹	624
35017	血竭破棺丹	624
35018	血翳泻心汤	624
35019	血余固本九阳丹	624

向

35020	向荣汤	625
35021	向骨膏	625
35022	向胜破笛丸	625

行

35023	行气丸	625
35024	行气散	625
35025	行气散	625
35026	行水丸	626
35027	行水汤	626

35028	行水膏	626
35029	行军散	626
35030	行军散	626
35031	行军散	627
35032	行经丹	627
35033	行药方	627
35034	行药方	627
35035	行健汤	627
35036	行瘀煎	627
35037	行气下乳汤	628
35038	行气开痹饮	628
35039	行气香苏饮	628
35040	行气香苏饮	628
35041	行气香苏散	628
35042	行气香苏散	628
35043	行气活血汤	628
35044	行气活血汤	628
35045	行气逐瘀汤	629
35046	行血助浆汤	629
35047	行血定痛丸	629
35048	行血破瘀汤	629
35049	行血消瘀汤	629
35050	行血救骨膏	629
35051	行血解毒汤	629
35052	行军万应膏	629
35053	行经红花汤	629
35054	行经活血汤	630
35055	行经腹痛方	630
35056	行湿补中汤	630
35057	行湿流气散	630
35058	行气和血却风汤	630
35059	行湿补气养血汤	630
35060	行湿滋筋养血汤	630

后

35061	后辛汤	630
35062	后调汤	631
35063	后喘汤	631
35064	后七宝丸	631
35065	后天育龙散	631
35066	后天和疟饮	631

舟

35067	舟车丸	631
-------	-----	-----

35068	舟车丸	632
35069	舟车神祐丸	632
35070	舟制涌泉散	633

创

35071	创丹	633
35072	创灼膏	633

全

35073	全功散	633
35074	全目饮	633
35075	全甲散	633
35076	全生丸	633
35077	全生汤	633
35078	全生饮	633
35079	全生饮	633
35080	全生散	633
35081	全生錠	634
35082	全圣散	634
35083	全母汤	634
35084	全虫方	634
35085	全虫散	635
35086	全虫散	635
35087	全羊丸	635
35088	全阳方	635
35089	全阳汤	635
35090	全形散	635
35091	全身丹	635
35092	全身汤	636
35093	全身汤	636
35094	全身饮	636
35095	全肺汤	636
35096	全带汤	636
35097	全指散	636
35098	全胃汤	636
35099	全活汤	636
35100	全真丸	636
35101	全真丸	636
35102	全真丸	637
35103	全真丹	637
35104	全鸭丸	637
35105	全消饮	637
35106	全趾饮	637

35107	全鹿丸	637
35108	全鹿丸	638
35109	全鹿丸	638
35110	全鹿丸	639
35111	全鹿丸	639
35112	全鹿膏	639
35113	全痘汤	639
35114	全鼻散	640
35115	全蝎丸	640
35116	全蝎丸	640
35117	全蝎丸	640
35118	全蝎丸	640
35119	全蝎丸	640
35120	全蝎汤	640
35121	全蝎饼	640
35122	全蝎散	641
35123	全蝎散	641
35124	全蝎散	641
35125	全蝎散	641
35126	全蝎散	641
35127	全蝎散	641
35128	全蝎散	641
35129	全蝎散	641
35130	全蝎散	642
35131	全蝎散	642
35132	全蝎散	642
35133	全蝎散	642
35134	全蝎散	642
35135	全蝎散	642
35136	全蝎散	642
35137	全蝎散	642
35138	全蝎散	642
35139	全蝎散	642
35140	全蝎散	643
35141	全蝎散	643
35142	全蝎散	643
35143	全蝎散	643
35144	全蝎散	643
35145	全蝎散	643
35146	全蝎散	643
35147	全蝎散	643
35148	全蝎散	643
35149	全蝎散	643

35150	全蝎散	643
35151	全蝎散	644
35152	全蝎散	644
35153	全蝎散	644
35154	全蝎散	644
35155	全蝎散	644
35156	全蝎散	644
35157	全蝎散	644
35158	全蝎散	644
35159	全蝎膏	644
35160	全蝎丸	644
35161	全蝎丸	645
35162	全蝎丸	645
35163	全体神膏	645
35164	全元百补丸	645
35165	全生止逆汤	645
35166	全生白术散	645
35167	全生白术散	646
35168	全生至宝丹	646
35169	全生至宝丹	646
35170	全生虎骨散	646
35171	全生茯苓散	646
35172	全生茯苓散	646
35173	全生保安散	646
35174	全生活血汤	646
35175	全生活血汤	647
35176	全生活血汤	647
35177	全生救难汤	647
35178	全阴救胃汤	647
35179	全宝赴筵膏	647
35180	全真一气汤	648
35181	全真益气汤	649
35182	全痘散火汤	649
35183	全蝎五病丸	649
35184	全蝎生皮散	649
35185	全蝎地龙丸	649
35186	全蝎延胡散	649
35187	全蝎观音散	650
35188	全蝎观音散	650
35189	全蝎观音散	650
35190	全蝎乳香散	650
35191	全蝎星香散	650

会

35192	会毒散	650
35193	会脓散	650
35194	会脓散	650
35195	会脓散	650
35196	会仙救苦丹	651
35197	会厌逐瘀汤	651
35198	会通灵应膏	651
35199	会通灵应膏	651
35200	会稽赖公常山汤	651

合

35201	合膏	652
35202	合口散	652
35203	合手香	652
35204	合手香	652
35205	合光丹	652
35206	合凶散	652
35207	合阴汤	652
35208	合欢丸	652
35209	合欢饮	652
35210	合明散	653
35211	合明散	653
35212	合治汤	653
35213	合香丸	653
35214	合掌丸	653
35215	合掌丸	653
35216	合掌丸	653
35217	合掌丸	653
35218	合掌丹	653
35219	合掌散	654
35220	合掌散	654
35221	合掌散	654
35222	合掌散	654
35223	合掌散	654
35224	合掌散	654
35225	合掌散	654
35226	合掌散	654
35227	合掌散	654
35228	合掌散	655
35229	合掌膏	655
35230	合魂丹	655

35231	合德丸	655
35232	合欢皮散	655
35233	合口收功散	655
35234	合欢保元膏	655

众

35235	众仙丸	655
35236	众妙丸	655

杀

35237	杀风散	655
35238	杀虫丸	656
35239	杀虫丸	656
35240	杀虫丸	656
35241	杀虫丸	656
35242	杀虫丸	656
35243	杀虫丸	656
35244	杀虫丸	656
35245	杀虫丹	656
35246	杀虫丹	656
35247	杀虫散	657
35248	杀虫散	657
35249	杀虫散	657
35250	杀虫膏	657
35251	杀鬼丸	657
35252	杀鬼丸	657
35253	杀鬼丸	657
35254	杀鬼丸	657
35255	杀鬼丸	658
35256	杀鬼丸	658
35257	杀鬼丸	658
35258	杀鬼丸	658
35259	杀鬼丹	658
35260	杀鬼杖	658
35261	杀疥药	658
35262	杀疥散	658
35263	杀疮药	658
35264	杀疳丸	658
35265	杀疳丸	658
35266	杀疳丸	659
35267	杀疳丸	659
35268	杀疳散	659
35269	杀蛆药	659

35270	杀九虫散	659
35271	杀虫神丹	659
35272	杀鬼杖子	659
35273	杀虫化积丸	659
35274	杀虫乌梅丸	659
35275	杀虫茺莢散	659
35276	杀虫神妙丸	659
35277	杀虫硫黄散	660
35278	杀虫雄黄散	660
35279	杀鬼五邪丸	660
35280	杀鬼虎头丸	660
35281	杀鬼破胎汤	660
35282	杀鬼烧药方	660
35283	杀鬼雄黄丸	660
35284	杀鬼麝香丸	660
35285	杀疳保童丸	660
35286	杀虫青箱子散	661

汤

35287	汤煎	661
-------	----	-----

各

35288	各半散	661
35289	各神丸	661
35290	各等倍奇汤	661

多

35291	多子酒	661
35292	多子錠	661
35293	多皮饮	661
35294	多效散	662
35295	多黑散	662

争

35296	争功散	662
35297	争先汤	662

皂

35298	皂莢散	662
35299	皂莢粥	663

旬

35300	旬效散	663
-------	-----	-----

旬

35301	旬奴露宿丸	663
35302	旬奴露宿丸	663
35303	旬奴露宿丸	663

【、】

刘

35304	刘老丸	663
35305	刘刺史丸	663
35306	刘寄奴汤	663
35307	刘寄奴汤	664
35308	刘寄奴汤	664
35309	刘寄奴汤	664
35310	刘寄奴汤	664
35311	刘寄奴饮	664
35312	刘寄奴散	664
35313	刘寄奴散	664
35314	刘寄奴散	664
35315	刘寄奴散	664
35316	刘寄奴散	664
35317	刘寄奴散	665
35318	刘寄奴散	665
35319	刘寄奴散	665
35320	刘寄奴散	665
35321	刘氏毒鏢膏	665
35322	刘寄奴饮子	665
35323	刘庭瑞通圣散	665
35324	刘氏跌打损伤膏	665

齐

35325	齐州荣姥方	666
35326	齐峰川椒散	666
35327	齐峰花椒散	666

充

35328	充脊汤	666
35329	充德丸	666
35330	充髓丹	667
35331	充髓汤	667

交

35332	交加丸	667
-------	-----	-----

35333	交加丸	667
35334	交加丸	667
35335	交加散	667
35336	交加散	667
35337	交加散	667
35338	交加散	668
35339	交加散	668
35340	交加散	668
35341	交加散	668
35342	交加散	668
35343	交加散	668
35344	交合汤	668
35345	交肾汤	668
35346	交和散	668
35347	交济汤	668
35348	交济汤	668
35349	交济汤	669
35350	交济汤	669
35351	交济散	669
35352	交泰丸	669
35353	交泰丸	669
35354	交泰丸	669
35355	交泰丸	669
35356	交泰丸	670
35357	交泰丸	670
35358	交泰丸	670
35359	交泰丸	670
35360	交泰丸	670
35361	交泰丹	671
35362	交泰丹	671
35363	交泰丹	671
35364	交泰丹	671
35365	交泰散	671
35366	交泰散	671
35367	交感丸	671
35368	交感丹	671
35369	交感丹	671
35370	交感丹	671
35371	交感丹	672
35372	交感汤	672
35373	交解饮	672
35374	交藤丸	672
35375	交藤丸	672

35376	交加饮子	672
35377	交解饮子	672
35378	交加双解饮	672
35379	交加地黄丸	672
35380	交感地黄丸	673
35381	交加双解饮子	673
35382	交感地黄煎丸	673

衣

35383	衣鱼散	673
35384	衣中白鱼摩方	673

产

35385	产后丸	673
35386	产灵丹	673
35387	产宝丸	674
35388	产宝丸	674
35389	产宝汤	674
35390	产宝散	674
35391	产后理血丹	675
35392	产后救生丸	675
35393	产难如圣散	675
35394	产癰土龙汤	675

亥

35395	亥药	675
35396	亥骨饮	675

庆

35397	庆云散	675
35398	庆世丹	676

闭

35399	闭白丸	676
35400	闭血汤	676
35401	闭毒散	676
35402	闭真丸	676
35403	闭管丸	676
35404	闭管丸	676
35405	闭精丸	676
35406	闭精散	676
35407	闭关止渴汤	677

问

35408	问命丸	677
35409	问命丹	677
35410	问命散	677
35411	问命散	677
35412	问命散	677

灯

35413	灯心汤	677
35414	灯心汤	677
35415	灯心散	677
35416	灯心散	677
35417	灯心散	677
35418	灯花丸	677
35419	灯花散	678
35420	灯花散	678
35421	灯花膏	678
35422	灯苍丸	678
35423	灯心竹叶汤	678

冲

35424	冲元汤	678
35425	冲关散	678
35426	冲和丸	678
35427	冲和丸	678
35428	冲和丹	678
35429	冲和汤	678
35430	冲和汤	678
35431	冲和汤	679
35432	冲和汤	679
35433	冲和汤	679
35434	冲和汤	679
35435	冲和汤	679
35436	冲和汤	679
35437	冲和汤	679
35438	冲和饮	679
35439	冲和散	680
35440	冲和散	680
35441	冲和散	680
35442	冲和散	680
35443	冲和散	680
35444	冲和散	680

35445	冲和膏	680
35446	冲和膏	680
35447	冲和膏	680
35448	冲寒散	680
35449	冲和仙膏	681
35450	冲和饮子	681
35451	冲脉饮子	681
35452	冲和补气汤	681
35453	冲和灵宝饮	681
35454	冲和灵宝饮	682
35455	冲和顺气汤	682
35456	冲和养胃汤	682
35457	冲和神功丸	682
35458	冲和赶毒散	682
35459	冲和健脾丸	682
35460	冲和资生丸	682
35461	冲虚至宝丹	683
35462	冲虚至宝丹	683

决

35463	决水汤	683
35464	决阴煎	683
35465	决明丸	683
35466	决明丸	683
35467	决明丸	684
35468	决明丸	684
35469	决明丸	684
35470	决明丸	684
35471	决明丸	684
35472	决明丸	684
35473	决明丸	684
35474	决明丸	684
35475	决明丸	684
35476	决明丸	685
35477	决明丸	685
35478	决明丸	685
35479	决明丸	685
35480	决明丸	685
35481	决明丸	685
35482	决明丸	685
35483	决明丸	685
35484	决明丹	686
35485	决明汤	686

35486	决明汤	686	35529	决流汤	691	35572	决壅顺流汤	696
35487	决明汤	686	35530	决明子丸	691	35573	决壅破饮丸	696
35488	决明汤	686	35531	决明子丸	691		冰	
35489	决明汤	686	35532	决明子丸	691			
35490	决明汤	686	35533	决明子丸	691	35574	冰玉散	696
35491	决明汤	686	35534	决明子丸	691	35575	冰片散	696
35492	决明饮	686	35535	决明子丸	692	35576	冰片散	696
35493	决明散	686	35536	决明子丸	692	35577	冰片散	697
35494	决明散	687	35537	决明子丸	692	35578	冰片散	697
35495	决明散	687	35538	决明子丸	692	35579	冰片散	697
35496	决明散	687	35539	决明子丸	692	35580	冰六散	697
35497	决明散	687	35540	决明子丸	692	35581	冰心散	697
35498	决明散	687	35541	决明子丸	693	35582	冰玉散	697
35499	决明散	687	35542	决明子丸	693	35583	冰石散	697
35500	决明散	687	35543	决明子丸	693	35584	冰石散	697
35501	决明散	688	35544	决明子丸	693	35585	冰白散	697
35502	决明散	688	35545	决明子方	693	35586	冰白散	697
35503	决明散	688	35546	决明子汤	693	35587	冰白散	697
35504	决明散	688	35547	决明子汤	693	35588	冰瓜散	697
35505	决明散	688	35548	决明子汤	693	35589	冰台散	697
35506	决明散	688	35549	决明子散	693	35590	冰灰散	698
35507	决明散	688	35550	决明子散	693	35591	冰肌散	698
35508	决明散	688	35551	决明子散	693	35592	冰池散	698
35509	决明散	689	35552	决明子散	694	35593	冰豆膏	698
35510	决明散	689	35553	决明子散	694	35594	冰苋散	698
35511	决明散	689	35554	决明子散	694	35595	冰芦散	698
35512	决明散	689	35555	决明子散	694	35596	冰芦膏	698
35513	决明散	689	35556	决明子散	694	35597	冰青散	698
35514	决明散	689	35557	决明子散	694	35598	冰青散	698
35515	决明散	689	35558	决明子散	694	35599	冰炉散	699
35516	决明散	689	35559	决明子散	694	35600	冰柏丸	699
35517	决明散	689	35560	决明子散	695	35601	冰砂丹	699
35518	决明散	690	35561	决明子散	695	35602	冰炭散	699
35519	决明散	690	35562	决明子粥	695	35603	冰香散	699
35520	决明散	690	35563	决明子点方	695	35604	冰香散	699
35521	决明散	690	35564	决明车前散	695	35605	冰壺丸	699
35522	决明散	690	35565	决明甘草汤	695	35606	冰壺汤	699
35523	决明煎	690	35566	决明鸡肝散	695	35607	冰壺散	699
35524	决明膏	690	35567	决明夜光散	695	35608	冰壺散	700
35525	决经汤	690	35568	决明夜灵散	695	35609	冰消散	700
35526	决津煎	690	35569	决明洗眼方	696	35610	冰梅丸	700
35527	决效方	691	35570	决明消翳散	696	35611	冰梅丸	700
35528	决效散	691	35571	决明益阴丸	696	35612	冰梅丸	700

35613	冰梅丸	700
35614	冰梅丸	700
35615	冰梅散	701
35616	冰黄散	701
35617	冰黄散	701
35618	冰黄散	701
35619	冰黄散	701
35620	冰黄散	701
35621	冰黄散	701
35622	冰黄膏	701
35623	冰硫散	701
35624	冰硼散	701
35625	冰蛤散	702
35626	冰硼散	702
35627	冰硼散	702
35628	冰硼散	702
35629	冰硼散	702
35630	冰硼散	702
35631	冰硼散	702
35632	冰硼散	702
35633	冰硼散	702
35634	冰硼散	703
35635	冰硼散	703
35636	冰硼散	703
35637	冰硼散	703
35638	冰硼散	703
35639	冰硼散	703
35640	冰硼散	703
35641	冰熊散	703
35642	冰霜散	703
35643	冰螺捻	703
35644	冰螺散	703
35645	冰螺散	703
35646	冰麝散	704
35647	冰雪饮子	704
35648	冰膏似雪	704
35649	冰片鸡蛋油	704
35650	冰片破毒散	704
35651	冰瓜雄朱散	704
35652	冰梅上清丸	704
35653	冰硼利喉散	704
35654	冰糖乌梅汤	704
35655	冰霜梅苏丸	704

35656	冰霜梅苏丸	705
35657	冰霜梅苏丸	705
35658	冰翳还睛丸	705
35659	冰麝上清丸	705
35660	冰麝无价散	705
35661	冰麝痧药丸	705
35662	冰硼散金钥匙方	705

汗

35663	汗斑粉	705
35664	汗斑散	706
35665	汗斑散	706
35666	汗斑散	706
35667	汗斑肥皂	706
35668	汗斑擦剂	706

江

35669	江螺丸	706
35670	江螺散	706
35671	江蛭围药	706
35672	江南度世丸	706
35673	江候秘传药酒	707
35674	江南三十六症丸	707

汤

35675	汤粥	707
35676	汤泡饮	707
35677	汤泡散	707
35678	汤泡散	707
35679	汤泡散	707
35680	汤脚散	707
35681	汤火止痛散	707
35682	汤火至圣膏	707
35683	汤火神验方	708

汝

35684	汝言化痰丸	708
-------	-------	-----

壮

35685	壮元丸	708
35686	壮元丸	708
35687	壮元丸	708
35688	壮元丹	708

35689	壮元汤	709
35690	壮元酒	709
35691	壮气丸	709
35692	壮气丸	709
35693	壮气汤	709
35694	壮火丹	709
35695	壮水汤	709
35696	壮水汤	709
35697	壮本丹	710
35698	壮阳丸	710
35699	壮阳丹	710
35700	壮阳丹	710
35701	壮阳丹	710
35702	壮阳丹	710
35703	壮阳丹	710
35704	壮阳汤	710
35705	壮阳膏	711
35706	壮体丹	711
35707	壮肾散	711
35708	壮肾散	711
35709	壮金丹	711
35710	壮骨丹	711
35711	壮骨散	711
35712	壮原汤	711
35713	壮脑散	712
35714	壮脾丸	712
35715	壮脾丸	712
35716	壮脾丸	712
35717	壮脾汤	712
35718	壮土固金丸	712
35719	壮气四物汤	713
35720	壮气收肠方	713
35721	壮气收肠汤	713
35722	壮气益母汤	713
35723	壮气益血汤	713
35724	壮火益土汤	713
35725	壮火温脾汤	713
35726	壮水明目丸	713
35727	壮水制阳汤	713
35728	壮阳固齿散	714
35729	壮阳种子丸	714
35730	壮阳种子丹	714
35731	壮阳种子方	714

35732	壮骨去湿丹	714
35733	壮胆星朱丹	714
35734	壮胆镇惊丸	714
35735	壮真五和丸	714
35736	壮筋补骨丹	714
35737	壮筋养血汤	715
35738	壮筋续骨丹	715
35739	壮筋续骨丹	715
35740	壮筋续骨丹	715
35741	壮腰健肾汤	715
35742	壮精固本丸	715
35743	壮阳暖下药饼	715
35744	壮阳无价至宝丹	716
35745	壮阳固本地黄丸	716
35746	壮神益志保孕汤	716
35747	壮胃清湿热调滞气 汤	716

守

35748	守中丸	716
35749	守中丸	717
35750	守中汤	717
35751	守田膏	717
35752	守灵散	717
35753	守胃散	717
35754	守胃散	717
35755	守宫丸	717
35756	守宫丸	717
35757	守宫膏	717
35758	守神丸	718
35759	守效丸	718
35760	守效散	718
35761	守病丸	718
35762	守病丸	718
35763	守病丸	718
35764	守病丸	718
35765	守瘰丸	718
35766	守中金丸	719
35767	守仙五子丸	719
35768	守阳碧云膏	719
35769	守病缠疾丹	719

宅

35770	宅中汤	719
-------	-----	-----

安

35771	安土汤	719
35772	安土散	719
35773	安中丸	720
35774	安中丸	720
35775	安中汤	720
35776	安中汤	720
35777	安中汤	720
35778	安中汤	720
35779	安中汤	720
35780	安中散	720
35781	安中散	720
35782	安中散	721
35783	安中散	721
35784	安气汤	721
35785	安心丸	721
35786	安心汤	721
35787	安心汤	721
35788	安心汤	721
35789	安心散	722
35790	安平饮	722
35791	安东散	722
35792	安乐散	722
35793	安宁饮	722
35794	安幼汤	722
35795	安老丹	722
35796	安老汤	722
35797	安贞汤	722
35798	安虫丸	722
35799	安虫丸	723
35800	安虫丸	723
35801	安虫丸	723
35802	安虫饮	723
35803	安虫散	723
35804	安虫散	723
35805	安虫散	723
35806	安全散	723
35807	安冲汤	724
35808	安志丸	724
35809	安志膏	724
35810	安志膏	724
35811	安志膏	724

35812	安体散	724
35813	安肾丸	724
35814	安肾丸	725
35815	安肾丸	725
35816	安肾丸	725
35817	安肾丸	725
35818	安肾丸	725
35819	安肾丸	726
35820	安肾丸	726
35821	安肾丸	726
35822	安肾丸	726
35823	安肾丸	726
35824	安肾丸	726
35825	安肾汤	727
35826	安肾汤	727
35827	安和饮	727
35828	安和散	727
35829	安和散	727
35830	安肺汤	727
35831	安肺汤	727
35832	安肺散	727
35833	安肺散	727
35834	安肺散	727
35835	安定汤	728
35836	安经丸	728
35837	安经汤	728
35838	安荣丸	728
35839	安荣汤	728
35840	安荣汤	728
35841	安荣汤	728
35842	安荣汤	728
35843	安荣散	728
35844	安荣散	729
35845	安荣散	729
35846	安荣散	729
35847	安荣散	729
35848	安荣散	729
35849	安胃丸	729
35850	安胃丸	729
35851	安胃丸	730
35852	安胃丸	730
35853	安胃丸	730
35854	安胃丸	730

35855 安胃汤	730	35898 安胎饮	735	35941 安胎煎	740
35856 安胃汤	730	35899 安胎饮	735	35942 安胎膏	740
35857 安胃汤	730	35900 安胎饮	735	35943 安养汤	741
35858 安胃汤	731	35901 安胎饮	735	35944 安宫丸	741
35859 安胃汤	731	35902 安胎饮	735	35945 安宫散	741
35860 安胃汤	731	35903 安胎饮	735	35946 安宫散	741
35861 安胃汤	731	35904 安胎饮	736	35947 安神丸	741
35862 安胃汤	731	35905 安胎饮	736	35948 安神丸	741
35863 安胃饮	731	35906 安胎饮	736	35949 安神丸	741
35864 安胃饮	731	35907 安胎饮	736	35950 安神丸	742
35865 安胃饮	731	35908 安胎饮	736	35951 安神丸	742
35866 安胃饮	731	35909 安胎饮	736	35952 安神丸	742
35867 安胃散	731	35910 安胎饮	736	35953 安神丸	742
35868 安胃散	732	35911 安胎饮	736	35954 安神丸	742
35869 安胃散	732	35912 安胎饮	736	35955 安神丸	742
35870 安胃散	732	35913 安胎饮	737	35956 安神丸	742
35871 安胃散	732	35914 安胎饮	737	35957 安神丸	743
35872 安胃散	732	35915 安胎饮	737	35958 安神丸	743
35873 安胆汤	732	35916 安胎饮	737	35959 安神丸	743
35874 安脉汤	732	35917 安胎饮	737	35960 安神丸	743
35875 安胎丸	732	35918 安胎饮	738	35961 安神丸	743
35876 安胎丸	732	35919 安胎饮	738	35962 安神丸	743
35877 安胎丸	732	35920 安胎饮	738	35963 安神丸	743
35878 安胎丸	732	35921 安胎饮	738	35964 安神丸	743
35879 安胎丸	733	35922 安胎饮	738	35965 安神丸	744
35880 安胎丸	733	35923 安胎饮	738	35966 安神丸	744
35881 安胎丸	733	35924 安胎饮	738	35967 安神丸	744
35882 安胎汤	733	35925 安胎饮	738	35968 安神丸	744
35883 安胎饮	733	35926 安胎散	738	35969 安神丸	744
35884 安胎饮	733	35927 安胎散	739	35970 安神丸	744
35885 安胎饮	733	35928 安胎散	739	35971 安神丸	744
35886 安胎饮	734	35929 安胎散	739	35972 安神丸	744
35887 安胎饮	734	35930 安胎散	739	35973 安神丸	744
35888 安胎饮	734	35931 安胎散	739	35974 安神丸	745
35889 安胎饮	734	35932 安胎散	739	35975 安神丸	745
35890 安胎饮	734	35933 安胎散	739	35976 安神丸	745
35891 安胎饮	734	35934 安胎散	739	35977 安神丹	745
35892 安胎饮	734	35935 安胎散	740	35978 安神汤	745
35893 安胎饮	735	35936 安胎散	740	35979 安神汤	745
35894 安胎饮	735	35937 安胎散	740	35980 安神汤	745
35895 安胎饮	735	35938 安胎散	740	35981 安神汤	745
35896 安胎饮	735	35939 安胎散	740	35982 安神汤	745
35897 安胎饮	735	35940 安胎散	740	35983 安神汤	746

35984 安神饮	746	36027 安营散	750	36070 安息香丸	755
35985 安神饮	746	36028 安崩汤	750	36071 安息香丸	755
35986 安神散	746	36029 安豚丹	750	36072 安息香丸	755
35987 安神散	746	36030 安惊丸	750	36073 安息香丸	756
35988 安神散	746	36031 安惊丸	750	36074 安息香丸	756
35989 安神散	746	36032 安斑汤	751	36075 安息香丸	756
35990 安神散	746	36033 安斑散	751	36076 安息香丸	756
35991 安神散	746	36034 安厥汤	751	36077 安息香丸	756
35992 安神散	747	36035 安蛔丸	751	36078 安息香丸	756
35993 安神散	747	36036 安蛔丸	751	36079 安息香丸	756
35994 安神散	747	36037 安蛔汤	751	36080 安息香丸	757
35995 安神散	747	36038 安蛔散	751	36081 安息香丸	757
35996 安神散	747	36039 安脾丸	751	36082 安息香丸	757
35997 安神散	747	36040 安脾散	751	36083 安息香丸	757
35998 安神散	747	36041 安脾散	752	36084 安息香丸	757
35999 安神散	747	36042 安然汤	752	36085 安息香丸	757
36000 安神散	747	36043 安痘汤	752	36086 安息香汤	757
36001 安神散	747	36044 安痛散	752	36087 安息香汤	757
36002 安神散	747	36045 安寐丹	752	36088 安息香汤	757
36003 安神散	747	36046 安魂汤	752	36089 安息香散	758
36004 安神散	748	36047 安魂汤	752	36090 安息香散	758
36005 安神散	748	36048 安魂散	752	36091 安息香煎	758
36006 安神散	748	36049 安魂散	752	36092 安息香膏	758
36007 安神散	748	36050 安睡丹	753	36093 安儿至宝汤	758
36008 安神散	748	36051 安睡散	753	36094 安中归气汤	758
36009 安神散	748	36052 安寝丸	753	36095 安中调气丸	758
36010 安神散	748	36053 安嘈汤	753	36096 安心绝梦汤	759
36011 安神散	748	36054 安嗽汤	753	36097 安冲调经汤	759
36012 安神膏	748	36055 安嗽膏	753	36098 安妊进食汤	759
36013 安珠散	748	36056 安露饮	753	36099 安坤赞育丸	759
36014 安眠汤	749	36057 安髓散	753	36100 安坤赞育丸	759
36015 安眠散	749	36058 安髓散	753	36101 安坤赞育丸	759
36016 安眠散	749	36059 安囊丸	753	36102 安枕无忧散	760
36017 安眠散	749	36060 安心煮散	753	36103 安卧如神汤	760
36018 安息丸	749	36061 安石榴汤	754	36104 安肺宁嗽丸	760
36019 安息丸	749	36062 安和饮子	754	36105 安肺桔梗汤	760
36020 安息膏	749	36063 安胎主膏	754	36106 安荣养胎汤	760
36021 安脏汤	749	36064 安胎饮子	754	36107 安胃化痰汤	761
36022 安脐散	749	36065 安息香丸	754	36108 安胃白术散	761
36023 安脐散	750	36066 安息香丸	754	36109 安胃行血汤	761
36024 安脐散	750	36067 安息香丸	755	36110 安胃和中汤	761
36025 安脐散	750	36068 安息香丸	755	36111 安胃和脾散	761
36026 安营饮	750	36069 安息香丸	755	36112 安胃定胎散	761

36113 安胃醒脾汤	761	36156 安胎神应丸	765	36199 安蛔理中汤	773
36114 安胎万全汤	761	36157 安胎铁罩散	766	36200 安蛔理中汤	773
36115 安胎万全饮	761	36158 安胎凉膈饮	766	36201 安奠二天汤	773
36116 安胎止痛汤	761	36159 安胎调气饮	766	36202 安魂定魄丹	773
36117 安胎四物汤	762	36160 安胎寄生汤	766	36203 安魂琥珀丹	773
36118 安胎四物饮	762	36161 安胎鲤鱼粥	766	36204 安睡如神汤	774
36119 安胎白术汤	762	36162 安宫牛黄丸	766	36205 安胎桑寄生散	774
36120 安胎白术散	762	36163 安宫牛黄散	767	36206 安胎桑寄生散	774
36121 安胎白术散	762	36164 安神止痛汤	767	36207 安神熟地黄散	774
36122 安胎白术散	762	36165 安神化痰汤	768	36208 安胎万全神应汤	774
36123 安胎达生散	762	36166 安神生化汤	768	36209 安胎万全神应散	774
36124 安胎当归丸	762	36167 安神代茶饮	768	36210 安胎加味八物汤	774
36125 安胎当归汤	762	36168 安神补气丸	768	36211 安胎易产紫苏饮	774
36126 安胎当归饮	763	36169 安神补心丸	768	36212 安胎养血益母丸	775
36127 安胎如圣丹	763	36170 安神补心汤	768	36213 安神镇心琥珀丸	775
36128 安胎如圣饮	763	36171 安神妙香丸	768		
36129 安胎如胜饮	763	36172 安神固精丸	769	并	
36130 安胎扶元饮	763	36173 安神定志丸	769	36214 并祛丹	775
36131 安胎利气饮	763	36174 安神定志丸	769	36215 并提汤	775
36132 安胎利水汤	763	36175 安神定志丸	769	36216 并补两天丸	775
36133 安胎补火汤	763	36176 安神定志丸	769		
36134 安胎阿胶散	763	36177 安神定志丸	769	关	
36135 安胎和气饮	763	36178 安神定志丸	770	36217 关夫子快脾散	776
36136 安胎和气饮	764	36179 安神定志方	770	36218 关节炎汤 1 号	776
36137 安胎和气饮	764	36180 安神定智汤	770	36219 关节炎汤 2 号	776
36138 安胎和气饮	764	36181 安神复元汤	770		
36139 安胎和气饮	764	36182 安神复睡汤	770	羊	
36140 安胎和气饮	764	36183 安神养血汤	770	36220 羊毛饼	776
36141 安胎和气饮	764	36184 安神养志丸	770	36221 羊心汤	776
36142 安胎和气饮	764	36185 安神益志汤	770	36222 羊甲散	776
36143 安胎和气饮	764	36186 安神清镇丹	771	36223 羊矢散	777
36144 安胎和气散	764	36187 安神犀角丸	771	36224 羊矢散	777
36145 安胎和气散	764	36188 安神滚痰丸	771	36225 羊头脰	777
36146 安胎和气散	764	36189 安神镇心丸	771	36226 羊皮面	777
36147 安胎和气散	764	36190 安神镇惊丸	771	36227 羊肉丸	777
36148 安胎和伤汤	765	36191 安神镇惊丸	771	36228 羊肉方	777
36149 安胎织罩散	765	36192 安神镇惊丸	772	36229 羊肉方	777
36150 安胎枳实散	765	36193 安神醒心丸	772	36230 羊肉方	777
36151 安胎顺气饮	765	36194 安息香煎丸	772	36231 羊肉汤	777
36152 安胎顺血汤	765	36195 安息活血丹	772	36232 羊肉汤	778
36153 安胎顺血散	765	36196 安惊保命丹	772	36233 羊肉汤	778
36154 安胎独圣丹	765	36197 安喘至圣丹	773	36234 羊肉汤	778
36155 安胎独圣散	765	36198 安蛔理中汤	773	36235 羊肉汤	778

36236 羊肉汤	778	36279 羊肝散	785	36322 羊肾粥	790
36237 羊肉汤	779	36280 羊肝散	785	36323 羊肾粥	790
36238 羊肉汤	779	36281 羊肝散	785	36324 羊肾羹	790
36239 羊肉汤	779	36282 羊肝散	785	36325 羊肾羹	790
36240 羊肉汤	779	36283 羊肝散	785	36326 羊肾羹	790
36241 羊肉汤	779	36284 羊肝散	785	36327 羊肾羹	790
36242 羊肉汤	779	36285 羊肝散	785	36328 羊肾羹	790
36243 羊肉汤	780	36286 羊肝散	785	36329 羊乳丸	790
36244 羊肉汤	780	36287 羊肝粥	786	36330 羊乳丸	790
36245 羊肉汤	780	36288 羊肝煎	786	36331 羊乳饮	791
36246 羊肉汤	780	36289 羊肝羹	786	36332 羊乳饮	791
36247 羊肉汤	780	36290 羊肚方	786	36333 羊乳饮	791
36248 羊肉饮	780	36291 羊肚羹	786	36334 羊乳膏	791
36249 羊肉饼	780	36292 羊角丸	786	36335 羊肺汤	791
36250 羊肉粥	780	36293 羊角丸	786	36336 羊肺汤	791
36251 羊肉粥	780	36294 羊角汤	786	36337 羊肺汤	791
36252 羊肉羹	780	36295 羊角散	786	36338 羊肺散	791
36253 羊肉羹	781	36296 羊角散	786	36339 羊肺羹	792
36254 羊肉脍	781	36297 羊角散	786	36340 羊肺羹	792
36255 羊肉脍	781	36298 羊角散	787	36341 羊肺羹	792
36256 羊血方	781	36299 羊肾丸	787	36342 羊胡散	792
36257 羊花散	781	36300 羊肾丸	787	36343 羊莢顶	792
36258 羊肝丸	781	36301 羊肾丸	787	36344 羊胃汤	792
36259 羊肝丸	782	36302 羊肾丸	787	36345 羊骨汤	792
36260 羊肝丸	782	36303 羊肾丸	787	36346 羊骨汤	792
36261 羊肝丸	782	36304 羊肾丸	787	36347 羊骨饮	792
36262 羊肝丸	782	36305 羊肾丸	787	36348 羊骨散	792
36263 羊肝丸	782	36306 羊肾丸	788	36349 羊骨粥	792
36264 羊肝丸	783	36307 羊肾丸	788	36350 羊骨粥	793
36265 羊肝丸	783	36308 羊肾方	788	36351 羊骨粥	793
36266 羊肝丸	783	36309 羊肾汤	788	36352 羊须散	793
36267 羊肝丸	783	36310 羊肾汤	788	36353 羊须膏	793
36268 羊肝丸	783	36311 羊肾汤	788	36354 羊胆丸	793
36269 羊肝丸	783	36312 羊肾汤	788	36355 羊胆膏	793
36270 羊肝丸	784	36313 羊肾汤	788	36356 羊胆膏	793
36271 羊肝丸	784	36314 羊肾汤	789	36357 羊胆膏	793
36272 羊肝丸	784	36315 羊肾汤	789	36358 羊脰散	793
36273 羊肝丸	784	36316 羊肾汤	789	36359 羊屎散	793
36274 羊肝丸	784	36317 羊肾酒	789	36360 羊屎膏	793
36275 羊肝丸	784	36318 羊肾散	789	36361 羊脊粥	793
36276 羊肝方	784	36319 羊肾散	789	36362 羊脊羹	794
36277 羊肝饼	784	36320 羊肾散	789	36363 羊脂汤	794
36278 羊肝散	785	36321 羊肾粥	789	36364 羊脂粥	794

36365 羊脂粥 794
 36366 羊脂粥 794
 36367 羊脂煎 794
 36368 羊脂煎 794
 36369 羊脂膏 794
 36370 羊脏方 794
 36371 羊脏散 795
 36372 羊脏羹 795
 36373 羊脑方 795
 36374 羊脑玉 795
 36375 羊脑煎 795
 36376 羊脑膏 795
 36377 羊脑膏 795
 36378 羊酒方 796
 36379 羊羔酒 796
 36380 羊羹酒 796
 36381 羊羹膏 796
 36382 羊睛方 796
 36383 羊蜜方 796
 36384 羊蜜膏 796
 36385 羊膈丸 796
 36386 羊蹄散 796
 36387 羊蹄散 796
 36388 羊藿散 797
 36389 羊髓粥 797
 36390 羊髓粥 797
 36391 羊髓煎 797
 36392 羊髓膏 797
 36393 羊髓膏 797
 36394 羊髓膏 797
 36395 羊髓膏 797
 36396 羊子肝散 797
 36397 羊头肉方 798
 36398 羊头蹄煎 798
 36399 羊肉发药 798
 36400 羊肉食方 798
 36401 羊肉索饼 798
 36402 羊肉索饼 798
 36403 羊肉膈膳 798
 36404 羊肝生方 798
 36405 羊肝夹子 798
 36406 羊肝饼饅 799
 36407 羊肝饅子 799

36408 羊肚食方 799
 36409 羊肾饼饅 799
 36410 羊肾馄饨 799
 36411 羊骨煎丸 799
 36412 羊骨煎丸 799
 36413 羊胫灰丸 800
 36414 羊胫灰散 800
 36415 羊胫灰散 800
 36416 羊胫炭丸 800
 36417 羊桃根散 800
 36418 羊桃根散 800
 36419 羊脊骨汤 800
 36420 羊脊骨粥 800
 36421 羊脊骨粥 800
 36422 羊脊骨羹 801
 36423 羊脊骨羹 801
 36424 羊脊骨羹 801
 36425 羊脊骨羹 801
 36426 羊脊髓粥 801
 36427 羊脂涂方 801
 36428 羊痫疯丸 801
 36429 羊蹄跗丸 801
 36430 羊蹄根酒 801
 36431 羊蹄根酒 801
 36432 羊蹄根散 802
 36433 羊肉大黄酒 802
 36434 羊肉天真丸 802
 36435 羊肉地黄汤 802
 36436 羊肉当归汤 802
 36437 羊肉当归汤 802
 36438 羊肉当归汤 802
 36439 羊肉当归汤 803
 36440 羊肉杜仲汤 803
 36441 羊肉肤羸丸 803
 36442 羊肉补真丸 803
 36443 羊肉面棋子 803
 36444 羊肉桂心汤 803
 36445 羊肉黄耆汤 804
 36446 羊肉黄耆汤 804
 36447 羊肝明目丸 804
 36448 羊肝明目丸 804
 36449 羊肝明目散 804
 36450 羊肝退翳丸 804

36451 羊肝猪胆丸 805
 36452 羊角补中汤 805
 36453 羊肾苁蓉羹 805
 36454 羊肾补肾汤 805
 36455 羊肾附子丸 805
 36456 羊骨补肾汤 805
 36457 羊桃淋蘸方 805
 36458 羊蹄草合剂 805
 36459 羊蹄根涂方 805
 36460 羊肉生地黄酒 806

兴

36461 兴阳丹 806

米

36462 米饮 806
 36463 米壳散 806
 36464 米莲饮 806
 36465 米莲散 806
 36466 米粉丹 806
 36467 米粉散 806
 36468 米黄散 806
 36469 米猪肚 806
 36470 米糖膏 807
 36471 米囊皮散 807

许

36472 许真君如意丹 807

军

36473 军门丹 807
 36474 军门方 807
 36475 军持露 807
 36476 军持露 807
 36477 军门一笑膏 807
 36478 军门立效散 808
 36479 军门立效散 808
 36480 军中一捻金 808
 36481 军中一捻金 808
 36482 军中跌打丸 808
 36483 军中一捻金散 808
 36484 军中第一仙方 808

【一】

异

36485 异功丸	808	36525 异效散	814	36564 导气散	819
36486 异功丸	809	36526 异效散	814	36565 导气散	820
36487 异功汤	809	36527 异效散	814	36566 导气散	820
36488 异功汤	809	36528 异香膏子	814	36567 导火汤	820
36489 异功汤	809	36529 异方红丸子	814	36568 导水丸	820
36490 异功散	809	36530 异方油煎散	814	36569 导水丸	820
36491 异功散	809	36531 异方济阴丹	815	36570 导水丸	820
36492 异功散	809	36532 异方黄耆丸	815	36571 导水丸	820
36493 异功散	809	36533 异功五积散	815	36572 导水汤	820
36494 异功散	810	36534 异功快斑汤	815	36573 导水饼	820
36495 异功散	810	36535 异功敌暑丸	815	36574 导水散	820
36496 异功散	810	36536 异香四神散	815	36575 导水散	821
36497 异功散	810	36537 异香鳖甲散	816	36576 导水散	821
36498 异功散	811	36538 异类有情丸	816	36577 导赤丸	821
36499 异功散	811	36539 异授金兔丹	816	36578 导赤丸	821
36500 异功散	811	36540 异方神仙济阴丹 ...	816	36579 导赤片	821
36501 异功散	811	36541 异功拔毒千金托里		36580 导赤丹	821
36502 异功散	811	散	816	36581 导赤丹	822
36503 异功散	811	36542 异功散加当归川芎		36582 导赤汤	822
36504 异功散	811	汤	816	36583 导赤汤	822
36505 异功散	811			36584 导赤饮	822
36506 异功散	812			36585 导赤饮	822
36507 异功散	812			36586 导赤散	822
36508 异功散	812			36587 导赤散	823
36509 异功散	812			36588 导赤散	823
36510 异功散	812			36589 导赤散	823
36511 异功散	812			36590 导赤散	823
36512 异功散	812			36591 导赤散	823
36513 异功散	812			36592 导赤散	823
36514 异功散	812			36593 导赤散	824
36515 异功散	812			36594 导赤散	824
36516 异功散	812			36595 导赤散	824
36517 异功散	813			36596 导赤散	824
36518 异圣散	813			36597 导赤散	824
36519 异香丹	813			36598 导赤散	824
36520 异香散	813			36599 导赤散	824
36521 异香散	813			36600 导赤散	824
36522 异香散	813			36601 导赤散	824
36523 异香散	813			36602 导赤散	824
36524 异效丸	814			36603 导赤散	825
				36604 导赤散	825
				36605 导赤散	825
				36606 导赤散	825

导

36543 导药	817
36544 导散	817
36545 导气丸	817
36546 导气丸	817
36547 导气丸	817
36548 导气丸	817
36549 导气丸	817
36550 导气丸	817
36551 导气丸	818
36552 导气丸	818
36553 导气丸	818
36554 导气丸	818
36555 导气丸	818
36556 导气丹	818
36557 导气汤	819
36558 导气汤	819
36559 导气汤	819
36560 导气汤	819
36561 导气汤	819
36562 导气汤	819
36563 导气饮	819

36607 导赤散	825	36650 导痰汤	829	36693 导赤清心汤	834
36608 导赤散	825	36651 导痰汤	830	36694 导赤解毒汤	835
36609 导赤散	825	36652 导痰汤	830	36695 导赤解毒汤	835
36610 导利散	825	36653 导痰汤	830	36696 导神化毒汤	835
36611 导饮丸	825	36654 导痰汤	830	36697 导滞定功丸	835
36612 导饮丸	825	36655 导痰汤	830	36698 导滞香连丸	835
36613 导饮丸	826	36656 导痰汤	830	36699 导滞通经汤	835
36614 导饮丸	826	36657 导源饮	830	36700 导赤通经汤	835
36615 导饮丸	826	36658 导源煎	830	36701 导滞通幽汤	836
36616 导经丸	826	36659 导聚散	830	36702 导痰干结汤	836
36617 导经汤	826	36660 导膈饮	831	36703 导痰小胃丹	836
36618 导经散	826	36661 导癰囊	831	36704 导痰开关散	836
36619 导毒丹	826	36662 导水饮子	831	36705 导痰消风散	836
36620 导热汤	826	36663 导赤甘露	831	36706 导痰消滞汤	836
36621 导热散	826	36664 导经散子	831	36707 导痰调经汤	836
36622 导秘丸	826	36665 导气抑留汤	831	36708 导痰救苦丹	836
36623 导黄汤	826	36666 导气枳壳丸	831	36709 导赤泻心各半汤 ...	837
36624 导滞丸	826	36667 导气枳实丸	831		
36625 导滞丸	827	36668 导气枳实丸	831	寻	
36626 导滞汤	827	36669 导气除湿汤	831	36710 寻气丸	837
36627 导滞汤	827	36670 导气除湿汤	832	36711 寻虫散	837
36628 导滞汤	827	36671 导气除燥汤	832	36712 寻伤丸	837
36629 导滞汤	827	36672 导气通经汤	832	36713 寻经丸	837
36630 导滞汤	827	36673 导气通幽汤	832	36714 寻积丸	837
36631 导滞散	827	36674 导气通瘀錠	832	36715 寻痛丸	837
36632 导滞散	827	36675 导气清利汤	832	36716 寻痛丸	837
36633 导滞散	827	36676 导气槟榔散	832	36717 寻痛丸	837
36634 导痹汤	827	36677 导气醒脾汤	832	36718 寻痛丸	838
36635 导痰丸	828	36678 导水茯苓汤	832	36719 寻常煮散	838
36636 导痰丸	828	36679 导水消肾丸	833	36720 寻痛住痛散	838
36637 导痰丸	828	36680 导宁纯阳丹	833	36721 寻痛舒筋丸	838
36638 导痰丸	828	36681 导赤五苓散	833		
36639 导痰丸	828	36682 导赤化毒汤	833	尽	
36640 导痰丸	828	36683 导赤地榆汤	833	36722 尽秽丹	838
36641 导痰丸	828	36684 导赤各半汤	833		
36642 导痰汤	829	36685 导赤各半汤	834	艮	
36643 导痰汤	829	36686 导赤各半汤	834	36723 艮宫除害丹	838
36644 导痰汤	829	36687 导赤各半汤	834		
36645 导痰汤	829	36688 导赤各半汤	834	阮	
36646 导痰汤	829	36689 导赤泻心汤	834	36724 阮氏桃花汤	839
36647 导痰汤	829	36690 导赤承气汤	834		
36648 导痰汤	829	36691 导赤通气汤	834	阵	
36649 导痰汤	829	36692 导赤通气散	834	36725 阵王丹	839

阳		36767 阳铁箍散 845	36808 阴阳散 850
36726 阳丹 839	36768 阳熨锭子 845	36809 阴阳散 850	36810 阴红汤 850
36727 阳乌膏 839	36769 阳明二妙丸 845	36811 阴疟丸 850	36812 阴毒汤 850
36728 阳旦汤 839	36770 阳和二陈汤 845	36813 阴挺丹 850	36814 阴疮膏 850
36729 阳旦汤 839	36771 阳和化坚汤 845	36815 阴痛方 850	36816 阴痢散 851
36730 阳旦汤 839	36772 阳和化癌汤 845	36817 阴湿汤 851	36818 阴鹭丸 851
36731 阳旦散 839	36773 阳和生化汤 845	36819 阴六贤散 851	36820 阴铁箍散 851
36732 阳和丸 839	36774 阳和至宝膏 846	36821 阴分生阳汤 851	36822 阴伏紫灵丹 851
36733 阳和丸 840	36775 阳和启脾膏 846	36823 阴伏紫霞丹 851	36824 阴阳二气丹 851
36734 阳和丸 840	36776 阳和救急汤 846	36825 阴阳二气散 852	36826 阴阳二血丸 852
36735 阳和汤 840	36777 阳和救绝汤 846	36827 阴阳二炼丹 852	36828 阴阳至圣丹 852
36736 阳和膏 841	36778 阳和犀角丸 846	36829 阴阳至圣丹 852	36830 阴阳至圣膏 852
36737 阳和膏 841	36779 阳和解凝膏 846	36831 阴阳攻积丸 852	36832 阴阳两救汤 852
36738 阳和膏 841	36780 阳毒内消散 847	36833 阴阳和合汤 853	36834 阴阳起死膏 853
36739 阳毒汤 841	36781 阳毒内消膏 847	36835 阴阳兼治汤 853	36836 阴阳兼培丸 853
36740 阳春酒 841	36782 阳毒升麻汤 847	36837 阴毒内消散 853	36838 阴毒内消膏 853
36741 阳消药 842	36783 阳毒升麻汤 847	36839 阴毒升麻汤 853	36840 阴毒甘草汤 853
36742 阳消散 842	36784 阳毒梔子汤 847	36841 阴毒甘草汤 853	36842 阴蚀黄连膏 853
36743 阳粉散 842	36785 阳春白雪膏 847	36843 阴炼秋石丹 853	36844 阴病开关散 853
36744 阳液方 842	36786 阳炼秋石丹 847	36845 阴崩固经丸 854	36846 阴痢附子散 854
36745 阳痢散 842	36787 阳起圣灵丹 847	36847 阴痧急救膏 854	36848 阴湿化痰汤 854
36746 阳熨锭 842	36788 阳病开关散 848	36849 阴湿薤白汤 854	36850 阴虚生内热方 854
36747 阳七贤散 842	36789 阳崩胶艾汤 848		
36748 阳八味汤 842	36790 阳痢防风散 848		
36749 阳起石丸 842	36791 阳痧救急膏 848		
36750 阳起石丸 843	36792 阳毒玄参升麻汤 ... 848		
36751 阳起石丸 843			
36752 阳起石丸 843	阴		
36753 阳起石丸 843	36793 阴丹 848		
36754 阳起石丸 843	36794 阴旦汤 849		
36755 阳起石丸 843	36795 阴华散 849		
36756 阳起石丸 843	36796 阴阳丸 849		
36757 阳起石丸 844	36797 阴阳丸 849		
36758 阳起石丸 844	36798 阴阳丸 849		
36759 阳起石丸 844	36799 阴阳丹 849		
36760 阳奇石丸 844	36800 阴阳丹 849		
36761 阳起石丸 844	36801 阴阳水 849		
36762 阳起石汤 844	36802 阴阳水 849		
36763 阳起石汤 844	36803 阴阳汤 849		
36764 阳起石散 845	36804 阴阳汤 849		
36765 阳起石散 845	36805 阴阳黄 849		
36766 阳铁箍散 845	36806 阴阳散 849		
	36807 阴阳散 850		

36851 阴虚生内热汤 854	36892 防己汤 859	36935 防己散 864
36852 阴毒升麻鳖甲汤 ... 854	36893 防己汤 859	36936 防己膏 864
防	36894 防己汤 860	36937 防己膏 864
36853 防己丸 855	36895 防己汤 860	36938 防风丸 864
36854 防己丸 855	36896 防己汤 860	36939 防风丸 865
36855 防己丸 855	36897 防己汤 860	36940 防风丸 865
36856 防己丸 855	36898 防己汤 860	36941 防风丸 865
36857 防己丸 855	36899 防己汤 860	36942 防风丸 865
36858 防己丸 855	36900 防己汤 860	36943 防风丸 865
36859 防己丸 855	36901 防己汤 860	36944 防风丸 866
36860 防己丸 855	36902 防己汤 861	36945 防风丸 866
36861 防己丸 855	36903 防己汤 861	36946 防风丸 866
36862 防己丸 855	36904 防己汤 861	36947 防风丸 866
36863 防己丸 856	36905 防己汤 861	36948 防风丸 866
36864 防己丸 856	36906 防己汤 861	36949 防风丸 866
36865 防己丸 856	36907 防己汤 861	36950 防风丸 866
36866 防己丸 856	36908 防己饮 861	36951 防风丸 867
36867 防己丸 856	36909 防己饮 861	36952 防风丸 867
36868 防己丸 856	36910 防己饮 861	36953 防风丸 867
36869 防己汤 856	36911 防己饮 861	36954 防风丸 867
36870 防己汤 856	36912 防己饮 861	36955 防风丸 867
36871 防己汤 857	36913 防己饮 862	36956 防风丸 867
36872 防己汤 857	36914 防己饮 862	36957 防风丸 868
36873 防己汤 857	36915 防己饮 862	36958 防风丸 868
36874 防己汤 857	36916 防己饮 862	36959 防风丸 868
36875 防己汤 857	36917 防己散 862	36960 防风丸 868
36876 防己汤 858	36918 防己散 862	36961 防风丸 868
36877 防己汤 858	36919 防己散 863	36962 防风丸 868
36878 防己汤 858	36920 防己散 863	36963 防风丸 868
36879 防己汤 858	36921 防己散 863	36964 防风丸 868
36880 防己汤 858	36922 防己散 863	36965 防风丸 869
36881 防己汤 858	36923 防己散 863	36966 防风丸 869
36882 防己汤 858	36924 防己散 863	36967 防风丸 869
36883 防己汤 858	36925 防己散 863	36968 防风丸 869
36884 防己汤 859	36926 防己散 864	36969 防风丸 869
36885 防己汤 859	36927 防己散 864	36970 防风丸 869
36886 防己汤 859	36928 防己散 864	36971 防风丸 869
36887 防己汤 859	36929 防己散 864	36972 防风丸 869
36888 防己汤 859	36930 防己散 864	36973 防风丸 869
36889 防己汤 859	36931 防己散 864	36974 防风丹 869
36890 防己汤 859	36932 防己散 864	36975 防风丹 869
36891 防己汤 859	36933 防己散 864	36976 防风汤 870
	36934 防己散 864	36977 防风汤 870

36978	防风汤	870	37021	防风汤	876	37064	防风汤	881
36979	防风汤	870	37022	防风汤	876	37065	防风汤	881
36980	防风汤	870	37023	防风汤	877	37066	防风汤	881
36981	防风汤	870	37024	防风汤	877	37067	防风汤	882
36982	防风汤	870	37025	防风汤	877	37068	防风汤	882
36983	防风汤	871	37026	防风汤	877	37069	防风汤	882
36984	防风汤	871	37027	防风汤	877	37070	防风汤	882
36985	防风汤	871	37028	防风汤	877	37071	防风汤	882
36986	防风汤	871	37029	防风汤	877	37072	防风汤	882
36987	防风汤	872	37030	防风汤	877	37073	防风汤	882
36988	防风汤	872	37031	防风汤	878	37074	防风汤	882
36989	防风汤	872	37032	防风汤	878	37075	防风汤	882
36990	防风汤	872	37033	防风汤	878	37076	防风汤	882
36991	防风汤	872	37034	防风汤	878	37077	防风汤	883
36992	防风汤	872	37035	防风汤	878	37078	防风汤	883
36993	防风汤	872	37036	防风汤	878	37079	防风汤	883
36994	防风汤	872	37037	防风汤	878	37080	防风汤	883
36995	防风汤	873	37038	防风汤	878	37081	防风汤	883
36996	防风汤	873	37039	防风汤	878	37082	防风汤	883
36997	防风汤	873	37040	防风汤	879	37083	防风汤	883
36998	防风汤	873	37041	防风汤	879	37084	防风汤	883
36999	防风汤	873	37042	防风汤	879	37085	防风汤	883
37000	防风汤	873	37043	防风汤	879	37086	防风汤	883
37001	防风汤	873	37044	防风汤	879	37087	防风汤	883
37002	防风汤	874	37045	防风汤	879	37088	防风汤	884
37003	防风汤	874	37046	防风汤	879	37089	防风汤	884
37004	防风汤	874	37047	防风汤	879	37090	防风汤	884
37005	防风汤	874	37048	防风汤	880	37091	防风汤	884
37006	防风汤	874	37049	防风汤	880	37092	防风汤	884
37007	防风汤	874	37050	防风汤	880	37093	防风汤	884
37008	防风汤	874	37051	防风汤	880	37094	防风汤	884
37009	防风汤	875	37052	防风汤	880	37095	防风汤	885
37010	防风汤	875	37053	防风汤	880	37096	防风汤	885
37011	防风汤	875	37054	防风汤	880	37097	防风汤	885
37012	防风汤	875	37055	防风汤	880	37098	防风饮	885
37013	防风汤	875	37056	防风汤	881	37099	防风饮	885
37014	防风汤	875	37057	防风汤	881	37100	防风饮	885
37015	防风汤	875	37058	防风汤	881	37101	防风饮	885
37016	防风汤	876	37059	防风汤	881	37102	防风饮	885
37017	防风汤	876	37060	防风汤	881	37103	防风饮	885
37018	防风汤	876	37061	防风汤	881	37104	防风饮	885
37019	防风汤	876	37062	防风汤	881	37105	防风饮	886
37020	防风汤	876	37063	防风汤	881	37106	防风饮	886

37236 防风散	902	37279 防喘汤	908	37322 防风天麻散	915
37237 防风散	902	37280 防温汤	908	37323 防风天麻散	915
37238 防风粥	902	37281 防犀饮	908	37324 防风天麻膏	915
37239 防风粥	902	37282 防腐汤	908	37325 防风木通汤	915
37240 防风煎	903	37283 防己煮散	909	37326 防风牛蒡汤	915
37241 防风膏	903	37284 防风饮子	909	37327 防风升麻汤	915
37242 防风膏	903	37285 防风饮子	909	37328 防风升麻汤	915
37243 防附汤	903	37286 防风饮子	909	37329 防风升麻汤	915
37244 防苓汤	903	37287 防风饮子	909	37330 防风升麻汤	916
37245 防疟方	903	37288 防风饮子	909	37331 防风平胃散	916
37246 防俭饼	903	37289 防风饮子	909	37332 防风石膏汤	916
37247 防疫丹	903	37290 防风补煎	909	37333 防风石膏汤	916
37248 防疫丹	904	37291 防风根汤	909	37334 防风归芍饮	916
37249 防桔汤	904	37292 防风浴汤	909	37335 防风四苓散	916
37250 防眩汤	904	37293 防风浴汤	910	37336 防风四物汤	916
37251 防葵丸	904	37294 防风浴汤	910	37337 防风白术汤	916
37252 防葵丸	904	37295 防风煮散	910	37338 防风白术散	916
37253 防葵丸	904	37296 防风煮散	910	37339 防风立效散	916
37254 防葵丸	905	37297 防己地黄汤	910	37340 防风必效散	916
37255 防葵丸	905	37298 防己竹沥汤	911	37341 防风半夏丸	917
37256 防葵丸	905	37299 防己苡仁汤	911	37342 防风发表汤	917
37257 防葵丸	905	37300 防己枳壳汤	911	37343 防风芍药汤	917
37258 防葵丸	905	37301 防己茯苓汤	911	37344 防风芍药汤	917
37259 防葵丸	905	37302 防己茯苓汤	912	37345 防风芎归汤	917
37260 防葵丸	905	37303 防己茯苓汤	912	37346 防风百解散	917
37261 防葵丸	906	37304 防己宣痹汤	912	37347 防风至宝汤	917
37262 防葵丸	906	37305 防己桂枝汤	912	37348 防风当归丸	917
37263 防葵丸	906	37306 防己桂枝汤	912	37349 防风当归汤	917
37264 防葵丸	906	37307 防己黄耆汤	912	37350 防风当归汤	917
37265 防葵方	906	37308 防己麻黄汤	913	37351 防风当归汤	918
37266 防葵饮	906	37309 防己椒苈丸	913	37352 防风当归饮	918
37267 防葵散	906	37310 防己椒苈汤	913	37353 防风当归饮	918
37268 防葵散	906	37311 防己葶苈丸	913	37354 防风当归散	918
37269 防葵散	907	37312 防己葶苈丸	914	37355 防风当归散	918
37270 防葵散	907	37313 防己葶苈丸	914	37356 防风冲和汤	918
37271 防葵散	907	37314 防己槟榔丸	914	37357 防风冲和汤	918
37272 防葵散	907	37315 防风一字散	914	37358 防风羊角汤	918
37273 防葵散	907	37316 防风干葛汤	914	37359 防风导赤散	918
37274 防葵散	907	37317 防风子苓丸	914	37360 防风导赤散	919
37275 防葵散	908	37318 防风天麻丸	914	37361 防风如神散	919
37276 防葵散	908	37319 防风天麻丸	914	37362 防风苍术汤	919
37277 防葵散	908	37320 防风天麻汤	914	37363 防风苍术汤	919
37278 防葵散	908	37321 防风天麻汤	914	37364 防风苍术汤	919

37365 防风赤芍汤 919	37408 防风通圣丸 924	37451 防葛石膏汤 930
37366 防风羌活丸 919	37409 防风通圣散 924	37452 防葛石膏汤 930
37367 防风羌活汤 919	37410 防风通圣散 925	37453 防己加茯苓汤 930
37368 防风羌活汤 920	37411 防风通圣散 925	37454 防风加葛根汤 930
37369 防风羌活汤 920	37412 防风通圣散 926	37455 防风当归饮子 931
37370 防风羌活汤 920	37413 防风通圣散 926	37456 防风钩藤钩丸 931
37371 防风羌活汤 920	37414 防风通圣散 926	37457 防风羚羊角汤 931
37372 防风羌活散 920	37415 防风通圣散 926	37458 防风蔓荆子丸 931
37373 防风羌活散 920	37416 防风黄芩丸 926	37459 防风白术牡蛎汤 ... 931
37374 防风败毒散 920	37417 防风黄连汤 926	37460 防风白术牡蛎散 ... 931
37375 防风败毒散 920	37418 防风黄耆汤 926	37461 防风芍药甘草汤 ... 931
37376 防风败毒散 920	37419 防风黄耆汤 926	37462 防风松肌败毒汤 ... 932
37377 防风败毒散 921	37420 防风麻黄汤 927	37463 防风荆芥甘草汤 ... 932
37378 防风败毒散 921	37421 防风麻黄散 927	37464 防风通圣三黄丸 ... 932
37379 防风明目汤 921	37422 防风散结汤 927	37465 防风黄芩二物汤 ... 932
37380 防风泻白散 921	37423 防风散结汤 927	37466 防风葛根石膏汤 ... 932
37381 防风泻肝散 921	37424 防风散结散 927	37467 防饥救生四果丹 ... 932
37382 防风枳实汤 921	37425 防风散痧汤 927	37468 防己加茯苓芒消 汤 932
37383 防风枳实散 921	37426 防风葛根汤 927	37469 防毒气防瘟疫灵 药 932
37384 防风柏子散 921	37427 防风葛根汤 928	37470 防己椒目葶苈大黄 丸 932
37385 防风荆芥散 921	37428 防风葛根汤 928	37471 防风通圣散加蝎尾 方 933
37386 防风荆芥散 921	37429 防风葛根汤 928	
37387 防风茯苓汤 921	37430 防风葛根汤 928	
37388 防风茯苓汤 922	37431 防风煮肝散 928	
37389 防风茯神散 922	37432 防风雄黄丸 928	
37390 防风复元散 922	37433 防风温胆汤 928	
37391 防风独活汤 922	37434 防风解毒汤 928	
37392 防风独活汤 922	37435 防风解毒汤 929	
37393 防风独活汤 922	37436 防风解毒汤 929	
37394 防风胜金汤 922	37437 防风解毒汤 929	
37395 防风胜湿汤 922	37438 防风解温汤 929	
37396 防风胜湿汤 922	37439 防风蔓荆丸 929	
37397 防风胜湿汤 923	37440 防风藁本汤 929	
37398 防风神术汤 923	37441 防术牡蛎汤 929	
37399 防风秦艽汤 923	37442 防独神分湿 929	
37400 防风桔梗汤 923	37443 防桂术苓散 929	
37401 防风桔梗汤 923	37444 防耆分湿汤 930	
37402 防风桔梗汤 923	37445 防病牛黄汤 930	
37403 防风柴胡汤 923	37446 防盗止汗汤 930	
37404 防风消毒饮 923	37447 防椒茱萸丸 930	
37405 防风消毒散 923	37448 防椒茱萸汤 930	
37406 防风通气汤 923	37449 防葛二陈汤 930	
37407 防风通气汤 924	37450 防葛平胃散 930	
		收
		37472 收火汤 933
		37473 收舌散 933
		37474 收伤油 933
		37475 收血汤 933
		37476 收血汤 933
		37477 收肌饮 933
		37478 收汗丹 933
		37479 收汗丹 933
		37480 收汗丹 934
		37481 收汗汤 934
		37482 收汗散 934
		37483 收阳汤 934
		37484 收阳粉 934
		37485 收阴散 934
		37486 收束散 934
		37487 收呆汤 934

37488 收肛散	934
37489 收肛散	934
37490 收肛散	934
37491 收肛散	935
37492 收肠丸	935
37493 收肠散	935
37494 收肠散	935
37495 收泪散	935
37496 收泪散	935
37497 收毒散	935
37498 收毒散	935
37499 收带丸	935
37500 收带汤	935
37501 收胎散	935
37502 收珠散	935
37503 收脂汤	935
37504 收脓散	935
37505 收脓膏	936
37506 收痔丸	936
37507 收痔散	936
37508 收痔散	936
37509 收痒丹	936
37510 收惊汤	936
37511 收髓散	936
37512 收髓散	936
37513 收湿粉	936
37514 收膜汤	936
37515 收膜散	937
37516 收干药捻	937
37517 收口掺药	937
37518 收口掺药	937
37519 收功后药	937
37520 收阳温粉	937
37521 收黑虎汤	937
37522 收干生肌膏	937
37523 收口八宝散	938
37524 收口生肌散	938
37525 收口红宝膏	938
37526 收功万全汤	938
37527 收功尽根丸	938
37528 收功补漏丸	938
37529 收功拔毒散	938
37530 收血双解散	938

37531 收汗生阳汤	938
37532 收阴养胃煎	939
37533 收呆至神汤	939
37534 收毒外消膏	939
37535 收带六合丸	939
37536 收晕白玉膏	939
37537 收湿异效散	939
37538 收髓黑龙丹	939
37539 收干生肌药粉	939
37540 收肠养血和气丸	939
37541 收肠养血和气汤	939

迅

37542 迅行汤	939
37543 迅补丸	940
37544 迅雷散	940

如

37545 如玉散	940
37546 如圣丸	940
37547 如圣丸	940
37548 如圣丸	940
37549 如圣丸	940
37550 如圣丸	941
37551 如圣丸	941
37552 如圣丸	941
37553 如圣丸	941
37554 如圣丸	941
37555 如圣丸	941
37556 如圣丸	941
37557 如圣丸	942
37558 如圣丸	942
37559 如圣丸	942
37560 如圣丸	942
37561 如圣丸	942
37562 如圣丸	942
37563 如圣丸	943
37564 如圣丸	943
37565 如圣丸	943
37566 如圣丸	943
37567 如圣丸	943
37568 如圣丸	943
37569 如圣丸	943

37570 如圣丸	943
37571 如圣丸	943
37572 如圣丸	944
37573 如圣丸	944
37574 如圣丸	944
37575 如圣丸	944
37576 如圣丹	944
37577 如圣丹	944
37578 如圣丹	944
37579 如圣丹	944
37580 如圣水	944
37581 如圣汤	945
37582 如圣汤	945
37583 如圣汤	945
37584 如圣汤	945
37585 如圣汤	945
37586 如圣汤	945
37587 如圣汤	945
37588 如圣汤	945
37589 如圣汤	946
37590 如圣汤	946
37591 如圣汤	946
37592 如圣饮	946
37593 如圣饮	946
37594 如圣饮	946
37595 如圣饮	946
37596 如圣饮	946
37597 如圣饮	946
37598 如圣饮	946
37599 如圣饮	947
37600 如圣饮	947
37601 如圣饮	947
37602 如圣饮	947
37603 如圣饼	947
37604 如圣饼	947
37605 如圣饼	947
37606 如圣散	947
37607 如圣散	947
37608 如圣散	948
37609 如圣散	948
37610 如圣散	948
37611 如圣散	948
37612 如圣散	948

37613 如圣散	948	37656 如圣散	953	37699 如圣散	958
37614 如圣散	948	37657 如圣散	953	37700 如圣散	958
37615 如圣散	948	37658 如圣散	954	37701 如圣散	958
37616 如圣散	949	37659 如圣散	954	37702 如圣散	958
37617 如圣散	949	37660 如圣散	954	37703 如圣散	958
37618 如圣散	949	37661 如圣散	954	37704 如圣散	958
37619 如圣散	949	37662 如圣散	954	37705 如圣散	958
37620 如圣散	949	37663 如圣散	954	37706 如圣散	958
37621 如圣散	949	37664 如圣散	954	37707 如圣散	959
37622 如圣散	949	37665 如圣散	954	37708 如圣散	959
37623 如圣散	949	37666 如圣散	954	37709 如圣散	959
37624 如圣散	950	37667 如圣散	955	37710 如圣膏	959
37625 如圣散	950	37668 如圣散	955	37711 如圣膏	959
37626 如圣散	950	37669 如圣散	955	37712 如圣膏	959
37627 如圣散	950	37670 如圣散	955	37713 如圣膏	959
37628 如圣散	950	37671 如圣散	955	37714 如圣膏	959
37629 如圣散	950	37672 如圣散	955	37715 如圣膏	959
37630 如圣散	950	37673 如圣散	955	37716 如圣膏	960
37631 如圣散	950	37674 如圣散	955	37717 如圣膏	960
37632 如圣散	950	37675 如圣散	956	37718 如圣膏	960
37633 如圣散	951	37676 如圣散	956	37719 如圣膏	960
37634 如圣散	951	37677 如圣散	956	37720 如圣膏	960
37635 如圣散	951	37678 如圣散	956	37721 如圣膏	960
37636 如圣散	951	37679 如圣散	956	37722 如圣膏	960
37637 如圣散	951	37680 如圣散	956	37723 如圣膏	961
37638 如圣散	951	37681 如圣散	956	37724 如圣膏	961
37639 如圣散	951	37682 如圣散	956	37725 如圣膏	961
37640 如圣散	951	37683 如圣散	956	37726 如冰散	961
37641 如圣散	952	37684 如圣散	956	37727 如冰散	961
37642 如圣散	952	37685 如圣散	956	37728 如金丸	961
37643 如圣散	952	37686 如圣散	956	37729 如金散	961
37644 如圣散	952	37687 如圣散	956	37730 如金散	961
37645 如圣散	952	37688 如圣散	956	37731 如金散	961
37646 如圣散	952	37689 如圣散	957	37732 如圣散	961
37647 如圣散	952	37690 如圣散	957	37733 如胜散	961
37648 如圣散	952	37691 如圣散	957	37734 如胜散	962
37649 如圣散	953	37692 如圣散	957	37735 如胜散	962
37650 如圣散	953	37693 如圣散	957	37736 如胜膏	962
37651 如圣散	953	37694 如圣散	957	37737 如神丸	962
37652 如圣散	953	37695 如圣散	957	37738 如神丸	962
37653 如圣散	953	37696 如圣散	957	37739 如神丸	962
37654 如圣散	953	37697 如圣散	957	37740 如神丸	962
37655 如圣散	953	37698 如圣散	958	37741 如神丸	962

37742 如神丸	962	37785 如神散	966	37828 如意汤	972
37743 如神丸	963	37786 如神散	967	37829 如意饮	972
37744 如神丸	963	37787 如神散	967	37830 如意油	972
37745 如神丸	963	37788 如神散	967	37831 如意酒	973
37746 如神丸	963	37789 如神散	967	37832 如意散	973
37747 如神丸	963	37790 如神散	967	37833 如意散	973
37748 如神丸	963	37791 如神散	967	37834 如意散	973
37749 如神丸	963	37792 如神散	967	37835 如意散	973
37750 如神丸	963	37793 如神散	967	37836 如意散	973
37751 如神丸	963	37794 如神散	967	37837 如意散	973
37752 如神丹	963	37795 如神散	968	37838 如意散	973
37753 如神汤	963	37796 如神散	968	37839 如意散	973
37754 如神汤	963	37797 如神散	968	37840 如意散	973
37755 如神汤	963	37798 如神散	968	37841 如意膏	973
37756 如神汤	963	37799 如神膏	968	37842 如意膏	974
37757 如神汤	964	37800 如神膏	968	37843 如意膏	974
37758 如神汤	964	37801 如神膏	968	37844 如意膏	974
37759 如神汤	964	37802 如雪汤	968	37845 如圣饮子	974
37760 如神汤	964	37803 如智丸	968	37846 如圣饮子	974
37761 如神汤	964	37804 如智丸	968	37847 如圣金錠	974
37762 如神汤	964	37805 如智丸	968	37848 如圣饼子	974
37763 如神汤	964	37806 如智散	968	37849 如圣饼子	974
37764 如神饮	964	37807 如意丸	968	37850 如圣饼子	975
37765 如神饮	965	37808 如意丸	969	37851 如圣饼子	975
37766 如神散	965	37809 如意丸	969	37852 如圣饼子	975
37767 如神散	965	37810 如意丸	969	37853 如圣黑膏	975
37768 如神散	965	37811 如意丸	969	37854 如圣煎丸	975
37769 如神散	965	37812 如意丸	969	37855 如神饼子	975
37770 如神散	965	37813 如意丸	969	37856 如意仙丹	975
37771 如神散	965	37814 如意丸	970	37857 如意金丹	976
37772 如神散	965	37815 如意丸	970	37858 如圣千金散	976
37773 如神散	965	37816 如意丸	970	37859 如圣无比散	976
37774 如神散	965	37817 如意丸	970	37860 如圣针头丸	976
37775 如神散	965	37818 如意丸	970	37861 如圣围毒膏	976
37776 如神散	966	37819 如意丹	971	37862 如圣青金丸	976
37777 如神散	966	37820 如意丹	971	37863 如圣青金丹	976
37778 如神散	966	37821 如意丹	971	37864 如圣青金丹	976
37779 如神散	966	37822 如意丹	971	37865 如圣金刀散	977
37780 如神散	966	37823 如意丹	972	37866 如圣柘黄丸	977
37781 如神散	966	37824 如意丹	972	37867 如圣胜金錠	977
37782 如神散	966	37825 如意丹	972	37868 如圣胜金錠	977
37783 如神散	966	37826 如意丹	972	37869 如圣消惊丸	978
37784 如神散	966	37827 如意汤	972	37870 如圣黄耆汤	978

37871	如圣救苦散	978
37872	如圣救苦散	978
37873	如圣紫草汤	978
37874	如圣黑丸子	978
37875	如金解毒汤	978
37876	如金解毒散	978
37877	如神千金方	978
37878	如神开骨膏	979
37879	如神开骨膏	979
37880	如神木香丸	979
37881	如神木香丸	979
37882	如神止泻丸	979
37883	如神化毒汤	979
37884	如神白虎汤	979
37885	如神白虎汤	979
37886	如神宁嗽膏	979
37887	如神托里散	980
37888	如神定喘汤	980
37889	如神救苦散	980
37890	如神救苦散	980
37891	如神断痢丸	980
37892	如神鳖甲汤	980
37893	如童老奴丸	980
37894	如意大力丸	980
37895	如意金黄散	981
37896	如意金黄散	981
37897	如意铁箍散	981
37898	如意通圣汤	981
37899	如意通圣散	981
37900	如意通圣散	982
37901	如意通圣散	982
37902	如意紫沉煎	982
37903	如圣加枳实汤	982
37904	如圣麦门冬散	982
37905	如圣胜金锭子	982
37906	如圣加吴茱萸汤	982
37907	如妙辰砂化痰丸	982
37908	如圣加人参麝香杏仁汤	982

妇

37909	妇宝丸	983
37910	妇宝丹	983

37911	妇康片	983
37912	妇科金丹	983
37913	妇科金丹	984
37914	妇人归附丸	984
37915	妇女止痛酒	984
37916	妇女乌发丹	984
37917	妇女抽筋丸	984
37918	妇女香身丹	984
37919	妇女养血丸	985
37920	妇女养营丸	985
37921	妇女调经膏	985
37922	妇女紫金丹	985
37923	妇女痛经丸	985
37924	妇宝宁坤丸	986
37925	妇宝胜金丹	986
37926	妇宝胜金丹	986
37927	妇宝胶归丸	986
37928	妇宝调经汤	987
37929	妇科十味片	987
37930	妇科五淋丸	987
37931	妇科五淋丸	987
37932	妇科分清丸	987
37933	妇科乌金丸	987
37934	妇科白带丸	988
37935	妇科回生丹	988
37936	妇科妇宝丹	988
37937	妇科补益丸	988
37938	妇科调经丸	988
37939	妇科调经片	988
37940	妇科得生丹	988
37941	妇科散瘀丸	989
37942	妇科黑豆丸	989
37943	妇女救苦金丹	989
37944	妇科花蕊石散	989
37945	妇科大黄虻虫丸	989

好

37946	好乳汤	989
37947	好槐枝汤	989

观

37948	观音丸	990
37949	观音丸	990

37950	观音针	990
37951	观音针	990
37952	观音灸	990
37953	观音灸	990
37954	观音茶	990
37955	观音散	990
37956	观音散	990
37957	观音散	990
37958	观音散	991
37959	观音散	991
37960	观音散	991
37961	观音散	991
37962	观音散	991
37963	观音散	991
37964	观音散	991
37965	观音散	991
37966	观音露	991
37967	观音露	991
37968	观音露	992
37969	观音全蝎散	992
37970	观音全蝎散	992
37971	观音应梦饮	992
37972	观音应梦散	992
37973	观音应梦散	992
37974	观音妙济散	992
37975	观音梦授丸	992
37976	观音梦授方	992
37977	观音救生散	992
37978	观音救苦丹	992
37979	观音救苦丹	992
37980	观音救苦丹	993
37981	观音救苦丹	993
37982	观音救苦丹	993
37983	观音救苦丹	993
37984	观音救苦方	993
37985	观音救苦针	993
37986	观音救苦散	993
37987	观音救苦散	994
37988	观音救苦锭	994
37989	观音救苦膏	994
37990	观音救苦膏	994
37991	观音救命散	994
37992	观音救急丹	994

37993	观音普济丹	994
37994	观音救苦神膏	995
37995	观音人参胡桃汤 ...	995
37996	观音梦感参桃汤 ...	996
37997	观音救苦甘露饮 ...	996
37998	观音大士救苦神膏	996

欢

37999	欢喜散	996
-------	-----------	-----

羽

38000	羽白散	996
38001	羽泽丸	996
38002	羽泽散	996
38003	羽泽散	996
38004	羽泽散	996
38005	羽泽散	996
38006	羽泽散	997
38007	羽泽散	997
38008	羽泽散	997
38009	羽泽散	997
38010	羽泽散	997
38011	羽泽散	997
38012	羽泽散	997
38013	羽泽散	997
38014	羽泽散	997
38015	羽泽散	997
38016	羽泽散	997
38017	羽泽散	997
38018	羽泽散	997
38019	羽泽散	997
38020	羽泽散	997
38021	羽泽散	998
38022	羽泽散	998
38023	羽泽散	998
38024	羽泽散	998
38025	羽泽散	998
38026	羽泽散	998
38027	羽泽散	998
38028	羽泽散	998
38029	羽泽散	998
38030	羽泽散	998

38031	羽泽散	998
38032	羽皇散	998
38033	羽液膏	998

买

38034	买子木汤	999
-------	------------	-----

孙

38035	孙武散	999
38036	孙思邈真人丸	999
38037	孙思邈真人煎	999
38038	孙真人五汁膏	999
38039	孙真人红枣丹	999
38040	孙真人活命神丹 ...	999
38041	孙真人透骨小灵丹	1000

驯

38042	驯龙汤	1000
38043	驯龙馭虎汤	1000

驰

38044	驰源散	1000
-------	-----------	------

红

38045	红丸	1000
38046	红丸	1000
38047	红油	1000
38048	红药	1000
38049	红粉	1000
38050	红粉	1000
38051	红粉	1001
38052	红粉	1001
38053	红粉	1001
38054	红袍	1001
38055	红雪	1001
38056	红雪	1001
38057	红雪	1002
38058	红散	1002
38059	红膏	1002
38060	红膏	1002
38061	红膏	1002
38062	红丸子	1002

38063	红丸子	1002
38064	红丸子	1002
38065	红丸子	1003
38066	红丸子	1003
38067	红丸子	1003
38068	红丸子	1004
38069	红丸子	1004
38070	红丸子	1004
38071	红丸子	1004
38072	红丸子	1004
38073	红丸子	1004
38074	红丸子	1004
38075	红子汤	1005
38076	红升丹	1005
38077	红升丹	1005
38078	红玉散	1005
38079	红玉散	1005
38080	红玉散	1005
38081	红玉散	1005
38082	红玉散	1006
38083	红玉散	1006
38084	红玉散	1006
38085	红玉散	1006
38086	红玉散	1006
38087	红玉锭	1006
38088	红玉膏	1006
38089	红玉膏	1006
38090	红玉膏	1006
38091	红玉膏	1006
38092	红玉膏	1007
38093	红玉膏	1007
38094	红玉膏	1007
38095	红玉膏	1007
38096	红玉膏	1007
38097	红玉膏	1007
38098	红玉膏	1007
38099	红玉膏	1007
38100	红玉膏	1008
38101	红末子	1008
38102	红龙散	1008
38103	红龙散	1008
38104	红龙散	1008
38105	红龙散	1008

38106 红白丹	1008	38149 红吹散	1012	38192 红消散	1017
38107 红白散	1008	38150 红灵丹	1012	38193 红消散	1017
38108 红白散	1008	38151 红灵丹	1013	38194 红润膏	1017
38109 红白散	1009	38152 红灵药	1013	38195 红粉丹	1017
38110 红白散	1009	38153 红灵酒	1013	38196 红粉散	1017
38111 红白散	1009	38154 红灵散	1013	38197 红粉散	1017
38112 红曲酒	1009	38155 红灵散	1013	38198 红粉散	1017
38113 红肉膏	1009	38156 红鸡膏	1013	38199 红粉散	1017
38114 红阳膏	1009	38157 红鸡膏	1013	38200 红粉霜	1018
38115 红豆丸	1009	38158 红英丹	1013	38201 红浆水	1018
38116 红豆丸	1009	38159 红枣丸	1013	38202 红娘丸	1018
38117 红豆散	1009	38160 红枣丸	1014	38203 红雪汤	1018
38118 红豆散	1009	38161 红枣散	1014	38204 红雪散	1018
38119 红豆散	1009	38162 红枣散	1014	38205 红雪散	1018
38120 红花丸	1009	38163 红枣膏	1014	38206 红雪煎	1018
38121 红花汤	1010	38164 红雨丹	1014	38207 红眼药	1018
38122 红花汤	1010	38165 红矾丸	1014	38208 红铜片	1018
38123 红花汤	1010	38166 红矾散	1014	38209 红绵丹	1018
38124 红花汤	1010	38167 红矾散	1014	38210 红绵散	1019
38125 红花汤	1010	38168 红轮散	1014	38211 红绵散	1019
38126 红花汤	1010	38169 红炉雪	1014	38212 红绵散	1019
38127 红花汤	1010	38170 红炉散	1015	38213 红绵散	1019
38128 红花汤	1010	38171 红净药	1015	38214 红绵散	1019
38129 红花酊	1010	38172 红油膏	1015	38215 红绵散	1019
38130 红花酊	1010	38173 红油膏	1015	38216 红绵散	1019
38131 红花酒	1010	38174 红油膏	1015	38217 红绵散	1019
38132 红花散	1010	38175 红宝丹	1015	38218 红绵散	1020
38133 红花散	1011	38176 红柿粥	1015	38219 红绵散	1020
38134 红花散	1011	38177 红药子	1015	38220 红绵散	1020
38135 红花散	1011	38178 红药膏	1015	38221 红绵散	1020
38136 红花散	1011	38179 红香粉	1015	38222 红绵散	1020
38137 红花散	1011	38180 红狮丹	1016	38223 红绵散	1020
38138 红花散	1011	38181 红胜丹	1016	38224 红绵散	1020
38139 红花散	1011	38182 红桃丹	1016	38225 红绵散	1020
38140 红花散	1011	38183 红桃丹	1016	38226 红绵散	1020
38141 红花散	1011	38184 红桃散	1016	38227 红绵散	1021
38142 红花散	1011	38185 红桃散	1016	38228 红绵散	1021
38143 红花散	1011	38186 红桃散	1016	38229 红绵散	1021
38144 红花散	1012	38187 红莲散	1016	38230 红绵散	1021
38145 红花散	1012	38188 红铅散	1016	38231 红绵散	1021
38146 红花散	1012	38189 红秫散	1017	38232 红绵散	1021
38147 红花膏	1012	38190 红倩丹	1017	38233 红椒丸	1021
38148 红吹药	1012	38191 红消散	1017	38234 红椒丸	1021

38235 红棉散	1021	38278 红芍药散	1027	38321 红蓝花散	1032
38236 红棉散	1021	38279 红肉药捻	1027	38322 红蓝花散	1032
38237 红棉散	1022	38280 红血药捻	1027	38323 红蓝花散	1032
38238 红棉散	1022	38281 红衣大炮	1027	38324 红蓝花煎	1032
38239 红散子	1022	38282 红豆蔻丸	1027	38325 红避瘟散	1032
38240 红散子	1022	38283 红豆蔻丸	1027	38326 红玉生肌散	1032
38241 红散子	1022	38284 红豆蔻汤	1027	38327 红白痢症丸	1032
38242 红散子	1022	38285 红豆蔻散	1027	38328 红白痢疾丸	1033
38243 红散子	1022	38286 红豆蔻散	1028	38329 红花升麻散	1033
38244 红散子	1022	38287 红花子汤	1028	38330 红花归尾散	1033
38245 红散子	1022	38288 红花子汤	1028	38331 红花四物汤	1033
38246 红绉膏	1022	38289 红阿胶丸	1028	38332 红花四物汤	1033
38247 红蓝散	1023	38290 红定眼药	1028	38333 红花当归丸	1033
38248 红蓝散	1023	38291 红粉纱条	1028	38334 红花当归汤	1033
38249 红蔻散	1023	38292 红粉纱条	1029	38335 红花当归汤	1033
38250 红蜡丸	1023	38293 红粉药捻	1029	38336 红花当归汤	1033
38251 红膏药	1023	38294 红粉霜丹	1029	38337 红花当归饮	1033
38252 红膏药	1023	38295 红黑二散	1029	38338 红花当归散	1034
38253 红膏药	1023	38296 红樨咽方	1029	38339 红花当归散	1034
38254 红膏药	1023	38297 红蓝花汤	1029	38340 红花当归散	1034
38255 红膏药	1024	38298 红蓝花汤	1029	38341 红花当归散	1034
38256 红膏药	1024	38299 红蓝花汤	1029	38342 红花当归散	1034
38257 红膏药	1024	38300 红蓝花汤	1029	38343 红花当归散	1034
38258 红膏药	1024	38301 红蓝花汤	1030	38344 红花当归散	1035
38259 红膏药	1025	38302 红蓝花饮	1030	38345 红花血竭丸	1035
38260 红膏药	1025	38303 红蓝花酒	1030	38346 红花苍柏丸	1035
38261 红颜酒	1025	38304 红蓝花酒	1030	38347 红花苏木汤	1035
38262 红潮散	1025	38305 红蓝花散	1030	38348 红花胜金散	1035
38263 红薯粥	1025	38306 红蓝花散	1030	38349 红花活血汤	1035
38264 红燕丹	1025	38307 红蓝花散	1030	38350 红花桃仁汤	1035
38265 红霞散	1025	38308 红蓝花散	1030	38351 红花桃仁汤	1035
38266 红藤煎	1025	38309 红蓝花散	1030	38352 红花桃仁汤	1035
38267 红千捶膏	1026	38310 红蓝花散	1031	38353 红花桃仁汤	1036
38268 红内消散	1026	38311 红蓝花散	1031	38354 红花桃仁汤	1036
38269 红内消散	1026	38312 红蓝花散	1031	38355 红花桃仁汤	1036
38270 红内消散	1026	38313 红蓝花散	1031	38356 红花桃仁汤	1036
38271 红内消散	1026	38314 红蓝花散	1031	38357 红花桃仁煎	1036
38272 红水眼药	1026	38315 红蓝花散	1031	38358 红花散瘀汤	1036
38273 红平安散	1026	38316 红蓝花散	1031	38359 红桃四物汤	1036
38274 红玉饮子	1026	38317 红蓝花散	1032	38360 红铅造化丹	1036
38275 红玉铤子	1026	38318 红蓝花散	1032	38361 红粉生肌膏	1037
38276 红玉铤子	1026	38319 红蓝花散	1032	38362 红黄霹雳散	1037
38277 红芍药散	1027	38320 红蓝花散	1032	38363 红雪通中散	1037

38364 红雪通中散	1037	38369 红花白芷防风		38371 约荣煎	1038
38365 红绵龙骨散	1037	饮	1037	38372 约营煎	1038
38366 红蓝花饮子	1037			38373 约营煎	1038
38367 红霞鹤顶丹	1037	约		38374 约精丸	1038
38368 红霞鹤顶方	1037	38370 约阴丸	1037	38375 约精丸	1038

检 字

六 画

【一】

戎	1
巩	2
地	2
朽	101
朴	101
杈	108
芋	108
苟	109
茭	135
芒	135
芝	138
芎	138
吉	186
老	187
西	191
亚	197
再	197
耳	204
共	207
列	207
夺	207
压	229
厌	230
有	231
灰	231
存	232
达	233
戌	237
成	237

百	238
死	276
夹	277
托	279
扫	294
扬	298
邪	298
过	298
至	299
夷	316

【丨】

此	316
贞	316
当	316
光	411
吐	416
吃	418
吸	420
岁	421
吕	421
吊	423
早	423
同	424
团	424
回	427
曲	458
虫	463
肉	463

【丿】

竹	486
---	-----

舌	528
先	529
乔	532
年	532
朱	532
传	568
休	570
伏	570
伐	580
仲	581
任	581
伤	581
华	586
延	590
自	612
血	615
向	625
行	625
后	630
舟	631
创	633
全	633
会	650
合	652
众	655
杀	655
汤	661
各	661
多	661
争	662
鳧	662
旬	663

甸..... 663

【、】

刘..... 663

齐..... 666

充..... 666

交..... 677

衣..... 673

产..... 673

亥..... 675

庆..... 675

闭..... 676

问..... 677

灯..... 677

冲..... 678

决..... 683

冰..... 696

汗..... 705

江..... 706

汤..... 707

汝..... 708

壮..... 708

守..... 716

宅..... 719

安..... 719

并..... 775

关..... 776

羊..... 776

兴..... 806

米..... 806

许..... 807

军..... 807

【一】

异..... 808

导..... 817

寻..... 837

尽..... 838

艮..... 838

阮..... 839

阵..... 839

阳..... 839

阴..... 848

防..... 855

收..... 933

迅..... 939

如..... 940

妇..... 983

好..... 989

观..... 990

欢..... 996

羽..... 996

买..... 999

孙..... 999

驯..... 1000

驰..... 1000

红..... 1000

约..... 1037

六 画

戎

30067 戎盐丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《卫生总微》卷十五。

【异名】加减三黄丸（《医部全录》卷四一五）。

【组成】戎盐 黄芩（一作葵子） 黄柏 大黄各五两 人参 桂心 甘草各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以饮送下，一日三次。亦烧铁烙之。

【主治】舌上黑，有数孔，大如箸，出血如涌泉。

【备考】本方改为汤剂，名“戎盐汤”（见《嵩崖尊生》）。

30068 戎盐丸

《圣济总录》（文瑞楼本）卷四十五。即原书（人卫本）同卷“戎盐方”。见该条。

30069 戎盐方

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷四十五。

【组成】戎盐 槟榔（锉） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 桂（去粗皮） 楝实 益智（去皮） 蓬莪术（炮）各半两 墨 巴豆霜 肉豆蔻（去壳） 丁香 木香 胡椒各一分

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二丸至三丸，食后用生姜汤送下。

【功用】利心胸，化留饮。

【主治】脾胃冷气攻心腹疼痛，痰逆恶心，不思饮食。

【备考】本方方名，原书（文瑞楼本）作“戎盐丸”。

30070 戎盐汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】戎盐一分 地骨皮一两 细辛（去

苗叶）半两 生地黄（切，焙）一两

【用法】上为粗末，每服五钱匕，水一盞，煎十余沸，去滓热饮，每日三次。

【主治】肾虚齿痛。

30071 戎盐汤

【方源】《普济方》卷一八六引《指南方》。

【组成】戎盐 黄耆 茯苓 甘草半两 高良姜 芍药 泽泻一两 官桂二两 吴茱萸 乌喙三分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞，浓煎后，又入水一盞，同煎半盞，去滓服。

【主治】①《普济方》引《指南方》：心痹、心痛。②《鸡峰》：肾心痛，痛引腰背，善癱痲，如物从后触其心，身伛偻，脉沉紧。

【备考】方中戎盐、黄耆、茯苓、高良姜、芍药、吴茱萸用量原缺。

30072 戎盐汤

《本草纲目》卷十一。即《金匱》卷中“茯苓戎盐汤”。见该条。

30073 戎盐汤

《嵩崖尊生》卷六。即方出《千金》卷六，名见《卫生总微》卷十五“戎盐丸”改为汤剂。见该条。

30074 戎盐散

【方源】《外台》卷二十九引《古今录验》。

【异名】戎盐涂敷方（《圣济总录》卷一三三）。

【组成】戎盐二分 大黄四分 茵茹一分

【用法】上为散。以酒和敷疮上，一日三次。

【主治】浸淫疮。

30075 戎盐散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】戎盐三分 甘草半两（炙微赤，锉） 蒲黄一两 白矾三分（烧令汁尽） 龙骨一两 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服二钱，食前煎大枣汤调下。

【主治】遗尿恒涩。

30076 戎盐散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】戎盐一合 皂荚半两(去皮子,炙黄焦) 细辛一两半

【用法】上为末。以三角囊大如指长三寸贮之,以纳阴中。但卧,痃当下青如葵汁。

【主治】青痃。痃聚在左右肋背脊上,与肩膊腰下挛急,两足肿,面目黄,大小便难,其候月水不通,或不复禁,状若崩中。

30077 戎盐散

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《医方妙选》。

【组成】戎盐一两 附子一枚 雄黄半两(细研,水飞)

【用法】上为细末。每用少许,以雄鸡血调涂患处。

【主治】小儿鬼火丹,两臂赤起如李子。

30078 戎盐涂敷方

【方源】方出《圣惠》卷九十一,名见《圣济总录》卷一八二。

【组成】戎盐一两 附子一枚(烧灰)

【用法】上为细散。以雄鸡血调涂之。

【主治】小儿鬼火丹。

30079 戎盐涂敷方

《圣济总录》卷一三三。为《外台》卷二十九引《古今录验》“戎盐散”之异名。见该条。

玃

30080 玃堤丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地二两 菟丝子(酒煮)二两 白术(炒)二两 北五味 益智仁(酒炒) 故纸(酒炒) 附子(制) 茯苓 家韭子(炒)各一两

【用法】上为末,山药糊为丸,如梧桐子大。每服百余丸,空心滚汤或温酒送下。

【主治】膀胱不藏,水泉不止,命门火衰,小水不禁。

【加减】如兼气虚必加人参一二两更妙。

【方论选录】《成方便读》:方中熟地、菟丝、

骨脂、韭子,大补肾脏。然所以约束肾中之气者,又在于脾,故以白术、山药大补脾土;益智辛香温暖,独入脾家,且能子固摄之中,仍寓流动之意;附子助其火;茯苓去其邪水;而以五味子一味,固其关其隄也。

地

30081 地丁汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地丁 31 克 连翘 12 克 蒲公英 31 克 黄柏 9 克 黄芩 9 克 生苡仁 12 克 苍术 12 克

【用法】水煎服。

【主治】脓疱疮。

30082 地丁饮

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】紫花地丁一两 白矾 甘草各三钱 银花三两

【用法】水煎服。

【主治】疔疮。

30083 地丁饮

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】鲜紫花地丁

【用法】用花、梗、叶捣汁服。毒重者愈多服愈妙,盖被出汗,其毒自解,并用滓敷患处。或加蒲公英、甘草末三钱调服更效。

【主治】疔毒、对口、发背,一切红肿。

【宜忌】疮色白、平坦者忌用。

30084 地丁饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】地丁 9 克 野菊花 9 克 银花 9 克 连翘 9 克 黑山栀 9 克 半枝莲 9 克 蒲公英 15 克 草河车 9 克 生甘草 6 克

【功用】清热解毒,消肿止痛。

【主治】疔疮。

30085 地丁散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】地丁 廋虫 倒钩棘针 露蜂窠 蛇蛻皮 粟米 黍米 大麻仁 黑豆 赤小豆 乱发 折牛膝 射生箭 熟红帛 蚕纸

各半两 朝生花(秋夏滞雨后,粪堆或烂木上生如小菌子者,及时收之)半两

【用法】上锉细,以蚕纸裹缠,水浸良久,滤出候干,于净地上以炭火烧令烟绝,入新盆中,以盆子合之,候冷,细研为散。如患已成头有脓水者,以散敷之;如未成头,以酒调一钱服之。

【主治】一切恶疮,疗肿毒疮。

30086 地丁散

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】地丁 当归 大黄 赤芍 金银花 甘草减半

【用法】水煎服。

【主治】恶疮肿痛。

30087 地丁膏

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】黄花地丁(即蒲公英) 紫花地丁 各八两

【用法】以长流水洗净,用水熬汁,去滓,又熬成膏,摊贴。

【主治】乳吹,并一切毒。

30088 地干丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】槐角二两 当归身一两 黄耆一两 生地黄二两 川芎五钱 阿胶五钱 黄连一两 连翘一两 黄芩一两 枳壳一两 秦艽一两 防风一两 地榆一两 升麻一两 白芷五钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,加至七八十丸,空心米汤或酒送下。

【功用】清热凉血,祛风宽肠。

【主治】痔漏。

30089 地六汤

【方源】《虚损启微》卷下。

【组成】熟地六钱 苁蓉三钱(漂淡) 麦冬三钱 白芍一钱 生地三钱 柏子仁二钱

【用法】水二钟,煎七分,温服。或加砂仁

五六分

【主治】水亏液涸,大便秘结。

30090 地龙丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】干地龙一分(末) 麝香一分

【用法】上为细末,以黄蜡消汁,为丸如粟米大。每用一丸,纳于蚌孔中。咽津无妨。

【主治】牙疼。

30091 地龙丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】地龙(炒)一分 甜瓜子(炒)半两 自然铜(烧,醋淬,研)二两 乳香(研)一钱 骨碎补 赤芍药 五灵脂 当归(切,炒)各半两 没药(研)一分

【用法】上除研者外,为细末,再和匀,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,空心、临卧温酒送下。

【主治】风邪外袭,身体疼痛。

30092 地龙丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】地龙(去土) 牵牛子(半生半炒) 苦参各一两 乌头(生,去皮尖)四两

【用法】上为末,醋煮稀面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,空心、夜卧米饮送下。

【主治】风气壅滞,大肠秘涩。

30093 地龙丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】川楝子肉一两(用巴豆炒,不用巴豆) 全蝎二钱 好面一两 破故纸三钱(用斑蝥炒,不用斑蝥) 茴香二钱半(用黑牵牛一钱炒,不用黑牵牛) 胡芦巴二钱半(用海金沙一钱炒,不用海金沙) 自然铜半两(煨,醋淬) 水蛭二条(麝香炒) 败龟半两 石薜荔半两(用盐、醋浸一时,焙) 无名异四钱(炒) 槟榔三钱(不见火) 天竺黄半两 红曲半两(瓦上焙) 穿山甲四钱(炒) 地龙三钱(去土,炒) 古

钱十二个(用砂锅子盛,炉内煨成汁,醋淬)

【用法】上为细末,将乳香一钱、没药一钱、麝香一钱、辰砂半两为衣,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。温酒吞下。

【主治】风毒脚气,痛不可忍。

30094 地龙丸

【方源】《普济方》卷一一〇引《卫生宝鉴》。

【组成】全蝎 地龙(去土) 蛇蛻(酒炒) 香附子 防风 胡麻子(别研)各一两 川乌(去皮尖) 蚕沙 荆芥各二两 苍术二两半(米泔水浸)

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服二十九至三十丸,茶、酒任下,不拘时候。

【主治】大风,一切风毒生疮。

30095 地龙丸

《医统》卷五十八。即《兰室秘藏》卷中“地龙散”改为丸剂。见该条。

30096 地龙片

【方源】《中医外科学》。

【组成】地龙(研粉)

【用法】加适量赋型剂,轧片,每片含生药0.3克。成人每次五片,温开水送服,一日二至三次。

【功用】祛风潜镇。

30097 地龙水

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】大白颈地龙四条。

【用法】上洗净研烂,加生姜汁一匙,白蜜一匙,薄荷汁一匙,再加片脑半分,研匀,徐徐灌令尽。良久渐快,稳睡少顷,即揉心下片时,再令睡,当有汗则愈。若不应,再投一服。

【主治】阳毒伤寒,药下虽通,结胸硬痛,或发狂乱。

30098 地龙汤

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】干地龙一分(末) 麝香一分

【用法】上为细末,以黄蜡消汁,为丸如粟米大。每用一九,纳于肿孔中。咽津无妨。

【主治】牙疼。

30099 地龙汤

《医学纲目》卷二十八。即《兰室秘藏》卷中“地龙散”。见该条。

30100 地龙汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】蚯蚓二十条 葱四十条

【用法】同捣烂如泥,以井水二碗漉过,取汁一碗,灌入醉人口中。

【主治】恣饮烧酒,大醉欲死,身体臭秽。

30101 地龙汤

【方源】《伤寒瘟疫条辨》卷一。

【组成】蚯蚓(捣烂)

【用法】入新汲水,搅净浮油,饮清汁。

【主治】温病大热诸证。

30102 地龙饮

【方源】《直指》卷十二。

【组成】生地龙三条(研细)

【用法】加生姜汁、薄荷汁、生蜜各少许,新汲水调下。

【主治】瘴疟、诸疟,大热烦躁。

【加减】如热炽,加脑子少许。

【备考】《理瀹》本方用法:涂胸口。

30103 地龙油

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】干地龙三钱 香油五钱

【用法】将地龙入香油内,微火炸之,俟油生烟,稍停,盛清油于器中,每日以此油点之。

【主治】小儿痘疹后,或大人病后,因出屋太早,而致迎风流泪,及泪孔生瘵。

30104 地龙酒

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】活地龙五七枚(用乌芋捣绞)

【用法】入酒浆少许,炖热服之。

【主治】痘疮,血热毒盛,黑陷不起。

30105 地龙散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】地龙末一两(微炒) 好茶末一两 白僵蚕一两(微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】白虎风,疼痛不可忍。

30106 地龙散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】干地龙(烧灰) 黄矾 白矾(烧令汁尽) 青矾 巴豆(去皮心,研,纸压去油) 石胆 人粪灰(细研)各一分

【用法】上为细散。以绵裹少许,纳于虫孔中。如孔小,以针纳药。一日一度换之,待恶物碎骨出尽为度。

【主治】急疔。虫蚀牙齿,连牙床骨,损坏疼痛。

30107 地龙散

【方源】方出《圣惠》卷五十七,名见《普济方》卷三〇八。

【组成】青葱叶一茎(去尖头,作孔子) 地龙一枚(置葱叶中,紧捏两头,勿令透气,候化为水)

【用法】涂患处。

【主治】蜘蛛咬,遍身成疮。

30108 地龙散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】地龙一两(微炒) 滑石一两 膩粉一钱 麝香一钱(细研) 自然铜半两 绿豆粉三分

【用法】上为细散。每服一钱,煎甘草汤调下,不拘时候。

【主治】血淋,烦热涩痛,眠卧不安。

30109 地龙散

【方源】方出《圣惠》卷六十五,名见《圣济总录》卷一三七。

【组成】猪脂 蚯蚓

【用法】上捣如泥。敷患处,一日四五次。

【主治】代指。

30110 地龙散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】地龙一两(微炒) 蜥蜴一两(微

炙) 芎藭一两 桂心一两 干姜半两(炮裂,锉) 苏枋木一两(锉) 木香三分 蒲黄三分 赤芍药三分 牡丹三分 水蛭三分(微炒) 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒令黄)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以温酒调下。

【主治】妇人气血不调,腹中积聚,瘀血疼痛。

30111 地龙散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】干地龙半两(微炒) 虎睛一对(微炙) 人参一分(去芦头。以上三味同为末) 金箔三十片 朱砂一分 雄黄一分 天竺黄一分 代赭一分 铅霜一分 铁粉一分

【用法】上为细末,入前三味,再研令匀。每服半钱,以温水调下。

【主治】小儿痫癇瘈瘲,发歇无时。

【备考】方中铅霜一分《直指小儿》作“轻粉半钱”。用法以紫苏汤调下。

30112 地龙散

《圣济总录》卷十。为《圣惠》卷二十二“当归散”之异名。见该条。

30113 地龙散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】地龙(白颈者,于瓦上炒)五两 附子(炮裂,去皮脐)二两 蕤蕤子(炒,去角) 赤小豆(炒)各二两半

【用法】上为散。每服二钱匕,空心、晚食前生姜酒调下。

【主治】风攻腰脚疼及痹痹。

30114 地龙散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】地龙(去土,炒) 半夏(生姜汁捣作饼,焙令干,再捣为末) 赤茯苓(去黑皮)各半两

【用法】上为散。每服一字至半钱匕,生姜、荆芥汤调下。

【主治】风头痛及产后头痛。

30115 地龙散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】地龙三钱（去土） 谷精草二钱 乳香（锉）一钱

【用法】上为细散。每服半钱，于烧香饼子上取烟，用纸筒子罩熏鼻中，偏痛随左右用之。

【主治】眼眉骨及头脑俱痛。

30116 地龙散

《圣济总录》卷一一六。为《圣惠》卷三十七“敷鼻蚯蚓散”之异名。见该条。

30117 地龙散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】地龙（去土） 延胡索 草茛各等分

【用法】上为散。如左牙疼，用药一字入左耳内；右牙疼，入右耳内。

【主治】牙齿疼痛。

30118 地龙散

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】地龙粪

【用法】上为末。每服一钱匕，熟水调下，一日三次，不拘时候。

【主治】毒箭所伤。

30119 地龙散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】地龙（炒） 郁金 棕榈（烧令存性） 柏叶 地黄汁 胎发（泥裹烧过，去泥）各等分

【用法】上为散。每服三钱匕，温地黄汁酒调下，不拘时候。

【主治】妇人冲任气虚，经血暴下，兼带下。

30120 地龙散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】地龙（炒） 干姜（炮） 当归（切，焙） 缩砂仁各一分

【用法】上为散。每服半钱匕，生蜜少许和热酒调下，每日三次。

【主治】小儿因患泻痢后，脱肛不得收。

30121 地龙散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引丁时发方。

【组成】郁金（皂角水煮干） 甘草（炙） 白僵蚕 地龙各一两 蝎 牙消各一分

【用法】上为细末。每服一钱，薄荷汤调下，儿小半钱。

【主治】小儿风热，咽喉肿痛。

30122 地龙散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】地龙粪（韭菜地内者，火煨过）不以多少

【用法】上为细末，入膩粉少许，同研匀。先以甘草汤洗了，后用药干掺；或油调敷亦得。

【主治】下疳疮。

30123 地龙散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归梢一分 中桂 地龙各四分 麻黄五分 苏木六分 独活 黄柏 甘草各一钱 羌活二钱 桃仁六个

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】腰脊痛，或打扑损伤，从高坠下，恶血在太阳经中，令人腰脊痛，或胫膂臂股中痛不可忍，鼻塞不通。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“地龙汤”。改为丸剂，名“地龙丸”（见《医统》）。

30124 地龙散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】地龙三条 盐半两（炒）

【用法】上相和，研令烂。以面围毒处，敷药于上。须臾化为水，不过三两次。

【主治】青蛙蛇螫。

30125 地龙散

《普济方》卷三六二。为《普济方》卷三九九引《直指》“地龙膏”之异名。见该条。

30126 地龙散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】地龙（洗去土）半两（焙干） 穿

山甲半两(以皂角灰炒令黄) 朱砂二钱(研细)

【用法】上前二味为细末,后入朱砂一处,再研和匀。每服一钱,用紫草煎汤调下,不拘时候。

【主治】小儿风热瘾疹,状如伤寒,耳尖及手足冷。

30127 地龙散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】甘草 地龙末

【用法】用甘草煎汁,调地龙末涂之。

【主治】阴囊肿大。

30128 地龙膏

【方源】《养老奉亲》。

【组成】白项地龙 茴香用时看多少

【用法】上杵汁,倾于脐内。自然便通。

【主治】老人小便不通。

30129 地龙膏

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】地龙 黄连各三分 巴豆二十个 黄蜡一两 小油二两

【用法】前三味小油内煎药,焦黑色为度,滤去药,用槐柳枝搅成膏,入黄蜡再搅匀。涂贴如常法。

【主治】小儿胎风,并大人疥癣。

30130 地龙膏

【方源】《普济方》卷三九九引《直指》。

【异名】地龙散(《普济方》卷三六二)。

【组成】干地龙不拘多少。

【用法】上为末。先以葱椒汤子避风处洗,次用津唾调敷其上。外肾热者,鸡子清调敷,或加牡蛎少许亦可。

【主治】小儿外肾肿硬,或疝,或风热暴肿及阴疮。

【宜忌】《普济方》:常避风冷湿地。

30131 地龙膏

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】活地龙(白颈者)五条 白梅肉二个 朴消二钱

【用法】上同研成膏,挑入喉中,含化。

【主治】缠喉风。

30132 地龙膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引李养齐方。

【组成】雄黄 地龙粪 小麦面各等分

【用法】上为末。醋调涂之。

【主治】瘰癧未破者。

30133 地仙丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】草薢 防风(去叉) 白蒺藜(炒) 狗脊(去毛) 乌药(锉) 附子(炮裂,去皮脐) 白附子(炮) 赤小豆(拣) 地龙(去土) 骨碎补(炒) 茴香子(炒) 羌活(去芦头) 天南星(炮) 黄耆(锉,炒) 各半两 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 牛膝(酒浸,切,焙) 何首乌(去黑皮) 蜀椒(去合口及目,炒出汗) 覆盆子(去蒂) 各一两 木鳖子(去壳) 三分

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前盐汤或茶酒任下。

【功用】治风顺气,补元阳,活血,壮筋骨,滑肌肤,明目,益寿驻颜,久服轻身。

【主治】男子久冷,元气虚惫,脚手疼痛。

30134 地仙丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】枸杞子 陈曲(炒) 甘菊 熟干地黄(焙) 桂(去粗皮) 各二两 肉苁蓉(切,酒浸一宿,焙干) 一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前酒、饮任意送下。

【功用】安神延年,乌髭黑发,令身体轻健,耳目聪明,宽膈进食,除寒热,调荣卫。

【主治】劳伤,头目昏眩。

30135 地仙丸

《圣济总录》卷一九八。为原书卷一八六“内养丸”之异名。见该条。

30136 地仙丹

【方源】方出《圣惠》卷四十一,名见《普济方》卷五十。

【组成】远志一升(去心) 白茯苓一斤

熟干地黄一斤 地骨皮一斤 麦门冬一斤半
(去心, 焙) 苣荬一斤(蒸, 晒干, 去皮)

【用法】上为末, 以枣肉为丸, 如梧桐子大。
每服四十丸, 以温酒送下, 晚食前再服。

【功用】令发黑, 延年, 久服貌如童子, 齿落重生, 行如奔马, 夜视有光。

【宜忌】忌生葱、大蒜、萝卜等。

30137 地仙丹

【方源】《朱氏集验方》卷一引南康刘立之方。

【组成】钱子地龙(炒, 去土) 五灵脂(去石) 天台乌药 白胶香(别研) 威灵仙(去芦, 洗) 木瓜(去瓤) 赤小豆(炒) 黑豆(生, 去皮) 天仙藤(洗) 淮乌(炮, 去皮) 五加皮(洗) 木鳖子(去壳油) 苍术(米泔水浸一宿, 削去皮, 锉, 炒) 椒红(去目并合者, 炒出汗, 盖盖地出汗取红) 各等分

【用法】上为细末, 酒糊为丸, 如梧桐子大。
每服七十丸, 空心盐汤、盐酒任意送下。

【主治】男子、妇人阳证脚气痛。

30138 地仙丹

《得效》卷八。为《易简》引陶隐居方(见《永乐大典》卷一一六二〇)“经进地仙丸”之异名。见该条。

30139 地仙丹

《普济方》卷二四一。为《医方大成》卷三引秘方“神翁地仙丹”之异名。见该条。

30140 地仙丹

【方源】《本草纲目》卷三十六引《保寿堂方》。

【异名】秘传地仙丹(《良朋汇集》卷三)。

【组成】天精草(春采枸杞叶) 长生草(夏采枸杞花) 枸杞子(秋采) 地骨皮(冬采枸杞根)

【用法】并阴干, 用无灰酒浸一夜, 晒露四十九昼夜, 取日精月华气, 待干为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。每早、晚各用一丸细嚼, 以隔夜百沸汤下。

【功用】常服除邪热, 明目, 轻身。

30141 地仙饮

【方源】《玉案》卷三。

【异名】地仙散(《不居集》下集卷一)。

【组成】地骨皮三钱 防风一钱五分 薄荷 甘草各一钱 乌梅肉八分

【用法】水煎服。

【功用】《不居集》: 退热。

【主治】潮热。

30142 地仙酒

【方源】《普济方》卷二六五引《十便良方》。

【组成】蔷薇根茎(锉碎)

【用法】上熟蒸, 晒干为末, 酒调。每服二钱, 一日三次。亦可浓煮汁为煎, 酒调服更佳。

【功用】延年益寿。

30143 地仙散

【方源】《本事》卷四。

【组成】地骨皮(洗, 去心) 防风(去钗股) 各一两 甘草(炙) 一分

【用法】上为细末。每服二钱, 水一盞, 加生姜三片, 竹叶七片, 煎至七分服。

【功用】解一切虚烦躁, 生津液。

【主治】①《本事》: 骨蒸肌热。②《得效》: 伤寒、伏暑后烦热不安。

【方论选录】《本事方释义》: 地骨皮气味苦甘寒, 入手太阴、足厥阴, 能治有汗之骨蒸; 防风气味辛甘微温, 入足太阳; 甘草气味甘平, 入足太阴。此治骨蒸内热, 阴虚烦躁, 津液欲伤者, 再以生姜之辛温而散, 竹叶之辛凉而清, 使内外和平, 则病魔焉有不去者乎。

30144 地仙散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】地骨皮 防风各一两 人参 甘草各半两

【用法】上为粗末。每服三钱, 水一盞, 加青蒿五七叶, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。无青蒿, 用竹叶五七片。

【功用】生津液。

【主治】心脏积热口干，或烦渴，颊赤，舌涩，及汗后余热。

30145 地仙散

【方源】《得效》卷九。

【组成】地骨皮二两 防风（去芦）一两 甘草半两 麦门冬一两（去心）

【用法】上锉散。每用三钱，水一盏，加生姜五片，煎服，不拘时候。

【功用】《校注妇人良方》：生津液而清肺火。

【主治】骨蒸肌热，一切虚劳烦躁。

30146 地仙散

【方源】《普济方》卷二三六引《经验方》。

【组成】北地骨皮 防风各一两 人参 鸡苏 甘草各二钱半

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，淡竹叶三五叶，同煎至七分，去滓温服。

【主治】骨蒸肌热，一切虚烦。

30147 地仙散

《不居集》下集卷一。为《玉案》卷三“地仙饮”之异名。见该条。

30148 地仙煎

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】地仙膏（《衡要》卷二）。

【组成】山芋末一斤 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）一升 生牛乳一升

【用法】上先研杏仁极细，入生牛乳绞取汁，次取山芋末相拌，入新瓷器，密封，安于釜中，重汤煮一日煎成。每服一匙，空心温酒调下。

【功用】①《圣济总录》：令人颜色悦泽，骨髓坚固，行及奔马。②《衡要》：益津液，润燥。

【主治】①《圣济总录》：腰膝疼痛及腹内一切冷病。②《衡要》：一切燥症。

【方论选录】《衡要》：山药补阴血，润皮毛，杏仁润肺液皮肤，牛乳生津血以润燥。

30149 地仙膏

《衡要》卷二。为《圣济总录》卷一八六“地仙煎”之异名。见该条。

30150 地芝丸

【方源】《东垣试效方》卷五。

【异名】万寿地芝丸（《御药院方》卷六）、地黄丸（《脉因证治》卷下）。

【组成】生地黄（焙干）四两 天门冬（去心）四两 枳壳（去瓤，麸炒）二两 甘菊花（去枝）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，食后茶清送下；温酒亦可。

【功用】①《御药院方》：和颜色，利血气，调百节，黑发坚齿，逐风散气，愈百疾。②《脉因证治》：大除风热。

【主治】目不能远视，能近视，或亦妨近视，及大疔风成癩。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阴药也。生地凉血生血，天冬润肺滋肾，枳壳宽肠去滞，甘菊降火除风。②《成方便读》：王海藏云：目能远视，责其有火，不能近视，责其无水，法当补肾。夫火之力刚，故能远照，水之力柔，故能近视。人之一身百病千端，亦不过一阴阳水火而已。然肾为主水之脏，肺为生水之源，故以生地大补肾水，天冬润养肺金，使之金水相生，则肝得所养；菊花得金水之精，专入肝经，能祛风于外；枳壳具苦降之性，单行气分，为破滞之需。庶凡风尽去而滞无留，则补药得力而病易愈耳。用茶者，欲火热之下降；用酒者，欲药力之上行也。

【备考】《此事难知》本方用法：如能饮食，茶清汤下；不能饮食，温酒下。

30151 地芝丸

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】二地各四两 二冬 枸杞 枣皮 各三两 当归一两 知母七钱 胆草二钱

【用法】蜜为丸服。

【主治】瞳人枯小。

30152 地耳散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】地踏菜

【用法】晒干为末，猪油调敷。

【主治】汤泡伤。

30153 地血散

【方源】《普济方》卷一五三引《活人书》。

【组成】茜根四钱 大豆二钱 黄药子甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱，新汲水调下。

【功用】《卫生宝鉴》：解一切毒。

【主治】①《普济方》引《活人书》：热毒深入吐血。②《卫生宝鉴》：一切吐血咯血，及诸热烦躁。

30154 地血散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】茜草 当归 白芍 乌梅 柴胡知母各一钱

【用法】加生姜三片，水煎，温服。

【主治】妇人心血间有热，饮食不减，起居如常，但发烦热。

30155 地芩饮

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】生地黄一两 黄芩二钱（酒炒）

【用法】上加青荷叶五钱，水煎去滓，微温服。

【主治】肝肾火升，耳窍中时流鲜血。

30156 地连丸

【方源】《履霜集》卷一。

【组成】生地黄 白藕（各取自然汁）一升牛乳一升

【用法】熬成膏，炒黄连末为丸，如绿豆大。每服三钱，白汤送下。

【功用】甘辛降火。

【主治】中消，善食易饥，自汗，大便硬，小便数而黄赤。

30157 地连散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】地骨皮 诃子

【用法】上用地骨皮煎汤洗，诃子连核烧存

性，为末干掺。

【主治】玉茎上生疮。

30158 地罗汤

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】元参 麦冬各二两 锦地罗 生甘草各一两 桔梗 贝母各五钱

【用法】水煎服。

【主治】肺病，胸膈作痛，咳嗽尤痛，手按气急。

30159 地金丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】生地黄十七斤（竹刀子切，木臼捣烂） 木香 菟丝子（酒浸一日，蒸过，别捣末） 牛膝（酒浸一宿，切，焙）各二两 陈曲一斤（捣末） 何首乌（用黑豆蒸一复时，晒干，木臼捣末） 杏仁（去皮尖双仁，研，纸压去油）各四两

以上七味和匀，入瓦罐内盛，令平，用新油单盖，复缚定，以白盐一两和灰泥固济，勿令透气，掘坑深广二尺，先用慢火烧热，方安药罐子在内，用糠火细细烧三昼夜，开验，药如鼓汁色即住，如未，更烧一日。取出研细，入后药：

鹿茸（酥涂炙） 五味子（焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 茯苓（去黑皮） 覆盆子（焙） 山茱萸 巴戟天（去心）各二两半（同用木臼捣为末）

【用法】上和作饼子，捣干山芋一斤半于盆内，表里接掩过。安在竹棚子上，用纸铺盖阴干，新瓦器中盛贮，旋取为细末，炼白蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，食后更一服，经一百日后，每日一次。其粘罐子药，用酒洗，别以瓶子贮，可每日一杯。

【功用】补益血脉，乌髭发，润肌肤。

【主治】风冷诸疾。

30160 地金汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生干地黄（焙） 生干藕节各二两

【用法】上锉细，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】鼻衄。

30161 地肤丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】地肤子（炒） 白蒺藜（炒去刺） 青箱子 茺蔚子 菟丝子（酒浸一宿，生用） 草决明 车前（酒浸，炒）各二两 大黄（炒） 蜚虫（去足） 细辛 黄连各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】青盲不见物。

30162 地肤汤

【方源】《外台》卷二十七引《小品方》。

【异名】地肤子汤（《千金》卷二十一）、地肤子散（《玉机微义》卷二十八引《济生》）。

【组成】地肤草三两 知母 猪苓（去皮） 瞿麦 黄芩 升麻 通草各二两 海藻一两 葵子一升 枳实二两（炙）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分为三服。

【主治】诸淋。下焦诸结热，小便赤黄，数起出少，大痛或便血；温病后余热，及霍乱后当风，取热过度，饮酒房劳，及步行冒热，冷饮逐热，热结下焦，及乳石热动关格，少腹坚，胞胀如斗大。

【加减】大小便皆闭者，加大黄三两；妇人房劳，肾中有热，小便难不利，腹满痛，脉沉细者，加猪肾一具。

【方论选录】《千金方衍义》：地肤子，《本经》主膀胱热，利小便，《千金》治热淋以之为君；佐以知母、黄芩、猪苓、瞿麦、通草、葵子、海藻等味，皆清热利窍之品；惟枳实、升麻，一破痰积，一分清浊，清浊分而气无阻滞，痰积破而津液宣通，乌有热结淋闭之患乎。肾中有热加猪肾者，用肾脏为逐热之内应也。

30163 地肤汤

《圣济总录》卷一五七。为《外台》卷三十三（注文）引《小品方》“地肤饮”之异名。见该条。

30164 地肤汤

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】地肤草 车前子各三两 知母 黄芩 赤茯苓 赤芍 枳实（炙） 升麻 通草 甘草（炙）各二两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，煎八分，去滓，空心温服。

【主治】妊娠患子淋。

30165 地肤饮

【方源】《外台》卷三十三（注文）引《小品方》。

【异名】地肤汤（《圣济总录》卷一五七）、地肤草汤（《医方考》卷六）。

【组成】地肤草三两

【用法】以水四升，煮取二升半，分三服，日三次，夜一次。

【主治】妊娠患子淋，小便数，出少，或热痛痠疼，及足肿。

【方论选录】《医方考》：子淋之原，本于湿热，地肤草能利膀胱，能疏风热，以之而治子淋，亦单剂之良方也。

30166 地肤饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】地肤子三两 知母（焙） 猪苓（去黑皮） 瞿麦（去梗） 黄芩（去黑心） 升麻 木通（锉）各二两 冬葵子一两半 海藻（洗去咸，焙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒淋，小便不通，秘涩疼痛。

30167 地肤酒

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】地肤子（即扫帚子）

【用法】上为末。每服三钱，黄酒冲，热服。微汗即愈。

【主治】疔毒，吹乳。

30168 地肤散

【方源】《外台》卷二十五引《古今录验》。

【组成】地肤五两 地榆根 黄芩各二两

【用法】上为散。每服方寸匕，水送下，一日三次。

【主治】血痢。

30169 地肤煎

【方源】方出《本草纲目》卷十六引《圣济总录》，名见《仙拈集》卷二。

【组成】落帚子。

【用法】同生姜研烂，热酒冲服，取汗即愈。

【主治】雷头风肿，不省人事。

30170 地柏散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】地柏半两（炙令黄色） 玄参三分 川升麻一两 牛蒡子一两（微炒） 犀角屑一两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温水调下。

【主治】瘰癧经数年不愈。

30171 地骨酒

《本草纲目》卷三十六引《圣济总录》。为《圣惠》卷九十五“菊花酒”之异名。见该条。

30172 地骨酒

【方源】方出《本草纲目》卷三十六引《简便方》，名见《仙拈集》卷二。

【组成】新地骨皮（洗净）

【用法】捣自然汁（无汁则以水煎汁），每服一盞，加酒少许，食前温服。

【主治】①《本草纲目》引《简便方》：小便出血。②《仙拈集》：血淋。

30173 地骨散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】地骨皮 黄芩 人参（去芦头） 黄耆（锉） 葳蕤 麦门冬（去心） 甘草（炙微赤，锉） 赤芍药各半两 柴胡一两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠烦躁，体热疼痛，口干食少。

30174 地骨散

《鸡峰》卷二十二。为《圣济总录》卷一三二“地骨皮散”之异名。见该条。

30175 地骨散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】地骨皮 生地黄 黑参 甘草 木通 黄芩各等分

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】心经受热，眼赤或生翳膜。

30176 地骨散

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】柴胡 地骨皮 桑白 枳壳 前胡 黄耆各七分五厘 茯苓 五加皮 人参 甘草 桂心 白芍各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】肺热，热在皮肤，日夕甚，喘咳洒淅。

30177 地骨膏

【方源】《不居集》上集卷十六。

【组成】鲜地黄十斤（捣汁和众药汁同煎） 当归身一斤 芍药半斤 枸杞半斤 天门冬 麦门冬各六两 川芎 丹皮各二两 莲肉四两 知母 地骨皮各三两 人参 甘草各一两

【用法】上将众药，用水二斗，煎一斗，去滓净，和生地黄汁同熬成膏服之。

【功用】滋阴降火，养血清热。

【主治】肺经之热，轻手乃得，微按全无，瞥瞥然见于皮毛上，喘咳，洒淅恶寒。

30178 地胆丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】地胆（去头足翅，糯米炒令米黄） 斑蝥（去头足翅，糯米炒令米黄） 牛黄（别研）各一分 芫青十枚（糯米炒令米黄，去头翅足） 生大豆黄三十枚

【用法】上四味为末，入牛黄再研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心茶送下。后再服寻常补益丸散。

【主治】瘰癧成疮有脓。

【宜忌】宜贴药后服。

30179 地胆散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】地胆 地锦各等分

【用法】上晒干为散。每用一钱匕，盏内用醋调，却用盏一只合定，慢火熬热，涂啮处。如已啮得三两日，即先以牡蛎末一钱，新汲水调下，然后涂此药。

【主治】一切虫啮。

30180 地胆膏

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷一一六。

【组成】生地胆十枚 细辛半分（末） 白芷半分（末）

【用法】上以地胆压取汁，和药末，以涂于瘰肉之上。取消为度。

【主治】鼻中瘰肉肿大，气息闭塞不通。

30181 地黄丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】干地黄丸（《圣济总录》卷一七五）

【组成】干地黄 大黄各一两六铢 茯苓十八铢 当归 柴胡 杏仁各半两

【用法】上为末，以蜜为丸，如麻子大。每服五丸，一日三次。

【功用】生肌肉。

【主治】小儿胃气不调，不嗜食。

【方论选录】《千金方衍义》：此专疗胃中气血不调，饮食不为肌肉。故专取地黄治伤中，逐血；当归治寒热，和脾；柴胡升少阳生气；杏仁下胸中逆气；大黄涤六腑实热；茯苓守五脏真气也。

30182 地黄丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷一八九。

【组成】干地黄 梔子 甘草各等分

【用法】上为末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。鼻有风热者，以葱涕为丸，如梧桐子大，每服五丸。

【主治】鼻出血不止。

【加减】鼻疼者，加豉一合。

30183 地黄丸

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】地黄煎丸（《圣济总录》卷五十八）、生地黄丸（《鸡峰》卷十九）。

【组成】生地黄汁 生栝楼根汁各二升 牛羊脂三升 白蜜四升 黄连一斤（为末）

【用法】上合煎令可丸，即丸如梧桐子大。每服五丸，饮送下，加至二十丸，一日二次。

【功用】除热，止渴，补养。

【主治】消渴面黄，手足黄，咽中干燥，短气，脉如连珠。

【方论选录】《千金方衍义》：脉如连珠，心脾结热可知，故用黄连专泻二经之积热，地黄滋血，栝楼根滋阴，牛羊脂、蜂蜜滋肠胃之枯燥也。

30184 地黄丸

【方源】《医方类聚》卷二三五引《周迥传授济急方论》。

【组成】生地黄（研取汁，留滓） 生姜（研取汁，留滓）各二斤 蒲黄 当归各四两

【用法】上于银器内，用慢火取地黄汁炒生姜滓，以生姜汁炒地黄滓，各令干，四味同焙干，为细末，醋煮面糊为丸，如弹子大。每服一丸，食前用当归酒化下。

【主治】产后腹痛，眼见黑花，或发狂如见鬼状，或胎衣不下，失音不语，心胸胀满，水谷不化，口干烦渴，寒热往来，口内生疮，咽喉肿痛，心中忪悸，夜不得睡，产后中风，角弓反张，面赤，牙关紧急，或崩中如豚肝，脐腹疼痛，烦躁悸惚，四肢肿满，及受胎不稳，唇口指甲青黑。

30185 地黄丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】干地黄丸（《圣济总录》卷十九）。

【组成】生干地黄一两 泽泻一两 山茱萸一两 萆薢一两（锉） 薯蓣一两 牛膝一两（去苗） 白术三分 天雄三分（炮裂，

去皮脐) 蛭螬三分(炙令微黄) 干漆三分(捣碎,炒令烟出) 狗脊三分(去毛) 车前子三分 茵芋三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】血风痹,走无定处,及诸风痹。

30186 地黄丸

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《圣济总录》卷一一四。

【组成】生地黄一两半 杏仁七枚(汤浸,去皮尖,令黑) 巴豆二枚(去皮心,炒令紫色) 印成盐一两颗 头发一鸡子大(烧灰)

【用法】上熟捣,炼蜡为丸,如枣核大。以针穿透药丸,纳耳中,每日二三次换之。

【主治】耳聋。

【备考】本方改为散剂,名“地黄散”(见《普济方》)。

30187 地黄丸

【方源】方出《圣惠》卷四十一,名见《圣济总录》卷一〇一。

【组成】生地黄三十斤(捣绞取汁) 杏仁三斤(汤浸,去皮尖双仁,点地黄汁研令如稀膏) 胡桃瓤一斤(研如膏) 大麻油一斤 丁香 木香 人参(去芦头) 牛膝(去苗) 白茯苓各三两 栈香 沉香各一两 安息香二两(锉如棋子,水煮烂用之) 没石子 诃黎勒皮各五两 柳枝皮三两(炙令干) 盐花三两 乌麻油一斤(点地黄汁研,以净布挹汁) 白松脂八两(炼成者) 龙脑一分 白蜜一升 酥一升

【用法】上除地黄汁及脂膏蜜外,共为末,然后都合一处,以诸药汁调和如稀膏,于三两口瓷瓶中盛,仍强半不得令满,坐瓶于炉中砖上,四面以火逼之,候瓶中药沸,以柳木篦搅之,时以匙抄,看堪丸乃止,候冷取出,以蜡纸密封头,勿泄药气。食后含一丸,如小弹子大,有津液即咽之,日可三丸,夜卧时含一丸。只十日觉灵,一百日变白为黑。

初服药,处净室一月。

【功用】①《圣惠》:补血,治气,益颜色,延年。②《圣济总录》:荣养鬓发,坚齿牙。

【主治】须发早白,牙齿摇动。

【宜忌】慎葱、萝卜、藕、蒜,常宜吃生姜。

30188 地黄丸

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】生干地黄一两 桂心半两 川大黄一两(锉碎,微炒) 赤芍药半两 赤茯苓半两 王不留行半两 甘草一分(生用)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服七丸,以熟水送下。

【功用】消疮疖。

【主治】小儿虚热,疮疖。

30189 地黄丸

《圣惠》卷九十八。为《金匱》卷下“肾气丸”之异名。见该条。

30190 地黄丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】生干地黄五两 川椒红二两(去目及闭口者,微炒去汗) 牛膝二两(去苗) 杏仁三两(汤浸,去皮尖双仁,童便浸三宿,麸炒微黄) 附子二两(炮裂,去皮脐) 鹿角胶二两(捣碎,炒令黄燥) 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心以温酒送下。

【功用】补骨髓,益颜色,充肌肤,耐寒暑;久服强志力,延年却老。

30191 地黄丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】生地黄(净洗,细切)一斗(以好酒一斗浸之,经宿即出。干即入酒中浸,以酒尽为度,候干) 干漆二两(捣碎,炒令烟出) 肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 蛇床子二两 菟丝子三两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 桂心二两 远志三两(去心) 人参三两(去芦头) 牛膝二

两(去苗) 石斛一两(去根, 锉) 补骨脂二两(微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心及晚食前以盐汤送下。

【功用】还精补髓, 驻颜色, 却老, 安脏腑, 暖下元, 壮腰。

【主治】虚损。

30192 地黄丸

【方源】《普济方》卷三十八引《指南方》。

【组成】地黄二两 王瓜一两(新瓦内用炭火烧灰存性, 研) 黄连半两

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 米饮送下。

【主治】脏毒下血。

30193 地黄丸

【方源】《医方类聚》卷一八三引《神巧万全方》。

【组成】生干地黄 白蒺藜(去刺)各三两 黄耆 菟丝子(酒浸一宿, 别杵)各二两 枳壳(去白, 麸炒令黄) 槟榔各一两半 乌蛇(酒浸, 去皮骨, 用肉, 炙黄)二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 食前以温粥饮送下。

【主治】痔疾生疮肿痛, 下血不止。

30194 地黄丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】补肾地黄丸(《幼幼新书》卷六引《集验方》)、补肝肾地黄丸(《奇效良方》卷六十四)、六味地黄丸(《正体类要》卷下)、六味丸(《校注妇人良方》卷二十四)。

【组成】熟地黄八钱 山萸肉 干山药各四钱 泽泻 牡丹皮 白茯苓(去皮)各三钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三丸, 空心温水化下。

【功用】滋补肝肾。

①《小儿药证直诀》: 补肾, 补肝。②《校注妇人良方》: 壮水制火。③《保婴撮要》: 滋肾水, 生肝木。④《东医宝鉴·内景

篇》: 专补肾水, 能生精补精, 滋阴。

【主治】肝肾阴虚, 头晕目眩, 耳聋耳鸣, 腰膝痠软, 遗精盗汗, 骨蒸潮热, 五心烦热, 失血失音, 消渴淋浊; 妇女肾虚, 血枯闭经; 小儿囟开不合, 五迟五软。

①《小儿药证直诀》: 肾怯失音, 囟开不合, 神不足, 目中白睛多, 面色皤白。②《校注妇人良方》: 肾虚发热作渴, 小便淋秘, 痰壅失音, 咳嗽吐血, 头目眩晕, 眼花耳聋, 咽喉燥痛, 口舌疮裂, 齿不坚固, 腰腿痠软, 五脏亏损, 自汗盗汗, 便尿诸血。③《万氏女科》: 女子冲任损伤, 及肾虚血枯, 血少血闭之症。④《寿世保元》: 小儿肝疳, 白膜遮睛, 肝经虚热, 血燥, 或风客淫气, 而患癰癧结核, 或四肢发搐, 眼目忽抽动, 痰涎上壅; 又治肾疳脑热, 消瘦, 手足如冰, 寒热往来, 滑泄肚胀, 口臭干渴, 齿齲溃烂, 爪黑而黯, 遍身、两耳生疮, 或耳内出水, 或发热, 自汗盗汗, 或小便淋闭, 咳嗽吐血, 或咽喉燥痛, 口舌疮裂, 或禀赋不足, 肢体瘦弱, 解颅鹤节, 五迟五软, 或畏明下窜, 或早近女色, 精血亏耗, 五脏齐损等肝肾诸虚不足之症。⑤《医方集解》: 肝肾不足, 真阴亏损, 精血枯竭, 憔悴羸弱, 腰痛足痠, 自汗盗汗, 水泛为痰, 发热咳嗽, 头晕目眩, 耳鸣耳聋, 遗精便血, 消渴淋沥, 失血失音, 舌燥喉痛, 虚火牙痛, 足跟作痛, 下部疮疡。

【宜忌】①《审视瑶函》: 忌萝卜。②《寿世保元》: 忌铁器, 忌三白。③《医方发挥》: 本方熟地滋腻滞脾, 有碍消化, 故脾虚食少及便溏者慎用。④《中医方剂选讲》: 阴盛阳衰, 手足厥冷, 感冒头痛, 高热, 寒热往来者不宜用。又南方夏季暑热湿气较盛时, 宜少服用。

【方论选录】①《医方考》: 肾非独水也, 命门之火并焉。肾不虚, 则水足以制火, 虚则火无所制, 而热证生矣, 名之曰阴虚火动。河间氏所谓肾虚则热是也。今人足心热, 阴股热, 腰脊痛, 率是此证。老人得之为顺, 少

年得之为逆,乃咳血之渐也。熟地黄、山茱萸、味厚者也,经曰:味厚为阴中之阴,故能滋少阴,补肾水;泽泻味甘咸寒,甘从湿化,咸从水化,寒从阴化,故能入水脏而泻水中之火;丹皮气寒味苦辛,寒能胜热,苦能入血,辛能生水,故能益少阴,平虚热;山药、茯苓,味甘者也,甘从土化,土能防水,故用之以制水脏之邪,且益脾胃而培万物之母也。②《红炉点雪》:六味丸,古人制以统治痰火诸证。痰火之作,始于水亏火炽金伤,绝其生化之源乃尔。观方中君地黄,佐山药、山茱,使以茯苓、牡丹皮、泽泻者,则主益水、清金、敦土之意可知矣。盖地黄一味,为补肾之专品,益水之主味,孰胜乎此?夫所谓益水者,即所以清金也。惟水足则火自平而金自清,有子令母实之义也。所谓清金者,即所以敦土也。惟金气清肃,则木有所畏而土自实,有子受母荫之义也。而山药者,则补脾之要品,以脾气实则能运化水谷之精微,输转肾脏而充精气,故有补土益水之功也。而其山茱、茯苓、丹皮,皆肾经之药,助地黄之能。其泽泻一味,虽曰接引诸品归肾,然方意实非此也。盖茯苓、泽泻,皆取其泻膀胱之邪。古入用补药,必兼泻邪,邪去则补药得力。一辟一阖,此乃玄妙。后世不知此理,专一于补,所以久服必致偏胜之害。③《审视瑶函》:肾者,水脏也。水衰则龙雷之火无畏而亢上,故王启玄曰:壮水之主,以制阳光,也即《经》所谓求其属而衰之。地黄味厚,为阴中之阴,专主补肾填精,故以为君药;山茱萸味酸归肝,乙癸同治之义,且肾主闭藏,而酸敛之性,正与之宜也;山药味甘归脾,安水之仇,故用二味为臣;丹皮亦入肝,其用主宣通,所以佐茱萸之涩也;茯苓亦入脾,其用主通利,所以佐山药之滞也,且色白属金,能培肺部,又有虚则补其母之义;至于泽泻有三功:一曰利小便以泄相火,二曰行地黄之滞,引诸药速达肾经,三曰有补有泻,诸药无畏恶增气之虞,故用之为使。此丸为益肾之圣药,而味者

薄其功缓,乃用药者有四失也:一则地黄非怀庆则力浅;一则地黄非自制则不工,且有犯铁之弊;一则疑地黄之滞而减之,则君主力弱;一则恶泽泻之渗而减之,则使力微。自蹈四失,而反咎药之无功,毋乃冤乎。④《古今名医方论》柯韵伯曰:肾虚不能藏精,坎宫之火无所附而妄行,下无以奉春生之令,上绝肺金之化源。地黄禀甘寒之性,制熟味更厚,是精不足者补之以味也,用以大滋肾阴,填精补髓,壮水之主。以泽泻为使,世或恶其泻肾而去之,不知一阴一阳者,天地之道,一开一阖者,动静之机。精者,属癸,阴水也,静而不走,为肾之体;溺者,属壬,阳水也,动而不居,为肾之用。是以肾主五液,若阴水不守,则真水不足,阳水不流,则邪水逆行。故君地黄以护封蛰之本,即佐泽泻以疏水道之滞也。然肾虚不补其母,不导其上源,亦无以固封蛰之用。山药凉补,以培癸水之上源。茯苓淡渗,以导壬水之上源,加茱萸之酸温,藉以收少阳之火,以滋厥阴之液。丹皮辛寒,以清少阴之火,还以奉少阳之气也。滋化源,奉生气,天癸居其所矣。壮水制火,特其一端耳。⑤《医方集解》:此足少阴、厥阴药也。熟地滋阴补肾,生血生精;山茱温肝逐风,涩精秘气;牡丹泻君相之伏火,凉血退蒸;山药清虚热于肺脾,补脾固肾;茯苓渗脾中湿热,而通肾交心;泽泻泻膀胱水邪,而聪耳明目。六经备治,而功专肾肝,寒燥不偏,而补兼气血。苟能常服,其功未易殚述也。⑥《医方论》:此方非但治肝肾不足,实三阴并治之剂。有熟地之膩补肾水,即有泽泻之宣泄肾浊以济之;有萸肉之温涩肝经,即有丹皮之清泻肝火以佐之;有山药收摄脾经,即有茯苓之淡渗脾湿以和之。药止六味,而大开大合,三阴并治,洵补方之正鹄也。⑦《实用方剂学》:本方是补阴的代表方剂,其组成特点,是补中寓泻,而以补阴为主。方中以熟地滋阴补肾,填精益髓而生血;山茱萸温补肝肾,收敛精气;山药健脾,兼固精缩尿;是本方的“三补”,用以治本。但以熟地补肾为

主,山茱萸的补肝和山药的补脾为辅,故熟地的用量是山茱萸和山药的一倍。由于肝肾阴虚,常可导致虚火上炎,故又以泽泻泻肾火,丹皮泻肝火,茯苓渗脾湿,是本方的“三泻”,用以治标。但本方是以补为主,所以这三种泻药的用量较轻。这样把补虚与祛邪结合起来,就形成甘淡平和,不温不燥,补而不滞的平补之剂。因此,本方滋补而非峻补,故虚不受补者亦可用。

【临证举例】①慢惊后不语 《小儿药证直诀》:东都王氏子,吐泻,诸医药下之,至虚,变慢惊。后又不语,诸医作失音治之。钱曰:既失音,开目不能饮食,又牙不紧,而口不紧也,诸医不能晓。钱以地黄丸补肾。治之半月而能言,一月而痊也。②血痢 《明医杂著》薛己注:祠部李宜散,患血痢,胸腹膨胀,大便欲去不去,肢体殊倦。余以为脾气虚弱,不能摄血归原,用补中益气汤加茯苓、半夏,治之渐愈。后因怒,前症复作,左关脉弦浮,按之微弱,此肝气虚不能藏血,用六味丸治之而愈。③糖尿病 《中华医学杂志》(1956;6:549):用六味地黄丸改汤剂治疗糖尿病2例。例1入院时昏迷,经胰岛素治疗后,神志清醒。通过饮食治疗,尿糖始终无法控制。经服六味地黄汤4天后,不仅多饮、多食、多尿及消瘦等临床症状好转,尿糖亦告消失,同时血糖亦逐渐恢复正常,体重日增。例2入院时极度消瘦,合并肺结核,咳嗽严重,影响睡眠,体力十分衰弱,自服六味地黄丸后,咳嗽很快停止,精神好转,多饮、多食、多尿等症状显著改善,夜间仅解小便一次,一周后体重增加4千克,尿糖已逐渐消失,惟血糖未恢复正常。④病理性室性早搏 《河南中医》(1987;3:24):以六味地黄汤加苦参,每日一剂,早、晚各服一次,治疗病理性室性早搏12例。12例经心脏听诊,其中7例经心电图复查,均无室早发现,且无自觉症状。⑤防治食管癌 《中医杂志》(1983;6:71):先后在湖北、河北两地食管癌高发人群中用六味地黄汤治疗食管

上皮重度增生患者92例,1年后,病理脱落细胞复查,癌变2例,稳定8例,好转和正常者82例,而在湖北当地作对照的未服药患者89例中,8个月后随访,癌变11例,稳定23例,好转55例。两者相较,差异显著($P<0.001$)。对湖北的57例患者作了5年以上的随访,并和相应的47例未服药患者作了对比观察,服药组的癌变率明显低于对照组($P<0.05$)。

【现代研究】①降血脂作用 《中成药研究》(1986;12:41):以本方片剂对实验性高血脂家兔进行研究,给药组的血清胆固醇和甘油三脂分别低于对照组,效果显著($P<0.01$),而对正常大鼠无明显影响;给药组肝、脾、肾上腺重量均比对照组明显下降($P<0.05$);解剖时肉眼观察,对照组肝脏等脏器都呈现较明显的脂肪沉积,而给药组色泽均较正常;对实验性高血脂大鼠HDL-C能明显增高($P<0.01$)。②降血糖作用:《国外医学·中医中药分册》(1986;4:11):用本方水提物口饲糖尿病大鼠,3天后能降低血糖、尿素氮和甘油三脂,5天后能降低血钾、提高血钠和血蛋白,降低尿中酮体水平。③防治肿瘤 《中医杂志》(1983;6:71):本方能抑制N-亚硝基氨基酸乙酯和氨基甲酸乙酯的诱癌作用,有助于荷瘤体的单核吞噬系统的吞噬功能,促进骨髓干细胞和淋巴组织增生,在一定程度上维持荷瘤小鼠甲状腺功能,降低蛋白分解代谢,从而对肿瘤的形成和荷瘤体的生存具有某些作用。④保护肾功能作用 《中成药研究》(1982;12:23):用本方对大鼠Masugi型肾炎的实验治疗,治疗组血清尿素明显低于对照组,而停药后尿素量又明显增高,说明本方能促进肾脏对体内代谢产物——尿素的排泄,从而保护肾功能。⑤对实验性肾虚动物牙周组织的影响 《中西医结合杂志》(1990;5:295):本方对牙周病阴虚模型动物的牙周组织有保护作用,具有修复牙周组织损害的作用,并且动

物体重和活力增加。在一定程度上可以纠正由甲状腺素引起的代谢紊乱,对由甲状腺素所致肾虚模型动物的牙组织有保护作用。⑥ 滋补强壮作用 《中成药研究》(1986; 4; 26); 本方与人参有类似的抗低温、抗疲劳、耐缺氧及促皮质激素样作用,对氢化考的松引起的小鼠肾上腺、胸腺萎缩有一定的对抗作用,并能抑制小鼠棉球肉芽肿增生。

【备考】《医方集解》本方用法:盐汤下;冬,酒下。改为汤剂,名“六味地黄汤”(见《景岳全书》)、“地黄汤”(见《证治宝鉴》)、“六味汤”(见《医学心悟》卷六)。

30195 地黄丸

【方源】《医方大成》卷十引钱氏方。

【组成】熟干地黄八钱(洗,焙干) 泽泻(洗)二钱 牡丹皮(去心) 牛膝 山茱萸 白茯苓(去心)各三钱 鹿茸(酥炙) 干山药各四钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。三岁以下每服二三丸,空心温水化下。

【主治】小儿禀赋不足,肾虚不生骨髓,头囟不合,并体瘦骨露,有如鹤膝者。

30196 地黄丸

【方源】《传家秘宝》卷中。

【异名】金髓煎丸(《圣济总录》卷一〇二)、明睛地黄丸(《局方》卷七续添诸局经验秘方)、明眼地黄丸(《得效》卷十六)、明目地黄丸(《原机启微·附录》)、经验地黄丸(《医方类聚》卷六十七引《经验秘方》)。

【组成】地黄二斤 杏仁半斤(去皮尖) 金钗石斛 牛膝 防风 枳壳各四两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一钱,空心用无灰豆淋酒送下,一日二次。

【功用】①《传家秘宝》:补肾气。②《局方》(续添诸局经验秘方):补肝益肾,驱风明目。

【主治】①《圣济总录》:肝虚血不足,肢

节拘急,筋脉挛痛及肾虚眼目昏暗。②《局方》(续添诸局经验秘方):男子妇人肝脏积热,肝虚目暗,膜入水轮,漏睛眵泪,眼见黑花,视物不明,混睛冷泪,翳膜遮障,及肾脏虚惫,肝受虚热,及远年日近暴热赤眼,风毒气眼。兼治干湿脚气,消中消渴,及诸风气等由肾气虚败者。

【宜忌】《局方》(续添诸局经验秘方):忌一切动风毒等物。

30197 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】熟干地黄(焙) 山茱萸 萆薢 当归(洗,焙) 续断 芎藭 黄耆(锉细) 五味子 狗脊(去毛)各半两 细辛(去苗叶)一分 白茯苓(去黑皮) 牛膝(去苗,酒浸,焙) 木瓜各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心盐汤送下。

【主治】肾气亏损,不能生肝,肝乏生气,遂多虚冷,肝肾脉俱弱者。

30198 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生地黄一斤 生姜二两 蜜三两(以上二味同捣取汁,和蜜,银器内煎成膏) 柴胡(去苗) 前胡(去芦头) 山梔子仁 百合 天门冬(去心,焙) 百部 桔梗(炒) 木通(锉) 甘草(炙,锉) 恶实(炒) 紫苏子各半两 人参 桂(去粗皮) 木香 芎藭 当归(切,焙) 射干各一分

【用法】上十七味为末,与前膏拌匀,涂酥为丸,如梧桐子大。每服三十丸,临卧生姜汤送下。

【主治】肺热,上热下冷,背膊疼痛,痰涕多。

30199 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】熟干地黄(焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 黄耆(锉) 桑寄生各一两 蔓荆实半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午、临卧各一次，温酒送下。

【主治】腰痛，筋脉拘急，强直不伸。

30200 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】生干地黄（焙） 菟丝子（酒浸一宿，晒，别捣） 白芷 牡荆实（去萼） 冬葵子（炒） 当归（切，焙） 芎藭 赤茯苓（去黑皮） 败酱 蒲黄各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎粟米饮送下，一日三次。

【主治】小便出血。

30201 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】生干地黄（切，焙） 黄耆（锉）各一两半 防风（去叉） 远志（去心） 栝楼子 茯神（去木） 黄芩（去黑心） 鹿茸（酥炙，去毛）各一两 人参一两一分 石韦（去毛） 当归（切，焙）各半两 赤芍药 甘草（炙） 蒲黄 戎盐（研）各三分 车前子 滑石各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】肾虚劳，膀胱结淋涩。

30202 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】生地黄汁一升 生姜汁五合 巨胜子 熟干地黄（焙） 旋覆花 干椹子各一两

【用法】上除二味汁外，共为末。先将前二汁用银器煎熟，看稀稠，将药末和丸，如弹子大。每夜饮酒半酣后，含化一丸。

【功用】乌髭发。

30203 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】熟干地黄二两 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服二十丸，食后、临卧新米泔饮送下。

【主治】眼病。一切内外障，翳膜遮蔽，时作疼痛赤涩。

30204 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】熟干地黄（焙）三分 黄耆（锉，焙） 山茱萸 桑根白皮各二两 黄连（去须） 羚羊角（屑） 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 代赭各一两 芎藭 天雄（炮裂，去皮脐）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】肾虚耳鸣。

30205 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】生地黄（切，焙）一两 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 独活（去芦头） 枸杞子 山芋各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心煎枣汤送下。

【主治】肾脏虚，食冷热物齿皆痛。

30206 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】生地黄五斤（粗者，取汁） 山芋四两 人参四两 枸杞根三两（粗大者） 白茯苓（去黑皮）四两

【用法】上先煎生地黄汁，余药为末，用好酒一斗，别煎至三升，去滓，入地黄汁同再煎，加白蜜一斤，酥少许，煎候可丸，即丸如小豆大。每服二十丸，酒送下，一日三次，渐加至五次。

【主治】齿动摇。

30207 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】生干地黄二两 地骨皮 麦门冬（去心，焙） 柴胡（去苗） 枳壳（去瓢，麸炒） 赤芍药 黄连（去须） 羚羊角（屑） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 百合 桔梗（炒）各一两一分 郁李仁（汤浸，

去皮,炒) 玄参 槟榔(锉) 茯神(去木)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,煎茯苓汤送下。

【主治】妇人血风劳气,头项筋急疼痛,咽喉干,脐腹痛,四肢无力,血脏经脉不调。

30208 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】熟干地黄(焙) 柏子仁(别研) 青橘皮(去白,炒) 诃黎勒皮(炮) 杜仲(去粗皮,锉,炒) 木香(炮) 白茯苓(去黑皮) 菖蒲 赤石脂 五加皮(锉) 菟丝子(酒浸,别捣) 秦艽(去苗土) 海浮石 艾叶(烧灰存性) 当归(切,炒) 牛角髓灰各一两

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,米饮或温酒送下。

【主治】室女禀气怯弱,血海虚损,月水不断。

30209 地黄丸

《圣济总录》卷一五三。为方出《千金》卷四,名见《千金翼》卷五“生地黄丸”之异名。见该条。

30210 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】熟干地黄不拘多少(切,焙)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,空心煎当归酒嚼下;温酒亦得。

【主治】妇人血衰不足,经候艰涩,致子宫不荣,妊娠多病,胎不长成。

30211 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】熟干地黄(新润者,焙)一两 泽兰(嫩者) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 山芋 石斛(沉水者) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙令透) 蛇床子(炒) 柏叶 艾(嫩者) 续断 卷柏(汤浸,洗) 五味子各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。

每服十五丸,空心、晚间生姜、艾汤送下。

【主治】妇人血气衰弱,子脏风冷,妊娠数堕。

30212 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】生干地黄(焙) 黄耆(锉) 人参 荆芥(去梗) 黄芩(去黑心) 甘草(炙) 梔子仁 干薄荷叶各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,温汤送下,不拘时候。

【主治】妊娠诸疮。

30213 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】生干地黄(焙) 当归(切,焙) 阿胶(炙令燥) 黄耆(锉)各一两 艾叶(炙)三分 生姜一分(切,炒)

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒或米饮送下,不拘时候。

【主治】产后血露不断。

30214 地黄丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】菖蒲四两 蜜半两 生地黄汁一中盏

【用法】上研为膏,蒲黄为丸,如弹子大。每服一丸,食后新水化下。

【主治】心经热。

30215 地黄丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】生地黄一两 人参 白芍药 当归各半两 甘草一分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。临卧浓煎淡竹叶汤嚼下一丸。常服养营卫,用人参汤下。

【功用】退热安神,养营卫。

【主治】心热太过,三焦不顺,夜卧不寐。

【宜忌】《普济方》:有虚热者,宜服此药。

30216 地黄丸

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】熟地黄 牛膝各四两 干山药 覆盆子 枸杞子各二两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，早晨空心酒送下。

【主治】眼昏涩。

30217 地黄丸

【方源】《本事》卷十引庞老方。

【组成】熟干地黄一两一分 山茱萸(连核用) 白茺萸 白芍药(锉，微炒) 代赭石(醋淬，煅五六次)各一两 干姜(炮) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 白僵蚕(去丝嘴，炒)各三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心酒送下，一日三次。

【主治】妇人月经不调，每行数日不止，兼有白带，渐渐瘦悴，饮食少味，累年无子。

【方论选录】《本事方释义》：熟地黄味甘苦微寒，入足少阴；山茱萸味酸微温，入足厥阴；白茺萸味辛平，入手足阳明、足太阴；干姜味辛温，入手足太阴；白芍药味酸微寒，入足厥阴；代赭石味甘平，入手少阴、足厥阴；厚朴味辛温，入足阳明、太阴；白僵蚕味辛咸平，入手足阳明，能引药入络。温酒送药，亦引入经络也。此妇入月经不调，兼有白带，渐渐瘦悴，饮食无味，累年无子者，急宜治之，使血气冲和，否则终身不孕育也。

30218 地黄丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】熟地黄(酒洒，九蒸九晒，焙干称)二两半 肉苁蓉(酒浸，水洗，焙干) 白茯苓(去皮) 泽泻各三两 桂枝(不见火) 附子(炮，去皮脐)各半两 五味子三两(拣) 黄耆(独茎者，蜜水涂炙)一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十至五十丸，空心酒送下，食前再服。

【主治】肾虚或时脚肿，兼治脾虚。

【方论选录】《本事方释义》：熟地黄味甘

苦微寒，入足少阴；肉苁蓉味咸温，入肾；茯苓味甘平淡渗，入胃；泽泻味咸微寒，入足太阳；五味子味酸咸温，入肾；桂枝味辛温，入足太阳；附子味辛咸热，入手足少阴；黄耆味甘微温，入手足太阴。此肾虚而兼脾弱，则湿留不去，或时脚肿，故补肾药中必佐以辛热之品，淡渗下行之味，兼理脾肺之药。以酒送之，斯气化流行，脾肾不致失司，病焉有不去耶。

【备考】本方方名，《普济方》引作“八味地黄丸”。

30219 地黄丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】熟干地黄(酒洒，九蒸九晒，焙干)一两 牛膝(洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙) 石斛(洗，去根)各三分 肉苁蓉(水洗，酒浸，切片，焙) 茵芋(去梗，锉，炒) 防风(去叉股) 川芎(洗) 五味子(拣) 桂心(不见火) 附子(炮，去皮脐) 薏苡仁(炒)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、食前酒吞下。

【功用】益气血，补肝肾，祛风湿，壮脚膝。

【方论选录】《本事方释义》：熟干地黄味甘苦微寒，入足少阴；牛膝味酸咸平，入足厥阴；石斛味甘平微苦咸，入足太阴、少阴；肉苁蓉味咸温，入足少阴；茵芋味苦辛温，入手足阳明；防风味辛甘微温，入足太阳；川芎味辛温，入足少阳、厥阴；五味子味酸咸微温，入足少阴；桂心味辛甘大热，入足厥阴；附子味辛咸大热，入手足少阴；薏苡仁味甘平淡渗，入手足太阴。此补虚祛邪之方也，虚而邪走下焦，不能即愈者，宜此缓治之。

30220 地黄丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】菊花丸(《普济方》卷七十一)。

【组成】熟干地黄(酒洗，九蒸九晒，焙干称)一两半 黄连一两(去须) 决明子一

两 没药(别研) 甘菊花 防风(去叉股) 羌活(去芦) 桂心(不见火) 光明朱砂(水飞)各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后熟水送下,一日三次。

【功用】益血镇肝明目。

【主治】①《本事》:勤读书伤肝,风热上凑,目昏疼痛。②《普济方》:肝虚血不足,肢节拘急,筋脉挛痛。及用力劳心,肝虚风热攻眼,赤肿羞明,渐生翳膜,兼肝肾风毒热气上冲目痛。

【方论选录】《本事方释义》:熟干地黄气味甘苦微寒,入足少阴;黄连气味苦寒,入手少阴;草决明子气味咸苦平,入足厥阴;没药气味苦平,入足阳明,能通瘀入络;甘菊花气味辛凉,入手太阴、足厥阴、少阳;防风气味辛甘微温,羌活气味辛甘平,皆入足太阳,乃引经之风药;桂心气味辛甘大热,入足厥阴;光明朱砂气味苦温,入手少阴。此肝虚风动,热气上升,致目不明,攻补皆在难投,故用一味壮水之药,佐以苦辛诸品,则升降得宜而奏功矣。

【备考】本方方名,《医学纲目》引作“熟地黄丸”、《丹溪心法附余》引作“黄连丸”。

30221 地黄丸

【方源】《本事》卷十。

【异名】赤芍地黄丸(《医学入门》卷八)、抑阴丸(《古今医鉴》卷十一)、断欲丸(《寿世保元》卷七)。

【组成】生干地黄二两 柴胡(去苗,净洗) 秦艽(净洗,去芦) 黄芩各半两 赤芍药一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,乌梅汤送下,一日三次,不拘时候。

【主治】尼师寡妇,独阴无阳,欲男子而不可得,以致恶风体倦,乍寒乍热,面赤心烦,或时自汗,厥阴脉弦长而上出鱼际。

【方论选录】《本事方释义》:生干地黄气味

甘苦微寒,入手足少阴、厥阴;柴胡气味辛甘平,入足少阳;秦艽气味苦平,入手足阳明,兼入肝胆;黄芩气味苦寒,入手太阴、少阳;赤芍药气味苦平,入足厥阴,能行血中之滞;乌梅汤送药,亦取其泄肝也。师尼寡妇,独阴无阳,情欲未遂,以致阴阳交争,乍寒乍热,将欲成劳者,非此不能治。

【备考】本方方名,《妇人良方》引作“生地黄丸”,《准绳·类方》引作“抑阴地黄丸”。

30222 地黄丸

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】熟干地黄五两 苁蓉(酒浸) 天门冬 石斛 当归 防风 白茯苓 川芎各三两 远志 黄耆 甘草(炙) 芍药各二两 人参 细辛 巴戟各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,荆芥汤送下。

【功用】常服令人终身不发背。

30223 地黄丸

《卫生家宝产科备要》卷三。为《普济方》卷三三七引《产育宝庆》“小地黄丸”之异名。见该条。

30224 地黄丸

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】熟地黄二两(酒蒸二次,焙) 生地黄二两 川当归一两半(去芦) 川牛膝一两 金钗石斛一两(切,酒浸,焙) 菟丝子一两(酒浸,炒,别研) 车前子一两 防风一两 枳壳(略洗,去瓢,麸炒)一两 杏仁(麸炒,先用汤泡过,去皮尖,别研)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心盐汤送下,一日一次。先服此方半月,次服羌活丸五日,然后用立应散搐鼻。

【功用】平补,壮气血,悦精神。

【主治】内外障及眼见飞花。

30225 地黄丸

【方源】《普济方》卷一五六引《十便良方》。

【组成】牛膝二斤(捣碎,用生地黄汁五升浸一宿,晒干,又浸,再晒干,炒,以地黄汁尽为度) 附子五两(炮裂,去皮) 干姜三两(炮制,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】腰脚疼痛。

30226 地黄丸

【方源】《普济方》卷三八一引《百一》。

【异名】九味地黄丸(《明医指掌》卷十)。

【组成】熟地黄(洗)五钱 赤茯苓 当归 山茱萸(蒸,去核) 川楝肉(焙) 牡丹皮 山药 川芎 使君子(煨)各二钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,空心温汤送下。

【主治】小儿肾疳。多由乳食不调,脏腑伏热所致。凡滋味入于脾而生虫,虫大则动,侵蚀脏腑,遂使小儿心闷。若上蚀腮龈,则口疮出血,齿色紫黑;下蚀肠胃,则下痢肛烂,湿痒生疮。或以走马命名,盖齿属肾,肾气虚才受邪热。疳气直奔上焦,初作口气,名曰臭口;次第齿黑,名曰崩砂;盛则龈烂,名曰溃槽;热血逆出,名曰宣露;甚者牙皆脱落,名曰腐根,其根即腐,齿不复生矣。外证脑热脱削,手足如冰,寒热时作,滑泄肚痛,口臭干渴,牙龈生疮,爪黑面黧,身疼疮疥。

【备考】《婴童百问》有泽泻,无川芎。

30227 地黄丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】熟干地黄二两(洗) 黄连一两半(去须,瓦上炒) 枳壳一两(去瓢,麸炒黄)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮送下。

【主治】脏毒。

30228 地黄丸

《活法机要》。为《保命集》卷下“黑地黄丸”之异名。见该条。

30229 地黄丸

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】补骨脂丸(《医学入门》卷七)。

【组成】大熟地黄(洗,焙) 当归 川芎 辣桂 菟丝子(酒浸三日,晒干,捣末) 大川椒(出汗) 故纸(炒) 白蒺藜(炒,杵去刺) 葫芦巴(炒) 杜仲(姜制,炒去丝) 白芷 石菖蒲各一分 磁石(火烧醋淬七次,研细,水飞)一分半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,以葱白温酒空心送下,晚饭后再服。

【主治】劳损耳聋。

【备考】《医统》有芍药三钱。

30230 地黄丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】熟地黄(九蒸)十两 菟丝子(淘洗,酒浸,蒸) 鹿角霜各五两 茯苓 柏子仁各三两 附子一两

【用法】上为末,鹿角胶煮酒为丸。每服百十丸,盐酒任下。

【主治】①《朱氏集验方》:白浊。②《得效》:白浊。心肾水火不济,或因酒色,遂至已甚,谓之土淫,盖脾有虚热而肾不足,故土邪干水。

30231 地黄丸

《朱氏集验方》卷七。为《普济方》卷一八八引《余居士选奇方》“地黄煎丸”之异名。见该条。

30232 地黄丸

【方源】《痘学真传》卷七引海藏方。

【组成】玄参五分 熟地 当归各七分 黄连 大黄(煨熟) 犀角 木贼 白蒺藜 沙苑蒺藜 蝉蜕 谷精草 羌活 防风各一钱 甘草 生地 木通各一钱五分

【用法】上为末,炼蜜为丸服。

【主治】痘后目疾生翳。

【方论选录】二地、当归、沙苑以养血滋肾，二黄、犀角、玄参、木通以清火润下，木贼、蒺藜以消翳，蝉退、谷精以轻扬，羌活疏风，甘草和药，凡痘后目疾生翳，皆从血虚火炎，养血清火治其本也，消翳、轻扬、疏风治其标也。

30233 地黄丸

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】黄芩 生地黄 决明子各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。用苦竹叶煎汤，加沙糖少许，同送下五七十丸，食后、临睡时服。

【主治】风热眼。

30234 地黄丸

【方源】《田氏保婴集》。

【组成】天门冬 麦门冬 玄参各三两 甘草 薄荷叶各一两

【用法】上为细末，熬生地黄汁为丸，如櫻桃大。每服一丸，温蜜水化下。

【主治】小儿疮疹，口疮，咽喉肿痛，牙疳臭烂。

30235 地黄丸

《普济方》卷二二六引《如宜方》。为《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一五〇）“人参固本丸”之异名。见该条。

30236 地黄丸

《脉因证治》卷四。为《东垣试效方》卷五“地芝丸”之异名。见该条。

30237 地黄丸

【方源】《医方类聚》卷二一七引《新效方》。

【组成】生地黄一斤（杵汁，以和生姜滓，晒干为末） 老生姜一斤（杵汁，以和地黄滓，晒干为末） 玄胡索 当归 川芎 白芍药各四两 人参 桃仁各一两半 木香 没药各一两 香附子半斤

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心生姜汤送下。

【主治】妇人经水不调，气痞血块，肚腹作

疼。

30238 地黄丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】地黄（酒蒸熟）一两六钱 槐角（炒） 黄柏（炒） 杜仲（炒） 白芷各一两 山药 山茱萸 独活各八钱 泽泻 牡丹 茯苓各六钱 黄芩一两半 白附子二钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下。

【功用】滋阴。

【主治】五痔。

【备考】方中黄芩，《直指·附遗》作黄耆。

30239 地黄丸

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】甘菊花 木贼半两 苍术 地黄 枸杞子各三钱 荆芥三钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后茶送下。

【功用】去风明目。

【备考】方中甘菊花用量原缺。

30240 地黄丸

【方源】《普济方》卷二三一引《经验良方》。

【组成】生干地黄 杏仁 甘草 贝母 麻黄（去节）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，噙化。

【功用】润肺出声。

【主治】劳嗽声不出。

30241 地黄丸

《普济方》卷五十。即《圣惠》卷四十一“干地黄丸”。见该条。

30242 地黄丸

《普济方》卷七十九。为《兰室秘藏》卷上“羌活退翳丸”之异名。见该条。

30243 地黄丸

《普济方》卷九十八。为原书同卷引《大全集》“四圣丹”之异名。见该条。

30244 地黄丸

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】地黄汁一斤 砒霜(研)半斤 蜡少许

【用法】先将地黄汁于瓷器中暖，候沸，加砒霜，不住手搅，煎令稠，再加蜡相和，为丸如绿豆大。每发时服一丸，并花水送下。未愈，发前更服一丸。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】忌热物。

30245 地黄丸

【方源】《普济方》卷二二八。

【组成】干地黄 茯苓 玄参各五两 泽泻 薯蓣 山茱萸 桂心 芍药各四两 附子三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，酒送下。以知为度。

【主治】男子妇人劳损虚羸，伤寒冷食少。

30246 地黄丸

【方源】《普济方》卷二三二。

【组成】熟干地黄(焙) 桂(去粗皮)各三分 防风(去芦) 乌头(炮裂，去皮脐) 芎藭 桃仁(汤浸，去皮尖，炒，别研) 牛膝(酒浸，切，焙) 石斛(去根) 干姜(炮裂)各五钱

【用法】上除桃仁外，共为末，与桃仁和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【主治】虚劳羸瘦，不思饮食，脏腑虚冷。

30247 地黄丸

《普济方》卷二八八。为《圣济总录》卷一三一“解毒地黄丸”之异名。见该条。

30248 地黄丸

《普济方》卷三四九。为《圣惠》卷八十“熟干地黄丸”之异名。见该条。

30249 地黄丸

《普济方》卷三六三。为《圣济总录》卷一六七“干地黄丸”之异名。见该条。

30250 地黄丸

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】生地黄(焙) 黄耆各半两 防风

远志(制) 茯神(去木) 鹿茸(酥炙去毛) 黄芩 瓜蒌各一两 人参 石苇(去毛) 当归各半两 赤芍药四钱

【用法】上为细末。每服二钱，食前米饮调下。

【主治】肾气虚惫，膀胱淋涩。

【备考】本方方名，据剂型当作“地黄散”。

30251 地黄丸

【方源】《育婴秘诀》卷上。

【组成】山药 山茱萸(酒浸，去核取肉) 熟地黄各三钱 独活 川续断(酒洗) 白茯苓 丹皮 泽泻各二钱

【用法】炼蜜为丸。空心温酒送下。

【功用】补肾。

【主治】小儿痢瘫在左者。此为肝血虚，筋无所养，故筋急拘挛强直。

【加减】手不利，加肉桂；足不利，加牛膝；手足俱不利，并加之，各二钱。

30252 地黄丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】人参二钱 怀熟地黄四钱 鹿茸(酒炙) 怀山药 茯苓 丹皮 山茱萸肉各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每用一丸，人参汤化下。

【主治】小儿肾元不充，颅解不合。

30253 地黄丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】熟地二两 当归 赤芍 石斛 藜本 夏枯草 楮实子 青箱子 蔓荆子 草决明 龙胆草 白芍 黄芩各一两 远志(去心) 黄耆各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次三十丸，食后服，一日三次。

【主治】黑风内障。初发时，头旋脑痛，眼涩生花，往来昏黑。

30254 地黄丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】熟地 茯苓各五钱 川芎 人参

各三钱 当归一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。茶送下。

【主治】拳毛倒睫。

30255 地黄丸

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄四两 山药 山茱萸 牡丹皮 茯苓各一两五钱 泽泻 香附（童便制）各一两

【用法】为丸服。

【主治】脾胃虚弱，食少，月经过期者。

30256 地黄丸

《疡医大全》卷十一。为《丹溪心法》卷四“生熟地黄丸”之异名。见该条。

30257 地黄丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】地骨皮 石斛 杏仁 防风 枳实各十二钱 地黄一斤 牛膝十二钱

【用法】上药面糊为丸。每服一钱，白汤送下，一日二次。

【主治】诸般内障。

30258 地黄丸

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地八两 当归 山药 枣皮 枸杞 巴戟 麦冬 菊花各四两 五味二两

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】瞳人散大。

30259 地黄丸

《饲鹤亭集方》。即《圣济总录》卷五十一“地黄饮”改为丸剂。见该条。

30260 地黄汁

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】生地黄汁

【用法】取一分，调发灰半钱，分作两服，食后少顷灌下。

【主治】小儿吐血、衄血。

30261 地黄汤

【方源】方出《外台》卷十七引《集验方》，名见《普济方》卷二三三。

【组成】生地黄五两 香豉五合（绵裹）人参二两 粟米五合 茯苓四两 知母四两

麦门冬（去心）三两 前胡三两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水八升，煮取二升七合，去滓，分四次服。

【主治】虚劳不得眠。

【宜忌】忌海藻、菰菜、茱萸、酢物。

30262 地黄汤

【方源】方出《外台》卷三十四引《集验方》，名见《普济方》卷三二七。

【组成】生地黄八两 芍药五两 香豉一升 葱白（切）一斤 生姜四两 甘草（炙）二两

【用法】上切。以水七升，煮取二升半，分三次服。不得重作。

【主治】女人伤于丈夫，四体沉重，噎吸头痛。

【宜忌】慎房事。

30263 地黄汤

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【异名】地黄煎（《圣济总录》卷三十）。

【组成】生地黄（切）一升 升麻 玄参 芍药 柴胡 麦门冬（去心）各八分 贝母六分 竹叶（切）一升 白蜜一合

【用法】上切。以水九升，煮取三升，绞去滓，纳蜜，再上火煎三沸。含咽其汁勿停，中间不妨食。

【主治】天行肺热咳嗽，喉有疮。

【宜忌】忌茱萸、热面、猪犬肉、油腻。

30264 地黄汤

【方源】《外台》卷三十三引《广济方》。

【异名】干地黄汤（《圣济总录》卷一五三）。

【组成】干地黄 牛膝 当归各八两 芍药 卷柏 防风各六两 桂心 牵牛子末各三分

【用法】上切。以水六升，煮取二升三合，去滓，分三服。又别和一分牵牛子末服，如人行四五里更进一服，以快利止。

【主治】妇人久无子断绪，少腹冷疼，气不

调。

【宜忌】忌热面、荞麦、炙肉、生葱、茺萸、蒜、粘食等物。

30265 地黄汤

【方源】方出《外台》卷三十四引《广济方》，名见《产宝诸方》。

【组成】生地黄汁一升 当归一两（末） 生姜汁三合 酒五合 童便二升

【用法】上和煎三四沸，去滓分服，一日令尽，间食服。

【主治】①《外台》卷三十四引《广济方》：产后心胸中烦闷，血气涩，肋下妨不能食。②《产宝诸方》：恶露不快。

30266 地黄汤

【方源】方出《圣惠》卷四，名见《圣济总录》卷四十三。

【组成】生地黄一两 葱白五茎 白茅根一两

【用法】上切细。以水一大盏半，煎至八分，去滓，食前分二次温服。

【主治】小肠实热，心中烦闷，小便出血。

30267 地黄汤

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】生地黄汤（《圣济总录》卷一二一）。

【组成】生地黄三两（切） 柳枝（锉）一合 黑豆二合

【用法】将豆及柳枝炒令黄，以无灰酒二盏沃之，即下地黄，更煎五六沸，去滓，热含冷吐。以愈为度。

【主治】齿龈出血。

30268 地黄汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】生地黄二两 苦竹茹一两 刺薊一两 黄芩三分 豉一合 川升麻三分 黄连三分（去须） 梔子仁半两

【用法】上药锉细和匀。每服半两，以水一大盏，煎至七分，去滓，分二次温服，如人行五里再服。

【主治】乳石发动，热盛吐血。

30269 地黄汤

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】生地黄汁一升 川升麻二两 白薇二两 梔子仁二两 黄连二两 黄柏一两 当归二两 赤芍药二两 射干二两 川大黄二两 甘草二两半（锉）

【用法】上锉细。以水一斗，煮至六升，去滓，下地黄汁，搅令微温，以故帛纳汤中，蘸搦于肿上。

【主治】发背成疮烂坏。

30270 地黄汤

【方源】方出《圣惠》卷七十五，名见《圣济总录》卷一五五。

【组成】淡竹茹一两半 生地黄一两半（切） 桂心半两（锉）

【用法】以水一大盏半，煎至一盏，去滓，不拘时候，稍热分为三服。

【主治】妊娠心痛，烦闷不食。

30271 地黄汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【异名】生地黄汤（《此事难知》）。

【组成】生地黄（自然汁）一升（或末二两重） 生藕（自然汁，如无，用小蓟汁）半升（再无，用小蓟末一两） 虻虫二十个（去足翅，麸炒黄） 桃仁半两 蓝叶一握（切，令干作末） 水蛭十个（麸炒） 干漆半两（炒烟尽） 大黄一两（锉如骰子大）

【用法】入水三升半，慢火熬及二升，放冷，分三服。投一服至半日许，血未下再投之。

【主治】年老及年少气虚弱者患伤寒蓄血。伤寒七八日以后，两手脉沉迟细微，肤冷，脐下满，或喜或妄，或狂躁，大便实而色黑，小便自利者。

【备考】方中干漆用量原缺，据《普济方》补。

30272 地黄汤

【方源】《普济方》卷八十一引《护命》。

【组成】防风 羌活 黄芩 黄连 地黄

当归 人参 茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞半，煎至一盞，食后温服。

【主治】眼昏涩，因病发而久不愈者。

30273 地黄汤

《伤寒总病论》卷三。为《外台》卷二引《小品方》“芍药地黄汤”之异名。见该条。

30274 地黄汤

《圣济总录》卷七。为《圣惠》卷十九“生地黄汁饮子”之异名。见该条。

30275 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】生地黄二两（切） 甘草（炙，锉） 大黄各半两 升麻三分 车前子一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，下朴消末一钱匕，搅匀。食后温服，每日三次。先针舌下两边出血。

【主治】伤寒后，心脾虚热，舌根肿塞，喉痹。

30276 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生干地黄（切，焙） 赤茯苓（去黑皮） 柴胡（去苗）各一两 射干 甘草（炙，锉） 麦门冬（去心，焙）各半两 半夏（汤洗七遍） 麻黄（去根节） 紫菀（去苗土） 五味子 黄芩（去黑心） 桑根白皮（锉）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大（拍碎），大枣二枚（擘破），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：肺痿咽燥。②《普济方》：咳嗽吐脓血，胸胁胀满短气，羸瘦不思饮食。

30277 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】生干地黄（焙）一两半 麦门冬（去心，焙） 羚羊角（镑） 槟榔（锉） 牛膝（切，焙） 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 丹参 枳壳（去瓢，麸炒） 赤茯苓（去黑皮）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾脏实热，心胸烦闷，腹胁胀急，腰重不利。

30278 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】熟干地黄（锉） 麦门冬（去心，焙）各二两 甘草（炙） 茯苓子（炒去角）各半两 干姜（炮）一两 桂（去粗皮） 续断各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，日三夜二服。

【主治】消肾。脚胫瘦细，小便数，或赤似血色，脏腑虚冷者。

30279 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】生干地黄（焙）三分 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 黄芩（去黑心） 赤茯苓（去黑皮） 升麻 龙胆（去土） 大黄（锉，炒） 黄连（去须） 桑根白皮（锉，炒）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。以利为度。

【主治】咳嗽，大便不通，壅热，口内生疮。

30280 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】生干地黄（焙） 地骨皮 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉） 大黄（湿纸裹煨，锉） 玄参 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 麦门冬（去心，焙） 藿香（取叶） 升麻 紫菀（去苗土） 桑根白皮（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】心肺壅热，上焦不利，吐血，胸中痞，口干。

30281 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】生地黄汁五合 黄明胶一两 生

藕汁三合(如无,即单用地黄汁)

【用法】上先以地黄汁微火煎,令胶消尽,倾瓷器内,下藕汁搅匀,分为二服,不拘时候。

【主治】乳石发脚气,热毒冲上,气急伤肺,或吐血唾血。

30282 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】熟干地黄(焙)一两一分 芍药 甘草(炙,锉) 麻黄(去根节)各半两 桂(去粗皮) 栝楼实 葛根(锉) 独活(去芦头) 防风(去叉)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风湿腰痛。

30283 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】生干地黄(焙) 柴胡(去苗)各一两 石膏二两 梔子仁三分 赤小豆(生)三两 木通(锉)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加竹叶十四片,同煎取六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心劳实热,口疮心烦,多笑少力,小便不利。

30284 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】熟干地黄二两 黄耆(锉) 桂(去粗皮) 甘草(炙) 当归(切,焙)各三两 芍药 黄精(焙干) 黄芩(去黑心)各一两 麦门冬(去心,焙)五两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜半分(拍碎),大枣两枚(去核),煎至六分,去滓,空腹温服,日午、夜卧再服。

【主治】虚劳少气,行动喘促,小便过多。

30285 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】生干地黄(焙)三两 甘草(炙) 白茯苓(去黑皮) 人参 当归(切,焙)各

二两 羊肉(去脂,切)三斤

【用法】上六味,前五味铢细。将羊肉用水二斗,煮取汁一斗,去羊肉入诸药,煮取七升,加葱白一把(切),大枣十四枚(擘破),再煮取六升,绞去滓,每温服一盞,不拘时候。

【主治】寒疝心腹痛,汗出厥冷。

30286 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】熟干地黄(切,焙) 人参 石韦(去毛)各一两 滑石三分 王不留行 冬葵子(炒) 车前子 桂(去粗皮) 甘遂(炒) 木通各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】劳淋结涩不通。

30287 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】生地黄(细切)二两半 竹茹 玄参 鸡苏苗各一两 赤茯苓(去黑皮) 升麻 麦门冬(去心,焙)各一两半

【用法】上除地黄外,为粗末,入地黄拌匀。每服三钱匕,水一盞,煎至五分,去滓,食后、临卧温服;如不能多服,细细含咽。

【主治】咽喉中生疮,唾血不下食。

30288 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】生地黄汁一合 射干 升麻 黄连(去须) 芒消 白薇 梔子仁 大黄各半两 甘草 当归各一分

【用法】上将九味铢碎,以水五升,煎至三升,去滓,下地黄汁,更煎三五沸,以故帛三片,浸药汁中,交替拓肿上,每日一二十次。再暖用即愈。

【主治】乳痈。

30289 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【异名】生地黄汤、黄耆汤(原书卷一八三)。

【组成】生地黄 芍药 升麻 木通 甘草（炙） 大黄（锉，微炒） 知母 人参 赤茯苓（去黑皮） 当归（焙）各一两 黄芩（去黑心）黄耆各一两半 小麦半升 栝楼根二两 前胡（去芦头）一两半

【用法】上咬咀，如麻豆。每服五钱匕，用水一盏半，入竹叶七片，煎至八分，去滓，空心温服，晚再服。以愈为度。

【主治】痈疽，虚热大渴。乳石发动。

【加减】如小便不利，除木通；大热，加人参。

30290 地黄汤

《圣济总录》卷一四四。为《千金》卷六“生地黄汤”之异名。见该条。

30291 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生干地黄（焙）二两 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 柏叶各一分半 艾叶半分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，加蒲黄一钱匕，空心、食前服。

【主治】冲任气虚，经血虚损，月水不断，绵绵不止。

30292 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生地黄（切，焙）五两 艾叶 黄芩（去黑心） 当归（切，焙）各二两 地榆四两 伏龙肝 柏叶 生姜（切，焙） 蒲黄各三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】妇人气血虚损，月水不断，绵绵不已。及妇人经血不止，颜色不定。

30293 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】地黄（锉，炒） 当归（切，焙） 黄耆（锉） 阿胶（炙令燥）各一两 艾叶（炒，焙）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】妇人血伤带下。

30294 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】熟干地黄 泽兰叶 白茯苓（去黑皮） 人参 五味子 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，炒） 禹余粮（火煨醋淬）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、日午、夜卧温服，一日三次。

【主治】妇人先有所脱血，或醉中房劳伤肝，致使月事不来，血枯燥干。

30295 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】熟干地黄四两 当归（切，焙） 艾叶各二两 芎藭 阿胶（炒令燥） 杜仲（去粗皮，锉，炒） 五加皮各三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠气血衰微，胞脏挟冷，数堕胎。

30296 地黄汤

《圣济总录》卷一五八。为《胎产救急方》引《杨氏产乳》（见《医方类聚》卷二二四）“胶艾汤”之异名。见该条。

30297 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】生干地黄（切，焙）一两 牛膝（去苗，锉） 芎藭 桂（去粗皮） 朴消（别研）各三分 当归（锉，炒） 蒲黄（别研）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒各半盏，同煎七分，去滓稍热服，连服三五次。

【主治】①《圣济总录》：妊娠五六月，子死腹中不出。②《普济方》：产后五六日，胎衣不出。

30298 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】芍药 甘草(炙)各一两 丹参一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，加地黄汁一合，蜜半合，生姜汁一合，更煎数沸，空腹温服。

【主治】产后脐腹疼，余血未尽，不进饮食。

30299 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】生地黄汁 竹沥各半升 独活(去芦头)一两半

【用法】将独活为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，加地黄汁、竹沥各一合，再煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，口面喎僻，语涩不利。

30300 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】熟干地黄(焙)一两一分 草薢 附子(炮裂，去皮脐)各三分 干漆(炒烟出) 麻黄(去根节) 细辛(去苗叶) 防风(去叉) 羌活(去芦头) 当归(切，焙)各一两 蜀椒(去目并闭口者，炒出汗)半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风偏枯。

30301 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】熟干地黄(焙) 附子(炮裂，去皮脐) 当归(切，焙)各一两 人参 柴胡(去苗) 白茯苓(去黑皮) 芍药各三分 肉苁蓉(切，酒洗，焙) 黄耆(锉)各一两 芍药三分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚热不解，烦倦无力，困痒。

30302 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】生地黄汁 桑根白皮汁各一合

【用法】上入蜜半合，同煎十余沸。每服二

分，一日三次。

【主治】小儿口疮。

30303 地黄汤

【方源】《医学纲目》卷三十七引《婴童妙诀》。

【组成】生地 赤芍药 当归 川芎各等分

【用法】上咬咀。水煎，去滓服。

【主治】小儿荣中热及肺痈，鼻衄生疮，一切丹毒。

【加减】如鼻衄，临熟加生蒲黄少许；生疮，加黄耆等分；丹毒，加防风等分。

【备考】本方方名，《保婴撮要》引作“地黄散”。

30304 地黄汤

《鸡峰》卷九。为《圣惠》卷二十七“地黄金粉散”之异名。见该条。

30305 地黄汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】生干地黄一两一分 芍药 牡丹皮各四分 玄参三分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】衄血。

【加减】伏热者，以犀角代玄参。

30306 地黄汤

【方源】《本事》卷五。

【组成】生干地黄二两半 桑白皮(洗净，蜜炙黄)一两 磁石(捣碎，水淘二三十次，去尽赤汁为度)二两 枳壳(去瓤，细切，麸炒黄) 羌活(去芦) 防风(去叉股) 黄芩(去皮) 木通(去粗皮) 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞半，煎至七分，去滓，一日二三次，不拘时候。

【主治】①《本事》：男子二十岁，因疮毒后肾经热，右耳听事不真，每心中不快则觉转重，虚鸣疼痛。②《医方类聚》引《经验良方》：耳内出脓。

【方论选录】《本事方释义》：生干地黄气味甘寒微苦，入手足少阴；桑白皮气味甘辛平，入手太阴；磁石气味甘温，入手足少阴；枳壳气味甘寒，入手足太阴；羌活气味甘辛甘平，入手足太阳；防风气味甘辛微温，入手足太阳；黄芩气味甘寒，入手足少阳、阳明；木通气味甘平，入手太阳，能泄丙丁之火；甘草气味甘平，入手足太阴。此因男子少壮发疮毒后，肾经留热，右耳听事不真，心中常怏怏不快，转觉重虚，耳鸣或疼痛，故以重镇之药，苦降之品，佐以辛散升腾，则升降和平，病自减矣。

30307 地黄汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】芎 归 白芍 熟地 参 苓 术 草 苍术 陈皮 香附 黄耆 麦冬 杜仲 黄芩 大枣

【功用】养胃。

【主治】妊娠六月，胎动不安。

30308 地黄汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】川芎 黄芩 赤芍 牡蛎 生地 牛膝 陈皮 车前子 甘草 黄耆 人参 滑石 归须 黄连 香附 蜂房 蒲黄（半生半炒）

【主治】产后血虚，为热所乘，小便出血。

【方论选录】补按：是方以清热为主。用黄连、黄芩之苦寒以清上中二焦之热；用滑石、车前之甘淡以清下焦沟渎之热；四物之苦温酸寒以凉血养血；人参、耆 草之甘温以益气除热；牡蛎、蒲黄之涩以止血；香附、陈皮之辛温苦以行气，兼治脾中之滞血，而蜂蜜之甘寒以滋肺生津，亦清热药中之一小补也。

30309 地黄汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】麦门冬（去心） 生地黄（干）各五两 人参 茯苓 芍药各三两 菱蕤四两 石膏六两 远志（去心）十两 甘草三两 白

术三两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盂半，煎七分，去滓，不拘时服。

【主治】脉实极。气衰血焦，发落，好怒，唇舌赤，甚则言语不快，色不泽，饮食不为肌肤。

30310 地黄汤

《女科百问》卷上。为《普济方》卷三一八引《圣惠》“小柴胡加地黄汤”之异名。见该条。

30311 地黄汤

【方源】《袖珍》卷三引《济生》。

【组成】生地黄（洗） 赤茯苓（去皮） 玄参（洗） 石菖蒲 人参（去芦） 黄耆（去芦） 远志（去心，甘草煮） 甘草（炙）各一两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盂，加生姜五片煎服，不拘时候。

【主治】肾劳实热，腹胀耳聋，常梦见大水。

30312 地黄汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】生地黄（洗，焙） 川芎各一两 半夏（制） 甘草（炙）各三分 南星（汤洗七次） 芍药 白芷 茯苓 北梗 前胡 知母 人参各半两

【用法】上锉。每服三钱匕，加生姜五片，乌梅一个，水煎服。

【主治】呕吐脓血。

30313 地黄汤

【方源】《朱氏集验方》卷一引刘立之《已效方》。

【组成】熟地黄四两 川当归二两 北芍药 川芎 川牛膝 三奈子各一两 杜仲（姜制）半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盂半，煎至八分，不拘时服。

【主治】穿心脚气。

30314 地黄汤

【方源】《普济方》卷三六〇引《傅氏方》。

【组成】赤芍三钱 当归二钱 桂心一钱

茯苓二钱 山药三钱 芷梢二钱 粉草三钱
生地黄三钱

【用法】上为末。每服半钱，生地黄汤调下。

【主治】初生婴儿吞恶血。

30315 地黄汤

《普济方》卷二十七。为《圣济总录》卷四十九“干地黄汤”之异名。见该条。

30316 地黄汤

《普济方》卷二十七。为《外台》卷十引《删繁方》“干地黄煎”之异名。见该条。

30317 地黄汤

《普济方》卷三十。为《圣惠》卷二十六“干地黄散”之异名。见该条。

30318 地黄汤

《普济方》卷三十二。为《圣济总录》卷五十三“干地黄汤”之异名。见该条。

30319 地黄汤

《普济方》卷三十五。即《圣济总录》卷四十七“干地黄汤”。见该条。

30320 地黄汤

【方源】《普济方》卷二二九。

【组成】生地黄汁半斤 蜜三合 青蒿汁三合

【用法】上药相和。温服一合，不拘时候，宜顿服之。

【主治】热劳咳嗽，四肢无力，不能饮食。

30321 地黄汤

《普济方》卷二三七。为《圣济总录》卷九十三“干地黄汤”之异名。见该条。

30322 地黄汤

《普济方》卷三四六。为《外台》卷三十四引《广济方》“生地黄汤”之异名。见该条。

30323 地黄汤

《普济方》卷三四八。为方出《外台》卷三十四引《广济方》，名见《圣惠》卷八十“荷叶散”之异名。见该条。

30324 地黄汤

《普济方》卷三五三。为《三因》卷十八“熟地黄汤”之异名。见该条。

30325 地黄汤

【方源】《普济方》卷三六一。

【异名】地黄茵陈汤(《幼幼发挥·附方》)。

【组成】赤芍药 川芎 当归 天花粉 猪苓 赤茯苓 泽泻 甘草 山茵陈各等分

【用法】上咬咀。加生地黄水煎，子母同服。

【主治】胎受母热毒，生下遍身面目俱黄，身热，大便秘，小便黄色，多啼不乳。

【备考】《片玉心书》有木通。

30326 地黄汤

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】黄芩 生地黄各等分(一方加赤芍药，甘草)

【用法】上咬咀。每服一大钱，水半盏，煎三分，去滓服。

【主治】小儿舌苔黄，出血，舌肿，舌裂，舌生芒刺，舌卷，舌黑，舌赤等诸舌病。

【备考】如舌干燥者，与调胃承气汤、人参白虎汤并服。

30327 地黄汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】生地 芍药 白术 黄柏各一钱 地榆五分

【用法】水煎，温服。

【主治】血痢疼痛。

30328 地黄汤

【方源】《准绳·类方》卷五。

【异名】地黄散(《景岳全书》卷五十六)。

【组成】干地黄 甘草(炙) 麻黄(去节)各一两

【用法】上咬咀。用酒三升，水七升，煎至四升，去滓，分作八服，每日二次，不拘时候。

【主治】中风四肢拘挛。

30329 地黄汤

《准绳·女科》卷四。为《普济方》卷一九〇引《经验良方》“地黄散”之异名。见该条。

30330 地黄汤

《准绳·女科》卷四。为《圣济总录》卷一五八“地黄酒”之异名。见该条。

30331 地黄汤

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】熟地 当归 防风 蝉蜕 羌活 元参 大黄 黄连 白蒺藜 沙苑蒺藜 犀角 炙甘草 谷精草 木贼草

【用法】上为末。羊肝煎汤调食。

【主治】小儿痘疮。

30332 地黄汤

《证治宝鉴》卷三。即《小儿药证直诀》卷下“地黄丸”改为汤剂。见该条。

30333 地黄汤

《法律》卷三。即《千金》卷八“地黄煎”。见该条。

30334 地黄汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【异名】凉血地黄汤（《胎产心法》卷上）。

【组成】生地三钱 紫菀 知母 白术各一钱 陈皮四分 麦冬二钱 当归二钱 天冬一钱 甘草四分 黄芩一钱半 犀角八分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠咳血。

【加减】喘，加瓜蒌仁一钱。

30335 地黄汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】白芍 生地黄 当归身 川芎各一钱 羌活 防风 柴胡 荆芥穗（炒黑）升麻（炒） 甘草各七分 黄芩（酒炒） 黄连（姜汁炒） 黄柏（酒炒） 藁本 蔓荆子各五分 红花 细辛各一分

【用法】水煎，空心服。

【功用】清热以清其源。

【主治】崩漏初止。

30336 地黄汤

【方源】《霉病新书》。

【组成】地黄 牙皂 木瓜 独活 当归 川芎 大黄 黄芩 黄连 甘草 土茯苓各十钱至十五钱。

【用法】以水八合，煮取四合服。若渴者，以水一升，煮取七合服。

【主治】杨梅疮。

【备考】方中自地黄至甘草用量原缺。

30337 地黄汤

《女科秘旨》卷四。为《兰室秘藏》卷中“凉血地黄汤”之异名。见该条。

30338 地黄汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地四钱 淮山药（炒） 杞子 茯苓各二钱 萸肉一钱五分 丝饼三钱

【主治】肾虚耳聋。

【加减】肾有火邪，去杞子、丝饼，加泽泻一钱五分，黄芩、知母各一钱。

30339 地黄饮

《医心方》卷三。即《外台》卷六引《广济方》“地黄饮子”。见该条。

30340 地黄饮

【方源】方出《圣惠》卷六，名见《圣济总录》卷六十八。

【异名】五汁汤（《普济方》一九〇）。

【组成】生藕汁二合 生地黄汁二合 刺薊根汁二合 牛蒡根汁二合 生蜜一合 生姜汁半合

【用法】上药汁调和令匀，每服一小盏，不拘时候温服。

【主治】肺壅热极，肺胀喘，吐血不止。

30341 地黄饮

【方源】《养老奉亲》。

【组成】生地黄半斤（研如水，取汁）

【用法】煎作膏。空心渐食之，每日一次。

【主治】老人咳嗽烦热，或唾血气急，不能食。

【备考】本方方名，据剂型当作“地黄膏”。

30342 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】生地黄汁二合 蜜二合

【用法】上搅匀，顿服。

【主治】伤寒鼻衄。

30343 地黄饮

《圣济总录》卷四十七。为原书卷二十九“生地黄饮”之异名。见该条。

30344 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【异名】地黄饮子(《宣明论》卷二)。

【组成】熟干地黄(焙) 巴戟天(去心) 山茱萸(炒) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 石斛(去根) 五味子(炒) 桂(去粗皮) 白茯苓(去黑皮) 各一两 麦门冬(去心,焙) 远志(去心) 菖蒲各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,大枣二枚(擘破),同煎七分,去滓,食前温服。

【主治】瘖非证。舌强不能言,足废不能用;及产后麻瘖。

①《圣济总录》:肾气虚厥,语声不出,足废不用。②《证治宝鉴》:中风肾虚者。③《胎产心法》:产后麻瘖。

【宜忌】《兰台轨范》:风气甚而有火多痰者忌服。

【方论选录】①《法律》:肾气厥,不至舌下,乃脏真之气不上荣于舌本耳。至其浊阴之气必横格于喉舌之间,吞咯维艰,昏迷特甚,又非如不言之证,可以缓调。方中所用附、桂、巴、苁,原为驱逐浊阴而设,用方者不可执己见而轻去之也。②《医方集解》:此手足少阴、太阴、足厥阴药也。熟地以滋根本之阴;巴戟、苁蓉、官桂、附子以返真元之火;石斛安脾而秘气;山茱温肝而固精;菖蒲、远志、茯苓补心而通肾脏;麦冬、五味保肺以滋水源,使水火相交,精气渐旺而风火自息矣。

【临证举例】①瘖《校注妇人良方》:一妇人忽然不语半年矣,诸药不应,两尺浮数,先用六味丸料加肉桂,数剂稍愈。乃以地黄饮子三十余剂而痊。②非《洄溪医案》:新郭沈又高续娶少艾,未免不节,忽患气喘,厥逆、语涩、神昏,手足不举。医者以中风法治之,病益甚。余诊之曰:此《内经》所谓非证也。少阴虚而精气不续,与大概偏中风、中风、痰厥、风厥等病绝不相类。刘河间所立地黄饮子,正为此而设,何医者反忌之耶?一剂而

喘逆定,神气清,声音出,四肢震动。三剂而病除八九、调以养精益气之品而愈。③神经衰弱《浙江中医杂志》(1982;3:125):沈某,男,45岁。由于思想长期紧张,致心悸不宁,头晕,腰痠,失眠,每晚需服安眠药。后病情加重,精神恍惚,记忆力衰退,耳鸣,心烦,畏冷,夜尿频清,面热,舌质红、苔薄,脉细弱稍数,此为肾阴亏虚,阴损及阳,阴阳失衡,心肾失交之症。处方:生熟地各15克 苁蓉15克 山萸肉 石斛 麦冬 巴戟天 柏子仁各10克 五味子8克 肉桂粉3克(吞) 制附子 炙远志 石菖蒲各5克 白茯苓30克 龙眼肉3枚。5剂后好转,加减续投,共50剂而愈。④风非(晚期梅毒脊髓痨)《新中医》(1985;6:16):用地黄饮子原方去姜、枣、薄荷,治疗晚期梅毒脊髓痨,均服7剂,复诊时大部分病者都见好转。西医对比,证明有效率80%以上。

【备考】本方改为丸剂,名“地黄丸”(见《饲鹤亭集方》)。《宣明论》地黄饮子加薄荷同煎,不拘时候服。

30345 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】地黄半斤(肥嫩者,洗,劈碎) 黄雌鸡一只(去皮毛肠胃,锉细)

【用法】用水一斗,煮至三升,去滓,一日内徐徐服尽。宜先焙大椎,次焙风府及手心,更灸后心、天窗百壮。

【主治】面目俱青,好向暗处眠卧,不欲见明,手异衣服,状如鬼神,望见黄花生者,此名鸡黄。

30346 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】生干地黄(焙)五两 王不留行 牡丹皮各二两 赤芍药 萆薢各四两 麦门冬(去心,焙) 续断 牛膝(切,焙) 阿胶(炙燥)各三两 蛭蟥(研)五枚

【用法】上除蛭蟥外,为粗末,以生地黄汁三升,赤马通汁三升,并蛭蟥同煎至三升半,

去滓，空心、食前分六次温服。

【主治】忽吐血一两口。

30347 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【异名】地黄煎（《直指》卷二十六）。

【组成】生地黄八两（研取汁） 鹿角胶一两（炙燥，碾为末）

【用法】上先以童便五合，于铜器中煎，次下地黄汁及胶末，搅令匀，煎令熔，十沸后，分作三次服。当止。

【主治】肺损吐血不止。

【备考】《直指》本方用法：加姜汁少许调下。

30348 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】生地黄汁 生麦门冬汁 蜜各二合 竹沥一合 石膏二两半（研） 人参 芎藭 黄芩（去黑心）各一两半 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各二两 麻黄（去根节）一两 甘草（炙，锉）一两半

【用法】上除地黄、麦门冬、竹沥、蜜外，并为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，下地黄等汁各半合，再煎一二沸，去滓，分二次服，空腹、食后各一次。

【主治】精极。脏腑俱损，遍身虚热，骨节烦疼。

30349 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】地黄汁一升 生姜汁一合

【用法】上并取自然汁相和，分作三服。每服煎一沸温服，自早至日中服尽。

【主治】①《圣济总录》：小便出血。②《直指》：骨蒸劳热，咯血。

30350 地黄饮

《圣济总录》卷一五二。为《千金》卷四“生地黄汤”之异名。见该条。

30351 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】生干地黄（焙） 人参 当归（切，焙） 桑寄生 芍药 赤茯苓（去黑皮） 桔

梗（锉，炒）各一两 桂（去粗皮） 钩藤（锉） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一枚（擘），煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】妊娠心腹痛，面青汗出，闷喘无力。

30352 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】生地黄汁 童便各半盞。

【用法】上药相和，煎七分温服，相次更煎服之。

【主治】产后血晕烦闷。

30353 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】生地黄（肥嫩者）半斤

【用法】上捣取自然汁。每服半盞，煎令沸服之。未效再服。

【主治】①《圣济总录》：产后血晕，心闷气绝。②《赤水玄珠》：衄血，吐血，经闭。

30354 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】生地黄汁二盞 当归（切，焙，捣末）二两 酒 生姜汁各半盞 童便一盞 人参（捣末）一两

【用法】上将四汁相和。每服用汁半盞，水半盞，入当归、人参末各半钱，同煎至七分，空心、日午、临卧温服。

【主治】产后血气不利，心胸烦闷，胁肋胀满。

30355 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】熟干地黄（焙） 当归（切，焙） 人参 白术 白茯苓（去黑皮） 乌药（锉） 沉香（锉） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】产后短气，呼吸促迫。

30356 地黄饮

《普济方》卷三四六。即《云岐子保命集》卷下“地黄散”。见该条。

30357 地黄饮

《普济方》卷三四六。为《圣济总录》卷一六〇“生地黄饮”之异名。见该条。

30358 地黄饮

《丹溪心法附余》卷十一。即《卫生宝鉴》卷十“地黄散”。见该条。

30359 地黄饮

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】生地 熟地 何首乌(生) 各三钱 当归二钱 丹皮 黑参 白蒺藜(炒去刺) 僵蚕(炒) 各一钱五分 红花 甘草(生) 各五分

【用法】水煎，早、晚服。

【主治】血风疮，血燥痒盛不眠。

【备考】方中丹皮，《医钞类编》作“丹参”。

30360 地黄饮

《医林纂要》卷四。为《简易方》引《家宝方》(见《医方类聚》卷一二五)“地黄饮子”之异名。见该条。

30361 地黄饮

《产孕集》卷上。为《普济方》卷三一二引《肘后方》“地黄酒”之异名。见该条。

30362 地黄饮

《丸散膏丹集成》。即《准绳·幼科》卷一“地黄饮子”。见该条。

30363 地黄面

《本事》卷七引崔元亮《海上方》。为《外台》卷七引《古今录验》“地黄博饴”之异名。见该条。

30364 地黄饼

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【异名】地黄饼子(《御药院方》卷九)。

【组成】地黄五斤

【用法】上净择去苗后，于甑内蒸，先铺布一重，以土一层密闭令熟，出晒干，如此经

三度，以生地黄汁二升洒之，却晒干，然后捣为饼子。含化。

【功用】治齿，生津液，乌髭鬓。

【主治】牙齿痛。

30365 地黄酒

【方源】《普济方》卷三一二引《肘后方》。

【异名】地黄饮(《产孕集》卷上)。

【组成】生地黄(洗、切、研)八两 酒三升

【用法】上共煎数沸，去滓。每次温服一盞，不拘时候。

【主治】跌打损伤，妊娠下血，腰腹疼痛。

①《普济方》引《肘后方》：倒仆筋蹠，不得舒展，及瘀血不散。马坠。②《千金》：妊娠下血不止。及落身后血。③《普济方》：妊娠腰痛、腹中痛。

【备考】《千金》注文云：姚大夫加黄雌鸡一头，治如食法；崔氏取鸡血和药中服。

30366 地黄酒

【方源】《千金》卷三。

【组成】地黄汁一升 好曲一斗 好米二升

【用法】上先以地黄汁渍曲令发，准家法酝之至熟，封七日，取清服之，常使酒气相接，勿令断绝。未产前一月，当预酿之，产讫，薛中服之。先服羊肉当归汤三剂，乃服之佳。

【主治】产后百病。

【宜忌】慎食蒜、生冷、酢、滑、猪、鸡、鱼。夏三月热不可合，春秋冬宜得合。

【方论选录】《千金方衍义》：方中地黄寒滞，得曲蘖发之，滋养血虚之良法。

【备考】《千金翼》本方用法：生地黄汁一石，煎取五斗，冷渍曲发，先淘米晒干，欲酿时，别煎地黄汁，渍米一宿，漉干炊酿，一如家酿法，拌饴亦以余汁，酸醅皆然，其押出地黄干滓，亦如米炊酿之，酒熟讫封七日押取。每次温服一盞，常令酒气相接。服之百日，肥白疾愈。

30367 地黄酒

【方源】《外台》卷十七引《崔氏方》。

【组成】生地黄（肥大者）一石二斗（捣，以生布绞取汁四斗四升） 杏仁一斗（去皮尖双仁，熬，捣末） 大麻子一斗（熬，捣末） 糯米一石（晒干） 上曲一斗五升（晒干，锉细）

【用法】上先以地黄汁四斗四升，浸曲候发，炊米二斗作饭，冷暖如人肌，酎曲汁中和之，候饭消，更炊米一斗作饭，酎如前法；又取杏仁、麻子末各一升二合半，和饭搅之酎曲汁中，待饭消，依前炊米饭一斗，以杏仁、麻子末各一升二合半，一如前法酎之。凡如此可八酎讫，待酒发定，封泥二七日，压取清。每温饮一升，渐加至二升，一日二次。

【功用】令人充悦能食，益气力，轻身明目，久服去万病，令人有子。

【主治】虚羸。

【宜忌】忌茺蓂。

30368 地黄酒

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】生干地黄一斤（细切） 白杨树皮半斤（锉） 生姜二两（碎切，炒熟） 大豆半斤（炒令熟）

【用法】上用绢袋盛，以清酒一斗，于瓷瓶中浸，密封，经七日开。每服一小盏，食前温服。

【主治】腰脚疼痛。

30369 地黄酒

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】生地黄汁半小盏 益母草汁半小盏

【用法】加酒一小盏相和，煎三五沸，分为三服，频频服之。

【主治】产后崩中，下血不止，心神烦乱。

30370 地黄酒

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】生地黄汁一升 生姜汁一合 清酒二升

【用法】先煎地黄汁三五沸，次入生姜汁并

酒，更煎三两沸。每温服一中盏，一日三次。先服紫汤，后服本方。

【功用】逐血调中。

【主治】产后血晕。

30371 地黄酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】肥地黄一斤（捣碎） 糯米五斗（熟炊） 面曲五斤（捣碎）

【用法】上三味相和，于盆中熟捣，纳于不津瓮中，密封，春、夏三七日，秋、冬五七日，日满启之。当中有一盏绿汁，是其精也，宜先酌饮之。余以生布绞取，置器中，任性饮之，续酿使其相接，不过三剂，发黑。若以新牛膝捣绞，取汁三升，用拌渍，则变白更急矣。

【功用】①《圣惠》：补益乌发。②《本草纲目》：补虚弱，壮筋骨，通血脉，治腹痛，变白发。

30372 地黄酒

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】生地黄一石（洗，切）

【用法】上捣取自然汁，绞去滓，用酒二斗和匀，同于瓷石器中，煎熟为度，瓷器盛贮。每温饮一盏，不拘时候。

【主治】骨髓虚冷痛。

30373 地黄酒

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】生地黄汁半升 酒一升 桃仁（去皮尖双仁，炒） 牡丹（去心） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上以后三味为细末，与前二味一处煎熟，去滓，每服温饮一盏，不拘时候。

【主治】伤损瘀血在腹。

30374 地黄酒

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】生地黄汁一升 酒一升 桃仁（去皮尖，别研膏）一两

【用法】上先将地黄汁并酒煎令沸，下桃仁膏，再煎数沸。每温服一盏，不拘时候。

【主治】倒仆蹴损筋脉。

【备考】本方方名,《普济方》引作“桃仁地黄酒”。

30375 地黄酒

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【异名】地黄汤(《准绳·女科》卷四)。

【组成】生地黄(以铜竹刀切,炒)半两 蒲黄(炒) 生姜(切,炒)各一分

【用法】上以无灰酒三盏,于银器内同煎至二盏,去滓,分三次温服,未下更服。

【主治】妊娠堕胎,胞衣不出。

30376 地黄酒

【方源】《本事》卷一。

【组成】熟干地黄(酒洒,九蒸九晒,焙干)四两 附子(炮,去皮脐) 茵芋(去梗,锉,炒用) 羌活(去芦) 防风(去叉股) 芍药各一两 石斛(洗,去根)二两 丹参二两半 牛蒡根二两半 牛膝(酒浸,水洗,焙) 杜仲(去皮,锉如豆,炒令黑) 桂枝(不见火)各一两半 大麻子(去皮)一升

【用法】上锉细,入绢袋盛,宽贮之,用无灰酒一斗五升,封渍七日。逾日空心、食前饮一盏。常醺勿令吐。

【主治】风在肝脾,语蹇脚弱,大便多秘。

30377 地黄酒

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】生地二两 黄柏 苦参 丹参 革薺 菊花 银花 丹皮 赤芍 当归 枸杞子 蔓荆子 赤茯苓各一两 秦艽 独活 威灵仙各五钱 桑枝一两五钱 乌梢蛇(去头尾)一具

【用法】上用好头生酒五十斤煮,退火七日用。

【功用】清湿热,祛风邪。

【主治】痹风。

30378 地黄酒

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】熟地八两 枸杞四两 首乌四两

(黑豆蒸) 米仁四两(炒) 当归三两 白檀香三钱(或沉香末一钱) 龙眼肉三两

【用法】陈酒三十斤,浸七日可服。饮完,滓捣碎再浸。临卧温服,随量饮之。如一升之量,只可饮二合,不可过。

【主治】虚证不睡。

30379 地黄散

【方源】《普济方》卷一八九引《肘后方》。

【组成】干地黄 龙脑薄荷各等分

【用法】上为细末。冷水调下。

【主治】鼻衄,及膈上盛热。

30380 地黄散

【方源】《外台》卷二十九引《深师方》。

【组成】干地黄十分 桂心 干姜 芍药 甘草(炙) 当归各二分 芍药五分

【用法】上为散。每服方寸匕,食前以酒送下,一日三次。

【功用】补绝复伤。

【主治】蹉跌。

30381 地黄散

【方源】方出《千金》卷二,名见《产孕集》卷上。

【组成】干地黄(捣末)

【用法】以三指撮,酒送下,不过三服。

【主治】漏胞,妊娠血下不止。

30382 地黄散

【方源】方出《千金》卷二,名见《圣济总录》卷一五四。

【异名】干姜地黄散(《张氏医通》卷十五)。

【组成】干地黄四两 干姜二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,酒送下,一日二三次。

【主治】妇人血少气寒,胎漏腹痛。

①《千金》:妊娠血下不止。②《圣济总录》:胎漏腹痛。③《鸡峰》:妇人血少气寒,面色青白。

30383 地黄散

【方源】方出《千金》卷六,名见《普济方》卷一八九。

【异名】生地黄饮。

【组成】生地黄八两 蒲黄一升 地骨皮五两 黄芩 芍药 生竹茹各三两

【用法】上㕮咀，以水八升，煮取二升七合，分三次温服。

【主治】劳热所致大便出血，及口鼻皆出血，血上涌，心胸气急。

30384 地黄散

【方源】方出《千金》卷十九。名见《圣济总录》卷五十三。

【组成】豉二升 地黄八斤

【用法】上蒸二次，晒干为散。每服二方寸匕，食后以酒一升送下，一日二次。

【主治】虚劳冷，骨节疼痛无力；亦治虚热。

30385 地黄散

【方源】《千金》卷十九。

【组成】生地黄三十斤

【用法】上切细晒干，又取生者三十斤，捣取汁渍之，令相得，出晒干，九复如是，为末。每服方寸匕，酒送下，勿令绝。

【功用】益气调中，补绝，令人嗜食，除热。

【方论选录】《千金方衍义》：《本经》言地黄治伤中，逐血痹。作汤以除寒热积聚，疗折跌绝筋，生者尤良。此用生者九晒九捣，并不经火，深得《本经》之奥。

30386 地黄散

【方源】方出《妇人良方》卷二十引《千金》，名见《普济方》卷三五二。

【组成】生干地黄一两 乌贼骨二两

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心温酒调下。

【主治】产后血瘕。

30387 地黄散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】生干地黄一两 黄芩一两 白芍药一两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两 伏龙肝二两

【用法】上为细散。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳吐血不止。

30388 地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄半两 赤芍药三分 柏叶一两 阿胶半两（杵碎，炒令黄燥） 当归半两 赤茯苓三分

【用法】上为细散。每服二钱，煎黄耆汤调下。

【主治】鼻衄日夜不止，面无颜色，昏闷。

30389 地黄散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷六十九。

【组成】生干地黄三两 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服二钱，食后以糯米粥饮调下。

【主治】舌上忽出血如簪孔者。

30390 地黄散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】生干地黄一两 犀角屑三分 赤芍药一两 蜀葵根三分（锉） 葵子半两 黄芩一两 甘草半两（生，锉） 当归三分（锉，微炒） 木通一两（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】乳石发动，小肠中热，下血淋涩，脐下疔痛。

30391 地黄散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】熟干地黄三分 当归三分（锉，微炒） 木香三分 白术三分 干漆三分（捣碎，炒令烟出） 桂心三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 槟榔三分

【用法】上为细散。每服一钱，食前醋汤调下。

【主治】妇人血气攻心痛，腹胁妨闷，不欲饮食。

30392 地黄散

《圣惠》卷七十三。为《千金》卷四“生地

黄汤”之异名。见该条。

30393 地黄散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】生干地黄半两 甜瓜子 蒲黄 桂心 赤芍药 川大黄(锉,微炒) 当归(锉,微炒) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)各一分

【用法】上为细散。每服用酒半合,生地黄汁半合相和,焙令温,调下半钱,不拘时候。

【主治】小儿落床,伤于肢节,青瘀疼痛。

30394 地黄散

【方源】方出《博济》卷三,名见《圣济总录》卷一二〇。

【组成】生干地黄十二分(好者,细切) 升麻一两(碎) 诃子二枚(研末) 白盐花半分 麻粩(末)四合(取打一遍者) 粟饭一大合 朱砂一两(细研,临烧时以沙牛粪汁调之,免飞上)

【用法】上拌匀,子一净沙瓶中盛,密封头,通身遍泥,阴干七八日,待泥干,入炉中坐之,瓶四畔以炭火围之,烧其炭,续续添尽七斤即住,其药以为黑灰,收之,并为细末。每日夜用之揩齿。欲用药时,以生姜一块如杏仁大烂嚼,须臾即吐却滓,以左手指揩三五遍,就湿指点药末,更揩十数遍,含汁不得吐,以两手取津涂髭发,待辛辣定,即细细咽之。若能空心用三遍,饭后更用之,见效即速矣。

【功用】驻颜,益齿,乌发。

【主治】①《博济》:兼治脚风、肠风。②《圣济总录》:肾虚齿痛。

30395 地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】地黄 麦门冬各二两 地骨皮 黄芩 茯神各一两 酸枣仁(生用) 白鲜皮 沙参半两 甘草(炙) 羚羊角屑各半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,

煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】胆热,神思不爽,昏闷如醉,多睡少起。

【备考】方中酸枣仁、白鲜皮用量原缺。

30396 地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】地黄二两 麦门冬(去心) 地骨皮 赤茯苓 石膏各二两 甘草(炙) 葛根各半两 梔子仁三十枚

【用法】上为粗散。每服三分,以水一中盏,加生姜半分,小麦与豆豉各五十粒,淡竹叶二七片,煎六分,温服。

【主治】心实热,或欲吐而不出,烦闷喘急,头痛。

30397 地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】地黄 黄耆 阿胶(麸炒焦) 贝母 桑白皮 蒲黄各一两 人参 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 甘草(生用) 赤芍药 当归(炒)各半两

【用法】上为散。每服一钱,以粥饮调下。

【主治】肺壅热,气逆吐血。

30398 地黄散

【方源】《中藏经·附录》引《湘山野录》。

【异名】西岳莲华峰神传齿药(《三因》卷十六)、陈希夷刷牙药(《御药院方》卷九)、西岳华峰方(《医统》卷六十四)、仙传齿药(《济阳纲目》卷一〇七)。

【组成】猪牙皂角 生姜 升麻 熟地黄 木律 旱莲 槐角子 细辛 荷叶(取心用) 青盐各等分

【用法】上药同烧煨,研末擦牙。

【功用】牢牙,乌髭发。

30399 地黄散

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】大黄(锉,炒,捣末)一两 龙脑(研)一钱

【用法】上为末。每服二钱匕，用生地黄汁调下。

【主治】伤寒吐血不止。

30400 地黄散

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】生地黄汁三升 蛤粉一斤 郁金（铍）二两 甘草（炙，铍）三两

【用法】上用地黄汁拌和下三味令匀。晒干为散。每服一钱匕，食后、临卧用新汲水调下，一日三次。

【主治】心经积热烦郁。

30401 地黄散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生干地黄（焙） 阿胶（炙令燥）各三两 蒲黄二两

【用法】上为散。每服二钱匕，温糯米饮调下，不拘时候。

【主治】衄血，血汗不止。

30402 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】生干地黄（焙） 大黄（铍，炒）朴消（研）各二两 没药（研）半两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后、临卧温水调下。

【主治】飞血赤脉，及血灌瞳人疼痛。

30403 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】生干地黄二两 地骨皮一两 升麻三分 牛膝（酒浸，切，焙）一两半 羌活（去芦头） 芎藭 藁本（去土） 细辛（去苗叶）各一两 胡桐泪半两（研）

【用法】上为散。先用温盐汤净漱口，次以药揩之，揩了更不漱，早起、临卧用之。

【主治】口齿宣露，蜜蚀肿痒。

30404 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】生干地黄二两 细辛（去苗叶）白芷 皂荚（不蛀者，去皮子）各一两

【用法】上同入瓶内，以纸泥固济，晒干，用炭火烧令烟尽，取出放冷，研令极细，次

加白僵蚕末一分，甘草末二钱，再研令匀。早晨或临卧以少许揩牙龈，良久以温水漱口。

【主治】牙龈宣露，痒疼血出。

30405 地黄散

《圣济总录》卷一二一。为《博济》卷三“揩牙乌髭地黄散”之异名。见该条。

30406 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】熟干地黄（焙） 当归（切，焙）羌活（去芦头） 独活（去芦头）各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】伤折为风冷所侵，皮肉不合，肿痛。

30407 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】熟干地黄（焙） 当归（切，焙）各三两 羌活（去芦头） 苦参各二两 续断四两

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】打扑伤损，筋骨疼痛。

30408 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】生干地黄（焙） 牛膝（酒浸，切，焙） 蒲黄（炒） 芎藭 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 刘寄奴 延胡索 芍药 乌头（炮裂，去皮脐） 蓬莪术（煨，铍）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血风，走注气冷，月候不调，四肢烦热，头面虚肿麻木。

30409 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生地黄八两 生姜五两

【用法】上各切，同炒干，为散。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】室女经络寒凝，月水不通，心烦腹满，腰脚急痛；及产后血气不和，血块时攻心腹痛不可忍。

30410 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】熟干地黄(洗,焙) 白芷 酸石榴皮(锉) 陈橘皮(去白,炒) 甘草(炙) 各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,温米饮调下,不拘时候。

【主治】室女月水不断,心烦气闷。

30411 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生干地黄一两(焙) 生姜(切作片) 四两 乌豆二合 当归(切) 一两

【用法】上同入银石器中,慢火炒令燥,共为散。每服二钱匕,温酒少许调下,空心、日午、卧时各一次。

【主治】室女血气不利,月水来即少腹刺痛。

30412 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】熟干地黄(焙) 干姜(炮) 赤石脂各二两

【用法】上为散。每服方寸匕,酒送下,一日二三次。

【主治】妊娠胎漏,下血不止。

30413 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】生干地黄(切,焙) 白芷 延胡索 白胶(炙燥) 赤芍药 桂(去粗皮) 白术 刘寄奴 龟甲(醋炙) 丹参 当归(切,焙) 各一两 荷叶二片

【用法】上为散。每服三钱匕,温酒调下,不拘时候。

【主治】产后下血过多,气虚血晕,冲心闷乱,不知人事。

30414 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】生干地黄(焙) 一两 熟干地黄(焙) 四两

【用法】上为散。每服三钱匕,温酒调下,温粥饮调亦得,一日三次。

【主治】产后血虚烦热,引饮不止。

30415 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】生地黄五斤 五加皮五两 牛膝(去苗) 半斤

【用法】上各锉细,先以酒浸地黄一宿后,九蒸九晒,同为散。每服二钱匕,空心温酒下;梗米粥调亦得。

【功用】治腰膝,补下元,壮筋骨。

30416 地黄散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】生干地黄(切,焙) 熟干地黄(切,焙) 当归(去芦头,切,焙) 各一分 黄连(去须) 一钱 木通一钱半 玄参半钱 甘草一钱半(锉,炒) 防风(去芦头,焙) 羌活 生犀末 蝉壳(去土) 木贼 谷精草 白蒺藜(去尖) 沙苑蒺藜各一钱 大黄(去皮取实者,锉,略炒) 一钱

【用法】上为细末。每服一字或半钱,煎羊肝汤食后调下,日三次,夜一次。

【主治】①《闫氏小儿方论》:大人、小儿心肝壅热,目赤肿痛,生赤脉,或白膜遮睛,甚则失明;及疮疹入眼。②《眼科阐微》:痘后翳膜遮睛。

【宜忌】忌口将息。

【方论选录】《眼科阐微》,此方凉血之药居多,邪热蕴于血分中者,用此清之。

30417 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】生干地黄一两 枣叶一握(焙干) 梔子仁 黄芩 陈橘皮(汤浸,去白) 各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水八分一盞,加葱白、盐、豉各少许,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿热病。

30418 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《吉氏家传》

【组成】干地黄 厚朴(姜汁拌炒) 干葛 人参 茯苓 藿香叶 黄耆(蜜炙) 白术(麸炒)各一分 丁香 诃子(炮用肉)各一钱

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，用苍术煮饭饮调下，并进四五服。

【主治】小儿脾胃气衰弱，霍乱吐泻，呕逆不食，烦躁迷闷。

30419 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《吉氏家传》。

【组成】绿豆粉 滑石各一两 生干地黄二两 甘草半两(炙)

【用法】上为末。每服二钱，小儿八岁以下每服半钱，新汲水调下，二服止。

【主治】小儿心脏、脾脏、肝脏积热，下传小肠，尿血。

【宜忌】忌热食、酸、咸。

30420 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《张氏家传》。

【组成】熟地黄(去土，洗) 当归 地骨皮(各洗) 枳壳(去瓢，麸炒) 柴胡 秦艽(各去芦) 知母 鳖甲(去黑皮尽，醋炙黄)各等分

【用法】上为末。每服一钱半，水一盞，加乌梅半个，煎七分，和梅热服。

【主治】小儿骨蒸体热，成劳倦。

30421 地黄散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】干地黄 升麻 青盐 芦荟 防风各等分

【用法】上锉细和匀。每用药一两，以水一大盞，酒一盞，同煎至一盞半，去滓，热含于齿动处良久，倦即吐之，以药含尽为度，一日二次。

【主治】牙浮动，饮冷热痛。

30422 地黄散

《本事》卷六。为《圣惠》卷六十八“法

炼石灰散”之异名。见该条。

30423 地黄散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】生干地黄一两 明胶半两(炒)

【用法】上为末。每服一二钱，温汤调下。

【主治】小儿舌上出血如针孔。

30424 地黄散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】桃仁 红花 牛膝 桂心 生地 白芷 蒲黄 赤芍 归尾 川芎 香附 甘草 丹皮 陈皮 干荷叶蒂

【主治】产后气血虚损，或胞络挟于风冷，或当风取凉，风冷乘虚与血相搏，血冷壅滞，恶露应下不下者。

【加减】七日后，去归尾、赤芍、桂心，加当归、瓜蒌根。

【方论选录】新产三日以外，七日之内，当以祛瘀为先，用药宜生新去旧，补中有行。是方，肉桂辛热，行恶血为君；桃仁、红花、蒲黄、归尾、赤芍、生地、川芎、丹皮、荷蒂行血祛瘀为臣；牛膝直引瘀血下行，性最迅速；陈皮、香附行气，气行则血不滞，补中有行，行中有补；四物汤入血分，得桂心、甘草甘温能生新血也。

30425 地黄散

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】黄柏二两 升麻三两 生地黄五两 蔷薇根皮四两(一方用芦根，无蔷薇根皮)

【用法】上咬咀。以水七升，煮取三升，去滓含之，稍冷吐却，更含至愈。

【主治】口疮。

30426 地黄散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】熟干地黄(洗，酒浸，焙) 橘皮(去白，锉，焙)各等分

【用法】上为末。每服一钱，粥饮调下。

【主治】产后血痛如刀刺。

30427 地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】生地黄一两半 防风 细辛 薄荷叶 地骨皮 藁本各一两 当归 茵草叶 荆芥穗各半两

【用法】上为粗末。每用四钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，微热漱口，冷即吐之，不拘时候。

【主治】风热攻注阳明，齿痛龈肿，或血出宣露。

30428 地黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

【用法】上焙干为末。每服二钱，蜜汤调下，一日三次，不拘时候。

【主治】衄血往来久不愈。

【备考】本方方名，《丹溪心法附余》引作“地黄饮”。改为膏剂，名“地黄膏”（见《不知医必要》）。

30429 地黄散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】生干地黄 当归（并略炒）各一两 生姜半两（细切如绳头大，新瓦炒令焦黑）

【用法】上为细末。每服二钱，姜酒调下。

【主治】产后恶物不尽，腹内疔痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地黄饮”。

30430 地黄散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】生地黄一两 芍药 土当归 甘草各半两

【用法】上为散。每服三钱，水一盞半煎，食后温服。

【主治】混睛外障，因毒风积热，白睛先赤而后痒痛，迎风有泪，闭涩难开，或时无事，不久又发，年深则睛变成碧色，满目如凝脂，横赤如丝。

30431 地黄散

【方源】《普济方》卷一九〇引《经验良方》。

【异名】地黄汤（《准绳·女科》卷四）。

【组成】生干地黄 龙脑薄荷各二两 甘草（生用）一两

【用法】上为末。每服一钱，食后新汲水调下。

【主治】经血妄行，及鼻衄不止。

30432 地黄散

《普济方》卷五十三。方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一四“地黄丸”改为散剂。见该条。

30433 地黄散

《普济方》卷一六二。即《圣惠》卷四十六“干地黄散”。见该条。

30434 地黄散

《普济方》卷二三〇。即《圣惠》卷二十九“生地黄散”。见该条。

30435 地黄散

【方源】《普济方》卷二三四。

【组成】熟地黄一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 防风三分（去芦头） 羌活三分 黄耆一两（锉） 白芍药 木通（锉） 桂心各三分 人参一两（去芦头）

【用法】上为末。每服用羊肾一对（切去脂膜），以水一大盞半，煎至一盞，去肾，入药末五钱，煎至六分，去滓，空心及晚食前分二次温服。

【主治】虚劳耳聋及虚鸣。

30436 地黄散

《普济方》卷二五七。即《圣济总录》卷三十一“干地黄汤”。见该条。

30437 地黄散

《普济方》卷三〇二。为《圣济总录》卷一三九“败弩筋散”之异名。见该条。

30438 地黄散

【方源】《普济方》卷三三〇。

【组成】地黄（锉，炒） 当归（切，焙） 黄耆（锉） 阿胶（炙令燥）各一两 艾叶（炒，焙）三分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】妇人血伤带下。

30439 地黄散

《普济方》卷三四七。即《圣惠》卷七十九“生干地黄散”。见该条。

30440 地黄散

《普济方》卷三五五。为《圣惠》卷七十八“熟干地黄散”之异名。见该条。

30441 地黄散

【方源】《永乐大典》卷一四九四七引《崔氏产蓐方》。

【组成】玄胡索(炒) 当归(酒浸) 蒲黄 京芎 干地黄(酒炒) 赤芍药 泽兰 天麻 地榆 蓬莪术 肉桂(不见火) 各一两 滑石二两

【用法】上为细末。每服一大钱，空心酒调下，食压之；若用炒姜酒或薄荷茶调下亦可。

【主治】妇人血气不顺，脚肿，骨节内痛不可忍者。

30442 地黄散

《保婴撮要》卷四。即《医学纲目》卷三十七引《婴童妙诀》“地黄汤”。见该条。

30443 地黄散

《保婴撮要》卷四。为《圣惠》卷八十四“生干地黄散”之异名。见该条。

30444 地黄散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】地龙一两 黄瓜一两

【用法】上为细末。每服二钱，用黄酒或茶清调下。

【主治】遍身黄肿。

30445 地黄散

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】红内消(去根)二钱 仙女乔(根药不拘) 赤芍 牡丹皮 黄连五钱 土生地黄汁

【用法】上为末。每服二钱，热茶水调下。

【主治】咽喉单双鹅疔。

30446 地黄散

《景岳全书》卷五十六。为《准绳·类方》卷五“地黄汤”之异名。见该条。

30447 地黄散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】生地黄 当归 熟地黄(焙干) 大黄各七钱 谷精草 黄连(酒炒) 白蒺藜(炒去刺) 木通 乌犀角(镑细末) 玄参 木贼草 羌活 炙甘草各五钱

【用法】上为细末。每服二钱，煮猪肝或羊肝汁，食远调下。

【主治】混睛障症。

30448 地黄散

【方源】《重楼玉钥》卷上。

【异名】内消散。

【组成】小生地二钱 京赤芍八分 苏薄荷六分 牡丹皮八分 牙桔梗八分 生甘草六分 净茜草(又名地苏木)一钱

【用法】上以灯心二十节，红内消一钱(即茜草藤，五月五日采取，阴干)为引，开水泡药蒸服。每次须与紫正散合用勿离。

【主治】喉风。

【加减】孕妇，去丹皮，加四物汤；热盛者，加连翘、犀角；头痛闭塞，加开关散；烦渴，加银锁匙；潮热者，加柴胡、黄芩；咳嗽，加麦冬、知母；大便秘结，小便赤涩者，加木通；数日不大便者，加元明粉；热壅肺闭致气喘促者，加麻黄五分，先滚去沫，再入药内同蒸；痰稠，加贝母；阴虚者，合四物汤。

30449 地黄粥

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】生地黄汁三合 生姜一两(取汁) 粳米三合

【用法】粳米煮粥，临熟下地黄、生姜汁，搅令匀，空心服。

【主治】初产腹中瘀血，及瘀血结痛，虚损无力。

30450 地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】生地黄粥(《圣济总录》卷一九〇)、生地粥(《病机沙篆》)。

【组成】生地黄汁三合 糯米三合

【用法】上煮糯米作粥，临熟下地黄汁，搅调令匀，空腹食之。

【主治】①《圣惠》：妊娠漏胎，胞干胎死。
②《饮膳正要》：虚劳瘦弱，骨蒸，寒热往来，咳嗽唾血。

30451 地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】生地黄汁三合 粳米一合 好酥半两

【用法】以水一大盏，先煮米欲熟，加地黄汁，次下酥，候粥熟，温食之。

【主治】骨蒸劳瘦，日晚寒热，咳嗽唾血。

30452 地黄粥

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】肥好地黄四两

【用法】取汁去滓，作粥，候粥半熟，即以绵裹椒一百粒，生姜一片投粥中，候熟出之，再以羊肾一具（去脂膜），细切如韭叶大，入粥中同煮熟，加盐适量食之。

【功用】补虚。

【主治】脚气。

30453 地黄粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】生地黄汁二合 粟米一合 粳米一合 诃黎勒（炮，去核，为末）半两 盐花少许

【用法】以水三升，先煮二米将熟，次入诃黎勒末、地黄汁、盐花搅匀，煮令稀稠得所，分二次服。

【主治】妇人血气不调。

30454 地黄粥

【方源】《庸仙活人方》。

【组成】地黄（切）二合。

【用法】候汤沸，与米同入罐中煮之，候熟，以酥二合，蜜一合，同炒香入内，再煮熟食之。

【功用】①《庸仙活人方》：和血生精。②《遵生八笺》：滋阴润肺。

【主治】①《医统》：老人血燥，大便秘结。

②《红炉点雪》：吐血。

30455 地黄粥

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】生地不拘多少。

【用法】上捣自然汁，浸粳米渗透，晒极干，再浸再晒三次。每用瓷器煎汤一升令沸，入前米一合熬成稀粥，空腹服。

【功用】降心火，凉肝血。

【主治】血热入肝，睡起目赤肿，良久无事者。

30456 地黄煎

【方源】《千金》卷八。

【组成】生地黄汁二升 生姜汁一升 枸杞根汁三升 荆沥 竹沥各五升 酥三升 入参 天门冬各八两 茯苓六两 梔子仁 大黄各四两

【用法】后五味为散。先煎地黄等汁成煎，次纳散药搅调。每服一匕，一日二次。渐加至三匕，觉利减之。

【功用】①《千金》：冷补。②《法律》：补虚，清热，润燥，涤痰除风，开通瘀壅。

【主治】风热心烦闷，及脾胃间热，不下食。

【方论选录】《千金方衍义》：地黄煎用杞根、天冬而兼地黄、乳酥，佐二沥以润血燥，梔子、大黄以泄烦热，人参、茯苓以助祛邪，姜汁以辟痰涎之滞也。

【备考】本方方名，《法律》引作“地黄汤”。

30457 地黄煎

【方源】《千金》卷十一。

【组成】生地黄 淡竹叶 生姜 车前草 干蓝各（切）一升 丹参 玄参各四两 茯苓二两 石膏五两 赤蜜一升

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升，去滓停冷，下蜜更煎三两沸，分三次服。

【主治】邪热伤肝，好生悲怒，所作不定，自惊恐。

【方论选录】《千金方衍义》：地黄滋肝肾真

阴,干蓝引领淡竹、车前等味降泄诸经游火,又须生姜、赤蜜辛甘滋养肺气,不使虚阳留宿于上。然蜜有赤白之分,白者补而赤者泻,两不移易之定法。

30458 地黄煎

【方源】《千金》卷十一。

【异名】生地黄汤(《圣济总录》卷九十二)。

【组成】生地黄汁三升 生葛汁 生玄参汁各一升 大黄 升麻各二两 梔子仁 麻黄 犀角各三两 石膏五两 芍药四两

【用法】上取咀。以水七升,煮七物,取二升,去滓,下地黄汁煎一两沸,次下葛汁等煎取三升,分三次服,每日二次。

【主治】筋实极,手足爪甲或青、或黄、或黑乌黯,四肢筋急烦满。

【方论选录】《千金方衍义》:筋极而见手足爪甲青黑,颇有似乎阴寒之证,然有烦满而无厥逆,洵有瘀热无疑,故于解利药中,得麻黄、升麻外通经气之结,得地黄、大黄破蓄血之满也。

30459 地黄煎

【方源】《千金》卷十六。

【组成】地黄汁四升三合 茯神 知母 萎蕤各四两 栝楼根五两 竹沥三合(一方用竹叶) 生姜汁 白蜜 生地骨皮(切)各二升 石膏八两 生麦门冬汁一升

【用法】上取咀。以水一斗二升,先煮诸药,取汁三升,去滓,下竹沥、地黄、麦门冬汁,微火煎四五沸,下蜜、生姜汁,微火煎取六升。初服四合,日三夜一,渐加至六七合。四月五月作散服之。

【主治】①《千金》积热。②《千金方衍义》:肾气不能上蒸于肺,肺胃枯槁不能滋其化源,而致烦渴便难。

【方论选录】①《法律》:按此方生津凉血,制火彻热,兼擅其长,再加入参,乃治虚热之圣方也。②《千金方衍义》:方中用凉润诸味润血生津,单取生姜之辛以开结滞之气。

30460 地黄煎

《千金》卷二十二。为《外台》卷三十一引《小品方》“单地黄煎”之异名。见该条。

30461 地黄煎

【方源】《普济方》卷十五引《千金》。

【异名】地黄煎丸(《圣济总录》卷九十二)、地黄蒸丸(《医学从众录》卷一)。

【组成】地黄(生,取汁)六升 天门冬(生,取汁)三升 醇酒一升 生姜(取汁)白蜜 鹿髓 牛膝 大枣(煮,去皮,研成膏)各二合 石斛(去根) 黄耆(锉)各一两 茯神(去木)一两半 枳壳(炒,去瓢) 芎藭各三钱 甘草一两(已上六味并捣为末)

【用法】上先将地黄、天门冬、酒三物,慢火煎减半;次下姜汁、鹿髓,再煎减半;次下枣膏、蜜、煎如稠糖,候小冷,纳石斛等六味药末于铜器中,重汤上熬,勿住手搅,候可丸,即取出丸如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前温酒送下,一日三次。煎药须用银石等器。

【主治】足厥阴经有余,筋实极,足下满痛,四肢筋急。

30462 地黄煎

【方源】《外台》卷三十一引《广济方》。

【组成】生地黄汁二升 甘草三两(炙,末) 豉心一升 葱白(切)一升 牛酥半斤 藕汁二升 白蜜一升

【用法】以小便六升煮葱、豉等,取二升,绞去滓,次下地黄、藕汁,更煎取三五沸,下酥、蜜,搅勿住手,候似稀汤,以器贮之。每服一匙,渐至三匙。桑枝熬煎汤调和服之尤妙;桃仁汤亦良。

【主治】妇人丈夫血气劳,骨热,日渐瘦悴。

30463 地黄煎

【方源】《外台》卷三十一引《近效方》。

【组成】生地黄汁二升 麦门冬汁五升 生姜汁五合 紫菀三两 贝母 款冬花 甘草(炙)各三两(一方有人参三两)

【用法】上切。以水七升，煮取三大升，去滓，却入锅中，下地黄汁、麦门冬、姜汁等，煎三十沸，下蜜一升，煎如饴，盛不津器中放冷。含如枣许，渐增之。

【功用】补心肺，令髭发不白。

【主治】肺气咳嗽。

30464 地黄煎

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】生地黄汁 藕汁各一升 生姜汁二合 蜜四合

【用法】上相和，煎如稀饴，每服一匙，空心温酒调下。

【主治】产后虚劳百病，血气不调，腹肚结痛，血晕昏愆，心烦躁，不多下食。

30465 地黄煎

【方源】《颅凶经》卷上。

【组成】生地黄汁五两 酥 生姜汁 蜜各一两 鹿角胶半两

【用法】先将地黄汁安锅内，慢火煎，手不住搅，约五六沸，下酥，又五六沸，下蜜，次下胶，又下姜汁，慢火煎，候如稀饴即住火。每食后两度共与一匙头。

【主治】小儿疳劳，肺气热，咳嗽，四肢渐瘦，心肺干。

【宜忌】忌毒物。

【备考】本方方名，《准绳·幼科》引作“干地黄煎”。

30466 地黄煎

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】生地黄汁半升 牛蒡根汁三合 蜜三合 黄丹一两 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，细研） 铅霜一分（研） 太阴玄精半两（研）

【用法】上合和令匀，入银器内重汤煮，用槐枝子不住手搅，看色紫即倾入瓷盒中盛。每服小弹子大，含咽津，不拘时候。

【主治】热病，热毒攻咽喉肿痛，连舌根痛。

30467 地黄煎

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生地黄汁三升 防风二两（去芦头） 黄耆二两（锉） 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 当归二两 丹参二两 桑寄生二两 狗脊二两 牛膝二两 羊髓一升

【用法】上为细散，先煎地黄汁，减一升，纳前药末入汁中，次入羊髓，搅令匀，慢火煎如饴，收瓷盒中。每服半匙，食前以温酒调下。

【功用】强骨髓，令人充健。

【主治】骨极。

30468 地黄煎

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】生地黄煎（《普济方》卷三十三）。

【组成】生地黄一斤（捣绞取汁） 牛酥一斤 白蜜二斤

【用法】上先以慢火煎地黄汁减半，纳牛酥更煎，良久，次下蜜，搅令匀，候稀稠得所，于瓷器中盛。每服半匙，空心、午时及晚食前以温酒调下。

【功用】填骨髓。

【主治】精极。

30469 地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】生地黄汁一中盏 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研） 黄牛髓六两 阿胶三两（捣研，炒令黄燥，为末） 生姜汁一合 薯蕷二两（末） 酥四两 蜜四两

【用法】上用石锅子纳一处，以慢火熬成膏，收于瓷器中。每服一茶匙，以温粥饮调下，不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿，咳嗽，咽喉胸膈干痛。

30470 地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】生地黄一斤（研取汁） 白蜜五两 马牙消三两（细研）

【用法】先将地黄汁及蜜入子石锅内，慢火熬成膏，去火，次下马牙消，搅令匀，用瓷

盒盛。每服抄一杏核大，含咽津；冷水调下亦得。不拘时候。

【功用】祛热毒，利胸膈。

【主治】咽喉肿痛。

30471 地黄煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】生地黄汁一斗 生姜汁一升 酥一斤 蜜一升 杏仁一升（汤浸，去皮尖，研如膏用之）

【用法】先取地黄汁，于银锅中煎如稀汤，纳姜、酥、蜜、杏仁等和，更煎令稠，于不津器中盛。每以温酒一觥壳服之，一日三次。

【功用】长肌肉，填骨髓。

【主治】五劳七伤。

30472 地黄煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】生地黄汁三升 酥二升 蜜三升 枣膏二升 髓一升（牛、羊皆得用） 杏仁一升（汤浸，去皮尖，研用之） 生姜汁一升 天门冬十两（去心） 麦门冬六两（去心） 黄耆八两（锉） 紫菀六两（去苗土） 桔梗五两（去芦头） 甘草八两（炙微赤，锉） 五味子八两 百部六两 狗脊七两 丹参八两 牛膝十两（去苗） 杜仲十两（去皴皮） 防风七两（去芦头） 地骨皮十两 桑根白皮十两 桂心六两 羌活六两 肉苁蓉十两（酒浸，去皴皮） 白茯苓十两 薏苡仁十两

【用法】天门冬以下二十味锉细，以水七斗，煎取三斗，绞去滓，和地黄汁、生姜汁等，绵滤，纳于铜锅中，以微火煎之，三分减二，即下酥、蜜、髓及大枣、杏仁等相和，以重汤煎，以物不住手搅之，可如稀汤即止，以瓷瓶贮之。每服一匙，以温酒调下，一日三次。

【功用】大补益，养命延年，驻颜不老。

30473 地黄煎

【方源】《医方类聚》卷二二八引《王岳产书》。

【组成】生地黄（捣取自然汁）二合 生姜汁四合 白蜜四合

【用法】上以埴铜锅内相和，慢火煎令稀稠得所如汤，以干埴瓶内盛。每服一匙头，空腹热酒调下。产后十日内，吃三二服甚良。以腊月修合贮之。

【功用】产后调养。

30474 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】生地黄汁三合 蜜五合

【用法】上搅匀，慢火煎如稠汤。每服半匙，含化，徐徐咽津，不拘时候。

【主治】伤寒心热，口舌生疮。

30475 地黄煎

《圣济总录》卷三十。为《外台》卷三引《广济方》“地黄汤”之异名。见该条。

30476 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】生地黄汁二合 铅丹（炒）一两 猪牙皂荚一挺（去皮，酥炙，为末） 白蜜二两

【用法】上和匀，以瓶子盛，密封头，饭上蒸一时久，去滓收之。每取一匙头，含化咽津。

【主治】伤寒后咽喉不能咽食，口中生疮，积热上攻，涎出不止。

30477 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】生地黄汁五两 蜜 生姜汁各三合 沙糖一两半 升麻（细锉，绵裹同煎） 杏仁（去皮尖双仁，研成膏）各二两 人参（为末）三两

【用法】上先将六味于铜器中微火煎，频搅，以地黄等汁尽为度，乃去升麻，下人参末搅匀，候冷，收置瓷盒中密盖。每服一枣大，含化，日夜各三次。

【主治】肺虚声嘶气乏。

30478 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生地黄汁 生栝楼汁各二升半

牛脂三升 蜜半升 黄连(去须)一斤(为细末)

【用法】上合煎，取五升，不津器收贮。每服一大匙，热汤化，通口服，一日三次。

【功用】除热。

【主治】膈消。

30479 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生地黄汁 生杏仁(取油) 生紫苏汁各一盞 生麦门冬汁 生天门冬汁各二盞 莱菔子(炒)半两 五味子 桔梗 桑根白皮(炙，銼) 旋覆花 贝母(炒)各二两

【用法】上将后六味为末，用前汁和丸，如弹子大。食后、临卧含化一丸。

【主治】肺脏壅热。

30480 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】生地黄五斤(洗，焙) 补骨脂 人参各五两

【用法】上为末。每用酒二升，药末二两，羊髓一具(去筋膜)，一处细研，慢火熬稠，瓷器盛之。每服一小匙，温酒化下，空心、日午、卧时各一次。

【主治】髓虚寒，脑痛不安。

30481 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】生地黄(细切)三斤 生姜(细切)半斤 生麦门冬(去心)二斤

【用法】上于石臼内捣烂，生布绞取自然汁，用银石器盛，慢火熬，稀稠得所，以瓷盒贮。每服一匙，用温汤化下，不拘时候。

【主治】消渴，口干舌燥。

30482 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】地黄汁一升半 麦门冬汁 生姜汁 天门冬汁各五合 玄参 柴胡(去苗) 赤茯苓(去黑皮) 射干各一两 黄牛乳一升 蜜二升 黄牛酥五两 黄耆(銼，炒)

桂(去粗皮) 人参 五味子(炒) 款冬花 紫菀(去苗土) 贝母(去心)各二两 杏仁(去皮尖双仁，研)五两

【用法】上将余药为末，次将各自然汁及酥、乳、蜜等入铜银器中，以文武火煎百十沸，时时搅转，然后旋调下诸药末，搅令匀，煎百余沸，来日封闭于甑上，蒸两炊久，待冷以蜡纸紧封闭十数日，时复一看，莫令损动。每日饭后服一匙头，仰卧渐渐咽之，令药浸润心肺，至夜临睡时如前再服。

【主治】肺气不和，上气咳嗽。

30483 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】生地黄汁一升半 生姜汁半升 白蜜一升 牛酥半升 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒，研)二两半 紫苏子(研令细)二两 甘草(炙，銼)一两半 贝母(去心，炒黄)二两 赤茯苓(去黑皮) 紫菀(去苗土，洗，焙)各一两半 竹叶半升

【用法】先捣后五味为细末，以水四升半，煎取二升，去滓，入紫苏子、地黄汁、生姜汁，净滤，同白蜜、牛酥铜器中重汤煎，搅勿住手，候如稀饧，以干器贮之。时含一匙，细细咽汁，常令喉中药不绝。

【主治】上气乏急。

30484 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】生地黄汁一合 苦参(銼)一两 酥三合 盐花二钱(后入) 生姜汁一合

【用法】先以地黄、生姜汁浸苦参一宿，以酥和于铜石器中，煎九上九下，候汁入酥尽，去滓，倾入盒中。每以少许，滴于疮上。

【主治】鼻生疮，痒痛不止。诸风热疮。

30485 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】生地黄汁一升 生麦门冬(去心) 生天门冬(去心) 萎蕤各四两 细辛(去苗叶) 甘草(炙) 芍药 白术各二两 黄耆 升麻各三两

【用法】上除地黄汁外，并锉细，以绵裹，苦酒浸一宿，取出，更用猪膏三升煎，滤过，下地黄汁，并绵裹者药同煎，以膏鸣、水脉尽为度，去滓盛贮。每以少许，细细含化，缓咽之。

【主治】脾胃风热，唇生核。

30486 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】生地黄汁 刺薊汁各二盏 杏仁（汤浸，去皮尖及双仁，麸炒黄，研）一两 阿胶（炙令燥，碾为末）半两

【用法】上同入银器中，慢火熬为煎。每服一钱匕，新汲水化下，不拘时候。

【主治】小儿鼻衄。

30487 地黄煎

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】生地黄汁半斤 大黄（末）一两

【用法】将地黄汁熬耗一半，纳大黄末同熬，候可丸，即丸如梧桐子大。每服五粒，熟水送下。未效，加至十粒。

【主治】①《全生指迷方》：血热。②《朱氏集验方》：心经火热，脉洪数，或吐或衄。

30488 地黄煎

【方源】《中藏经》卷下。

【异名】地黄煎丸（《妇人良方》卷五）。

【组成】生地黄汁五升 生杏仁汁一升 薄荷汁一升 生藕汁一升 鹅梨汁一升 法酒二升 白蜜四两 生姜汁一升（以上同于银石器中，慢火熬成膏，却入后药） 柴胡四两（去芦，焙） 木香四两 人参二两 白茯苓二两 山药二两 柏子仁二两 远志二两（去心） 白术二两 桔梗二两 枳实二两（麸炒） 秦艽三两（去芦） 麝香二钱（另研） 熟地黄四两

【用法】上为末，入前药膏中捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后用甘草汤送下，一日三次。安即住服。

【功用】解劳生肌肉，进食，活血养气。

30489 地黄煎

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】生地黄三斤（取汁） 干漆一两 牛膝半两

【用法】上为细末，将地黄汁于银器内慢火熬成膏，和丸如梧桐子大。每服三十丸，食前酒送下。

【主治】惊恐忧思，意所不快，气郁抑而不舒，则乘于血，气滞则血结，以致经候顿然不行，疔痛，上攻心腹欲死；或因不行，积结渐渐成块，脐腹下如覆杯。

30490 地黄煎

【方源】《妇人良方》卷五引《经验方》。

【组成】生地黄 熟地黄各等分

【用法】上为细末，用生姜自然汁入水相和，打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后用地黄汤送下；或只茶、酒、醋汤送下亦可，一日三次。觉脏腑虚冷，早晨先服八味丸一次。

【功用】《丸散膏丹集成》：补阴益血，退热。

【主治】①《妇人良方》引《经验方》：妇人血风劳，心忪，发热不退。②《校注妇人良方》：肝脾血虚发热，内热晡热，盗汗作渴，体倦，筋骨疼痛，筋脉拘挛，血虚发躁，虚热生痰咳嗽。

30491 地黄煎

【方源】《妇人良方》卷十八。

【组成】生地黄汁 生姜汁各一升 藕汁半升 大麻仁三两（去壳，为末）

【用法】上和停，以银器内慢火熬成膏。每服半匙，温酒调下。更以北秫煎膏半盏，入之尤佳。

【主治】产后诸疾。

30492 地黄煎

《直指》卷二十六。为《圣济总录》卷六十八“地黄饮”之异名。见该条。

30493 地黄煎

【方源】《朱氏集验方》卷七。

【组成】生地黄（沉水，掬取汁）二升 生藕（取汁）一升 生姜四两（取自然汁） 真

酥三两 人参一两(为细末) 阿胶一两(微炒,为末)

【用法】上先将地黄、生姜汁与阿胶末入石器,同慢火熬,候稍稠,即加入参末熬,少时,方加真酥熬,搅匀,稀稠得所。每服一弹子大,早晨、日中、临卧含津咽,或以麦门冬汤化亦得。

【主治】咯血、呕血、嗽血。

30494 地黄煎

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】生地黄十斤(浮洗漉出,一宿后,捣压取汁) 鹿角胶一斤半 生姜半斤(绞取汁) 蜜二大升 酒四升

【用法】上以文武火煎地黄汁数沸,即以酒研紫苏子滤取汁下之,又煎二十沸下胶,胶尽,下酥、蜜同汁煎良久,候稠如饧,贮洁器中。凌晨取一匕,以温酒调下。

【功用】扶衰。

30495 地黄煎

【方源】《普济方》卷一八八。

【组成】生地黄汁 藕节汁 蜜各等分

【用法】银铤内煎略沸,待温,用匙挑入口。

【主治】吐血。

30496 地黄煎

《普济方》卷二二二。为《圣济总录》卷一八六“麋茸丸”之异名。见该条。

30497 地黄煎

《普济方》卷三八五。为《圣惠》卷八十二“生地黄煎”之异名。见该条。

30498 地黄煎

【方源】《奇效良方》卷五十。

【组成】生地黄五斤(绞取汁)

【用法】上于银锅内微火煎一二沸,投白蜜一升,再煎至三升。每服半升,一日三次。

【主治】吐血,忧悲绝伤,胸膈疼痛,及虚劳唾血。

30499 地黄煎

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】地黄膏(《摄生众妙方》卷二)。

【组成】生地黄不拘多少(取汁熬成煎)生

麦冬不拘多少(取汁熬成煎)

【用法】上二煎合入一处,滤过,入砂锅内同熬一时四分,入蜜一分,再熬一时,取出,纳瓷罐内收之。每日用黄酒纳药一二匙搅匀饮之;不用酒者以白汤下,一日二三次。

【功用】①《丹溪心法附余》:驻容颜。②《寿世保元》:补肾水真阴,填精固精,生血乌发。

【主治】男妇血虚。

30500 地黄煎

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】生地一斤(搗绞净汁) 麦冬八两(搗绞净汁) 川芎一两(搗绞净汁) 生姜一两(搗绞净汁)

【用法】盐花少许,煎膏噙化。

【功用】壮水散滞。

【主治】阴虚血滞鼻痛,脉虚微数者。

【方论选录】阴虚血滞,清肃之令不行,无以分布营气以上荣于鼻,故鼻准作痛特甚。生地滋阴以大壮其水,川芎活血以上荣于鼻,麦冬之凉润能清心火,佐川芎以除肺燥,生姜之温行善开肺气,率地黄以止鼻痛也。绞汁取其味之清,煎膏得其力之醇,盐花润下,噙而化之,俾阴精上奉,则血滞顿行,而肺燥自润,安有鼻准作痛特甚之患乎。

30501 地黄膏

【方源】方出《千金》卷二十三,名见《普济方》卷二九三。

【组成】生地黄 猪脂(不着水)

【用法】上咬咀生地黄,纳脂中,令脂与地黄足相淹和,煎六七沸。先以桑灰汁洗疮去恶汁,以地黄膏敷疮上,每日一换。

【主治】鼠漏疮,愈后复发,或不愈,出脓血不止。

30502 地黄膏

【方源】《千金》卷二十五。

【异名】生肌膏(《圣惠》卷六十八)。

【组成】生地黄(切)一升(捣绞取汁三合) 熏陆香 松脂各二两 羊肾脂五合

(煎) 乌麻油二升 杏仁 蜡各二两 石盐一两(研如粉)

【用法】上先下蜡微火令消,次纳羊脂令消,次下乌麻油,次下松脂令消,次下杏仁,次下熏陆,次下地黄汁,次下石盐,以微火煎之,令地黄汁水气尽,以绵滤停凝。一切诸疮,初伤皆敷之,日三夜二。

【功用】蚀恶肉,不着痂,先从内愈。

【主治】金疮、火疮、灸疮不能愈者。

【宜忌】慎生冷、猪肉、鸡、鱼。

【方论选录】《千金方衍义》:地黄凉血,乳香定痛,松脂生肌,杏仁消肿,蜡补绝伤,羊脂祛风,麻油解毒,石盐软坚。为金疮、火疮、灸疮通治之药。

【备考】《圣惠》有蜜二两。

30503 地黄膏

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】生地黄一斤(取汁) 胡桐泪半两(细研) 麝香一分(细研) 白矾半两(烧灰细研)

【用法】先于银器中煎地黄汁,欲凝,下诸药,搅勿住手,膏成,于瓷盒中盛。每用少许,涂齿根下。

【主治】①《圣惠》:牙齿宣露,齿根挺出,时出脓血不止。②《普济方》:骨槽风痛。

30504 地黄膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】生地黄汁一升 松脂二两 熏陆香一两 羊肾脂一两半 牛酥一两半 蜡一两

【用法】于地黄汁中煎松脂及香,令消尽,即纳羊脂、酥、蜡,慢火煎令稠膏成,涂软帛上,每日换一二次。

【功用】排脓止痛。

【主治】一切痈疽发背,溃后疼痛不止。

【备考】方中牛酥原作“牛膝”,据《肘后方》改。

30505 地黄膏

《伤寒总病论》卷四。为《肘后方》卷二

“黑膏”之异名。见该条。

30506 地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】生地黄 粟米饭淀(极酸者)各等分

【用法】上烂研相和如膏。匀摊于薄纱绢上,方圆可二寸,用贴熨眼,干热即换。

【主治】目赤肿痛。

30507 地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】生地黄(净洗,切,研) 黑豆各二两(生捣末)

【用法】上为膏。临卧时,以盐汤洗眼后闭目,以药膏厚罨眼上,更不动,至晓,水润药令软取下。

【主治】暴赤眼肿痛。

30508 地黄膏

《圣济总录》卷一二〇。为《圣惠》卷三十四“生地黄散”之异名。见该条。

30509 地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】生干地黄三分 白及 白蔹 甘草(生,锉)各半两 白芷三分 猪脂半斤(炼)

【用法】上除猪脂外,为末,入猪脂内熬成膏,候冷,每日三四次涂之。

【功用】生肌。

【主治】诸疮不合。

30510 地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】生地黄三斤(细切,捣绞取汁)

【用法】上于铜器内慢火煎搅成膏。取数肿处,以故帛涂贴之亦得。每日换三五次即溃。

【主治】热痈肿结,热振焮痛,欲作脓。

30511 地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】生地黄(细切)三斤 乌鸡一只(去毛、肠、肚并足和骨,锉细)

【用法】上相和,捣研为膏。量患处多少,摊帛上缚之,日再易。

【主治】伤折，恶血结滞肿痛。

30512 地黄膏

《圣济总录》卷一四五。为方出《圣惠》卷六十七，名见《圣济总录》卷一四五“地黄敷方”之异名。见该条。

30513 地黄膏

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】石膏(煨) 藿香叶 蚌粉 香白芷 雄黄(研)各等分

【用法】上为细末，以生地黄自然汁调，稀稠得所。涂疮上四周，留疮头，已破者留疮口勿涂。干即再敷之，药厚以新水润之。

【主治】一切痈疽，及毒虫所伤。

30514 地黄膏

【方源】《幼幼新书》卷五引《惠眼观证》。

【组成】郁金(皂荚水煮干，切细，焙干用) 豆粉各半两 甘草一分(炙) 马牙消(研)一钱

【用法】上用生地黄汁及蜂蜜对合，入盏内约二分许，熬成膏，和成药。每服两皂子大，香熟水含化；或鹅翎扫涂口内亦得。

【主治】①《幼幼新书》引《惠眼观证》：初生儿鹅口、重舌、重腭。②《幼科释谜》：婴孩胎受热毒或生下两目不开。

30515 地黄膏

【方源】方出《本事》卷六，名见《得效》卷十八。

【组成】生地黄(研如泥，成膏) 木香(为细末)

【用法】以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄贴肿上。不过三五次即愈。

【功用】内消痈肿。

【主治】①《本事》：打扑伤损，及一切痈肿未破。②《得效》：臂白脱出。

【方论选录】《本事方释义》：生地黄味甘苦微寒，入手足少阴厥阴，能凉血；木香气味辛温，入足太阴，能疏滞，打伤扑损、痈肿未破者，皆能内消。大凡损伤痈肿，必因

气血不宣畅，今既气得疏，血亦流行，肿岂有不消者哉。

30516 地黄膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】山梔仁 绿豆粉各一两半 粉草六钱

【用法】上药或晒或焙为末，用生地黄烂杵，取汁一两半，好蜜一两半，以薄瓦器盛，在铜铁铫中水煮成膏，如稀糊相似，候冷停分，入前药末，同在乳钵再杵匀，为丸如芡实大。每以一九至二丸，麦门冬煎水化下，不拘时候。儿大者每用一九纳口内含化，或以新汲水调点舌上。

【主治】①《活幼心书》：小儿口内舌上，生疮作痛，饮食难进，昼夜烦啼。②《保婴易知录》：婴儿胎热，生后旬日之间多虚痰，气急喘满，眼闭，目胞浮肿，神困，呵欠吸吸作声，遍身壮热，小便赤，大便闭，时惊烦者。

30517 地黄膏

【方源】《得效》卷十六。

【组成】生地黄一合 黄连一两 黄柏寒水石各半两

【用法】地黄研自然汁，和药成饼子，要用时以纸贴目上。

【功用】逐去热毒瘀血。

【主治】眼外障。目被撞打，疼痛无时，瞳仁被惊，昏暗蒙蒙，眼眶停留瘀血；或风热赤目，热泪出。

30518 地黄膏

【方源】《得效》卷十六。

【组成】生地黄(肥者)

【用法】上洗净研细，绢帛包之，仰卧，以药搭在眼上，初似碍而痛，少顷清凉。

【主治】赤眼。

30519 地黄膏

《摄生众妙方》卷二。为《丹溪心法附余》卷二十四“地黄煎”之异名。见该条。

30520 地黄膏

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】鲜地黄不拘多少(捣汁,以十斤为则,和众药汁同熬) 当归身一斤 芍药半斤 甘杞子半斤 天门冬六两 川芎二两 麦门冬六两 莲肉四两 丹皮二两 知母地骨皮各三两 人参 甘草各一两

【用法】上将众药用水二斗,煎一斗,去滓净,用生地黄汁同熬成膏。

【功用】滋阴降火,养血清肝。

【主治】癆瘵。

30521 地黄膏

《痘疹传心录》卷十八。为《卫生总微》卷二十“生地黄膏”之异名。见该条。

30522 地黄膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】大黄 黄柏 黄连 黄芩 赤芍药 当归 绿豆粉 芙蓉叶 薄荷各等分

【用法】上为末,用生地黄汁、鸡子清、蜜同调匀。贴太阳穴及眼胞上。

【主治】赤肿疼痛,外障等眼疾。

30523 地黄膏

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】生地黄(酒洗净)一斤

【用法】上用水五六碗,入铜砂锅内慢火煮干三分之二,用布绞去汁,将滓捣烂,又用水三碗再熬减大半,又以布绞净。如此三次,将汁通和一处,入好蜜以甘苦得中为度,用文武火熬至滴水不散,似稀糊样,取起置冷地上一夜,出火毒,以瓷罐收贮。或加当归等分。

【主治】血虚生疮,肌肤燥痒,自汗,遗精便多,妇人乳少。

30524 地黄膏

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】生地 当归 丹皮 白芍药 甘枸杞 知母 人参 甘草 地骨皮

【主治】精虚中消,时食时饥,饥不欲食。

30525 地黄膏

【方源】《医灯续焰》卷十八。

【组成】生地黄三斤(捣取汁) 茜草一斤(水五大碗,煎绞取汁,滓再煎二三次取汁。)

【用法】合二汁,缓火煎如膏,以瓶盛之。

每日空心温服半匙。一月髭须如漆。

【功用】久服乌须发。

30526 地黄膏

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】生地二两 黄连一两 黄柏 寒水石各五钱 归尾 红花各二钱

【用法】先将地黄酒浸,捣烂如泥,和药成饼,摊油纸上,贴目上下。

【功用】行血凉血,去热毒。

【主治】撞损瞳人,瘀血疼痛,或风热赤目泪出等眼疾。

30527 地黄膏

《不知医必要》卷二。即《卫生宝鉴》卷十“地黄散”改为膏剂。见该条。

30528 地黄膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地1千克 藤黄15克 红粉9克 冰片3克 广丹12克

【用法】上后四味为细末,备用。先将生地洗净,放砂锅内煮三十分钟左右,取出捣烂,再放入原汤煮二十分钟,过滤取滓。将滓再煮再滤,然后将滤出的药液放砂锅内,用大火煎熬成膏,以提起成丝为度。放入罐内待冷后,将备用药粉搅入即成。先以生理盐水,或温开水洗净疮面,用无菌敷料摊上药膏(不宜太厚),盖在疮口上,间日或三日换药一次。

【主治】淋巴腺结核。

30529 地黄醴

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】大怀熟地(取味极甘者,烘晒干以去水气)八两 沉香一钱(或白檀三分亦可) 枸杞(用极肥者,亦烘晒以去润气)四两

【用法】上约每药一斤,可用高烧酒十斤浸之,不必煮,但浸十日之外,即可用矣。服完又加酒六七斤再浸半月仍可用。宜常服之。

【主治】男妇精血不足,营卫不充。

【宜忌】服此者不得过饮。

30530 地榆丸

【方源】《外台》卷二十五引《延年秘录》。

【组成】地榆六两(炙) 赤石脂七分 厚朴六分 白术五分 干姜六两 龙骨七分 黄连十分 当归五分 熟艾五分 乌梅肉六分 甘草四分(炙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至二十五丸，饮送下，一日二次。

【主治】冷痢。不消食，腹中胀痛，气满不能食。

30531 地榆丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】地榆一两 龙骨 赤石脂 无食子(炮) 熟艾(微炒)各半两 黄柏(去粗皮)三分 橡实壳(炒)一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》久痢不止。②《普济方》：大便不禁。

30532 地榆丸

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】地榆一两 草豆蔻三枚(炮，去皮) 黄耆(锉)一两 枳壳(麸炒，去瓤)半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如麻子大。一二岁儿每服十丸，草节汤送下，一日三次。

【主治】小儿肠虚腹胀，泻血不止。

30533 地榆丸

《卫生总微》卷十一。为《幼幼新书》卷二十九引张涣方“地榆丹”之异名。见该条。

30534 地榆丸

【方源】《普济方》卷九十七。

【组成】大川乌头(盐炒，不得过熟，去皮脐尖)一两 甜参一两 地榆一两 麝香一分(别研，入前四味中拌令匀)

【用法】上为末，五味同捣，炼白蜜五两和为丸，如梧桐子大，以瓷盒密封贮之。每日二十丸，空心、食前温酒送下。服此药当有汗出是验。

【主治】风气攻注、荣卫壅滞，四肢疼痛无力，渐成瘫痪。

【备考】本方用法云“五味同捣”，而实际组成仅四味，疑脱。

30535 地榆丸

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】地榆(微炒) 当归(微炒) 阿胶(糯米炒) 黄连(去须) 诃子肉(炒，取肉称) 木香(晒干) 乌梅肉(去核，净称)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，陈米饮吞下。

【主治】泻痢或血痢。

【临证举例】痢疾 先公昔在括苍，病痢踰月，得此方而愈。余在晋上，士人苏子病此为甚，其妇翁孙亿来告急。录此方以与，旋即痊愈。

【备考】本方原名地榆散，与剂型不符，据《准绳·类方》改。

30536 地榆丸

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】防风 乌梅肉 枳壳 阿胶 甘草(炙) 荆芥穗 黄连 生地 当归身 槐花 白术 伏龙肝 地榆

【用法】水为丸。陈米饮送下。

【主治】小儿时常粪后出血不止。

30537 地榆丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】白术半两 黄柏(炒)二钱 生地黄二钱 白芍药二钱 地榆二钱 黄芩(炒)二钱 香附二钱

【用法】上为末，蒸饼为丸服。

【主治】脏毒挟湿者。

30538 地榆丸

《全国中药成药处方集》(抚顺方)。为原书(抚顺方)“槐角地榆丸”之异名。见该条。

30539 地榆丹

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【异名】地榆丸(《卫生总微》卷十一)。

【组成】地榆(炙，锉) 黄连 干蓝叶 川

升麻各一两 川楝子 苦楝根各半两

【用法】上为细末，软饭为丸，如黍米大。每服十粒，乳食前米饮送下。

【功用】消毒止痢。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：小儿虫痢。②《卫生总微》：肠中蓄毒，下血如豆汁，或诸恶物。

30540 地榆水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地榆 31 克

【用法】加水两碗，煎成半碗，用纱布浸药液，湿敷

【主治】急性湿疹，湿润糜烂，流水淋漓。

30541 地榆汤

【方源】《千金翼》卷八。

【组成】地榆根 柏叶各八两 蟹爪 竹茹各一升 漏芦三两 茯苓一两 蒲黄三合 伏龙肝半斤 干姜 芍药 当归 桂心 甘草（炙）各二两

【用法】上咬咀。以水一斗五升，煮地榆根，减三升，纳诸药，更煮取四升。分服，日三次，夜一次。

【主治】妇人崩中漏血不绝。

30542 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】地榆 黄连（去须） 木香各半两 白术一分半 甘草（炙，锉） 阿胶（炙燥）各一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒不发汗，变成狐惑，毒气上攻，咽喉疼痛，下痢不止。

30543 地榆汤

《圣济总录》卷三十三，为《圣惠》卷十三“地榆散”之异名。见该条。

30544 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】地榆（锉） 黄连（去须） 黄芩（去黑心） 犀角屑各一两 升麻 茜根各半

两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】疟痢挟热，下血腹痛。

30545 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】地榆 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 当归（切，焙）各三分 艾叶（炒） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒） 高良姜各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空心、日午温服。

【主治】肠胃受风，飧泄无度，或下黄水，腹胁痛闷。

30546 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】地榆（锉） 甘草（炙，锉） 酸石榴皮各三分 阿胶（炙，炒）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）三分 白石脂（研）半两 赤芍药三分 龙骨半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，空心、日午温服。

【主治】泄痢。

30547 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【异名】地榆饮（原书卷七十七）。

【组成】地榆 樗皮（去粗皮，炙） 黄连（去须，炒）各一两 当归（切，炒） 陈橘皮（汤浸去白，炒） 枳壳（去瓢，麸炒） 桂（去粗皮） 桔梗（炒）各三分 大腹皮一两半 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，煎至一盞，去滓，空心温服。

【主治】一切痢疾。气痢腹胁虚满，肠鸣腹痛，便下赤白。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地榆散”。

30548 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】地榆二两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞，煎取七分，去滓温服，日二次，夜一次。

【主治】血痢不止。

30549 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】地榆（锉，焙） 樗根（锉，焙）各一两 酸石榴皮（干者）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，将水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血痢不止，及积毒泻血。

30550 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】地榆 诃黎勒皮各一两 甘草（炙） 当归（切，焙）各半两 柏叶 茜根 芍药 赤茯苓（去黑皮）各三分

【用法】上锉细。每服三钱匕，水一盞，煎取六分，去滓，食前温服。

【主治】脾毒气痢，下血如鹅鸭肝，腹痛不止。

30551 地榆汤

《圣济总录》卷七十七。即《圣惠》卷五十九“犀角散”改为汤剂。见该条。

30552 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【异名】地榆甘草汤（《杂病源流犀浊》卷十七）。

【组成】地榆（粗者，锉）四两 甘草（半生半炙，并锉）三两

【用法】上为末。每用五钱匕，水三盞，加缩砂仁四七枚，同煎至一盞半，去滓，分二次温服。

【主治】①《圣济总录》：结阴下血。②《宣明论》：阴结下血不止，渐渐极多，腹痛不已。

【方论选录】《古方选注》：结阴者，阴气自结，不和于阳也，结则下瘀血，若瘀血去尽而再结再下，三结三下，断续不绝，亦危证也。地榆身能止血，稍能行血；甘草生用能行肝胃二经污浊之血，炙之入阴而温散血中

之结；煎时另入缩砂仁，香而能窜，内醒脏气，引领二味，止血开结。此之征乎内者，从里解也。

30553 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】地榆 艾叶 枳壳（去瓤，麸炒） 黄耆（锉） 防风（去叉） 龙骨 桑耳各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盞，加生地黄一分（拍碎），同煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

【主治】痔疮下血。

30554 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】地榆（锉） 柏叶（去枝） 蒲黄 酸石榴皮（锉） 甘草（炙） 生熟地黄（焙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】室女月水不断。

30555 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】地榆 当归（切，焙） 阿胶（炙燥） 黄耆（锉）各一两半 艾叶三分 龙骨（碎）二两

【用法】上咬咀如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妇人经血暴下，兼带下积久不愈，面目萎黄，困倦羸瘦。

30556 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】地榆（去苗，刮净，锉细）一两 当归（炙，焙，切碎）二两 生姜（去皮，切碎，阴干者） 艾叶（捣为末）各半两 赤石脂一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加新竹叶十片，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠堕胎后，血出不止，形体虚羸。

30557 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】地榆 芍药各三分 木香 当归(切, 焙) 甘草(炙, 锉) 阿胶(炙燥)各半两 干姜(炮裂)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓温服。

【主治】产后血痢不止, 脐腹疼痛。

30558 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】地榆(锉) 黄柏(去粗皮, 微炙) 黄连(去须) 黄芩(去黑心)各一两半 马蔺子(微炙)半两 茜根(锉)一两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕, 水半盞, 加生姜一片, 同煎至三分, 去滓, 食前分二次温服, 一日二次。

【主治】小儿血痢。

30559 地榆汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】地榆半两(微炙, 锉) 厚朴三分(生姜汁制, 炒) 诃子半两(煨, 去核)

【用法】上为细末。每服半钱, 乳食前, 煎木瓜、枣汤调下。

【主治】小儿下痢赤白, 脐腹撮痛, 日夜频并, 羸困烦渴, 全不入食。

30560 地榆汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】苍术去皮(四两) 地榆二两

【用法】上咬咀。每服一两, 水一盞, 煎至七分, 食前多服除根。

【主治】久病肠风, 痛痒不任, 大便下血。

30561 地榆汤

【方源】《百一》卷十四。

【异名】地榆散(《医方类聚》卷一四一)。

【组成】地榆(洗, 焙干, 锉) 卷柏(不去根, 净洗)各等分

【用法】每用一两, 水一碗, 以砂瓶子煮数十沸, 通口服, 不拘时候。

【主治】下血远年不愈。

30562 地榆汤

《普济方》卷二九八, 即《圣惠》卷六十“地榆散”。见该条。

30563 地榆汤

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】地榆 甘草 干姜 干葛 粟壳 当归 芍药 茯苓

【主治】滑痢, 冷热不调者。

30564 地榆饮

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】地榆三两 赤石脂一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食前温服, 一日二次。

【主治】伤寒后下痢赤白。

30565 地榆饮

《圣济总录》卷七十七。为原书卷七十五“地榆汤”之异名。见该条。

30566 地榆饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】地榆一两 当归(切, 焙) 艾叶 人参各二两 生干地黄(焙)三两 桂(去粗皮)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 加生姜三片, 同煎至七分, 去滓, 空心温服。

【主治】产后恶露下多, 心烦气短, 食少多倦。

30567 地榆饮

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】地榆(锉, 焙干) 酸石榴皮各一两 黄连(去须)三两 当归(锉, 炒)二两

【用法】上为粗散。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食前温服。

【主治】产后赤白痢, 久不止, 脐腹疼痛。

30568 地榆饮

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】地榆 黄柏(去粗皮, 炙) 黄连(去须) 马芹子(炒) 黄芩(去黑心)各三分 蔓菁根(洗, 切)半两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水一盞，加生姜少许，煎至五分，去滓，分二次温服。

【主治】小儿蛊毒血痢。

30569 地榆饮

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】地榆三分 甘草二分 芍药一钱 当归一钱

【用法】上为饮子。每服一钱、水一钟，煎至五分，去滓服。

【主治】小儿冷热痢，腹痛，赤白频并。

30570 地榆饮

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】地榆 甘草二钱 芍药 当归 一钱 枳壳一钱半（炒）

【用法】上锉散。每服一钱，白水煎服。加黄连亦好。

【主治】小儿热痢腹痛，下痢赤白频并。

30571 地榆饮

【方源】《保婴撮要》卷七。

【组成】地榆三分 甘草 赤芍药（炒） 枳壳各二分

【用法】水煎服。

【主治】小儿冷热痢，腹痛下痢赤白频并。

30572 地榆饮

【方源】方出《回生集》卷下，名见《卫生鸿宝》卷二。

【组成】地榆一斤 甘草二两 银花一两

【用法】先将地榆用水十碗，煎三碗，再将甘草、银花煎一碗，空心腹。一服即消。

【主治】大小肠痢。

【宜忌】忌荤、腥、房事。

30573 地榆散

【方源】《外台》卷二十九引《范汪方》。

【组成】地榆根 白薤各二分 附子一分（炮） 当归四分 芍药 白芷 芍药各三分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒饮送下，一日三次。

【功用】内塞止痛。

【主治】金疮。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生菜、生葱、猪肉、冷水。

30574 地榆散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】地榆 椿根白皮各一两 酸石榴皮（焙干）半两

【用法】上为末。每服三匕，浆水一升半，煎至一升，取清汁分二次温服。

【主治】泻血肠风，痔疮下血。

30575 地榆散

【方源】《圣惠》卷十三。

【异名】地榆汤（《圣济总录》卷三十三）。

【组成】地榆（锉） 黄连（去须，微炒） 犀角屑 茜根 黄芩各一两 梔子仁半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，加薤白五寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，毒热不解，日晚即壮热腹痛，便痢脓血。

【备考】方中茜根，《准绳·疡医》作“葛根”。

30576 地榆散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】地榆三分（锉） 黄连一两（去须，微炒） 柏叶三分（炙微黄） 黄柏三分（微炙，锉） 黄芩三分 龙骨一两 赤石脂一两 赤地利一两 阿胶三分（捣碎，炒令黄燥） 犀角屑三分

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒热毒下脓血，或如赤小豆汁，腹痛烦闷。

30577 地榆散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】地榆一两 龙骨一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 人参一两（去芦头） 醋石榴皮一两 黄芩一两 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热病。壮热头痛，四肢烦疼，下痢黄赤色，日夜十余行，及呕吐不下食。

30578 地榆散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】地榆半两(锉) 柏叶三分 甘草半两(锉，生用) 吴蓝三分 黄芩三分 刺蓟一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加青竹茹一分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】心肺热盛，吐血不止。

30579 地榆散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】地榆一两(净洗去泥土) 白芍药一两 阿胶三分(捣碎，炒令黄燥) 甘草一分(生用) 艾叶一两 小蓟根一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】吐血不止。

30580 地榆散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】地榆(锉) 赤芍药 生干地黄 茜根(锉) 龙骨 黄芩 鸡苏苗各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】大便下血，久不止。

30581 地榆散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】地榆一两 木香半两 葳蕤二分 当归三分(锉，微炒) 黄芩三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】乳石发动，烦热腹痛，变为痢，不欲饮食。

30582 地榆散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】地榆一两半(锉) 栲树白皮一两(炙微黄，锉) 白术三分 当归三分(锉，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：赤白痢。②《鸡峰》：胃风。其状恶风，颈多汗，膈下塞不通，饮食不下，胀满，形瘦腹大，失衣则噤，食寒则泻泄、白痢。

30583 地榆散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】地榆 臭椿树皮(炙) 狼牙 黄芩各半两

【用法】上为散。每服半两，以水一中盏，煎至七分，去滓，分二次温服，不拘时候。

【主治】久血痢不愈。

30584 地榆散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】地榆一两(锉) 甘草半两(炙微赤，锉) 赤芍药一两 柏叶一两(微炙) 茜根一两(锉) 诃黎勒一两(煨，用皮) 当归一两(锉，微炒) 黄连一两(去须，微炒)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎取六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】盘注痢。下血如鹅鸭肝，腹痛不止。

30585 地榆散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】地榆(锉) 黄耆(锉) 枳壳(麸炒微黄，去瓢) 槟榔 当归(锉，微炒) 黄芩 赤芍药各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】痔疾生疮肿痛，下血不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地榆汤”。

30586 地榆散

【方源】方出《圣惠》卷七十三，名见《医学入门》卷八。

【异名】地榆苦酒煎(《金鉴》卷四十五)。

【组成】地榆二两

【用法】上锉细。以醋一升，煮十余沸，去滓，食前稍热服一合。

【主治】妇人漏下赤色不止，令人黄瘦虚

渴。亦治呕血。

30587 地榆散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】地榆一两(锉) 伏龙肝一两 白茯苓一两 熟干地黄一两 柏叶一两(微炙) 蒲黄一两 白芍药一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 鹿角胶一两(捣碎, 炒令黄燥) 当归一分(锉, 微炒) 桂心半两 芎藭三分 干姜半两(炮裂, 锉) 漏芦一两 蟹爪一两(微炒)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏。加竹茹一分, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】妇人崩中, 漏下不止。

【方论选录】《济阴纲目》: 此方有温有凉, 其破瘀止痛, 莫如蟹爪; 而补血上行, 莫如角胶, 其余可三反矣。

30588 地榆散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【异名】阿胶散(《普济方》卷三四二)。

【组成】地榆三分(锉) 干姜一分(炮裂, 锉) 当归三分(锉, 微炒) 龙骨三分 芎藭三分 艾叶半两(微炒) 阿胶三分(捣碎, 炒令黄燥) 熟干地黄一两 蒲黄半两 黄牛角觔一两(烧灰) 白术半两 乌贼鱼骨三分(烧灰)

【用法】上为细散。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】妊娠损胎, 下血不止, 腹内疼痛。

30589 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆一两 白茯苓一两 黄柏一两(微炙, 锉)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓服, 不拘时候。

【主治】小儿痢渴, 或下五色恶物, 心神烦热不止。

30590 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆三分(微炙, 锉) 酸石榴皮

半两(锉, 微炒) 龙骨一两(烧赤) 当归半两(锉, 微炒) 黄耆半两(锉) 阿胶三分(捣碎, 炒令黄燥) 黄连三分(去须, 锉, 微炒) 赤石脂一两(烧灰) 乌梅肉半两(微炒)

【用法】上为细散。每服半钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】小儿赤白痢。烦渴寒热, 腹痛羸瘦, 不欲饮食。

30591 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆三分(锉) 酸石榴皮半两(锉, 微炒) 白龙骨一两 赤石脂一两 黄连三分(去须, 微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿赤白痢不止。

30592 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆三分(微炙, 锉) 厚朴三分(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 黄连一两(去须, 微炒) 阿胶半两(捣碎, 炒令黄色)

【用法】上为细散。每服半钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】小儿水谷痢, 日夜不止。

30593 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆三分(微炙, 锉) 黄连半两(去须, 微炒) 赤石脂一两 人参半两(去芦头) 杏仁半两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 赤芍半两

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿痢, 腹痛心烦, 不欲饮食。

30594 地榆散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地榆一两半(微炙, 锉) 黄柏一两半(去粗皮, 微炙, 锉) 马蔺子半两

(微炒) 荔枝一两(锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿血痢。

30595 地榆散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】地榆半两 酸石榴皮三分 黄芩(去黑心)半两 枳壳(去瓢,麸炒)三分 赤石脂半两 甘草一两(炙,锉)

【用法】上为散。每服二钱匕,食前米饮调下。

【主治】热血痢不止,日夜频滑。

30596 地榆散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】地榆一两(焙干) 矾石(烧汁尽,研细)半两

【用法】上为散。同生猪肉二两批开,掺药一钱匕在肉上,用炭火炙熟,细嚼米饮下。并两服立效。

【主治】丈夫、妇人便血下痢。

30597 地榆散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】地榆 酸石榴皮(焙,锉) 木贼各一两

【用法】上为散。每服一钱匕,食前煎河黎勒汤调下。

【主治】肠胃虚热,血痢。

30598 地榆散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】地榆(锉) 桑耳 甘草(炙,锉) 赤芍药各三两 熟干地黄(焙) 伏龙肝各四两 艾叶(炒)二两 黄耆(锉)六两

【用法】上为细散。每服二钱匕,食后临卧米汤调下,一日三次。

【主治】结阴泻血。

30599 地榆散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】地榆(锉)

【用法】上为散。每服二钱匕,饭饮调下,

一日三次。

【主治】①《圣济总录》:血痔。②《幼科类萃》:大肠停积热毒,小儿赤痢,或点滴鲜红。

30600 地榆散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】地榆 甘草(半炙半生) 陈槐花(半炒半生)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心食前浓煎枳壳、桑根白皮汤调下。

【主治】肠痔。下部生核肿痛,发寒热出血。

30601 地榆散

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【异名】龙骨散(《普济方》卷三四三)。

【组成】地榆(去苗,锉碎)一两 当归(切,焙) 龙骨 艾叶(捣成末) 蒲黄(微炒)各半两 牛角觔(炙令焦匀,锉取末) 阿胶(炒令燥) 生干地黄(焙)各一两

【用法】上为散,研匀。每服二钱匕,食前以温米饮调下。

【主治】妊娠堕胎后,血出不止。

30602 地榆散

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】地榆(锉细) 桂(去粗皮) 草豆蔻(去皮) 黄连(去须)各三分 槟榔(锉) 当归(切,炒) 肉豆蔻(炮,去壳) 阿胶(炒令燥) 木香(炮) 乌头(炮裂,去皮脐) 丁香(炒) 枳壳(去瓢,麸炒) 高良姜(炒)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心、食前温酒调下;米饮亦得。

【主治】产后泄泻,日久不止,烦渴困倦,不思饮食。

30603 地榆散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《吉氏家传》。

【组成】地榆一分(炒) 诃子五个(炮,去皮) 陈槐花 黄连各一钱(炒)

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，陈米饮下。

【主治】小儿血痢，日久不愈。

30604 地榆散

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】枳壳（去瓢，麸炒）半两 诃子七枚（煨去核） 甘草半两（炙） 地榆一两 黄芩一分 赤芍药一分 白芍药一分 罂粟壳十四枚（蜜炙焦黄）

【用法】上为细末。每服三钱，空心陈米饮调下。

【主治】下痢纯血，脐腹疼痛，里急后重，昼夜频并。

【宜忌】《普济方》：脾胃弱者不可服。

30605 地榆散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】地榆 诃子（煨，去核） 赤芍药 橡斗子各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食前陈米饮调下。

【主治】肠风下血不止。

30606 地榆散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】地榆二两（炒） 御米壳四两（蜜炒） 陈皮一两（浸洗，去白） 藿香一两（洗去土） 黄连一两 甘草一两（炙） 苍术一两（米泔浸三日，炒）

【用法】上为粗末。每服二钱，水一大盏，煎至八分，去滓，通口服，并二服滓再煎作一服，共三服。

【主治】五色痢，里急后重，痛不可忍者。

30607 地榆散

《百一》卷七，为《杨氏家藏方》卷三“泼火散”之异名。见该条。

30608 地榆散

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】石榴皮 莲蓬（去茎） 甘草（炒） 罂粟壳（去瓢，蜜涂炙）各等分

【用法】上为细末。每服二大钱，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，通口服，不拘时候。

【主治】肠胃气虚，冷热不调，泄泻不止，或下鲜血，或如豆汁，或如豚肝，或脓血相杂，赤多白少，腹痛后重，遍数频并，全不入食。

【备考】本方名“地榆散”，但方中无地榆，疑脱。

30609 地榆散

【方源】《普济方》卷三二五引《家藏经验方》。

【组成】何首乌 肉桂 地榆 香白芷各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，米泔一盏半，沙糖一小块，煎至八分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人败血。

30610 地榆散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】地榆 黄连 茜根 黄芩 茯神各半两 梔子仁一分

【用法】上为粗末。每服三钱，加薤白五寸同煎服。

【主治】肠风热证下血。

30611 地榆散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】地榆 黄耆 枳壳 槟榔 川芎 黄芩 赤芍药 槐花 羌活各半两 白藜 蜂房（炒焦） 甘草（炙）各一分

【用法】上锉。每服三钱，新水煎服。

【主治】痔疮肿痛。

30612 地榆散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】地榆 诃子 甘草

【用法】上为细末。盐米饮调下。

【主治】①《朱氏集验方》：诸般痢。②《普济方》：大肠热毒停积之赤痢，或点滴鲜红。

【备考】《普济方》本方用量：各等分。

30613 地榆散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】地榆 荆芥 蒺藜 苦参各等分

【用法】上为粗末。每用药二两，水三大碗，煎三五沸，去滓，避风处热淋洗患处，冷即再温。

【主治】足胫湿毒肿满，按之不起。

30614 地榆散

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【组成】地榆（炒） 干葛各半斤 茯苓（去皮） 赤芍药各六两 干姜（炮）二两 当归（去苗）三两 甘草（炙）四两 罂粟壳（蜜炒）十二两

【用法】上为细末。每服二钱，用温热水调下，不拘时候。小儿三岁，可服半钱。

【主治】大人、小儿脾胃气虚，冷热不调。下痢脓血，赤多白少；或因肠胃乘虚为热毒所渗，下痢纯血，脐腹疼痛，里急后重，口燥烦渴，小便不利，纯下鲜血；或先经下痢，不应服热药而误服热药，蕴毒不散，积于肠间，渗而成血者。及下痢纯白，或下紫黑血，肠滑不禁者。

30615 地榆散

《普济方》卷四十，即《御药院方》卷八“淋瀝药地榆散”。见该条。

30616 地榆散

《普济方》卷二一〇，即《圣济总录》卷七十五“地榆汤”。见该条。

30617 地榆散

【方源】《普济方》卷二五三。

【组成】臭椿根（东引根白皮，蜜炙，焙干） 地榆各半两

【用法】上为细末。每服一钱，热米饮调下。

【主治】蛊毒下血。或腹痛，或不痛，百治不效，日夜不止，烦渴。

30618 地榆散

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】地榆 乌梅 柏皮 甘草 当归各等分

【用法】上为末。清水煎，去滓服。

【主治】小儿冷热痢。腹痛，下痢赤白频并。

30619 地榆散

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】地榆（炒） 干姜（炮） 当归（切，焙） 缩砂仁各一分

【用法】上为散。每服半钱，以生姜、蜜少许，和热酒调下，一日三次。

【主治】小儿因患泻痢后，脱肛不得收。

30620 地榆散

《医方类聚》卷一四一。为《百一》卷十四“地榆汤”之异名。见该条。

30621 地榆散

【方源】《回春》卷四。

【组成】乌梅一两（焙干，去核） 五倍子（炒）五钱 槐花 枳壳（麸炒）一钱 黄连三钱（炒） 地榆二钱 荆芥穗三钱 白芷一钱

【用法】上为细末。每服三钱，空心酒调下。远年者，服至断根为度。

【主治】肠风下血。

30622 地榆散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】熟地五两 黄耆三两（蜜炙） 白术一两半（炒黑） 当归三两 白芍一两半（炒黑） 炮姜五钱 地榆三两（炒炭） 茯苓一两半 炙草五钱

【用法】上为散。每服三五钱，饮下。

【主治】崩久不止，脉软者。

【方论选录】气血两亏，冲任失守，而寒从中生，故腹痛频频，崩漏久不止焉。熟地补阴滋血以安冲任，黄耆补气举陷以奠生阳，白术健脾燥湿，当归养血归经，白芍敛阴止崩下，茯苓渗湿清治节，炮姜温中逐冷，地榆涩血止血，甘草以缓中益胃也。为散以散之，米饮以下之，使气血内充则中寒自化，而经脉完固，何腹痛不退，崩久不止乎。

30623 地榆散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】生地榆（晒干）

【用法】上为末。香油调敷；破烂者干搽；伤重者，再用生萝卜捣汁一碗灌下，良久愈。

【主治】汤火伤。

30624 地榆散

【方源】《医级》卷八。

【组成】地榆 当归 阿胶 菖蒲 诃子肉 乌梅肉 木香各五钱

【用法】上为末。每服二三钱，开水下。

【主治】血痢便血，肠风。

30625 地榆散

【方源】《伤寒瘟疫条辨》卷四。

【组成】地榆二钱 当归四钱 白芍四钱 黄芩 黄连 栀子（炒黑） 犀角（镑，磨汁）各二钱 薤白四钱

【用法】水煎，去滓，入犀角汁，冷服。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：整肠止痢。

【主治】伤寒温病，热毒不解，日晡壮热，腹痛，便利脓血，甚如烂瓜肉及屋漏水者。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食辣、腥、硬物。

30626 地榆膏

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】地榆一斤

【用法】用水三升，煎至一半，去滓再煎如稠汤，空心服三合，一日二次。

【功用】涩血。

【主治】赤白带下骨立者。

【方论选录】《简明中医妇科学》：地榆凉血涩血，血自归经，安有赤白注溢之患哉。

30627 地锦汤

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】苧菜叶 干针草 酸草子 地锦草各等分（阴干）

【用法】上为细末。每服二钱，白汤调下，食后温服。

【主治】肠风下血。

30628 地熏散

《圣济总录》卷十三。为原书同卷“柴胡散”之异名。见该条。

30629 地魄汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】甘草一钱 半夏三钱 麦冬三钱 芍药三钱 五味子一钱 元参三钱 牡蛎三钱

【功用】补阴，清君相之火，降肺胃之逆，益水敛神而生津。

【主治】失血家，阴脉受伤，恍惚不宁。

30630 地鳖散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】干地鳖（末） 麝香（研）各少许

【用法】上研匀。干掺或贴，随干湿治之。

【主治】瘰疮肿。

30631 地髓汤

【方源】方出《证类本草》卷六引《肘后方》，名见《普济方》卷二一四。

【异名】牛膝膏、苦杖散（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】牛膝（并叶）一大把

【用法】上不以多少，酒煮饮之。

【主治】小便不利，茎中痛欲死；兼治妇人血结腹坚痛。

30632 地髓汤

《圣济总录》卷一六四，为《理伤续断方》“四物汤”之异名。见该条。

30633 地髓汤

《得效》卷八。为方出《本事》卷十名见《得效》卷八“苦杖散”之异名。见该条。

30634 地髓汤

《准绳·类方》卷六。为《医学正传》卷六“牛膝膏”之异名。见该条。

30635 地髓散

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】生干地黄四两 莎草根 茜根 地骨皮（洗，焙） 菴苣子 茅根各一两

【用法】上为细散。每服一钱匕，早晨温酒调下，午后再服。

【功用】却病强身延年。

30636 地髓煎

【方源】《本草纲目》卷十六引《千金》。

【组成】生地黄十斤（洗净，捣压取汁） 鹿角胶一斤半 生姜半斤（绞取汁） 蜜二升

酒四升

【用法】文武火煮地黄汁数沸，即以酒研紫苏子四两，取汁入煎一二十沸，下胶，胶化，下生姜汁、蜜再煎，候稠，瓦器盛之。每服一匕，空心酒化下。

【功用】大补益。

【主治】《古今医彻》：血枯便燥结。

30637 地龙饼子

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】地龙(炒) 海蛤 硫黄(研) 乌头(炮裂，去皮脐)各半两 鯪鲤甲(炙)一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如鸡头子大，捏作饼子，晒干。每用一饼，以葱白裹安在手足节上，以手帛系住，搁在一杉木桶上，用热汤淋之，候觉骨中热极，方解去帛子。手足未得舒展时，再用热汤淋之。每一饼可用三次。每用药毕，当着衣服盖之，不得透风。

【主治】中风，手足筋急，拘挛疼痛。

30638 地龙浸液

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】活蚯蚓。

【用法】洗净，放入白糖内，即化为液体。外涂。

【主治】带状疱疹。

30639 地龙粪散

【方源】方出《外台》卷十三引《近效方》，名见《圣惠》卷二十二。

【组成】炭灰五升(无炭灰，桑灰亦得，纱罗罗之一遍) 蚯蚓粪一升(捣之) 红蓝花七捻

【用法】上一处搅和，熬令热，取好酽醋拌之令匀，分作四份，以故帛三四重裹。更替当所患痛处熨之，勿住手揉之，冷热得所。宁令小热，不得作冷，冷即复熬令热，又熨之。

【主治】①《外台》引《近效方》：白虎风。②《圣惠》：白虎风，痛走不定，无问老幼。

30640 地龙粪散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】地龙粪半两 人参半两(去芦头) 龙骨一两 乌梅肉半两(微炒) 蜗牛壳一两(微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢渴，烦热不止。

30641 地松涂方

【方源】方出《外台》卷二十九引《必效方》，名见《圣济总录》卷一三四。

【组成】漆姑草(捣汁)二分 芒消一分

【用法】和涂之。

【主治】漆疮。

30642 地肤子丸

【方源】《外台》卷二十一引《广济方》。

【组成】地肤子五两 决明子一升

【用法】上为末，米饮和丸。每服二十丸至三十丸，食后以饮送下。

【主治】雀目。

30643 地肤子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】地肤子半两 川大黄一两(锉碎，微炒) 柏子仁三分 蕤仁半两(去皮) 决明子三分 甜瓜子半两 青箱子半两 白蒺藜三分(微炒，去刺) 羌藟子半两 蓝子三分 菟丝子一两(酒浸三日，晒干，别捣为末) 黄连三分(去须) 细辛三分 桂心三分 萤火虫三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】虚劳眼痛，泪多不明。

【宜忌】忌生冷、猪肉、热面、荤辛。

30644 地肤子丸

《圣惠》卷三十三。为《千金翼》卷二十三“补肝丸”之异名。见该条。

30645 地肤子丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】地肤子三分 蓝子一分 白蒺藜三分(微炒，去刺) 车前子半两 甜瓜子半两 羌藟子一分 青箱子三分 细辛半两

萤火虫一分(微炒,去翅足) 决明子三分
黄连三分(去须) 覆盆子三分 生干地黄
· 两 菟丝子三分(酒浸三宿,晒干,别捣
为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。
每服二十丸,温酒送下,不拘时候。

【功用】补肝明目,能令远视。

【主治】眼目昏暗。

30646 地肤子丸

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】地肤子 决明子 沙参 羚羊角
屑各一两 秦皮 菊花 枳壳(去瓢,麸
炒) 大黄(锉,炒)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。
每服二十丸,食后温水送下。

【主治】伤寒热病后,眼目诸疾。

30647 地肤子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】地肤子 草决明(微炒) 沙参
秦皮(去粗皮) 人参 甘菊花 羖羊角屑
各三分 枳壳(去瓢,麸炒)半两 大黄
(锉,炒令香)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。
每服三十丸,浆水送下,临卧再服。

【主治】时气病后,眼忽失明。

30648 地肤子汤

【方源】《外台》卷三十六引《小品方》。

【组成】地肤子一分 瞿麦 冬葵子各三
分 知母 黄芩 猪苓 海藻 橘皮 升麻
通草各一分半 大黄八分

【用法】上切。以水二升,煮取一升,量儿
大小与服。

【主治】①《外台》引《小品方》:小儿小
便不通。②《千金》:小儿热毒入膀胱中,忽
患小便不通,欲小便则涩痛不出,出少如血,
须臾复出。

【备考】《千金》有枳实三分。

30649 地肤子汤

《千金》卷二十一。为《外台》卷二十七引

《小品方》“地肤汤”之异名。见该条。

30650 地肤子汤

《普济方》卷三八八。为《圣惠》卷九十二
“地肤子散”之异名。见该条。

30651 地肤子汤

【方源】《医学正传》卷七引《录验》。

【组成】地肤草 车前子各一钱 知母(去
毛,炒) 黄芩 赤茯苓 白芍药 枳壳
(麸炒黄色)各七分 升麻 通草 甘草各三
分

【用法】上切细,作一眼。水一盏半,煎至
一盏,温服。

【主治】妊娠子淋,小便涩数。

30652 地肤子散

【方源】方出《圣惠》卷三十三,名见《普
济方》卷八十一。

【组成】地肤子 枸杞子 营实各一两

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒调下,
不拘时候。

【主治】眼热目暗。

【备考】方中枸杞子,《圣惠》原作“批杷
子”,据《普济方》改。

30653 地肤子散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】地肤子汤(《普济方》卷三八八)。

【组成】地肤子 瞿麦 冬葵子 知母
黄芩 川升麻 木通(锉) 川大黄(锉,微
炒) 猪苓(去黑皮)各半两

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一中盏,
煎至六分,去滓,不拘时服。

【主治】小儿积热,小便不通。

30654 地肤子散

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】地肤子(炒)二两 紫葛(锉)一
两半 白头翁(锉,炒)一两

【用法】上为散。每服二钱匕,加至三钱匕,
温酒调下。

【主治】柔风。肢体弛缓不收,里急不能仰
息,兼治妇人产后中风。

30655 地肤子散

《圣济总录》卷一〇三。为《圣惠》卷三十三“补肝地肤子散”之异名。见该条。

30656 地肤子散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】地肤子(新瓦上焙干)

【用法】上为散。每服三钱匕,用陈粟米饮调下,一日三次。

【主治】痔疾。

30657 地肤子散

《玉机微义》卷二十八引《济生》。为《外台》卷二十七引《小品方》“地肤汤”之异名。见该条。

30658 地肤草汤

《医方考》卷六。为《外台》卷三十三(注文)引《小品方》“地肤饮”之异名。见该条。

30659 地骨皮丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】地骨皮三分 柴胡一两(去苗) 子芩一两 生干地黄一两 麻黄根一两 麦门冬半两(去心,焙) 犀角屑半两 知母一两 川升麻一两 牡蛎粉半两 人参一两(去芦头) 赤茯苓一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,煎淡竹叶汤送下,不拘时候。

【主治】心脏壅滞,或时烦热,频多汗出。

30660 地骨皮丸

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】地骨皮五两 生干地黄五两 牛膝三两(去苗) 覆盆子三两 黄耆三两(锉) 五味子三两 桃仁四两(去皮尖双仁,别研如膏) 菟丝子四两(酒浸三日,晒干,别捣为末) 蒺藜子四两(微炒去刺)

【用法】上为末,下桃仁,搅使相入,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心以温酒送下;粥饮或浆水送下亦得。服药十日,即急拔去白者,二十日即黑者却生,四时宜常服。

【功用】益气血,乌髭发,坚牙齿,益筋力。

【宜忌】忌食蒜、牛肉、生葱、萝卜等。

【备考】本方能令髭发终身不白,但黑润而

已;黄者经六十日变黑;已白者服百日如漆。

30661 地骨皮丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】地骨皮半两 龙胆二分(去芦头) 子芩二分 紫参半两 黄耆半两(锉) 枳壳一分(麸炒微黄,去瓢) 木香一分 猪苓一分(去黑皮) 川大黄半两(锉碎,微炒) 郁李仁半两(汤浸,去皮尖,微炒) 海蛤一分(细研)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,以温水送下,一日三次。得微利为效。

【主治】因奶热所致小儿脊瘤,渐渐黄瘦,以手指击之,背如鼓响,脊骨高。

30662 地骨皮丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】地骨皮 白槟榔(煨,锉) 桔梗(炒) 麦门冬(去心,焙) 各一两半 茯神(去木) 百合 诃黎勒(煨,取皮) 人参 甘草(炙,锉) 各一两 熟干地黄(焙) 赤芍药各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心煎黄耆汤送下,一日三次。

【主治】虚劳咳嗽喘满,食少胁痛,时发寒热。

30663 地骨皮丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】地骨皮 龙胆 枳壳(去瓢,麸炒) 黄芩(去黑心) 甘草(炙,锉) 山梔子(去皮) 各一两 鳖甲(醋浸,炙黄) 一两半 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后米饮送下,一日二次。

【主治】骨蒸羸瘦,经久不愈,邪热留连。

30664 地骨皮丸

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】地骨皮 白芷 升麻 防风(去叉) 赤芍药各半两 柴胡(去苗) 一两 生干地黄(焙) 一两半 大黄(锉,炒) 黄芩(去黑心) 枳壳(去瓢,麸炒) 芎藭

知母(焙) 菱蕤 槟榔(锉) 细辛(去苗叶) 甘菊花 薰本(去苗土) 牵牛子(炒) 马牙消(研) 犀角屑各半两 胡黄连 甘草(炙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后、夜卧熟水送下。以利为度。

【主治】风袭齿龈,肿痛有血。

30665 地骨皮丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】地骨皮 牛膝 菟丝子(焙) 枳壳(去瓤,麸炒) 远志(去心) 熟干地黄各六两

【用法】上使酒浸三日,焙干为末,用浸药酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【功用】补血气。

【主治】风湿。

30666 地骨皮丸

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】地骨皮 龙胆 黄芩(去黑心) 枳壳(去瓤,麸炒) 木香 赤芍药 猪苓(去黑皮) 海蛤(研)各一分 紫参(研) 大黄(锉,炒)各半两 郁李仁(炒,研)一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五七丸,温汤送下。微利即止。

【主治】小儿疳泻不定,黄瘦不思食。

30667 地骨皮丸

【方源】《奇效良方》卷六十。

【组成】地骨皮 黄耆 桑白皮 山梔子 马兜铃各等分

【用法】上为细末,甘草膏为丸,如芡实大。每服一丸,食后嚼化。

【主治】肺热口臭,口中如胶,舌干发渴,小便多。

30668 地骨皮汤

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《圣济总录》卷三十四。

【组成】知母 鳖甲(炙) 常山各二两

地骨皮三两(切) 竹叶一升(切) 石膏四两

【用法】以水七升,煮二升五合,分三次温服。

【主治】温疟,不下食。

【宜忌】忌蒜、热面、猪、鱼。

30669 地骨皮汤

【方源】《医方类聚》卷二三四引《王岳产书》。

【组成】地骨皮半两 柳枝半握 细辛半两 防风半两 杏仁半两(去皮尖) 生地黄一两 盐半两 蔓荆子半两

【用法】上锉细,如煮散。每用一两,以水一大盏,酒一盏,同煎取一盏,滤过,热含,就疼处浸良久吐之,含一盏尽为度,每日二次。

【主治】产后血虚,齿龈宣露,摇动疼痛。

30670 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】地骨皮(去土) 人参 甘草(炙,锉) 柴胡(去苗) 葛根(锉) 麦门冬(去心,焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加竹叶二十片,生姜两片,同煎至七分,去滓,食后温服。

【主治】风热毒气,身体烦热,头目不利,口干舌涩,夜卧不安。兼解利伤寒汗后,余热烦躁。

30671 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】地骨皮五两 知母一两半 桔梗(去芦头,炒) 甘草(炙)各一两 前胡(去芦头)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,煎至七分,去滓,食后、临卧温服。

【功用】利头目。

【主治】劳风,上膈壅痰实。

30672 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】地骨皮 升麻 犀角(镑) 玄参

各三分 常山一两(细锉)

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，煎至七分，去滓，未发前空腹温服。欲吐须忍，俟不能禁即吐，如此吐下即愈。

【主治】久疟不愈，发不以时，或朝或夜，肌瘦食少。

30673 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】地骨皮 知母(焙) 柴胡(去苗) 枳壳(去瓤，麸炒) 各半两 鳖甲(去裙襖，醋炙) 三分 赤茯苓(去黑皮) 三分 虎头骨一两(酒涂炙焦)

【用法】上为粗末，分为五服。每服以水三盞，煎取一盞，加地黄汁一合，更煎三五沸，去滓，分二次温服，食后良久再服，一日一帖。

【主治】寒热往来，久成痲瘵。

30674 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】地骨皮 生干地黄各五两(锉细) 前胡(去芦头) 二两半 茯神(去木) 二两 麦门冬(去心，焙) 知母各二两半 人参 甘草(炙，锉) 各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加豉及粟米各少许，同煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】谋虑伤胆，胆气上溢，膈脘虚烦，常觉口苦。

30675 地骨皮汤

《圣济总录》卷四十三。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“地骨皮散”之异名。见该条。

30676 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】地骨皮二两 防风(去叉) 甘草(炙) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】胃气实热，唇口干燥，头昏体倦，五心烦热。

30677 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】地骨皮五两 白前二两 石膏(研)六两 杏仁(去皮尖双仁，炒)三两 桑根白皮(锉)四两

【用法】上锉，如麻豆大。每服六钱匕，水二盞，加竹叶十片，煎至一盞，去滓温服。

【主治】肺实热，喘逆胸满，仰息气急。

30678 地骨皮汤

《圣济总录》卷四十八。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“地骨皮散”之异名。见该条。

30679 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】地骨皮 柴胡(去苗) 甘草(炙，锉) 各一两 胡黄连一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】骨实热烦痛。

30680 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】地骨皮(洗)二两 胡黄连 柴胡(去苗) 当归(切，焙) 泽泻 黄芩(去黑心) 甘草(炙，锉) 枳实(去瓤，麸炒) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】髓实，使人强悍惊热。

30681 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】地骨皮 栝楼根 黄连(去须) 麦门冬(去心，焙) 黄芩(去黑心) 各一两 茯神(去木) 远志(去心) 各三分 甘草(炙，锉) 半两 石膏(碎)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脾虚热，暴渴不已。

30682 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】地骨皮 栝楼根各一两半 黄连

(去须) 土瓜根 麦门冬(去心, 焙) 车前子各一两 知母(焙) 半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞半, 加生地黄半分(切), 煎至八分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】暴渴。

30683 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】地骨皮 鳖甲(去裙襕, 醋炙) 当归(切, 焙) 秦艽(去苗土) 柴胡(去苗) 知母(切, 焙) 贝母(去心) 各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加乌梅半个, 桃、柳枝各七寸(拍碎), 同煎至七分, 去滓温服。

【主治】虚劳, 阴阳不和, 早晚潮热, 面赤烦躁, 肢体疼痛。

30684 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】地骨皮 细辛(去苗叶) 各半两 柴胡(去苗) 一两 甘草(炙, 锉) 人参 白茯苓(去黑皮) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 一日三次。

【主治】虚劳, 肢体疼痛, 头目昏眩, 怠惰少力, 饮食无味, 心忪烦渴, 口苦咽干, 夜多盗汗。

30685 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】地骨皮 白茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心, 焙) 柴胡(去苗) 各一两半 赤芍药 甘草(炙令赤) 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 用水一盞半, 煎至一盞, 去滓, 食后分二次温服。

【主治】虚劳五蒸。

30686 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】地骨皮一两 芍药一两半 桑根白皮(锉) 一两半 茅根一两半 甘草(炙,

锉) 一两 柴胡(去苗) 一两半 石膏(碎) 三两半

【用法】上为粗末。每用五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓, 分二次温服, 空心、食后各一次。

【主治】骨蒸羸瘦少力, 或热或寒, 背膊疼痛, 口干, 小便赤黄。

30687 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】地骨皮 知母(焙) 柴胡(去苗) 当归(切, 焙) 秦艽(去苗土) 鳖甲(醋炙, 去裙襕) 甘草(炙, 锉) 枳壳(去瓢, 麸炒) 各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 加乌梅、生姜、桃柳枝、小麦各少许, 煎至七分, 去滓温服。

【主治】虚劳骨蒸, 烦热发渴。

30688 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】地骨皮 茺蔚子各一两半 防风(去叉) 黄芩(去黑心) 玄参 大黄(锉, 炒) 细辛(去苗叶) 各一两 芒消二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食后、临卧温服。

【主治】目赤痛。

30689 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】地骨皮(去土) 甘菊花(择) 升麻 黄连(去须) 防风(去叉) 决明子(微炒) 细辛(去苗叶) 各一两 竹叶(洗)

【用法】上除竹叶外, 共为粗末。每服五钱匕, 以水一盞半, 加竹叶七片, 煎至一盞, 去滓, 食后、临卧温服。

【主治】风毒冲眼, 赤痛干疼。

30690 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】地骨皮(切) 三斤

【用法】上以水三斗, 煮取三升, 绞去滓,

更纳盐二两，煎取一升，洗目。或加干姜一两。

【主治】时行，目暴肿痒痛。

30691 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】地骨皮一两半 甘菊花 升麻 黄连(去须) 防风(去叉) 木通(锉) 萎蕤 大黄(锉，炒) 甘草(炙，锉) 蕤仁(去皮)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】心肺风热，目干涩痛痒。

30692 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】地骨皮一两 细辛(去苗叶)半两 生干地黄(切)一两 戎盐(研)二分

【用法】上为粗末。每用五钱匕，以水二盞，煎三五沸，去滓，热漱冷吐。以愈为度。

【主治】牙齿疼痛，吃物不得。

30693 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】地骨皮(去土)一两 白杨皮(切)一握 生地黄汁一合 细辛(去苗叶) 蜀椒(去目并闭口者，炒出汗)各一分 杏仁(去皮尖双仁，炒)二十枚 盐(研)二钱 苍耳半两

【用法】上除地黄外，为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，入生地黄汁半合，煎至一盞，去滓，热漱冷吐，每日三五次。

【主治】牙齿风痛。

30694 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】地骨皮 防风(去叉) 盐 细辛(去苗叶) 杏仁(汤去皮尖双仁，炒) 蔓荆实 生干地黄(焙)各一两 白杨皮一握(切)

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，同煎十余沸，去滓，热漱冷吐。

【主治】牙齿风虫，齿根挺出，动摇疼痛。

30695 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】地骨皮 黄耆(锉) 桔梗(锉，炒) 山梔子仁 竹茹 犀角(镑)各半两 甘草(炙，锉)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大(拍碎)，煎至五分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】心脾壅积，咽喉痛，舌上结热。

30696 地骨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】地骨皮(锉，焙)二两半 白术二两 石膏(碎)三分 桑根白皮(锉)二两 杏仁(去皮尖双仁，炒)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后肺气寒壅咳嗽。

30697 地骨皮汤

《圣济总录》卷一七九。为《博济》卷一“地骨皮散”之异名。见该条。

30698 地骨皮汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】地骨皮散(《鸡峰》卷十一)。

【组成】地骨皮 百部各二两 芍药 赤茯苓各一两

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，加竹叶十片，同煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】①《全生指迷方》：肾咳恶热，骨间烦疼。②《鸡峰》：肺壅痰嗽。

30699 地骨皮汤

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】地骨皮(去骨) 胡黄连各一两 鳖甲(涂酥炙黄，去裙襖) 柴胡(去苗) 犀角(锉，取屑) 嫩桃枝(锉) 川大黄(炮) 知母各半两

【用法】上为细末。每服一大钱，水一盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿骨蒸体热肌瘦。

30700 地骨皮汤

【方源】《本草纲目》卷三十六引《兰室秘

藏》。

【组成】柴胡 地骨皮各三钱

【用法】水煎服。

【主治】膀胱移热于小肠，上为口糜，生疮溃烂，心胃壅热，水谷不下。

30701 地骨皮汤

《普济方》卷四十三。为《圣济总录》卷五十四“解肌地骨皮汤”之异名。见该条。

30702 地骨皮汤

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】地骨皮 防风 盐 细辛 蔓荆实 杏仁 独活 青箱子 当归各一两

【用法】上为散。每用半钱，以水二大盏，入盐一钱，煎至一盏，去滓，热含冷吐，一日二次。

【主治】牙齿风虫，齿根挺出，动摇疼痛。

30703 地骨皮汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】地骨皮半斤 当归四两 盐二两 白矾末一两

【用法】上锉细。每用药五两，水九升，煎取二升，去滓，再煎至一升，收瓷器中，用绵蘸拭患处五七次愈。

【主治】风瘾疹。

30704 地骨皮汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】生地 麦冬 黄耆 山药 五味子 地骨皮 淡竹叶

【主治】赤浊，因思虑过度，心虚有热者。

30705 地骨皮汤

【方源】《女科秘要》卷四。

【组成】地骨皮 当归 川芎 知母 麦冬各一钱 甘草五分

【用法】空心服。

【主治】妇人肥盛，肠胃多痰，壅滞经络，血闭带下。

30706 地骨皮饮

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】地骨皮(洗) 麦门冬(去心)各二两 酸枣仁(炒)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后虚烦客热，累夜不得睡眠，头痛眼疼迷闷。

30707 地骨皮饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】地骨皮(锉) 土瓜根(锉) 栝楼根(锉) 芦根(锉)各一两半 麦门冬(去心，焙)二两 枣七枚(去核)

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏，煎取八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴，日夜饮水不止，小便利。

30708 地骨皮饮

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】地骨皮 白茯苓(去黑皮) 瞿麦穗 赤芍药 生干地黄(焙) 山梔子仁 甘草(炙)各一两 大黄(锉，炒) 柴胡(去苗) 木通(锉)各一两半 人参 木香各半两 青橘皮(汤浸，去白，焙)一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，加竹茹少许，同煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿潮热，盗汗心忪，及骨蒸劳热。

30709 地骨皮饮

【方源】方出《元戎》，名见《金鉴》卷六十二。

【组成】四物汤加丹皮 地骨皮

【用法】水煎服。

【主治】①《元戎》：妇人骨蒸。②《金鉴》：痢疽溃后，但热不寒。

30710 地骨皮饮

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】柴胡(去芦) 地骨皮各三两 知母 甘草(炙) 鳖甲(醋炙黄) 黄芩 人参各二钱半 赤茯苓半两

【用法】上锉。一岁每服二钱，水六分，加生姜、乌梅各一片，煎三分，不拘时候服。

【主治】小儿骨蒸，潮热往来，心膈烦悸，及伤寒后气未解。

30711 地骨皮饮

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】生地一钱 沙参八分 丹皮六分
地骨皮一钱五分 党参(去芦) 白芍(酒炒)各七分 甘草四分

【主治】小儿发热，昼静夜热。

30712 地骨皮散

【方源】《玉诀》引《手集》(见《幼幼新书》卷二十六)。

【组成】地骨皮(拣择令净，干，用粗葛皮包洗过后，干称) 黄耆(锉，焙) 柴胡(去芦头，洗，锉，焙)各一两 人参(锉，焙) 白茯苓(去黑皮，锉，焙) 甘草(炙，焙)各半两

【用法】上为细末。每服一钱或半钱，白汤点下。

【功用】进食。

【主治】小儿热疳。

30713 地骨皮散

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《玉诀》。

【组成】地骨皮(拣净，粗葛包洗) 黄耆(焙) 柴胡(焙)各一两 紫菀 犀角 土瓜根各一分

【用法】上为散。每服半钱，以蜜水调下，不拘时候。

【功用】进食。

【主治】小儿热疳。

30714 地骨皮散

【方源】方出《圣惠》卷四，名见《普济方》卷十七。

【组成】地骨皮一两 葳蕤一两 玄参一两 黄耆一两(锉) 子芩一两 麦门冬一两(去心) 川升麻一两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，用水一中盏，加竹叶七片，煎至五分，去滓，加生地黄汁、蜜各半合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】①《圣惠》：心气盛实，气血壅滞，阴阳不通，荣卫隔塞，上焦壅滞，心胸烦热。

②《普济方》：心胸中久积烦热，口干颊赤。

30715 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】地骨皮三分 麦门冬一两(去心) 柴胡一两半(去苗) 川升麻一两 赤芍药三分 甘草半两(炙微赤，锉) 射干一两 石膏二两 龙胆三分(去芦头)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，加牛蒡汁一合，更煎一两沸，食后温服。

【主治】脾实热，唇肿心烦，咽喉不利，体热烦疼。

30716 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】柴胡一两(去苗) 地骨皮 木香 麻黄(去根节) 甘草(炙微赤，锉) 川升麻 栝楼根 人参(去芦头) 赤茯苓 木通(锉)各半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】阳毒伤寒，头昏身重，咽喉唇干，腮赤，狂言欲走，心胸胀满，呕逆不下饮食，面色斑斑如锦文。

30717 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】地骨皮 葳蕤 人参(去芦头) 黄耆(锉) 麦门冬(去心) 子芩各一两 茯神三分 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，加生地黄汁一合，生姜汁一茶匙，蜜半合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】伤寒，心神烦热，狂语不定。

30718 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】地骨皮半两 知母三分 麦门冬三分(去心) 淡竹沥半合 白蜜半两

【用法】上锉细。用水两大盏半，煎至一盏半，去滓，加蜜、竹沥，搅令匀，分作五服，

不拘时候温服。

【主治】伤寒后阴阳易病，乍寒乍热，发作有时。

30719 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】地骨皮 防风（去芦头） 赤芍药 葛根（锉） 羚羊角屑 川大黄（锉碎，微炒） 各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加豉五十粒，葱白一茎，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】时气热毒攻眼疼痛，心中躁闷。

30720 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】地骨皮一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 川大黄一两（锉碎，微炒） 赤芍药半两 柴胡一两（去苗） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 麦门冬一两（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病七日，遍身疼痛，壮热不解。

30721 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】地骨皮一两 泽泻一两 麦门冬一两（去苗） 梔子仁半两 犀角屑半两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，烦渴不止。

30722 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】地骨皮一两 黄芩一两 黄连一两（去须） 川大黄一两（锉碎，微炒） 木香一两 羚羊角屑一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病疮疮，心神烦躁。

30723 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】地骨皮二两 麦门冬二两（去心） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加小麦一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，口中苦渴，骨节烦疼。

30724 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】地骨皮一两 半夏半两（汤浸七遍去滑） 桔梗半两（去芦头） 人参半两（去芦头） 白茯苓半两 白术半两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 柴胡三分（去芦头） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳寒热，四肢羸瘦，不欲饮食。

30725 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】地骨皮三分 玄参三分 黄耆二两（锉） 泽泻一两 麦门冬三分（去心） 生干地黄一两 葳蕤半两 人参一两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，食少无力。

30726 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷八十七）。

【组成】地骨皮一两 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 桂心半两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，梗米五十粒，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】热劳肢节痠疼，翕翕少气，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇赤，面色枯燥，饮食

无味，悲忧戚惨，多卧少起。

【宜忌】忌菟菜。

30727 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】地骨皮三分 百合三分 黄耆三分 赤茯苓三分 人参半两（去芦头） 赤芍药三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮三分（锉） 柴胡一两半（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 犀角屑三两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 白前三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳骨蒸烦热，心神不宁，及小便赤涩，时有咳嗽，四肢羸弱疼痛。

【宜忌】忌菟菜。

30728 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】地骨皮二分 赤芍药一两 桑根白皮一两 茅根一两（锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 柴胡二两（去苗）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸，羸瘦少力，燥热，背膊痠痛，小便赤黄，口舌干燥烦渴。

30729 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】地骨皮 川升麻 玄参 甘草（炙微赤，锉） 防风（去芦头） 黄芩各一两 赤茯苓二两 羌活三分 桑根白皮二两（锉） 决明子二两半 石膏二两 柴胡二两半（去苗）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，黑豆五十粒，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝壅毒气上攻，眼睛赤涩疼痛，心

躁体热。

30730 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】地骨皮 石膏（细研，水飞过） 川大黄（锉碎，炒） 井泉石各二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，加石膏更研令匀。每服二钱，食后以白米泔调下。

【主治】眼睛疼痛，睡卧不得。

30731 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】地骨皮一两 独活一两 莽草半两 细辛半两 附子一枚（生用，去皮脐） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）

【用法】上为粗散。每用半两，以酒二升浸一宿，于铜器中慢火煎之，热含冷吐，勿咽，一日三次。

【主治】牙齿连颊骨相引疼痛。

30732 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】地骨皮一两 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒） 生干地黄一两 川升麻一两半 藁本半两 露蜂房半两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细散。每用一钱，以绵裹，常含咽津。

【主治】齿黄黑，枯燥无光泽。

30733 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】地骨皮一两 当归一两 川升麻半两 寒水石半两 桂心半两 芎藭半两 黄药一两 沉香一两 麝香一分（细研）

【用法】上为末。用贴齿根，重者以绵裹，含如弹子大，每日二三丸。

【主治】牙齿动摇，吃食不稳。

30734 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】地骨皮二两 栝楼根一两 石膏一两 黄连一两（去须） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消中。虚羸，烦热口干，眠卧不安。

30735 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】地骨皮一两 茯神三分 栝楼根一两 黄连一两（去须） 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两（去心） 黄芩一两 远志三分（去心）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】消渴。口舌焦干，精神恍惚，烦躁不安。

30736 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】地骨皮一两 柴胡一两（去苗） 人参二两（去芦头） 羚羊角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，加生地黄汁半合，不拘时候温服。

【主治】髓黄。身体赤黄，四肢不举，肌肉战掉，鼻中出血，两脚疼闷，一手专安额上，身不壮热，爱卧冷处。

30737 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】地骨皮一两 石膏一两 黄连一两（去须） 麦门冬一两（去心） 甘草一两（炙微赤，锉） 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日四五次。

【主治】金疮，烦渴闷乱，头痛。

30738 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】地骨皮一两 柴胡一两（去苗） 白茯苓半两 桑根白皮三分（锉） 五加皮半两 人参半两（去芦头） 黄耆三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心半两 白芍药半两 前胡三分（去芦头） 枳壳三

分（麸炒微黄，去瓢）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血风，气体虚，发歇寒热。

【方论选录】《济阴纲目》汪箕笈：黄耆、人参、桂心是补肺温气药，桑皮、枳壳、地骨皮是泻肺清热药，白芍、茯苓是降收之味，五加、前胡是行散之味，而乃并用之，重在气虚有火，当以分两中求之，疾苦中审之，则窈妙自得。

30739 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】地骨皮一两 柴胡一两（去苗） 琥珀三两（细研） 赤芍药半两 土瓜根半两 木通半两（锉） 黄芩半两 青蒿子半两 当归三分（锉，微炒） 川大黄一两（锉，微炒） 牡丹半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】室女月水不通，心神烦热，四肢疼痛，不思饮食。

30740 地骨皮散

【方源】《博济》卷一。

【异名】地骨皮汤（《圣济总录》卷一七九）、地骨皮枳壳散（《元戎》卷五）。

【组成】地骨皮（水洗） 秦艽（水洗净） 柴胡（去芦） 枳壳（去白，麸炒香熟用） 知母（生用） 当归（去芦） 鳖甲（去裙襕，醋炙令黄色）各等分

【用法】上为末。每服二大钱，水一大盏，加桃、柳枝头各七个，生姜三片，乌梅一个，同煎至七分，去滓温服，每日空心、临卧各一服。

【主治】骨蒸壮热，肌肉减瘦，多困少力，夜多盗汗。

30741 地骨皮散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《博济》。

【组成】地骨皮 麦芽各一两 猪牙皂角半两 青盐一合

【用法】上同捣令匀，粗入锅内炒过，再为末。每用先以盐水漱口，再用药末掺擦。

【主治】骨槽风，牙齿宣露，肿痒浮动，疼痛时作，或龈烂生疮。兼治口疮。

30742 地骨皮散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】地骨皮汤（《圣济总录》卷四十三）。

【组成】地骨皮一两 防风一两（去芦头）甘草半两（微炙）

【用法】上为散。每服二钱，用水一中盏，加竹叶五七片，同煎至七分，温服，不拘时候。

【功用】凉上焦，生津液。

【主治】心脏热，咽干舌涩，面赤潮热。

30743 地骨皮散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】地骨皮汤（《圣济总录》卷四十八）。

【组成】地骨皮二两 紫苏叶一两 桑根白皮一两半 甘草一两（炙）

【用法】上为散。每服二钱，用水一中盏，同煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】肺脏风热，喘促上气，胸膈不利，烦躁鼻干。

30744 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】地骨皮一分 荆芥穗二两 石膏（研，飞过）二两 白花蛇（酒浸，炙，去皮骨） 天南星（浆水煮软，切，焙）各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，加腊茶一钱，食后、临卧汤点服。

【主治】脑风，头痛时作，及偏头疼。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“白花蛇散”。

30745 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】地骨皮二两 柴胡（去苗）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，用麦门冬（去心）煎汤调下，不拘时候。

【主治】热劳。

30746 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】地骨皮（去土） 羌活（去芦头） 防风（去叉） 土茯苓（去刺，微炒） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，荆芥茶清调下；如患暴赤眼，浓煎甘草汤调下，食后、临卧服。

【主治】风毒气上攻，两眼碇涩疼痛，及暴赤眼。

30747 地骨皮散

【方源】方出《圣济总录》卷一一四，名见《普济方》卷五十五。

【组成】地骨皮半两 五倍子一分

【用法】上为细末。每用少许，掺入耳中。

【主治】耳聋，流脓水不止。

30748 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】地骨白皮（微炒）一两 当归（切，焙干）三分 升麻半两 桂（去粗皮）一分 甘草（炙黄赤色）半两 芎藭三分 紫矿（炙）半两 寒水石二两半 苎蓍子（炒香熟）半两

【用法】上为散。每用一钱匕，涂齿根下；甚者绵裹如弹子大，日吞三两丸，口中含化亦妙。

【主治】齿动，吃食不稳。

30749 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【异名】地骨散（《鸡峰》卷二十二）。

【组成】地骨皮

【用法】先刮取浮皮别收之，次取皮下腻白粉为细散，其白粉下坚赤皮锉细，与浮皮一处为粗散。每用粗末一合许，煎浓汁，乘热

洗疮，直候药汤冷，以软帛掺干，乃用细散敷之，每日洗帖一次。以愈为期，用之未愈，慎不可住。

【功用】《鸡峰》：止痛生肌。

【主治】恶疮。

30750 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】地骨皮（捣末）半两 小麦 麻子各十粒（烧灰） 绯帛方五寸（烧灰） 曲头棘刺二七枚（烧灰） 半夏七枚（炒黄，捣末） 乱发一团如鸡子（烧灰）

【用法】上为末。每服二钱匕，空心温酒调下，至晚再服。

【主治】疗肿。

30751 地骨皮散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】地骨皮（自采佳） 知母 银州柴胡（去芦） 甘草（炙） 半夏（汤洗七次，切，焙） 人参（切去顶，焙） 赤茯苓各等分

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜五片，水一盞，煎至八分，食后温服。

【主治】小儿虚热潮作；亦治伤寒壮热及余热。

【备考】本方加秦艽，名“秦艽饮子”（《见《婴童百问》引《全婴方》），又名“秦艽饮”（见《婴童百问》）。

30752 地骨皮散

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】地骨皮（洗，焙干） 川大黄（微炮） 黄芩各一两 麦门冬（去心） 黄耆 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分一盞，加荆芥少许，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿热病，口干，心神烦躁。

30753 地骨皮散

《鸡峰》卷十一。为《全生指迷方》卷四“地骨皮汤”之异名。见该条。

30754 地骨皮散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】地骨皮三两半 生干地黄二两

【用法】上为细末。每服二钱，食后温酒调下。

【主治】风热客于皮肤，血脉凝滞，身体头面瘾疹生疮。

30755 地骨皮散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】人参（去芦头） 白术 白茯苓（去皮）各一两 前胡 地骨皮 当归（洗，焙） 陈橘皮（去白） 甘草（炙） 半夏曲 桔梗（去芦头）各半两

【用法】上哎咀。每服二钱，水六分盞，加生姜一片，大枣一枚，同煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿寒热更作，肌体羸瘦，烦渴引饮，不思饮食。

30756 地骨皮散

《普济方》卷六十七引《十便良方》。为《圣济总录》卷一二〇“升麻散”之异名。见该条。

30757 地骨皮散

【方源】《直指》卷九。

【组成】地骨皮（洗） 秦艽（洗，去芦） 柴胡 枳壳（制） 知母（生） 当归 鳖甲（醋炙黄）各半两 川芎半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱，加桃、柳枝各七寸，生姜三片，乌梅一个，同煎，空心、临卧各一服。

【主治】虚劳，潮热骨蒸，壮热。

【加减】潮热甚，加些大黄微利之。

30758 地骨皮散

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】生干地黄半两 真地骨皮 细辛各一分 五倍子（炒令黑）二钱

【用法】上为细末。每用少许敷之。

【主治】小儿肾疳，腮腮、牙齿肉烂腐臭，鲜血常出。

30759 地骨皮散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】人参 地骨皮 柴胡 黄耆 生地黄各一两半 白茯苓半两 知母一两 石膏二两

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏，加生姜七片，煎至七分，去滓，细细温服。

【主治】肺痈，疮疡，气虚内热者。

①《云岐子脉诀》：脏中积冷，荣中有热，脉举之有余，按之不足，阳有余阴不足者。②《外科发挥》：肺痈。骨蒸潮热，自汗，咳吐腥秽稠痰。③《景岳全书》：疮疡，气虚内热，烦渴不宁。

30760 地骨皮散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】地骨皮 茯苓各半两 柴胡 黄芩 生地黄 知母各一两 石膏二两

【用法】上咬咀。加生姜，水煎服。

【主治】阳毒浑身壮热，自汗。

【加减】如自汗已，多加知母。

30761 地骨皮散

【方源】《医方大成》卷七引《经验方》。

【组成】地骨皮 凤眼根皮(并用悬崖中者好，去土不用)各等分

【用法】同炒微黄色，为细末。每服三钱，空心温酒调下。

【主治】肠风痔瘕，下血不止。

【宜忌】忌油腻食物。

30762 地骨皮散

【方源】《丹溪心法》卷一。

【组成】地骨皮 茯苓各半两 柴胡 黄芩 生地黄 知母各一两 石膏二两 羌活 麻黄各七钱半

【用法】上咬咀。每服一两，加生姜，水煎服。

【主治】阳毒火炽发渴，浑身壮热，无汗，脉长而滑。

30763 地骨皮散

【方源】《普济方》卷二三六引《仁存方》。

【组成】地骨皮 黄耆 人参 鳖甲(酒浸，炙) 甘草各等分

【用法】上为末。每服三钱，以水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，空心、临卧服。

【主治】骨蒸

30764 地骨皮散

【方源】《普济方》卷一七八。

【组成】地骨皮一两 栝楼根一两 芦根一两(锉) 人参半两(去芦头) 麦门冬一两半(去心) 赤茯苓三分 生干地黄一两 黄芩三分

【用法】上为散。每服四钱，水一盞，加生姜半分，小麦一百粒，淡竹叶二十七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴，体热烦躁。

30765 地骨皮散

《普济方》卷一七八。即《千金》卷二十一“枸杞汤”。见该条。

30766 地骨皮散

【方源】《普济方》卷二三五。

【组成】当归四两 黄耆半斤 秦艽六两 知母二两 枳壳一两 地骨皮一斤 甘草一斤

【用法】上为末。每服半两，水二盞，加生姜三片，乌梅、大枣各一个，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸壮热，肌肉减瘦，面色萎黄，小便赤色，恶心潮热，夜多盗汗，嗜卧少力，口苦舌干，肢节烦疼，渐成劳瘵。

30767 地骨皮散

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】地骨皮 黄芩 人参 黄耆 葳蕤 麦门冬 甘草 赤芍药各半两 柴胡一两

【用法】上为散。每服四钱，水一盞，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠烦躁，体热疼痛，口干食少。

30768 地骨皮散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】地骨皮 白茯苓 麻黄(去节)

白芍药 黄芩 川芎 前胡 升麻 甘草各等分

【用法】上咬咀。葱白同煎服。

【主治】小儿伤寒热甚者。

30769 地骨皮散

《普济方》卷四〇三。为《幼幼新书》卷十五引《家宝方》“麦汤散”之异名。见该条。

30770 地骨皮散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二引《应验方》。

【组成】柴胡四钱 地骨皮三钱 薄荷二钱

【用法】上咬咀，作一服。水一钟半，煎至一钟，去滓，温漱冷吐。

【主治】牙齿虚热，气毒攻冲，龈肉肿痛，口舌生疮。

30771 地骨皮散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】知母 柴胡 甘草(炙) 地骨皮 赤茯苓 半夏

【用法】生姜一片为引，水煎服。

【主治】小儿肺热。有时发热，过时即退，来日依时复发，其状如疟。

30772 地骨皮散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】地骨皮 柴胡 黄芩 广皮 甘草

【主治】肝胆气分发热，夜则安静，昼则发热，唇焦口渴，饮水多汗，左脉洪数。

30773 地骨皮散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】地骨皮 柴胡 知母 黄芩 人参 甘草

【主治】春温夏热，阳火炽盛，气分受邪，发热闷乱，烦躁不宁，不得卧，骨节烦热。

30774 地骨皮散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】石膏二钱 黄芩 知母 生地各一钱 羌活七分半 赤苓 地骨皮各五分

【主治】伤热成积，或吐或泻，头晕腹痛，

心中烦躁。

30775 地骨皮散

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】地骨皮 丹皮 生地 知母 黄芩 金钗石斛 北沙参 鳖甲

【用法】水煎服。

【主治】麻疹退清之后，虚热神昏，阴虚血热者。

【加减】如在春、夏，加陈青蒿一钱，其热自退。

30776 地骨皮露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】地骨皮一斤

【用法】用蒸气蒸馏法，每斤吊成露五斤。每用四两，隔水温热饮服。小儿酌减。

【功用】清热解烦。

【主治】骨蒸内热。

30777 地扁竹散

【方源】《医统》卷九十三。

【组成】射干

【用法】上为末。每用小钱抄末三字许，温酒调下。病在上即微吐，在下即微泻。仍用麒麟竭膏收敛疮口。

【主治】恶疮。

30778 地菰苗散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】地菰苗 石灰末 旋覆苗 葛叶 青蒿苗 麦门冬苗各五两

【用法】上除石灰外，切碎，绞取汁，和石灰作饼子，晒干，再为散。敷疮上。五月五日合佳。

【功用】止血。

【主治】金刃伤筋骨。

30779 地黄小煎

【方源】《千金》卷十二。

【组成】干地黄(末)一升 蜜二升 猪脂一斤 胡麻油半升

【用法】上以铜器中煎令可丸，即丸如梧桐子大。每服三丸，饮送下，一日三次。稍加至十丸。

【功用】久服，瘦黑者肥充。

【主治】五劳七伤，羸瘦干削。

30780 地黄汁汤

【方源】方出《千金》卷十，名见《外台》卷四。

【组成】大黄一两半（末） 生地黄（汁）八合 芒消一两

【用法】上合和。每服五合，一日二次。以利为度，不须二服。

【主治】急黄，热气骨蒸，两目赤脉。

30781 地黄汁汤

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】地黄汁半合 黄芩三分 大黄甘草（炙）各一分 梔子仁二分

【用法】上切。以水八合，煮至四合，去滓，下地黄汁，每服一合，日进三服，夜一服。

【功用】除热。

【主治】少儿始满月变蒸，时患惊，欲作痢，已服紫丸，已大下热犹不折，腹满胀，目视高者。

30782 地黄花粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】地黄花（阴干）

【用法】上为末。每用粟米两合，净淘煮粥，候熟入末三钱匕，搅匀，更煮令沸，任意食之。

【主治】消渴。

30783 地黄饮子

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】生地黄汁六合 芦根一握 生麦门冬一升（去心） 人参八分 白蜜三合 橘皮六分 生姜八分（一方云生姜汁一合）

【用法】上切。以水六升，煮取二升，去滓，下地黄汁，分三次温服，如人行四五里更进一服。

【主治】虚热，呕逆不下食，食则烦闷。

【宜忌】忌茺莢、生冷面、炙肉、荞麦、猪肉、蒜、粘食。

【备考】本方方名，《医心方》引作“地黄

饮”。

30784 地黄饮子

【方源】《外台》卷三十五引《广济方》。

【组成】生地黄汁三合 生姜汁三合 诃黎勒四分（末） 白蜜一匙

【用法】上相和调匀。分温服之。微利尤良。

【主治】小儿心腹满，吃食不下。

30785 地黄饮子

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】地黄汁 藕汁各一碗 生姜汁一盞

【用法】令和暖，分三四次温服。微有寒，煎二十沸服之。

【主治】小产后，其恶露被热蒸断不行；亦治死胎不下。

30786 地黄饮子

《宣明论》卷二。为《圣济总录》卷五十一“地黄饮”之异名。见该条。

30787 地黄饮子

【方源】《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》卷一二五）。

【异名】生地黄饮子（《得效》卷七）、生津地黄饮子（《证治宝鉴》卷四）、地黄饮（《医林纂要》卷四）。

【组成】人参（去芦） 生干地黄（洗） 熟干地黄（洗） 黄耆（蜜炙） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 枳壳（去瓢，麸炒） 石斛（去根，炒） 枇杷叶（去毛，炒） 泽泻 甘草（炙）各等分。

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【功用】《中国医学大辞典》：滋补气血。

【主治】①《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》）：消渴咽干，面赤烦躁。②《医钞类编》：消渴，阴虚火炎，阳明苑热。

【方论选录】①《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》）：此方乃全用二黄丸、甘露饮料生精补血润燥止渴；佐以泽泻、枳壳疏导二腑，使心火下行，则小腑清利；肺经润

泽,则大腑流畅,宿热既消,其渴自止。②《医林纂要》:此方意在滋阴血以济亢阳,故麦冬、枇杷叶所以佐天冬而清肺;黄耆、甘草所以佐人参而和脾胃;生地、泽泻所以佐熟地而滋肾;引肾水以上荣,而亢阳不能害,则于石斛取之。固其本根达其条枚,荣其枝叶,破其上逆之势,而泻其余邪。三焦之气顺,心包之血滋,火散而气清,润泽荣华,无烦躁咽干之病。

30788 地黄饮子

《东垣试效方》卷三。为《兰室秘藏》卷上“和血益气汤”之异名。见该条。

30789 地黄饮子

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】生地黄 赤芍药各二钱 羌活(去芦) 当归(去芦) 甘草各一钱

【用法】上为极细末。用灯心煎汤,食前服。乳母宜服。

【主治】小儿生下,满身面目皆黄,状如金色;或面赤身热,眼闭不开,大便不通,小便如梔子汁,满身生疮。

【宜忌】忌酒、面、五辛之物。

【备考】本方方名,《丸散膏丹集成》引作“地黄饮”。

30790 地黄饮子

【方源】《简明医彙》卷三。

【组成】生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 黄芩 天门冬 芍药 黄耆 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服七钱,水二钟,煎八分,去滓,空腹服。

【主治】血热所致吐血、衄血、下血、溺血。

【加减】如脉微、身凉、恶风者,加桂二分。

30791 地黄饮子

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】生地黄 丹皮 天门冬 黄芩 地骨皮 白芍

【主治】肝肾精竭,血燥劳瘵,及血分有火之鼻衄。

【加减】若尺脉大,加黄柏、知母。

30792 地黄饼子

《御药院方》卷九。为《圣济总录》卷一一九“地黄饼”之异名。见该条。

30793 地黄酒酥

【方源】《千金翼》卷十二。

【组成】粗肥地黄十石(切,捣取汁三石) 麻子一石(捣作末,以地黄汁研取汁二石七斗) 杏仁一石(去皮尖双仁,捣作末,以麻子汁研取汁二石五斗) 曲末三斗

【用法】上以地黄等汁浸曲七日,候沸,以米三石,分作三份投下,饷一度,以药汁五斗,和饷酿酒,如家酿酒法,三日一投,九日三投。熟讫,密封三七日,酥在酒上,其酥色如金,以物接取,可得大升九升酥。然后下簍取酒封之。其糟令服药人食之,食糟尽,乃服药酒及酥。每服酒一升,一匙酥,温酒和服之。其地黄滓晒干,更以酒三升和地黄滓捣之,晒干,作饼服之。

【功用】令人肥悦,百病除愈,发白更黑,齿落更生,髓脑满实,还年却老,走及奔马,久服有子。

【宜忌】宜吃白饭、茺菁。忌生冷,酥滑、猪、鸡、鱼、蒜。

30794 地黄蒸丸

《医学从众录》卷一。为《普济方》卷十五引《千金》“地黄煎”之异名。见该条。

30795 地黄電方

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】生地黄(洗,切,研) 藏瓜姜内糟 生姜(洗,切,研)各一两

【用法】上同以慢火炒,乘热電损处,以帛系之,每日一换。

【主治】伤损,骨蹉跌。

30796 地黄傅饴

【方源】《外台》卷七引《古今录验》。

【异名】地黄面(《本事》卷七引崔元亮《海上方》)。

【组成】地黄(浓捣汁)

【用法】和而作傅饴。服一顿,虫即出;不出再服,必出便愈。

【主治】心痛如虫啮痛，宛转欲死者。

【宜忌】冷淘忌用盐。

【方论选录】《本事方释义》：生地黄气味甘苦微寒，入手足少阴、厥阴；捣汁和以面者，以五谷之气令其入胃也。此心痛有虫，久不得愈，以苦寒之药佐之以面，引虫之上逆而出也。

【临证举例】心痛 正元十年，通事舍人崔抗女患心痛，垂气欲绝，忽记此方，服便吐出一物，可方一寸以来，状如虾蟆，无目足，微似有口。盖被此物所蚀。抗云，往年见亲表患痛，因偶食地黄饅饅，遂吐一虫犹动，其时亦不谓地黄冷淘，能害此虫。因盛于小竹筒，以数茎地黄冷淘，投于竹筒中，须臾视之，已化为水。然觉此冷淘杀虫，心痛无不永绝。抗自得此方，救三四人皆如神效。

30797 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生地黄五十斤（拣择好者，洗，捣取汁） 无灰酒三斗（上二味，于银锅中慢火熬成膏，入后药） 肉苁蓉三两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 枸杞子二两 巴戟二两 薯蓣二两 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 山茱萸 五味子 茯神 续断 补骨脂（微炒） 远志（去心） 蛇床子 附子（炮裂，去皮脐） 石斛（去根，锉） 覆盆子 黄耆（锉） 芎藭 木香 桂心 牛膝（去苗） 菟丝子（酒浸一宿，焙干，别捣为末） 人参（去芦头） 沉香各一两半

【用法】上为末，入前煎和为丸，如梧桐子大。每日四十丸，空心及晚食前以温酒调下。

【功用】添精补髓，益气养神，驻颜，调血脉，令入轻健。

【主治】肾脏劳损。

30798 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生地黄八斤（净洗晾干，捣绞取汁） 大麻仁半斤（以水研滤取汁） 牛髓一斤 白蜜二斤 无灰酒五升 大枣五十枚

（煮取肉，烂研） 生天门冬一斤（捣绞取汁）（上七味，同于银锅中熬成膏，入后药末） 鹿角胶五两（捣碎，炒令黄燥） 石斛一两（去根，锉） 覆盆子二两 酸枣仁一两（微炒） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 人参二两（去芦头） 附子二两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 白茯苓二两 五味子二两 熟干地黄三两 补骨脂三两（微炒） 干漆二两（捣碎，炒令烟出） 肉桂三两（去皱皮） 杜仲二两（去粗皮，炙令黄，锉） 菟丝子三两（酒浸一宿，晒干，别捣罗为末）

【用法】上为末，入前地黄煎汁，以慢火熬，候可丸，即丸如弹子大。每服一丸，空心、午前、晚饭后以温酒化下。若丸如梧桐子大，每次服二十丸。其药腊月合弥佳。

【功用】填骨髓。

【主治】骨极，肾脏劳伤，少气不足，羸瘦无力，肢节痠疼，腰脚多痛，不能久立。

30799 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生地黄五斤（拣择好者，捣绞取汁） 无灰酒一斗（与上一味于银锅中以慢火熬成膏，入后药末） 巴戟一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 桑螵蛸一两（微炒） 五味子一两 蛇床子一两 石斛一两（去根，锉） 附子二两（炮裂，去皮脐） 补骨脂二两（微炒） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 黄耆一两（锉） 牛膝一两（去苗） 菟丝子一两（酒浸一宿，晒干，别捣罗为末） 石龙芮一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 沉香一两 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为末，用前地黄煎和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】益气养神，驻颜色，调血脉，久服令人肥健。

【主治】精极，五脏六腑虚羸，骨节烦疼，精常漏泄。

30800 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】生地黄五斤（洗净，肥好者） 巨胜子三两 牛膝三两（去苗） 桂心三两 生黄精五斤（洗净，同地黄子木臼中烂捣，绞取汁，旋更入酒三升，于银锅中慢火熬成膏） 附子三两（炮裂，去皮脐） 干漆三两（捣碎，炒令烟出） 肉苁蓉三两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 补骨脂三两（微炒） 鹿角胶三两（捣碎，炒令黄燥） 菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为末，入地黄、黄精膏中，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【功用】益脏腑，久服轻身，驻颜色，强志力，补虚损。

【主治】虚劳，精少。

30801 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】生地黄五斤（肥好者） 巨胜子三两（微炒） 牛膝二两（去苗） 威灵仙二两 生黄精三斤（与黄精同净洗，于木臼中烂捣，绞取汁，旋更入酒三升，于银锅中以慢火熬成煎） 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 桂心二两 附子三两（炮裂，去皮脐） 干漆二两（捣碎，炒令烟出） 补骨脂三两（微炒）

【用法】上为末，入地黄、黄精煎中，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【功用】补暖脏腑，久服轻身，益颜色，强志力，补虚损。

30802 地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】生地黄五斤（捣，绞取汁，入蜜半斤，以慢火熬成煎） 熟干地黄半斤 牛膝五两（去苗） 杏仁半斤（汤浸，去皮尖，麸

炒微黄，研如膏） 诃黎勒皮三两

【用法】上为末，以地黄煎和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以空心温酒送下，晚食前再服。

【功用】补益驻颜，长服黑发髭，填骨髓。令人耐老。

30803 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】生地黄汁六升 生天门冬汁五合 牛髓五合 生姜汁七合 牛酥五合 白蜜五合 醇酒二升 枣肉膏（去核）五合（以上八味，先煎地黄汁并酒，五分减二分，次下天门冬汁、姜汁，煎二十沸，次下牛髓、酥、蜜、枣膏，煎如稀糖，次下后散药） 黄耆（锉） 石斛（去根） 人参 山芋 茯神（去木） 柏子仁（别捣研） 山茱萸 桂（去粗皮） 五味子 防风（去叉） 枸杞子 枳壳（去瓢，麸炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 白术各半两 干姜（炮）半两 赤石脂（别捣研） 甘草（炙，锉）各一两 远志（去心） 细辛（去苗叶）各一分

【用法】上除前八味外，捣研为末，入前煎中搅匀，于银器中重汤煎至可丸，即丸如梧桐子大。每服三十丸，空心、早食后温酒送下，一日二次。

【主治】风惊邪，心虚，冷热不调，左肋下有气，发即妨胀不能食。

30804 地黄煎丸

《圣济总录》卷五十八。为《千金》卷二十一“地黄丸”之异名。见该条。

30805 地黄煎丸

《圣济总录》卷八十七。为《苏沈良方》卷一“治劳地黄丸”之异名。见该条。

30806 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】地黄汁一升（煎成煎） 鹿茸（去毛，酥炙黄色）半两 人参一两半 茯神（去木）半两 防风（去叉）半两 甘草（炙，锉）一两

【用法】上为末，以地黄煎为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心温酒送下。

【功用】补益，镇心，强志。

【主治】虚劳脱营，失精少气，形体日减。

30807 地黄煎丸

《圣济总录》卷九十二。为《普济方》卷十五引《千金》“地黄煎”之异名，见该条。

30808 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】生地黄五斤（捣取汁） 无灰酒一斗（银石器盛，入地黄汁，用文武火熬成膏，后入诸药） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）二两 巴戟天（去心） 鹿茸（酒炙，去毛） 桑螵蛸（炒） 附子（炮裂，去皮脐） 黄耆（锉） 肉豆蔻（去壳）各一两 五味子（炒） 蛇床子（炒） 石斛（去根） 补骨脂（炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 青木香 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分 枳壳（去瓢，麸炒） 草澄茄 沉香各半两（锉）

【用法】上为末，以地黄煎搜和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】益气养神，驻颜色，调血脉。

【主治】精极，脏腑虚羸，骨节烦疼，精泄不止。

30809 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】生地黄（汁） 小蓟（汁）各一升 沙糖一两（同上二味熬成膏） 地榆根（锉，焙） 阿胶（炙令燥） 侧柏（焙）各二两

【用法】上为末，入膏中和丸，如小弹子大。每服一丸，水一盞，煎至六分，和滓温服。

【主治】结阴便血。

30810 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】地黄汁 生姜汁 青蒿汁各一盞（同熬成膏） 麒麟竭（研） 没药（研） 延胡索 凌霄花 红蓝花各半两

【用法】上五味各为末，与前膏子和匀为

丸，如弹子大。每服一丸，烧秤锤投酒化下。

【主治】妇人月候久不行，心忪体热，面颊色赤，不美饮食，脐下刺痛，腰膝重疼。

30811 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】生地黄（肥者，细切，研烂绞汁）十斤 生姜（去皮，研烂绞汁）一斤半（二味汁于微火上煎令如稀汤） 干漆（炒令烟尽） 桂（去粗皮） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 当归（切，焙） 生干地黄（焙） 芍药 牡丹皮 牛膝（去苗，酒浸，炙黄，锉碎）各二两 大黄（煨，锉）一两半 水蛭（糯米炒） 虻虫（去翅足并头，炒）各一百枚

【用法】上为末，入前地黄煎中，以微火上煎，硬软得所，即丸如梧桐子大。每服七丸，空心、食前温酒送下。

【主治】妇人因月水不调，血结不通，血积小腹成块，如覆杯。

30812 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】生地黄二十斤（洗，捣取汁） 熟干地黄（焙）二斤 生干地黄（焙）二斤 甘草（炙，锉）半斤 醇酒一斗（用无灰者） 菟丝子（酒浸，别捣） 鹿角胶（炙燥） 白蒺藜（炒，去角） 牛膝（酒浸，切，焙） 干漆（末，用酒拌和，炒令烟尽） 白茯苓（去黑皮） 白槟榔（煨，锉） 枳壳（去瓢，麸炒） 草薢 覆盆子（去梗）各四两

【用法】上除生地黄汁并酒外，余各为细末。先取地黄汁与酒五升，于银锅内慢火煎三十沸，次下鹿角胶搅匀消尽，次下地黄末，又次下诸药，添酒，以柳枝不住手搅，候堪为丸，即分为二十剂，余以蜡纸裹于宽瓷瓶内封贮。旋取一剂，为丸如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前温酒送下，用地黄酒下尤佳。余药收经三月余，取于日中晒之，依前收封。

【功用】平补诸虚，牢牙齿，荣须发，久服

坚筋骨，长肌肉，悦颜色，聪耳明目，令人壮健。

【主治】虚劳诸风。

30813 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】生地黄七斤（洗五遍，取汁，余滓更入酒二升同研，更挾汁银石器内，慢火熬成膏）熟干地黄（焙）生干地黄（焙）各五两 山芋二两 黄耆（锉）远志（去心）五味子 牛膝（酒浸，焙）柏子仁 干枣肉（焙）巴戟天（去心）各一两 干漆三钱（末，酒炒烟尽）枸杞子（去蒂）石菖蒲（九节者）各二两 桂（去粗皮）半两

【用法】上除前膏外，共为末，入膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】补虚续绝，益精髓。

30814 地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】地黄二十斤（沉者，净洗，阴干，令水脉尽，木臼内杵，绞汁，余滓更入法酒五升，重杵，再绞，与前叶相和于银石器内，慢火煎，柳木篦子搅，膏成放冷，更入乌鸡子清十枚，大麻油五合搅匀，次入诸药）山芋四两 鹿角胶（炙燥）三两 山茱萸（焙）一两 牛膝（酒浸，切，焙）肉苁蓉（去皱皮，酒浸，切，焙）菟丝子（酒浸一宿，烂捣，拍作饼，焙）巴戟天（去心）白茯苓（去黑皮）虎骨（酥炙）附子（炮裂，去皮脐）干漆（炒）牡丹皮（锉，焙）泽泻（炮）续断各二两 生干地黄（焙，木臼捣）熟干地黄（焙，木臼捣）甘草（炙，锉）各四两

【用法】上为末，入地黄煎为丸，如梧桐子大。每服四十丸，渐加至六十丸，早晨、日午空心温酒或盐汤送下。

【功用】调顺营卫，补填骨髓，续筋脉，助真元，滑肌肉，驻颜益气，乌髭发。

【主治】诸虚损。

【宜忌】①《圣济总录》：服药后忌房事百日。②《普济方》：忌食葱、萝卜、蒜。

【备考】本方方名，《普济方》引作“平补熟干地黄丸”。

30815 地黄煎丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【异名】琥珀地黄丸（《妇人良方》卷十九）。

【组成】生地黄二斤（以布袋取汁，留滓）生姜二斤（以布袋研取汁，留滓。以生姜汁炒地黄滓，以地黄汁炒生姜滓，至干）蒲黄四两 当归 延胡索（糯米内炒赤，用末）各一两 南番琥珀三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食前当归汤送下，一日二次。

【主治】妇人胎前产后，眼见黑花，或即发狂，如见鬼状；胎衣不下，失音不语，心腹胀满，水谷不化，口干烦渴，寒热往来，口内生疮，咽中肿痛，心忪悸，夜不得睡；产后中风，角弓反张，面赤，牙关紧急，崩中下血，如豚肝状，身体烦躁，恍惚昏迷，四肢肿满；及胎不安，唇口指甲青，下血，脐腹满痛。

30816 地黄煎丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】生干地黄（洗，切，焙干）熟干地黄（洗，切，焙干）各二两 薄荷叶二两半（洗去土）甘草一两半（切，微炒）山梔子仁一两半 片白脑子一钱（别研）

【用法】上为细末，后人脑子，同研匀，炼蜜为丸，每一两作四十丸。每服一二丸，乳食后、临卧温熟水化下。大人每服五丸至十丸。

【主治】①《杨氏家藏方》：小儿血热风壅，大人亦宜服之。②《奇效良方》：小儿风壅，上膈热烦，鼻衄口疮，咽喉肿痛，口舌生疮；或血热，五心常热，多渴饮水。

【备考】《奇效良方》有玄参七钱半。

30817 地黄煎丸

《妇人良方》卷五。为《中藏经》卷下“地黄煎”之异名。见该条。

30818 地黄煎丸

【方源】《普济方》卷一八八引《余居士选奇方》。

【异名】地黄丸（《朱氏集验方》卷七）、生地黄膏（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】生地黄一斤（洗净，细研取汁，其滓再入好酒少许，又取汁令尽） 附子一两（炮，去皮脐，切片子，入地黄汁内，用银器熬成膏，取出附子，焙干）

【用法】上以山药三两为末，以地黄膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】吐血，遍服药不效者。

30819 地黄煎丸

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】生地黄（新者）十两（洗，水浸研如泥） 黄连五两 黄芩（去腐）三两 枳壳（炒，去瓢） 大黄各二两五钱 人参二两

【用法】上除地黄煎外，共为细末，再和地黄煎，炼蜜为丸，如豌豆大。每服五七十丸，食后温水送下。

【功用】清利胸膈，明目。

【主治】脏腑有热，胸膈痰实，气血不和，经络秘涩，多生疮肿；或已患恶疮毒肿，大小便结涩。

30820 地黄煎丸

《普济方》卷三五二。为《本草纲目》卷三十五引《指南方》“万应丸”之异名。见该条。

30821 地黄膏子

【方源】《产乳备要》。

【异名】地髓煎丸。

【组成】熟地黄八两 净蜜十八两

【用法】将熟地黄为末，同蜜熬成膏子为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前温酒送下，米饮亦得；或作膏子，酒化服，

不饮酒，白汤亦得。

【主治】妇人本脏血气衰乏，经气不调，虚烦发热，肌体瘦悴，形羸弱困。饮食不进，欲成劳病。

30822 地黄膏子

《赤水玄珠》卷十五。即《元戎》卷十一“地黄膏子丸”，见该条。

30823 地黄敷方

【方源】方出《圣惠》卷六十七，名见《圣济总录》卷一四五。

【异名】地黄膏（《圣济总录》卷一四五）。

【组成】生地黄不限多少

【用法】熟捣，用醋熬令热，乘热摊于所伤处，以帛系之，每日一换。

【主治】腕折，四肢骨碎及筋伤，蹉跌疼痛。

30824 地黄敷方

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】生地黄二斤（洗，研） 芥菜子（研）四两

【用法】上为细末。入酥四两同煎沸，乘热敷患处，或以帛子系之，每日一换。

【主治】骨节蹉跌，内伤疼痛。

30825 地蒿蓄散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】耳环尻（又名琉璃草，又名花管草，又名地蒿蓄）

【用法】捣酒服。又以砍烂，酒炒，敷患处。

【主治】手中指头结毒，掀赤肿痛。

30826 地榆合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地榆 33 克 黄连 33 克 黄柏 33 克

【用法】上为末，再加冰片 1 克，调菜油 100 毫升，搽患处。

【主治】烫火伤。

30827 地榆饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】地榆一两 当归一两（锉，微炒） 酸石榴皮一两（锉，微炒） 秫米一两 薤白（切）二合

【用法】上锉和匀，分为六服。以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，腹痛不止。

30828 地榆饮子

【方源】方出《本草纲目》卷十四引《全生指迷方》，名见《鸡峰》卷十。

【组成】香附子 新地榆各等分

【用法】各煎汤，先服附子汤三五呷，次服地榆汤至尽。未效再服。

【主治】①《本草纲目》引《全生指迷方》：小便尿血。②《鸡峰》：小便凝涩。

30829 地榆油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地榆粉 31 克 冰片 2 克 麻油 60 毫升

【用法】调膏。外用。

【主治】胎火丹毒。

30830 地榆绢煎

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】地榆八两（洗净，捣罗为末） 绢一匹（小薄者）

【用法】上件绢，用清水洗净绢糊，用炭灰淋清汁二斗煮绢，以灰汁尽为度。绢已烂熟，擘得成片，段三寸至五寸，即取出压尽灰汁，入于清水内，洗三五次，令去灰力尽，重入锅内，以水二斗，入地榆末煎，煮熟烂，以手指捻看，不作绢片，取入砂盆研之，如面糊得所。分减二服，用白粳米粥饮调，空心服之。服后仰卧，不得惊动转侧、言语。其余一服，至来日空心，亦用粥饮调服。其将养一月内，切须慎护。如是产后所伤，服此药绢一匹，分作四服，每服用粥饮一中盏调服之，一日二次。

【功用】补定伤痕。

【主治】刀刃所伤，内损大肠及两胁肋；并腹肚伤破，大便从疮口中出；并中大箭透射，伤损肠胃；及产后伤损，小肠并尿囊破，小便出无节止。

【宜忌】忌一切毒食。只食熟烂黄雌鸡及白

米软饭，余物不可食之。

30831 地髓煎丸

《产乳备要》。为原书“地黄膏子”之异名。见该条。

30832 地髓煎丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】生地黄一斤（取汁） 牛膝（去苗，酒浸一宿，为末）

【用法】上将地黄汁银石器内熬成膏子如汤，搜和牛膝末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【功用】通经脉，补虚羸，强脚膝，润泽肌肤，和畅筋脉。

30833 地王止血散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【异名】地黄赤茯苓散（《不知医必要》卷二）。

【组成】海螵蛸 生地 赤茯苓各等分

【用法】上为末。每服一钱，柏叶、车前子煎汤送下。

【主治】①《惠直堂方》：尿血。②《不知医必要》：血淋

30834 地龙粉霜丹

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】粉霜二钱 蚯蚓粪一两（火焙干） 百草霜三钱 轻粉二钱 黄丹三钱（飞过） 生甘草二钱 冰片二钱 黄柏三钱（炒） 胡粉二钱

【用法】上为细末。点搽。

【主治】翻花杨梅疮。

30835 地龙粪饼子

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】地龙粪半两（研） 梔子仁半两（末） 牛蒡根三两（生者）

【用法】上捣令熟，硬软得所，捏作饼子。闭目卧，以搗眼上，时时易之。

【主治】眼赤痛。

30836 地芍芍桂汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地二两 茯苓五钱 白芍五钱

肉桂五分

【用法】水煎服。

【主治】伤风后下利，咽痛，胸满心烦。

30837 地肤大黄汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【异名】大黄散（《圣惠》卷七十四）。

【组成】地肤草 大黄各三两 知母 黄芩 茯苓（一作猪苓） 芍药 枳实（炙） 升麻 通草 甘草（炙）各二两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三次服。得下后，淋不愈，还饮地肤葵根汁。

【主治】实热子淋。

①《外台》引《小品方》：子淋。②《圣惠》：妊娠小便淋涩，脐腹妨闷。③《济阴纲目》汪淇笺释：实热而淋者。

【宜忌】忌海藻、菰菜、酢物。

【方论选录】①《济阴纲目》：此治实热而淋者，大便通则小便自利。②《医略六书》：妊娠胎肥火盛，热壅胃肠，而膀胱之气亦不能化，故小便涩痛，淋漓不已。大黄泻热通幽，水道亦得以快；枳壳泻滞化气，火热亦从下泄；地肤子利水道以通淋；猪苓利溺道以通闭；条芩清热安胎；白芍敛阴护胎；知母清热存阴以润燥；甘草泻火缓中以除痛；更以升麻升举清阳，而浊阴自降。水煎温服，使热降清升，则气得施化，而小便清长，何淋漓涩痛之有？胎孕无不安矣。

30838 地肤子洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地肤子 12 克 防风 10 克 独活 10 克 荆芥 10 克 白芷 10 克 赤芍 10 克 川椒 10 克 桑白皮 10 克 苦参 10 克

【用法】用水 1.5 升煎沸，洗浴。

【主治】皮肤瘙痒症，荨麻疹。

30839 地肤子煎剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地肤子 15 克 蛇床子 15 克

【用法】水煎洗。

【主治】毛囊炎。

30840 地参菊花汤

【方源】《古今名方》引杨慎修方。

【组成】熟地 玄参 菊花各 60 克 生石膏 10~30 克 升麻 0.5~5 克 蜂蜜 60 克

【用法】上加水 1000 毫升，煎成 300 毫升，徐徐服之。

【功用】补阴，清热，止痛。

【主治】阴虚胃热牙痛。

30841 地柏清肠汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】鲜生地六钱 生侧柏叶四钱 银花 茜草 赤芍 夏枯草 血见愁各二钱 紫葳花二钱

【用法】先用鲜茅根、生藕各二两，煎汤代水。

【功用】凉血泄热。

【主治】肠热，粪后下血，鲜红光泽，或色深紫，或有凝块紫亮者。

30842 地骨白皮汤

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】地骨白皮半斤 白杨皮半两 盐一两 白矾末一两

【用法】上锉细。每用药五两，以水九升，煎取二升，去滓，更煎至一升，收瓷器中，用绵蘸拭所患处。五七次愈。

【主治】风瘾疹。

30843 地骨皮饮子

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】地骨皮二两 生干地黄一两 人参一两（去芦头） 麦门冬二两（去心） 白龙骨一两 黄耆一两（锉）

【用法】上锉细。每服半钱，以水一大盏，加生姜半分，小麦半合，煎至五分，去滓，每于食前温服。

【主治】肾中虚热，虽能食，小便数多，渐加瘦弱。

30844 地胆甘草散

【方源】方出《外台》卷二十三注引刘涓子方，名见《普济方》卷二九三。

【组成】雄黄一分 干姜一分 龙胆二分

(一作龙骨) 石决明 续断 菴苘根各一分
细辛二分 大黄半分 地胆一分(熬) 甘草一分

【用法】上为散。敷疮，每日四五次。

【主治】因思虑忧忆伤胆而致浮沮痿，发于颈，如两指，使人寒热欲卧。

【宜忌】忌生菜。

【方论选录】《千金方衍义》：《本经》言地胆治鬼疟寒热，鼠痿，恶疮死肌，破癥瘕，堕胎。其破血辟毒之力最猛。甘草之佐，非助其力，解其毒耳。其余诸味，虽寒热错杂，不出解散之意，以浮沮病不在里，仅用外敷足矣。

【备考】《外台》注文引《古今录验》有硫黄，无雄黄。方中甘草原缺，据《千金》补。

30845 地黄二至丸

【方源】《马培之医案》。

【组成】大生地二钱 女贞子三钱 泽泻一钱半 怀山药二钱 当归一钱半 怀牛膝一钱半 旱莲草一钱半 丹皮一钱 川断一钱半 桑枝三钱

【主治】肝肾阴虚生热，背驼足弱，小溲不利。

30846 地黄人参汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】生地黄 人参 熟地黄 枇杷叶各一钱 甘草四分 黄耆八分 天门冬 麦门冬 泽泻 石斛各七分

【用法】上咬咀。以水二钟，煎一钟，食前温服。

【主治】心膈有热，消渴，咽干，面赤。

30847 地黄干漆丸

【方源】《医方类聚》卷一四五引《千金月令》。

【组成】肥地黄三十斤(烂捣取汁，向灶釜中微火煎如饴，即下鹿角胶末) 鹿角胶四两(炙令通起，捣为末，余者炒为珠子，捣令尽) 甘草半斤(炙，末) 生干地黄末二斤 干漆末四两(其漆以微火铛中熬令烟

尽，即着少酒挹之，又以微火煎之，令干，待冷入之) 乌鸡子十颗(去黄取白用) 覆盆子末四两 葶藶末四分 槟榔末五两 枳壳末四两(去瓢，炒了称，捣末)

【用法】上以微火煎，搅勿住手，渐点清酒二斗令尽，勿令焦，但堪作丸即止，分为十二团，各以蜡纸裹，着瓷瓶中，可一年服之。腊月合和，至二月三月即于烈日中晒之，即不坏。每服二十丸，一日二次。

【功用】久服走及奔马，八十有子息。

【宜忌】忌萝卜、蒜、藕、冬瓜、莲子、贝母、白药。

30848 地黄大补丸

【方源】《痼疽神秘验方》。

【组成】龟版(酒炙)一两半 黄柏(酒炒)五钱 知母五钱(去皮，酒拌，捣膏) 人参二两 生地黄一两半(酒拌，铜器蒸半日，捣膏)

【用法】上为细末，入二膏，炼蜜或酒糊丸，梧桐子大。每服七八十丸，空心温酒送下，盐汤亦可。

【主治】痼疽愈后作渴。

30849 地黄门冬汤

【方源】方出《千金》卷五。名见《医部全录》卷四二二。

【组成】干地黄四两 麦门冬 五味子 蜜各半升 大黄 消石各一两

【用法】上咬咀。以水三升，煮取一升，去滓，纳消石、蜜，煮令沸，每服二合，一日三次。大者服五合。

【主治】小儿寒热咳逆，膈中有癖，吐乳，不欲食。

30850 地黄门冬酒

【方源】方出《千金》卷十四，名见《千金方衍义》卷十四。

【组成】天门冬十斤 地黄三十斤

【用法】上捣取汁，作煎服。

【主治】①《千金》：风癰。②《千金方衍义》：阴虚癰妄。

【方论选录】《千金方衍义》：《千金》治癰都用祛风破结，此独养正除邪，盖生地黄有逐血除痹之功，天门冬有暴风湿痹、强骨髓、去伏尸之治。至于酿酒为煎，补益多端，岂止治风癰恶疾而已哉。

30851 地黄五味丸

【方源】方出《百一》卷六。名见《普济方》卷一九〇。

【组成】生地黄 熟地黄 五味子各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心用好酒送下，一日三次。

【主治】妄行吐血。

30852 地黄双桂汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引叶氏验方。

【组成】熟地三钱 桂枝尖 紫萸桂各五分 酒炒白芍一钱半 当归 茯苓各一钱

【主治】怯寒脉虚，当脐痛，便溺不利。

30853 地黄艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【异名】艾叶汤（《普济方》卷三四四）。

【组成】熟干地黄（焙） 艾叶（炒）各二两 人参 地榆 干姜（炮裂） 阿胶（炒燥） 当归（切，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠卒下血不止，腰腹疼痛。

30854 地黄石斛丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】生地黄五斤（研取汁，银石器中熬去半，入白蜜四两，慢火熬成膏） 石斛（去根） 巴戟天（去心） 牛膝（去苗，切，酒浸，焙） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙） 桂（去粗皮） 补骨脂（炒） 鹿角胶（炒令燥） 菟丝子（酒浸，别捣末） 木香 附子（炮裂，去皮脐） 枸杞子（焙） 鹿茸（去毛，酥炙）各一两

【用法】上为末，入膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、临卧温酒或盐汤送下。

【功用】补虚，益精髓。

30855 地黄加减汤

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】地黄汤加知母 黄柏 麦冬

【主治】阴虚火旺，便浊。

30856 地黄芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】生干地黄（焙） 芍药 当归（锉，炒） 独活（去芦头） 细辛（去苗叶）各二两 桂（去粗皮） 吴茱萸（水浸经宿，炒令香） 干姜（炮裂） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气虚冷，攻心腹痛。

30857 地黄芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】熟干地黄（焙）一两 芎蒭三分 白茯苓（去黑皮）半两 人参 当归（切，焙）各三分 柴胡（去苗） 刺藟 桑寄生（焙干）各半两 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙）一两 龙骨 阿胶（炒沸） 白石脂各三分 黄耆（锉）半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，一日三次，不拘时候。

【功用】和气养胎。

【主治】妊娠气血虚弱，令胎不长。

30858 地黄当归汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】地黄汁五合（如无，用干地黄三两，水渍，研汁代之） 蜜三合 当归（锉细） 白术（锉细）各一两

【用法】先将当归 白术，用水二盞，煎至一盞，去滓，下地黄汁并蜜和匀，分作三服，相继服尽。

【主治】颜色干枯，目下赤，口干舌缩，心中恍惚，四肢烦重，此名白黄。

30859 地黄当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】熟干地黄(焙) 赤石脂各二两 当归(切,焙) 木占斯 地榆 黄连(去须) 白茯苓(去黑皮)各一两 天雄(炮裂,去皮脐) 黄芩(去黑心)各半两 桑耳 紫葛(锉) 麻黄(去根节) 黄耆(锉)各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,同煎至八分,去滓温服。

【主治】产后血虚烦渴,饮食不进。

30860 地黄当归汤

《保命集》卷下。即《本事》卷十“内补丸”改为汤剂。见该条。

30861 地黄肉桂汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】党参(去芦,米炒)三钱 熟地四钱 半夏(制) 归身各二钱 吴萸(泡)七分 肉桂(去皮,另煨)六分

【功用】热补。

【主治】反胃。病在下焦,朝食暮吐,暮食朝吐,食入久而反出。

30862 地黄竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生地黄(切,焙)一斤 青竹茹五两 黄芩(去黑心) 当归(焙) 甘草(炙) 芍药 芎藭各三两 桂(去粗皮)一两 釜月下焦黄土一块如鸡子大。

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服。

【功用】消热结。

【主治】衄血,血汗。

30863 地黄羊脂煎

【方源】《外台》卷三十四引《古今录验》。

【组成】生地黄汁一升 生姜汁五升 羊脂二斤 白蜜五升

【用法】先煎地黄汁,令余五升,下羊脂,煎减半,次下姜,次下蜜,便以铜器盛,着汤中煎令如饴状。每服以酒一升,取煎如鸡子大。投酒中饮,一日三次。

【主治】产后诸病羸瘦。

【方论选录】《千金方衍义》:地黄纯阴滋腻,能治伤中淋露;羊脂性温益津,能固肠胃虚脱;蜂蜜解毒和中,能除心腹邪气;以产母素禀燥热,故聚润剂以滋之。姜汁辛散,专行三味之腻也。

30864 地黄豆豉汤

《治痘全书》卷三。为方出《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》,名见《奇效良方》卷六十五“地黄雄黄散”之异名,见该条。

30865 地黄赤茯苓

《不知医必要》卷二。为《惠直堂方》卷二“地王止血散”之异名。见该条。

30866 地黄余粮汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】熟地黄 禹余粮 五味子

【主治】久痢,阴伤气陷,肛坠尻痠。

【方论选录】肛门坠而尻脉痠,肾虚而津液消亡之象,故以熟地、五味补肾而酸甘化阴,余粮固涩下焦,而痠可除,坠可止,痢可愈也。

30867 地黄沉香丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】沉香(锉) 鹿茸(酒浸,去皮,酥炙) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 牛膝(酒浸,切,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 菟丝子(酒浸一宿,别捣为末)各三两 黄耆(锉)一两 熟干地黄(焙)四两 茯苓子(炒去角)二两 巴戟天(去心) 芎藭 石斛(去根) 木香 山茱萸 羌活(去芦头) 补骨脂(炒) 蛇床子(炒) 人参 楝实(取肉) 桂(去粗皮) 槟榔(锉) 茴香子 骨碎补(去毛) 安息香(用胡桃瓢二枚,先研)各一两

【用法】上为末,别取地黄自然汁七升,枣膏四两,酒三升,蜜半斤,酥五两,于银石器中熬如膏,放冷,入羯羊筒骨骨髓半升,炼油去滓,和前末为丸,如梧桐子大。每服三十丸,加至四十丸,空心温酒或盐汤送下。

【功用】补虚益气。

【主治】上热下冷，五劳七伤。

30868 地黄阿胶散

【方源】方出《圣济总录》卷六十八。名见《普济方》卷一八八。

【组成】地黄汁六合 牛皮胶一两（细研）生姜一块如大拇指（捶碎）

【用法】上先以二味于铜器中煎十数沸，次下牛皮胶，煎令消，滤去生姜，分作两服。或微利一行，不妨。

【主治】肺损，吐血不止。

30869 地黄青娥汤

【方源】方出《岳美中医案集》，名见《古今名方》。

【组成】熟地黄 12 克 山茱萸 6 克 怀山药 6 克 建泽泻 4.5 克 粉丹皮 4.5 克 云茯苓 4.5 克 枸杞果 6 克 甘菊花 3 克 五味子 4.5 克 麦门冬 4.5 克 补骨脂 3 克 胡桃肉 3 克

【用法】水煎服。

【功用】滋养肝肾。

【主治】颤抖症，手颤动不休，平举更甚，腿痿软，头晕，视物模糊，大便溏泻，日行二至三次，舌红无苔，脉弦细。

30870 地黄金粉散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【异名】地黄汤（《鸡峰》卷九）、生地黄汤（《普济方》卷二十九）。

【组成】地黄半斤（取自然汁） 飞罗面四两

【用法】同调成糊，摊于漆盘内，候干取下为末。每服二钱，以陈米饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳吐血，消瘦。

①《圣惠》：虚劳，心肺热吐血。②《鸡峰》：劳瘦。③《普济方》：肾气虚弱。

30871 地黄金粉煎

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】生地黄一斤（净洗令干，切，入酒内浸二复时取出，纸袋盛，火焙令干，为粉） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 桂心一

两 当归一两 芎藭一两 桃仁一两（汤浸去皮尖双仁，微炒）

【用法】上为末，入金粉内和令匀，用酒二斗，以文火煎成稠煎。每服一匙头，空心、午前、夜卧时各以温酒调下。

【功用】散瘀血，理新血，续筋骨，止疼痛。

【主治】伤折筋骨后，疼痛不止。

30872 地黄茵陈汤

《幼科发挥·附方》。为《普济方》卷三六一“地黄汤”之异名，见该条。

30873 地黄养血汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】熟地一钱二分 归身一钱 柴胡五分 茯苓一钱 白芍一钱 蔓荆八分 枣仁一钱 丹皮一钱 炙草五分 远志肉一钱二分 川芎一钱 黄耆一钱二分 升麻三分

【主治】血虚气陷，经行发热，兼头重目暗。

【方论选录】是方四物、远、枣以补肝、肾二经之血，耆、苓、炙草以补气，升、柴举下陷之阳，蔓荆子引诸药上行至头面巅顶为使也。

30874 地黄益母汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】生地黄汁 益母草汁各半碗

【用法】上药各取半盏，同煎至七分，每日三五次。

【主治】妇人血伤不止，兼赤白带下。

30875 地黄通经丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】生地黄三两 虻虫 水蛭 桃仁各五十个

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，酒送下。未效，加至七丸。

【主治】①《鸡峰》：经候顿然不行，疔痛，上攻心腹欲死，或因不行，积结渐渐成块，脐腹下如覆杯，久成肉癥。②《校注妇人良方》：产后恶露，脐腹作痛。

【备考】方中生地黄，《妇人良方》作“熟地黄”。

30876 地黄黄芩汤

【方源】《外科集腋》卷四。

【组成】射干 甘草 枳实 升麻 干地黄 黄芩各二两 犀角六分 前胡三分

【用法】水五升，煎三升，加大黄一钱，煎一沸，去滓，入麝香二分，分三服。剂数以愈为度。

【主治】瘰疬。

30877 地黄黄连汤

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】川芎 生地 当归七钱 赤芍 梔子 黄芩 黄连三钱 防风一两

【用法】每服三钱，水煎服。

【主治】循衣撮空摸床。

【加减】脉实者，加大黄。

【备考】方中川芎、生地、赤芍、梔子、黄芩用量原缺。

30878 地黄鹿茸丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】熟地黄 赤芍药 当归 赤茯苓 桃胶各一两 鹿茸半两 血余四两

【用法】上为细末、白面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒或灯草汤送下。

【主治】虚淋。

30879 地黄鹿茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】鹿茸（燉去毛，酥炙） 续断（洗，干炒） 山药各三两 白艾（醋炒） 五味子（去枝） 白薇 卷柏 阿胶（锉，蛤粉炒成珠） 黄耆（蜜炙） 泽兰 厚朴（去粗皮，姜制，炙）各二两 熟地黄六两（酒浸） 肉苁蓉四两（酒浸，去土）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤送下。

【功用】补虚调经。

30880 地黄清肺饮

《婴童百问》卷八。为《医方类聚》卷二五四引《直指小儿》卷三“清肺饮”之异名。见该条。

30881 地黄雄黄饮

《痘治理辨》。为方出《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》，名见《奇效良方》卷六十五“地黄雄黄散”之异名。见该条。

30882 地黄雄黄散

【方源】方出《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》，名见《奇效良方》卷六十五。

【异名】地黄雄黄饮（《痘治理辨》）、地黄豆豉汤（《治痘全书》卷三）。

【组成】生地黄四两 淡豆豉四两

【用法】上以猪脂一斤和匀，露一宿，煎至六分，候冷，三分减去一分，去滓；下雄黄末一钱，麝香半钱搅匀，量儿大小饮。若太多反有所损。

【主治】①《幼幼新书》引《疹痘论》：小儿瘟毒，痘疮不出。②《奇效良方》：冬应寒反热，或被积寒暴发，热毒不得宣泄，而致温毒发斑，疮痘出不快，身斑如绵纹，心闷而咳，但呕清汁者。

30883 地黄紫苏煎

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生地黄三两 生姜二两（与地黄和研，绞取汁） 生玄参一斤 生天门冬（去心）半斤 生麦门冬（去心）一斤 紫苏子（炒，研）二两 生牛蒡四两（细切，与玄参至紫苏子四味烂研，以水少许拌匀，布绞取汁） 杏仁（去皮尖双仁）三两（研，别入）

【用法】上将两等药汁并杏仁和匀，于银石器中慢火煎令稍稠，停火，加白蜜五两，真酥二两和匀，于饭甑上蒸少时，候冷，以净器盛。每服一小匙，含化，一日三次，不拘时候。

【主治】肺痿喘嗽，涕唾稠粘，咽膈不利。

30884 地黄滋阴汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地五钱 茯苓三钱 麦冬（去心） 萸肉各二钱 牛膝（盐水炒）一钱五分 北味七分

【主治】咽喉肿痛，日轻夜重，痰声如锯者。

30885 地黄膏子丸

【方源】《元戎》卷十一。

【组成】血竭 沉香 木香 广茂（炮）玄胡 蛤蚧 人参 当归 川楝（麸炒）芍药 川芎 续断 白术 全蝎（炒）柴胡 茴香（炒）没药（以上分量不定，随症加减用之）

【用法】上为细末，地黄膏子为丸，如梧桐子大。每服二十丸，日加一丸，至三十丸，空心温酒送下。

【主治】男子、妇人脐下奔豚气块，小腹疼痛，卵痛，即控辜相似，渐成肿，阴肿痛，上冲心腹不可忍者。

【加减】多气者，加青皮、陈皮；多血者，加肉桂、吴茱萸。

【备考】本方方名，《赤水玄珠》引作“地黄膏子”。

30886 地黄薄荷汤

【方源】《岭南卫生方》卷中。

【组成】生地黄根 生薄荷叶不拘多少

【用法】上净洗，砂钵内捣烂，取自然汁，入麝香少许，并华水调下。如觉心间顿凉，不再服。

【主治】伤寒热瘴，头疼足热，发渴烦躁，不呕不泻，其脉洪实。

30887 地黄糟裹方

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】生地黄（洗，切，杵细）酒糟各一斤

【用法】上药拌和令匀。随肿处用药，遂旋以大碗盛，甑上蒸热，用布绢之类裹肿处，每日一换。

【主治】坠堕扑损，筋肉疼痛，瘀血凝滞，肿热不消。

30888 地榆甘草汤

《杂病源流犀烛》卷十七。为《圣济总录》卷九十七“地榆汤”之异名。见该条。

30889 地榆芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】苍术八两 地榆三两 卷柏三两 芍药三两

【用法】上咬咀。每服一两，水一大盏半，煎至一半，去滓温服。

【主治】泻痢脓血，乃至脱肛。

30890 地榆当归散

《鸡峰》卷十五。为《圣惠》卷七十五“当归散”之异名。见该条。

30891 地榆防风汤

《何氏济生论》卷三。即《保命集》卷中“地榆防风散”之异名。见该条。

30892 地榆防风散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】地榆防风汤（《何氏济生论》卷三）。

【组成】地榆 防风 地丁香 马齿苋各等分

【用法】上为细末。每服三钱，温米饮调下。

【主治】破伤中风、半在表、半在里、头微汗、身无汗。

【备考】方中地丁香，《医钞类编》作“紫花地丁”。

30893 地榆苦酒煎

《金鉴》卷四十五。为方出《圣惠》卷七十三，名见《医学入门》卷八“地榆散”之异名。见该条。

30894 地榆败毒散

【方源】《外科医镜》引沈雨苍方。

【组成】西党参三钱 羌活三钱 独活三钱 柴胡三钱 前胡三钱 甘草三钱 茯苓三钱 枳壳二钱（炒用） 抚芎二钱 桔梗二钱 生地榆一两 紫竹根一把 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】中狂犬毒，症见卒病心腹痛，神志不清，痛极无聊，自咬肌肉，甚者嚼瓷器衣服，闻声及风则战慄惊惕不安。

【临证举例】狂犬病 道光丙午路经湘潭，见米船伙卒病心腹刺痛，烦躁欲死，医不识何疾。同舟醴陵客大呼曰：殆哉，此癫犬略发，乃死证也。速用地榆败毒散大剂浓煎，一

剂神识清。再剂其病若失。

30895 地榆黄连散

【方源】方出《圣惠》卷九十三，名见《普济方》卷三九七。

【组成】地榆半两（微炙，锉） 黄连半两（去须，微炒） 木香半两 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿赤白痢，不欲饮食，四肢瘦弱。

30896 地榆槐角丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归（酒洗）二两 川芎一两 白芍（酒炒）一两 生地黄二两 黄连（酒炒）一两 条芩（酒洗）一两 黄柏（酒炒）一两 梔子（炒）一两 连翘一两 地榆二两 槐角一两半 防风一两 荆芥五钱 枳壳（去瓢）二两 茜根五钱 侧柏叶五钱 茯神五钱 陈皮五钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心白滚水送下，或加细茶亦可。

【主治】便血。

30897 地榆槐角丸

《全国中药成药处方集》（南昌方）。为《局方》卷八（宝庆新增方）“槐角丸”之异名。见该条。

30898 地榆解热汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】当归五钱 生地三钱 地榆 天花粉各二钱 黄芩 甘草 苏叶 大黄各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肺金干燥，伤风潮热，大便微硬。

30899 地榆槐皮丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】地榆四钱 槐根白皮三钱 白芍药一钱半 阿胶（蛤粉炒，去蛤粉）一钱 当归（去芦，洗净）一钱 乌梅肉二钱半 木瓜一钱半 枳壳（去瓢，麸炒黄）一钱 茯

苓一钱 肉豆蔻一个（面裹煨，去面） 甘草二钱（炙） 木香一钱 绵姜半钱（炮） 金樱子二钱 人参（去芦）半钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服二十丸，乳食前米饮送下。

【主治】小儿虫痢，肠中蓄毒，下血如豆汁，或诸恶物。

30900 地鳖紫金丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】地鳖虫 硼砂 血竭 自然铜各八钱 乌药 土狗 元胡索（醋炒） 当归（酒炒） 桃仁 威灵仙（酒炒） 川牛膝各五钱 麝香 香附（制） 木香各四钱 川续断（盐水炒） 五加皮（炒） 猴骨（制） 苏木 贝母 广皮（炒） 泽兰 五灵脂（醋炒）各三钱 菟丝子（不见火）二钱

【用法】上为细末。伤重者每服三钱，轻者服一钱五分，酒送下。

【主治】跌打损伤。

30901 地鳖紫金丹

【方源】《伤科方书》。

【组成】青皮三钱 黄芩三钱 赤芩三钱 乌药三钱 红花三钱 赤芍三钱 血竭八钱 朱砂二钱 然铜八钱 土狗五钱 土鳖三钱 猴骨三钱 虎骨八钱 牛膝三钱 灵仙三钱 灵脂五钱 木香二钱 寸香三钱 香附四钱 肉桂三钱 枳壳二钱 丹皮四钱 桃仁五钱 贝母三钱 寄奴三钱 广皮三钱 苏木三钱 远志二钱 归尾五钱 桂枝三钱 木通三钱 三棱四钱 莪术四钱 秦艽三钱 加皮五钱 续断三钱 杜仲三钱 骨脂四钱 碎补三钱 羌活三钱 葛根三钱 蒲黄四钱 泽泻三钱 松节五钱 枸杞三钱 韭菜子三钱 硼砂八钱

【用法】上为细末。重服三分，轻二分，再轻一分，酒送下。

【主治】远近跌打内伤，面黄肌瘦，四肢无力，腰痛。

30902 地骨皮枳壳散

《元戎》卷五。为《博济》卷一“地骨皮散”之异名。见该条。

30903 地黄石英酒丸

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】生地黄十六斤(十月采,取肥大者佳,细切) 石英五大两 无灰清酒二斗

【用法】以坩土锅盛石英,烧令极赤,纳酒中,去石,以地黄纳酒中浸之,经三日出之,晒干,复纳酒中,以酒尽为度,惟留汁一升许,捣地黄为末,以一升残酒和末作丸。任食,一日二次。

【功用】补益。

30904 地黄叶猪肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】生地黄叶四两(切) 猪肾二两(去脂膜,切) 豆豉一合 生姜一分(切) 葱白三茎(去须,切)

【用法】先以水二大盏煮豉等,取汁一盞五分,去滓,加地黄叶等于汁中煮,更加盐、酱、醋、米,作羹食之。

【主治】骨蒸劳,乍寒乍热,背膊烦痛,瘦弱无力。

30905 地黄生姜煎丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】生姜汁一升 生地黄汁五升 蜜二斤(绵滤过) 生麦门冬汁三升 牛胫骨内髓一升 茯神(去木) 甘草(炙) 石斛(去根) 黄连(去须) 各四两 栝楼根五两 五味子(微炒) 知母(焙) 人参当归(切,焙) 丹参各二两 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 三两(除前五味外,茯神等十一味捣罗为末) 地骨皮(锉) 二升 胡麻仁二升 萎蕤(锉) 五两 生竹根(锉) 三升

【用法】先以水一斗五升,煮地骨皮等四味至水四升,绞去滓,下麦门冬、地黄汁再煎五六沸,却下蜜、髓、姜汁,再煎至七升为膏,稀稠得所,入前药末和为丸,如梧桐子

大。每服三十丸,竹叶汤送下,不拘时候。

【主治】消渴后四肢羸弱,气虚乏。

30906 地黄麦门冬煎

【方源】《外台》卷十引《延年秘录》。

【组成】生地黄汁三升 生麦门冬三升 生姜汁一合 酥二合 白蜜二合

【用法】先煎地黄、麦门冬、姜汁等,三分可减一分,纳酥、蜜,煎如稀汤,纳贝母末八分,紫菀末四分,搅令调。每服一匙,日二次,夜一次。

【主治】肺热兼咳。

【宜忌】忌茺萸。

30907 地榆降血饮子

【方源】《卫生家宝产科备要》卷四。

【组成】苏子降气汤一帖加地榆一钱半(洗净) 麦门冬十粒(去心)

【用法】只作一服。用水一盞半,加生姜二片,煎七分,去滓,入乳香少许(透明者),溶开温服。不能自饮者,扶起灌之。

【主治】妊娠足月临产之时,血出三日而子未下,手足不收,昏瞀如醉,不省人事。

30908 地罗甘桔玄冬汤

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】玄参二两 麦冬一两 锦地罗一两 生甘草一两 桔梗五钱 贝母五钱

【用法】水煎服。一剂消半,二三剂全愈。

【主治】肺痈。胸膈作痛,咳嗽尤痛,手按气急。

30909 地骨皮鼠粘子汤

【方源】《玉机微义》卷五十。

【组成】鼠粘子汤加地骨皮

【主治】痲疹出太多。

30910 地黄龙牡榴梅散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】大生地一两(炒) 龙骨(煨,研末) 牡蛎(煨) 各四钱 石榴皮(炒) 乌梅肉(炒) 陈棕皮 百草霜各三钱 阿胶六钱(蒲黄拌炒) 陈京墨二钱(炒)

【用法】上为极细末,用淮山药五钱研末,醋、水打糊为丸。分作七日服。内加人参三

钱尤效，或用人参汤下。

【主治】血崩。

【备考】本方方名，据剂型当作“地黄龙牡榴梅丸”。

30911 地黄芍药芩柏汤

【方源】《医学金针》卷八。

【组成】甘草(生) 生地 黄芩 黄柏各一钱 元参 芍药各二钱

【用法】流水煎，温服。外以黄连、石膏、甘草、青黛各等分，研细，时时涂之。

【主治】疳疮。

30912 地骨白皮五味饮子

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【组成】地骨白皮三两 知母三两 麦门冬五两(去心) 竹沥一升 白蜜三合

【用法】上切，地骨皮、知母和麦门冬，以水六升，煮取二升，去滓，纳竹沥、蜜搅调，分三次温服，相去如人行十里久。如觉虚，不能空腹顿尽，欲间食服亦佳。

【主治】天行病愈后，体气虚羸，每觉头痛，唇口干，乍寒乍热，发作有时，或虽能行动运转，然每作时节有前状者；兼主伤寒。

朽

30913 朽木汤

【方源】《医方考》卷四。

【组成】朽木(方寸者)三十枚

【用法】水煎服。

【主治】消渴。

【方论选录】朽木年深而质腐，腐者水之气。水足以制火，故腐足以胜焦，热中、消中皆焦证也，故此物主之。

朴

30914 朴连汤

《袖珍》卷一引《经验方》。为方出《外台》卷二十五引张文仲方，名见《圣济总录》卷七十五“黄连汤”之异名。见该条。

30915 朴沉汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙透)五两 沉香三两 丁香 附子(炮裂，去皮脐) 高良姜各二两 白术 藿香叶 木香 甘草(炙、锉)各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】中焦有寒，胃中逆冷，泄利。

30916 朴附丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)一两 附子(炮裂，去皮脐)半两 甘草(炙)一两 干姜(炮裂)一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温米饮送下。

【主治】大肠虚冷，便利滑泄，不思饮食，肠鸣腹痛。

30917 朴附丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】厚朴(去粗皮)一斤 生姜一斤(同厚朴于木臼内捣匀，取出晒干) 附子(炮裂，去皮脐)二两 干姜(炮)半斤

【用法】上为末，熟枣肉并面糊为丸，如梧桐子大。每服五十至七十丸，空心、食前温酒或米饮送下。

【功用】补虚、厚肠胃、美饮食。

30918 朴附丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】厚朴(去皮，锉作小块子) 附子(炮，去皮脐，锉作小块子)各一两 生姜八两(去皮，取汁)

【用法】将上二味，以姜汁同煮，以尽为度，焙干为末，酒煮为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】①《全生指迷方》：虚寒相搏所致的反胃，心下牢大如杯，或时寒时热，朝食则暮吐，暮食则朝吐，关脉弦紧。②《鸡峰》：脾胃气弱，下冷泄泻，不思食。

30919 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五引李学渝方。

【组成】川厚朴(去粗皮, 锉作骰子块) 附子(去皮脐, 切骰子块) 各二两 大肉枣五十个 生姜五两(以上四味, 用水一大碗煮干, 拣出枣子, 将三味药焙干) 肉豆蔻(面裹煨) 诃子(煨, 取肉) 川白姜(炮, 洗) 各一两 人参半两(去芦)

【用法】上为细末, 将前枣肉为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 加至百丸, 米饮送下。

【功用】《普济方》: 补益脾气, 止心腹撮痛, 温胃进食。

【主治】脾胃久虚, 谷肠滑泄, 脐腹绞痛, 肠鸣泄泻, 肢体无力。

30920 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六引陆仲安方。

【组成】厚朴(去皮, 姜制, 炙) 附子(炮, 去皮脐) 茴香(淘去砂, 炒) 各等分

【用法】上用生姜自然汁浸过煮干, 为细末, 神曲打糊为丸, 如梧桐子大。每服三五十丸, 食前盐米饮或汤、酒送下。

【功用】益肾气, 固脏腑, 实脾元, 进饮食。

30921 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】白艾叶 附子(炮, 去皮脐) 吴茱萸(汤泡七次, 炒) 厚朴(去粗皮) 各一两

【用法】上用生姜汁半盏, 同好酒半盏煮炒令干燥, 别用肉豆蔻半两, 赤石脂半两, 同为细末, 酒糊为丸, 如梧桐子大。每服三五十丸, 空心、食前米饮送下。

【主治】泻痢。

30922 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】厚朴二十二两(去皮, 锉。用生姜二斤, 切片, 水一斗, 于砂石器内煮。自晓至暮, 水干添汤, 候干取出, 去姜) 干姜四两(炮、洗) 甘草二两(炙。以上三味同煮如前法, 取出焙干) 补骨脂(炒) 舶上茴香(炒) 附子(炮, 去皮脐) 各五两 肉豆蔻四两(面裹煨)

【用法】上为细末, 煮枣肉为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 空心、食前米饮或温酒送下。

【主治】泄泻。

30923 朴附丸

【方源】《局方》卷五(宝庆新增方)。

【组成】厚朴(去粗皮, 姜汁制) 附子(炮, 去皮) 各一斤 神曲(炒) 八两 干姜(炮) 三斤

【用法】上为细末, 酒糊为丸, 如梧桐子大。空心、食前服三十丸, 米饮或盐汤送下。

【主治】脾元虚弱, 饮食迟化, 食必多伤, 腹痛肠鸣, 脏腑滑泄, 昼夜无度; 胃气虚损, 不美饮食, 呕哕恶涎。兼治反胃恶心, 及久患脾泄冷泻之人。

30924 朴附丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】川椒(去目) 茴香各二两 青盐一两 附子四两(去皮, 生用, 切作片子) 生厚朴 生姜各四两

【用法】用水三升于银器内慢火煮, 水尽为度, 焙干为末, 煮糊为丸服。

【功用】厚肠胃, 止寒泄, 助元气, 进饮食。

【主治】脾肾气弱, 手足浮肿。

30925 朴附丸

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】厚朴 附子 干姜 陈皮各一两

【用法】上为末, 糊为丸, 如粟米大。每服三十丸, 米饮送下, 一日三次。

【主治】小儿滑冷, 下痢不禁。

30926 朴附丹

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】厚朴一两(涂姜汁炙熟) 附子一枚(炮, 去皮) 赤石脂半两 龙骨半两 诃黎勒一两(面裹炮) 乌梅肉半两(炒)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如麻子大。每服十丸, 乳食前空心米饮送下。

【主治】①《普济方》: 小儿下痢, 赤白相杂。②《准绳·幼科》: 小儿无辜痞痢。

30927 朴附汤

【方源】《续易简》卷三。

【组成】大附一只(生,去皮用,剪作骰子块,生姜自然汁浸,炒干) 川朴(去皮,与附子等分,剪作骰子块,生姜自然汁三浸三炒)

【用法】上为散。病轻者每服四钱,水二大盏,加生姜七片,大枣七个,同煎至七分服。重者加之。

【主治】①《续易简》:久发虚疟。②《袖珍》引《济生》:老人寒胀,中寒下虚,心腹膨胀,不喜饮食,脉来浮迟而弱。

【加减】重者,加木香。

30928 朴梔散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】梔子(炒黑) 朴消各等分

【用法】上为末。每服一二匙,滚水下。

【主治】胃热呕吐,手足心皆热者。

30929 朴香丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】川厚朴(姜汁炒)五钱 大附子(炮,去皮脐)三钱八分 木香一钱半

【用法】上锉一剂。加生姜七片,大枣二个,水煎,热服。

【主治】寒胀,老人、虚人中寒下虚,心腹膨胀,不喜饮食,脉浮迟而弱。

【备考】本方方名,据剂型,当作“朴香汤”。

30930 朴姜汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 高良姜(炒) 陈橘皮(去白,炒) 人参各三分 草豆蔻(去皮)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,大枣一个(擘破),煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】伤寒后霍乱,心膈不利。

30931 朴消丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】川朴消二两(炼熟) 川芒消二两

(炼熟) 消石一两(以上三味同研令细) 犀角屑一两 椒目一两(微炒过,以上二味捣罗为末) 苡苳子一两(水淘去浮者,水煮令黄芽出,候干却炒令黑色) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色) 杏仁二两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,以上三味同捣如膏)

【用法】上为末,以枣肉为丸,如梧桐子大。每服十五丸,以枣汤送下,不拘时候。

【主治】肺气喘急,不得眠卧,头不着枕,无间昼夜,长倚物坐;兼治十种水病。

30932 朴消丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】川朴消 当归(锉,微炒) 薏苡仁 川大黄(锉,微炒)各二两 代赭 牛膝(去苗) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人夙有积血,月水来时,腹中疔痛。

30933 朴消丸

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】朴消二两(青白色,炼过细研) 芒消一两(青白色者,细研) 马牙消半两(细研) 乌头(生,去皮脐) 椒目各一两(炒,二味捣为散,与三消末同罗) 葶苈子(纸上炒) 苡苳子(炒)各一两 杏仁(去皮尖双仁,炒研)二两

【用法】上为末,取大枣七个,煮熟取肉,铍子内煨令水尽,研烂,与药和匀,更入熟蜜少许,同捣千杵,丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸,空心桑白皮汤送下。

【主治】脚气、水气。

30934 朴消丸

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】朴消(研) 大黄(锉,炒) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒研) 葶苈子(微炒)各二两

【用法】上先以三味为细末,入朴消和匀,

炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎黄耆汤送下。以通利为度，未利再服。

【主治】痈疽疮发，大小便闭塞不通。

30935 朴消丸

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】朴消（炼）半斤

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后蜜水送下。

【主治】金石发热，及诸热。

30936 朴消汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】朴消 大黄（锉，炒） 芍药各一两 当归（切，焙） 木香各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒食毒，腹胀气急，大小便不通。

30937 朴消汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】朴消（烧令白，于湿地纸衬出火毒）一分 豉（炒令香熟）一合 山栀子仁八分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，煎至半盞，去滓，空心温服，如人行十里，再一服。如利即止。

【主治】伤寒毒气壅于上焦，毒热不散，发狂欲走，或时时伏地，脉左寸洪数。

30938 朴消汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】大黄（细锉，微炒） 朴消（研）各二两 黄芩（去黑心） 山栀子仁 大青各一两半 龙胆（去土） 苦参各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎麦门冬汤送下。

【主治】伤寒得汗，热毒不解，心烦躁闷，言语不定，小便赤涩，大便不通，狂闷欲走。

30939 朴消汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】朴消（研） 柴胡（去苗）三分 芍药 旋覆花各半两 桑根白皮（炙，锉）三分 生姜（切）半两 大腹 槟榔各二枚

（和皮用） 紫苏茎叶半两

【用法】上除朴消外并锉细，分作三贴。每贴以水二盞，煎至一盞，去滓，下朴消二钱匕，空心、食前分温二服。

【主治】脚气攻心闷乱。

30940 朴消汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】荆芥 薄荷 朴消各一两 白矾二两

【用法】上咬咀。每用一两，水五升，煎数沸，熏患处，通手淋洗。

【主治】热毒结成痔疾，肿胀热痛，坐卧不安。

30941 朴消散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】川朴消三分 犀角屑三分 栀子仁半两 赤芍药三分 黄芩三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 川大黄三分（锉碎，微炒） 柴胡一两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，加淡竹叶三十片，生姜半分，煎至六分，去滓，温频服，不拘时候。以利为度。

【主治】伤寒四日，烦热不解，大小肠涩。

30942 朴消散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】川朴消半两（炒熟） 朱砂一分（细研，水飞过） 龙脑半钱（细研） 乌贼鱼骨半两（细研） 黄柏一两 黄连一两（去须）

【用法】上件药，先取黄柏、黄连杵碎，以三盞水，煎取浓汁一盞，去滓，于日中煎令干，然后以诸药相和，细研如面。每以铜箸取如绿豆大点之。

【主治】眼生花翳。

30943 朴消散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】川朴消二两 硼砂半分（通明者） 白矾半两（通明者）

【用法】上为末，将小瓷瓶子，以慢火炙令

热，然后抄药末，徐徐入在瓶内，旋以柳枝子搅拨，不令着瓶子四边，又入药末，续续添火，候药尽。良久，断烟，以干瓦子盖口，更以大火，烧经一炊久，去火，候瓶冷，其药如雪轻肥便成。即埋在湿土内七日，出火毒讫，取出细研。每以铜箸取少许点之，一日四五次。

【主治】眼久积顽翳，盖覆瞳仁。

30944 朴消散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】川朴消（炼成者）半斤

【用法】上为细末。每服一钱，以蜜水调下，一日三四次。

【主治】①《圣惠》：乳石发动，烦闷，及诸风热。②《圣济总录》：热淋，小便赤涩热痛。

30945 朴消散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【异名】白花散（《卫生宝鉴》卷十七）。

【组成】朴消不拘多少

【用法】上为细散。每服二钱匕，温茴香酒调下，不拘时候。如热燥，以蜜水调服。

【主治】膀胱热，小便不通。

30946 朴消散

《普济方》卷二九九。为《圣济总录》卷一一七“吹喉朴消散”之异名。见该条。

30947 朴消散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】朴消一分 衣中白鱼（炒）三枚 盐少许

【用法】上为细散。每服以指搨少许在舌下。

【主治】小儿咽喉、舌肿胀，咽气不利。

30948 朴消散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】五倍子 朴消等分

【用法】上为细末。每服三两，水三碗，同煎至三四沸，淋渫。

【主治】淋渫痔疮。

30949 朴消散

【方源】《普济方》卷六十一引《选奇方》。

【组成】朴消（研细） 黄丹（飞过，研细）

【用法】上相拌和深粉红色。遇病用芦管或笔管，以半钱许吹入喉中即破，吐涎而愈。甚者不过两次。

【主治】喉痹。

30950 朴消散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】朴消

【用法】上用生麻油调，涂头顶上。

【主治】时气，脑痛不止。

30951 朴消散

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】朴消五分（研） 海金沙一钱（研） 皂角三分

【用法】上为末。沙糖井花水调下。

【主治】五淋。

30952 朴消散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】朴消

【用法】上为末。每服二钱，温童便调下。

【功用】《明医指掌》：下死胎，取胞衣。

【主治】①《普济方》：死胎不出。②《明医指掌》：产后败血。

30953 朴消散

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】朴消二分 紫雪二分 白盐半分

【用法】上为末。每用五分，以竹沥井水调敷舌上下。

【主治】肿舌。

30954 朴消散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】朴消二分 紫雪二分 白盐少许 冰片一分

【用法】上为细末。井水调敷。

【主治】重舌、木舌。

30955 朴消散

【方源】《幼科释谜》卷五。

【组成】大黄 牡蛎各五钱 朴消二钱

【用法】每末一钱，或二钱，用田螺一枚，洗净浸一宿，水调涂。

【主治】①《幼科释谜》：小儿脐突，或痛或不痛；及感湿热，阴及囊肿。②《梅氏验方新编》：小儿脐疮。

30956 朴消煎

【方源】《千金》卷十六。

【组成】朴消一斤 芒消八两 寒水石四两 石膏二两 金二两

【用法】上五味，先纳二消于八升汤中搅之令消，以纸密封一宿，澄取清，纳铜器中，别捣寒水石、石膏碎如豆粒，以绢袋盛之，纳汁中，以微火煎之，候其上有沫起，以箸投中，着箸如凌雪凝白，急下泻着盆中，待凝取出，烈日晒干。每服方寸匕，白蜜一合和冷水五合，搅和令消，顿服之，一日三次。热定即止。

【功用】《医略六书》清解悍毒，搜涤燥热。

【主治】①《千金》：服石所致积热，困闷不已。②《张氏医通》：服石成消瘴大渴者。

【方论选录】①《千金方衍义》：膏粱金石皆富贵之所，常嗜受如持虚，每致热发毒蕴，百治罔效，惟朴消煎可以荡涤脏腑，专取石药之寒以治石药之毒，如水沃火，顷刻冰消。贵高人加金以治五金之毒，皆同气相招之意。②《医略六书》：石药气悍，积毒伤阴，故消瘴大渴，肌肉顿削焉。朴消、芒消荡涤积热之结滞；石膏、寒水石清解燥火以存阴。俾石药之悍毒顿消，则消瘴大渴自退，而肌体无不丰腴矣。此清解悍毒之剂，为搜涤燥热之专力。

30957 朴消膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】川朴消一两（细研如粉） 猪胆二枚（用汁）

【用法】上药相和调为膏，用摩疮癰上勿令动着，任疮痂自落。

【主治】伤寒，发豌豆疮初愈。

30958 朴消膏

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】朴消（烧令干）一分 黄连（去须）三分

【用法】上为细末。绵裹，以乳汁浸之，点眼。

【主治】小儿赤眼。

30959 朴消膏

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】朴消四茶匙

【用法】以鸡子一个搅匀，用井水和匀一碗，每日空心服，用七服为率，弱者间一日服。

【主治】小儿、大人黄疸。

30960 朴黄丸

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】大黄十两（水洗净，置砂锅内，用酒熬三昼夜成膏） 厚朴（去皮，姜汁炒） 木香一两 槟榔一两

【用法】上为末，入大黄膏内为丸，如梧桐子大。每服二钱，轻者一钱，白痢，姜汤送下；赤痢，白汤送下。幼儿不能吞者，调服。

【主治】①《万氏家抄方》：赤白痢。②《何氏济生论》：暑毒，食滞，溇泄，水泄。

【备考】方中厚朴用量原缺。《何氏济生论》无槟榔。

30961 朴黄丸

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】陈皮 厚朴（姜汁炒）各十二两大黄（酒煮）一斤四两 广木香四两

【用法】上为细末，荷叶水送为丸，如绿豆大。每服三钱，小儿一钱，开水送下。

【主治】痢初期，腹中实痛，不得手按。

【方论选录】《证因方论集要》：大黄味苦下泄则闭者通；厚朴苦温，苦可以泄，温可以行；木香辛温益胃；陈皮苦辛调气。

30962 朴黄丸

【方源】《医学传灯》。

【组成】大黄四两（酒煮） 厚朴二两（姜汁炒）

【主治】痢疾。后重窘迫，腹痛急坠。

30963 朴黄汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】大黄 厚朴各等分

【主治】支饮胸痛。

30964 朴黄汤

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】厚朴一钱五分 生大黄四钱 陈皮一钱 广木香五分 制香附一钱五分 川连八分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾初起，腹痛后重，不拘赤白。

30965 朴黄汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】厚朴 黄连 鸡金 枳实 茯苓

【主治】水谷痢，其证粪稀 薄而不聚，水谷不化，里急后重。

30966 朴藜丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】厚朴一斤（去粗皮） 白术半斤 麦藜六两

【用法】上为细末，生姜自然汁煮神曲末六两为糊，丸如梧桐子大。每服三十丸，茶、酒、白汤任下，不拘时候。

【主治】肠风下血，痔疾。

30967 朴麝散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】朴消（研）五两 麝香（研）一分 甘草（炙）一分 淡竹叶一握 黄芩（去黑）半两 芦根（锉）一两 山栀子（去皮）一两

【用法】上七味，锉五味如麻豆大，入研者二味，以新汲水三升，将药入铛中煎约半升，去滓澄清，取瓷瓶一个，倾药汁在内，以物盖定瓶口，用盐泥固济，慢火煨一复时，去火放冷却，将瓶安在水中，无令水至瓶口，浸经一宿，至明日打破瓶子，取药如金色，研为细散。每服半钱匕，冷水调服，绵裹咽津亦得。

【主治】重舌，及天行阴黄，丹石发动，一

切热毒。

30968 朴沉化郁丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）

【组成】广木香 薏仁 砂仁 青皮（醋炒） 南柴胡 沉香 元胡（醋制） 甘草 公丁香 檀香各七钱 香附（醋制）三两 厚朴（姜制）一两五钱 枳壳（麸炒）一两 片姜黄三钱 广皮二两 莪术（醋制）五钱 良姜五钱 肉桂（去粗皮）三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】舒气化痰，开胃消食。

【主治】胸腹胀满，消化不良，呕吐恶心，停食停水，气滞闷郁，胃脘刺痛。

【宜忌】孕妇忌服。

30969 朴附二陈汤

【方源】《医林绳墨大全》卷三。

【组成】二陈汤加厚朴 香附

【功用】开郁行气，清痰降火。

【主治】脾胃虚弱，不能健运。膈有郁火，胃有稠痰，积滞蕴蓄，冲逆于心而暖气嘈杂。

30970 朴果四皮饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】川朴 广皮 猪苓各一钱五分 浙苓皮 大腹皮各三钱 草果仁 青皮各一钱

【用法】用冬瓜皮子各一两，煎汤代水。

【功用】清热导湿。

【主治】湿热郁积于中而成胀满。

30971 朴实六合汤

【方源】《医方集解》。

【组成】四物四两加厚朴 枳实（麸炒）各五钱

【主治】妊娠伤寒后，虚痞胀满，阳明本虚者。

30972 朴消大黄煎

【方源】《医心方》卷二十引《承祖方》。

【组成】大黄（金色者）二两 朴消（细白者）二两

【用法】以水一斗，煮减三升，去滓，着铜

器中于汤上，微火上煎令可丸。病人强者可倾吞，羸人中服可，后宜得羊肉若鸭糜肉羹补之。

【主治】胃管中有燥粪，大便难，身体发创。

30973 朴消牛膝汤

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】杜牛膝二两 朴消一两

【用法】以雪水二碗，煎杜牛膝至一碗，调朴消空心服。

【主治】小便不通，或血淋。

30974 朴消荡胞汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】荡胞散（《圣惠》卷七十）、大荡胞汤（《医学正印》卷下）。

【组成】朴消 牡丹 当归 大黄 桃仁（生用）各三钱 细辛 厚朴 桔梗 赤芍药 人参 茯苓 桂心 甘草 牛膝 橘皮各一铢 虻虫十枚 水蛭十枚 附子六铢

【用法】上咬咀，以清酒五升，水五升合煮，取三升，分四服，日三夜一。每服相去三时，更服如常。覆被取少汗，汗不出，冬日着火笼之，必下积血及冷赤脓如赤小豆汁。若斟酌下尽，气力弱、大困，不堪更服，亦可二三服即止。如大闷不堪，可食酢饭冷浆一口即止。然恐去恶物不尽，不大得药力，若能忍服尽大好，一日后仍着导药。

【主治】妇人立身以来全不产，及断绪久不产三十年者。

【方论选录】《千金方衍义》：土中有石则草不生，渠中有旱则水积阻，妇人立身不产，断绪不孕，皆子脏有瑕之故。方中消、黄、虻虫决渠之捶着也，桂心、附子沮荒之力士也；人参、茯苓开疆之粮饷也；桔梗、厚朴药中宣使，病在下，取之上也；其余牡丹、赤芍等味皆供驱役之流。此方专涤胞门积血，故以抵当为主而兼下瘀血、桃仁承气之制、其力专矣，犹恐积垢难动，又需参、附之大力直捣长驱，何惮坚垒不破耶？服后覆取微汗，不独迅扫诸内，并以开发元府，宣通中外。但

药力过峻，须防暝眩，乃预拟酸收之法，可无仓卒之虞。然必天阴脐下疼痛，方为瘀血之确徵。

30975 朴消急救饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】苍术三钱 陈皮一钱半 厚朴二钱 甘草五分 肉桂三钱 朴消五钱（俟上药煎好，投入一二沸即可）

【功用】下死胎。

【主治】妇人临产，忽子死腹中，或胎前患热病，以致胎痿，或生理不顺，坐草太迟，阻塞气血，或稳婆不慎伤胎。

【方论选录】平胃散中苍术燥烈，能祛胞中浊浆；厚朴、陈皮下气；朴消可以烂胎，且味涩性收，能束之使下；肉桂辛热，能行瘀血，逐死胎。

权

30976 权木丸

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】南康蛤粉一两 猪苓半两 泽泻半两 真平胃散一两

【用法】上为细末，同平胃散蛤粉和匀，用大蒜（连皮）灰火煨香熟，捣烂为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，用温水送下，一日三次。

【主治】男子妇人，通身温胀，不能动作。

【宜忌】忌鱼腥、冷物、湿面。

芋

30977 芋粥

【方源】《药粥疗法》引《食物本草》。

【异名】芋艿粥（《饮食治疗指南》）。

【组成】芋头 60~90 克 粳米 60~90 克 沙糖适量

【用法】将新鲜芋头洗净去皮，切成小块，与粳米煮粥，粥成后加入沙糖稍煮一二沸即可。

【功用】消瘰癧，补脾胃。

【主治】小儿瘰癧，虚癧，慢性淋巴结炎，淋巴结核，淋巴腺肿。

30978 芋芡丸

《中国医学大辞典》。为《济世养生集》卷一“蹲鸱丸”之异名。见该条。

30979 芋芡粥

《饮食治疗指南》。为《药粥疗法》引《食物本草》“芋粥”之异名。见该条。

芍

30980 芍甘汤

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】白芍三钱 甘草一钱

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】诸腹痛。

【加减】热痛，加黄芩。

30981 芍药汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】泽泻一钱 茯苓八分 猪苓八分 白术八分 木通八分 黄连八分 黄芩八分 芍药一钱六分

【用法】水煎服。

【主治】麻后积热遗于大肠泄泻者。

【方论选录】热逼大肠则泻，大肠非有热也，自小肠遗之；小肠之热，自心遗之；心之热自脾胃归之。泄脾胃之水而行之膀胱，泻心肺之热而达之小肠，小肠能分泌水谷，三焦水道通利，则大肠无热矣。方中四苓散以行水道，自脾胃而引之下达于膀胱，水行则热息；木通泻心热于小肠；黄连泄心肝之热，且厚肠胃；黄芩泻肺热于大肠，芍药以敛阴和脾补肺，而和大肠。

30982 芍药丸

【方源】《医心方》卷十二引《经心录》。

【异名】芒消丸（《千金》卷十五）。

【组成】芍药六分 芒消六分 黄芩五分 大黄八分 杏仁八分

【用法】上为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日三次。

【主治】胀满，大便不通。

【备考】本方原名芍药汤，与剂型不符，据《圣济总录》改。

30983 芍药丸

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】芍药 当归 白术 鳖甲（炙）各八分 诃黎勒十颗（去核） 干姜 人参各六分 豆蔻 雄雀屎各四分 郁李仁十分（去皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹酒送下，一日二次。

【主治】心腹胀满，脐下块硬如石，疼痛不止。

【宜忌】忌生菜、热面、葱、苋、桃、李、雀肉、蒜、粘食等物。

30984 芍药丸

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《婴童方》。

【组成】芍药 茯苓 大黄各五分 柴胡四分 鳖甲三分（炙） 桂心二分 人参一分（一方有杏仁二两，人参三分）

【用法】上为末，炼蜜为丸。三岁以下每服三小豆大，不知加之；七八岁每服三梧桐子大，不知加之。病甚者，服二十日效。

【主治】①《幼幼新书》引《婴童方》：小儿百病，有寒热，腹大，食不消化，不生肌肉，痿痹。②《普济方》：下痢不止。

【加减】腹坚大者，加鳖甲一分；渴者，加栝楼二分。

30985 芍药丸

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《婴童方》。

【组成】芍药 大黄各一两 桂心二两 茯苓 柴胡各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸。一岁每服大豆许二丸，不知稍加之，食后服。炼蜜须三五沸用。

【主治】小儿不生肌肉，丁奚大腹，食不消。

30986 芍药丸

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《婴孺方》。

【组成】芍药 茯苓各三分 大黄二分 半夏一分(洗) 桂心 胡椒(汗)各半分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服十丸，酒送下，一日三次。

【主治】少小阴癫气疝，发作有时。

30987 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】芍药 人参 赤茯苓(去黑皮) 厚朴(去粗皮，姜汁炙)各二两 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 木香 桂(去粗皮) 桔梗(炒)各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，一日二次。

【主治】胃热肠寒，善饥，小腹痛胀。

30988 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】芍药 木香 枳壳(去瓢，麸炒)各三分 槟榔(锉细) 大黄(锉，炒)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，渐加至三十丸，食后温水送下。

【主治】风毒脚气，心胸烦闷，多痰咳嗽，背膊痛，大肠涩。

30989 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】芍药 桔梗(去芦头，炒) 细辛(去苗叶) 蜀椒(去目并闭口者，炒出汗) 桂(去粗皮) 干姜(炮)各三分 附子(炮裂，去皮脐)半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或米饮送下，不拘时候。

【主治】心疝。心胁痛及绕脐痛。

30990 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】芍药 地龙(去土，炒) 大黄(锉，炒) 威灵仙各一两 木鳖子(去壳，

研)二两

【用法】上为末，将三分之一用醋一盞熬成膏，和余药末为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心、食前茶清送下，一日二次。

【主治】肠风痔瘕，久不愈者。

30991 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芍药 阿胶(炙令燥)各一两半 乌贼鱼骨(去皮甲)一两 当归(切，焙)三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心葱汤送下，一日三次。

【主治】产后血下不止。

30992 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】芍药(炒) 艾叶各一两 地榆(炒) 当归(切，焙) 白术各三分 龙骨(碎) 干姜(炮)各半两

【用法】上为末，米醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下。

【主治】产后赤白痢。

【备考】本方用法原作：“上七味，粗捣筛，每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服”，与方名不符，据《普济方》改。

30993 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】芍药 铁粉(研)各三分 蚱蝉(去翅足，炙)四枚 当归(切，焙)三分 大黄(锉，炒)一两 石膏(碎)三分 桂(去粗皮)半两 人参一两一分 银屑(研) 芎藭 龙骨(研) 细辛(去苗叶) 黄芩(去黑心)各半两 牛黄(研)一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，米饮送下，一日三次。

【功用】①《圣济总录》：常服除热。②《普济方》：止惊，常服除热痰。

【主治】小儿诸痛及惊。

30994 芍药丸

《圣济总录》卷一七五。为《圣惠》卷八

十八“赤芍药丸”之异名。见该条。

30995 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】芍药 大黄(銼,炒) 鳖甲(醋炙,去裙襴) 麻仁(研)各三分 防葵 陈曲(炒) 白术各一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。一岁儿每服三丸,三岁至五岁五丸,并温熟水送下,一日二次。

【主治】小儿食癖,本于肠胃气弱,吃食不化,结聚不散,腹中隐隐成块,按之即痛。

30996 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】芍药 当归(切,焙) 芎藭 人参各三分 甘草(炙)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服一丸,以乳汁送下,早晨、日午、近晚各一次。

【主治】小儿胎寒,大便青,不欲食。

30997 芍药丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】芍药(炒) 白鸡冠花(炒) 陈槐花各等分

【用法】取青蒿根汁煮丸。米饮送下。

【主治】酒毒下血。

30998 芍药丸

【方源】《普济方》卷二九二。

【组成】芍药十分(炙令黄) 黄耆 鳖甲(炙) 人参各四分 柴胡八分 茯苓六分 甘草 干姜各三分(一方有大黄,无黄耆)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如大豆大。每服五丸,一日二次。

【功用】令儿充悦。

【主治】四五岁儿,因食及在胎中宿热,乳母饮食粗恶辛苦,乳汁不起,儿哺不为肌肤,心腹痞满,萎黄瘦脊,四肢痿蹙挛戾。

【加减】如有热者,去干姜,加枳实。

30999 芍药丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】白芍二两 当归 黄连 黄芩各五钱 木香 炙甘草 槟榔片各三钱 桃仁五粒 肉桂五钱

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,二钱重。每服一丸,开水送下,一日二次。

【功用】助消化,整肠止痢。

【主治】赤白痢疾,大便脓血,腹痛肠鸣,里急后重。

【宜忌】忌生冷、荤腥,尤忌蟹肉。中气虚弱者及孕妇忌服。

31000 芍药汤

【方源】《外台》卷四引《深师方》。

【组成】芍药五分 黄连四分 甘草二分(炙) 黄芩二两 桂心二两 桔楼二分

【用法】上切。以水五升,煮取三升,分三服,一日令尽。

【主治】温毒病及吐下后,有余热而渴者。

31001 芍药汤

【方源】《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】芍药 细辛 桂心 甘草(炙) 当归 吴茱萸 独活各二两 干地黄二两 生姜五两 桃仁四十枚(去皮尖双仁,碎)

【用法】上切。以水九升,煮取三升,分为四服。

【主治】中毒风肿,心腹痛达背,迫气前后如疰痛。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱、茺荑、生菜。

【加减】宜利者,加大黄二两。

31002 芍药汤

【方源】《千金》卷二引《逐月养胎法》。

【异名】芍药饮(《圣济总录》卷一五六)。

【组成】芍药 生姜各四两 厚朴二两 甘草 当归 白术 人参各三两 薤白(切)一升

【用法】上咬咀。以水五升,清酒四升,合煮取三升,分三服,日三夜一。

【功用】《济阴纲目》汪琪笺释:补土生金,散寒除痛。

【主治】妊娠八月中风寒,有所犯触,身体

尽痛，乍寒乍热，胎动不安，常苦头眩痛，绕脐下寒，时时小便白如米汁，或青或黄，或时寒慄，腰背苦冷而痛，目眈眈者。

【方论选录】《千金方衍义》：方中取专走阳明之薤白一味，以开泄经气；即用善护子气之芍药助之；以参、术、当归、生姜、甘草，外佐薤白，内助芍药。一服而转危就安，且无风药动摇胎息之患。世医咸谓薤白安胎，不知薤白之功更胜；用厚朴者，以其时时小便有所下，借《内经》洁净府之一法也。

31003 芍药汤

《外台》卷十七引《古今录验》。为《伤寒论》卷三“小建中汤”之异名。见该条。

31004 芍药汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】白芍药 干地黄 牡蛎各五两 桂心三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取二升半，去滓，分三服，一日三次。

【主治】产后虚热头痛，亦治腹中拘急痛者。

【方论选录】《千金方衍义》：产后虚热虚烦，浑是虚火上炎之候，芍药、地黄专清血热，恐其闭拒，乃以桂心散之，牡蛎能解虚热上蒸之头痛，以其咸降也。

【备考】本方加黄芩，名“桂心牡蛎汤”（见《活人书》）、“桂心牡蛎散”（见《普济方》）。

31005 芍药汤

【方源】方出《千金》卷十三，名见《圣济总录》卷五十六。

【组成】赤芍药六两 桔梗 杏仁各五两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取三升，分三服。

【主治】①《千金》：寒气猝客于五脏六腑中则发心痛。②《圣济总录》：心痛懊恼。

31006 芍药汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】芍药 桂心各三两 当归 半夏

（洗去滑） 茯苓各二两 蜀椒二合（汗） 生姜汁五合 蜜一升

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升，去滓，纳生姜汁及蜜，复煎取二升五合。每服五合，渐加至六合。相去一炊久再服。

【主治】产后心痛，因寒冷所致者。

【宜忌】忌冷食。

31007 芍药汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】芍药四两 茯苓三两 人参 干地黄 甘草各二两

【用法】上㕮咀。以清酒兼水各六升，煮取三升，分服，每日三次。

【主治】产后腹痛。

31008 芍药汤

【方源】《伤寒微旨》卷上。

【组成】芍药 荆芥穗各一两 石膏三两 甘草（炙）半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，加生姜一块（擘破），同煎至七分，去滓热服。如三五服后，犹恶风，再加生姜一块，大枣三个，煎法如前。

【主治】伤寒无汗恶风，脉浮数，或紧或缓，三部俱有力者。

31009 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】芍药 防风（去叉） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）各三分 葛根（锉）一两 黄芩（去黑心） 防己 桂（去粗皮）各半两 干姜（炮裂）一两 白术 人参 独活（去芦头） 芎藭 竹沥（旋入） 升麻 牛膝（去苗，锉，微炒） 石膏（碎） 陈橘皮（汤去白，焙） 羚羊角（镑屑） 五加皮（炙）各半两

【用法】上除竹沥外，㕮咀如麻豆大。每用药十二钱匕，以水四盞，煎取二盞，去滓，加竹沥一合，更煎三沸，分三次温服，空心、午时、夜卧各一服。

【主治】中风半身不随。

31010 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芍药 防风(去叉) 石膏(研碎) 木通 麻黄(去根节) 各一两 甘菊花(择) 葛根各半两 甘草(炙, 锉) 前胡(去芦头) 各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜三片, 大枣一枚(去核), 煎至一盞, 去滓, 入荆沥半合, 重煎令沸。早晚食后、临卧温服。

【主治】风眩暗倒, 眼旋屋转, 脑痛。

31011 芍药汤

《圣济总录》卷十九。为《圣惠》卷十九“侧子散”之异名。见该条。

31012 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】芍药 熟干地黄(焙) 当归(切, 焙) 各二两 防风(去叉) 秦艽(去苗土) 羌活(去芦头) 防己 芍药 白术 各一两 桂(去粗皮) 甘草(炙) 各三分

【用法】上为粗末, 每服五钱匕, 以水一盞半, 煎至八分, 去滓温服, 一日二次。

【主治】脉痹。营卫不通, 四肢疼痛。

31013 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】芍药一两 附子(炮裂, 去皮脐) 三分 人参 甘草(炙) 各半两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜半分(拍碎), 同煎至八分, 去滓温服, 日晚再服

【主治】伤寒下利清谷, 里寒外热, 汗出而厥, 腹痛兼呕。

31014 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】芍药 当归(切, 焙) 黄芩(去黑心) 黄连(去须, 锉, 炒) 各三两 伏龙肝一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食前温服。

【主治】伤寒后血痢, 腹痛不可忍者。

31015 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】芍药 白术 厚朴(去粗皮, 姜汁炙) 各一两 白豆蔻(去皮) 桂(去粗皮) 干姜(炮) 甘草(炙, 锉) 各半两 木香三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】伤寒食毒, 心腹胀满, 或时泄利。

31016 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】芍药 黄芩(去黑心) 羚羊角(镑) 甘草(炙, 锉) 各一两 大青三分 升麻二两 黄柏(去粗皮, 蜜炙) 半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加竹叶三七片, 煎至八分, 去滓, 入蜜半合, 更煎一二沸, 食后温服。

【主治】伤寒后, 心热口疮久不愈。

31017 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】芍药 柴胡(去苗) 赤茯苓(去黑皮) 人参 麦门冬(去心, 焙) 藿香叶 白芷各半两 生芦根一两 甘草(炙) 一分

【用法】上锉, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜半分(拍碎), 同煎至七分, 去滓, 空心温服, 晚食前再服。

【主治】伤寒后壮热, 骨肉疼痛, 头重呕啰。

31018 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】赤芍药 车前子叶 木通各一两

【用法】上锉细。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓温服。

【主治】胞转, 小便不利。

31019 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】赤芍药 赤石脂 大腹皮 京三棱(煨, 锉) 桑根白皮(锉, 焙) 各一两半 肉豆蔻(去壳) 一枚 桃仁(去皮尖双仁, 炒) 三十枚 桂(去粗皮) 半两 附子

(炮裂,去皮脐) 白术 木香 枳壳(去瓢,麸炒) 当归(切,焙) 麻黄(去根节) 黄连(去须) 各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,同煎至八分,去滓温服。

【主治】积聚。心腹胀满,甚则泄利及气不升降。

31020 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】赤芍药 黄柏(去粗皮,炙) 地榆各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以浆水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】血痢腹痛。

31021 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】芍药(锉,炒)一两 桂(去粗皮)半两 黄耆(锉)二分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,用米醋一合,水一盞半,煎至一盞,去滓温服。烦心勿怪,六七日即愈。

【主治】通身水肿,其脉沉迟。

【宜忌】勿食盐。

31022 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤芍药 防己 枳壳(去瓢,麸炒)各二两 独活(去芦头) 防风(去叉) 桂(去粗皮) 葛根(锉)各一两半 半夏(汤洗去滑,姜汁制)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜五片,同煎至六分,去滓温服,空心、日午、近晚各一次。

【主治】脚气肿满,胸膈痞塞,吐逆不下食。

31023 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】芍药 黄耆(锉) 桂(去粗皮)各一两 甘草(炙) 干姜(炮)各半两 熟干地黄一两(焙) 阿胶(炒燥)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至一盞,去滓,加饴糖少许,再煎一二沸,食后分二次温服,夜卧再服。

【主治】虚劳少气,胁下妨闷,腹中拘急,少腹疼痛,唇干口燥,不能饮食。

31024 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】芍药三两 黄耆(去芦头) 干姜(炮裂)各二两 甘草(炙,锉) 桂(去粗皮)各一两 当归(去芦头,切,焙)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜一分(拍碎),大枣两枚(去核),煎至七分,去滓,加饴糖一分,再煎令沸,空腹温服,日午、夜卧再服。

【主治】虚劳里急,少腹发痛,气引胸胁,或心痛短气。

31025 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】芍药 地骨皮各三分 柴胡(去苗)一两 甘草(炙,锉)半两 石膏(碎)一两 当归(切,焙)三分 鳖甲(醋浸,炙黄)一两 白术一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至一盞,去滓。分二次温服,空心、食后各一次。

【主治】骨蒸羸瘦,背膊烦疼,头痛寒热,不能下食。

31026 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【异名】大黄散(《普济方》卷三十九)。

【组成】赤芍药 桑根白皮(锉)各三两 瞿麦穗 大黄(锉,炒) 榆白皮(锉) 防葵(去芦头) 麻子仁(研如膏)各二两

【用法】上为粗末,与麻子仁拌匀。每服五钱匕,水一盞半,煎至一盞,去滓,加芒消末半钱匕,更煎二沸,空腹温服,日晚再服。

【主治】①《圣济总录》:大小便不通。②《普济方》:心腹满闷不可忍。

31027 芍药汤

《圣济总录》卷九十七。为《博济》卷三“芍药散”之异名。见该条。

31028 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】赤芍药 大黄(锉,炒) 当归(切,焙) 芎藭各二两 桂(去粗皮) 人参 细辛(去苗叶)各三两 桃白皮一握(洗) 真珠末半两 雄黄(研)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】气淋,小便不通。

31029 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】芍药 白茯苓(去黑皮) 决明子 玄参 羚羊角(镑) 前胡(去芦头) 萎蕤 秦皮 甘草(炙) 人参 苦参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓,加生地黄汁少许,再煎沸,食后、临卧温服。

【主治】风热上攻,眼目飞血赤脉,涩痛难开。

31030 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】芍药 芎藭 黄芩(去黑心) 大黄(锉,炒熟) 甘草(微炙,锉)各半两 黄连(去须)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盞,煎至一盞,去滓,食后、临卧温服。

【功用】利心肺。

【主治】目小眦赤脉。

31031 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】赤芍药一两半 羚羊角(镑) 玄参 防风(去叉) 黄芩(去黑心)各一两 蔓荆实 甘菊花各三钱

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至七分,去滓,加马牙消一钱匕,食后、临卧温服。

【主治】热毒攻目眦,目肿起有脓汁者。

31032 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】赤芍药 犀角(镑) 木通(锉) 石膏(碎) 升麻各二两 甘草(生,锉) 朴消 玄参 麦门冬(去心,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】胃脘蓄热,结聚成痢。

31033 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】芍药 当归各一两 黄耆(锉) 生干地黄(焙) 赤茯苓(去黑心)各一两半 人参 甘草(炙)各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜半分(拍碎),大枣二枚(擘破),同煎至八分,去滓,空心温服,晚再服。

【主治】缓疽。

31034 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】赤芍药 黄耆 附子(炮裂,去皮脐) 当归(切,焙) 续断 桂(去粗皮) 羌活(去芦头) 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤折恶血不散,肿痛不消。

31035 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芍药 牡丹皮 玄参 芎藭 白茯苓(去黑皮) 熟干地黄(焙) 白薇 甘草(炙,锉) 当归(切,焙) 五味子 麦门冬(去心,焙) 人参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血风劳气,骨节疼痛,寒热头眩,眼睛疼,心虚恍惚惊悸。

31036 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】赤芍药 牡丹皮 桂(去粗皮) 当归(切,焙)各一两 芸薹子(研)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加酒少许，同煎至七分，去滓温服。

【主治】妇人血风走注，浑身疼痛，心忪恍惚，头目昏眩。

31037 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】芍药 柏叶（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒各半盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】①《圣济总录》：妇人月水久不断。②《普济方》：崩中下血不止，小腹痛。

31038 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】芍药 人参 厚朴（去粗皮，生姜汁炙烟出）各一两 肉豆蔻（去壳）半两 甘草（炙） 当归（微炙） 枳壳（去瓢，麸炒）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人月水来腹痛，烦闷体热。

31039 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】芍药 芎藭 当归（切，焙） 防风（去叉） 桂（去粗皮）各半两 甘草（炙，锉） 生干地黄（焙）各一两 枳壳（去瓢，麸炒） 白术各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服。

【主治】妇人血积气攻刺疼痛不已，面黄体瘦，经水不调。

【加减】经水久不利，煎成加芒消半钱匕，稍热服。

31040 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】赤芍药一分 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研） 枳壳（去瓢，麸炒） 百合 当归（锉，微炒） 赤茯苓（去黑皮） 牵牛子（微炒） 槟榔各一两（锉）

【用法】上为粗末。每服四钱匕，以水一盞半，加生姜半分（切），同煎至八分，去滓，空心温服。逐日以利为效，未利再服。

【主治】妇人血分有病，头面浮肿，腹肋妨闷，四肢烦疼。

31041 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】赤芍药（锉，炒） 桑根白皮（锉）各三分 木通（锉）一两 百合三分 大腹（碎）五枚 郁李仁（汤浸去皮，炒）三分 甘遂半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧服。水通即止。

【主治】妇人水分，面目身体浮肿，胸满短气，小便不利。

31042 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】芍药一分 生干地黄（焙） 甘草（炙令赤）各一两 丹参半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一分（切碎），同煎至七分，去滓，加白蜜少许，再煎令沸，温服，相次更服。

【主治】产后血晕，心闷不识人，言语错乱少气者。

31043 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】赤芍药三分 白茅根半两 瞿麦穗一分 桃仁七枚（汤浸，去皮尖双仁，炒） 知母（焙）半两 桂（去粗皮）半两 朴消 当归（锉，焙）各一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，再加生地黄汁半合，复煎至一盞，温服，一日三次。

【主治】产后半月余，恶血不尽，腹痛寒热，呕吐不能食。

31044 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】芍药三两 知母（焙）二两 当归

(锉, 焙) 一两 红蓝花二两 荷叶蒂二枚(炙)

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜五片, 煎至八分, 去滓, 再加蒲黄一钱匕, 生地黄汁半合, 煎六七沸, 去滓, 空腹温服, 相次再服之。

【主治】产后三四日, 恶露未尽, 呕吐不食, 身体壮热。

31045 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芍药二两 黄耆(锉) 白芷 人参 芎蒭 当归(切, 炒) 生干地黄(焙) 甘草(炙) 各一两 白茯苓(去黑皮) 一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎取七分, 去滓, 加酒少许温服, 不拘时候。

【主治】产后因血不快利, 气攻心腹疼痛。

31046 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芍药二两 桂(去粗皮) 甘草(炙, 锉) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后血气攻心腹痛。

31047 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芍药 当归(切, 焙) 独活(去芦头) 防风(去叉) 芎蒭 人参各二两 桂(去粗皮) 玄参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后中风, 言语不爽, 惚恍多忘, 体热倦怠。

31048 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】芍药 当归 麻黄(去根节) 防风(去叉) 独活(去芦头) 白僵蚕(炒) 牛膝(酒浸, 切, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 桂(去粗皮) 各一两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 煎七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后中风偏枯。

31049 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】赤芍药 葛根各一两(锉) 麻黄(去根节, 煎, 掠去沫, 焙) 甘草(炙) 石膏 人参 当归(切, 炒) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后伤寒, 肢体疼痛, 干呕头昏, 烦躁潮热。

31050 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】赤芍药 延胡索 当归(切, 炒) 枳壳(去瓢, 麸炒) 牛膝(去苗, 酒浸, 炒) 石斛(去根) 附子(炮裂, 去皮脐) 各一两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 大枣二枚(擘破), 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后气血凝滞, 腰重痛。

31051 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】芍药(锉) 牡丹皮 人参各一两 芎蒭一两半 白茯苓(去黑皮) 一两 干姜(炮) 半两 甘草(炙) 白薇 麦门冬(去心, 焙) 熟干地黄(焙) 各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后虚热, 骨节烦疼瘦瘵, 不下食。

31052 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】芍药一两 知母半两 甘草(炙) 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 各一两 生干地黄(焙) 三两 黄耆(锉) 二两 人参一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕, 水一盞,

煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚热，烦闷瘦瘁。

31053 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】赤芍药（锉）一两 芍药 牡丹皮 玄参 当归（切，焙） 人参各半两 五味子 麦门冬（去心，焙）各一两 白茯苓（去黑皮） 白薇各半两 熟干地黄（焙）二两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气虚弱，心下惊悸，梦寐不安，妄见鬼物；产后蓐劳，疼痛寒热，头眩眼运，精神恍惚，睡多惊恐，盗汗腹痛，大便不利。

31054 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】芍药 五味子各一两 芍药 牡丹（去心） 玄参 当归（切，炒） 人参 麦门冬（去心，微炒） 白茯苓（去黑心） 生干地黄（焙） 白薇（去苗） 甘草（炙）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣二枚（擘），同煎至七分，去滓温服，不拘时候，一日三次。

【主治】产后虚羸瘦瘁，肌肉不泽，气血不充，或寒或热。

31055 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】芍药 牡丹皮 玄参 芍药 白茯苓（去黑皮） 干姜（炮） 甘草（炙） 白薇各二两 麦门冬（去心，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盞，煎至一盞，去滓温服，一日三次。

【主治】产后虚劳，骨节疼痛，寒热往来，精神恍惚，梦寐惊悸。

31056 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】芍药（锉，炒）一两 当归（切，

炒）三分 生干地黄（焙）二两 黄耆（锉）一两 白茯苓（去黑皮）一两 石斛（去根，锉）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】产后虚汗不止，虚烦愤闷。

31057 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】赤芍药 芒消（别研） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒）各一两 大麻仁三分（研如膏） 大黄（锉，炒） 当归（切，炒）各二两

【用法】上揀四味为粗末。入大麻仁同研令匀。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，加芒消末半钱匕，温服。以利为度。

【主治】产后大小便不通，腹胀气急。

31058 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】芍药 桂（去粗皮） 黄耆（锉） 赤茯苓（去黑皮） 当归（切，炒） 生干地黄（焙）各一两 甘草（炙，锉） 人参 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大（切），煎至八分，去滓，加朴消末一钱匕，再煎令沸，温服，不拘时候。

【主治】产后乳结痈脓，败坏不散，发寒热疼痛。

31059 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】芍药 甘草（炙，锉）各半两 大黄（蒸，焙干，锉）一两

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，以水半盞，煎至三分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】小儿壮热及百病。

31060 芍药汤

《圣济总录》卷一七一。为《外台》卷三十五引《古今录验》“赤汤”之异名。见该条。

31061 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】芍药 桔梗(炒) 桃仁七枚(去皮尖双仁,炒) 黄芩(去黑心) 柴胡(去苗) 升麻各一两 大黄(锉,炒)二两 鬼臼一两 甘草(炙)半两 杏仁四十枚(汤浸,去皮尖双仁,炒) 麝香半钱(研)

【用法】上为粗末,加麝香和匀。一二岁儿每服一钱匕,以水一小盏,煎至六分,去滓,分二次温服,空心、午后各一服。以利为度。

【主治】小儿中恶,心腹坚胀痛,颜色青黑,大便不通。

31062 芍药汤

《圣济总录》卷一八一。为《圣惠》卷八十九“芍药散”之异名。见该条。

31063 芍药汤

《圣济总录》卷一八三。即《千金翼》卷二十二引华佗方“茅苳汤”。见该条。

31064 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】芍药 枳实(去瓢,麸炒) 大黄(锉,炒) 升麻各二两 当归(切,焙)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一大盏,煎至七分,去滓温服,空心、食前、日午各一服。

【主治】乳石发热,坚肿。

31065 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】芍药 牡丹皮 莎草根(炒去毛) 高良姜各一两 木香 附子(炮裂,去皮脐)各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣二枚(擘),煎至七分,去滓温服。

【功用】补益脏腑。

【主治】小肠虚冷,时发搐痛,不思饮食。或时干哕。

31066 芍药汤

【方源】《幼幼新书》卷十七引张涣方。

【组成】赤芍药一两 黄芩 当归(锉,焙干) 柴胡各半两 肉桂 甘草(炙)各一分

【用法】上为细末。每服一钱,水八分盏,加生姜二片,大枣二枚,同煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿寒热往来。

31067 芍药汤

【方源】《产乳备要》。

【组成】当归一两半(切,焙) 人参 肉桂 生姜(后入) 甘草(炙)各一两 芍药一两

【用法】上为末。每服三钱,水二盏,加大枣二枚,煎至一盏,去滓温服,一日三次。

【功用】补虚治气。

【主治】产后虚乏,不思饮食,四肢昏倦,心腹阵痛。

【备考】《普济方》有“生地黄”。

31068 芍药汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】芍 归 白芍 熟地 参 术 草 陈皮 香附 前胡 柴胡 紫苏 黄耆 杜仲 大枣

【主治】妊娠八月,胎动不安者。

31069 芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】黄芩芍药汤(《明医指掌》卷九)、白芍药汤(《医家心法》)、当归芍药汤(《金鉴》卷五十三)。

【组成】芍药一两 当归 黄连各半两 槟榔二钱 木香二钱 甘草二钱(炙) 大黄三钱 黄芩半两 官桂二钱半

【用法】上咬咀。每服半两,水二盏,煎至一盏,食后温服。

【功用】活血调气,清热解毒。

①《保命集》:下血调气。②《杏苑》:清热行滞活血。③《成方便读》:理气行瘀。④《方剂学》:调和气血,清热解毒。

【主治】湿热痢。腹痛便脓血,赤白相兼,

里急后重，肛门灼热，小便短赤。

①《保命集》：泻痢。②《杏苑》：湿热壅郁，气血不得宣通，下痢脓血者。③《明医指掌》：妊娠痢疾，腹痛口渴，后重里急之证。④《金鉴》：湿热凝结于肠胃，以致腹中窘痛，频频下痢，尿短色红，舌赤唇焦，喜饮冷水。⑤《成方便读》：下痢脓血稠粘，腹痛后重，邪滞交结者。

【宜忌】①《景岳全书》：此方惟真有实热者可用，若假热假实者误服则死。②《中医方剂与治法》：痢疾初起有表证，久痢属虚寒者，不宜使用本方。

【加减】血痢，渐加大黄；汗后脏毒，加黄柏半两。

【方论选录】①《保命集》：《经》曰：溲而便脓血。气行而血止，行血则便脓自愈，调气则后重自除。②《杏苑》：本方以芩、连之苦寒以清湿热；木香、槟榔之辛温以行滞气；白芍、归尾活血养血；大黄下湿热之郁积；桂心通和营卫；甘草缓中和药。③《医方集解》：此足太阴、手足阳明药也。芍药酸寒，泻肝火，敛阴气，和营卫，故以为君；大黄、归尾破积而行血；木香、槟榔通滞而行气；黄芩、黄连燥湿而清热。盖下痢由湿热郁积于肠胃不得宣通，故大便重急，小便赤涩也。辛以散之，苦以燥之，寒以清之，甘以调之。加肉桂者，假其辛热以为反佐也。④《成方便读》：此方用大黄之荡涤邪滞；木香、槟榔之理气；当归、肉桂之行血；病多因湿热而起，故用芩、连之苦寒，以燥湿清热；用芍药、甘草者，缓其急而和脾。⑤《方剂学》：本方治法，是以调和气血为主，兼以清热解毒，方中重用芍药，配当归调和营血，配甘草缓急止痛；黄连、黄芩苦寒燥湿以解肠中热毒。在本方中，大黄配芩、连则清中有泻，导热下行；配木香、槟榔能行气导滞；皆属“通因通用”之法。方中肉桂，配在苦寒药中是为“反佐”，能防止苦寒伤阳，冰伏湿热之邪；配和血药则有加强行血之功。

【临证举例】①杆菌性痢疾 《中华医学杂志》(1954; 11: 860~861)用芍药汤去大黄，制成芍药合剂，治疗杆菌性痢疾 54 例，全部治愈出院。制法与服法：将方中挥发性药物如当归、肉桂及广木香用蒸气蒸馏，其它非挥发性药物采用 20%乙醇渗滤，按照《药典》规定，以 1:1 制成流浸膏。成人每次 20 毫升，日服 4 次，连服一周。儿童酌减。54 例中 1 日内退烧者 22 例 (40.75%)，3 日内退烧者 13 例，5 日内退烧者 4 例，其余病例在入院初体温即正常。排便次数在服药 3 日内正常者 22 例，4 日内正常者 8 例，一周内正常者 14 例，1 周后正常者 10 例。腹痛及里急后重大多数病例在 5 日内消失，而严重的毒血症现象，均在 3 日内消失，烦躁不安、四肢痉挛都在 1 日后消失。大便镜检多数在一周内恢复正常。少数在二周内转为正常。芍药合剂与磺胺类药物治疗杆菌性痢疾之疗效作对照，并无逊色。其中有 4 例急性菌痢和 1 例慢性菌痢曾用磺胺类药物治疗无效，改用本方而收效。芍药合剂对肠炎疗效亦佳，在应用中无任何副作用。②痔疮胀痛 《江两中医药》(1984; 5: 31)刘某某，女，48 岁。混合痔伴静脉及血栓形成，舌质红，苔黄，脉滑。以芍药汤加枳壳、银花，服 4 剂后胀痛消除。

【现代研究】芍药汤配伍槟榔作用的实验研究《中成药研究》(1987; 11: 45)芍药汤由芍药、当归、黄连、大黄、肉桂、槟榔、木香、炙甘草九味药组成。就芍药汤、去槟榔芍药汤的药理作用，进行动物实验的比较研究。结果显示：①急性毒性试验，芍药汤组小鼠死亡为 11/12 只；去槟榔组无死亡。二组差异 $P < 0.001$ 。②测验对兔离体肠管活动的影响。在剂量在 4×10^{-2} 、 2×10^{-2} 、 1×10^{-2} 时，芍药汤组能使肠管出现急剧而振幅上升，进而消失的抑制现象。③杀菌作用测试。芍药汤组在 1:5, 1:10 时有杀菌作用，1:20 无作用；去槟榔组在 1:5 有杀菌作用，1:

10:20 均无作用。④对痢疾杆菌感染的预防治疗作用测试。芍药汤组小鼠存活为 6/10 只,去槟榔组无一存活,两组差异 $P < 0.02$,实验认为槟榔在芍药汤中尚有加强清热解毒作用。

31070 芍药汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】芍药一斤 黄芩 茯苓各六两

【用法】上为粗末。每服半两,水煎,去滓温服。

【功用】养阴去热。

【主治】①《保命集》:产后诸积不可攻者。②《医略六书》:产后热积,脉数弦虚微涩者。

【方论选录】《医略六书》:产后热积伤阴,不能涵养肝木而肝气不化,故胸膈不利,刺痛不止焉。黄芩清积热以凉胸膈,赤苓渗湿热以利营气,白芍敛阴和肝,青皮汁制调和肝气,以除热积伤阴之痛也。水煎温服,使热化气行,则积结自散而营阴暗复,经络清和,何胸膈刺痛之不已哉。

31071 芍药汤

《朱氏集验方》(人卫本)卷十。即原书(宛委别藏本)“芍药散”。见该条。

31072 芍药汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药 白术各一两 甘草 茯苓各五钱 黄芩二两

【用法】上锉细。每服一两,水煎服。

【主治】妇人妊娠伤寒,邪入太阴,自利腹中痛,食欲不下,脉沉者。

【备考】本方方名,《医方类聚》引作“芍药散”。

31073 芍药汤

《永类铃方》卷十八。为《金匱》卷下“当归散”之异名。见该条。

31074 芍药汤

《普济方》卷三十三。即方出《千金》卷十九,名见《圣济总录》卷五十三“芍药虎骨散”。见该条。

31075 芍药汤

《普济方》卷三三二。为《圣惠》卷七十二“牛膝散”之异名。见该条。

31076 芍药汤

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】人参(去芦根) 赤芍药 桔梗(去芦头) 地骨皮 杏仁(汤浸,去皮尖,蛤粉炒)各半两 木香 槟榔 甘草(微炙)各二两半

【用法】上咬咀。每服二钱,水半盏,煎至三分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿身体壮热,心腹胀闷,不思乳食,渐渐羸瘦。

31077 芍药汤

【方源】《幼科发挥·附方》。

【组成】白芍 泽泻 甘草 大茴 薄荷 木香 茺萸 生姜

【主治】①《幼科发挥》:小儿夜啼泄泻。②《慈幼心传》:小儿胎中受寒,或乳母好食生冷,或夜失盖,冷气侵袭儿腹,易夜多啼,面青白,面便亦青白。

【备考】《慈幼心传》本方用法:水煎服。

31078 芍药汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】芍药 栀子 黄连 石膏 连翘 薄荷各一钱 甘草三分

【用法】上锉。水煎,食后服。

【主治】脾火,或消谷易饥,或胃热口燥烦渴,或唇生疮,右关脉洪数者。

31079 芍药汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】芍药二钱 木香一钱 当归一钱 枳壳(去瓢)一钱 黄芩(去朽)一钱 槟榔一钱 黄连二钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎,温服。

【主治】虚弱人初痢。

31080 芍药汤

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】白芍 泽泻 薄荷 甘草

【主治】小儿湿热积滞于大肠,面成脱肛者。

【备考】治上证,宜少加大黄以泻其积滞之气。

31081 芍药汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】白芍 当归各一钱 槟榔二钱 厚朴一钱 甘草七分

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】瘟疫战汗后,复下后越二三日,反腹痛不止,欲作滞下,无论已见积、未见积。

【加减】里急后重,加大黄三钱;红积,倍芍药;白积,倍槟榔。

31082 芍药汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】白芍(酒炒) 甘草(炙) 忍冬 茯苓 黄芩各等分 薏苡仁倍用

【用法】水煎,热服。

【主治】痘将靨时微痒者。

31083 芍药汤

《嵩崖尊生》卷七。为《伤寒论》“芍药甘草汤”之异名。见该条。

31084 芍药汤

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】白芍药 木香 薄荷 泽泻 甘草

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】小儿胎寒,腹痛肠鸣,粪清下利,或时发寒慄,握拳曲足,失治而成盘肠溇泄,口噤慢惊者。

31085 芍药汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】生白芍

【用法】磨酒服。

【主治】痘痛。

31086 芍药汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】白芍一钱半(酒炒) 紫朴一钱(盐水炒黑) 白术一钱半(炒) 条芩一钱半(酒炒) 当归三钱 知母一钱半(酒炒) 人参一钱(生) 木香一钱 砂仁一钱(炒) 薤白三枚

【用法】水煎,去滓温服。

【功用】清补调中。

【主治】妊娠八月,胎热气壅,气壅不能统运其胎,而腹满疼痛,脉洪滑疾,按久软涩者。

【方论选录】生人参补气之虚,黑厚朴散气之壅,白术健脾生血,条芩清热安胎,当归养血荣经脉,白芍敛阴和血脉,知母清胎热以润燥,木香调中气以醒脾,砂仁醒脾开胃,薤白散滞宽中。水煎温服,务使热化虚回,则胎顺气调,而疼痛无不退,胎息无不宁矣。

31087 芍药汤

【方源】《续名医类案》引伍氏方。

【组成】炒白芍 薏仁 茯苓 地骨皮 银花 百合 山药 建莲

【主治】痘已破碎,声不哑,毒不陷者。

31088 芍药汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芍六钱 郁金三钱 降真香 花蕊石 炙草各二钱 侧柏叶(炒)

【主治】阴虚吐血。

【备考】方中侧柏叶用量原缺。

31089 芍药汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芍 生地 黄芩 丹皮 甘草

【主治】因火便血。

31090 芍药汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地 白芍 元参 麦冬 槐花 地榆 木耳 甘草

【主治】因火便血。

31091 芍药汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】生白芍 山楂(烧成炭) 桔梗各一钱五分 陈茶叶二钱 炙甘草七分 生姜五片

【主治】痢疾初起,身不热者。

【加减】如渴,加葛根一钱五分。

31092 芍药饮

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】赤芍药 麻黄（去根节，先煮，掠去沫，焙） 天门冬（去心，焙）各三两 杏仁（去皮尖双仁，炒）各五十枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大（切），煎至八分，去滓温服。

【主治】风湿痹，身体疼痛，恶风微肿。

31093 芍药饮

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】赤芍药 芍药各四两 附子（炮裂，去皮脐）二两 甘草（炙）三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服。

【主治】风湿痹，皮肤痒厚，肌肉痠痛，不可屈伸。

31094 芍药饮

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】芍药 牡丹皮各三分 熟干地黄（炮） 黄耆 甘草（炙） 白茯苓（去黑皮） 青葙子 白附子 防风（去叉） 山梔子仁（炒）各一两半 细辛（去苗叶）半两 枳实（去瓢，麸炒） 荆芥穗各三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加竹叶七片，煎至八分，去滓，空腹温服，食后、夜卧再服。

【功用】补虚。

【主治】肝劳不足。

31095 芍药饮

《圣济总录》卷一五六。为《千金》卷二引《逐月养胎法》“芍药汤”之异名。见该条。

31096 芍药饮

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】赤芍药一两 当归（切，焙）二两 柴胡（去苗）一两 麦门冬（去心，焙）一两半 黄芩（去黑心）一两 白茯苓（去黑皮）一两半 白术（锉）三分 甘草（炙）半两 鳖甲（去裙襕，醋炙）二两 常山三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，大枣二枚（擘），同煎八分，去滓，当未发前温服，不拘时候。

【主治】产后寒热疟，头疼体痛烦渴。

31097 芍药饮

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】芍药二两 甘草（炙，锉） 阿胶（炙令燥） 艾叶（炙） 当归（锉，炒）各一两 生干地黄（焙，锉）二两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后下痢赤白，心烦腹痛。

31098 芍药散

【方源】方出《外台》卷三十四引《小品方》，名见《医心方》卷十二引《令李方》。

【异名】白薇散（《圣济总录》卷一五七）、白薇芍药散（《三因》卷十七）。

【组成】白薇 芍药各等分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】妊娠小便多，产后遗尿，血淋，热淋。

①《外台》引《小品方》：产后遗尿不知出。

②《圣济总录》：妊娠小便无度。③《朱氏集验方》：血淋、热淋。

31099 芍药散

【方源】《外台》卷三十四引《深师方》。

【组成】芍药 通草 桂心 昆布 白薇 附子（炮） 黄耆 人参 海藻 木占斯各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后以清酒送下，一日三次。

【功用】消核。

【主治】乳痈肿，及颐下气结瘰癧。

31100 芍药散

【方源】《外台》卷三十四引《删繁方》。

【组成】芍药四分 牡蛎（熬） 干地黄 白术 干姜 乌贼鱼骨 附子（炮） 桂心 黄耆 龙骨各八分（研）

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下。

【主治】①《外台》引《删繁方》：妇人崩中，泄血不断，淋漓连年不绝，黄瘦伤损。②

《圣济总录》：妇人经血不止，兼五色不定。

31101 芍药散

【方源】方出《千金》卷六，名见《鸡峰》卷十。

【组成】生竹皮一升 芍药二两 芎蒭当归 桂心 甘草各一两 黄芩二两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮竹皮，减三升，下药，煎取二升，分三次服。

【主治】脏气虚，膈气伤，吐血，衄血，溺血，或起惊悸。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芍药竹茹汤”。

31102 芍药散

【方源】《医心方》卷十五引《令李方》。

【组成】芍药三分 大黄三分 白薇三分 莽草二分

【用法】上为末，和调之。每服半钱，酒送下，一日二次。不知，可稍增至方寸匕。

【主治】久痢疽漏。

31103 芍药散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白芍药一两 黄耆二两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头） 熟干地黄一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 干姜半两（炮裂，锉） 当归一两 前胡一两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 诃黎勒皮一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，纳饴糖枣许大，更煎一二沸，食前温服。

【主治】虚劳里急，四肢疼痛，气引胸胁不利。

【宜忌】忌菘菜。

31104 芍药散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】当归散（《普济方》卷三一一）。

【组成】赤芍药一两 当归一两（锉，微炒） 续断一两 白芷一两 生干地黄一两 黄芩一两 甘草一两（炙微赤，锉） 牛膝

一两（去苗） 蒲黄一两

【用法】上为细散。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】扑损筋骨，恶血不散，迷闷疼痛，小便下血。

31105 芍药散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白芍药一两 生干地黄一两 牡蛎粉一两 桂心半两 甘草一分（炙微赤，锉） 石膏一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚头痛。

31106 芍药散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】赤芍药一两 半夏三分（汤洗七遍去滑） 当归一两（锉，微炒） 桂心一两 草豆蔻三分（去皮） 甘草半两（炙微赤，锉） 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后血气不和，心腹疼痛，痰逆，不思饮食。

31107 芍药散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】赤芍药半两 桂心半两 芎蒭半两 黄芩半两 薯蓣半两

【用法】上为细散。一月及百日儿每服一字，粥饮调下，半岁及一岁儿每服半钱，连夜三五服。

【主治】小儿夜啼不止，胸滞气胀，膈中气逆，呕吐腹痛。

31108 芍药散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】赤芍药 人参（去芦头） 白术 黄芩 川大黄（锉，微炒） 当归各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿心痛。但觉儿将手数数摩心腹即啼，是心痛不可忍。

31109 芍药散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】芍药汤（《圣济总录》卷一八一）。

【组成】赤芍药一两 黄耆三分（锉） 犀角屑半两 槟榔半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿心气不足，舌本无力，令儿语迟。

31110 芍药散

【方源】《普济方》卷五十四引《圣惠》。

【组成】赤芍药 白芍药 川芎 当归 甘草 大黄 木鳖子各半两

【用法】上锉散。每服四钱，食后、临卧水煎服。

【主治】热壅生风，耳内痛与头相连，脓血流出。

31111 芍药散

【方源】《博济》卷三。

【异名】芍药汤（《圣济总录》卷九十七）。

【组成】赤芍药一两半 官桂（去皮）三两 甘草半两（炮）

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，加生姜半斤，汤少许，同煎至七分，温服。

【主治】非时下血及血痢。

31112 芍药散

【方源】《苏沈良方》卷八。

【组成】茱萸（炒）半两 黄连（炒） 赤芍药各一两

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。

31113 芍药散

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】芍药 防风 麻黄各三分 黄芩

防己 桂心 白术 人参 芎藭 独活 升麻 牛膝 石膏 橘皮 五加皮 羚羊角屑 各半两 杏仁二十个（去皮尖） 干葛一两

【用法】上为粗散。每服四钱，水一大盏，加竹沥二合，生姜半分，同煎至八分，滤去滓服。

【主治】卒暴风，口面僻邪，半身不遂，语不转，有气者。

31114 芍药散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《王岳产书》。

【组成】赤芍药一分 麻黄二分 甘草三铢（炮） 葛根一分 麦门冬（去心）一分 石膏二分 黄芩一分 柴胡（去头）一分

【用法】上锉，熬，为散。每服四钱，以水一盏，加生姜二片，煎取六分，去滓温服，每日五次，不拘时候。

【主治】妊娠五月或七八月内，急患时气，烦热口干，心躁头痛，四肢烦疼，不得安卧。

31115 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】赤芍药 黄耆（锉）各二两 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 续断（锉） 桂（去粗皮） 羌活（去芦头） 虎骨（酥炙） 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗） 大黄（生）各一两 乌头（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】腕折疼痛。

31116 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】赤芍药 黄耆 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 续断（锉） 桂（去粗皮） 羌活（去芦头） 虎骨（酥炙） 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）各一两 乌头（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】倒仆，筋脉蹇损。

31117 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】赤芍药 牛膝(焙，酒制)半两 桂(去粗皮) 当归(焙)各三分 木香 牡丹皮 延胡索 人参 甘草(炙) 芍药各半两 桃仁(麸炒)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，早、晚温酒调下。

【主治】室女月水不通。

【备考】方中赤芍药用量原缺。

31118 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】芍药 当归(切，焙) 芍药各一两 干姜(炮)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】室女月水来，腹疼痛。

31119 芍药散

《圣济总录》卷一五二。为《圣惠》卷七十三“熟干地黄散”之异名。见该条。

31120 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】白芍药一两 牡蛎(煅)半两 熟干地黄(焙)半两 木贼(銼，炒)一两 乌贼鱼骨(去甲) 干姜(炮)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食前米饮或温酒调下。

【主治】妊娠胎动，下血不止，脐腹疼痛，迷闷昏塞。

31121 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】芍药二两 白术一两半 黄芩(去黑心)一两 陈橘皮(汤浸去白，焙)一两 木香三分 丁香半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，空心炒生姜汤调下。

【主治】妊娠心腹痛。

31122 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】赤芍药二两 沤麻头一握(拣择净，銼碎) 芍药 当归(切，炒) 茯神(去木) 甘草(微炙) 陈橘皮(汤浸去白，焙)各二两 乱发灰一分

【用法】上为散。每服二钱匕，临卧时温酒调下，频服之。

【功用】催生。

【主治】难产。

31123 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】芍药半两(捣末) 乱发一分(烧灰)

【用法】上为末。每服二钱匕，以热酒调，温服之，须臾再服。

【主治】产后血晕，绝不识人

31124 芍药散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】芍药 芍药 廬虫(炙令焦)各一分

【用法】上为散。一月及百日儿，每服一字匕，用乳汁调服，半岁至一岁儿，每服半钱匕，连夜四服。

【主治】小儿夜啼腹痛。

31125 芍药散

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《吉氏家传》。

【组成】芍药 枳壳(去白，炒) 甘草 地榆(洗)各一钱 黄柏半两(去粗皮) 川乌头一个(炮)

【用法】上焙干为末。每服半钱，用白梅汤下。

【主治】小儿积痢。

31126 芍药散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《惠眼观证》。

【组成】芍药 大黄 甘草(炙) 当归 朴消各一分

【用法】上为末。每服一大钱，水一盞，瓦器中煎至半盞，去滓服。

【主治】小儿大小便下药不通者。

31127 芍药散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药二两 桂枝五钱

【功用】解利伤寒

【加减】往来寒热而呕，加柴胡散二钱半。

31128 芍药散

【方源】《朱氏集验方》卷十（宛委别藏本）。

【组成】香附子四两（黄子醋两碗，盐一两，煮干为度） 肉桂 延胡索（炒） 白芍药

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调下，不拘时候。

【主治】①《朱氏集验方》：妇人胁痛，凡药不进。②《景岳全书》：妇人血滞，腰胁痛。

【备考】本方方名，原书（人卫本）作“芍药汤”。方中肉桂、延胡索、白芍药用量原缺。

31129 芍药散

《普济方》卷一四一。即《圣惠》卷十三“赤芍药散”。见该条。

31130 芍药散

《普济方》卷一五三。为《全生指迷方》卷二“芍药黄耆汤”之异名。见该条。

31131 芍药散

【方源】《普济方》卷四〇七。

【组成】赤芍药 黄连 蛇床子

【用法】上为末。加轻粉半钱，麻油调涂。洗破立效。

【主治】小儿奶疥癣癩。

【宜忌】忌幼风物。

31132 芍药散

《普济方》卷四〇八。为方出《圣惠》卷九十，名见《圣济总录》卷一八二（文瑞楼本）“甘草散”之异名。见该条。

31133 芍药散

《医方类聚》卷二二六。即《云岐子保命集》卷下“芍药汤”。见该条。

31134 芍药膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】芍药 大黄 黄耆 独活（去芦

头） 白芷 当归各一两 薤白三两 生地 黄一两半（捶碎） 猪脂一斤半

【用法】上锉细，先熬脂令沸，下诸药，煎候白芷赤黑色，绵滤去滓。每取少许，涂敷疮上，一日三五次。

【功用】痈疽恶肉疮，蚀尽后生肌。

31135 芍药饮子

【方源】《产宝诸方》。

【组成】赤芍药半两 白茯苓一两 甘草一分半（炙） 汉防己一分 槟榔一个

【用法】上咬咀。每服二钱，加灯心五茎，水一盞半，煎至七分，去滓，热调琥珀散服。

【功用】产后调顺心经，开水道，解血结，利小肠。

31136 芍药浸酒

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】芍药 黄耆 生地黄各三两 艾叶一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。以绢袋盛，浸酒一斗，经宿后，每食前随量温饮之。

【主治】妇人血伤，兼赤白带下。

31137 芍药干姜汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药 干姜 白术 桂枝各半两

【用法】上锉细。每服五钱，加生姜，水煎服。

【主治】伤寒汗下后，腹中时痛，小便清者。

31138 芍药木香汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】白芍（酒炒）七钱 木香（湿纸包，煨） 炮姜各一钱 蕲艾（操去灰泥）一钱五分 炙草一钱 吴萸（黄连拌炒，去黄连）七分

【主治】虚寒人痢疾。

31139 芍药化毒汤

【方源】《医部全录》卷四九一引《幼科全书》。

【组成】白芍 归尾 连翘 红花 苦参（酒浸洗）

【用法】水煎服。

【主治】痘疹，寒战、咬牙并作。

31140 芍药六合汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】四物汤内倍加芍药

【主治】妇人气充经脉，月事频并，脐下痛。

31141 芍药甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】戊己汤（《症因脉治》卷四）、芍药汤（《蒿崖尊生》卷七）。

【组成】芍药 甘草（炙）各四两

【用法】以水三升，煮取一升五合，去滓，分二次温服。

【功用】①《杂症会心录》：温养脾土而生阴血。②《伤寒论讲义》：酸甘化阴，缓急止痛。

【主治】阴血不足，血行不畅，腿脚挛急或腹中疼痛。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦微恶寒，脚挛急，足温者。②《玉机微义》：小肠腑发咳，咳而失气。③《医统》：四时伤寒腹痛；小儿热腹痛，小便不通；痘疹肚痛。④《张氏医通》：营血受伤，热不止。⑤《类聚方广义》：小儿夜啼不止，腹中挛急甚者。⑥《伤寒温疫条辨》：妇人伤寒，汗解表除，热入血室，经水过多，无实满者；及杂病木克脾土，阴阳血气不和而腹痛。⑦《杂症会心录》：产后腹痛。

【宜忌】《辽宁中医杂志》（1981，4：25）：使用本方宜辨虚实，虚热者可用，虚寒者不宜用。

【方论选录】①《注解伤寒论》：芍药白补而赤泻，白收面赤散也。酸以收之，甘以缓之，酸甘相合，用补阴血。②《医方集解》：此足太阴、阳明药也，气血不和，故腹痛。白芍酸收而苦涩，能行营气；炙甘草温散而甘缓，能和逆气；又痛为木盛克土，白芍能泻肝，甘草能缓肝和脾也。

【临证举例】①足肿痛《经方实验录》：四嫂，足遇多行走时则肿痛面色紫，始则右足，

继乃痛及左足，天寒不可向火，见火则痛剧，故虽甚恶寒，必得耐冷，然天气过冷，则又痛，晨起而肿痛止，至夜则痛如故。按历节痛足亦肿，但肿常不退，今时有退者，非历节也，惟痛甚时筋挛。用芍药甘草汤以舒筋。赤、白芍各一两，生甘草八钱，二剂愈。②转筋《浙江中医杂志》（1982；4：181）：贾某某，男，53岁，左腿经常转筋，多在夜晚发作，发时腿肚聚起一包，腿不能伸直，患侧拇趾也向足心抽挛，疼痛难忍，脉弦细直，舌红绛少苔。此为肝血不足，血不养筋，筋脉细急所致。用白芍24克，炙甘草12克，四剂愈。③舞蹈症《山东中医杂志》（1983；6：4）：覃某某，女，11岁，手足不断舞动，行走摇摆不稳，双手持物不牢，面部呈鬼脸样动作，舌不断伸缩，头部摇晃，烦躁不安，舌淡苔白，脉弦细，有膝关节疼痛史，诊为小儿舞蹈症。系肝血不足，筋脉失养所致。治宜滋阴养血，缓急解痉。拟芍药甘草汤：芍药30克，甘草30克，水煎服，七剂愈。④胃扭转《上海中医药杂志》（1981；4：29）：孙某某，女，38岁，胃脘胀痛20多年，后10年伴发频繁呃逆，大声嗳气，每年复发2~3个月，近一年加重，呈持续状态，不能右侧卧，查上消化道未见器质性病变，胃呈扭曲状，诊为胃扭转。用芍药20克，甘草20克，日一剂，浓煎取汁，日服三次。服药后第一天，诸症减，续服20余剂痊愈，查胃形态恢复正常。⑤过敏性肠炎《辽宁中医杂志》（1981；4：25）：范某某，男，成人，腹痛，腹泻绵绵不愈，诊为过敏性肠炎。神疲倦怠，舌质淡，苔薄白，脉小弦，腹痛，按之则舒。此乃肝脾不和，脾气滞结，脉络不行，治宜调肝和脾。方用芍药甘草汤：生白芍30克，生甘草15克，服4剂痊愈。⑥顽咳《湖南中医杂志》（1986；1：44）：李某某，男，55岁，咳嗽少痰，郁郁微烦一年余，食纳一般，二便调，舌边尖红赤，少苔，脉沉弦细稍数，曾服二陈汤、止嗽散、九仙散等无效。据其证

见郁郁微烦等，试以肝火犯肺论治。方用芍药甘草汤：白芍 30 克，甘草 20 克，日服一剂，水煎取汁 200 毫升，一日三次，服 5 剂愈。

【现代研究】镇痉作用《国外医学·中医中药分册》(1981; 5: 46): 芍药甘草汤水煎剂对雄鼠回肠进行实验研究，结果表明：本方对外因性乙酰胆碱作用于回肠引起的收缩有抑制作用；对经肠壁的低频电刺激引起的牵拉反应，有轻度持续性抑制作用。《上海中医药杂志》(1957; 10: 21): 大量的芍药甘草汤对病变性的异常兴奋起显著的抑制、镇静作用；而小量的芍药甘草汤，对胃肠运动机能，反而呈现了兴奋的，促进的作用。

31142 芍药甘草汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】芍药 干地黄 黄耆各三两 甘草(炙)一两半 人参一两 茯苓 麦门冬(去心) 生姜(切)各二两

【用法】上咬咀。以水八升，煮取二升五合，分三次服。

【主治】肿疮发背。

31143 芍药甘草汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷二引仲景方。

【组成】桂枝二钱 甘草(炙)一钱半 芍药 白术 附子(炮)各一钱

【用法】上锉，作一贴。水煎服。

【主治】伤寒，汗后恶寒。

31144 芍药甘草汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】芍药 甘草 石膏 荆芥

【功用】调和阴血。

【主治】伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，咽干烦燥。

【方论选录】此方妙在石膏、荆芥辛凉上焦，润其咽干烦燥，又籍其辛凉入血，助芍药、甘草下缓肝急，使其脚伸。

31145 芍药地黄汤

【方源】《外台》卷二引《小品方》。

【异名】犀角地黄汤(《千金》卷十二)、地黄汤(《伤寒总病论》卷三)、解毒汤(《卫生总微》卷八)、解毒散(《杨氏家藏方》卷十九)。

【组成】芍药三分 地黄半斤 丹皮一两 犀角屑一两

【用法】上切。以水一斗，煮取四升，去滓，温服一升，一日二三次。

【功用】①《外台》引《小品方》：消化瘀血。②《方剂学》：清热解毒，凉血散瘀。

【主治】热扰心营，神昏谵语，斑色紫黑，舌绛起刺；热入血分，吐血，衄血，尿血，便血；蓄血发狂，漱水不欲咽，胸中烦痛，自觉腹满，大便色黑。

①《外台》引《小品方》：伤寒及温病，应发汗而不发之，内瘀有蓄血，其入脉大来迟，腹不满，自言满者；及鼻衄吐血不尽，内余瘀血，面黄，大便黑者。②《景岳全书》引《局方》：劳心动火，热入血室，吐血衄血，发狂发黄，小儿疮痘血热。③《卫生总微》：小儿脏腑蕴热，积毒发泻，斑疮稠密，脓血大盛，狂躁发渴，咽嗑不利，遍身溃烂，苦无全肤，不能转侧，疼痛不任。④《杨氏家藏方》：小儿疮疱出足，壅盛喘急，浸淫成片。⑤《朱氏集验方》：小肠淋漓出血，疼痛难忍，心血妄行，衄血。⑥《此事难知》：蓄血证实者，当汗不汗，热入于里，血在上，呕血吐血，胸中手不可近。⑦《永类铃方》：温毒发斑；伤寒热病十日以上，汗吐利后热不除，身斑出。⑧《医方考》：劳心动火，吐血，衄血者；心移热于肺而咳嗽出血者；诸见血、失血，血热者。⑨《金鉴》：跌打损伤坠堕之证，恶血留内，胁肋少腹疼痛。⑩《温病条辨》：时欲漱口，不欲咽，大便黑而易者。

【宜忌】①《普济方》：体衰弱不宜用。②《医贯》：若阴虚火动吐血与咳咯者，可以借用成功；若阴虚劳力及脾胃虚者，俱不宜。

【加减】有热如狂者，加黄芩二两。

【方论选录】①《医方考》：心主血，生地

黄所以凉心血；肝纳血，白芍药所以和肝血；火能载血，牡丹皮所以去血中伏火；热能行血，犀角所以解诸经之热。②《医方集解》：此足阳明、太阴药也。血属阴，本静，因诸经火逼，遂不安其位而妄行。犀角大寒，解胃热而清心火；芍药酸寒，和阴血而泻肝火；丹皮苦寒，泻血中之伏火；生地大寒，凉血而滋水，以共平诸经之僭逆也。③《千金方衍义》：血得辛温则散，得苦寒则凝。此方另开寒冷散血之门，特创清热解毒之法，全是犀角通利阳明，以解地黄之滞；犹赖赤芍、牡丹下气散血，允为犀角、地黄之良佐。④《金鉴》：吐血之因有三：曰劳伤，曰努伤，曰热伤。劳伤以理损为主，努伤以去瘀为主，热伤以清热为主。热伤阳络则吐衄，热伤阴络则下血。是汤治热伤也，故用犀角清心去火之本，生地凉血以生新血，白芍敛血止血妄行，丹皮破血以逐瘀。此方虽曰清火，而实滋阴；虽曰止血，而实去瘀。瘀去新生，阴滋火熄，可为探本穷源之法也。

【临证举例】①胃出血《中医杂志》(1958；5：339)：谢某某，男，36岁。有胃痛史，忽然大痛，吐紫血块，大便亦下血块，头汗淋漓，心慌头晕，吐下不止，脉洪大，诊为胃出血。投犀角地黄汤，四剂愈。方用：乌犀角一钱，生地黄五钱，丹皮三钱，杭白芍三钱。犀角别研极细末，另三味药以水1.2升，煎至800毫升，分四次兑犀角末服。②咯血《中医杂志》(1958；5：339)：胡某某，男，42岁。咯痰带血一月余，右胸痛连后背，口中腥臭，继之吐血，脉细数，头晕眼花，心烦气短，咳嗽胸痛，诊为肺出血。投犀角地黄汤，加阿胶、枇杷叶。三服后止血，后用千金苇茎汤三剂愈。③崩漏《中医杂志》(1958；5：339)：冯某某，女，31岁。突然血崩，时下时止，缠绵三月余，消瘦，贫血，头晕气喘，手足心午后发烧，脉细数，投犀角地黄汤，一剂崩止，三剂愈。④血小板减少性紫癜《中医杂志》(1963；11：12~15)：以犀

角地黄汤为主，治疗11例原发性血小板减少性紫癜。患者均有不同部位，不同程度的出血症状，并均有发热及不同程度的头昏眼花，心悸无力等贫血症状，其中2例因大量失血而发生昏迷。血小板 $6\text{万}/\text{mm}^3$ 以下者5例，其余均在6万至8万之间。鉴于病情急性发作者均有口干思饮，烦躁不安，面红，瘦黄，舌红有薄苔不润，脉象滑数而躁动不宁等一派内热炽盛之象，故采用清热凉血解毒法为主。服用此汤后，多见出血症状首先停止，出血时间缩短，血小板数上升，血块收缩随之改善。据此，本方可能是首先改善毛细血管壁之通透性，继而使血小板数逐渐恢复。加减法：热盛者，配合紫雪丹或羚羊角；出血较多，加参三七粉、云南白药及十灰散等；后期出现出血减少，舌红少苔，脉细数无力等阴虚内热症状者，酌加龟版、阿胶、旱莲草、女贞子、麦冬等。

31146 芍药地黄汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】芍 归 白芍 生地 丹皮 柴胡 桔梗 黑荆芥 焦山栀(七日后加) 泽兰 香附 甘草 陈皮

【功用】补血清肝，解郁扶脾。

【主治】血虚兼七情所伤，暴怒伤肝，忧郁伤脾，产后乳汁不行及乳少者。

【方论选录】是方四物补血、丹皮、焦栀、柴胡清肝火，香附、陈皮解脾郁，泽兰、荆芥祛风热，桔梗开乳窍，甘草泻内热。

31147 芍药地黄汤

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】芍药 生地黄 黄芩 牡丹皮各五钱

【用法】上以水六升，煮取三升，去滓温服，每次一升，一日三次。

【主治】伤寒发热疹出血，并有积，喜忘如狂，鼻衄面黄，大便黑，及时行本有蓄血，腹胁满如鼓者。

31148 芍药地榆汤

【方源】《医方集解》引河间方。

【组成】苍术地榆汤加芍药 阿胶 卷柏

【主治】泄痢脓血，乃至脱肛。

【方论选录】《医林纂要》：芍药，治痢君药；苍术以燥湿，且舒郁热而升达阳气；卷柏辛咸平，生于水石，得清洁之气，而色青紫入肝，能除血分之浊热，去瘀软坚，炙用能止崩漏、脱肛，肠风血痢；阿胶滋阴养血，兼能补肺宁心。此亦热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，酸收，苦发之道。但痢至脱肛，则似宜加以升提温补，而后为无弊也。

31149 芍药竹茹汤

《普济方》卷一九〇。即方出《千金》卷六，名见《鸡峰》卷十“芍药散”。见该条。

31150 芍药防风汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】赤芍 陈皮 升麻 防风 桔梗 川芎 枳壳 厚朴 甘草

【主治】痘出不快，腹痛，烦躁啼叫者。

【备考】《金鉴》本方用法：引用生姜，水煎服。

31151 芍药防风汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】白芍 陈皮 升麻 防风 桔梗 川芎 枳实 厚朴 甘草 白芷 香附

【主治】痘出不快，腹痛烦躁。

【加减】大便秘，加酒大黄；感寒，加苏叶，生姜引。

31152 芍药补气汤

【方源】《东垣试效方》卷九引张洁古方。

【异名】补气汤（《兰室秘藏》卷下）。

【组成】黄耆一两 白芍药一两半 橘皮（不去白）一两 泽泻半两 甘草（炙）一两

【用法】上咬咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】肺气不行，皮肤间麻木。

31153 芍药虎骨散

【方源】方出《千金》卷十九，名见《圣济总录》卷五十三。

【组成】芍药一斤 生干地黄五斤 虎骨

四两

【用法】上咬咀，以清酒一斗，渍三宿，晒干，复入酒中，如此取酒尽为度，为末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】①《千金》：骨髓中疼。②《圣济总录》：骨髓虚冷，疼痛倦怠。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芍药汤”。

31154 芍药和中汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】苍术 白术各一钱 厚朴八分 白芍药 泽泻 猪苓 赤茯苓各七分 甘草五分 官桂三分

【用法】上锉。加生姜二片，大枣一枚，水煎，空腹服。

【主治】泄泻腹痛，兼痢疾红白。

【加减】痢疾红白，去官桂。

31155 芍药知母汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】桂心 知母 防风各四两 芍药 甘草（炙） 麻黄（去节） 附子（炮，去皮脐）各三两（一法有白术、川芎、杏仁、半夏）

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓，空腹服。

【主治】诸肢节疼痛，身体羸羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐。

31156 芍药枳术丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术二两（面炒） 赤芍药二两（酒炒） 枳实一两（面炒） 陈皮一两

【用法】上以荷叶汤煮黄老米粥为丸，如梧桐子大。每服百余丸，米饮或滚白汤任下。

【主治】食积痞满及小儿腹大胀满，时常疼痛，脾胃不和。

【加减】如脏寒，加干姜（炒黄者）五钱或一二两；脾胃气虚，加人参一二两。

31157 芍药枳实散

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】白术(净)四钱 枳实(面煨,去瓢)二钱 赤芍 莲仁(去心) 陈皮各一钱

【用法】加炒香老米一钱,共为细末。每服一钱或一钱五分,米饮调下;白汤下亦可。

【主治】小儿肚腹膨胀,或不时作痛。

31158 芍药柏皮丸

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】芍药 黄柏各一两 当归 黄连各半两

【用法】上为末,水为丸,如小豆大。每服三四十九,温水送下,不拘时候,兼夜五六服。

【主治】一切湿热恶痢,频并窘痛,无问脓血。

【宜忌】忌油腻脂肥、发热等物。

31159 芍药柏皮丸

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药 黄柏各等分

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸至二百丸,食前温水送下。

【主治】溲而便脓血。

31160 芍药柏皮丸

【方源】《医方类聚》卷一四〇引《医林方》。

【组成】白芍药 黄柏 当归各等分

【用法】上为细末,滴水为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,煎甘草汤送下。

【主治】脏毒,先血而后便。

31161 芍药柏皮丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】白芍药 黄柏各一两 当归 黄连 枳壳各五钱

【用法】上为末,滴水为丸,如绿豆大。白汤送下。

【主治】一切脓血恶痢窘痛。

31162 芍药梔鼓汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药 当归 梔子各五钱 香豉半合

【用法】上锉细。每服一两,水煎服。

【主治】产后虚烦不得眠。

31163 芍药香连汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】白芍一两 香附二钱 炙甘草三分 川连一钱 灯草一钱 柴胡三分 莲子心一钱 梔子一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】心胁穿痛。

31164 芍药香附丸

【方源】《医统》卷二十六引《元戎》。

【组成】芍药(炒) 香附子(制)各一两 苍术五钱 片苓三钱 甘草二钱

【用法】上为末,蒸饼为丸服。

【主治】久病阴虚,内热夜甚。

31165 芍药香附汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】芍药 香附 干姜 甘草 丁子砂仁

【用法】每服四钱,以水二合,煮取一合,温服。

【主治】产后下利,上气足冷,时发热,肠鸣切痛。

【加减】下利不已,干噎食臭,加黄连。

31166 芍药健脾汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】山药 扁豆 石斛 萎蕤 沙参 白芍 陈皮 白茯苓 山楂 神曲 花粉

【主治】痢疾,胸中不宽,脏腑虚燥,大渴欲饮,脉来细数。

31167 芍药润燥丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 山药各一两 炒梔子三钱 芡实一两

【用法】水煎服。

【主治】怒气伤肝,忽然梦遗,久而不止,凡增烦恼,泻精更多,其症两胁多闷,火易上升于头目,饮食倦怠,发躁发胀。

31168 芍药黄土汤

【方源】《医学金针》卷八。

【组成】甘草 白术 附子 阿胶 地黄 黄芩各一钱 芍药二钱 灶中黄土三钱

【用法】流水煎，温服。

【主治】痘家便血。

31169 芍药黄芩汤

《准绳·类方》卷六引东垣方。为《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》“黄芩汤”之异名。见该条。

31170 芍药黄芩汤

【方源】《顾松园医镜》卷六。

【组成】白芍(炒)二至四钱 甘草 黄芩 黄连 枳壳 橘红 茯苓各一至三钱

【主治】热邪传入太阴，腹满咽干，吐而食不下，自利而腹痛。

【加减】便脓血，加地榆，调服滑石末三五钱；便脓血不止，佐以升麻(醋炒)三至七分、葛根钱许；若呕吐者，加石莲子(去心，炒黄)、陈松萝茶各三五钱；腹满呕吐者，去甘草。

【方论选录】此方和解清热为主，佐以利气除湿之药。方中白芍安脾胃而和血脉，治腹痛而止泻利，黄连清热邪，枳壳破结气，橘红通滞气，茯苓益脾胃，止吐泻。

31171 芍药黄连汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】芍药 黄连(去须) 麦门冬(去心，焙)各三分 栝楼根半两 甘草(炙)一分 黄芩(去黑心)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盞，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒温病，吐下后有余热，烦渴不止。

31172 芍药黄连汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药 当归 黄连各半两 大黄一钱 桂(淡味)半钱 甘草一钱(炙)

【用法】上咬咀。每服半两，水一盞，煎至七分，食后温服。

【主治】大便后下血，腹中痛者，为热毒下

血。

【加减】痛甚者，调木香、槟榔末一钱服之。

31173 芍药黄连汤

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】黄连 当归 芍药 甘草

【用法】调天水散服。

【主治】小儿下痢白积腹痛，里急后重。

31174 芍药黄耆汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】芍药四两 黄耆 白芷 桂心 生姜 人参 芎藭 当归 干地黄 甘草各二两 茯苓三两 大枣十枚

【用法】上咬咀。以酒、水各五升，合煮取三升，去滓，食前服一升，每日三次。

【主治】产后心腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》：此以血气亏损而致心腹疼痛，故用保元合内补当归建中之制，更加芎、地以滋冲脉之虚，苓、芷以散子户之风也。

31175 芍药黄耆汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】芍药四分 黄耆三两 白芷 桂心 生姜 甘草(炙)各二两 大枣十枚(擘)

【用法】上咬咀。以酒、水各五升，合煮取三升，空腹服一升，每日三次。

【主治】产后心腹痛。

31176 芍药黄耆汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【异名】芍药散(《普济方》卷一五三)。

【组成】芍药三钱 黄耆 甘草(炙) 青蒿(阴干)各一两

【用法】上为散。每服五钱，水二大盞，煎至一盞，去滓，食后温服。

【主治】①《全生指迷方》：阴气亏少，少水不能制盛火，发热从背，或从手足渐渐遍身，或昼发而夜宁，或夜发而至旦即消。口舌干燥，欲饮水而不能，其脉虚疾而小。②《普济方》：阴虚发热。

31177 芍药黄耆汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】芍药二两 黄耆三两 川芎二两 乌头(炮, 去皮)半两

【用法】上为散。每服五钱, 水二盏, 加生姜三片, 大枣一个, 同煎至一盏, 去滓温服。

【主治】劳风。眩晕, 但欲上视, 目瞑不能开, 开而眩, 唾出若涕, 恶风振寒。

31178 芍药黄耆汤

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】黄耆二两 白芍药 白术各一两半 甘草一两

【用法】每服五钱, 加煨姜三片, 大枣一枚, 水煎服。

【主治】虚劳自汗不止。

31179 芍药黄耆散

【方源】《普济方》卷一〇七引《指南方》。

【组成】芍药 黄耆 川芎各三分

【用法】上为粗末。每服五钱, 水二盏, 加生姜三片, 大枣二个, 同煎至一盏, 去滓温服。

【主治】劳风。

31180 芍药清肝散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】白术 川芎 防风各三分 甘草(炙) 荆芥各二分半 桔梗 羌活各三分 芍药二分半 柴胡二分 前胡 薄荷 黄芩各二分半 山梔 知母各二分 滑石 石膏各三分 大黄四分 芒消三分半

【用法】上咬咀, 都作一服。水二钟, 煎至一钟, 食后热服。

【主治】眊多眵躁, 紧涩羞明, 赤脉贯睛, 脏腑秘结。

【方论选录】上方为治淫热反克面作也。风热不制之病, 热甚大便硬者, 从权用之。盖苦寒之药也, 苦寒败胃。故先以白术之甘温、甘草之甘平, 主胃气为君; 次以川芎、防风、荆芥、桔梗、羌活之辛温, 升散清利为臣; 又以芍药、前胡、柴胡之微苦, 薄荷、黄芩、山梔之微苦寒, 且导且攻为佐, 终以知母、滑

石、石膏之苦寒、大黄、芒消之大苦寒、祛逐淫热为使, 此逆则攻之治法也。大热服者, 反治也。

31181 芍药蒺藜煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】龙胆草 梔子 黄芩 木通 泽泻各一钱半 芍药 生地各二钱 白蒺藜(连刺, 捶碎)五钱(甚者一两)

【用法】水二钟, 煎至八分, 食远服。外以嫫蛸散敷之。

【主治】通身湿热疮疹, 及下部红肿热痛诸疮。

【加减】如火不甚者, 宜去龙胆、梔子、加当归、茯苓、薏仁之属; 如湿毒甚者, 加土茯苓五钱至一二两。

31182 芍药解肌汤

《普济方》卷三六九。为《千金》卷五“芍药四物解肌汤”之异名。见该条。

31183 芍药槟榔散

【方源】方出《证类本草》卷八引《博济》, 名见《赤水玄珠》卷十五。

【组成】赤芍药一两 槟榔一个(面包煨)

【用法】上为末。每服一钱匕, 空心白汤调下。

【主治】五淋。

31184 芍药甘草附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】芍药附子甘草汤(《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》)。

【组成】芍药 甘草(炙)各三两 附子一枚(炮去皮, 破八片)

【用法】以水八升, 煮取一升五合, 去滓, 分三次温服。

【功用】《伤寒论教学参考资料》: 扶阳益阴。

【主治】伤寒发汗后阴阳俱虚, 反恶寒; 疮家发汗成痉。

①《伤寒论》: 发汗病不解, 反恶寒, 虚故也。②《云岐子保命集》: 发汗病不解, 小便

滑,大便依度,腹痛。③《张氏医通》:疮家发汗成疮。

【方论选录】①《注解伤寒论》:芍药之酸,收敛津液而益荣;附子之辛温,固阳气而补卫,甘草之甘,调和辛酸而安正气。②《伤寒来苏集》:发汗后反恶寒,里虚也。表虽不解,急当救里,若反与桂枝攻表,此误也。故于桂枝汤去桂、姜、枣,加附子以温经散寒,助芍药、甘草以和中耳。脚挛急与芍药甘草汤,本治阴虚,此阴阳俱虚,故加附子,皆仲景治里不治表之义。

31185 芍药四物解肌汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】四物汤(《圣济总录》卷一七四)、芍药解肌汤、四物解肌汤(《普济方》卷三六九)。

【组成】芍药 黄芩 升麻 葛根各半两

【用法】上咬咀。以水三升,煮取九合,去滓分服。一岁以上分三服。

【主治】①《千金》:少小伤寒。②《普济方》:小儿伤寒,烦热头体痛。

【方论选录】《千金方衍义》:此升麻汤兼黄芩汤之制。以升麻汤专行阳明,黄芩汤专走少阳,此则兼解二经风热也。

31186 芍药汤加芒消方

【方源】《医方考》卷二。

【组成】白芍药二钱 当归尾 黄连 黄芩各一钱 木香(不见火) 桂心 槟榔 甘草各五分 大黄七分 芒消一钱

【主治】痢疾便脓血,里急后重者。

【方论选录】河间云:行血则便脓自愈,故用归、芍、消、黄以行血;和气则后重自除,故用木香、槟榔、甘草以和气;苦能坚肠,寒能胜热,故用芩、连厚肠胃而去热;有假其气,则无禁也,故假桂心之辛热为反佐。

31187 芍药芩连葛根汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】甘草 芍药 黄芩 黄连 葛根

【主治】火泻。

31188 芍药附子甘草汤

《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》。为《伤寒论》“芍药甘草附子汤”之异名。见该条。

31189 芍药枣仁柴胡汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】芍药三钱 甘草三钱 首乌三钱 枣仁三钱(生研) 柴胡三钱 丹皮三钱

【用法】煎半杯,热服。

【主治】目珠突出者。

31190 芍药桂苓胶地汤

【方源】《医学金针》卷八。

【组成】芍药 生地 茯苓各三钱 阿胶 生姜各二钱 桂枝 甘草各一钱

【用法】流水煎,温服。

【主治】疹后目疾。

芫

31191 芫柏散

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】白芫三钱 黄柏三分

【用法】上为细末。用葱汁调敷患处一昼夜。

【主治】飞灶丹,从头顶上红肿起。

芒

31192 芒消丸

【方源】《医心方》卷二十引《承祖方》。

【组成】芒消三两 大黄三两 杏仁三两

【用法】上各别捣治,先末大黄,芒消下从后,捣杏仁子令如膏,乃合三物,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二丸,一日二次。

【主治】积热呕吐。

31193 芒消丸

《千金》卷十五。为《医心方》卷十二引《经心录》“芍药汤”之异名。见该条。

31194 芒消丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】川芒消半两 川大黄半两(锉碎,微炒) 半夏一分(汤洗七遍去滑) 代赭

半两 甘遂一分(微炒) 杏仁十粒(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服两丸,空心以温水送下。

【主治】小儿痰实,往来寒热,不欲饮食,肌体羸瘦。

31195 芒消丸

《普济方》卷三八六。为《千金》卷五“芒消紫丸”之异名。见该条。

31196 芒消汤

【方源】《外台》卷三十引《延年秘录》。

【组成】芒消三两

【用法】用汤一升,纳芒消令消散,以帛子沾取拭疹。

【主治】①《外台》引《延年秘录》:赤疹,心家稍虚,热气相搏,其色赤。②《千金》:漆疮。

31197 芒消汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】芒消 丹砂(末) 当归 芍药 土瓜根 水蛭各二两 大黄三两 桃仁一升

【用法】上㕮咀,以水九升,煮取三升,去滓,纳朱砂、芒消,分为三服。

【主治】月经不通。

【方论选录】《千金方衍义》:芒消汤一方,药只八味,乃抵当汤、丸之三,土瓜根散之二,桃仁汤中之七,独以丹砂一味,镇摄心主,使血各归其乡,不致窜入窠囊复为瘀积,既败之血随消、黄、水蛭、桃仁引之下泄,与桃仁汤前后并驰,无分优劣。

31198 芒消汤

【方源】方出《千金》卷十五,名见《医心方》卷十二。

【组成】芒消二两 乌梅 桑白皮各五两 芍药 杏仁各四两 麻仁二两 大黄八两(一本无乌梅,加枳实、干地黄各二两)

【用法】上㕮咀,以水七升,煮取三升,分三服。

【主治】关格,大便不通。

【方论选录】《千金方衍义》:关格危证,不为急通,命悬呼吸。故于麻仁丸中削去枳实,厚朴之缚缓,易之芒消以峻攻。又恐津随药脱,即以乌梅敛之。用桑根皮者,通泄肺气于下,取其有利水之功也。读古人方须要识当时立方缓急之用,方不失先哲垂诲后世之心。印此方,端为实热暴关、涓滴不通者设。设久病阴虚,肝肾不能司开合之权而渐至闭拒,有时滴沥者,亟为峻补真阴,通调气化,尚恐难为,既摘之荣,况可消、黄漫施乎!

【备考】按:《医心方》引本方无乌梅,桑白皮作乌柏根皮。

31199 芒消汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】芒消 桂心各二两 通草 甘草各三两 白术一两 李核仁二十一枚 大枣二十枚

【用法】上㕮咀,以水八升,煮取三升,分三服。

【主治】白石英动附子之毒已解,烦热腹胀,胃中有余热者。

【加减】若腹胀,去芒消,加人参二两。

【方论选录】《千金方衍义》:身热虽解,而烦热腹胀不除,则与芒消汤荡涤肠胃,仍兼桂心、李仁、甘草之类,更加通草利水通窍,白术、大枣滋培津气以杜悍烈之复入。而方后又有腹胀去芒消、加人参之例,从前既用大黄得下而胀,此际岂可复用芒消之荡涤欤?

31200 芒消汤

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】木防己 白术 鬼白各一两半 芒消 芍药 当归各二两 大黄三两 蜈蚣(炙) 蜥蜴(炙)各二枚 甘草一两(炙)

【用法】上㕮咀,以水七升,煮取二升,去滓,下芒消,分为三服,每日三次。

【主治】暴瘕坚结。

31201 芒消汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】芒消(别研) 生干地黄(洗,切,

焙) 白术 甘草(炙)各一两 豉(炒) 白茯苓(去黑皮)各一两半 石膏(碎)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加竹叶十片,葱白二寸,煎至一盞,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱走哺,呕吐不止,噎塞满闷。

31202 芒消汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】芒消(研)二两半 冬葵子(微炒)三合,滑石(碎)三两

【用法】上三味,除芒消外,哎咀二味。每服五钱匕,水一盞半,煎至一盞,去滓,入芒消末半钱匕,更煎二沸,空心温服。

【主治】关格不通,脘肠妨闷,大小便不通。

31203 芒消汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】芒消 黄连(去须) 黄芩(去黑心) 甘草(炙令赤)各一两 梔子仁 大黄(锉,炒)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,早晚各一次。

【主治】乳石发动,上气,热实不解,心腹满闷,大小便不通,口燥目赤。

31204 芒消汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】芒消 枳壳 厚朴

【主治】伤寒十三日不解,胸胁满而呕,日晡所发潮热,已而微利。

31205 芒消饮

《圣济总录》(文瑞楼本)卷一五七。即原书同卷(人卫本)“芒消散”。见该条。

31206 芒消散

【方源】方出《千金》卷十,名见《普济方》卷一九五。

【组成】大黄一两半(末) 生地黄汁八合 芒消一两

【用法】上三味合和。每服五合,一日二次,以利为度。

【主治】急黄,热气骨蒸,两目赤脉。

【方论选录】《千金方衍义》:疸发而见骨

蒸,似乎虚象,以病起于急,属实何疑?其两目脉赤,又为血热之验。故于《金匱》大黄消石汤中裁去黄柏、梔子之苦寒,加入生地黄汁,专化血脉之滞也。

31207 芒消散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】川芒消二两 前胡一两(去芦头) 枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄) 葛根一两(锉) 川大黄二两(锉碎,微炒) 半夏一两(汤洗七遍,去滑)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盞,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候,以利为度。

【主治】伤寒失下,九日不解,致令内实,胸胁逆满,日晚即潮热者。

31208 芒消散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】川芒消 黄连(去须) 黄芩 枳壳(麸炒微黄,去瓢) 梔子仁 钩藤(锉)各一两 川大黄三分(锉碎,微炒) 甘草三分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服二钱,食后以乌豆汤调下。

【主治】丹石毒攻眼,疼痛、肿、生翳,心神躁乱。

31209 芒消散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】川芒消二两 川大黄一两(锉碎,微炒) 梔子仁一两 甘草一两(生,锉) 黄芩一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盞,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】发背。大小便不通,心神烦躁,脐腹妨闷。

31210 芒消散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】川芒消三分 川大黄三分(锉碎,微炒) 赤茯苓三分 木通一两(锉) 黄芩半两 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，葱白二寸，煎至五分，去滓温服。

【主治】八九岁儿脏腑结实壮热。

31211 芒消散

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】芒消（别研）半两 赤茯苓（去黑皮，为末）一两

【用法】上为末。每服二钱匕，蜜熟水调下。心烦躁热者，以冷蜜水调下。

【主治】膀胱结热不通。

31212 芒消散

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷一五七。

【组成】芒消 蒲黄 芎蒭 桂（去粗皮）鬼箭羽各半两 生干地黄（焙）一两 桃仁（去皮尖双仁，炒）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】半产后恶露不尽，气攻疼痛，血下成块，结筑脐腹。

【备考】本方方名，原书（文瑞楼本）作“芒消饮”。

31213 芒消紫丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】芒消丸（《普济方》卷三八六）。

【组成】芒消 大黄各四两 半夏二两 代赭一两 甘遂二两 巴豆二百枚 杏仁一百二十枚

【用法】上为末，别捣巴豆、杏仁治如膏，旋纳药末，捣三千杵，令相和合，强者纳少蜜为丸，如胡豆大。百日儿服一丸，过百日至一岁服二丸，随儿大小，以意为度。当候儿大便，中药出为愈。若不出，更服如初。

【主治】小儿宿食、癖气、痰饮，往来寒热，不欲食，消瘦。

【方论选录】《千金方衍义》：牛黄丸为膏粱者设，芒消紫丸为藜藿者设。方中芒消以代真珠之涤热；大黄、甘遂以代牛黄之荡实；半夏以代附子之破结，在粗厉之子，原无藉于

峻温也。

【备考】方中甘遂，《普济方》作甘草。

31214 芒消甘草汤

【方源】《急救便方》。

【组成】芒消 甘草

【用法】水煎服。

【主治】一切毒，在下者。

31215 芒消猪胆膏

【方源】《万氏家抄方》：卷六。

【组成】乳香 没药 芒消各一钱 滑石三钱

【用法】上为细末，猪胆汁调搽疮上。如疮生蛆，巴豆数粒，烧熟研细加入。

【主治】痘疮不落生疮者。

芝

31216 芝麻酒

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】芝麻（炒焦）二两

【用法】上为末。热黄酒冲服，取暖汗出。

【主治】偶感风寒；心气痛。

31217 芝麻仁汤

【方源】《医统》卷四十九引《易简方》。

【组成】麻仁四升

【用法】以水六升，猛火煮，令芽生，去滓，煎取七合。空心服，以手摩手足心自定。

【主治】癫风。

芎

31218 芎汤

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】老芎一块

【用法】上磨汁，煎取一小盏或一二大盏，食后服。

【主治】风痹，骨节疼痛。

31219 芎乌散

《医方类聚》卷八十一引《济生续方》。为《妇人良方》卷二十二“川芎散”之异名。见该条。

31220 芎乌散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】川芎三两 乌药三两

【用法】上为散。薤白汤煎三钱，去滓温服。

【主治】产后气滞头痛，脉沉涩者。

【方论选录】产后怒郁伤肝，肝气滞逆经络，不能通畅，故头角作痛不休焉。川芎入血海，能行血中之气以升阳；乌药入气海，能疏滞逆之气以降浊。为散以疏其逆气，薤白以通其滞气，务使滞气消化，则经络通畅，而逆气和平，清阳得位，安有头角作痛之患哉！

31221 芎术丸

《圣济总录》卷一〇八。为原书卷一〇七“芎辛丸”之异名。见该条

31222 芎术丸

《丹溪心法》卷三。为原书同卷“越鞠丸”之异名。见该条。

31223 芎术丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】川芎 枳壳 甘草 白茯苓 桔梗各三钱 乌药 苍术 威灵仙 陈皮 羌活 白芷 当归 黄芩 苍耳子 秦艽 白术 杜仲 熟地 香附 海风藤 牛膝 木瓜 防风 红花 苡仁 荆芥各五钱 川乌 草乌各一钱 白花蛇一寸

【用法】上药用麻袋盛好，放酒坛内封固，隔汤煮半日许，候透埋土中一日夜出火毒。每日饮一茶杯，不拘时候。服尽即好，不用加减。

【主治】痛风，半肢软瘫，泥壁疯，遍身疯气，及冻风，起身不得。

31224 芎术汤

【方源】《博济》卷三。

【异名】芎术散（《得效》卷三）。

【组成】川芎 半夏（汤泡七次） 白术各一两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】冒雨中湿，眩晕呕逆，头重不食。

【备考】《杏苑》有茯苓。

31225 芎术汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎藭 苍术（米泔浸，去粗皮，切，焙） 麻黄（去根节） 芍药 甘草（炙，锉） 白芷 石膏 荆芥穗各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加薄荷五七叶，同煎至七分，去滓热服。

【主治】首风，头面多汗，恶风头痛。

31226 芎术汤

【方源】《三因》卷十六。

【组成】川芎半两 白术半两 附子（生，去皮尖）半两 甘草 桂心一分

【用法】上为散。每服四大钱，水二盞，加生姜七片，大枣一个，煎七分，去滓，食前服。

【功用】暖肌，补中，益精气。

【主治】着湿，头重眩暈，苦极不知食味。

【备考】方中甘草用量原缺。

31227 芎术汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】川芎二两半 白术二两七钱半

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜五片，煎至七分，去滓稍热服。

【功用】清神爽志，祛风消蕴。

【主治】头目昏痛，鼻塞声重。

31228 芎术汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】川芎六分 白术 人参 当归（酒洗） 茯苓各三分 升麻 黄耆各六分 陈皮四分 甘草（炙）三分 中桂一分

【用法】加生姜三片，大枣一个，水煎服。

【主治】痘三日后，顶平，扪摸不碍手者。

31229 芎术散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】芎藭 白术 天麻各一两 防风（去叉） 荆芥穗各半两 细辛（去苗叶）一钱 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为散。每服二钱匕，沸汤点服。

【主治】头面多汗，恶风头痛，身热烦闷。

31230 芎术散

【方源】《普济方》卷一三〇引《卫生家宝》。

【组成】川芎 甘草(微炮) 升麻 香附子 白芷 羌活 苍术 人参 当归 白芍药各等分

【用法】上咬咀。每服四大钱,以水一盏,加生姜四片,煎至七分,去滓,稍热连进三两服。热渐退,脉缓,头轻为效。

【功用】解截四时伤寒。

【主治】伤寒四五日,表里未分者。

31231 芎术散

《得效》卷三。为《博济》卷三“芎术汤”之异名。见该条。

31232 芎术散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】川芎 苍术 香附 白芷各等分

【用法】上为末。磨木香、姜汁点热汤调服。

【主治】痰积作痛,小便不利,脉滑。

31233 芎归丸

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】川归丸(《疡科选粹》卷五)。

【组成】川芎 当归 黄耆 神曲(炒) 地榆 槐花(微炒)各半两 阿胶(炒酥) 荆芥穗 木贼 头发(烧存性)各一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前米饮送下。

【主治】痔下血不止。

【备考】本方方名,《普济方》引作“当归丸”。

31234 芎归汤

【方源】《普济方》卷三四五引《通真子秘方》。

【异名】立效散。

【组成】川芎 当归各二斤(一方加缩砂)

【用法】上将芎、归各半斤咬咀,于瓦器内用水浓煎,不拘时候多少温服。余芎、归各一斤半,锉作大块,用香炉慢火逐旋烧烟,安在病人面桌子下,要烟气直上不绝,令病人低头伏桌子上,将口鼻及病乳常吸烟气,直

候用此一料药尽,看病证如何,或未全安,或略缩减,再用一料,如前法煎服及烧烟熏吸必安。如此二料已尽,虽两乳略缩上而不能复旧者,用冷水磨蓖麻子一粒,于头顶心上涂,片时即洗去,则全安矣。

【主治】乳悬,妇人产后忽两乳伸长,细小如肠,垂坠直过小肚下,痛不可忍,危在须臾。兼治产后恶露不下,腹痛;或下血太多,眩晕不能支吾;妊娠胎动,腹痛下血。

【加减】腹中刺痛,加芍药;口干烦渴,加乌梅、麦门冬;寒加干姜、白芍药;水停心下,微有呕逆,加茯苓、生姜;虚烦不得眠,加人参、竹叶;大便秘涩,加熟地黄、橘皮、杏仁;小便不利,加车前子;腹胁膨胀,加厚朴;血崩不止,加香附子;咳嗽痰多,加紫菀、半夏、生姜;腰痛脚痛,加牛膝;心下疼痛,加延胡索;恶血不下,腰腹重痛,加牡丹皮煎。

31235 芎归汤

《易简方》。为方出《千金》卷四,名见《局方》卷九“芎蒭汤”之异名。见该条。

31236 芎归汤

《云歧子保命集》卷下。为《圣惠》卷七十五“芎蒭散”之异名。见该条。

31237 芎归汤

《普济方》卷五十四。即《直指》卷二十一“芎归饮”。见该条。

31238 芎归汤

【方源】《医方类聚》卷二二七引《徐氏胎产方》。

【组成】川芎 当归各等分

【用法】上咬咀。每服三五钱,加紫苏数叶,酒、水合煎服。死者即下,未死者即安。

【主治】①《医方类聚》引《徐氏胎产方》:妊娠胎动子死,或不死。②《郑氏家传女科万金方》:妊娠血攻心腹痛。

31239 芎归汤

《万氏家抄方》卷一。为《三因》卷十七“芎蒭当归加芍药汤”之异名。见该条。

31240 芎归汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】川芎 当归各五钱（俱不洗炒）
连须葱白五根 生姜五片（焙干）

【用法】水煎，食后服。

【功用】补阴血。

【主治】产后去血过多，阴血已亏，阳气失守所致的头痛。

31241 芎归汤

《痘疹心法》卷二十二。为原书同卷“活血散”之异名。见该条。

31242 芎归汤

【方源】方出《摄生众妙方》卷十，名见《松崖医径》卷下。

【组成】当归三钱 川芎三钱 陈皮一钱五分

【用法】用水一钟，煎至七分，温服。

【功用】临产催生。

【主治】《松崖医径》：胎前因事跌仆，子死腹中，恶露妄下，疼痛不已，口噤欲绝；及胞衣不下。

31243 芎归汤

《摄生众妙方》卷十一。为《张文仲方》引徐王方（见《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

31244 芎归汤

《慎斋遗书》卷五。为《三因》卷九“加味芎藭汤”之异名。见该条。

31245 芎归汤

【方源】《回春》卷六。

【异名】川芎汤（《宋氏女科》）。

【组成】当归尾 川芎各五钱

【用法】上锉一剂。好酒煎，入童便一盞，同煎服。

【主治】胎漏下血不止，或心腹胀。

31246 芎归汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】当归五钱 川芎四钱 白芍（酒炒）二钱 续断三钱 荆芥穗（炒黑）三钱（或加人参二钱）

【用法】水一钟，酒半钟，煎服。立止。

【主治】血崩，以致寒所晕倒者。

31247 芎归汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芷 甘草 胆草各等分

【用法】每服五钱，煎汤浴洗患上，随后搽药。

【主治】妇人阴中突出如蛇，或似鸡冠、菌样，阴痒者。

31248 芎归汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】川芎 当归 赤芍 防风 羌活各等分

【用法】上锉。水二钟，煎至八分，去滓频洗。

【功用】活血祛风。

【主治】实热目痒。

31249 芎归汤

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】川芎 当归

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二个煎，食前服。

【主治】血症。

【加减】中满者，去枣。

31250 芎归汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】当归 川芎各二钱 人参 紫苏干葛各一钱

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】感冒。

31251 芎归汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归身 川芎 香附 枳壳（炒）各一钱 滑石二钱

【用法】生姜为引。

【主治】妇女脾胃虚弱，形瘦食少，过期经行者。

31252 芎归饮

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】川芎 当归 华阴细辛各半两

辣桂 石菖蒲 白芷各三钱

【用法】上锉细。每服三钱，加紫苏、生姜、大枣，水煎服。

【主治】耳鸣。

【加减】如虚冷甚者，酌量加生附子。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芎归汤”。

31253 芎归饮

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】芎劳 当归（去芦，酒浸） 防风（去芦）各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水一钟，煎至半钟，不拘时候。

【主治】中风后人事虚弱。

31254 芎归饮

【方源】《丹台玉案》卷五。

【组成】当归二两 川芎一两

【用法】水煎，临服加童便一杯。

【主治】产后恶血冲心，发狂跳跃。

31255 芎归饮

《纲目拾遗》卷三。为《张文仲方》引徐王方见（《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

31256 芎归饮

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】川芎二钱 当归三钱 红花一钱 桃仁（杵）十二粒

【功用】散血兼补。

【主治】饱食用力，或因持重，努伤脉络，失血涌吐，或跌扑打伤，令人大吐者。

31257 芎归散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】官桂 当归 川芎 香附各一分 川白姜 木香 甘草（炒）各半分

【用法】上为末。每服半钱，水煎，乳食前服。

【主治】小儿内钓，胎寒腹痛，僵啼。

31258 芎归散

《永类铃方》卷十六。为《本事》（扫叶山房刊本）卷十“芎羌散”之异名。见该条。

31259 芎归散

《普济方》卷三四八。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

31260 芎归散

【方源】《医统》卷六十四引《集成》。

【组成】川芎 当归 生地黄 青盐 石膏各一两 细辛半两

【用法】上为末。如常擦牙。

【功用】去风生血，黑发滋肾。

31261 芎归散

【方源】《回春》卷七。

【异名】芎劳散（《寿世保元》卷八）。

【组成】川芎 干山药 当归 白芍（炒）甘草（炙）各二钱半

【用法】上为细末。每服二钱，食后以白汤调下，并将此干药末擦牙龈即生。

【主治】小儿齿迟。

31262 芎归散

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】川芎 当归（去芦）各等分

【用法】上为细末。每服二三钱，食后、空心煎荆芥汤调下，一日二次。

【主治】脚气，腿腕生疮。

31263 芎归散

《张氏医通》卷十六。为《张文仲方》引徐王方见（《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

31264 芎归散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】抚芎 当归 熟地 白芍药 人参 陈皮 甘草 淮山药各等分

【用法】上为末。生姜、大枣汤下。

【主治】小儿齿迟。

31265 芎仙丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】川芎十两 白芍药五两 威灵仙三两

【用法】上为细末。用萝卜自然汁少许打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、临睡用萝卜自然汁同温酒半盏送下。

【主治】久新脚气，腿膝肿痛，或攻注生疮。

【宜忌】忌茶。

31266 芎皮散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】川芎 青皮（减半）

【用法】上为末。每服二钱，煎细茶、菊花汤调下。外以枯矾末、鸡子清调敷。睡者用南星末同生地黄捣膏贴太阳穴而肿自消。

【主治】针眼。

31267 芎朴丸

【方源】《本事》卷十。

【组成】芎蒭 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 白术半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。每服一丸，米饮化下。三岁以下只服半丸。

【主治】小儿疳瘦，泻白水，腹膨胀。

【方论选录】《本事方释义》：芎蒭气味辛温，入足少阳、厥阴；厚朴气味辛温，入足太阴、阳明；白术气味甘温微苦，入足太阴。小儿疳蚀泻白水，腹膨胀，因脾伤不主流行，滞浊窃踞中焦而为积聚，故以辛温疏其滞，以甘温补其虚，并藉辛温以升举其下陷之阳，则泻止胀消，何疳瘦之足忧！

31268 芎当散

【方源】《妇入良方》卷二。

【组成】川芎 川当归各等分

【用法】上为细末。每服二钱，空心煎艾汤调下。

【主治】妇人血气，上喘下肿；又治产后损身，血冲心及腹胀气绝者。

31269 芎防汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】川芎 薄荷 防风 白芷 羌活 藁本 法夏 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】小儿头痛。

31270 芎芷丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】芎蒭 白芷 橘皮 桂心 枣肉

各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸。食后服十五丸；又含之。以愈为度。

【主治】口吻疮。

【方论选录】《千金方衍义》：方用芎、桂而兼白芷，专散风热；橘皮专泄气滞；枣肉专和胃气。本方必为多痰者设，可不详审立方之义欤？

31271 芎芷汤

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】川椒（去目） 芎蒭各半两 白芷 防风（去芦头） 干姜各一分

【用法】上锉。以水一大盏，煎令浓，滤去滓，涂之，每日五七次。

【主治】手指伤风冷，筋脉挛急。

31272 芎芷汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】川芎 白芷 白菊花 甘草 白芍 茯苓 藁本 石膏

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】妊娠头痛，此风邪入脑，阳气衰也。

【加减】如不效，加细辛。

31273 芎芷散

【方源】《直指》卷十九。

【组成】川芎 白芷 荆芥穗 软石膏（煨）各等分

【用法】上为末。每服一钱，食后沸汤调下。

【主治】头风风壅。

31274 芎芷散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】芷芎散（《得效》卷十）。

【组成】白芷 石菖蒲（炒） 苍术 陈皮 细辛 厚朴（制） 半夏（制） 辣桂 木通 紫苏茎叶 甘草（炙）各一分 川芎二分

【用法】上为散。每服三钱，加生姜五片，葱白二片，水煎，食后、临卧服。

【主治】风邪入耳、入脑所致的耳鸣、耳聋、头痛。

①《直指》：风入耳虚鸣。②《明医指掌》：风邪入于头脑作疼痛。③《杂病源流犀烛》：暴聋。

31275 芎芷散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】川芎三钱 白芷三钱

【用法】上为末，黄牛脑子一个，擦药在上，瓷器内加酒炖熟，乘热和酒食之，尽量一醉，睡后酒醒，其疾如失。

【主治】远年近日偏正头风，疼痛难忍，诸药不效者。

31276 芎芷散

《保命歌括》卷二十九。为《卫生宝鉴》卷九“石膏散”之异名。见该条。

31277 芎芷散

【方源】《济阳纲目》卷一〇三。

【组成】川芎二钱 白芷 石菖蒲各一钱半 苍术(糸泔水浸，炒) 陈皮 细辛 防风 半夏(姜汤泡)各八分 木通 紫苏茎叶各一钱 甘草四分

【用法】上锉，加生姜三片，葱二根，水煎，食后服。

【主治】风入耳虚鸣。

31278 芎芷膏

《得效》卷十七。为《济生》卷五“芎藭膏”之异名。见该条。

31279 芎苏饮

《郑氏家传女科万金方》卷四。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“芎苏散”之异名。见该条。

31280 芎苏饮

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】小川芎一钱 紫苏叶一钱五分 江枳壳(炒)一钱五分 甜桔梗一钱 嫩前胡一钱五分 法半夏一钱半 白云苓一钱五分 广木香一钱 广陈皮一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】感冒风邪，头疼胸满，壮热憎寒，脉浮缓者。

【方论选录】感冒风邪，抑遏清阳之气，故

头痛胸满，憎寒壮热焉。脉浮缓是感冒风寒之象，川芎专疏血分之风，苏叶兼散气分之风，俾气血清和，则头痛自解。前胡疏邪清咽，香、枳泻滞调中，使邪解气调，则胸满亦快。苓、陈渗湿利气，半夏燥湿化痰，盖痰化气行，则营血统运而风邪无不外解，安有寒热之患哉！

31281 芎苏饮

【方源】《女科切要》卷七。

【组成】川芎 苏叶 枳壳 前胡 葛根 木香 桔梗 甘草 陈皮 半夏

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】产后头痛，着寒着风者。

31282 芎苏饮

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】参 苏 夏 苓 陈 草 枳 桔 芎 柴 木香 葛根 姜 枣

【功用】疏风。

【主治】兼感风寒暴嗽，鼻塞声重。

31283 芎苏散

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《局方》。

【异名】十味芎苏散(原书同卷)、芎芷香苏散(《准绳·伤寒》卷二引《澹寮》)、芎苏饮(《郑氏家传女科万金方》卷四)。

【组成】川芎二钱 苏叶 枳壳(麸炒) 桔梗 柴胡 半夏(汤泡七次) 广陈皮 白茯苓(去皮)各一钱 干葛一钱半 甘草(炙)五分

【主治】感冒风寒，发热恶寒，头疼身痛；瘧疟脚气。

①《增补内经拾遗》引《局方》：非时感冒，发热恶寒，头疼身痛。②《岭南卫生方》：瘧疟，壮热头痛，其脉弦紧，按之不绝。③《准绳·杂病》引《得效》：脚气。④《医方考》：感冒外有头痛、发热、恶寒；内有咳嗽、吐痰、气逆者。⑤《郑氏家传女科万金方》：产后伤风，恶露已净。⑥《幼科铁镜》：小儿感冒，面色寒滞，两颊或似水红桃花，鼻流清涕，恶风痰壅。

【方论选录】①《医方考》：川芎、苏叶、干葛、柴胡、解表药也，表解则头痛、发热、恶寒自愈；桔梗、半夏、陈皮、枳壳、茯苓、甘草，和里药也，里和则咳嗽、吐痰、气逆自除。②《中国医学大辞典》：此方为治非时感冒之首剂。方中芎、苏、紫、葛为通治三阳经外感药，而独以芎苏名方者，盖重在于邪伤血分也。更合以二陈治内伤饮食，加枳壳宽膈利痰，诚为总司内外之良方，而无引贼破家之患。

【备考】《岭南卫生方》本方用法：上咬咀。每服三钱，加生姜三片，大枣一个，水煎服。方中干葛，《伤寒图歌活人指掌》作干姜。

31284 芎苏散

【方源】《济生》卷七。

【组成】紫苏叶 川芎 白芍药 白术 麦门冬（去心） 陈皮（去白） 干葛各一两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，葱白二寸，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】发散表邪。

【主治】妊娠外感风寒，浑身壮热，眼晕头旋者。

【备考】方中干葛，《审视瑶函》作干姜。

31285 芎苏散

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】川芎 枳壳 桔梗 陈皮 半夏 苏叶 柴胡 干葛 茯苓 甘草 苍术

【用法】加生姜、葱白，水煎，热服取汗。

【主治】春、夏、秋感寒，头痛，发热恶寒，脉浮紧，无汗表证。

【加减】满闷，加香附，去甘草、茯苓；若天道尚寒而欲汗者，加麻黄、桂枝，去茯苓、柴胡；呕吐，加姜汁；体痛，加羌活；泻，加苍、白术，去枳壳、柴胡；腹痛，加木香；夏月夹暑，加香薷。

31286 芎苏散

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】川芎 陈皮 芍药 白术各八分 苏叶六分 干葛五分 黄芩 前胡 麦门冬各一钱 甘草三分

【用法】加生姜、葱白，水煎服。

【主治】孕妇伤寒，寒热头疼，身痛项背强。

31287 芎苏散

【方源】《穷乡便方》。

【组成】抚芎 苏叶 陈皮 槟榔 香附 大腹皮各八分 羌活 木通 猪苓 泽泻各四分 香草三分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】胃脘痛，素性有热，遇感即发。

31288 芎苏散

【方源】《活人方》卷三。

【组成】防风四两 苏叶二两五钱 干葛二两五钱 川芎一两五钱 羌活一两五钱 前胡一两五钱 麻黄一两 桂枝五钱 甘草五钱

【用法】上为末。每服三五钱，葱头、生姜汤调下，不拘时候。

【主治】感冒风寒，初起其邪在表，头疼项强，鼻塞身热，恶寒无汗，周身关节痠疼。

31289 芎连散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎藭 连翘 羌活（去芦头） 柴胡（去苗） 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 木贼（去节） 荆芥穗 甘菊花 旋覆花各半两 地骨皮一两 甘草（炙，锉）石膏（捣研）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧淡竹叶汤调下，一日三次。

【主治】脑风，鼻息不通，时出清涕，项背拘急，久成眩晕。

31290 芎辛丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】梔子 甘草各十八铢 细辛三十铢 桂心十二铢 芎藭一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。食后服七丸，

每日二次。愈止。

【主治】口吻疮。

【方论选录】《千金方衍义》：口疮而用桂心、芎藭，导虚火，和营血，崇本之治，难为俗陈。其细辛专散浮热，梔子专散泄虚阳，甘草调和寒热诸性也。

31291 芎辛丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】芎术丸（原书卷一〇八）。

【组成】芎藭 苍术（米泔浸三日，竹刀子刮去黑皮，切） 细辛（去苗叶） 蝉壳（去土） 荆芥穗 菊花各一两 蕤仁三分（和皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼酒送下，或盐汤送下，不拘时候。

【主治】目风眼寒，头目昏疼；眼晕翳。

31292 芎辛丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】川芎（洗） 防风（去叉股） 僵蚕（去丝嘴，炒） 独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙）各一两 天麻四两 桔梗（炒）三两 细辛（去叶） 白附子（炒） 羌活（洗，去芦） 甘草（炙）各半两 薄荷 荆芥穗各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后茶、酒嚼下。

【主治】头痛面赤，烦闷咽干，上膈风痰，头目晕昏，百节疼痛，背项拘急。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；防风气味辛甘微温，入足太阳；僵蚕气味辛咸，入手阳明，能引药入络；独活气味苦辛甘平，入足少阴、厥阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫；天麻气味辛平，入足阳明、厥阴，能泄肝风，止头晕；细辛气味辛温，入足少阴；白附子气味辛甘大温，入足阳明；羌活气味苦辛甘平，入足太阳；甘草气味甘平，入手太阴；薄荷气味辛凉，入手太阴、足厥阴；荆芥气味辛温，入足太阳、少阴。清茶送，取其降也；

温酒送，取其散也。此症非群剂风药不能散，兼以甘桔清咽利膈，则病自然少减矣。

31293 芎辛丸

【方源】《普济方》卷一三六引《海上名方》。

【组成】大川芎二两 华阴细辛半两（去叶） 甘草一分（炙）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，食后细嚼，用薄荷茶送下。

【功用】常服清利眼目。

【主治】伤寒非时头痛。

31294 芎辛汤

【方源】《三因》卷十五。

【异名】大芎辛汤（《得效》卷十）。

【组成】附子（生，去皮脐） 乌头（生，去皮尖） 天南星 干姜 甘草（炙） 川芎 细辛各等分

【用法】上为散，每服四大钱，水二盏，加生姜五片，茶芽少许，煎七分，去滓，食后服。

【功用】《易简方》：扶阳散寒。

【主治】①《三因》：伤风寒生冷及气虚、痰厥，头痛如破，兼眩晕欲倒，呕吐不定。②《易简方》：一切头疼、痰厥、饮厥、肾厥、气厥等证，偏正头疼难忍者。

【宜忌】《易简方》：但发热者不宜服。

【方论选录】《医略六书》：真阳内虚，寒邪得以深入，元气不能外敷上奉，故厥逆而头痛眩晕焉。川乌、生附扶真阳以御寒，南星、细辛通关窍以豁痰，干姜温中散寒，生姜散寒快膈，川芎活经中之血，炙草缓中州之气，芽茶化热以清头目也。此扶阳散寒之剂，为阳虚寒厥痛晕之专方。

【备考】本方方名，《医学正传》引作“芎辛散”。

31295 芎辛汤

【方源】《普济方》卷四十七引《十便良方》。

【组成】川芎四两（米泔水浸三日，切，

焙) 细辛一分 甘草一两 白芷一分

【用法】上为细末。每服二钱，白汤点下，不拘时候。不入盐。

【主治】伤风气壅，鼻塞清涕，头目昏眩。

31296 芎辛汤

【方源】《普济方》卷一〇四引《十便良方》。

【组成】芎藭半两 细辛(去苗土)一钱 甘草(炙)一钱半

【用法】上为粗末。每服二钱。以水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】膈痰风厥，头目昏痛，鼻塞声重，肩背拘急，不思饮食。

31297 芎辛汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛二分 芎藭 蔓荆子各五分 甘草 白芷各一钱 防风一钱五分

【用法】上咬咀，都作一服。水二盞，煎至一盞，临卧温服。

【主治】两眼昼夜隐涩难开，羞明恶日，视物昏暗，赤肿而痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芎藭汤”、《景岳全书》引作“芎辛散”。

31298 芎辛汤

《医方类聚》卷八十一。即《普济方》卷四十六引《济生》“小芎辛汤”。见该条。

31299 芎辛汤

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】川芎一钱半 细辛半钱 甘草(炙)六分 生姜五片

【用法】水煎，食后热服。

【主治】热厥头痛。

【加减】有热，加酒黄芩一钱五分；不应，更加石膏三钱，乌头二分；胃虚者，去白芷，易白术，使邪气无内贼之患；兼患客邪，加葱白、香豉；产妇用豆淋酒煎服。

31300 芎辛汤

《医略六书》卷二十一。为《证治汇补》卷四“芎辛散”之异名。见该条。

31301 芎辛汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】川芎一两 细辛二钱 防风一两 当归一两 石膏三两(煨) 白芷一两 羌活一两 苍术一两(炒) 香附一两半(酒炒) 甘草四钱(炙)

【用法】上为散。水煎三钱，去滓温服。

【主治】产后头额作痛，脉数涩大者。

【方论选录】产后风邪外束，热郁阳明，致清阳不能上奉于头，故头额作痛不已。川芎入血海以升阳，细辛入少阴以散邪，羌活散太阳之邪，白芷散阳明之邪，苍术燥湿强脾，石膏泻火清胃，当归养血荣经脉，防风散郁热，香附调气解郁，炙草缓中益胃也。为散水煎，使风邪解，则热郁自化，而经络融和，清阳上奉，何有头额作痛之患哉！

31302 芎辛散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】芎藭 白附子各三钱 细辛(去苗叶)一钱 滑石 槐芽各三钱

【用法】上为细散，加生龙脑半钱匕，同研极细。每用一字，搐入鼻中。

【主治】头目偏痛，时多晕眩，鼻中壅塞，不闻香臭。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芎藭散”。

31303 芎辛散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】川芎四钱 苍术八钱 甘草三钱 细辛一钱

【用法】上为细末。每服一钱，茶清调下，不拘时候。

【主治】风客阳经，头痛晕眩，项背拘急，肢体疼痛，鼻塞声重，发热恶寒；及诸语涩，麻痹而筋挛。

31304 芎辛散

【方源】《朱氏集验方》卷一引《鸡峰》。

【组成】北细辛一两 川芎一两 甘草二钱半

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，薄荷

七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】治风化痰，清利头目。

【主治】中风，不思饮食。

31305 芎辛散

【方源】《百一》卷五。

【组成】川芎 细辛 防风 桔梗 白芷 甘草 羌活各一两 桑白皮半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一钟半，加生姜二片，薄荷三叶，煎至七分，不饥不饱时温服。

【功用】清头目。

【主治】壅塞痰盛。

【临证举例】语痞 葛丞相作正言苦此疾逾月，语音不出，服柴胡之类亦不能去。医者云是燥，用芎辛散数服而愈。

31306 芎辛散

《医学正传》卷四。即《三因》卷十五“芎辛汤”。见该条。

31307 芎辛散

《景岳全书》卷六十。即《兰室秘藏》卷上“芎辛汤”。见该条。

31308 芎辛散

【方源】《证治汇补》卷四。

【异名】芎辛汤（《医略六书》卷二十一）。

【组成】川芎 细辛各一钱半 苍术 甘草 干姜各一钱

【主治】①《证治汇补》：寒湿头痛。②《医略六书》：寒湿头痛，脉细者。

【方论选录】《医略六书》：寒湿袭经，抑遏不散，故清阳之气不伸，不能分布，故头痛不止焉。川芎活血以上荣头角，细辛散寒以旁达肌表，苍术燥湿强脾兼主升阳，干姜温中散冷兼能补火，甘草缓中以和诸药也。使寒湿解散，则清阳得伸而经气清和，头痛无不愈矣。此辛燥散寒之剂，为寒湿头痛之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

31309 芎辛煎

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】桔梗二两（微炒） 川芎一两半 甘草七钱（微炙） 防风（去芦头） 半两 细辛（去叶土）一钱 麝香半钱（别研）

【用法】上为细末，入麝香研匀，炼蜜为丸，每一两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，食后细嚼，温酒或茶清送下。

【主治】风热上攻，肌肉颤动，头昏旋运，鼻塞声重。

【备考】本方方名，据剂型当作“芎辛丸”。

31310 芎羌汤

《本事》（上科本）卷十。即原书同卷（扫叶山房刊本）“芎羌散”。见该条。

31311 芎羌散

【方源】《博济》卷三。

【组成】荆芥穗（炒） 牛蒡子（炒） 木贼 苍术（生用）各等分

【用法】上为末。每服二钱，煎荆芥汤点腊茶调下，空心、日午、临卧各一次。

【功用】退翳膜，洗睛轮。

【主治】男女血风毒眼，昏涩赤烂；丈夫肾脏风毒气，眼痒肿疼。

【备考】本方名芎羌散，但方中无川芎、羌活，疑脱。

31312 芎羌散

【方源】《本事》（扫叶山房刊本）卷十。

【异名】芎归散（《永类铃方》卷十六）、旋覆花汤（《准绳·女科》卷二）。

【组成】川芎一两（洗） 当归三分（洗，去芦，薄切，焙干） 羌活（洗，去芦） 旋覆花 细辛（华阴者，去叶） 蔓荆子（拣） 石膏（生） 藁本（去苗，净洗） 荆芥穗 半夏曲（炒） 防风（去叉股） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 甘草各半两（炙）

【用法】上为末。每服二钱，水一大盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血虚，肝有风邪患头风症，每发必掉眩，如在车上。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；羌活气味辛甘平，入足太阳；旋覆花气味咸温，入手太阴、阳明；蔓荆子气味辛温，入足太阳；细辛气味辛温，入足少阴、太阳；石膏气味辛寒，入足阳明；藁本气味辛温，入足太阳；荆芥气味辛温，入足厥阴；半夏曲气味辛温，入足阳明；防风气味辛甘温，入足太阳；熟地黄味甘苦微寒，入足少阴；甘草味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性。妇人患头风者颇多，皆因血虚有风邪乘之，此方风药居多，辛温、辛凉之味，恐其升腾太过，以地黄之甘苦微寒、甘草之甘平和缓以调之，则经络不致受伤，而肝家之风邪自息耳。

【备考】本方方名，原书（上科本）作“芎羌汤”。《医学纲目》引作“芎藭散”。

31313 芎附汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】芎藭二两 附子（炮裂，去皮脐）一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎至八分，去滓，热嗽冷吐之。

【主治】齿风疼痛。

31314 芎附汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芎藭 附子（炮裂，去皮脐） 赤茯苓（去黑皮） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 柴胡（去苗） 前胡（去芦头） 桔梗（炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉） 人参各一两 木香半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧温服。

【主治】妇人虚劳，被风冷所侵，头目昏眩，筋脉拘急，骨节烦疼，或寒或热。

31315 芎附汤

《简明医彙》卷三。为《本事》卷三“芎附散”之异名。见该条。

31316 芎附饮

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】芎香散（《普济方》卷四十四引《鲍氏方》）、莎芎散（《医学入门》卷七）、芎附散（《赤水玄珠》卷九）。

【组成】川芎二两 香附四两

【用法】上为末。每服二钱，茶汤调下。

【功用】《赤水玄珠》：调气止血。

【主治】气血不和，衄血，吐血，气厥头痛及产后头痛。

①《丹溪心法》：衄血。②《普济方》引《鲍氏方》：男子气厥头痛，妇女气盛头疼及产后头痛。③《赤水玄珠》：吐血不归经。

【方论选录】《医学入门》：香附开郁行气，使邪火散于经络；川芎和血通肝，使血归于肝脏。血归火散，其血立止。

31317 芎附散

【方源】《本事》卷三。

【异名】芎附汤（《简明医彙》卷三）。

【组成】小川芎 附子（炮，去皮脐） 黄耆（蜜炙） 白术 防风（去钗股） 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙） 桂心（不见火） 柴胡（去苗，净洗） 甘草（炙）各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，去滓，食前服，每日三次。

【功用】常服不生壅热，兼消积冷。

【主治】脾胃虚弱，卫气不温分肉，为风寒湿邪所着而致的五种痹证，腿并臂间发作不定。

【方论选录】《本事方释义》：小川芎气味辛温，入肝胆；附子气味辛咸大热，入手足少阴；黄耆味甘平，入手足太阴；白术味甘温，入手足太阴；防风气味辛甘平，入足太阳；熟地黄味甘寒微苦，入肾；当归味辛甘温，入肝；桂心味辛甘热，入肝；柴胡味辛平，入足少阳；甘草味甘平，能行十二经络，缓诸药之性。此卫气不温分肉

间，为三气所乘，致邪留着不去，故发作无定。以补血养气之药护持正气，以风药及辛热之药搜逐留着之邪，则卫气坚固，无隙可乘，亦何从入哉！

31318 芎附散

【方源】《妇人良方》卷二十二引徐明仲方。

【组成】大附子一枚（醃醋一碗，用火四畔炙透，蘸醋令尽，去皮脐） 川芎一两

【用法】上为细末。每服二钱，茶清调下。

【主治】①《妇人良方》引徐明仲方：产后败血作梗，头痛，诸药不效者。②《医略六书》：产后阳虚头痛，脉沉细者。

【方论选录】《医略六书》：产后真阳内虚，其清阳之气亦不能上奉于头，故头脑作痛不休焉。附子补真阳以上奉，川芎入血海以升阳。为散，清茶煎，使真阳内充，则上奉之阳自然敷布，而气行血活，岂有头脑作痛之患乎！

31319 芎附散

《赤水玄珠》卷九。为《丹溪心法》卷二“芎附饮”之异名。见该条。

31320 芎枳丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】芎蒭（米泔浸一宿，锉，焙） 枳壳（米泔浸三宿，逐日换水，去瓢，再浸一宿，控干，麸炒）各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温熟水送下，至月余见效。

【功用】《御药院方》：去风郁痰实，清利头目。

【主治】①《圣济总录》：刺风，遍身刺痛；及劳风，强上冥视。②《普济方》引《卫生家宝》：斑疮入眼。

【备考】《普济方》引《卫生家宝》本方用法：每服三十丸，茶汤送下，不拘时候连服，俟愈即止。

31321 芎梔汤

【方源】《穷乡便方》。

【组成】川芎 山梔子各等分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】心气痛。

【备考】心气痛，非心痛，即胃脘痛也。素性有热，遇感即发，初用芎苏散，二用芎梔汤。

31322 芎胡饮

《郑氏家传女科万金方》卷四。为《女科万金方》“芎胡散”之异名。

31323 芎胡散

【方源】《女科万金方》。

【异名】柴胡饮（《郑氏家传女科万金方》卷四）。

【组成】人参 柴胡 陈皮 枳壳 桔梗 紫苏 半夏 茯苓 干葛 川芎 甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】产后受惊，寒热骨痛。

【加减】胸饱，去人参，加砂仁。

31324 芎荆散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】川芎五钱 蔓荆子二钱

【用法】水煎服。

【主治】头痛。

【方论选录】：盖川芎补血，蔓荆子去风也。

31325 芎草散

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】川芎十文 荆芥五文 甘草五文

【用法】上为末。搐鼻中。

【主治】头风。

31326 芎茶汤

【方源】《普济方》卷四十四引《圣惠》。

【组成】好川芎半两

【用法】上为末。每服二钱，腊茶清调下。

【主治】气虚头痛。

31327 芎香散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎蒭 藿香叶 黄耆（锉，焙） 天麻各一两 槐花（炒）二两 蔓荆实 白芷各半两 木香 甘草（炙，锉）各一分

【用法】上为细散。每服二钱匕，荆芥茶或温酒调下。

【主治】脑风，头痛至甚。

31328 芎香散

《普济方》卷四十四引《鲍氏方》。为《丹溪心法》卷二“芎附饮”之异名。见该条。

31329 芎活汤

《续易简》卷五。为《千金》卷五“增损续命汤”之异名。见该条。

31330 芎活汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】川芎 半夏(汤洗) 白茯苓 川独活 陈皮 枳壳(去瓢，炒)各半两 白术 甘草各一分

【用法】上为末。每服三钱，水一盞半，加生姜五片同煎，去滓，食后停少时温服。

【主治】脾土有亏，平日多饮水浆，不能传化所致的水饮停蓄，注于经络，发为臂痛。

31331 芎活汤

《济阴纲目》卷九。为《医学入门》卷八“芎活散”之异名。见该条。

31332 芎活散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】芎活汤(《济阴纲目》卷九)。

【组成】川芎 羌活各等分

【用法】水煎，入酒少许温服。

【功用】胎前安胎，产后逐恶血、下胞衣。

【主治】①《济阴纲目》：子癰。②《医略六书》：孕妇风痉，脉浮细涩者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠中风伤筋脉，而发为风痉，故角弓反张，奄忽不知人焉。芎蒭入血海以升阳，羌活通经络以散风。为散，水煎入酒下，使风邪外解，则经气清和，而筋脉得养，何角弓反张，奄忽不知人之有，而胎无不安矣。

31333 芎桂散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】生地黄四两(竹刀切) 生姜四两 川芎 肉桂 芍药各半两

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下，每日三次。

【主治】妇人月娠恶露不止。

31334 芎桂散

【方源】《三因》卷二。

【组成】川乌头二两(切作片，水浸一宿，切作算子条，更以米泔浸一宿，不洗，晒干，麸炒微赤为度) 川芎一两半 桂心一两 甘草(炙) 干姜(炮)各一分

【用法】上为末。每服二钱，温盐酒调下，一日三次。

【主治】中风，四肢疼痛，及两足俱软，行履不便。

31335 芎桂散

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】牛膝二两(去苗，酒浸) 白茯苓一两(去皮) 桂心(去粗皮，不见火) 川芎 防风(去芦) 人参(去芦) 附子(炮，去皮脐) 当归(去芦，锉，微炒) 川乌头(炮，去皮脐)各一两 羌活三分 甘草一分(炙微赤) 白术半两(炒)

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，加生姜五片，大枣三个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腰脚冷痹，风麻，肢节疼痛，不思饮食。

31336 芎蒭丸

【方源】《普济方》卷三六一引《肘后方》。

【组成】芎蒭 黄耆各三钱 牛黄(研)一分 麝虫半两 麝香(研)一钱 当归(切，焙)芍药各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服二丸至三丸，米饮送下，早晨、晚间各一次。

【主治】小儿胎寒腹痛，大便青。

31337 芎蒭丸

【方源】《外台》卷七引《深师方》。

【组成】芎蒭七分 乌头四分(炮) 防葵三分 蜀椒九分(汗) 白薇二分 桂心十分 白芷五分 茺莢六分 干姜八分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸。饮送下，一日三次。稍加至

五六丸，以知为度。

【主治】虚冷心腹寒疝，胸胁支满，饮食不消，腹中痛，久痢颈强。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱。

31338 芎藭丸

【方源】《医心方》卷二十一引《经心录》。

【组成】鹿茸二两 当归二两 蒲黄二两 阿胶二两 芎藭二两 白术三两 干地黄三两

【用法】上药治下筛，为丸，如大豆大。每服十丸，一日三次。

【主治】妇人崩中漏下。

31339 芎藭丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】芎藭一两 防风一两（去芦头）五加皮一两（锉） 肉桂半两（去皱皮） 犀角屑三分 赤茯苓一两 羌活二分 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归半两 牛膝一两（去苗） 海桐皮一两（锉） 石斛一两（去根，锉） 麻黄一两（去根，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以豆淋酒送下。

【主治】脚气风毒，痹挛疼痛。

31340 芎藭丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】芎藭一两 防葵一两 白薇一两 桂心一两 川椒一两半（去皮及闭口者，微炒去汗） 白术一两 干姜一两（炮裂，锉） 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜、橘皮汤送下，一日四五次。

【主治】寒疝，心腹痛，胸胁支满，饮食不下。

31341 芎藭丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】芎藭二两 当归一两半（锉，微炒） 桂心一两 黄耆一两（锉） 沉香一

两 安息香一两 附子半两（炮裂，去皮脐） 白芷半两 麒麟竭半两 丁香半两 木香一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 羌活半两 赤芍药半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、午时、晚食前以甘草酒送下。

【主治】妇人乳痈穿穴，脓水不住，年月深远，蚀肉伤筋，或时碎骨疮中自出，肉冷难生，疼痛不可忍。

31342 芎藭丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】芎藭一两 细辛 白芷 覆盆子 五味子 人参 白茯苓 羌活 肉桂 柏子仁 蔓菁子 甘菊花 枸杞子 车前子 甘草（炙）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下。

【主治】肝虚不足，两目昏暗，热气冲上，泪出疼痛，两胁虚胀，筋脉不利。

31343 芎藭丸

【方源】方出《证类本草》卷七引《经验后方》，名见《奇效良方》卷二十四。

【组成】川芎不拘分两

【用法】用净水洗浸，薄切片子，晒干或焙，为末，炼蜜为丸，如小弹子大。每服一丸，茶、酒嚼下，不拘时候。

【功用】化痰。

【主治】头风。

31344 芎藭丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】芎藭 龙骨 白茯苓（去黑皮） 紫石英（捣研） 防风（去叉） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 细辛（去苗叶） 铁精（捣研）各一两 甘草（炙，锉） 枳实（去瓢，麸炒） 丹参 桂（去粗皮） 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 人参 大黄（锉，炒） 干姜（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 菖

蒲(九节者,去须,米泔浸,切,焙)各一两一分 白芥子(生,研用) 吴茱萸(汤浸,焙,炒)各三分 禹余粮(煨,醋淬)一两三分 远志(去心)一两半

【用法】上十九味为末,与别研三味和匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七丸,温熟水送下,食后、临卧各一次。

【主治】心中风,惊恐愁忧,烦躁错乱,若风邪流入五脏,则往来烦闷悲啼,吸吸短气,发时恍惚喜卧,或心中涎涌,或怒起颠倒,手足厥冷,饮食呕逆。

31345 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】芎蒭 黄耆(锉) 防风(去叉) 山梔子(去皮) 枳壳(麸炒,去瓤)各一两 生干地黄(焙) 羌活(去芦头) 白芷 苦参各三分 白附子(炮)半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后温水送下。

【主治】头面风,生疮久不已。

31346 芎蒭丸

《圣济总录》卷十七。为《圣惠》卷二十三“威灵仙丸”之异名。见该条。

31347 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】芎蒭一两 桂(去粗皮) 当归(切,焙) 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 枳壳(去瓤,炒)各三分 槟榔(微煨,锉)六枚。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服二十丸,温酒送下。加至三十丸。

【主治】宿患冷气心痛,时时发动。

【加减】如腹有结块,加附子、鳖甲;妇人加桃仁各一两。

31348 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】芎蒭 枸杞子 荆芥穗 甘草(炙,锉) 苍术(米泔浸一宿,切,焙)各一两 细辛(去苗叶) 蝉蜕(洗,焙) 石

膏(研,水飞) 旋覆花 菊花 羌活(去芦头)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,食后、临卧细嚼,茶清送下,一日三次。

【主治】肝血不足,风邪乘虚搏于精气,两目晕翳,疼痛不可忍。

31349 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】芎蒭 细辛(去苗叶) 蝉壳(去土) 甘菊花 荆芥穗 苍术(米泔浸透,去皮,切,焙) 蕤仁(去皮)各一两 犀角(镑) 羚羊角(镑)各一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小弹丸大。每服一丸,茶、酒或盐汤嚼下,不拘时候。

【主治】肝肾虚风上攻,眼生黑花,头目不利,及内外障翳,睛疼隐涩。

31350 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】芎蒭二两 白芷 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 黄连(去须)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,甘草汤送下,不拘时候。

【主治】口吻疮。

31351 芎蒭丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】芎蒭 白芷各一两 生干地黄(锉碎) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒黄)各一两一分 干姜(炮) 甘草(炙) 蒲黄(微炒)各半两 芍药 牡丹(去心) 桂(去粗皮) 牛膝(去苗,酒浸,切,焙) 人参 当归(切,焙)各三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前米饮或温酒送下,一日二次。

【主治】妇人月水来腰腹刺痛不可忍,或多或少,来如清水,或似败汁,虚乏黄瘦。

31352 芎蒭丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】芎藭 菊花 荆芥 薄荷 甘草 各一两 苍术二两(泔浸)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸至六七十丸,食后茶清送下,一日一二次。

【功用】增明目力。

【主治】远视不明,常见黑花。

31353 芎藭丸

【得效】卷十。为方出《千金》卷六,名见《圣济总录》卷一一六“细辛丸”之异名。见该条。

31354 芎藭丸

【国医宗旨】卷三。为《本事》卷四“鞠藭丸”之异名。见该条。

31355 芎藭汤

【方源】《外台》卷七引《古今录验》。

【组成】芎藭 当归 桂心 芍药 甘草(炙)各一两 黄芩半两 干姜半两 杏仁三十枚(去皮尖)

【用法】上切。以水五升,煮取二升,分再服。

【主治】卒寒腹中拘急痛。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

31356 芎藭汤

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】细辛一两 芎藭二两 附子一两(炮)

【用法】上切。以水六升,煮取二升,去滓,含之少许,冷即吐却,每日三四次。勿咽汁。

【主治】齿中风,疼痛,龃肿。

31357 芎藭汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】芎藭 甘草各二两 蒲黄 女萎各一两半 芍药 大黄各三十铢 当归十八铢 桂心 桃仁 黄耆 前胡各一两 生地 黄一升

【用法】上咬咀。以水一斗,酒三升,合煮取二升,去滓,分四服,日三次,夜一次。

【主治】产后腹痛。

【备考】按:《中黄耆》,《千金翼》作“黄

芩”。

31358 芎藭汤

【方源】方出《千金》卷四,名见《局方》卷九。

【异名】当归汤(《圣济总录》卷一五九)、立效散(《保命集》卷下)、芎归汤、君臣散(《易简方》)、一奇散(《妇人良方》卷二十二)、佛手散(《医方类聚》卷二二九引《胎产救急方》)、芎藭散(《普济方》卷三〇三)、川芎汤(《普济方》卷三四八)、二奇散(《普济方》卷三五五)、川芎当归汤(《金匱翼》卷五)。

【组成】当归 川芎各三两

【用法】以水四升,煮取二升,去滓,分二服即定。展转次合诸汤治之。

【功用】《医略六书》:养荣活血。

【主治】失血过多所致的眩晕、头痛,及难产。

①《千金》:妇人产乳去血多,伤胎去血多、崩中去血多、金疮去血多、拔牙齿去血多未止,心中悬虚,心闷眩冒,头重目暗,耳聩满、举头便闷欲倒。②《圣济总录》:难产,疑胎毙腹中。③《保命集》:产前证,胎不动,如重物下坠,腹冷如冰。④《妇人良方》:产后头痛。⑤《医方类聚》引《胎产救急方》:产时将至,浆破血下,腹中作阵数疼痛,渐至腰痛极甚,儿身已转,眼如出火,谷道挺进。⑥《朱氏集验方》:妇人头晕痛,诸脉平和,惟肝脉独弱,预见崩疾来。

【方论选录】①《医方类聚》引《胎产救急方》:大凡难产,皆因产时未至,浆破血下过多,以致产道干涩。此方将产则先固其血,令儿易转动;临产进此以行血,令儿随血出,决无留难。处方之巧,无以逾此。②《医略六书》:血不配气,阴不维阳,不能荣经络以上牵于头,故头痛不止焉。当归身养血脉,滋血室,而经络可充,清阳得位;小川芎活血气,运营血,而上行头角,下行血海,使血盛气行,则清阳分布而经脉融和,安有头痛

之患乎。此养荣活血之剂，为血不配气头痛之专方。

31359 芎蒭汤

【方源】《千金》卷四。

【异名】芎蒭温中汤（《奇效良方》卷六十三）。

【组成】芎蒭 干地黄 黄耆 芍药 吴茱萸 甘草各二两 当归 干姜各三两

【用法】上咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】①《千金》：带下、漏血不止。②《普济方》：风虚冷热，劳损冲任，月水不调，崩中暴下，腰重里急，淋漓不断；及产后失血过多，虚羸腹痛；或妊娠胎动不安，下血连日，小便频数，肢体烦倦，头晕目暗，不欲饮食。

【加减】若月经后因有赤白不止者，除地黄、吴茱萸，加杜仲、人参各二两

【方论选录】①《千金方衍义》：芎、归、地、芍虽专调血，不得甘、耆不能助卫和营。尤妙在姜、萸之辛温，使血无阻积，得以归经。而经后赤白不止，非但不可用茱萸之浊燥，即地黄之腻滞亦宜斟酌，故退二位而进杜、参以益气，精气充而血液固矣。②《医略六书》：寒湿袭虚，经气不摄，故腹痛不止，崩且传漏焉。熟地补阴滋血，黄耆补气摄血，芎蒭行血中之气以除腹痛，白芍敛失位之血以止崩漏，吴萸温中止痛，炮姜温中止血，当归行血归经，炙草暖中和胃。水煮微温服，使寒湿外散，则经气内充，而冲脉完固，何有腹痛不止，崩且传漏之患哉！

【备考】本方方名，《普济方》引作“温中芎蒭汤”。

31360 芎蒭汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】芎蒭一两半 黄芩 石膏 当归 秦艽 麻黄 桂心各一两 杏仁二十一枚 干姜 甘草各一两（一方无石膏，用黄连）

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升，分

三服。

【主治】卒中风，四肢不仁，善笑不息。

【方论选录】《千金方衍义》：卒中风，善笑不息，土困木乘，心火炽然之象。乃汇取麻黄、越婢、麻杏甘石之制，专以干姜实脾杜风，麻黄开肺泄热，石膏清胃化火，具列鼎分之势。余药各随寒热佐使，标本兼赅。此长沙密谛真诠，不觉为之吐露，奈何千载尘埋，能不为之心折。

31361 芎蒭汤

【方源】《千金》卷十四。

【异名】芎蒭散（《圣惠》卷二十二）。

【组成】芎蒭 藁本 茺蔚各五两

【用法】上咬咀。酒一斗，煮取三升，顿服之，羸者分再服。取大汗。

【主治】风癫引胁牵痛，发作则吐，耳如蝉鸣。

【方论选录】《千金方衍义》：芎蒭治中风入脑头痛，藁本治风头痛，茺蔚治大风恶气，皆本经主治。

31362 芎蒭汤

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】芎蒭 白术 山茱萸 防风 羌活 枳实各三两（炙） 麻黄二两半（去节） 薯蓣四两 蒺藜子 生姜各六两（切） 乌喙（炮） 甘草（炙）各二两

【用法】上咬咀。以水九升，煮取二升七合，分三服。

【主治】面上及身体风瘙痒。

【备考】方中山茱萸，《外台》作“吴茱萸”。

31363 芎蒭汤

【方源】《外台》卷二十二引《广济方》。

【组成】芎蒭三两 当归三两 独活四两 细辛 白芷各四两

【用法】上切。以水五升，煮取二升，去滓，含漱，每日三五次，取愈。

【主治】风齿，口气臭。

31364 芎蒭汤

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《圣济总录》卷一五四。

【组成】甘草（炙） 当归 芎藭 人参 阿胶各二两 葱白（切）一升

【用法】上以水七升，煎取二升，分为三服。

【功用】安胎止痛。

【主治】胎动不安及横生倒产。

①《经效产宝》：胎动冲心，烦闷欲死。②《圣济总录》：妊娠外有惊动，令胎不稳。③《医方类聚》引《胎产救急方》：兼治横生倒产，上冲下筑，唇口青黑，手足厥冷，证候急者。

【备考】本方方名，《胎产救急方》引作“芎归葱白汤”（见《医方类聚》卷二二四）。

31365 芎藭汤

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《圣济总录》卷一五五。

【组成】芎藭 当归各四两 艾叶二两 甘草一两 阿胶二两（炙）

【用法】以水五升，煮取二升，分温三服。

【主治】妊娠三二月及七八月，胎动不安，或腰肚痛，有血下。

31366 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】芎藭一两半 黄芩（去黑心）一两 干姜（炮）一两 当归（切，焙）一两半 桂（去粗皮）二两 杏仁（去皮尖双仁，炒）三分 秦艽（去苗土）一两 甘草（炙，锉）一两 黄连（去须）一两 麻黄（去节，煎，掠去沫，焙干）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取八分，去滓温服，日三次，夜二次。

【主治】卒中风，四肢不仁。

31367 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】芎藭 防风（去叉） 白术 白芷 牛膝（去苗） 狗脊（去毛） 草薢（炒） 薏苡仁（炒）各半两 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒） 人参 葛根（锉） 羌活（去芦头）各

一两 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干用）二两 石膏（碎） 桂（去粗皮）各一两半

【用法】上为粗末。每服十二钱匕，以水三盞，煎取二盞，去滓，分三服，微热服之，日二服，夜一服。服药后宜依法次第灸诸穴，风池二穴，肩髃一穴，曲池一穴，支沟一穴，五枢一穴，阳陵泉一穴，巨虚、上下廉各一穴，灸九次即愈。

【主治】中风，手足不随，身体疼痛，口面喎斜，一眼不合。

31368 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】芎藭二两 石膏（碎）四两 桂（去粗皮） 人参各二两 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干用）三两 甘草（炙，锉）二两 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒）四十枚 干姜（炮裂，切）三两 当归（切，焙）二两

【用法】上为粗末。每服十二钱匕，以水四盞，煮取二盞，去滓，分温三服，日二次，夜一次，不拘时候。

【主治】中风，半身不遂，口不能言，冒昧如醉，不知人。

31369 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】芎藭三分 防风（去叉） 白茯苓（去黑皮） 羌活（去芦头） 菊花（择） 黄耆（锉）各一两 石膏（碎研）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，煎至一盞，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】中风寒热，头痛体疼，饥不能食。

31370 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎藭二两 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心）各一两 荆芥穗二两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

入薄荷七叶，同煎至七分，去滓温服。

【主治】脑风，鼻息不通，或流清涕，多嚏。

31371 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【异名】神术散（《中藏经·附录》）、神术汤（《岭南卫生方》卷中）。

【组成】芎蒭四两 苍术（一斤半，锉，麸炒熟，木臼内杵去黑皮，取净者）一斤 藁本（去苗土）一两 甘草二两（炙）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜五片，煎至六分，去滓，稍热并三服。

【主治】①《圣济总录》：伤寒初病三日内，脉浮有表证。②《中藏经·附录》：伤风头痛声重。

31372 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】芎蒭三分 大黄（锉，炒）一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒里实，谵语狂妄。

31373 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】芎蒭 附子（炮裂，去皮脐） 大黄（锉，炒） 桂（去粗皮）各三分 干姜（炮） 甘草（炙，锉） 木香各半两

【用法】上哎咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个（擘破），煎至六分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒食毒，壮热头痛，时复憎寒，四肢痠痛，口苦。

31374 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】芎蒭 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 高良姜各半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙令透）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水二盞，煎至七分，去滓温服，空心、日晚各一次。

【主治】卒心痛不可忍。

31375 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】芎蒭半两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）一两 鬼箭羽一两 干姜（炮裂）一分 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】中恶心痛，绕脐疔刺，白汗出。

31376 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】芎蒭 独活（去芦头） 旋覆花 防风（去叉） 藁本（去苗土） 细辛（去苗叶） 蔓荆实各一两 石膏（碎） 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加生姜二片，荆芥三五穗，水一盞，同煎至七分，去滓，食后稍热服之。

【主治】胸膈风痰，气厥上攻，头痛呕吐痰饮。

31377 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】芎蒭 石膏 防风（去叉） 芍药 络石各一两 大黄（锉，炒）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】目风眼寒，昏痛涩泪。

31378 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】芎蒭 羌活（去芦头） 蔓荆实 甘菊花 黄芩（去黑心） 防风（去叉）各一两 枳壳（去瓢，麸炒） 甘草（炙）各半两 石膏二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，煎取七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】目痛，上连头脑。

【备考】《普济方》有旋覆花。

31379 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】芎藭三分 莽草(去枝)半两 独活(去芦头, 锉)一两 防风(去叉)三分 细辛(去苗叶)半两 郁李仁(微炒, 去皮)三分 蓖苰子(炒令熟)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 以酒一升, 煎三五沸, 去滓, 热漱冷吐。

【主治】牙齿疼痛。

31380 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】芎藭(锉)一两半 防风(去叉)一两 薏苡仁一两 细辛(去苗叶)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 以水三盏, 煎一二十沸, 去滓, 热含冷吐, 咽津无妨。

【主治】风冲牙齿摇动。

31381 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】芎藭二两 苦参三两

【用法】上锉细。以水一斗, 煮取七升, 去滓淋洗。

【主治】风毒攻肌肉, 皮肤浮肿, 或在脚, 或在手。

31382 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】芎藭 防风(去叉) 当归(焙) 羌活(去芦头)各一两 甘草(炙)三分

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服六钱匕, 水二盏, 煎至一盏, 去滓热服。盖覆出汗。若不汗, 加麻黄(去节)一两、桂(去粗皮)三分, 汤成又加竹沥半合。

【主治】金疮中风, 疼痛不可忍。

31383 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【异名】桂芎汤。

【组成】芎藭 大黄(生) 桂(去粗皮) 菴藁子 朴消各一两 荷叶十斤(烧灰)

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盏, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】伤折, 恶血瘀结不散; 妇人经水不利, 血瘀不消。

31384 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】芎藭一两半 泽兰(取叶) 附子(炮裂, 去皮脐) 牛膝(酒浸, 切, 焙)各一两 蜀椒(去目及闭口者, 炒出汗) 生干地黄(焙)各三分 桂(去粗皮)半两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水、酒共一盏, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】坠堕倒仆, 蹴损筋脉。

31385 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芎藭 芍药 牡丹皮各一两半 羌活(去芦头) 甘菊花 防风(去叉) 甘草(炙)各二两 柴胡(去苗) 半夏(生姜汁制作饼, 晒干)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盏。加生姜三片, 薄荷三叶, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人血风攻注, 身体骨节疼痛, 头目昏眩, 口苦舌干, 多困少力, 时发寒热。

31386 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芎藭 防风(去叉) 当归(酒浸, 切, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 黄耆(锉) 人参 藁本(去苗土) 前胡(去芦头) 五加皮 石斛(去根) 山芋 续断各一两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盏, 加生姜三片, 大枣一个(擘破), 煎至七分, 去滓, 空心、日午、临卧温服。

【主治】妇人风虚劳冷, 肢体疼痛, 气血凝涩, 脾胃气弱, 月经不匀。

31387 芎藭汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芎藭 麻黄(去根节, 煎, 掠去沫, 焙) 升麻 白芷 甘草(炙) 石膏(碎)各一两 干姜(炮) 桂(去粗皮)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盏,

煎七分，去滓温服，一日三次。

【主治】妇人中风，言语不利，四肢拘急，头目昏眩，遍体发热。

31388 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】芎蒭（锉） 当归（切，焙） 细辛（去苗叶） 独活（去芦头） 麻黄（去根节） 续断各一两 桂（去粗皮） 干姜（炮） 羚羊角屑各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、酒各半盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，角弓反张，心膈烦闷，言语不利。

31389 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】芎蒭 黄耆（锉） 桑耳 桔梗各一两半 黄连（去须） 赤芍 牡蒙 京三棱（炮，锉） 附子（炮裂，去皮脐） 代赭 当归（切，焙） 白术各一两 青橘皮（去白，炒） 黄芩（去黑心）各半两 桂（去粗皮）三分

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人月水不调，脐下撮痛。

【备考】《普济方》无黄连，牡蒙作“牡丹皮”。

31390 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】芎蒭 艾叶（去梗，炒） 当归（切，焙） 白术各一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【功用】养胎荣血。

【主治】妊娠胎萎燥。

31391 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】芎蒭 甘草（炒） 芍药 草豆蔻

（去皮） 槟榔（锉）各二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加大枣一个（擘），生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心痛，呕逆不思饮食。

31392 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】芎蒭 芍药 白术 阿胶（炒令燥） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加艾叶、糯米、生姜，同煎至六分，去滓，食前服。

【主治】妊娠数堕胎，心腹疼痛。

31393 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】芎蒭 当归各一两（生，切） 瞿麦（去根）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，醋少许，同煎至七分，去滓，连三二服必下。

【主治】子死腹中不下。

31394 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】芎蒭一两半 大黄（锉，炒）二两 芍药一两半 黄芩（去黑心）一两 桂（去粗皮）一两 甘草（炙，锉）一两 当归（切，焙）二两 熟干地黄（焙）一两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，微炒令黄色）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空腹温服。

【主治】产后恶血所下不尽，心腹疼痛。

31395 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芎蒭（锉） 黄芩（去黑心） 防风（去叉）各一两 当归（切，炒） 芍药 甘草（炙）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤风冷，因致血气不利，心腹疼痛，或寒或热，头目昏重。

31396 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芎蒭一两半 防风(去叉) 人参 附子(炮裂,去皮脐) 芍药 当归(切,焙) 鬼箭羽(锉) 虎杖(锉) 甘草(炙) 生干地黄 槟榔各半两 牛黄(别研)一分

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水七分,酒三分,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,舌强不知人。

31397 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芎蒭 芍药 羌活(去芦头) 羚羊角(镑屑) 酸枣仁(微炒)各一分 防风(去叉) 桑根白皮(锉,炒)各一分半

【用法】上哎咀,如麻豆大。以水三盏,煎取一盏半,去滓,空腹分温二服。

【主治】产后中风,身背拘挛。

31398 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】芎蒭 防风(去叉) 桂(去粗皮) 人参各一两 麻黄(去根节,煎,掠去沫,焙)一两半 附子(炮裂,去皮脐) 甘草(炙)各半两 石膏(打碎)二两 杏仁(去皮尖双仁,炒)八十枚

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水二盏,加生姜半分(切),煎取一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后身体强直,如弓反张。

31399 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】芎蒭 牛膝(去苗,酒浸,切,焙) 当归(切,炒) 草薢(锉) 桂(去粗皮) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 芍药各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣二个(劈破),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后腰痛沉重。

31400 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】芎蒭 当归(切,焙) 黄耆(锉,焙)各二两 干姜(炮) 甘草(炙) 黄芩(去黑心)各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,早晨、日晚各一次。

【主治】小儿胎寒,腹痛羸啼。

31401 芎蒭汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】芎蒭 大黄(煨,锉) 羌活(去芦头) 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,以水一中盏,加薄荷数叶,同煎至六分,去滓,分温二服。

【主治】小儿心热盗汗。

31402 芎蒭汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】芎 归 白芍 熟地 参 苓 术 草 杜仲 川断 黄耆 阿胶 香附 陈皮 木香 艾叶 五味子

【主治】临月未满,胎不安者。

31403 芎蒭汤

《普济方》卷三四八引《仁存方》。为《产育宝庆》卷上“清魂散”之异名。见该条。

31404 芎蒭汤

【方源】《普济方》卷四十四。

【组成】芎蒭五两 细辛(去苗叶)二两半 人参一两半 甘草(炙)三分 半夏曲一分(用生姜和半夏末作曲用)

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱,水一盏,加生姜三片,薄荷五叶,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【功用】清气。

【主治】头痛痛。

31405 芎蒭汤

【方源】《普济方》卷四十七。

【组成】芎蒭 当归(去芦头,酒浸) 白

芷 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】一切失血多，眩晕不苏。

31406 芎蒭汤

《普济方》卷七十七。即《兰室秘藏》卷上“芎辛汤”。见该条。

31407 芎蒭汤

《普济方》卷三二八。为《张文仲方》引《徐王方》（见《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

31408 芎蒭汤

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】当归 川芎 黄芩 人参 甘草 芍药 防风 生姜各三分 大黄二分（可量人强弱方可服之） 桃仁八十枚

【用法】以水七升，煮取二升，下大黄，更煎三沸，分作三服。

【主治】产后心腹切痛，不能饮食，忽然往来寒热。

31409 芎蒭汤

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】芎蒭 桂心 当归 吴茱萸 茯苓 芍药 甘草各六分 桃仁十分

【用法】上咬咀。以水七升，煮取二升，去滓，分温服。

【主治】先患冷气，因产后腹痛。

31410 芎蒭汤

《校注妇人良方》卷二十二。为《三因》卷十七“芎蒭当归加芍药汤”之异名。见该条。

31411 芎蒭汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地十两（取汁） 芎蒭一两

【用法】芎蒭煎汁，冲地黄汁，分三次温服。

【主治】血崩气陷，不时举发，脉弦数者。

【方论选录】血室空虚，生气不振，故常觉气陷于下，而血崩不时举发焉。生地专滋血室之空虚，芎蒭特举生气之下陷，二味成方，味同力锐，能使血室滋荣，生气振发，则冲

任无不完固，而血自归经，何至不时举发血崩哉。

31412 芎蒭汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】川芎 梔子 芍药各二钱 香附 黄连各一钱 白芷五分 木香七分 沉香八分 茯苓五钱八分 人参五分 桔梗四钱三分 柴胡一钱 当归七分 菊花八分 黄芩七分 陈皮四钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人有瘀血，发血晕，因致眼疾者。

31413 芎蒭饮

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】芎蒭半两 马牙消（研） 石膏（研）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，好茶一钱匕，同煎至六分，去滓温服。不拘时候。

【主治】伤寒头疼不止。

31414 芎蒭饮

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】芎蒭 丹参 当归（锉，焙） 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 牡丹皮（锉） 桃仁（去皮尖双仁，炒）各一两 大黄（锉，炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】肾虚劳役，腰卒痛。

31415 芎蒭饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】芎蒭 当归（切，焙） 竹茹各一两 阿胶（炙燥）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，早晨、午时、至晚各一次。

【功用】止血安胎。

【主治】妊娠漏胎，下血过多，腹中刺痛。

31416 芎蒭酒

【方源】《千金》卷十三。

【组成】芎蒭 辛夷 天雄 人参 磁石 石膏 茵芋 桂心 秦艽 天门冬 柏子仁 山茱萸 白头翁各三两 松萝 细辛 薯蓣 羚羊角 菖蒲 甘草各二两 云母一两（烧之令赤，末之为粉） 防风四两

【用法】上咬咀。以酒二斗，渍之七日，初服二合，渐加至五合，每日三次。

【主治】脑风头重，颈项强，眼眦眦泪出，善欠，目欲眠睡，憎风，剧者耳鸣，满眉眼疼闷，吐逆，眩倒不自禁；诸风乘虚，经五脏六腑，皆为癫狂。

【方论选录】①《千金方衍义》：诸风之患，良由心包之火扰动于外，故见证种种。究其所由，不离内火招风，是以头风眩晕，牵引游风等证，诸治悉归附此。如芎蒭酒治脑风吐逆，癫狂诸邪，专以祛风散结，清心安神，镇摄虚火为主。方中芎蒭、辛夷、天雄、石膏、茵芋、羚羊、白头翁、秦艽、松萝、细辛、防风一派皆祛风散结之药；兼人参、柏仁、天冬、薯蓣、菖蒲、甘草清心安神之剂，以滋风药之性；磁石、山萸、桂心、云母镇摄虚火，使之不上乘心包；渍之以酒，引其药力也。②《中风斟诠》：方下所谓头重泪出，耳鸣、眉眼疼等无一非肝火肝风自动为病。若满闷吐逆，眩倒不禁，或为癫狂，则气血上冲，脑经昏乱矣。此方主治，名以脑风，可见古人亦未尝不知病之在脑，而药用羚羊清肝，磁石、石膏重坠摄纳，天冬、柏仁、白头翁凉润清热，以定内动之风火，证治非不符合。然古人习惯，凡是风病，无不认作外来之邪，所以有诸风乘虚经五脏六腑之说，且隐隐然有外风非温燥不可之意。即使确有内热见证，重任凉药，而亦必杂以桂、附、细辛之属，自盾自矛，恬不为怪，制方庞杂，亦必不能为古人讳。此则本方诸药，不特天雄、茵芋、桂心、细辛，必为内风上扰之鸩毒；即山萸、云母，皆温养肾肝，亦非所宜；而芎蒭、辛夷、防风，温升疏散，均是禁药；且酒之上升，尤为抱薪救火，是皆古人误以外

风之治法。欲用古方，必不可食古不化。

【临证举例】风眩《千金》：有女人少时患风眩，发则倒地，为妇积年无儿。服此酒并将紫石门冬丸服之，眩愈，生儿子平复也。

31417 芎蒭酒

【方源】方出《医心方》卷二十一引《医门方》，名见《云岐子保命集》卷下。

【组成】芎蒭八分 生地黄汁一升

【用法】上以酒五升，煮取二升，去滓，下地黄汁煎一沸，分三服，相去八九里。不耐酒者，随多少数服即止，但此二味可单用服之。

【主治】久崩中，昼夜不止。

【方论选录】《济阴纲目》：此方以酒煎芎蒭配生地汁，自有妙用，甚奇甚奇。用酒之意，便是升法。

31418 芎蒭酒

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】芎蒭 羌活（去芦头） 莽草 细辛（去苗叶） 甘草（炙，锉）各一两 黑豆（炒）二合

【用法】上为粗末，分作八帖。每帖以酒一升，煎取五合，热含漱，咽亦无妨。

【主治】热毒风攻，口面喎斜，及偏风。

31419 芎蒭粉

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】芎蒭 白芷 麻黄根各二两 藿香一两 米粉二升

【用法】上为粉。摩病上。

【主治】风瘾疹，痒痛难任。

31420 芎蒭散

【方源】《普济方》卷三四二引《肘后方》。

【组成】川芎

【用法】上为细末。每服方寸匕，以热酒调下，一日三四次。一方用热水调服。

【主治】妊娠因坠倒仆，胎不转动，腹内疼痛，腰重，及子死腹中不出。

31421 芎蒭散

【方源】《外台》卷二十六引《范汪方》。

【组成】芎蒭 雷丸 桔梗 白芷各四分

【用法】上为散。每服方寸匕，以蜜饮、苦酒或米汁调下，一日三次。又可用炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十三丸。当稍稍下；不尽，更服一剂。

【主治】三虫。

31422 芎蒭散

【方源】《外台》卷二十二引《删繁方》。

【组成】芎蒭八分 白芷七分 甘草五分(炙) 桂心四分 杜衡四分 当归五分

【用法】上为末。每服方寸匕，以酒调下，一日二次。

【主治】心虚寒，口气臭冲人；及虫齿痛。

31423 芎蒭散

【方源】《千金》卷五。

【组成】芎蒭 白术 防己各半两

【用法】上药治下筛。以乳和，与儿服之。又以儿母手掩脐中；亦以摩儿头及脊。二十日儿未能服散者，以乳汁和之，服如麻子大一丸；儿大能服药者，以意斟酌之。

【主治】小儿夜啼，至明即安寐。

【方论选录】《千金方衍义》：芎蒭散专取芎蒭以散风热，白术以培土虚，防己以开痰癖，为涤热安中专药。

31424 芎蒭散

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷六十五。

【组成】芎蒭 细辛 防风 矾石 附子 藜芦 莽草各等分

【用法】上为末。绵裹如弹子大，酒浸，安所患处，含之勿咽，每日三次。刺破极佳。

【主治】齿痛。

【方论选录】《千金方衍义》：其芎、辛、防风、藜芦、莽草总攻风毒，矾石涤除垢腻，尚恐不逮，乃以附子雄悍之力助之。刺破极佳者，破则热毒得以外泄矣。

31425 芎蒭散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】羌活一两 芎蒭 牡丹皮 当归 防己各半两 甘草(炙)四钱

【用法】上为末。每服三匕，水一升半，加生姜一分 煎减半，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒、伤风，头痛，身热，或身不甚热，拘倦无汗，头重，腰膝沉堕，恍惚无力。

31426 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】芎蒭三分 麻黄三分(去根节) 丹参三分 酸枣仁一两(微炒) 侧子三分(炮裂，去皮脐) 茯神三分 防风三分(去芦头) 甘菊花三分 甘草三分(炙微赤，锉)

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝脏风，筋脉抽掣，背膊疼痛。

【宜忌】忌猪肉、毒鱼、大蒜等。

31427 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】芎蒭一两 防风三分(去芦头) 独活三分 桂心三分 前胡三分(去芦头) 甘菊花半两 附子三分(炮裂，去皮脐) 麻黄一两(去根节) 细辛半两 五味子三分 黄耆半两(锉) 杏仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 人参二分(去芦头) 茯神三分 山茱萸半两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】肺脏中风，项强头旋，胸满短气，咽干，嘘吸颤掉，语声嘶塞，四肢缓弱。

【宜忌】忌生冷、毒滑、油腻。

31428 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】芎蒭一两 独活二两 柴胡一两半(去苗) 川大黄一两(锉碎，微炒) 防风三分(去芦头)

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒头痛，面色赤，发热，形如中风，常自汗出，呕逆；下之益烦，心懊恼，腹如饥；发汗致痉，身强难以屈伸。

31429 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】芎蒭 桔梗（去芦头） 前胡（去芦头） 石膏 人参（去芦头） 白茯苓 麦门冬（去心）各一两 旋覆花半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒已得汗，其人仍发热，心下悸，头痛目眩，心神烦喘。

31430 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】芎蒭二两 独活二两 赤芍药二两 赤茯苓一两 防风二两（去芦头） 当归二两 石膏一两 人参一两（去芦头） 葛根一两（锉） 桂心一两 羚羊角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉） 汉防己二两 麦门冬一两（去心） 白术一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，更煎一二沸，不拘时候温服。

【主治】风痹，四肢缓弱无力不收，烦闷语涩。

31431 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】芎蒭三分 独活三分 防风三分（去芦头） 白术半两 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 汉防己半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 茯神一两 羚羊角屑三分 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风虚邪气所攻，发即腹满急，头旋眼晕欲倒。

【备考】本方方名，《普济方》引作“川芎散”。

31432 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】芎蒭一两 防风一两（去芦头） 葛根一两（锉） 旋覆花半两 白蒺藜二两（微炒，去刺） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 石膏二两 甘菊花半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头痛，或时旋转。

31433 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】芎蒭三分 防风半两（去芦头） 麻黄三分（去根节） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 当归三分 白术半分 桂心半两 天雄半两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 蔓荆子半两 藁本半两 赤芍药三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风身体疼痛，头目昏重。

31434 芎蒭散

《圣惠》卷二十二。为《千金》卷十四“芎蒭汤”之异名。见该条。

31435 芎蒭散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】芎蒭三分 独活半两 防风半两（去芦头） 赤茯苓三分 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白术半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 黄芩半两 羚羊角屑半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头旋，发则心腹满急，眼晕欲倒。

31436 芎藭散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】芎藭三分 杜若三分 天雄三分（炮裂，去皮脐） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 防风半两（去芦头） 白术半两 赤茯苓三分 人参三分（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】头风目眩，心腹满闷，不下饮食。

31437 芎藭散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】芎藭一两 柴胡一两半（去苗） 桂心三分 赤芍药一两 白术一两 大腹皮二分 桃仁二十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 木香二分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳，肩背及心腹疼痛，或四肢不和，腹胀满。

31438 芎藭散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】芎藭一两 酸枣仁一两（微炒） 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 前胡一两 赤芍药一两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襴） 桔梗半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳四肢无力，骨节身体烦疼，不思饮食。

【宜忌】忌苋菜。

31439 芎藭散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】芎藭一两 当归一两 独活二两 细辛半两 白芷半两

【用法】上为粗散。每用药半两，以水二大盏，煎至一盏，去滓，热含冷吐。

【主治】齿风疼痛，及口臭。

31440 芎藭散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】芎藭 薏苡仁各二两 细辛 防风（去芦头） 地骨皮 柳枝（锉）各一两

【用法】上为散。每用半两，以水二大盏，煎至一盏，去滓，热含吐之。

【主治】牙齿动摇疼痛。

31441 芎藭散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】芎藭 槟榔 人参（去芦头） 赤茯苓 白术 麻黄（去根节） 肉桂（去皱皮） 郁李仁（汤浸，去皮尖，微炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至七分，去滓，每于食后温服。

【主治】外伤风冷，鼻塞，气息不通，壅闷。

31442 芎藭散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】芎藭一两 桂心一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 鳖甲二两（涂醋，炙令黄，去裙襴） 京三棱一两（微煨，锉） 槟榔一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】癥瘕久不愈，令人不食，羸瘦少力。

31443 芎藭散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】芎藭二两 延胡索一两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，微炒） 泽兰半两 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 肉桂二两

(去粗皮) 当归二两(锉, 微炒) 生干地黄一两 附子一两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为细散。每服二钱, 以温酒调下, 不拘时候。

【主治】从高坠下, 车马诸伤, 踉折疼痛不可忍。

31444 芎藭散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】芎藭一两半 黄芩一两 当归一两(锉, 微炒) 石膏二两半 麻黄一两(去根节) 桂心一两 秦艽一两(去苗) 干姜一两(炮裂, 锉) 杏仁三十枚(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人卒中风, 四肢不仁, 善笑不息。

31445 芎藭散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】大芎藭散(《普济方》卷三一八)。

【组成】芎藭一两 赤茯苓三分 赤芍药三分 酸枣仁三分 桂心三分 羌活半两 当归三分(锉, 微炒) 牛膝三分(去苗) 细辛半两 木香三分 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓤) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓稍热服, 不拘时候。

【主治】妇人血风, 身体骨节疼痛, 心膈壅滞, 少思饮食。

31446 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】芎藭三分 枳实三分(麸炒微黄) 藿香三分 赤箭三分 赤茯苓三分 白术半两 人参半两(去芦头) 半夏半两(汤浸七遍去滑) 桂心半两 前胡半两(去芦头) 诃黎勒皮三分 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时

候。

【主治】妇人血风攻脾胃, 心腹气壅闷, 痰逆不下饮食, 四肢少力。

31447 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】芎藭 桂心 桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 微炒) 吴茱萸(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 当归(锉, 微炒) 各三分 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁, 炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 食前稍热服。

【主治】妇人月水每来, 脐下朽刺, 四肢烦疼。

31448 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】芎藭一两 防风一两(去芦头) 犀角屑半两 生干地黄三分 葛根半两 麻黄三分(去根节) 独活半两 汉防己半两 杏仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 赤箭半两 羚羊角半两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 入竹沥半合, 不拘时候温服。

【主治】妊娠中风, 四肢腰背强直, 言语蹇涩, 心神烦闷。

31449 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】芎藭三两 吴茱萸一分(汤浸十遍, 焙干, 微炒) 白术一两 当归三分(锉, 微炒) 赤芍药二分 阿胶半两(捣碎, 炒令黄燥) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 前胡一两(去芦头) 枳实半两(麸炒微黄) 甘草一两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服二钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠九月, 伤寒头痛壮热, 心中烦闷, 小腹冷疼。

31450 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】芎藭一两 当归一两半（锉，微炒） 鹿角胶一两半（捣碎，炒令黄燥） 桑寄生一两 熟干地黄一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠忽胎动，下恶血，腹痛不可忍，心神烦闷。

31451 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】芎归汤（《云岐子保命集》卷下）。

【组成】芎藭一两 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 桔梗一两（去芦头） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 吴茱萸半两（汤浸七遍，姜汁炙令香，焙） 当归一两（锉，微炒） 白芍药二分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠先患冷气，忽冲心腹刺痛。

31452 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】芎藭三分 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒） 艾叶半两（微炒） 熟干地黄一两 桑寄生三分 赤石脂二分

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妊娠五六个月，从高坠下，胎腹内不安，兼脐下疔刺，疼痛不住，下血。

31453 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】芎藭 附子（炮裂，去皮脐） 琥珀 生干地黄 当归（锉，微炒） 羌活 桂心 赤芍药各一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。用羊肉二斤，川椒半分，葱白二七茎，生姜一两，以水五升，煮取汁

三升，每服用肉汁一中盏，药末四钱，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后体虚中风，四肢烦疼，腹内疔痛。

31454 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】芎藭三分 防风一两（去芦头） 桂心半两 赤芍药半两 羌活三分 当归三分（锉，微炒） 羚羊角屑三分 牛蒡子一两（微炒） 酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，四肢筋脉挛急疼痛，背项强直。

【方论选录】《医略六书》：产后风由于经，热遏于络，而筋脉失养，故项背强急，手足拘挛掣痛焉。西羌活散太阳之邪，羚羊角清厥阴之火；芎藭活血行气，当归养血荣筋；防风疏风于表，乳香活血止痛；牛蒡疏风散热，枣仁养心益营；桂心温营暖血以平肝木也。水煎温服，使风邪外解，则过热自化，而经络清和，筋得所养，安有项背强急，拘挛掣痛之患哉。

【备考】《医略六书》有乳香。

31455 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】芎藭 生干地黄 刘寄奴 鬼箭羽 羌活 当归（锉，微炒）各三分 柴胡一两（去苗） 鳖甲一两（涂醋，炙微黄，去裙襖）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气不散，体虚，乍寒乍热，骨节疼痛，四肢少力。

31456 芎藭散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】芎藭一两 桂心一两 木香一两 当归一两（锉，微炒） 桃仁一两（汤浸，去

皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后血气与冷气相搏，上攻心痛。

31457 芎蒭散

【方源】《普济方》卷三五四引《圣惠》。

【组成】芎蒭 芍药 黄芩各二两 桂心一两 甘草二两(炙)

【用法】以水六升，煮取二升，分三服。

【主治】产后血气不散，体虚，乍寒乍热，骨节疼痛，四肢少力。

【加减】无桂，加生地黄一斤。

31458 芎蒭散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《神巧万全方》。

【组成】芎蒭半两 甘菊花 白术 防风 人参 细辛 白茯苓 甘草(炙)各一分

【用法】上为散。每服一钱，以水一盞，加生姜少许，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿脑户伤于风冷，鼻内多涕，精神昏闷。

31459 芎蒭散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《神巧万全方》。

【组成】芎蒭 甘菊花 乌蛇(酒浸，去皮骨，炙黄)各一两 细辛 白芷 桂心各一两

【用法】上为散。每服一钱，食后温酒调下。

【主治】肝脏风虚，目视眈眈，常多泪出。

31460 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎蒭 石膏(碎) 细辛(去苗叶) 荆芥穗 甘草(炙，锉) 草乌头(去皮脐，同黑豆炒，去豆)各一两

【用法】上为散。每服半钱匕，腊茶清调下，加至一钱匕，空心食前服。

【主治】首风，头面多汗，恶风，头痛。

31461 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芎蒭 菊花 荆芥穗 石膏(研

细) 甘草各等分

【用法】上为细散。每服一钱匕，热汤调下。

【主治】头目昏眩，肢体烦倦。

31462 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芎蒭 莎草根(炒，去毛)各一两 藿香叶 荆芥穗各一两 石膏(碎)一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，食后荆芥汤调下。

【主治】风头痛。

31463 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】芎蒭 人参 前胡(去芦头) 白僵蚕(炒)各一两 防风(去叉) 蔓荆实 天麻(酒浸一宿，焙)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后温酒调下。

【主治】风头旋，眼目昏痛，眩运，倦怠，心忪。

31464 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】芎蒭 莎草根(炒) 青橘皮(去白，焙) 蓬莪术(炒)各一两 乌药二两

【用法】上为散。每服二钱匕，甚者三钱匕，温酒调下，更饮五合暖酒。得吐愈；未退更服，只三服止。

【主治】冷气攻冲，心腹疼痛，短气汗出。

31465 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】芎蒭(锉)一两半 附子(炮裂，去皮脐)一两 槟榔(锉) 羌活(去芦头) 桑根白皮(锉，炒)各三分

【用法】上为散。每服一钱匕，空心、食前煎绿豆汤调下，一日三次。

【主治】脚气痰壅，头牵引而痛。

31466 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】芎蒭 地骨皮 何首乌(去黑皮) 荆芥穗 菊花 旋覆花 甘草(炙) 石决明(刷净) 草决明各一两 蝉蜕(去土) 青

箱子 木贼各半两 白芷一分

【用法】上为散。每服一钱匕，食后米泔水调下。

【主治】目晕昏涩，视物不明。

31467 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】芎蒭 辛夷各一两 细辛（去苗叶）三分 木通（锉）半两

【用法】上为散。每用少许绵裹塞鼻中，湿即易之。五七日愈。

【主治】鼻塞不闻香臭。

31468 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】芎蒭 莎草根（炒）各二两 石膏（研，水飞）一两 龙脑（研）一分

【用法】上为散。每服二钱匕，食后荆芥、腊茶清调下。

【主治】脑热，鼻渊多涕。

31469 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】芎蒭 胡桐泪 石律 防风（去叉） 白芷 莽草各一两

【用法】上为散。每用半钱匕揩牙，盐汤漱之。

【主治】牙齿浮肿、宣露，鲜血不止。

31470 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】芎蒭 木香 乳香（研） 丁香各一分 烧盐（研）半两

【用法】上为散。每用少许，敷贴患处，一日三五次。

【主治】齿龈宣露，疳疔虫蚀。

31471 芎蒭散

《圣济总录》卷一三〇。为《圣惠》卷六十二“托里生肌散”之异名。见该条。

31472 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】芎蒭 大黄（生） 白藜 芍药 黄连（去须） 槐皮（锉） 龙骨（火烧）各半两

【用法】上为散。涂敷疮上，每日三五次。

【主治】热疮多脓汁。

31473 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【异名】内托散、生肉芎蒭散（《外科精义》卷下）。

【组成】芎蒭一两 当归（切，焙） 人参 防风（去叉） 桂（去粗皮）各三分 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 白芷 芍药 甘草（炙，锉） 黄耆（锉） 桔梗（锉，炒）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日三次。

【功用】暖肌生肉。

【主治】发背、痈疽已溃。

31474 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】芎蒭 甘草（炙，锉） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 泽兰 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各一两 当归（切，焙） 大黄（醋炒）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】伤折肿痛，气血不散。

31475 芎蒭散

《圣济总录》卷一五五。为《金匱》卷下“白术散”之异名。见该条。

31476 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】芎蒭 当归（切，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，用糯米饮调下，不拘时候。

【主治】妊娠腹痛胀闷。

31477 芎蒭散

《圣济总录》卷一五五。为《张文仲方》引《徐王方》（见《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

31478 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】芎蒭 当归(切,焙)各半两 榆白皮(锉)一两

【用法】上为散。每服三钱匕,用生地黄汁温调下。未下再服,以下为度。

【主治】胞衣不出。

31479 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芎蒭 当归(炙,焙令香,锉碎) 柏叶(炙黄)各一两 桂(去粗皮)半两 大黄(炮,锉)一分

【用法】上为散。每服二钱匕,煎当归酒调下,日间三次,夜晚一次。

【主治】产后血块攻筑,心腹痛。

31480 芎蒭散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】芎蒭 防己各半两 人参一分

【用法】上为散。二十日儿未能服者,以乳汁和之,如麻子大一丸,以乳汁下;儿大能服散者,每服一字匕,米饮调下,一日三二次。

【主治】小儿夜啼,至明即安。

31481 芎蒭散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】芎蒭 槟榔 麻黄(去节) 肉桂 防己 木通 细辛 白芷 石菖蒲各一分 木香 川椒 甘草(焙)各半分

【用法】上锉。每服三钱,加生姜、紫苏煎服。

【主治】鼻塞为鼾。

【备考】《证治宝鉴》有葛根,无甘草。

31482 芎蒭散

《朱氏集验方》卷十。为《圣济总录》卷一五四“桑寄生汤”之异名。见该条。

31483 芎蒭散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《黄帝七十二证眼论》。

【组成】石膏二斤 川芎 甘草 白芷 仙灵脾 白附子各一斤 脑子三钱 川乌一斤

【用法】上为细末。每服二钱,薄荷汤调下。

【主治】目晕。

31484 芎蒭散

《医学纲目》卷十一。即《本事》卷十(扫叶山房刊本)“芎羌散”。见该条。

31485 芎蒭散

《普济方》卷八十五。即《圣济总录》卷一〇九“芎辛散”。见该条。

31486 芎蒭散

【方源】《普济方》卷二四一。

【组成】川芎一两

【用法】上为细末。每服二钱,取生萝卜自然汁一盞,用重汤暖令温,空心调下。

【主治】寒湿脚气,肿满疼痛,行步艰难,或发或愈,延引岁月。

31487 芎蒭散

《普济方》卷三〇三。为方出《千金》卷四,名见《局方》卷九“芎蒭汤”之异名。见该条。

31488 芎蒭散

【方源】《普济方》卷三〇三。

【组成】芎蒭 防风(去叉) 羌活(去芦头)各一两 甘草(炙)三分 当归(焙)一两

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服六钱,用水二盞,煎至一盞,去滓热服,盖覆出汗。

【主治】疮中风,疼痛不可忍。

【加减】若不汗,加麻黄(去粗皮及节)三分,桂一两,汤成又加竹沥半合。

31489 芎蒭散

《袖珍小儿》卷七。为《袖珍》卷四引汤氏方“芎黄散”之异名。见该条。

31490 芎蒭散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】石膏二钱五分 草乌一分五厘 芎蒭二分 薄荷二分 白附子二分 甘草一分 白芷三分 细辛一分 仙灵脾二分

【主治】冷头风。

31491 芎蒭散

《寿世保元》卷八。为《回春》卷七“芎归散”之异名。见该条。

31492 芎蒭膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】芎蒭 吴茱萸 细辛 川椒 干姜(炮裂) 皂荚各三分

【用法】上为细末,以醋浸一宿,猪脂六两,同于银锅中煎五七沸,滤去滓,倾入瓷盒中。每取枣核大,绵裹纳鼻中。

【主治】①《圣惠》:鼻塞多痛。②《圣济总录》:鼻塞多清涕。

31493 芎蒭膏

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】芎蒭 当归 细辛(去苗叶) 白芷各一分

【用法】上为细末,以雄鱼脑六合,和于银器中,煎成膏,去滓,倾入盒中澄凝。以枣核大,绵裹塞耳中。

【主治】耳鸣,耳聋。

31494 芎蒭膏

【方源】《济生》卷五。

【异名】芎芷膏(《得效》卷十七)。

【组成】香白芷 芎蒭各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。食后临卧嚼化。

【主治】口气热臭。

【备考】本方方名,据剂型当作“芎蒭丸”或“芎芷丸”。

31495 芎蒭膏

【方源】《普济方》三一三。

【组成】川芎(微炮) 当归 皂荚(去皮) 白及 赤芍药 何首乌 无名异 木鳖子 川山甲(火炮) 黄柏 半夏 乳香 没药各等分

【用法】上咬咀。用香油一斤,药末三两(春、秋一斤油,用药四两,冬用六两药,夏用二两药),槐、柳条搅之,滴水如珠可用。

【主治】诸般痼疽、发背。

【加减】夏月,加黄柏三两;冬,加一两;春、秋,加二两。

31496 芎蒭丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】干姜(炮) 附子(炮,去皮脐) 山茱萸 续断 川芎 白芍药 蒲黄各一两 生干地黄三分 白术 菟丝子(酒浸令软,别捣) 肉苁蓉(酒浸一宿,切,焙) 黄耆各二两

【用法】上为细末,蜜糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前煎木香、热米饮送下。

【功用】安胎,补冲任,止胎漏,调血脉。

【主治】子脏风冷,腰腹疼痛,或久无子息,或妊娠损堕。

31497 芎夏汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】川芎 半夏(制) 茯苓 青皮 陈皮 枳壳(制)各半两 白术 炙草(炒)各一分

【用法】上为散。每服三钱,加生姜五厚片,水煎服。

【功用】逐水利饮。

【主治】水饮证。

【加减】喘,加去节麻黄;嗽,加炒桑白皮;呕,加生姜、半夏;泄,加苍术、白术;痞满,加枳壳、桔梗;胀满,加缩砂、白豆蔻;眩运,加半夏、南星;怔忡,加白茯苓。

【备考】寒热疼痛下其癖,浮肿体重渗其湿,余可类推。

31498 芎胶散

《产宝诸方》。为《圣济总录》卷一五四“阿胶汤”之异名。见该条。

31499 芎粉丸

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】川芎五钱 天花粉五钱 轻粉二钱五分 雄黄一钱二分五厘 辰砂一钱二分五厘 麝香五分

【用法】上为末,蒸饼糊为丸,如绿豆大。每服八分,每日三次。

【主治】诸疮赘肉。

31500 芎菊汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎藭 防风(去叉) 麻黄(去根节) 前胡(去芦头) 独活(去芦头) 各一两 菊花(择) 枳壳(去瓢, 麸炒) 甘草(炙, 锉) 细辛(去苗叶) 各半两 石膏(碎) 二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加薄荷五叶, 同煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】首风。目运头痛。

31501 芎菊散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】芎藭 甘菊花(择) 各一两 羌活(去芦头) 三钱 防风(去叉) 三分 细辛(去苗叶) 白僵蚕(炒) 各三两 草决明 旋覆花(择) 蝉蜕(洗, 焙) 各一钱 密蒙花(择) 天麻 荆芥穗 甘草(炙) 各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕, 水一盞, 煎至七分, 食后温服; 汤点亦得。

【主治】诸阳受风, 头目旋运, 目视昏暗, 肝气不清。

31502 芎菊散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】芎藭二两 菊花一两 白芷二两 细辛(去苗叶) 半两 石膏(水飞) 半两 防风(去叉) 二两 甘草(炙) 半两

【用法】上为细散。每服一钱匕, 食后茶调下。

【主治】眉骨、太阳穴、头面俱痛, 眼见黑花, 目渐昏暗。

31503 芎菊散

【方源】《百一》卷九。

【组成】薄荷二两 菊花 甘草 川芎各一两 防风七钱 白芷半两

【用法】上为细末, 食后以茶少许, 沸汤点服; 如伤风, 用酒调服, 其效尤速。

【主治】暴赤眼。

31504 芎黄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】川芎 大黄(锦纹者, 用无灰酒一碗浸, 火煮令酒尽, 焙干) 各二两

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食后温熟水送下。

【主治】风热壅盛, 头昏目赤, 大便艰难。

31505 芎黄汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】川芎一两 黄芩六钱 甘草二钱

【用法】上咬咀, 每服五七钱, 水一盞半, 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。三服即止。后用大芎黄汤下之。

【主治】破伤风。脏腑秘, 小便赤, 自汗不止, 因服热药, 汗出不休者。

【备考】本方方名, 《医学正传》引作“小芎黄汤”。

31506 芎黄汤

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】大黄 荆芥穗 贯芎 防风各等分

【用法】上为粗末, 大作剂料, 水煎, 去滓服之。以利为度。

【主治】头目眩运。

31507 芎黄汤

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】羌活 川芎 大黄各一两 甘草半两

【用法】上咬咀。每服半两, 水二盞, 煎至六分, 去滓温服。

【主治】实邪风热相合, 风性急, 火摇动焰而旋转, 其脉弦而紧洪, 风热发狂。

31508 芎黄汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】荆芥穗三钱 全蝎五个(炒) 大川乌头二个(炮, 去皮脐, 切碎, 炒黄色) 川芎半两 细辛(去苗叶) 一钱半 雄黄(研, 水飞) 一钱

【用法】上为细末, 每服半钱, 茶少许, 白汤点下, 不拘时候。

【主治】偏正头痛, 外伤风鼻塞声重, 清涕多嚏者。

31509 芎黄汤

《杏苑》卷八。为《保命集》卷中“大芎

黄汤”之异名。见该条。

31510 芎黄汤

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】川芎 黄芩各一钱半 甘草(炙)一钱 葱白四茎 香豉一合

【用法】水煎，温服，覆取微汗。

【主治】破伤风，便秘溺赤。

31511 芎黄散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】芎劳半两 川大黄三分(锉，微炒) 郁李仁三分(汤浸，去皮，微炒)

【用法】上为细散。每服一钱，以温水半盏调下，以利为度。

【主治】①《圣惠》：小儿大便不通，腹肋妨闷。②《永乐大典》引《医方妙选》：脏腑有热，小便涩，兼大便不通。

31512 芎黄散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】川芎 大黄 黄芩 何首乌各五钱 当归 黄连 香白芷各三钱半

【用法】上为细末。每用猪蹄汤煎药数沸，去滓，以绵惹洗之，药冷止。

【功用】化毒气，散脓汁，生肌肉，止疼痛。

【主治】疽疮。

31513 芎黄散

【方源】《普济方》卷七十七引《卫生家宝》。

【组成】白牵牛(炒) 大黄(煨) 川芎各等分

【用法】上为细末。每服三钱，临卧用沙糖水调下。睛疼，温酒调下。

【主治】血灌瞳仁及睛疼。

31514 芎黄散

【方源】《袖珍》卷四引汤氏方。

【异名】芎劳散(《袖珍小儿》卷七)。

【组成】大芎 干地黄各半两 山薯蓣 当归 芍药 甘草(炙)各二钱半。

【用法】上为末。热汤调服，并搽齿脚。

【主治】①《袖珍》：小儿齿不生。②《慈幼新书》：肾气不足，髓脉不充，七八月齿仍

不出，或难出而无力。

31515 芎黄散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】川芎 干地黄 当归 山药 白芍药各一两 沉香半两 粉草三钱

【用法】上为末。每服半钱，温盐汤调下，用少许揩齿脚亦佳。

【主治】小儿齿不生。

31516 芎黄散

【方源】《霉疮证治》卷下。

【异名】清心散、清身散。

【组成】大黄三两 芎劳一两 荞麦粉五钱

【用法】上为末。温酒或白汤调服。

【主治】结毒头痛；又治便毒。

31517 芎黄散

《家塾方》。为原书“应钟散”之异名。见该条。

31518 芎麻汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】川芎 天麻

【用法】以此方送下青州白丸子。

【主治】风痰头痛，眩晕欲吐。

31519 芎葛汤

【方源】《本事》卷七。

【组成】川芎(洗) 干葛 桂枝(去皮，不见火) 细辛(去叶) 枳壳(去瓢，麸炒黄) 人参(去芦) 芍药 麻黄(去节) 防风(去钗股)各半两 甘草一分(炙)

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，一日三次。有汗避风。

【主治】胁下疼痛不可忍，兼治脚弱。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；葛根气味辛甘平，入足阳明；桂枝气味辛温，入足太阳；细辛气味辛温，入足少阴；枳壳气味苦寒，入足太阴；人参气味甘温，入足阳明；白芍药味酸微寒，入足厥阴；麻黄气味辛温，入足太阳；

防风气味辛甘微温，入足太阳；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性；使以姜之辛通达表。胁下疼痛不可忍，兼有足弱不堪行走者，乃膀胱之气逆而不降，故以甘温护其中，以酸甘平缓其势，诸辛温苦平之品，得各行其性，鲜有气不行而疼不减者矣。

31520 芎藭散

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】川芎 罂粟（去蒂）各一两

【用法】上为细末。每服八分，空心蜜汤调下。

【主治】噤口红白痢疾，久不愈者。

31521 芎犀丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】犀角（镑屑）一分 芎藭三两 桔梗（锉，炒）一分 甘草（炙）一分 鸡苏叶（罗去土）三两 丹砂（别研，水飞）半两 细辛（去苗叶）一分 天麻半两 白芷一分 防风（去叉，锉）一分

【用法】除丹砂另研外，上为细末，和匀，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，食后细嚼，茶、酒任下。

【功用】治风化痰，清神志。

【主治】头目运眩欲倒，痰逆恶心，偏正头痛，眉骨痛，肢体倦怠，鼻塞气道不通，或面上游风，目翳。

31522 芎犀丸

【方源】《得效》卷十。

【组成】石膏（细研）四两 生龙脑（别研）朱砂（研，飞）四两（留一两为衣）生犀角一两 人参（去芦）二两 茯苓（去皮）二两 川芎四两 阿胶（碎，炒）一两半 细辛（去苗）二两 麦门冬（去心）三两 甘草（炙）二两 山梔子（去皮）一两

【用法】上除别研药后入，并为末，炼蜜为丸。每服一至二丸，食后细嚼、茶、酒任下。服此不十数次，成作嚏，突出一涎稠脓，即愈。

【主治】偏头疼，一边鼻塞不闻香臭，常流清涕，或作臭气一阵，加芎、蝎等遍服无效者。

【方论选录】《金匱翼》：此方兼祛风清热之长，而得参、胶等安定气血，虽虚人亦可用之，安内攘外，并行不悖也。

【备考】本方改为散剂，名“芎犀散”（见《中国医学大辞典》）。

31523 芎犀散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】川芎 犀角 独活（去芦）各半两 蝎梢 人参 天麻各半两

【用法】上为细末。每服半钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】风痫多困不省。

31524 芎犀散

《中国医学大辞典》。即《得效》卷十“芎犀丸”改为散剂。见该条。

31525 芎蝎散

【方源】《小儿病源方论》卷三。

【组成】川芎 芫荽各一两 蝎梢（去毒尖）一钱（焙） 细辛（去苗） 半夏（酒浸一宿，汤洗七次，焙干）各二钱

【用法】上为细末。一周儿每服抄一小铜钱，热汤调，稍热空心服。若痰满胸喉中，眼珠斜视，速与服。或痰气壅塞，不能咽药，用一指于儿喉膈中探吮，就斡去寒痰冷涎，气稍得通，以药灌之。

【主治】小儿脑髓风，凶颅开解，皮肉筋脉急胀，脑骨缝青筋起，面少血色，或腹中气响，时便青白色沫，或呕吐痰涎，欲成慢惊风搐，足胫冷者，或大人气上冲胸满，头面肿痒。

【备考】目上直视，睛不转睛者，难救。

31526 芎藭饮子

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】芎藭一两 白术一两 薏苡仁一两 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 羚羊角屑一两 前胡一两（去芦头） 赤茯

芎一两 麻黄一两(去根节) 汉防己一两
羌活一两 赤芍药一两 人参一两(去芦头)
丹参一两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上锉细, 和匀。每服半两, 以水一大盏, 煎至五分, 去滓, 食前温服。

【主治】腰退风。肌肤虚弱, 四肢缓弱, 湿痹不仁, 心胸满闷。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒滑物。

31527 芎蒭饮子

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】芎蒭三分 艾叶半两(微炒) 阿胶三分(捣碎, 炒令黄燥) 糯米半合 熟干地黄一两 大枣五个 青淡竹茹半两 生姜半两

【用法】上锉细, 和匀。以水二大盏, 煎至一盞三分, 去滓, 分温三服, 不拘时候。

【主治】胎动不安, 心神虚烦。

31528 芎蒭煮散

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】芎蒭 川羌活 关白芷(炒) 甘草(炮) 各一两 干姜(炮) 旋覆花 吴茱萸(炒) 各半两

【用法】上为散。每服二分, 加生姜半分, 大枣一个, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 空心、日中、临卧各一次。

【主治】三焦营卫气失度不和, 泻血疼痛, 服肠风药无效。

31529 芎蒭香苏散

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】川芎 香附 紫苏各四两 甘草一两(炙) 苍术 陈皮各二两

【用法】上锉。每服三五钱, 水煎, 去滓热服, 一日三次, 不拘时候, 四时俱可用。

【主治】头疼发热, 或鼻塞声重。

31530 芎蒭香连丸

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【组成】阿胶珠 白术各五钱 乳香 木香各二钱半 枳壳(麸炒) 干姜(炮) 各二钱 黄连一两(茱萸同炒) 砂仁(炒) 川

芎各五钱

【用法】上为细末, 醋糊为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 白汤送下。

【主治】妊娠下痢赤白, 腹中疝痛。

31531 芎蒭除眩汤

【方源】《易简方》。

【异名】芎蒭除眩散(《丹溪心法》卷四)、芎蒭除湿汤(《医钞类编》卷十三)。

【组成】川芎 白术 生附各等分 官桂 甘草各减半

【用法】每服四钱, 加生姜十片, 水煎服。

【主治】着湿头重眩晕。

31532 芎蒭除眩散

《丹溪心法》卷四。为《易简方》“芎蒭除眩汤”之异名。见该条。

31533 芎蒭除湿汤

《医钞类编》卷十三。为《易简方》“芎蒭除眩汤”之异名。见该条。

31534 芎归二术汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】白术 苍术 川芎 当归 人参 茯苓 薏苡仁 皂角针 厚朴 防风 木瓜 木通 穿山甲(炒) 独活各一钱 金银花二钱 甘草 精猪肉二两 土茯苓四两

【用法】水三碗, 煎一半, 量病上下服之, 滓再煎服。

【主治】杨梅结毒已成、未成, 筋骨疼痛, 步履艰辛, 及溃后腐肉臭败, 不能生肌收敛者。

31535 芎归二陈汤

《会约》卷十四。为《万氏女科》卷一“二陈加芎归汤”之异名。见该条。

31536 芎归二陈汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】川芎二钱 当归 半夏各三钱 陈皮 茯苓各一钱半 甘草六分

【用法】水煎, 温服。

【功用】化痰行气和血。

【主治】痰阻夹湿, 经来量少, 色淡稠粘, 痰多呕恶, 胸中不适, 脘胀, 口淡腻, 脉滑。

31537 芎归人参散

【方源】方出《外台》卷三十三引《广济方》，名见《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》。

【组成】川芎 川当归 人参 阿胶（炒）各等分 大枣十二个（擘）

【用法】上切。以水三升，酒四升，合煮取二升米，分三服。五日一剂，频服三四剂。

【功用】安胎。

【主治】胎漏腹痛。

31538 芎归内托散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 陈皮 茯苓 天花粉 桔梗 银花 黄耆各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】龙泉疽，虎须毒，已成欲作脓者。

31539 芎归加桂汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】当归 川芎 桂枝各等分

【用法】上锉。每服四钱，水、酒各一盞半，煮取一半，温服。

【主治】将产腹痛者。

【加减】若呕者，加半夏、生姜。

31540 芎归芍药汤

【方源】《奇效良方》卷二十八。

【组成】川芎 当归 芍药 桂枝 防风 枳实 羌活 甘草各一钱六分 干葛四分 麻黄 侧子二分

【用法】上咬咀，分作二帖。每帖用水二钟，加生姜五片，煎至七分，去滓，不拘时候服。有汗避风。

【主治】肝积气滞左胁下，遇发作手足头面昏痛。

【备考】方中麻黄用量原缺。

31541 芎归百草饮

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】当归 川芎 人参 甘草 干姜（炒） 百草霜

【用法】水煎，温服。

【主治】妊娠鼻血不止。

31542 芎归托里散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】川芎 当归 白芍药（炒） 木香 白芷 茯苓各半两 人参 辣桂 丁香 甘草（生）各一分

【用法】上为末。每服二钱，食前米汤调下。

【功用】托里排脓生肌。

【主治】痈疽。

31543 芎归血余散

【方源】《直指》卷九。

【组成】室女顶门生发一小团（井水洗取油腻，法醋浸一宿，日中晒干，纸搦火烧存性）川芎半两 当归三钱 木香 桃仁（水浸，去皮，焙）各二钱 安息香 雄黄各一钱 全蝎二枚 江上大鲤鱼头（生截断）一枚（醋炙酥）

【用法】上为末。分作四服，每服井水一大碗，净室中煎八分，入红硬降真香末半钱。服药毕，吸生气入口腹中，烧降真香置床下；午时又如前服药。瘵疾先用此，次以鳖甲生犀散取虫。

【主治】①《直指》：瘵疾。②《张氏医通》：传尸劳瘵，面赤，五心烦热。

31544 芎归安心汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】当归 川芎 生地 人参 丹皮 生蒲黄 干荷叶一片

【用法】水煎服。

【功用】大补心中之血，分清离经之瘀。

【主治】正产败血攻心，发热，恶露不行，狂言呼叫，甚则奔走登高。

31545 芎归均气饮

【方源】《医部全录》卷四九一引《幼科全书》。

【组成】归身 川芎 赤芍药 麦冬 人参 荆芥穗 防风 青皮 木香 官桂 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘如蚕壳蛇皮，气至而血不至。

31546 芎归苏苓汤

【方源】《女科秘旨》卷四。

【组成】当归二钱 川芎 枳壳 茯苓 砂仁各一钱 苏叶五分

【主治】胎不转动。

31547 芎归两和汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】川芎 当归 荆芥 蒺藜 桃仁 黑草

【用法】水煎服。

【主治】产后发热头痛，恶寒身痛。

31548 芎归补中汤

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【异名】芎归寄生汤（《医学正印》卷下）。

【组成】当归 川芎各一钱五分 茯苓八分 黄耆（炙）一钱 黄芩二钱 甘草 陈皮 阿胶（蛤粉炒）各五分 白术（土炒）一钱半 续断（酒洗）二钱 桑寄生七分 香附（炒）一钱 砂仁三分（按月加至一钱）

【用法】加生姜三片，水煎，空心服。如未孕，每服十五帖；如前次三月内小产，下次不如期而来，必先于两月半内，每日服一帖，保过三月半后方稳。

【主治】妇人性急，常惯小产。

31549 芎归补中汤

【方源】《校注妇人良方》卷十三。

【组成】艾叶（代姜） 阿胶（炒） 川芎 五味子（杵，炒） 黄耆（炙） 当归 白术（炒） 芍药（炒） 人参 杜仲（炒）各一钱 甘草（炙）五分

【用法】每服五钱，水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：妊娠未足月，气血虚而欲产。②《慈幼新书》：小产血崩，腹痛晕厥。

31550 芎归补中汤

《回春》卷六。为《济生》引《校正时贤胎前十八论治》（见《医方类聚》卷二二四）“芎蒭补中汤”之异名。见该条。

31551 芎归补血汤

《回春》卷六。为《古今医鉴》卷十二

“芎归调血饮”之异名。见该条。

31552 芎归补血汤

【方源】《审视瑶函》卷二。

【组成】生地黄 天门冬各四分 川芎 牛膝 白芍药 炙甘草 白术 防风各五分 熟地黄 当归身各六分

【用法】上锉。水二钟，煎至一钟，去滓温服。

【主治】男子衄血、便血，妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，不能视物，羞明酸涩，眼睫无力，眉骨、太阳俱痠疼者。

【加减】恶心不进食者，加生姜，水煎服。

【方论选录】上方专补血，故以当归、熟地黄为君，川芎、牛膝、白芍药为臣，以其祛风续绝定痛而通补血也；甘草、白术大和胃气，用以为佐；防风升发，生地黄补肾，天门冬治血热，血亡必生风燥，故以为使。

31553 芎归补血汤

《叶氏女科》。为《济生》引《校正时贤胎前十八论治》（见《医方类聚》卷二二四）“芎蒭补中汤”之异名。见该条。

31554 芎归补血饮

《履霜集》卷二。为《古今医鉴》卷十二“芎归调血饮”之异名。见该条。

31555 芎归阿胶汤

【方源】方出《外台》卷三十三引《集验方》，名见《胎产救急方》引《养生必用》（见《医方类聚》卷二二四）。

【组成】芎蒭 阿胶（炙） 当归 青竹茹各三两

【用法】上切。以水一斗半，煮银二斤，取六升，去银，纳药煎，取二升半，分三服，日二次夜一次。不愈，更作一剂。

【主治】妊娠动胎去血，腰腹痛。

31556 芎归枣仁汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】当归二钱（酒洗） 川芎 防风各一钱 枣仁五分（去壳，炒，研）（一方有羌活七分）

【用法】水煎服。

【主治】产后无汗，筋脉拘挛，类痉证。

31557 芎归明目丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】川芎 当归 白芍 地黄 牛膝 甘草 杞子 天冬 甘菊

【主治】由亡血过多，及久痛伤血，或年老血少，必羞明酸痛，不能视物，隐涩泪出。

【加减】外障，加木贼；内障，加珍珠。

31558 芎归泻心汤

《胎产心法》卷下。为《万氏女科》卷三“芎当泻心汤”之异名。见该条。

31559 芎归泻肝汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归尾 川芎 青皮 枳壳 香附（童便浸） 红花 桃仁各二钱

【用法】水煎，人童便一钟、酒一钟服。

【主治】产后败血流入肝经，胁下胀痛，手不可按。

31560 芎归定喘汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】天冬 川芎 当归 熟地 黄耆 人参 陈皮 甘草 香附 防风 腹皮 五味子 桔梗 杏仁 桑皮 马兜铃

【主治】新产去血过多，荣血暴竭，卫气无主，独聚喘促，此为孤阳绝阴，脉伏而厥，面黑。

【方论选录】产后七日内发喘，为败血冲肺；七日后发喘，因新产去血过多。败血冲肺发喘与血虚阳无所附发喘，虽有虚实之分，其为产后一也。产后血虚，败血乘虚上行，入肺致喘，当祛瘀为主，而兼补生新血。若产后血虚，孤阳无主，而停肺发喘，以益气为主，而兼止肺喘。是方归、芎、地黄，补血药也；参、耆、甘草，补气药也；天冬、五味，润肺敛肺药也；杏仁、桑皮、兜铃，清肺气、定喘药也；陈皮、香附，行滞气消喘药也；桔梗为使。而防风祛风，反泄卫气；腹皮祛胀，能利大便，恐子此症不宜用。

产后去血太多，营气竭而阳气独盛，血

下多则阴竭，而阳独盛则为孤阳，是以气逆于胸而令肺喘也。治宜补气以生血，而此孤阳绝阴，则又宜补阴以辅阳，阴阳和则肺气平，气平而不逆，则喘急自消矣。余每遇此，用补血之药十之七，补气之药十之三，盖气不可大补，而可敛之，使归气海，纳气归元即定喘之秘诀，新血渐生则阳不致独盛矣。

31561 芎归保元汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】人参 甘草（炙） 黄耆（蜜炙） 当归（酒洗） 川芎

【用法】龙眼肉为引，水煎服。

【主治】痘疹气血虚弱，当灌浆时，顶虽圆满，但根下全无红晕者。

31562 芎归独活汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】川芎 丹皮 续断 木瓜 丹参 秦艽 独活各八分 当归 香附（童便制） 牛膝各一钱 陈皮六分 甘草三分 赤芍八分 茯苓六分

【用法】水二钟，煎七分，温服。

【主治】产后败血流注经络，腿疼膝痛，寒热往来，以成产后杂症。

31563 芎归首乌饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】川芎三钱 当归一两 鲜首乌五钱（打碎） 青皮一钱五分 草薢仁一钱（研） 柴胡六分 炒枳壳一钱五分 甘草八分

【用法】酒一钟，河、井水煎。一服症轻，二服寒热除，三服全愈。

【主治】孕妇疟疾，寒热不止。

【加减】如胎火热重，加酒炒黄芩一钱五分，青蒿三钱；如寒多，加煨姜三钱、大枣三个；如恶心呕吐，加乌梅二个，灶心土三钱；如腰痛，加白术三钱，制杜仲三钱；如胎气下坠，加炙黄耆五钱；如子气上逆，加砂仁三钱，葡萄干二钱；如腹作泻，加鹿角霜三钱，痛加煨广木香一钱五分。

31564 芎归养荣汤

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄 黄柏 知母 人参 枸杞子 麦门冬 甘草

【用法】水煎服。

【主治】血厥。吐、衄不知人而厥者。

31565 芎归养荣汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】当归(酒洗) 川芎 白芍药(煨)各一钱半 熟地黄 黄柏(酒炒) 知母(酒炒)各一钱 枸杞子 麦门冬(去心)各八分 甘草五分

【用法】水二钟，煎八分，入竹沥半盏，姜汁二三匙，食前服。

【主治】血虚阴厥，脉伏虚细，四肢厥冷。

31566 芎归养荣汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】川芎 白芍药 熟地黄 当归 蔓荆子各一钱 细辛七分 人参一钱五分

【用法】上咬咀。水煎熟，食远温服。

【主治】血虚头疼，兼治血虚头风。

31567 芎归养荣汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】当归身二钱 人参 黄耆 白术 川芎 白芍 熟地各一钱 五味子 麦门冬 远志 甘草 茯苓各五分 牡丹皮 砂仁各三分

【用法】水二钟，加生姜三片、大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】瘰癧，流注，及一切不足之症，不作脓，或不溃，或已溃不敛，或身体发热恶寒，肌肉消瘦，饮食少思，睡卧不宁，盗汗自汗，惊悸恍惚。

31568 芎归桂朴汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】当归五钱 川芎三钱 肉桂一钱半 厚朴一钱半 枳壳二钱 红花一钱 葵子二钱 生脂麻三钱

【主治】妇人临产，由气血之虚，或初产畏惧，或脱衣受风，或冬月感寒，忽然寒战，即

时发热。

【方论选录】临产寒战发热，纵有风寒，非坐草时可一旦去也。故只宜肉桂以温经散寒，厚朴温中降气，而主以佛手散，辅以冬葵子、红花、枳壳、脂麻以行血滑胎。

31569 芎归桂朴汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】川芎八分 当归二钱 桂枝八分 厚朴一钱 枳实一钱 广皮一钱 半夏一钱五分 茯苓三钱 天麻六分 菊花二钱 生姜三片

【主治】留饮。心下痞满，作哕头眩。

31570 芎归胶艾汤

【方源】《金匱》卷下。

【异名】胶艾汤(《金匱》卷下)、当归散(《普济方》卷三四二)、胶艾四物汤(《医学入门》卷八)、阿胶蕪艾汤(《明医指掌》卷九)、艾叶地黄汤(《产孕集》卷上)。

【组成】芎劳 阿胶 甘草各二两 艾叶 当归各三两 芍药四两 干地黄四两

【用法】以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，纳胶令消尽，温服一升，一日三次。不愈更作。

【功用】①《普济方》：保血安胎。②《中医方剂学》：补血调经，安胎止痛。

【主治】妇人冲任虚损，崩中漏下，月水过多，淋漓不止，或半产后下血不绝，或妊娠下血，腹中疼痛者。

①《金匱》：妇人漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻。②《千金》：妊娠二三月至七八月，其人顿仆失踞，胎动不安，伤损，腰痛欲死，若有所见，及胎奔上抢心，短气。③《局方》：劳伤血气，冲任虚损，月水过多，淋漓漏下，连日不断，脐腹疼痛；及妊娠将摄失宜，胎动不安，腹痛下堕；或劳伤胞络，胞阻漏血，腰痛闷乱；或因损动，胎上抢心，奔动短气；及因产乳，冲任气虚，不能约制，经血淋漓不断，延引日月，渐成羸瘦。

【方论选录】①《金匱要略心典》：妇人经水淋漓，及胎产前后下血不止者，皆冲任脉虚，而阴气不能守也。是惟胶艾汤为能补而固之。中有芎、归，能于血中行气；艾叶利阴气，止痛安胎，故亦治妊娠胞阻。胞阻者，胞脉阻滞，血少而气不行也。②《医方集解》：此足太阴、厥阴药，四物以养其血，阿胶以益其阴。艾叶以补其阳，和以甘草，行以酒势，使血能循经养胎，则无漏下之患矣。

【临证举例】胎漏(《中医医案医话集锦》)：杨某某，女，31岁，工人，1976年8月5日初诊。自述妊娠四月，无故下血，量不多，腹不痛，脉滑无力，此因劳累伤脾，致使肝不藏血，脾不统血而胎漏。治宜清热安胎，养血止血，方用加味阿胶四物汤。处方：阿胶9克(烔化)，艾叶9克，生地15克，杭白芍9克，当归9克，川芎3克，续断9克，焦杜仲9克，人参9克，黄芩6克，甘草6克。8月9日二诊：服药三剂后下血减少，仍以原方续服五剂，血止病愈。

【备考】方中干地黄用量原缺，据《千金》补。

31571 芎归胶艾汤

【方源】《胎产救急方》引孙真人方(见《医方类聚》卷二二四)。

【组成】川芎 川当归 阿胶各三两(炒) 粉草一两

【用法】上锉。每服五钱，加陈艾十叶，水煎服。

【主治】胎动下血。

31572 芎归益母丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】益母草四两 当归一两 川芎五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。妊娠七八个月用，每服五六十丸。胎前加砂仁一钱，空心温酒或滚白汤送下；产后不用砂仁，用童便送下。

【主治】胎动不安。

【宜忌】忌铁器。

31573 芎归调血饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【异名】芎归补血汤(《回春》卷六)、芎归补血饮(《履霜集》卷二)。

【组成】当归 川芎 白术(去芦) 白茯苓(去皮) 熟地黄 陈皮 乌药 香附(童便炒) 干姜(炒黑) 益母草 牡丹皮 甘草

【用法】上锉一剂，加生姜一片，大枣一个，水煎，温服。凡产后，即用童便和热酒，随意饮之，百病不生。

【主治】①《古今医鉴》：产后一切诸病，气血虚损，脾胃怯弱，或恶露不行，或去血过多，或饮食失节，或怒气相冲，以致发热恶寒，自汗口干，心烦喘急，心腹疼痛，胁肋胀满，头晕眼花，耳鸣，口噤不语，昏愤等证。②《履霜集》：小产。

【加减】如恶露不行，倍益母草、丹皮，加童便、黄酒同服；如去血过多，倍芎、归、干姜；如饮食停滞，胸膈饱闷，加枳实、厚朴、山楂、砂仁；如因气恼，倍香附、乌药；如口噤昏愤不语，加荆芥；如两胁痛，加青皮、肉桂；如小腹阵痛，加玄胡索、桃仁、红花、苏木，甚者加三棱、莪术；如有汗，加黄耆；如口干苦，加麦门冬。

31574 芎归理中汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】理中汤(倍加人参，干姜炒黑)加川芎 当归

【主治】产后疲劳甚者，及产前患下利，而产后有热者。

31575 芎归理中汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】芎藭一钱五分 当归 党参 白术各三钱 炮姜 枳实各一钱 桃仁一钱五分

【主治】产后血瘀气结，挟寒而致心腹疼痛。

31576 芎归寄生汤

《医学正印》卷下。为《万氏家抄方》卷五“芎归补中汤”之异名。见该条。

31577 芎归寄生散

【方源】《胎产救急方》引《生生新书》(见《医方类聚》卷二二四)。

【组成】川芎 川当归各三两 桑寄生一两

【用法】上锉。每服五钱，水煎服。

【主治】漏胎腹痛。

31578 芎归葱白汤

《胎产救急方》引《产宝》(见《医方类聚》卷二二四)。即方出《经效产宝》卷上、名见《圣济总录》卷一五四“芎蒭汤”。见该条。

31579 芎归疏肝汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】川芎二钱 当归四钱 制香附二钱 炒青皮一钱 王不留行三钱 延胡三钱 蒲公英二钱 鹿角霜二钱 麦芽三钱(炒) 柴胡二钱 漏芦一钱 夏枯草二钱 路路通四个 枇杷叶五片(去毛)

【用法】水煎，入酒少许冲服。

【主治】乳痈，乳岩。

【宜忌】凡胎前不宜。

31580 芎归愈痛汤

【方源】《女科指南》。

【组成】人参 茯苓 半夏 柴胡 陈皮 枳实 当归 川芎 木香 砂仁 香附 甘草

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】妇人腹痛有块。

31581 芎归鳖甲汤

《证治汇补》卷三。为《直指》卷十二“芎归鳖甲散”之异名。见该条。

31582 芎归鳖甲饮

《准绳·类方》卷一。为《直指》卷十二“芎归鳖甲散”之异名。见该条。

31583 芎归鳖甲散

【方源】《直指》卷十二。

【异名】芎归鳖甲饮(《准绳·类方》卷一)、芎归鳖甲汤(《证治汇补》卷三)。

【组成】当归 川芎 芍药 青皮 陈皮 茯苓 半夏(制)各一分 鳖甲(醋炙黄)半两

【用法】上为散。每服三钱，加生姜五片，大枣二个，小乌梅一个，水煎服。

【主治】①《直指》：劳疟寒热。②《得效》：劳疟寒热，表里俱虚，真元未复，疾虽暂止，小劳复发。

【加减】热多，加柴胡；寒多，加草果。

【方论选录】《医略六书》：营阴亏损，痰伏于中，故疟疾愈而再作，得之疲劳伤肝，胃气不化焉。鳖甲滋肝阴以散结，当归养肝血以益营，川芎散血中之邪，白芍敛营中之阴，茯苓渗湿和脾，青皮利气和胃，半夏燥湿醒脾，乌梅敛津以收肝，生姜散痰涎以截疟也。使痰化气调则肝血充足而经气振，疟邪无不自解矣。此养营化气之剂，为疲劳疟复之专方。

31584 芎归鳖甲散

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】人参五分 青皮 黄耆(蜜水炙) 鳖甲(醋炙) 当归 茯苓 白术 厚朴 香附 抚芎各八分 砂仁 山楂(去子) 枳实(麸炒)各五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣二个，乌梅一个，水煎，食前温服。如制丸药，加阿魏醋煮化，水、醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米汤送下。

【主治】劳疟，寒中有热，热中有寒，或半月十日，小劳复来，经久不愈。

31585 芎当泻心汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【异名】芎归泻心汤(《胎产心法》卷下)。

【组成】归尾 川芎 延胡索 蒲黄 牡丹皮各一钱 桂心七分

【用法】水煎，另研五灵脂末一钱，食后调服。

【主治】产后败血停积，上干于心，心下胀闷，烦躁昏乱，狂言妄语，如见鬼神者。

31586 芎芷正气散

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 白术 厚朴 陈皮 半夏 茯苓 白芷 桔梗 大腹皮 苏叶 甘草 葱白 川芎

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】内伤饮食，外感风寒，头疼无汗。

【加减】如发汗，去白术，加苍术；如渴，去半夏；呕吐，去甘草。

31587 芎芷石膏汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】川芎 白芷 石膏 菊花 羌活 藁本

【主治】头痛眩晕，头风盛时发作，日久不愈。

【加减】苦痛者，加细辛；风盛目昏，加防风、荆芥穗；热盛，加梔子、连翘、黄芩、薄荷、甘草；大便秘，小便赤，加消、黄 攻之，自愈也。

31588 芎芷香苏饮

《准绳·类方》卷一。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“芎苏散”之异名。见该条。

31589 芎芷香苏饮

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】川芎 白芷 香附 紫苏 橘皮 甘草 葱白

【用法】加生姜一片，水煎服。

【功用】发散解表。

【主治】风寒；兼治风热，甚而头痛如破。

31590 芎芷香苏散

【方源】《方剂辞典》引《济生》。

【组成】川芎 白芷 香附子 陈皮 羌活各一钱 薄荷 紫苏各八分 甘草五分

【用法】加生姜、葱白，水煎服。

【主治】外感伤风，鼻塞声重，左脉浮缓。

【加减】加荆芥、防风，名荆防芎苏散。

31591 芎芷香苏散

【方源】《医方类聚》卷五十六引《管见良方》。

【组成】香附子（炒去毛） 紫苏各三两 陈皮（去白） 川芎 白芷各二两 甘草（炙）一两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】四时瘟疫、伤寒，发热，头痛项强，百节酸疼；又疗伤风咳嗽，声重，鼻流清涕，腰背拘急。

31592 芎芷香苏散

《准绳·伤寒》卷二引《澹寮》。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“芎苏散”之异名。见该条。

31593 芎芷香苏散

【方源】《得效》卷九。

【组成】即原书卷一香苏散加川芎 白芷

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣二个，水煎服。

【主治】伤风，鼻中清涕，自汗头痛，或发热。

31594 芎芷香苏散

【方源】《医便》卷二。

【组成】川芎 白芷 苏叶（紫者，去梗） 香附各一钱 陈皮 防风 羌活各八分 甘草五分

【用法】加生姜三片，葱白三寸，水一钟半，煎八分，食后热服。

【主治】春月伤风，鼻塞声重，或流清涕，咳嗽痰壅气逆，人迎脉浮缓。

【加减】有痰，加半夏一钱；咳嗽，加杏仁、桑白皮各八分，五味子十粒。

31595 芎芷香苏散

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】川芎 白芷 香附 苏叶 陈皮 甘草 枳壳

【主治】感冒，发热恶寒。

31596 芎芷香苏散

【方源】《外科十法》。

【异名】芎芷香苏灵散（《医钞类编》卷二十一）。

【组成】川芎 白芷 紫苏叶 赤芍 陈皮 甘草各一钱 荆芥 香附 秦艽各一钱五分 连须葱白二寸

【用法】水煎服。如毒不消，随服银花、甘草等药。

【主治】发背。毒多挟风寒而发者。

【加减】若兼伤食，加山楂、麦芽、葡子；若内热极盛，加连翘、牛蒡子。

31597 芎芷透毒汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】川芎 佩兰 藿香 紫草 银花 灯芯 白芷 菖蒲 木香 红花 绿豆 生草

【用法】水煎服。秽触者必痒，用苍术、大黄、茵陈、红枣烧烟辟秽，继以玉枢丹合本方。

【主治】痘证热逾三日，应现而不现，因秽触所致者。

31598 芎芷藿苏散

【方源】《医便》卷二。

【组成】川芎一钱 白芷八分 细辛五分（去叶） 干葛一钱 甘草三分（生） 紫苏叶一钱 藿香八分（去土） 半夏一钱（姜制） 陈皮八分 苍术（麸炒）一钱 枳壳（去瓢）七分 桔梗（去芦）七分 淡豆豉八分（不用亦可）

【用法】加生姜三片，葱白一根，水一钟半，煎八分，食后热服。

【主治】春初人事劳扰，饥饱失节，或解衣沐浴，触冒风寒，致成内伤外感，头疼发热，呕吐眩闷，膈胀痛，恶食，或鼻流清涕，咳嗽生痰，鼻塞声重。

【宜忌】有汗不可用葱白。忌腥荤三五日。

【加减】头痛不止，加藁本八分；呕吐不止，加干姜（炒）、砂仁（炒）各七分；发热，或潮热不退，加柴胡、黄芩各一钱；胸膈胀闷，加山楂、枳实各一钱；发而汗不出、热不退，

加麻黄一钱半、葱白二根；咳嗽生痰，加杏仁、前胡、金沸花（去梗）各八分，南五味子五分。

31599 芎苏五苓饮

【方源】《穷乡便方》。

【组成】抚芎 防风 泽泻各八分 香附米 木通 苏叶 猪苓 赤茯苓各一钱 羌活七分 甘草二分 生姜三片

【用法】水煎，不拘时候服。

【主治】湿温。春末夏初风湿时感湿病，头痛潮热，身体沉困，或汗或泄。

31600 芎苏五苓饮

【方源】《穷乡便方》。

【组成】抚芎四分 苏叶五分 陈皮 羌活 木通 香附米 猪苓 泽泻各六分 甘草三分 赤茯苓八分 生姜三片

【用法】水煎，食后服。

【主治】手阳明经平素有湿积，再感秋时燥气，而发痢病，初有潮热，头痛，兼有时气。

31601 芎苏泻白散

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】川芎 紫苏 防风 桑白皮 地骨皮 荆芥 甘草

【主治】风伤肺气，咳嗽，寒热，头痛。

【加减】若症兼太阳，加羌活；兼阳明，加干葛、白芷；兼少阳，加柴胡。

31602 芎苏香葛散

【方源】《医便》卷二。

【组成】紫苏叶（去梗）一钱 香附（炒）白茯苓（去皮） 干葛 藿香 半夏（制） 前胡（去芦） 陈皮 川芎各八分 白芷 防风（去芦）各七分 甘草三分 苍术一钱五分 羌活一钱

【用法】加生姜三片，葱白连须二根，水二钟，煎一钟，热服。厚被覆汗为度，无汗再服。

【主治】春月感冒伤寒，及感触山岚瘴毒疠气，头疼身痛，恶寒发热，人迎脉浮大。

【宜忌】忌鸡、鱼、猪、羊肉。

31603 芎苏柴陈汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】川芎 紫苏 柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮 白茯苓

【主治】疟疾初起，头疼身痛，热多汗出者。

31604 芎辛导痰汤

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】川芎 细辛 南星 陈皮（去白） 茯苓各一钱半 半夏二钱 枳实（麸炒） 甘草各一钱

【用法】上作一服。水二钟，加生姜七片，煎至一钟，食后服。

【主治】①《奇效良方》：痰厥头痛。②《杂病源流犀烛》：由风痰而致眉棱骨痛，连于目不可开，昼静夜剧者。

31605 芎辛益气汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】黄耆一钱二分 人参一钱 甘草（炙） 升麻 川芎各五分 白术（去油） 橘皮 当归各八分 柴胡 蔓荆子各四分 细辛二分

【用法】上㕮咀，用水煎，食远热服。

【主治】劳役或房欲过伤，气血俱虚，倦怠头疼。

31606 芎辛菊花散

【方源】《保命歌括》卷十五。

【组成】川芎 羌活 白芷 防风 荆芥 薄荷各一两 细辛 甘草 菊花各五钱

【用法】上为细末。每服二钱，清茶调，食远服。

【主治】风热头痛，发作无时。

31607 芎蒭三棱汤

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】芎蒭 白芷各一两 荆三棱（炮，锉） 桑根白皮（锉） 白术各一两 生干地黄（锉） 牡丹皮（去心） 桂（去粗皮） 甘草 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 芍药各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前米饮送下，或温酒

调下，一日三次。渐加至三十丸，即愈。

【主治】妇人月水来，腰腹疼痛不可忍，兼治呕逆不食。

【备考】本方方名，据剂型当作“芎蒭三棱丸”。

31608 芎蒭天麻丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】芎蒭二两 天麻半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两半作二十丸。每服一丸，食后细嚼，茶、酒任下。

【功用】清利头目，消风化痰，宽胃利膈。

【主治】心忪烦闷，旋运欲倒，颈项紧急，肩背拘倦，神昏多睡，肢体烦痛，皮肤搔痒，偏正头痛，鼻塞声重，面目浮肿。

31609 芎蒭补中汤

【方源】《济生》引《校正时贤胎前十八论治》（见《医方类聚》卷二二四）。

【异名】芎归补中汤（《回春》卷六）、芎归补血汤（《叶氏女科》）。

【组成】干姜（炮） 阿胶（锉，蛤粉炒） 芎蒭 五味子各一两 黄耆（去芦，蜜水炙） 当归（去芦，酒浸） 白术 赤芍药各一两 木香（不见火） 人参 杜仲（去皮，锉，炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盂半，煎至一盂，去滓，不拘时候通口服。

【功用】产后用之，养新血，去瘀血，补虚扶危。

【主治】①《奇效良方》：怀孕血气虚弱，不能卫养，以致数月而堕，名曰半产。②《叶氏女科》：劳役感寒，以致气虚下坠者。

31610 芎蒭补血汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】川芎 白术 阿胶 白芍 杜仲 人参 黄耆 木香 五味各一钱 甘草八分 生姜一片 大枣二个

【主治】妊娠月未足，由气血虚弱，脏腑皆虚，加以病患相感，情欲相扰，以致精血攻冲，侵损荣卫而胎无所养，而半产胎未堕，血

行腰痛者。

31611 芎蒭附子汤

【方源】《普济方》卷四十六引《十便良方》。

【组成】附子 芎蒭各半两 生姜一两

【用法】上切细，如麻子大，拌匀。每服五钱，水二大盏，慢火同煎至一盏，去滓，食后温服；间日三四次，不得并服；呕逆，食前服。

【主治】风寒客于头中，清涕，项筋拘急坚硬；又治胸中寒痰，呕吐清水。

31612 芎蒭前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】芎蒭一两 前胡（去芦头）三分 黄芩（去黑心）半两 芍药一两 蒲黄（微炒）一两半 桃仁（汤浸，去皮尖，别研）三分 当归（锉，炒）三分 桂（去粗皮）三分 甘草（炙，锉）一两 大黄（锉，炒）半两 生干地黄（焙）二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣一个（擘），煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后心腹痛，血气不利。

31613 芎蒭温中汤

《奇效良方》卷六十三。为《千金》卷四“芎蒭汤”之异名。见该条。

31614 芎蒭上清丸

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】生大黄 生栀子 川芎 防风 桔梗 白菊花 黄芩各六两 荆芥三两 滑石四两 生甘草九两 薄荷三两 黄柏九两

【用法】上为细末，水为丸，如绿豆大。每服二钱，白开水送下。

【主治】上焦火盛，偏正头疼，鼻塞耳鸣，头面发热。

【宜忌】寒症忌用。

31615 芎蒭茶调散

【方源】《慈禧光绪医方选议》引《局方》。

【组成】荆芥二钱 防风二钱 川芎二钱 甘菊三钱 细辛五分 白芷二钱 茅术二钱

（炒） 薄荷八分 生草八分

【用法】上为细末。每用一二钱，清茶调服。

【功用】祛风止痛。

【主治】鼻塞头痛，头风诸症。

31616 芎蒭茶调散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】薄荷四十两 羌活十两 芥穗二十两 白芷十两 防风二十两 细辛六两 菊花二十两 甘草六两 川芎十六两

【用法】上为细末，过罗。每服二钱，用茶水调下。

【功用】散风清热。

【主治】感冒风寒，风热上攻，头昏目眩，偏正头痛，鼻塞声重。

31617 芎蒭白术散

《鸡峰》卷十六。为《金匱》卷下“白术散”之异名。见该条。

31618 芎归六君子汤

【方源】《医方集解》。

【组成】当归 芎蒭 人参 白术 茯苓 甘草 橘红 半夏

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妇人体肥气虚，痰滞经络，经水后期，其来涩少。

【方论选录】此足太阴、厥阴药也。二陈治其痰滞；参、术补其气虚，气行则痰行；芎、归活其经血。

31619 芎归四君子汤

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】四君子汤加川芎 当归

【主治】食癥，脾气虚，血不行者。

31620 芎归加古拜汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归三钱 川芎 秦艽各一钱 炮姜七分 荆芥穗二钱

【用法】上为末。生姜汤调下。

【主治】妇人产后，外感身痛，兼鼻塞恶寒者。

31621 芎归加芍药汤

《医学纲目》卷三十五。为《三因》卷十

七“芎蒭当归加芍药汤”之异名。见该条。

31622 芎归加黑豆汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】当归五钱 川芎三钱 黑小豆一合（炒焦，乘热淬水中，煎）

【用法】水七分，酒三分，同煎至七分，加童便冲服。

【主治】横生倒产，死胎不下，血上冲心，并治产后血瘀腹痛，发热头痛。

【方论选录】临产催生，芎归汤可矣。其有伤胎伤血，及胎死不下，则用此方，产后亦可通用。以芎、归滋血行血，而黑豆补腰肾，童便滋阴去瘀。

31623 芎芷香苏灵散

《医钞类编》卷二十一。为《外科十法》“芎芷香苏散”之异名。见该条。

31624 芎蒭加芍药汤

《中国医学大辞典》。为《三因》卷十七“芎蒭当归加芍药汤”之异名。见该条。

31625 芎术姜梔二陈汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】川芎一钱 干姜（炮）一钱 苍术（米泔制）一钱 梔子（炒）一钱 陈皮（去白）二钱二分 半夏（姜汁炒）一钱 茯苓（去皮）一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，正痛时温服。痛止，待半日方可饮食。

【主治】素有痰火，胃脘急痛不可忍者，食不能消。

31626 芎蒭汤加芍药方

《妇人良方》卷二十二。为《三因》卷十七“芎蒭当归加芍药汤”之异名。见该条。

31627 芎蒭当归加芍药汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】芎蒭汤加芍药方（《妇人良方》卷二十二）、芎归加芍药汤（《医学纲目》卷三十五）、芎归汤（《万氏家抄方》卷一）、芎蒭汤（《校注妇人良方》卷二十二）、芎蒭加芍药汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】川芎 当归 芍药各等分

【主治】①《三因》：产后忧惊恚怒，脏气不平，或服断血药早，致恶血不消，郁满作坚，而成崩中。②《医学纲目》：产后血崩眩暈。

【备考】《妇人良方》本方用法：上咬咀，每服四钱，水一盏半，煮取七分，出滓热服，不拘时候。

吉

31628 吉利散

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】当归 赤芍 香附 羌活 薄荷各一两 枳壳 广皮 紫苏 五灵脂 人中黄（煨）各一两五钱 延胡索二两五钱 川芎 乌药 白芷各八钱 防风二两 甘草三钱

【用法】上为极细末。每服三钱，空心以红糖、油、陈酒调下。

【主治】新旧诸般损伤。

31629 吉利散

【方源】《伤科大成》。

【组成】当归 川芎 枳壳 陈皮 香附 厚朴 木香 苏木末 刘寄奴 落得打 三七 乳香 没药 篇蓄各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【功用】行气活血止痛。

【主治】跌打损伤，红肿不消，阵阵作痛。

31630 吉祥丸

【方源】《千金》卷二。

【组成】天麻一两 五味子二两 覆盆子一升 桃花二两 柳絮一两 白术二两 芎蒭二两 牡丹一两 桃仁一百枚 菟丝子一升 茯苓一两 楮实子一升 干地黄一两 桂心一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如豆大。每服五丸，空心以苦酒送下，日中一次，晚一次。

【功用】《饲鹤亭集方》：补肝养血，助脾胃正气。

【主治】妇人寒瘀凝结子宫，月经不调，积

年不孕。

①《千金》：女人积年不孕。②《女科切要》：妇人气食生冷，其腹多痛，经准不孕。③《饲鹤亭集方》：妇人血积胞门，或寒凝子宫，致气脉不荣，积年不孕。④《中国医学大辞典》：任脉不荣，冲脉少藏，经事不调。

【方论选录】《千金方衍义》：桃花令人好颜色，柳絮能除面热黑，斯亦围人之所需。其地黄、芎蒭、楮实养血壮筋，菟丝、覆盆、五味补精益气，牡丹、桂心、桃仁和营暖宫，茯苓、白术、天麻清痰逐湿，饮用苦酒，取酸收以归子宫也。

31631 吉祥丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】大熟地八两 鹿角霜 白芍药 党参 当归 杜仲 茯苓 菟丝子各四两 甘草(炙) 官桂 川芎 川椒各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，淡盐汤送下。

【主治】妇人子宫寒冷，瘀积胞门，任脉不荣，冲脉少藏，经事不调，积年不孕。

31632 吉祥油

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄黄三钱 明矾一两五钱 花椒二钱 松香一两 猪板油半斤 江青布三尺

【用法】上药与油，将布卷包，用火夹夹住，麻骨火烧，下以碗承油。搽之。

【主治】湿毒糜烂，黄水常流，常结痂而淫痒。

31633 吉州醒脾散

《袖珍》卷四。即《医方大成》卷十引汤氏方“醒脾散”。见该条。

31634 吉州醒脾散

《奇效良方》卷六十四。为《活幼口议》卷十四“醒脾散”之异名。见该条。

老

31635 老龙丸

【方源】《普济方》卷二一九引崔磨方。

【异名】苍龙丸(原书同卷)、老奴丸

(《奇效良方》卷二十一)。

【组成】母丁香 紫霄花 肉苁蓉(酒浸) 菟丝子(酒浸) 蛇床子 巴戟 仙灵脾 白茯苓(去皮) 远志(去心) 八角茴香各二两 灯草二钱 毕澄茄 胡桃肉 车前子 革薢 马蔺花(酒浸) 牡蛎(火烧炒六次) 韭子种 木通(酒浸) 各一两 干漆(炒去烟)三两 山茱萸 破故纸(酒浸) 全蝎 桑螵蛸(酒浸) 龙骨各一两半 熟地黄五两 当归五钱 沉香五钱 木香五钱 大蜘蛛七个(一方无桑螵蛸、当归、乳香)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】①《普济方》：添精补肾虚，去冷除风湿，扶经更起阳。②《饲鹤亭集方》：兴元阳，种子嗣。

【主治】①《普济方》：年高气衰虚耗，风湿脚疼痛。②《饲鹤亭集方》：下元虚损，精虚无子，及五劳七伤，腰膝痠痛，小肠疝气。

【临证举例】无子 《普济方》：褚氏无子，得此药修合未服，夫主有老奴七十之上，腰脚疼痛，曲背而行，褚氏以此药服之，其老奴语褚氏曰，自服此药，深有灵验，诸疾悉痊，房事如少壮之人。子是与褚氏通，因后有孕。一日，褚氏服药，其家母视之，切究其由，得其实，因打死此老奴，并折其腿，骨髓皆满，皆此药之效也。

31636 老奴丸

《奇效良方》卷二十一。为《普济方》卷二一九“老龙丸”之异名。见该条。

31637 老军散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】大黄(半生半煨) 甘草各等分

【用法】上为细末。每用一匙，空心温酒调服一二服。疏利为度。

【主治】发背痈疽，疔疮恶毒，一切无名肿毒，焮热初起未溃者。

31638 老君丹

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】老君须四分 紫背天葵三钱 乳香三钱 没药 红曲 防风 红花各三钱 梔子五分 当归八分 川芎四分 草果仁一钱 血竭五分 孩儿茶五分 土茯苓五分 金银花五分 白芥子五分

【用法】上为粗末。先用独蒜一个，顺揉烂，入好酒一碗，滤去滓，入药于内，重汤煮一时，食后、临卧服三剂。

【主治】瘰癧，并痰核结硬。

31639 老君丹

【方源】《疡医大全》卷三十四引张元履方。

【组成】白粉霜一两 蜈蚣（去足）全蝎（酒洗） 直僵蚕（炒去丝） 穿山甲（土炒） 朱砂（水飞） 雄黄（水飞） 广三七 蟾酥各五钱 乳香（去油） 没药（去油） 防风 荆芥各三钱 牛黄三分（或加青蛇末、苍龙末各五钱更妙）

【用法】上为细末，老米糊为丸，如绿豆大，阴干。每服一分或二三分，黄酒送下。

【主治】杨梅结毒，一切无名肿毒，痈疽，疔毒，对口，痰核瘰癧，湿痰流注。

31640 老鸡丸

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】胡黄连 银柴胡 人参 黄耆 熟地 川芎 远志 肉苁蓉 秦艽 甘草 当归各一两 山药 白术 五味各五钱 天冬 麦冬各一两二钱

【用法】上为末，用老鸡一只，去油蒸烂，同药捣千余下，细极无骨渣，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心米饮送下。

【主治】妇人下元气虚，五心烦热，食少，子宫冷，赤白带下，经水不调。

31641 老疟丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】常山 草果各二两

【用法】上药用酒、醋各一碗，入砂锅内浸一宿，再入青皮、陈皮、半夏、乌梅、三棱、莪术、砂仁、槟榔各一两，同浸半日，煮干，

晒，为末，半酒半醋打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】久疟不愈，腹痛有母。凡积聚及行瘴湿地方尤宜。

31642 老疟丹

【方源】《医方类聚》卷一二三引《澹寮》。

【组成】桃仁（去皮尖，略炒） 鳖甲（醋炙） 常山（酒煮） 豆豉（和梅蒸，或发而研）各等分

【用法】上蒸烂乌梅肉研膏为丸。每服三十丸，白熟汤送下，不拘时候，日十数服。

【主治】老疟。

31643 老疟丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】川芎 桃仁 红花 当归 苍术 白术 白芷 黄柏 甘草

【用法】上水煎，露一宿，次早服之。

【主治】老疟风暑，入阴在脏，碍血气。

31644 老疟饮

【方源】《三因》卷六。

【异名】痰疟饮（《古今医鉴》卷五）。

【组成】苍术（泔浸） 草果（去皮） 桔梗 青皮 陈皮 良姜各半两 白芷 茯苓 半夏（汤洗去滑） 枳壳（麸炒，去瓤） 甘草（炙） 桂心 干姜（炮）各三钱 紫苏叶 川芎各二钱

【用法】上锉散。每服四大钱，水二盏，盐少许，煎七分，去滓，空心服，日三夜一。仍吞下红丸子。

【主治】久疟，结成癥瘕癖在腹胁，诸药不去者。

31645 老鸦丹

《杨氏家藏方》卷二十。为原书同卷“枸杞子丸”之异名。见该条。

31646 老鸩丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】生姜十两（洗净，连皮薄切作姜钱） 净茴香十两（同生姜拌匀，共淹一宿，次日炒干，以生姜干脆为度） 青盐十两（捶碎，以银石铄炒尽硫黄气，摊冷）

【用法】上为末，好酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或米饮送下，一日二次。三两日内便觉心头快，进美饮食。

【功用】补养脾胃。

31647 老鸭果

【方源】《仙拈集》卷二引王永光方。

【组成】老白鸭一只

【用法】去毛，水洗净，用竹刀剖开，去肠肝肺，不见水，仍入内，再入龙眼肉四十九个，桃仁十个，莲肉一两五钱，贝母五钱，线缝紧密。用新砂锅一个，陈酒一斤，童便二斤，甜水一斤，煮极烂熟，先用肚内果子鸭汤，随用鸭肉，可下饭。至重者四五服痊愈。

【主治】癆病痰嗽。

31648 老鼠屎

《饲鹤亭集方》。为原书“万应锭”之异名。见该条。

31649 老痰丸

【方源】《医统》卷四十三引王节斋方。

【组成】天门冬(去心) 黄芩(酒炒) 海粉(另研) 橘红(去白) 各一两 连翘半两 桔梗 香附子(淡盐水浸，炒) 各半两 青黛(另研) 一钱 芒消(另研) 二钱 瓜蒌仁(另研) 一两

【用法】上为细末，炼蜜(入姜汁少许)为丸，如龙眼大。噙嚼一丸，细咽之，清汤送下；或丸如绿豆大，淡姜汤送下五六十九。

【功用】润燥开郁，降火消痰。

【主治】火邪炎上，凝滞于心肺之分，肺气不清，老痰郁痰结成粘块，凝滞喉间，吐咯难出。

【方论选录】此方天冬、黄芩泻肺火，海粉、芒消咸以软坚，瓜蒌润肺消痰，香附、连翘开郁降火，青黛去郁火，故不用辛燥之药。

31650 老蔻丸

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】老蔻四两 贡桂六两 丁香二两 当归 半夏 陈皮各三两 莱菔四两 木香

二两 油朴 青皮各四两 二丑六两 砂仁 二两 莪术 三棱各四两 甘草二两 枳壳 草果各三两 槟榔四两 乌药三两 川芎二两 神曲 山楂 白术 熟军各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱一分重，贮瓷坛内以免风干失效。每服一丸。服后缓泻，胸即畅快。每服三四丸即收特效。

【功用】温寒顺气，消食化湿，通导利便。

【主治】脾寒泄泻。脾经寒湿，水谷不化，腹疼泄泻，肠鸣腹冷；肝郁气滞，暴怒伤肝，肝气横逆，胸脘胀闷，噎气纳少；寒疝，寒气走窜，上冲胃脘，下牵睾丸，疼痛欲绝，胃寒呕吐，胃寒不运，食不消化，朝食暮吐。

【宜忌】忌食辛辣。

31651 老膜散

【方源】《医统》卷六十一引《局方》。

【组成】硃砂五分(上下瓦合定泥固，文火煨枯) 龙骨(煨) 三钱 巴豆(去油) 二厘(甘草水煮) 白丁香三分(飞)

【用法】上为极细末。点眼。

【主治】老膜经年不放光。

31652 老膜散

【方源】《异授眼科》。

【组成】珍珠二分 熊胆一分五厘 辰砂一分五厘 陀僧一分五厘 蕤仁一分五厘 白丁香一分五厘 葶芥粉二分 硃砂(升过) 一分

【用法】上为细末。点之。

【主治】翳膜极重者。

31653 老子乳丹

【方源】《圣惠》卷九十四。

【异名】太乙神丹。

【组成】蜜三升 新生儿乳三升

【用法】上合煎一两沸，以不津器盛之。每日空心服一中盏。

【功用】补益。

31654 老柏皮散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】老柏白皮二两(锉) 乌梅肉一两

(微炒) 细辛二两 地肤子二两

【用法】上为细散。每服二钱，食后以温水调下。

【主治】眼雀目，至暮无所见。

【备考】本方方名，《普济方》引作“白皮散”。

31655 老鹤草膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】老鹤草四百八十两

【用法】将老鹤草洗净泥土，水煎三次，每次过滤去滓，合并滤液，用文火煎熬，浓缩收膏，以不渗纸为度。每一两清膏，兑炼蜜二两，装瓶重二两。每服三至五钱，温开水冲下。

【功用】①《北京市中药成方选集》：舒筋活络，祛风除湿。②《中药制剂手册》：活血止痛。

【主治】风湿麻木，筋骨不舒，手足疼痛，皮内作痒。

31656 老年白带方

【方源】《妇科玉尺》卷五。

【组成】黄柏 五味 杜仲各四钱 萸肉五钱 补骨脂 牡蛎(煅)各三钱 醋香附八钱 砂仁 川椒 川芎 茯苓 车前子各二钱 醋炒艾叶一钱 醋化阿胶五钱 白芍六钱

【用法】鹿角胶为丸。盐汤送下。

【主治】年老人久带。

31657 老年延寿丹

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】茯神八两 枣仁(炒黑) 当归元肉 茯苓 丽参 麦冬 熟地 远志各四两 香附三两(酒制)

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，小米汤送下。

【主治】老人气血衰弱，失眠无力。

31658 老君长命丹

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】白茯苓 粉甘草各四两 川椒

干姜各二两 白面六斤(炒热)

【用法】上为细末，用真麻油二斤，炼花泛净，凉温，入前药面为丸。如不成，可加炼蜜为丸，如弹子大。初服一日三丸，三日九丸，后一日一丸，饮凉水三口。一日不饮不渴，如要食，吃核桃一个，即饥思食。

【功用】养生。

31659 老君神白散

【方源】《普济方》卷一三五引《余居士选奇方》。

【组成】白术 附子各二两 桔梗 细辛甘草各一两

【用法】上为细末。白汤点服。

【主治】伤寒阴证。

31660 老君神明散

《活人书》卷十七。为《肘后方》卷二“老君神明白散”之异名。见该条。

31661 老君益寿散

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】天门冬五两(去心，焙) 白术四两 防风一两(去芦头) 干姜一两半(炮裂，锉) 熟干地黄二两 细辛一分 桔梗一两(去芦头) 天雄半两(炮裂，去皮脐) 远志(去心) 肉苁蓉(酒浸，去皱皮) 泽泻各一两 石斛(去根，锉) 桂心 柏实 云母粉 石韦(去毛) 杜仲(去粗皮，锉) 牛膝(去苗) 白茯苓 菖蒲 五味子 蛇床子 甘菊花 山茱萸各半两 附子一两半(炮裂，去皮)

【用法】上为散。每服三钱，平旦酒下。冬月日三服，夏平旦一服，春秋平旦，日暮各一服。

【功用】驻颜益寿。

31662 老翁神杖散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】梓寄生一两(采归以利瓷片轻手刮去外黄皮，再刮去中间白肉内心不用，瓦上微火焙干，磨子磨之) 夜明砂一两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。

杀毒定疮，即以之用醋调敷，其头圆者敷其右，方者敷其左；丝瓜汁调尤佳。

【功用】杀毒定疮。

【主治】痈疽。

31663 老君神明白散

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】老君神明白术散（《圣惠》卷十六）、老君神明散（《活人书》卷十七）、神明白散（《圣济总录》卷二十二）、神明白术散（《普济方》卷一四八）。

【组成】术一两 附子三两 乌头四两 桔梗二两半 细辛一两

【用法】上为末。正旦服一钱匕。一家合药，则一里无病，此带行所遇，病气皆消。若他人有得病者，便温酒服之方寸匕亦得。病已四五日，以水三升煮散，服一升，覆取汗出。

【功用】辟瘟疫。

【主治】瘴气疫疠，温毒。

31664 老君神明白术散

《圣惠》卷十六。为《肘后方》卷二“老君神明白散”之异名。见该条。

西

31665 西瓜膏

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】西瓜二个（不得低于三十斤） 陈皮二两 生石膏 制半夏 炒苏子 百合各一两 杏仁（去皮，炒） 生阿胶各五钱 甘草一两 生五味子三钱

【用法】熬汁，去滓过滤，将汁炼至滴毛头纸上背面不印为标准，收清膏一斤，兑蜜三斤，收膏装瓶。每服一两，开水冲下。

【功用】清热化痰止咳，生津止渴。

【主治】咳嗽多痰，痰中带血，口燥咽干，胃热作呕。

【宜忌】风寒外感咳嗽忌服。

31666 西瓜霜

【方源】《疡医大全》卷十七。

【异名】咽喉独圣散（《疡科纲要》卷下）。

【组成】西瓜一个

【用法】用大黄泥钵一个，将西瓜一个照钵大小松松装入钵内，将瓜切盖，以皮消装满瓜内，仍以瓜盖盖，竹签扞定，再以一样大的黄泥钵一个合上，外用皮纸条和泥将缝封固，放阴处过数日，钵外即吐白霜，以鹅毛扫下收好，仍将钵存阴处，再吐再扫，以钵外无霜为度。收好。每用少许吹之。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：止痛、防腐、消肿。

【主治】①《疡医大全》：咽喉、口齿、双蛾喉痹，命在须臾。②《王氏医存》：喉疼、火眼、火疮、肿毒、口烂、牙疼、外痔等一切热患。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（吉林方）：忌食辛辣食物；白喉忌用。

31667 西瓜霜

【方源】《经验方》卷下。

【组成】秋季老西瓜一个

【用法】切开一片作盖，挖去内肉，取蜒蚰一大碗入瓜中，再入元明粉盛满，仍将切下之盖盖上，用竹钉钉上，夏布袋装之，挂于有风无雨处，下接瓷盆，以接滴下之水，此水能成白霜，候干透，研细末。临用时，加冰片少许。

【主治】喉风、乳蛾。

31668 西瓜霜

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】西瓜霜二十两 冰片六钱

【用法】上为细末。每用一分，吹入喉内。

【功用】消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，乳蛾喉痹。

【宜忌】①《北京市中药成方选集》：忌辛辣食物。②《全国中药成药处方集》（北京方）：忌酒、肉、油、面。

【备考】西瓜霜制法：将大西瓜一个，切成两半放入瓦罐内盛之。每十斤西瓜放入火消一斤、芒消一斤，将口封固，挂于透风处，候

其霜自行吐出，用刷扫下，再吐再扫，以罐外无霜为度。

31669 西圣丸

《仙拈集》卷四。为《回春》卷八“西圣复煎丸”之异名。见该条。

31670 西来方

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】硼砂二钱 苦葶苈子 海金沙各三钱 乳香一钱半 没药 牙皂各一钱半 槟榔 陈皮 三棱各二钱 莪术二钱半 木香一钱

【用法】上为末。每服五分，滚水调下。

【主治】腹中积块作胀作痛，大小便不利。

31671 西黄丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】炙净乳香 没药各一两 麝香一钱五分 西牛黄三分 雄精五钱

【用法】上为末，取饭一两，打烂，入末药，再打为丸，如萝卜子大，晒干忌烘。每服三钱，热陈酒送下，上部临卧服，下部空心服。醉卧被覆取汗，酒醒痼消痛息。

【主治】乳痈瘰癧，痰核流注，肺痈，小肠痈毒。

31672 西黄丸

《治疗汇要》卷下。为《外科全生集》卷四“犀黄丸”之异名。见该条。

31673 西清汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】桂枝五分 梔子一钱五分（姜汁炒） 苏子一钱五分 桑皮二钱 杏仁三钱 橘红一钱 半夏一钱 茯苓二钱 蒺藜三钱 郁金二钱 生姜三片

【主治】胆咳，咳呕胆汁。

31674 西霸散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】草乌头（紧实者）一枚（炮令七分熟） 西硼砂一两

【用法】上为细末。每用少许擦牙。

【主治】牙齿动摇。

31675 西台金丹

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】熟地三两 川芎 白芍 条芩 藁本 玄胡 茯苓 赤石脂 没药 丹皮 白薇 人参 香附各一两 桂心 甘草各一两五钱

【用法】上为末，每药一斤，用益母膏四两，同炼蜜为丸，如弹子大，约重二钱五六分，朱砂为衣，日色略照片时，瓷器收贮，清晨服一丸，调经者，白汤送下；安胎者，砂仁汤送下；产后血滞者，荆芥穗汤送下。

【主治】月水不调，赤白带下。

31676 西洋参酒

【方源】《丸散膏丹集成》。

【组成】西洋参

【用法】浸酒服用。

【功用】滋肺胃，养血气，生津止渴。

【主治】肺虚咳嗽，胃枯食少，及上中二焦阴虚液少诸证。

31677 西洋药酒

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十四。

【组成】红豆蔻（去壳） 肉豆蔻（面裹煨，用粗纸包压去油） 白豆蔻（去壳） 高良姜（切片，焙） 甜肉桂（去粗皮） 公丁香（各研净细末）各五分

【用法】先用上白糖霜四两，水一饭碗，入铜锅内煎化，再入鸡子清二个煎十余沸，入干烧酒一斤，离火置稳便处，将药末入锅内打匀，以火点着烧酒片刻，随即盖锅火灭，用纱罗滤去滓，入瓷瓶内，用冷水冰去火气。随量少少饮之。

【主治】膈食翻胃，一切痢疾水泻。

31678 西风暴雨方

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】天冬三钱（酒浸） 玉竹四钱 麦冬二钱 泽泻一钱 生地五钱（酒浸） 防风一钱 磁石半钱 荆芥二钱 黄耆一钱半（生用） 当归一钱 白芍三钱 木通二钱 梔子三钱（生研） 苍术二钱 茯苓三钱 前仁三钱 雄黄一钱半（泡服）

【功用】杀虫，解湿热之毒。

【主治】脾湿积热，郁蒸于喉所致的虫喉症，久而喉烂生虫，且痒且痛。

【方论选录】方以玉竹、二冬作天气；以酒洗生地作地气；以泽泻交阴阳之气而成雨；以防风、荆芥偕磁石而发西风；以苍术偕梔子、木通、车前利湿而清郁热；以生耆偕当归、白芍生肌敛疮口，清脾热，而令东风不动；以雄黄一味解毒杀虫。

【备考】先以酽醋一碗，将报木桐根一握、煮鸡蛋一个，入热醋内，令病者张口吸其酸气，引出其虫，虫不尽，则以硫黄、砒霜、艾叶研末，纸卷烧燃熏鼻，虫即死，而痒止矣。方中磁石，以虎骨易之更妙，虎骨磨服。

31679 西圣复煎丸

【方源】《回春》卷八。

【异名】西圣丸（《仙拈集》卷四。）

【组成】乳香 没药 儿茶 丁香（焙）各一两 阿魏 白花蛇 血竭各四钱（俱为末）白面（炒）一斤 蜂蜜（炼熟）六两 香油四两（煎熟）

【用法】上为末，入枣肉（水煮，去皮核）捣干余下，为丸如弹子大。每服一丸，上茯苓四两，水四碗，煎至二碗，入丸煎化，去滓温服。

【主治】杨梅疮后肿块经年，破而难愈，以致垂危。

31680 西州续命汤

【方源】《外台》卷十四引《肘后方》。

【异名】大续命汤（《千金》卷八引《胡洽方》）。

【组成】麻黄六两（去节） 石膏四两（碎，绵裹） 桂心 当归 甘草（炙）各二两 芍药 干姜 黄芩各一两 杏仁四十枚（去皮尖两仁）

【用法】上切。以水一斗九升，先煮麻黄再沸，吹去沫，后下诸药，煮取四升，初服一升，汗出即愈。汗后稍稍五合一服，饮食如常。

【主治】中风痱，身体不自收，口不能语，冒昧不识人，不知痛处，但拘急，中外皆痛，不得转侧。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜。

31681 西州续命汤

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】麻黄（去节） 干姜各三两 附子一两（炮） 防风 桂心 白术 人参 芍药 当归 甘草（炙）各一两 杏仁四十枚（去皮尖及两仁，碎）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，未食分再服。覆令汗出。

【主治】卒中风，身体直，角弓反张，口噤。

31682 西州续命汤

【方源】《外台》卷十九引《古今录验》。

【组成】麻黄三两（去节） 石膏二两 芍药一两 生姜三两 黄芩一两 甘草一两（炙） 芍药一两 桂心一两 郁李仁三两（去皮） 防风一两 杏仁四十枚 当归一两

【用法】上切。以水九升，煮麻黄，去上沫，纳诸药煮取三升，分四服。初服取汗，米粉于衣里粉之。

【主治】中风入脏，及四肢拘急不随。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

31683 西州续命汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】麻黄 生姜各三两 当归 石膏各二两 芍药 桂心 甘草 黄芩 防风芍药各一两 杏仁四十枚

【用法】上咬咀。以水九升，先煮麻黄，去沫，下诸药，煮取三升，去滓，分四服，一日二次。

【主治】肉极。虚热，肌痹淫淫，如鼠走身上，津液开泄，或痹不仁，四肢急痛。

【方论选录】《千金方衍义》：续命为风痱身体不能自收、正虚风中之首药，乃《古今录验》方中除去人参，加入黄芩，谓之西州续命。更添小续命中芍药、防风二味，并以生姜易干姜，即小续命中除去附子、防己，专

力开发风痹。以无脾虚喘乏，故无取于人参；以无肾虚逆冷，故无取于附子；以无下体疼痛，故无取于防己也。

【备考】本方方名，《普济方》引作“续命汤”。

31684 西来甘露饮

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】天萝水（《文堂集验方》卷一）。

【组成】丝瓜藤

【用法】霜降后三日，近根二尺剪断，将根头一节倒插入新瓦瓶中，上以物掩之，勿使灰尘飞入，次日以好新坛一只，将瓶中之汁倾在坛中，仍将藤照前插入瓶内，三日后汁收尽，将坛封固，收藏听候取用。若发热，烦躁，口渴，未见红点，将茜根一两，水煎浓汁二酒杯，掺丝瓜汁二酒杯相和，服之立安，痘出亦轻。若已见标，颜色红紫及稠密者，用紫草煎浓汤冲服，便见红润。若夹斑者，犀角、紫草、茜根煎汤冲服，寒月用酒煎冲服。天行时疫，以生姜汁少许，加蜂蜜调匀服之。

【功用】解毒清热。

【主治】痘疮发热之初，五日以前而热不退，痘色红紫，口渴，大便燥结；并治疹家烦热，口干，咳嗽，疹色枯燥，或谵语喘急，睡卧不安。

31685 西岳华峰方

《医统》卷六十四。为《中藏经·附录》引《湘山野录》“地黄散”之异名。见该条。

31686 西洋十宝散

【方源】《外科全生集·新增马氏试验秘方》。

【组成】真血竭一钱六分 明雄黄四钱 上红花四钱 净儿茶二分四厘 辰州砂一钱二分 净乳香一钱二分 当归尾一两 净没药一钱四分 当门子三厘 梅片一分二厘

【用法】上为细末，入乳钵研至无声，收入瓷瓶，黄蜡封口，勿令泄气。刃伤并各器械伤，皮破出血者，以末药掺上包固，不可见风；跌打损伤，皮肉青肿，未破者，用陈醋

调敷患处；内伤骨碎，或骨已断折，先将骨节凑准，用陈醋调敷患处，以纸包裹，外加老棉絮包好，再用薄板夹护，将绳慢慢系紧，不可移动，药性到骨自接，须静百日，勿犯房事，犯则必成残疾；刀伤深重，未致透膜者，先用桑皮纸线缝好，多掺药末于上，以活鸡皮急急调护如前骨损养法即愈；跌打昏迷不醒，急用一钱，同陈酒冲服。

【主治】跌打损伤，金疮。

31687 西域黄灵膏

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】麻油五两 白蜡六钱 黄蜡五钱

【用法】同化烊，离火，入藤黄末三钱，搅匀冷定，下冰片一钱，再搅匀任用。

【主治】金刃伤，及痈疽疔毒、臁疮、血风疮。

【加减】如治杖夹伤，加银朱末一钱五分，青鱼胆五分。

31688 西黄化毒丹

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】西黄一分 真珠三分 血珀五分 胆星三分 辰砂三分

【用法】上为细末。均作三服，灯心汤调下。

【主治】疔疽火毒内陷，神识模糊，不醒人事。

31689 西黄化毒丹

【方源】《朱仁康临床经验集》引章氏方。

【组成】牛黄 1.5 克 琥珀末 30 克

【用法】先将牛黄研细，再将琥珀研细装瓶内。量儿大小，每日服 0.15 克至 0.3 克，蜂蜜少许调下。

【功用】清化解毒。

【主治】胎疮疮（婴儿湿疹），大便不成形者。

【宜忌】服药期间，忌食鸡蛋、鱼腥、发物。

31690 西黄醒消丸

《中国医学大辞典》。即《外科全生集》卷四“犀黄丸”。见该条。

31691 西王母四宝散

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【异名】王母四童散(《圣惠》卷九十四)、龟台王母四童散(《遵生八笺》卷四)。

【组成】胡麻(熬) 天门冬 茯苓 山术 干黄精 桃核中仁(去赤皮)各等分。

【用法】六物精治,合捣三万杵,且以酒服三方寸匕,一日二次;亦可水服。

【功用】返老还童。

【备考】《遵生八笺》有辰砂。

31692 西川石刻安肾丸

【方源】《玉机微义》卷十九引《局方》。

【异名】西蜀石刻安肾丸(《医统》卷四十八)。

【组成】青盐四两 鹿茸(炙) 柏子仁(净) 石斛 附子 川乌(炮) 巴戟(去心) 肉桂 菟丝子 苁蓉 韭子 葫芦巴 杜仲 破故纸(炒) 石枣 远志 赤石脂 茯苓 茯神 茴香(炒)各一两 苍术 川楝子 川椒 山药各四两

【用法】上为末,山药酒糊为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,空心盐汤送下。

【主治】真气虚惫,脚膝弱缓,夜梦遗精,小便滑数而清。

31693 西王母玉壶赤丸

【方源】《医心方》卷十四引《深师方》。

【异名】仙人玉壶丸(《千金》卷十二)、香婆丸(《医心方》卷十四)。

【组成】武都雄黄一两(赤如鸡冠) 八角大附子一两(炮称) 藜芦一两 上丹砂一两(不使有石者) 白礬石一两(炼之一日一夜) 巴豆一两(去皮、炙令紫色称之)(一方有真朱一两)

【用法】先治巴豆三千杵;次纳礬石,治三千杵;次纳藜芦,治三千杵;次纳雄黄,治三千杵;次纳附子、治三千杵;次纳白蜜,治三千杵;若不用丹砂而纳真朱二两,勿令泄气。大人服之皆丸如小豆大,若本病将服者,禁食生鱼、生菜、猪肉;服以下病者,宿勿食,明旦服二丸,不知者,饮暖米饮以发之令下,下不止,饮冷水以止之;病在膈上吐,

膈下者下,或但噫气而愈。或食肉不消,腹坚胀或痛,服一丸立愈;风疝、寒疝,心疝,弦疝,每诸疝发腹中急痛,服二丸;积寒热老痞,蛇痞,服二丸;腹胀不得食饮,服一丸;卒大苦寒热往来,服一丸;卒关格不得大小便,欲死,服二丸;瘕结,服一丸、一日三次,取愈;若微者,射闾丸甚良;下利重下,服一丸便断;或复天行下便断,卒上气,但出不及逆气冲喉,暴积聚者,服二丸,一日二次;症未发服一丸,已发,服二丸便断;小儿百病痞寒中及有热,一百日至半岁者,以如黍米大一丸着乳头与服之,一岁以上,服如麻子大一丸,一日三次,皆以饮服;小儿大腹及中热恶毒,食物不化,结成坚积,皆服一丸,亦可以涂乳头使小儿乳之;伤寒靛色及时气病,以温酒服一丸,厚覆取汗,若不汗,复以酒服一丸,要取汗;欲行视病人服一丸,以一丸着头上,行无所畏;至死丧家,带一丸、辟百鬼;病苦淋露消瘦,百节痠疼,服一丸,一日三次;妇人产生余疾,及月水不通,及来往不时,服二丸,一日二次;卒霍乱心腹痛,烦满吐下,手足逆冷,服二丸;注病,百种病不可名,将服二丸,一日二次;若腹中如有虫,欲钻肋出状,急痛,一止一作,此是风气,服二丸;若恶疮不可名,病疥疽,以膏若好苦酒和药,先用盐汤洗疮去痂,拭令燥,以药涂之即愈;恶风逆心、不得气息,服一丸即愈;耳出脓血汁,及卒聾,以赤楮皮裹二丸塞耳孔中即愈;痈肿瘰疬瘰癧及欲作瘰,以苦酒和药涂之,齿痛,以绵裹小丸着齿孔中咋之;苦寒热往来,服二丸,若蛇虺蜂蝎螫所中及獠犬狂马所咋,以苦酒和涂疮中,并服二丸即愈;卒中恶欲死不知人,以酒若汤水和二丸,强开口灌喉中,捧坐令下;癖饮、留饮、痰饮,服一丸,以蜡和一丸如弹丸,着绛囊中以系臂,男左女右;中溪水毒,服二丸;已有疮在身,以苦酒和三四丸涂疮上;忧患之气结在胸中,苦连噫及咳,胸中刺痛,服如麻子大三丸,一

日三次；妇人胸中苦滞气，气息不利，小腹坚急，绕脐绞痛，浆服如麻子大一丸，稍增之如小豆大；心腹常苦切痛及中热，服一丸如麻子大，一日三次，五日愈；男女邪气鬼交通，歌哭无常，或腹大经绝，状如妊身，皆服如胡豆大三丸，日三次，夜一次，又以苦酒和之如饴，旦以涂手间使，暮又以涂足三阴交及鼻孔，七日愈，又将服如麻子大一丸，一日三次，三十日止；腹中三虫，宿勿食，明平旦进牛羊肉，灸三膊，须臾便服如胡豆大三丸，日中当下虫，过日中不下、复服二丸，必有烂虫下；小儿寒热，头痛身热及吐衄，服如麻子大一丸；小儿消瘦丁奚不能食，食不化，服二丸，一日三次，又苦酒和如饴，涂儿腹良；风目赤或痒，视物漠漠，泪出烂眦，以蜜解如饴，涂注目眦头；卒风肿，以苦酒若膏和涂之，即愈；风头肿，以膏和涂之，以絮裹之；若为蝮毒所中，吐血，腹内如刺，服如麻子大一丸，稍益至胡豆大，亦以涂鼻孔中，以膏和，通涂腹背，亦烧之自熏；鼠痿，以脂和涂疮，取啖舌狗子舐之即愈也。

【功用】解毒。

【主治】《医心方》引《深师方》：尸注，卒恶，水陆毒螫万病，积聚，心腹痛，中恶，痈瘍，水肿胀满。男女与鬼交通，歌哭无常，或腹大绝经，状如妊娠；恶风逆气不得气息；忧恚气结在胸心，苦连噫及咳，胸中刺痛；癖饮，痰饮；风疝，寒疝，心疝，弦疝；腹中三虫；卒关格，不得大小便，欲死；卒霍乱，心腹痛，烦满吐下，手足逆冷；下痢重下；疟未发或已发，寒热往来；伤寒救逆，时气热病；淋沥瘦瘠，百节痠痛；头卒风肿；耳聋，脓血汁出及卒聋；风目赤或痒，视物漠漠泪出，烂眦；齿痛；妇人产后余疾，及月水不通，往来不时；妇人胸中苦滞气，气息不利，少腹坚急，绕脐绞痛；小儿百病，惊痫痞塞及有热；小儿大腹及中热恶毒，食物不化，结成积聚；小儿寒热，头痛身热及吐乳；小儿羸瘦，丁奚，不能食，食不化。

【方论选录】《千金方衍义》：辟除恶毒之药，非猛力峻攻，无以建克敌之功。方中雄黄治寒热死肌，杀精物恶鬼邪气，胜五兵；附子治风寒痿躄，破癥坚积聚；藜芦治蛊毒泄利，杀蛊毒，去死肌；丹砂治身体五脏百病，养精神，安魂魄，杀鬼精恶物，与礞石治寒热风痹、腹中坚癖邪气；巴豆破癥瘕积聚，坚积留饮，荡练五脏六腑，开通闭塞，除蛊毒鬼疰邪物，种种皆辟除邪毒峻药，无不本诸本经。治宿患痼疾，确有五兵荡练之绩。而方后有无丹砂，真朱代用之说，真朱即矾红，取其涤除积垢，以安神识也。

【备考】用法中“次纳附子治三千杵”，原脱，据《千金》补。

31694 西岳真人灵飞散

【方源】《千金》卷二十七。

【异名】灵飞散（《千金翼》卷十三）。

【组成】云母粉一斤 茯苓八两 钟乳粉 柏子仁 人参 续断 桂心各七两 菊花十五两 干地黄十二两

【用法】上为末，生天门冬十九斤取汁搜药，纳铜器中蒸一石二斗黍米下，米熟晒干为末。先食饮服方寸匕，每日一次。

【功用】延年强身，悦颜固齿。

【宜忌】《张氏医通》：忌食胡蒜、羊血。

【方论选录】《千金方衍义》：云母为辟除三虫、伏尸，荡练脏腑积阴之的药。更添《本经》云母性升，主中风寒热如在车船上，除邪气，安五脏，益精明目；钟乳补真阳，安五脏，通百节，利九窍；人参补五脏，安魂魄，除邪气，明目开心；益智久服轻身延年；茯苓守五脏正气，久服安魂养神，不饥延年；桂心利关节，益气补中，久服通神，轻身不老；柏子仁除风湿，安五脏，久服令人润泽美色，耳目聪明，不饥不老，轻身延年；得菊花补水制火，益金平木，久服利血气，耐寒延年；续断续筋骨，补不足，久服益气力；生地黄治伤中，逐血痹，填骨髓，长肌肉，久服轻身益气，延年不饥，且与茯苓、生地黄

等皆能伏云母之性，使之驯良无悍，如无生者，不妨约取干者去心，杵烂熬膏和药，总在米下同蒸，生熟无异。服后白发尽落，故齿皆去，次以蜜丸服之而得更生，阴阳相济，非可言语形容。

【备考】《千金翼》有白术四两。

31695 西蜀石刻安肾丸

《医统》卷四十八。为《玉机微义》卷十九引《局方》“西川石刻安肾丸”之异名。见该条。

31696 西川罗赤脚仙还少丹

【方源】《洪氏集验方》卷一引陈晦叔方。

【异名】还少丸（《杨氏家藏方》卷九）、还少丹（《卫生宝鉴》卷六）、滋阴大补丸（《医学正传》卷三）、真人还少丹（《中国医学大辞典》）。

【组成】干山药 牛膝（酒浸一宿，焙干）各一两半 山茱萸 白茯苓（去皮） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 石菖蒲 巴戟（去心） 远志（去心） 杜仲（去粗皮，用生姜汁并酒合和，涂炙令熟） 楮实 舶上茴香各一两 枸杞子 熟干地黄各半两

【用法】上为末，炼蜜入枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒、盐汤送下，一日三次。至五日觉有力，十日精神爽健，半月气力稍盛，二十日目明，一月夜思饮食，冬月手足常暖，久服无毒。

【功用】大补心肾脾胃，常服令人身体轻健，筋骨壮盛，怡悦难老，齿牢，永无瘕疝；妇人服之，姿容光悦，去一切病。

【主治】①《洪氏集验方》引陈晦叔方：一切虚损，神志俱耗，精力不爽，腰脚沉重，肢体倦怠，气血羸乏，小便浑浊，子宫久冷。②《杨氏家藏方》：脾胃怯弱，心忪恍惚，精神昏愤，气血凝滞，饮食无味，肌瘦体倦，目暗耳聋。

【加减】如身热，加山梔子一两；心气不宁，加麦门冬一两；少精神，加五味子一两；阳弱，加续断一两。

31697 西岳莲华峰神传齿药

《三因》卷十六。为《中藏经·附录》引《湘山野录》“地黄散”之异名。见该条。

亚

31698 亚圣膏

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】象皮一两 驴甲（即悬蹄）一块 鸡子清三个 木鳖子七个 蛇蜕二钱 蝉蜕四钱 血余三钱 穿山甲六钱 槐枝 榆枝 艾枝 柳枝 桑枝各二十一寸 黄丹 黄蜡 麻油三斤

【用法】上将药浸七日，煎如常法，滤去滓，每净油一斤，入黄丹七两，煎成膏，入黄蜡五钱化匀，再加血竭五钱、儿茶三钱、乳香三钱、没药三钱、煅牡蛎五钱、五灵脂五钱，上六味研极细末，入膏内成膏，出火摊贴。

【主治】一切破烂诸疮并杨梅结毒。

再

31699 再生丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】蜈蚣一条（酒浸一宿，炙） 干蝎（全者）七枚（炒） 蚕蛾十枚（炒） 白僵蚕（直者，炒） 丹砂（研）各一分 天南星（炮） 白附子（炮） 麝香当门子各一枚 薄荷心七枚 龙脑（研） 水银（锡结沙子）各一钱 棘刚子二十枚（炒）

【用法】上为细末，以石脑油和剂，油单裹，每服旋作一丸，如黍米大。冷水化下。须发前服，三服必效。后服睡脾散。

【主治】小儿虚风慢惊，搐搦，项筋紧张，手足逆冷，腰背拘急。

31700 再生丸

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】巴豆一两（去皮，研） 朱砂一两（细研） 麝香半两（研） 川乌尖十四个（为末） 大黄一两（炒，取末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三丸，水化灌下。

【主治】厥死犹暖，及关格、结胸。

31701 再生丸

《御药院方》卷十。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

31702 再生丹

【方源】《普济方》卷二三五。

【组成】沉香八钱半 木香五钱 槟榔五钱 大茴香一两（盐炒） 小茴香一两（盐炒） 木通一两 川山甲一两（酥炒） 全蝎一两（微炒） 通草一两 灯草五钱 头红花二钱半

【用法】上为细末，甘草膏子为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心酒、盐汤送下，干物压之。

【主治】一切劳证黄瘦，虚损，诸药不能治者。

31703 再生丹

《袖珍》卷三。为《杂类名方》“夺命丹”之异名。见该条。

31704 再生丹

《增补内经拾遗》卷四。为《急救仙方》卷二“飞龙夺命丹”之异名。见该条。

31705 再生丹

《续医说》卷九引《曾公谈录》。为《妇人良方》卷十九引华佗方“愈风散”之异名。见该条。

31706 再生丹

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】急性子五钱 知母五钱 硼砂五钱 枯矾三钱 五灵脂三钱 雄黄二钱 硃砂三分 郁金二钱五分 青盐二钱 麝香一钱 古石灰五钱（炒黄色） 黄牛胆一斤

【用法】上为细末，将胆汁拌成不干不湿如鼠粪样，装入胆内，阴干听用。每服一分二厘，烧汤送下。若遇痰火，蜜水调服。

【主治】翻胃吐食，膈气痰火。

31707 再生丹

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】桔梗一分 硼砂一分 山豆根一

分 生甘草一分 牛黄一分 荆芥一分

【用法】上为极细末。用鹅翎插药五厘吹入蛾处，一日六次。痰涎出尽即愈。

【主治】双蛾、单蛾初起久患，喉痹。

31708 再生散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】乌蛇（酒炙，取肉） 天麻 天南星（炮） 干蝎（炒）各一分 麝香（研）一钱匕 膩粉半钱匕（研） 丹砂（研）二钱 牛黄（研） 白附各一钱

【用法】上九味，除别研外，为散，入研药和匀。每服半钱匕，金银汤调下，早晚各一次。

【主治】小儿天钓惊风，潮搐，项筋紧强，手足厥冷。

31709 再生散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】人齿五枚（烧灰） 蝎蜥尾五条（烧灰）

【用法】上为末。每服半钱，温酒或煎葱白汤调下，不拘时候。

【主治】小儿疮疱正出，忽变紫色，或作黑陷，喘急神昏。

31710 再生散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】土鳖四十九个（煨存性） 山豆根入中白（煨） 辰砂（飞）各二钱

【用法】上为细末，用时先割净腐肉，次用麻油通口噙漱，觉无油气吐之，如式六七次，次以百沸汤入盐、醋，漱吐三四次，再次以绵胭脂拭干，掺之。

【主治】走马牙疳，牙落鼻崩，久不愈者。

31711 再仙丹

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】大小茴香（盐水炒）各二两 麦冬 茯神 地骨皮 防风各二两 远志 人参 龙齿 羚羊角 炙甘草 石膏各三两 紫石英一两

【用法】上咬咀。每服三钱，加大枣一个，水一钟半，煎七分，食前温服。未愈再服，以

愈为度。

【主治】劳证，黄瘦，虚损，吐血。

31712 再攻饮

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】大黄一两 芒消五钱 防风一钱 赤芍药八分 荆芥八分 当归五分 川芎八分 西滑石一钱 苍术三钱 薄荷八分 连翘二钱 制乳香二钱 石膏二钱 桔梗一钱 枳实一钱 制没药二钱 厚朴一钱 黄芩一钱 梔仁一钱 天丁一钱

【用法】先服劫营饮，继用熏药，后服夹攻饮，如此再熏，改投本方，下解其毒。俟其痒止，虫死，秽净，烂处之紫红色成淡红色，乃以仙遗粮单服一月。

【主治】杨梅毒喉，腐烂臭秽，痒而且痛，饮食妨碍，其状如去皮石榴，颗粒分明，有界成板，其色淡红通亮。

31713 再苏丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】大戟（炒） 甘遂（炒） 春大麦面（炒） 巴豆（去心膜，麸炒出油尽） 干姜（炒） 桂（去粗皮） 大黄（銼，炒）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服十丸，空心茶送下。以利为度。

【功用】大通三焦。

【主治】水气。

31714 再苏丹

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】川乌头二两 草乌头一两 五灵脂四两

【用法】上为末，滴水为丸，如鸡头子大。每服一丸，研碎，入酒一盏，生姜三片，地黄三条，乳香少许，同煎至七分，临卧通口服。吃了须摩擦患处，令热彻，以助药力。如合时入乳香末一二钱，即煎时更不须入。

【主治】骨节疼痛，语言不正，行步艰难，手足战掉搐拽。

31715 再苏丹

【方源】《傅青主男女科·男科》卷下。

【组成】熟地二两 山萸 玄参 麦冬 五味子各一两 柴胡 菖蒲各一钱 茯苓五钱 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【功用】补肾水，滋脾气，安心通窍，泻火消痰。

【主治】厥证，阴虚猝倒。

31716 再苏散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】白矾（熬令汁枯） 地龙（去土，炒）各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕，用猪尾上血一椀斗多，同新水少许调下，不拘时候。

【主治】小儿触着疮子，毒气入里，疮变黑色，须臾不救。

31717 再造丸

【方源】《医方考》卷六。

【组成】生玳瑁一两半 片脑 蜈蚣（炒）各三钱 水蛭（炒黄） 麻黄各一钱（去节）

【用法】猪尾血为丸，如龙眼大。每服一丸，微汗吉。

【主治】痘中有赤黑斑，狂言烦躁者。

【方论选录】是方用生玳瑁能解毒而化斑，蜈蚣能从毒而化毒，水蛭能散瘀而破血，片脑能化气而利窍，麻黄能透肌而达表，和之以猪尾血，取其动而不滞耳。

31718 再造丸

《外科大成》（广益书局本）卷四。即原书善成堂刻本“再造丹”。见该条。

31719 再造丸

【方源】《医述》卷十二。

【组成】人参一两 白术八钱 茯苓一两 甘草一两 熟地一两二钱 当归一两 川芎一两 赤芍八钱 黄耆一两二钱 首乌一两 肉桂一两二钱 附子八钱 麻黄一两 防风一两 灵仙一两 白芷一两 细辛一两 羌活二两 葛根一两 桑寄生一两 天麻一两

僵蚕一两 乳香一两 没药一两 丁香一两
藿香一两 海南香一两 香附八钱 青皮八
钱 乌药八钱 松香六钱 草薏仁一两 白
薏仁八钱 草薏八钱 骨碎补一两 玄参八
钱 川连一两 大黄一两 天竺黄一两 红
花八钱 姜黄一两 朱砂一两 琥珀一两
血竭八钱 胆星一两 蕲蛇四两 龟版一两
虎膝一对 犀角八钱 穿山甲四两 雄鼠矢
一两 牛黄三钱 全蝎一两半 地龙八钱
冰片二钱 麝香八钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，每粒重一钱二
分，金箔为衣，阴干，蜡壳封好。

【主治】痹证。

31720 再造丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蕲蛇一两（净肉） 檀香二钱五分
细辛五钱 京牛黄一钱五分 地龙二钱五分
香附五钱 旱三七二钱五分 青皮五钱 红
曲二钱五分 防风一两 犀角三钱六分 山
羊血五钱 大熟地一两 丁香五钱 天竺黄
五钱 玄参一两 片姜黄一钱五分 乳香五
钱 薏仁五钱 首乌一两（炙） 川芎一两
甘草一两（炙） 赤芍五钱 两头尖一两 桑
寄生一两 葛根七钱五分 骨碎补五钱 辰
砂五钱 虎胫五钱 川草薏一两 龟版五钱
（炙） 冰片一钱一分 黄耆一两（炙） 茯
苓五钱 川连一两 生军一两 藿香一两
麻黄一两 全蝎七钱五分（去钩） 川附子
五钱 僵蚕五钱（炒） 山甲五钱（炙） 沉
香五钱 天麻一两 当归五钱 白术五钱
草薏一两 桂心一两 麝香二钱五分 人
参一两 没药一两（炙） 灵仙七钱五分
（炙） 羌活一两 白芷一两 血竭二钱六分
白芍一两 乌药一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱，
内用白灯花纸蜡皮粘裹，外用蜡皮封固。左
为血，病在左部，用四物汤为引；右为气，病
在右部，用四君子汤为引；其余各症用姜汤
或黄酒送下。

【功用】舒筋活络，祛风化痰。

【主治】寒湿入络，筋骨疼痛，四肢麻木，
半身不遂，口眼歪斜，手足拘紧，言语不清。

31721 再造丸

【方源】《温热经解》。

【组成】真蕲蛇（去皮骨头尾各三寸，酒浸，
炙，取净末）四两 两头尖（系草药，出乌
鲁木齐，非鼠粪也，如不得，以白附子代之，
制用）二两 山羊血五钱 虎胫骨一对（醋
炙） 龟版（醋炒）一两 乌药一两 当门
子五钱 天竺黄一两 黄耆二两（炙） 没
药一两（去油） 制乳香一两 北细辛一两
麻黄二两 赤芍一两 炙甘草二两 小青皮
一两 羌活一两 白芷二两 大熟地二两
明天麻二两 血竭八钱（另研） 防风二两
制附片一两 骨碎补（去皮）一两 犀角八
钱 玄参（酒炒）二两 沉水香一两 制首
乌 葛根二两半 藿香二两 白僵蚕一两
西牛黄二钱半 川连二两 川芎二两 穿山
甲二两（前后四足各用五钱，麻油浸） 辰
砂一两（飞） 桂心二两 川草薏二两 炒
于术一两 地龙五钱（去土） 红曲八钱 广
三七一两 母丁香（去油）一两 制香附一
两 全蝎（去毒）二两半 全当归二两 威
灵仙二两半 川大黄二两 片姜黄二两 白
茯苓二两 梅冰片二钱半 桑寄生一两半
草薏仁二两 白薏仁二两 制松香（水煮七
次）五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每丸重一钱，
金箔为衣，外用蜡丸包裹。凡服是丸后，神
气清爽，渐思饮食，间有一二处屈伸不利，此
系热痰留于关节，用豨薟草二钱，归身、白
芥子各一钱，红花八分煎汤，以新白布蘸热
汤擦抹，每日二三次，即能运动如常。

【主治】真中风寒，痰迷厥气，半身不遂，
口眼喎斜，腰腿疼痛，手足麻木，筋骨拘挛，
步履艰难，一切风痰。

31722 再造丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】蕲蛇肉(酒制)二十两 母丁香十两 玄参(去芦)二十两 熟地二十两 青皮(醋炒)十两 何首乌(酒炙)二十两 黄耆二十两 竹节香附二十两 大黄二十两 骨碎补十两 红曲五两 细辛十两 香附(醋炒)十两 三七五两 豆蔻仁十两 川芎二十两 甘草二十两 黄连二十两 葛根十五两 麻黄二十两 檀香五两 天竺黄十两 地龙肉五两 乳香(醋炒)十两 防风二十两 片姜黄二两五钱 茯苓十两 桑寄生二十两 藿香二十两 赤芍十两 全蝎十五两 川附子十两 草薢二十两 沉香十两 天麻二十两 草豆蔻二十两 没药(醋炒)十两 当归十两 建神曲四十两 虎骨(油炙)十两 穿山甲(醋炙)十两 白术(炒)十两 肉桂(去粗皮)二十两 白芷二十两 羌活二十两 人参(去芦)二十两 毛橘红四十两 僵蚕(炒)十两 龟版(醋炙)十两 于术八两 血竭七两五钱 威灵仙十五两 乌药十两 油松节十两

【用法】上为细末，每三百二十两细末兑牛黄一两、犀角粉三两、麝香二两、朱砂粉四两、冰片一两，研细和匀，炼蜜为丸，每丸重三钱，金箔为满衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下。一日二次。

【功用】祛风散寒，化痰活络，镇静安神。

【主治】中风半身不遂，左瘫右痪，口眼喎斜，腰腿不利，四肢麻木，言语不清，筋骨痠痛。

31723 再造丹

【方源】《外科大成》(善成堂刻本)卷四。

【组成】生漆 松香各半斤(和匀，盛瓦盆内，入大蟹七只，如小者倍之，此盆一个埋半截土内，日晒之，以柳枝搅之，夜则盖之，二十一日俱化为水，取起听用) 雄黄半斤(飞七次) 蛇蛻七条 川乌 草乌(俱姜汁浸泡) 人参 天麻各二两

【用法】上为末，用蟹漆汁为丸听用。初用麻黄、苏叶各半斤，防风、荆芥各四两，煎

汤一桶，沐浴浸洗，换新衣服，丸药三钱，黄酒送下，再饮至醉，盖卧出汗，汗干脱去衣，于空地焚之，另换新衣，至午再服三钱，酒下至醉，用夏枯草(蒸)铺席下卧之，不取汗。次日，沐浴，服药至醉，铺夏枯草卧，照前，将旧衣取出焚之。如此七日，其病尽出，如豆如疮，再服之七日，疮俱脱壳，五七日全愈。

【主治】大麻疯。

【宜忌】忌螃蟹、狗肉，终身不能食。

【备考】本方方名，原书(广益书局本)作“再造丸”。

31724 再造丹

【方源】《顾松园医镜》卷九。

【组成】川黄连二两(先同金银各二两，煎浓汁三碗) 大田螺五十个(仰摆盘内，以黄连汁挑点螺眼上，顷刻化成水，将绢滤收，同黄连、金银器煎至碗半，入萝卜子汁半碗煎至碗半，入韭菜汁半碗，煎至碗半，入侧柏叶汁半碗，煎至碗半，入梨汁一碗，煎至碗半，入竹沥一碗，煎至碗半，入童便一碗，煎至碗半，取出金银器，入人乳二碗，煎至一碗；入羊乳二碗，煎至一碗；入牛乳二碗，微火煎至成膏)

【用法】取膏入瓷罐内，封口埋土内一夜，以去火气。每用一酒杯，白汤下。极重者三服全愈。如汤水不能进者，将膏挑至舌上，随津咽下，遂能饮食。只可食糜粥，一月后方可用饭。

【主治】膈病。

31725 再造汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】甘草半两(生锉)

【用法】上为粗末，用水一中盏，煎至五分，去滓，分温二服。当吐蛊出。若预防蛊者，宜熟炙甘草，煮汁服之，即内消不吐。

【主治】小儿中蛊危急。

31726 再造汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】黄耆 人参 桂枝 甘草 熟附
羌活 细辛 川芎 白术 芍药

【用法】加生姜一片，大枣二个，水煎，临
服时入童便。

【主治】阳虚不能作汗，头疼身热，恶寒背
强。

【加减】夏月，去附、辛，加石膏。

31727 再造饮

《赤水玄珠》卷十八。为《伤寒六书》卷三
“再造散”之异名。见该条。

31728 再造散

《丹溪心法》卷四。为《三因》卷十五“通
天再造散”之异名。见该条。

31729 再造散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】再造饮（《赤水玄珠》卷十八。）

【组成】黄耆 人参 桂枝 甘草 熟附
子 细辛 羌活 防风 川芎 煨生姜

【用法】水二钟，加大枣二个，煎一钟。捶
法再加炒白芍一撮，煎二沸温服。

【主治】伤寒头痛发热，项脊强，恶寒无汗，
用发汗药二三剂而汗不出，脉无力者，此阳
虚不能作汗，名曰无阳证。

【加减】夏月热盛，加黄芩、石膏。

【方论选录】①《伤寒六书》：此足太阳药
也。《经》曰，阳之汗，以天之雨名之。太阳
病汗之无汗，是邪盛而真阳虚也，故以参、耆、
甘草、姜、桂、附子大补其阳，而以羌、防、
芎、细发其表邪。加芍药者，于阳中敛阴，散
中有收也。人第知参、耆能止汗，而不知能
发汗。以在表药队中，则助表药而能解散也。
东垣、丹溪治虚人感冒，多用补中益气加表
药，即同此意也。②《医方论》：此方但可施
于常时之不能作汗者。若在冬月，而脉见浮
紧，便是太阳之寒伤营，此方断不可用。注
中又引东垣、丹溪治虚人感冒多用补中益气
加表药，予不以为然，盖亲见喜用升、柴者
杀人无数，故不得不加意慎重，非偏执己见，
不喜升、柴，实不敢泥纸上之成方，误目前

之人命也。

【临证举例】荨麻疹 《中医杂志》(1985;
7:542):笔者从1979年11月至1983年3
月，应用再造散无选择地治疗100例寒冷性
荨麻疹患者。其中，男性56例，女性44例，
年龄大多在15至50岁之间。病程最长者10
年，最短者一星期，都曾不同程度的接受过
中、西药物治疗。再造散方药：淡附片10克，
北细辛3克，川桂枝10克，白芍10克，生
姜10克，大枣5个，炙甘草5克，生黄耆15
克，潞党参10克，大川芎5克，羌活10克，
青防风30克。开始以汤剂控制发作，待症状
消失后，再按上方比例制成散剂，每天服二
次，每次10克，连服一月，以资巩固。通过
治疗观察，最短者服一剂即中止发作，最长
者服十三剂始部分控制，服散剂半月后才完
全中止发作。当年治愈84例，次年追访复发
13例。

31730 再造散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】苦参八两半（油炒） 干漆一两
甘草五钱 川山甲（炒）二两

【用法】上为末。每服五分，用鲜蟹二只，
杵烂取汁，加酒调服，每日二次。至十日，则
长肉生眉。

【主治】大麻疯，眉落脚烂底穿者。

31731 再造膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】官桂四两 杜仲四两 牛膝四两
续断四两 甘草四两 大茴香四两 菟丝子
四两 天麻子四两 熟地四两 苁蓉四两
补骨脂四两 生地四两 小茴香四两 蛇床
子四两 紫梢花四两 木香一两六钱 芙蓉
叶三两二钱 附子二两 龙骨（生）二两四
钱 海马三两 羊腰子三对

【用法】上药酌予碎断，用香油三百六十两
炸枯，过滤去滓，炼至滴水成珠，入章丹一
百五十两，搅匀成膏，取出放入冷水中去火
毒后，加热溶化，再兑丁香四两、沉香一两

六钱、乳香一两六钱、没药一两六钱，雄黄一两六钱，赤石脂一两六钱，鹿茸(去毛)二两，阳起石八钱，冬虫草五钱，九味共为细末，兑膏油内搅匀摊贴。每张油重五钱，布光。贴丹田穴、肾俞穴。

【功用】强腰健肾，补气散寒。

【主治】气血虚弱，下元亏损，腰痛腿痠，肾囊冷湿。

31732 再造膏

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】细辛一两五钱 生黄耆二两三钱 生杜仲一两五钱 羌活八钱 茯苓 怀牛膝 防风各一两五钱 甘草一两二钱 生白芍一两五钱 川芎一两五钱 人参(去芦)一两五钱

【用法】以上药料用香油十五斤，炸枯去滓滤净，炼至滴水成珠，再入章丹九十两搅匀成膏。每膏药油十五斤兑肉桂面一两二钱、麝香一钱五分，搅匀。每大张净油八钱，每小张净油五钱。男子贴气海穴(即肚腹)，女子贴关元穴(即脐下)，腰腿疼痛贴患处。

【功用】补气固精，养血散寒。

【主治】男子遗精，妇女血寒，赤白带下，腰痠腿疼，身体瘦弱。

【宜忌】孕妇忌用。

31733 再黑膏

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】胡桃一枚(捶碎，去壳取全肉，于新瓦中心安顿，四边着慢火逼，渐渐簇火令近，时时拨转胡桃，令焦黑，地上放令冷用) 定粉一钱

【用法】上药一处研如膏，用小瓷盒收之。每用少许，先涂在白髭根上，方用镊子摘髭，急用手擦药入白髭窍内，后次即出黄髭。若三数次用，终身不白。每摘一髭，如此用一遍。

【功用】乌髭。

31734 再合宁心丹

【方源】《普济方》卷一一五。

【组成】白茯苓二两 山药一两半 防风一两 羌活一两 川芎半两 香附(白者)二钱 僵蚕二钱 天麻半两 甘草一两 全蝎二十一枚

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，温酒送下；或枣汤亦得。

【主治】一切风。

31735 再造至宝丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】大风肉 白蒺藜 防风 苦参各二斤 荆芥 胡麻 当归各一斤 天麻十两 黄连 乌药 棕灰 雄黄各五钱 海风藤 人参各八两 官桂 甘草各七两 天竺黄 檀香根各二钱 麝香一两

【用法】上为末，米糊为丸。酒送下。

【主治】大痲疯。

【加减】肺经毒盛，眉毛先落，加零陵香、皂角刺各二两；肝经毒盛，面起紫泡，加何首乌五两；肾经毒盛，脚底先穿，加血竭二两；心经毒盛，先损其目，加珠屑一两；脾经毒盛，遍身疮癣，加苍术八两；麻木不仁者，冷风也，加天麻蒂一两；肉死割切不痛，加霹雳二两；血死则溃烂成脓，加归尾八两；筋死则手足脱落，加白僵蚕三两；骨死则鼻梁崩塌，加骨碎补三两。

31736 再造还明丸

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】怀山药四两 木贼草二两 枸杞子三两 龙衣一两 望月砂二两 丹参 茯神 蝉衣 谷精草各三两

【用法】上为细末，水泛为丸。每服三钱，开水送下，早、晚各一次。

【主治】血虚肝热，目肿疼痛，渐生障翳，多泪羞明，隐涩畏光，视物不清。

31737 再造紫金丹

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】元麝一两五钱 冰片一两五钱 西黄七分半 文蛤七两五钱 朱砂七钱五分 千金霜五两 茅菇十两 雄黄五两 大戟肉

十两

【用法】上为极细末，饭捣为丸，朱砂为衣。

【主治】一切秽恶痧暑之毒，山岚瘴气，闭塞脏腑经络，昏迷不醒，呕吐。

31738 再生活血止痛散

《跌损妙方》。为《医学发明》卷三“复元活血汤”之异名。见该条。

耳

31739 耳膏

【方源】《医方类聚》卷七十八引《御医撮要》。

【组成】乳香 蓖麻子 通草各二分 附子一分 磁石一两 巴豆六分 杏仁 桃仁各三分 松脂 蜡蜜各一两 菖蒲三分

【用法】上件合煎。每以枣核大，绵裹塞耳内，旦换。

【主治】耳聋，耳内外肿出脓。

31740 耳疳散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】老生姜 5 克 雄黄 5 克

【用法】将老生姜挖一洞，然后装进雄黄粉末，再用挖出的生姜封紧洞口，放在陈瓦上，用炭火慢慢焙干，约七八小时成金黄色，研粉，过八十洞筛子，将粉装瓶备用。用 75% 酒精清洁外耳道，3% 双氧水清除干痂，用棉签涂药入外耳道，每天一次。

【主治】耳疳。

31741 耳鸣丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄八两 山茱萸(制)八两 茯苓八两 泽泻八两 黄连十两 龙胆草十两 黄柏十两 梔子(炒)十两 黄芩十两 当归十两 龟版(炙)十两 熟地十两 山药十两 五味子(炙)二两 芦荟二两 磁石(煅)二两 木香三两 青黛五两

【用法】上为细末，每一百三十六两细末兑麝香五钱，混合均匀研细，用冷开水泛为小丸，每十六两用朱砂、赭石各半共三两五钱

为衣闯亮。每服二钱，温开水送下。

【功用】滋阴清热。

【主治】肾水不足，肝热上升，耳鸣重听，大便秘结，小便赤黄。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(北京方)：忌辛辣、动火食物。孕妇忌服。

31742 耳鸣丸

《全国中药成药处方集》(南京方)。为《饲鹤亭集方》“耳聋左慈丸”之异名。见该条。

31743 耳底油

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【异名】治耳油(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】核桃仁油二钱(炼) 冰片二分 麝香一分

【用法】先将冰片、麝香研极细，与核桃油和匀。先将耳内脓水洗净擦干，再行滴入二三滴。

【功用】①《全国中药成药处方集》(北京方)：消炎止痛。②(天津方)：除湿解毒。

【主治】耳内生疮，流脓流水，肿痛作痒。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：忌辛腥食物。

31744 耳底散

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【异名】耳底白龙散(原书吉林方)

【组成】枯矾三钱四分 黄丹三钱四分 青花龙骨三钱四分 麝香七厘

【用法】上为细末，先用温开水蘸药棉，将耳中脓水洗净，再将药末用鸭毛或棉条蘸入耳内或吹入耳内。

【功用】《全国中药成药处方集》(吉林方)：解毒止痒，杀菌消炎。

【主治】①《全国中药成药处方集》(南昌方)：耳内肿痛流脓水。②(吉林方)：耳膜炎，疼痛难禁。

31745 耳炎散

【方源】《中药知识手册》。

【组成】猪胆膏 枯矾 黄连粉 樟脑

【用法】上为散，以棉裹塞耳孔内。

【功用】清火解毒，收敛燥湿。

【主治】耳内肿痛，流出脓水。

31746 耳桃煎

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】木耳（水泡去蒂，晒干，炒为细末） 核桃仁（去皮，捣为泥）各二钱

【用法】黄酒煎服。过半炷香，浑身汗出，是其验也。

【主治】妇女经闭。

31747 耳脓散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】水龙骨（煨）一钱 海螵蛸一钱 飞青黛一钱 枯矾三分 五倍子（炒黄）一钱 煨黄鱼齿五分 细薄荷五分 梅片三分 川雅连三分 蛀竹屑三分 石榴花瓣（炙脆）一钱

【用法】上为极细末。

【主治】耳疳脓水不止。

31748 耳疳散

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】白矾（枯）五分 麝香五厘 胭脂胚二分半 陈皮（烧灰）五分

【用法】先用绵杖子缠去脓，另用别绵杖子送药入耳口。

【主治】小儿、大人耳疳出脓及黄水。

31749 耳疳散

【方源】《丸散膏丹集成》引刘河间方。

【组成】麝香五厘 枯明矾二钱

【用法】上为极细末，将药棉捻净耳孔，掺入少许。

【主治】耳流脓水。

【备考】原方有胭脂，近因失真，故已不用。麝香嫌贵，可用冰片，加煨五倍子更妙。并为外科药。

31750 耳疳散

【方源】《中医外科学》。

【组成】五倍子 黄连 黄丹 枯矾 龙骨 海螵蛸各等分

【用法】上药加麝香、冰片少许，共为细末。

将药粉吹入耳窍内，每日二至三次。在第二次吹药时，用棉签将药卷净。

【功用】解毒收敛。

【主治】慢性耳脓。

31751 耳聋丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】巴豆两粒 全虫二个 麝香二厘 石菖蒲二寸

【用法】蒜汁为丸，莲子大，丝绵裹好。右耳聋塞左耳，左耳聋塞右耳，两耳俱聋者，次第塞之，一日一易。

【主治】耳聋。

31752 耳聋丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】龙胆草一两 大黄一两 黄芩一两 生地一两 醋柴胡一两 泽泻一两 木通一两 当归一两 车前子（炒）一两 黄柏六钱 甘草六钱 生栀子六钱 芦荟五钱 木香三钱

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，每十六两用青黛一两、滑石粉二两五钱为衣，闯亮。每服二钱，温开水送下。

【功用】清肝热，泄火通便。

【主治】肝胆火盛，头晕目眩，耳鸣耳聋，大便秘结，小便涩赤。

【宜忌】孕妇忌服。

31753 耳痛散

《全国中药成药处方集》（南京方）。为原书“吹耳散”之异名。见该条。

31754 耳聋神丹

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鼠脑一个 青龙齿 朱砂 梅冰 净乳香 麝香各一分 樟脑半分

【用法】上为细末，用鼠脑为丸，如梧桐子大。以丝绵包裹，纳入耳中。

【主治】伤寒温热症愈后耳聋。

31755 耳底八宝油

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】核桃仁十二两 香油四两 蛴螬五个 牛胆一钱

【用法】用香油炸核桃仁，加入蛎蛎、牛胆炸枯，过滤去净滓，候凉再兑麝香一分，冰片一钱，研细混合均匀，装瓶重一钱。每日上一二次，沾净脓水后，滴入一二滴。

【功用】消肿止痛。

【主治】耳内流脓水不止，或肿痛流血。

31756 耳底白龙散

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为原书(南昌方)“耳底散”之异名。见该条。

31757 耳脓独龙丹

【方源】《吉人集验方》。

【组成】生川乌(去皮脐)

【用法】上为细末，吹入耳中。数次即愈。

【主治】耳中脓血常流不息。

31758 耳聋左慈丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】耳鸣丸(《全国中药成药处方集》(南京方)、柴磁地黄丸《全国中药成药处方集》武汉方)。

【组成】熟地四两 山萸肉(炙)二两 茯苓一两五钱 山药二两 丹皮一两五钱 泽泻一两五钱 磁石三两 柴胡一两一钱

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：滋阴清热，益气平肝。

【主治】肾水不足，虚火上升，头眩目晕，耳聋耳鸣。

31759 耳聋左慈丸

【方源】《重订广温热论》卷二。

【组成】熟地黄八两 山萸肉 淮山药各四两 丹皮 建泽泻 浙茯苓各三两 煅磁石二两 石菖蒲一两半 北五味五钱

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】《中药成方配本》：补肝肾，通耳窍。

【主治】①《重订广温热论》：肾虚精脱，耳鸣耳聋。②《全国中药成药处方集》(杭州方)：肝肾阴亏，虚火上炎，头眩目赤，视物昏花，口舌干燥。

31760 耳聋故纸丸

【方源】《吉人集验方》。

【组成】破故纸十两

【用法】先用米泔水浸一夜，晒干；再用黄柏二钱煎水浸一夜，晒干；再用食盐二钱加水浸一夜，晒干；再用黑脂麻一斤，烧酒二斤，童便一斤，共煮干，取出再晒干炒香，取出故纸研末，不用脂麻，以陈米醋为丸，如绿豆大。每服二钱，食后用杜仲(炒去丝)一钱，知母一钱煎汤送下。

【主治】肾虚耳聋。

31761 耳聋烧肾散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】磁石一两(烧醋淬七遍，细研，水飞过) 附子一两(炮裂，去皮脐) 巴戟一两 川椒一两(去目及闭口者，微炒去汗)

【用法】上为细散。每服用猪肾一只(去筋膜，细切)，葱白、薤白各一分(细切)，入散药一钱，盐花一字，和搅令匀，以十重湿纸裹，于塘灰火内烧熟，空腹细嚼，酒解薄粥下之。十日效。

【主治】耳聋。

31762 耳聋鼠胆丹

【方源】《吉人集验方》。

【组成】活鼠一只(破腹取胆，真红色者是也) 川乌头一个(水泡去皮) 北细辛二钱 胆矾一钱五分

【用法】上为极细末，以鼠胆和匀，焙干研细，入麝香一分，口含茶满口吹入耳中，日吹二次。十日见功。

【主治】耳久聋不愈。

31763 耳聋开窍神效丹

【方源】《吉人集验方》。

【组成】真灵磁石(小豆大)一粒 川山甲(烧研)二分

【用法】用棉裹塞入耳中，口含生铁一块，耳中如风雨声即通。

【主治】耳聋。

共

31764 共殿香

《鲁府禁方》卷四。为原书同卷“香身丸”之异名。见该条。

列

31765 列节浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】列节二两 防风一两（去芦头）茵芋一两 黄耆二两 羌活二两 桂心二两 海桐皮二两 虎胥骨二两（涂酥，炙微黄）牛膝二两（去苗）附子二两（炮裂，去皮脐）生干地黄一两 芎藭一两 当归一两 枸杞子一两 白芷一两 败龟一两（涂酥，炙微黄）黑豆半合（炒熟）五加皮一两 酸枣仁一两

【用法】上锉细和匀，以生绢袋盛，用好酒三斗，密封瓶头，浸经一七日后开取。每日空心、午时及夜卧热暖一小盏饮之，其酒旋旋更添。

【主治】风，骨节疼痛，行立不佳。

【宜忌】忌生冷、猪、鸡、牛、马肉。

夺

31766 夺门丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】柞木枝一两 当归二两 川芎一两 人参一两

【用法】水煎服。

【主治】产妇交骨不开。

【备考】本方方名，《梅氏验方新编》引作“加味神柞饮”。

31767 夺天丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】龙骨二两（酒浸三日，然后用醋浸三日，火烧七次，用前酒、醋汁七次淬之）驴肾内外各一具（酒煮三炷香，将龙骨研末拌入驴肾内，再煮三炷香）人参三两 当归

三两 白芍三两 补骨脂二两 菟丝子二两 杜仲三两 白术五两 鹿茸一具（酒浸透，切片，又切小块）山药末炒五味子一两 熟地三两 山茱萸三两 黄耆五两 附子一两 茯苓二两 柏子仁一两 砂仁五钱 地龙十条

【用法】上药各为细末，将驴肾汁同捣，如汁干，可加蜜同捣为丸。每服五钱，早、晚用热酒送下。

【主治】男子天生阳物细小而不得子者。

【宜忌】坚忍房事者两月，少亦必七七日。

31768 夺关散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】牙皂（去弦，炮焦）三个 细辛一钱 明雄八分 白芥子八分 寸香十分 僵蚕五个

【用法】上为细末，备用。以竹筒吹鼻，男左女右。

【主治】发痫中痰，人事不知。

31769 夺郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苍术 藿香 香附 陈皮 砂仁 苏梗 生姜 草薢仁 省头草

【主治】湿滞土郁。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：清水煎服。

31770 夺命丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】大戟（麸炒） 甘遂（炒）各一分 苦葶苈半两（一半生，一半熟） 泽泻一分半

【用法】上为末，煮大枣肉为丸，如梧桐子大。每服三丸，若四肢肿者，名为顺水，星月上时温浆水送下，至天晓利下恶物；若四肢瘦而腹肿者，名为逆水，煎苦葫芦子、陈曲汤送下，小便频快是效。三日后，服补药矾石丸。

【主治】水气肿满。

31771 夺命丸

《圣济总录》卷一四七。为《圣惠》卷五十六“太一追命丹”之异名。见该条。

31772 夺命丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】半夏（大者，各四破之，用石薤荔一握锉碎，同半夏炒令黄色，去石薤荔，只用半夏）四十九粒 莲子肉四十九个 龙骨（煨，别研） 白茯苓（去皮） 远志（去心） 白矾（枯）各半两

【用法】上为细末，以车前草取自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心盐汤送下。

【主治】白浊。

31773 夺命丸

《妇人良方》卷十二。为《金匱》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

31774 夺命丸

《普济方》卷二五一。为《千金》卷二十四“太一追命丸”之异名。见该条。

31775 夺命丸

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】夺命丹（《灵验良方汇编》卷三）。

【组成】牡丹皮八钱 干膝 黑附子 当归尾各三钱 大黄（为末，好醋熬膏）八钱

【用法】上为末，以大黄膏同鸡子白捣匀为丸，如梧桐子大。每服五十丸，酒急吞下。即下。

【主治】产妇血寒凝滞，胎衣不下。

31776 夺命丸

《济阴纲目》卷十一。即《产育宝庆》“夺命丹”。见该条。

31777 夺命丸

【方源】《济阳纲目》卷七十二。

【组成】沉香 广木香 乳香 丁香（微炒） 苦苧苳各五分 皂角三分 巴豆（去皮，炒黄）四钱

【用法】上先将六味为细末，后将巴豆研细，同入一处再研匀，用熟枣肉为丸，如豌豆大，油单纸包裹。量病人大小，重者三丸，轻者二丸，皆以凉水送下。

【主治】心痛或急心痛，或绞肠痧，或积聚不思饮食，或湿痛、冷痛；小儿咳嗽泻痢；妇人血块积聚。

31778 夺命丸

《济阳纲目》卷八十五。为《丹溪心法附余》卷四“夺命丹”之异名。见该条。

31779 夺命丹

【方源】《博济》卷一。

【组成】朱砂二两 金箔八十片 膩粉半两 黄蜡三两 巴豆八十个（纸裹出油）

【用法】上为末，炼蜡为丸，如鸡头子大。每服以膩粉一钱，米饮一盞调下。如人行一里，药性动，下恶物。如药在其中，取出，掘一地坑埋三伏时取出，除却上面黑物，以麝香裹养之，如更用时，擘为两处重为丸，一粒可疗五七人。

【主治】伤寒阴阳二毒冲心。

31780 夺命丹

【方源】《幼幼新书》卷三十一引张涣方。

【组成】狼牙草 蒿竹 苦参各一两 雷丸 鹤虱 薏苡仁各半两

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如黍米大。每服十丸，取生地黄汁送下。

【主治】小儿虫动不止，攻心危困。

31781 夺命丹

【方源】《产育宝庆》。

【组成】附子半两（炮，去皮脐） 牡丹皮一两 干漆一分（捣碎，炒烟尽）

【用法】上为末，酹醋一升，大黄末一两同熬成膏，和药为丸，如梧桐子大。每服五七丸，温酒送下，不拘时候。

【功用】速去衣中之血。

【主治】①《产育宝庆》：胎衣不下。②《医略六书》：脉数涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：产后瘀血入胞，胞满腹胀，兼之少火不振，不能逐瘀下出，势甚危急，遂成逆症。黑附子振少火以推瘀下出，干漆灰破瘀血以逐瘀下行，牡丹皮凉血降瘀以防血晕也。大黄膏为丸，醋煮以收之，

酒下以行之，务使少火鼓舞，则瘀化气行，而胞衣自下，腹胀自退，何危迫之有哉！

【备考】本方方名，《济阴纲目》引作“夺命丸”。

31782 夺命丹

【方源】《幼幼新书》卷九引《张氏家传》。

【异名】通天再造丹。

【组成】真牛黄 蟾酥 辰砂 天麻 麝香（真者） 乌蛇（真者）各一分 青黛 甜葶苈（微炒）各半两 独角仙一枚（去足，使羽翼） 桑螵蛸 夜行将军（蝎也）各十枚 真脑子少许

【用法】上为细末，用猿猪胆汁为丸，如黄米粒大。急慢惊风、天钓，用新汲水煎薄荷、金银汤化下一丸。如小儿病极，药不下，滴鼻中，喷嚏，立灌下。

【主治】小儿急慢惊风。

31783 夺命丹

【方源】《幼幼新书》卷九引易忠信方。

【组成】乳香（研） 琥珀（研） 天南星 防风 白僵蚕（洗，炒） 麝香肉（别研） 茯神各一分 酸枣仁（去皮，炒） 远志（去心）各一两 芸苔子（炒）半钱 蝉壳（洗净）四钱 全蝎（炒）半两 天麻（酒浸）八钱 白附子三钱 天浆子二十一个 蜈蚣二条（炙） 木鳖子肉二钱（研）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服量大小加减一二丸，金银薄荷汤磨化下。

【主治】小儿急慢惊痫，手足掣搐、拘挛，上视，昏睡不省，角弓偏喎，不时语涩，行步不能，一切风证。

【加减】如急惊盛，加龙脑少许同磨；如慢惊，即加附子少许同磨化下。

31784 夺命丹

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】干蛤蟆一个（烧为灰） 蝉壳 蛇退皮各一分

【用法】上为末，麝香少许研匀。但是一切

疳，至午后服半钱至一钱，二岁即服一字，热米饮调下。后煎桃柳汤放温，浴儿后，便用青衣盖之，当有虫出，即效。

【主治】小儿五疳。

31785 夺命丹

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】白矾（枯） 黄丹（炒赤）各等分

【用法】上为末，以猪心血为丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】痢。

31786 夺命丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】川乌（酒煮） 苍术（米泔浸）各四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。空心服十五丸。忌见风，暖盖出汗。

【主治】中风，左瘫右痪，半身不遂，口眼喎斜，言语窘涩。

31787 夺命丹

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】朱砂半钱（研，水飞） 麝香（研） 麒麟竭（研）各半钱 牛黄（研） 龙脑（研） 没药（研） 熊胆（研） 粉霜一钱（研） 青黛三钱（研） 使君子十个（去壳，面裹煨熟，为末）

【用法】上为细末，取井花水滴水为丸，如豌豆大。每服一丸，以薄荷自然汁半蚬壳许化开，入温汤半茶脚调匀服之。若诸疳泻利不止，或惊热涎盛，吊眼发搐者，以三丸化下。

【主治】一切诸般惊风，天钓，暗风痫病，胎惊，发搐，上视，身直背强；及五疳肌瘦羸瘠，肚大脚细，发稀饑渴；便利脓血，水谷不化，洞泄下注；并温壮身热，口疮烦躁，叫啼。

31788 夺命丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】白僵蚕（炒，去丝嘴） 寒水石（煅） 贯众 缩砂仁 紫河车 山豆根 干胭脂 马屁勃各一两 白茯苓（去皮） 乌

贼鱼骨 磁石各半两 乌芋一两半 南硼砂一钱 象牙末一钱 甘草一两 飞罗面三两 金星凤尾草一两 麝香一钱(别研)

【用法】上为细末，滴水为丸，一两可作十五丸，蛤粉为衣。每服一丸，用冷水半盏放药内滚动，候沫起，吃水不吃药，细细呷之，不拘时候。

【主治】缠喉风，急喉痹，牙关紧急不能开者，重舌、木舌、单双肉蛾；并误吞竹木、鸡骨、鱼刺。

31789 夺命丹

【方源】《易简方》。

【组成】南星(炮)一分 蟾酥一分(酒浸一宿) 干蝎七枚(炒) 白附子半分(炮) 麝香一字(研) 青黛半分(研)

【用法】以粟米粥为丸，如绿豆大，以青黛为衣。每服一丸，荆芥、薄荷汤化下。

【主治】急惊风。

31790 夺命丹

【方源】《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)。

【异名】星斗丸(《本草纲目》卷三十二引《如宜方》)、四制茱萸丸(《医学入门》卷七)。

【组成】吴茱萸一斤(去枝梗，四两用酒浸，四两用醋浸，四两用汤洗，四两用童便浸，各浸一宿，同焙干) 泽泻(去灰土)二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前盐汤或酒送下。

【主治】远年日近小肠疝气，偏坠疼痛，脐下撮痛，以致闷乱；及外肾肿硬，日渐滋长，阴间湿痒抓成疮。

【临证举例】疝气 《续名医类案》：冯仲柔云，顷年，某仓使家传，将前方令药局中合卖，绍熙壬子冬，予亲曾得效，时苦奔豚寒气攻冲，小肠疝气，腹内引痛，神思闷乱四日，只一服，脏腑微动，痛苦失去，遂安。

31791 夺命丹

【方源】《普济方》卷三一〇引《朱氏集验方》。

【异名】接骨散

【组成】乳香 没药各一两

【用法】上为末，每服三大盏，温酒调灌，连进三五服。少刻，利血乃止。

【主治】打扑伤损，微有气者。

31792 夺命丹

【方源】《施园端效方》引李信之方(见《医方类聚》卷七十五)。

【组成】黄连 并泉石 寒水石(生) 白矾(生) 五倍子(去瓤) 诃子(去核) 铅白霜 黄丹各三钱

【用法】上为细末。每服一钱，冷酒调如稀糊，时时呷之，或干掺亦得。

【主治】危急咽喉，风热毒肿，闭塞涎壅，气不得通，水药不下，以致难救者；及白口疮、恶疮证。

31793 夺命丹

【方源】《施园端效方》引《药德全方》(见《医方类聚》卷一七九)。

【组成】川大黄一两 白僵蚕半两

【用法】上为细末，生姜汁为丸，如弹子大，阴干。生姜汁磨化下。

【主治】时气疙瘩，肿塞咽喉，水米不下。

31794 夺命丹

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《施园端效方》。

【组成】白矾 滑石各等分

【用法】同瓶器内烧，丸如半枣大。经坐子宫。

【主治】赤白带下。

31795 夺命丹

【方源】方出《云岐子保命集》卷下，名见《准绳·女科》卷五。

【组成】干荷叶 生地黄 牡丹皮各等分

【用法】上浓煎汤，调蒲黄末二钱匕。一服即定。

【主治】产后败血冲心，发热，狂言奔走，

脉虚大者。

31796 夺命丹

【方源】《医学纲目》卷十八引海藏方。

【组成】大黄(为末,置砂器中以水搅八十一遍,飞过)一两 牡蛎一两 生姜一两 没药 乳香各一钱

【用法】上为粗末,转作丸子一钱,用好酒一升,木炭火熬一沸,分二碗盛之,夜露一宿,早晨去滓,空心服。

【主治】恶疮痈疽发背。

31797 夺命丹

【方源】《杂类名方》。

【异名】返魂丹、再生丹、追命丹、延寿丹、来苏丹、知命丸、得道丸、寸金丹(《袖珍》卷三)、延命丹、来苏丸(《丹溪心法附余》卷十六)。

【组成】蟾酥半钱 朱砂三钱(水飞) 轻粉半钱 枯白矾一钱 寒水石一钱(水飞) 铜绿一钱 麝香一字 海羊二十个(另研)

【用法】上为细末,将海羊另研为泥,就药一处,丸如绿豆大,如丸不就,加好酒成之。病轻者一丸二丸,重者三丸,未效再服。服药法:先嚼生葱白一大口,极烂置手心,放药丸于葱内裹合,以热酒送下。暖处卧,汗出为效。

【主治】疔疮发恶心,及诸恶疮。

【宜忌】忌冰水。

31798 夺命丹

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【异名】救生夺命丹(《医方类聚》卷一七九引《新效方》)。

【组成】巴豆 半夏 天南星 乳香各半钱 硃砂 信实 黄丹各一字(一半为衣) 麝香少许 花斑螫八个(去翅)

【用法】上为细末,以蟾酥为丸,如米大。每服五丸,冷酒送下。疮在上,食后服;疮在下,食前服。如疮觉,一日服一丸,二日服三丸,三日者,服三丸,四日者,服五丸,

五日者,亦服五丸,五日后,反服如初,专记不服双丸。

【主治】一切诸般恶疮。

【宜忌】忌热饭一二时辰,温饭可食。

31799 夺命丹

【方源】《麻疹全书》卷三。

【组成】辰砂(择腰面者,以纱囊盛之,用升麻、麻黄、紫草、连翘四味同入砂罐,以新汲水、桑柴火煮一日夜,取出,将砂细研,仍将药汁去滓,飞,取末待干,听用)二钱 麻黄(连根节,酒蜜拌,炒焦)八分 蝉蜕(洗净,去足)三分 紫草(酒洗)五分 红花子三分 穿山甲(酒洗)五分 真蟾酥三分

【用法】上为细末,用醋酒为丸,分作千粒。周岁者半丸,二岁者一丸,最多者以三丸为止,热酒化服,厚盖取汗,汗出痘随出也。

【主治】风邪倒陷,及痘毒入里。

31800 夺命丹

【方源】《普济方》卷一九七引《经验良方》。

【组成】常山一两(细研,锉,先炒次用) 前胡半两(同炒)

【用法】上药各为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,一日三次。

【主治】寒症。

31801 夺命丹

【方源】《经验良方》引曾守壹方(见《医方类聚》卷一七九)。

【异名】万灵夺命丹(《奇方类编》卷下)。

【组成】朱砂 胆矾各一钱半 真血竭 铜绿各一钱 枯白矾二钱 雄黄三钱 蟾酥 轻粉各半钱

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,先用葱白三寸,令病人自嚼碎,吐出碎葱裹药在内,热酒送下,睡卧,如重车行五里之久,汗出或发热一阵即愈,或利为度,如病人不能嚼葱,搗碎葱白裹药,如前吞服,如不省人事,斡开口灌之。病在上,食

后服；病在下，食前服。

【主治】疔疮毒气向里，邪气入内，淫闷不已，水食不下，兼治痈疽发背，恶疮。

31802 夺命丹

【方源】《医方类聚》卷二六〇引《新效方》。

【组成】川郁金八钱（湿纸裹煨） 生辰砂二钱 巴豆二十四粒（去心膜油令尽） 麝香一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如芡实大，用辰砂更加金箔为衣。每服三丸，灯心汤化下。

【主治】小儿急惊，大人痼病。

【加减】若作寻常惊药锭子，减巴豆一半，加蛇含石。

31803 夺命丹

【方源】《永乐大典》卷九七八引《野夫多效方》。

【组成】朱砂 蝎梢（去毒用）各一钱 牛黄 轻粉 水银（锡少许，结砂子）各半钱 麝香 梅花龙脑各一字 青黛二钱 天南星（慢火炮裂，中心取二块）皂角子大

【用法】上先将南星净乳钵内研如粉，次入蝎梢又研细，后入前药一处研极细，用石脑油为丸，如樱桃大。三岁以上儿服一丸，三岁以下服半丸，煎薄荷汤化磨开与服。只一丸，逐下惊涎见效。

【主治】小儿急慢惊风，涎喘壮热，手足搐搦。

31804 夺命丹

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】白僵蚕（炒，去丝用） 寒水石（飞） 山豆根 紫河车 干胭脂 贯众 缩砂仁 马屁勃各一两 地栗沙一两 飞罗面一两 金星凤尾草一两 麝香（另研）半两

【用法】上为末，滴水为丸，每药一两作十五丸，蛤粉为衣。每丸冷水半盏，放药在水中，其药略有水米泡起，不用药，只服水半盏，不拘时候。

【主治】缠喉风，急喉闭，牙关不能开，重舌、木舌、双乳蛾；并误吞竹木、鸡、鱼骨刺。

31805 夺命丹

【方源】《普济方》卷二〇四。

【组成】马草节半两（炒干，再用蜜炙黄色） 拣丁香 广木香 槟榔 藿香叶各五钱

【用法】上为末，每服三分，煎柿蒂汤调下。

【主治】五膈食噎。

31806 夺命丹

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】丁香四十九粒 巴豆四十九粒 杏子四十九粒

【用法】上捣为泥，用净黄蜡化开，作一块为丸，如梧桐子大。如用时，空心服三七丸。赤痢，甘草汤送下；白痢，生姜汤送下；赤白者，甘草、姜汤送下。

【主治】远年久日赤白一切痢。

【宜忌】忌一切荤腥油物。

31807 夺命丹

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】吴茱萸半斤（分作四份，酒、醋、小便、米泔四处浸三宿，取出晒干）

【用法】上为末，加海带、海藻、海螵蛸、泽泻共四味同为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食前酒送下。

【主治】癫疝。

31808 夺命丹

【方源】《普济方》卷二五六。

【组成】没药半两（别研） 血竭二钱（别研） 巴豆（去皮不去油）

【用法】上药各为细末，人巴豆为丸，如梧桐子大。每服一丸，若急心痛，木香汤送下；气食积，陈皮汤送下；妇人月水不行，红花酒送下；妇人血瘦，当归酒送下；疔疮，橘菊水送下，凉水亦得；痈疽肿毒，连翘汤送下，便毒，瓜蒌汤送下，打扑伤损，酒送下。

【主治】急心痛；气食积；妇人月水不行，

血瘰；疔疮、痈疽肿毒。

31809 夺命丹

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】血竭一钱 蟾酥 铜绿 明矾 朱砂 轻粉 大黄各半钱 麻黄半两（去根节） 麝香三字 海羊十五个（去蜗牛）（一方用龙脑二字）

【用法】上为细末，将海羊研细烂为丸，如鸡头子大。每服先嚼葱白三寸，然后用好酒送下一丸。如重车行七里，汗出为效。

【主治】一切疔肿。

31810 夺命丹

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】朱砂半钱 干胭脂一分 蟾酥

【用法】上为末。用带根葱一根，破开将药放入，用火烧软，每服一钱，须嚼碎好酒下，汗出为妙。

【主治】疔疮。

【备考】方中蟾酥用量原缺。

31811 夺命丹

【方源】《普济方》卷二七六。

【组成】金头蜈蚣一对 麝香一钱 轻粉一钱 朱砂少许

【用法】上为细末，用蟾汁和剂，不得用手和，用竹刀子切成黄米大，瓷碗内摇之成丸，放干用羽子筒盛之，经年不变色。吐逆恶心，每服三二丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】七十二证走彻恶疮。

31812 夺命丹

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】紫河车 密陀僧各半两 砂仁 贯众 僵蚕（直者） 乌鱼骨 茯苓各一钱 麝香少许

【用法】上为细末，面糊为丸，如弹子大。每服一丸，无根水浸二时，频饮。

【主治】咽喉一切肿毒，木舌、双乳蛾、喉痹。

31813 夺命丹

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】釜底墨一两 灶突墨一两 梁上

倒挂尘一两 牛黄一钱五分 黄芩一两 麻黄一两 小麻奴一两 辰砂二钱 黄连一两五钱 雄黄三钱 真珠一钱 寒水石一两

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸，如弹子大。以新汲水一盞，研一丸于水中，令化尽服之。若病人渴欲饮水者，与之多饮为妙。不欲饮水者，亦宜强与之，须臾，当发汗出乃解。若服下一时许不作汗，宜再服一钟，以汗出为止。

【主治】伤寒热结胸中，口噤不能言，阳毒狂言，不得汗，得温热时行病不得汗。

31814 夺命丹

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【异名】蟾蜍丸（《外科理例》）、飞龙夺命丹（《保婴撮要》卷十八）。

【组成】蟾酥（干者，酒化） 轻粉各半钱 白矾（枯） 寒水石 铜绿 乳香 没药 麝香各一钱 朱砂三钱 蜗牛二十个（另研）

【用法】上为细末，将蜗牛别碾烂，入药末同捣匀为丸，如绿豆大，如丸不就，入酒糊些少。每服一丸，生葱白三五寸，病者自嚼烂，吐于手心，男左女右，包丸药在内，热酒和葱送下，如重车行五七里，汗出为效，重者再服一二丸。

【主治】①《奇效良方》：诸般肿毒，疔瘰恶疮。②《口齿类要》：喉闭。

31815 夺命丹

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】人参（去芦） 南星（姜制） 半夏（炮） 独活 荆芥穗 远志肉 川芎 酸枣仁（炒） 白附子（炒） 川白芷 桔梗 甘草 石菖蒲各五钱 白茯苓 白术 天麻（炮） 全蝎（去毒） 防风（去芦） 羌活 茯神 川乌（炮，去皮） 僵蚕（炒） 细辛（去叶）各三钱 蝉蜕四十个（去泥） 辰砂 雄黄 麝香各一钱 金箔二十片 银箔三十片（五味乳钵研）

【用法】上为细末，以生姜汁打面糊为丸，如芡实大，以朱砂为衣。每服半丸或一丸，用

金银、薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】急慢惊风，胎风风痫，客忤物忤，目睛斜视，痰壅搐掣等证。

31816 夺命丹

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】巴豆一两(去壳，醋煮一伏时) 黄丹三钱(炒) 朱砂 雄黄各三钱 乳香 郁金各五钱 大黄一两 轻粉二十录 糖酥一钱或五分 飞罗面三两

【主治】上为细末，蜡水糊为丸，如绿豆大。随身年分虚实，加减丸数服之，以下其毒。

【主治】疗肿。

31817 夺命丹

【方源】《医学正传》卷八。

【组成】南星 半夏各四钱(为末，以生姜汁捏和作饼子，焙干) 珍珠(新白者，研)二钱 巴豆(去油净)一钱 朱砂四钱 金箔 银箔各十片 轻粉 麝香各五分

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。每一岁儿一丸，灯心汤化下。

【主治】急惊不省人事，目定直视，牙关不开，唇白或黑者。

31818 夺命丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】裘一个(即蛻螂所滚之裘丸，凡粪土下俱有，用裘中有白虫者，将裘少破一点仍盖住，火煨黄色存性，勿令焦) 麝香一分 孩儿茶二分 金丝黄矾三分 朱砂(春二分、夏四分、秋六分、冬八分)

【用法】上为细末，空心烧酒调服。如觉饥，大小米煮，渐渐少用，一日二三次，不可多吃。

【主治】翻胃噎食。

【宜忌】忌生冷、酱炒厚味、葱蒜、酒面、炙博等物，及气恼。

31819 夺命丹

《普济方》卷三五七。为《金匱》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

31820 夺命丹

《枝注妇人良方》卷十八。为《卫生家宝产科

备要》卷五“血竭散”之异名。见该条。

31821 夺命丹

【方源】《丹溪心法附余》卷四。

【异名】二乌丸(《医学入门》卷八)、夺命丸(《济阳纲目》卷八十五)。

【组成】天麻 白芷 川乌(去皮)各二钱 草乌 雄黄各一钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】破伤风，角弓反张，牙关紧急。

【备考】本方原名“夺命散”，与剂型不符，据《便览》改。

31822 夺命丹

【方源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】信石一钱 白矾二钱 白附子三钱 南星四钱 半夏五钱(洗)

【用法】上先用信石与白矾一处，于石器内煨红出火，黄色为度，却和半夏、南星、白附子为细末，生姜、面糊为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服七丸，小儿三丸，井花水送下。

【功用】劫痰。

【主治】上气喘急，经岁咳嗽，胸膈久不愈。

【宜忌】忌食诸恶毒热物，切不可犯铁器。

【方论选录】此方治咳嗽痰喘劫剂也，盖肺受火邪，气从火化，有升无降，加以脾湿生痰，则上壅而为喘嗽，满闷不得安卧矣。病作之时，固宜用此药以劫痰。然病安之后，即当用知母茯苓汤或人参五味子散、宁肺汤以补虚可也。

31823 夺命丹

《万氏女科》卷二。为《济生》卷九“霹雳夺命丹”之异名。见该条。

31824 夺命丹

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】麻黄(酒蜜炒焦) 升麻各三钱 山豆根 红花子 大力子 连翘各二钱半 蝉衣 紫草 人中黄各三钱

【用法】上为细末，酒蜜为丸，辰砂为衣。薄荷叶煎汤送下。

【功用】《景岳全书》：解发痘毒。

【主治】①《痘疹心法》：痘疮及发之时，但见干燥，其痘焦黑者。②《幼幼集成》：痘方起发，正值经期，其血大下，以致陷伏。

31825 夺命丹

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】苦参 桔梗 升麻 当归 白芍 连翘 荆芥 防风 羌活 苍术各四两 独活 茯苓 黄芩 川芎 蛇床子各二两 薄荷 大黄 白芷各五两 陈皮 半夏 干葛各三两 枳壳一斤 甘草一两 山梔八两 芒消三两

【用法】上均作十贴。水煎服。

【主治】麻风。

【备考】本方方名，据剂型当作“夺命汤”。

31826 夺命丹

【方源】《解围元藪》卷四。

【异名】九龙丹。

【组成】草乌 首乌 没药 黄芩 禹余粮 威灵仙 蒺藜 菖蒲 天麻 蓖麻子各一两 雷丸 川椒 荆芥 胡麻 麻黄 牛蒡子 白花蛇 赤芍 全蝎 乌梢蛇各一两 乳香 东米各三钱 蜈蚣一条 羌活 风藤各五两 木鳖子一两五钱 苍术 诃子各八两 皂荚一斤（锉碎）

【用法】无灰酒浸一夜，去酒，以新汲水一碗探其汁，银瓷器内熬膏，丸如梧桐子大。每服六十丸，茶送下。面足觉痒乃药力至。

【主治】诸大风。

31827 夺命丹

《医统》卷四十九。为《医方大成》卷十引汤氏方“夺命散”之异名。见该条。

31828 夺命丹

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】朱砂五钱 雄黄五钱

【用法】上为末，以蟾酥为丸，如菜子大。每服三丸，葱酒送下。取汗为效。

【主治】无名肿毒，疔疮发背；小儿急慢惊风；及疽疮，伤寒阴症。

31829 夺命丹

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】轻粉 麝香 白砒（制）各五分 白矾（煨） 辰砂（为衣） 血竭各一钱 蟾酥（干者，酒化入药）二钱 铜绿 寒水石（煨） 乳香 没药 雄黄各二钱 蜗牛（连壳）二十一个

【用法】上为末，先将蜗牛研烂如泥，匀和前药为丸，如绿豆大。如丸不就，加好酒打三五百下。每服二三丸，先用葱白三寸与病者嚼烂，吐于男左女右手心，将药丸裹入葱白，用无灰酒三四盏温热送下。被盖取汗为度，重者不过三服。

【功用】《金鉴》：退寒热。

【主治】七情内乖，营卫不和所致的阴阳二气疽，及疔毒恶疮肿痛。

①《准绳·疡医》：疔毒肿痛。②《金鉴》：七情内乖，营卫不和所致的阴阳二气疽，生于脊背之旁，乍肿乍消，时软时硬。③《丸散膏丹集成》：诸恶疮肿痛。

【宜忌】《丸散膏丹集成》：忌冷水。

31830 夺命丹

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】巴豆（去壳） 大黄各一钱 郁金 雄黄 乳香各五分 朱砂 黄丹各三分 轻粉二分 麝香少许 蟾酥不拘多少

【用法】上为末。面糊为丸，如绿豆大。每服五七丸至九丸，茶清送下。以利为度。

【主治】疔疮，大便秘实不通，或心腹痛者。

31831 夺命丹

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】川乌（火煨，去黑皮）一两 雄黄一钱

【用法】上为末，葱汁为丸，如莲子大。每服一丸，用葱叶一片将药裹内，火微烧，嚼烂，黄酒送下。衣盖汗出而愈。

【主治】破伤风。

31832 夺命丹

《景岳全书》卷六十四。为《理伤续断方》

“至真散”之异名。见该条。

31833 夺命丹

【方源】《玉案》卷五。

【组成】丹皮 官桂 赤芍 桃仁 芒消 各等分

【用法】上为末。每服四钱，滚酒送下。

【主治】子死腹中。

31834 夺命丹

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【异名】辟厉夺命丹（《易简方便》卷六）。

【组成】蛇退 蚕故子（烧灰不存性） 发灰一钱 乳香五分

【用法】上为细末。酒调下。

【主治】临产未产时，目翻口噤，面黑唇青，口中吐沫，命在须臾。

31835 夺命丹

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】大附子（炮，去皮）五钱 丹皮 大黄末各一两

【用法】上为末，将大黄末醋熬成膏，每两作八丸。姜汁和酒磨下。

【主治】血入胞衣，胀满不下。

31836 夺命丹

《灵验良方汇编》卷三。为《医统》卷八十五“夺命丸”之异名。见该条。

31837 夺命丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】番木鳖（瓷片刮去毛，真麻油煎枯） 川山甲（土炒） 甘草各一两 朱砂一钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如粟米大。分为三份各安开，一份用朱砂为衣，一份用雄黄为衣，一份不用衣，俱每服五分。不用衣者，咳嗽痰火，火眼虚劳，绞肠痧，冷茶送下；小儿急慢惊风，薄荷汤送下。朱砂衣者，胸膈饱胀，翻胃膈食，火酒送下；气膈，木香、火酒送下。雄黄衣者，伤寒、伤风、寒湿头痛发热，姜汤送下；偏正头风，川芎汤送下；痈疽发背对口，槐花一合炒黑，煎酒送下，杨梅、鱼口、疔疮、虎蛇伤、瘫痪、半

身不遂、湿痰流注，白酒送下；痰迷心窍，竹沥、姜汤送下。

【主治】伤寒、伤风、寒湿头痛发热；偏正头风；咳嗽痰火；火眼虚劳；胸膈饱胀，翻胃膈食；绞肠痧；瘫痪，半身不遂，痰迷心窍，痈疽发背对口，湿痰流注；杨梅、鱼口、疔疮，虎蛇伤；小儿急慢惊风。

【宜忌】忌风并咸、酸物。

31838 夺命丹

《种痘新书》卷十二。为《痘疹传心录》卷十四“夺命五毒丹”之异名。见该条。

31839 夺命丹

《仙拈集》卷四。为《回春》卷八“小夺命散”之异名。见该条。

31840 夺命丹

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】西牛黄 青黛 甘草各一钱 郁金 明天麻 白僵蚕 白附子 全蝎（去头足） 茯神 蝉蜕（去头足） 陈胆星各二钱 钩藤钩 桔梗 朱砂各五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，金箔三十张为衣。每服一丸，金银花煎汤调下。

【主治】小儿风搐痰气，急慢二惊。

31841 夺命丹

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】归尾三两 桃仁三两 血竭五钱 地鳖虫一两五钱 儿茶五钱 乳香一两 没药一两 自然铜二两 红花五钱 大黄三两 朱砂五钱 骨碎补一两（去毛） 麝香五分

【用法】上为细末，用黄明胶热化为丸，朱砂为衣。每服一丸，陈酒磨冲下。

【功用】通关窍。

【主治】一切重伤险症，脏腑蓄瘀危急之候。

【宜忌】《浙江中医杂志》：孕妇禁用。

【临证举例】外伤致瘀头痛。《浙江中医杂志》（1986；1：15）：以夺命丹为主方治疗本病 105 例，男性 70 例，女性 35 例，年龄 11

个月至 70 岁,病程 0.5 小时至 4 个月,其中脑震荡 39 例,头皮血肿 16 例,颅骨骨折 3 例,头皮创伤 16 例,头皮挫伤 31 例,全部病例均有不同程度头痛,时轻时重,心烦易怒,抑郁不乐,神昏欲呕,病程长者可见舌质紫黯,边有瘀血斑点,脉弦涩等。经治后,94 例痊愈(头痛与临床症状消失),9 例好转(头痛减轻,临床症状明显改善),2 例无效(头痛与临床症状无明显改善)。

31842 夺命丹

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】土鳖 归尾 大黄 红花 桃仁 自然铜 古文钱 乳香 没药 朱砂 儿茶 骨碎补 血竭 雄黄 黄麻根灰 麝

【主治】跌打重伤,危在顷刻者。

31843 夺命丹

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】真川连 麻黄(去节)各二钱 黄柏 黄芩各六钱 大黄五钱

【用法】上为末,用马兰根汁浸晒九次,取密竹一段,将药入内,火煨存性,研末。每服五分,石菖蒲、石斛、竹沥汤下。

【主治】小儿肺胀鼻衄。

31844 夺命丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】西牛黄 雄黄 天虫(焙) 全蝎(去毒) 明天麻各五分 珍珠粉二分 血珀 原麝各三分 天竺黄 蜈蚣(制)各一分 防风(酒炒) 白芷各二分半 蝉退(焙)一分半 青礞石一钱二分 陈胆星二钱 辰砂一钱

【用法】上为细末,用粉甘草浓汁量加炼蜜为丸,金箔为衣。每服一丸,钩藤、薄荷汤化下。

【主治】惊风。

31845 夺命丹

《金鉴》卷六十二。为原书同卷“白降丹”之异名。见该条。

31846 夺命汤

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】皂角三寸(去黑皮并子) 甘草二寸

【用法】同打碎。用水一盞,煎至半盞,去滓,入蜜少许,再煎三五沸,放温服,连进二服。且吃白粥一日。

【主治】喉风

【宜忌】忌油面、酒、鱼腥、炙煨诸热毒物一百日。

31847 夺命汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】银花 草河车 赤芍 细辛 蝉蜕 黄连 僵蚕 防风 泽兰 羌活 独活 青皮 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】红丝疔。

31848 夺命汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】吴萸 肉桂 泽泻 白茯苓

【主治】冲疝、厥疝痛上攻,脐悸,奔豚气上行。

31849 夺命汤

《华氏医方汇编》卷四。为《疫痧草》“夺命饮”之异名。见该条。

31850 夺命饮

【方源】《疫痧草》。

【异名】夺命汤(《华氏医方汇编》卷四)。

【组成】川连 石膏 犀尖 羚羊角 原地 丹皮 赤芍 青黛 马勃 鲜沙参 大贝 连翘 元参 金汁

【主治】疫火极盛,津液干涸,舌绛口渴,神烦喉烂,脉弦,大痧点云密者。

【备考】《华氏医方汇编》本方用法:水煎,金汁冲服。

31851 夺命饮

【方源】《外科医镜》。

【组成】当归二钱 白芷二钱 僵蚕二钱(炒) 明天麻二钱 蝉蜕二钱 大黄五钱 桃仁二十粒 羌活二钱 防风一钱 南星一钱半(制) 麻黄五分

【用法】水煎服。甚者五剂痊愈;如未愈,

去大黄再服，外以清和膏盖之。

【主治】破伤中风。

31852 夺命散

《理伤续断方》。为原书“至真散”之异名。见该条。

31853 夺命散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】黑豆一合 乌鸡粪 马牙消（研）龙胆（去芦头，锉碎）各一分

【用法】上四味，先将鸡粪及豆同炒熟，次入龙胆、马牙消拌匀。以酒三盏，煎二盏，分三次温服，不拘时候。

【主治】中风卒倒，不省人事，口面喎斜，失音不语，但吐涎沫，或口噤不开，目瞑垂死，一切风疾。

31854 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷九引《茅先生方》。

【组成】铜青 朱砂各二钱 膩粉半钱 蝎尾（去刺）十四个 麝香少许

【用法】上为末。每服一字半钱，用薄荷、腊茶清调下。

【功用】吐下风涎。

【主治】小儿急慢惊风，天钓，脐风，客忤，卒死，撮口，鹅口，木舌，喉痹，胛腮。

31855 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《吉氏家传》。

【组成】朴消 白矾 天南星各半两

【用法】上为末。小儿每服半钱，水一盏，同煎二分；大人水一盏，药三钱，煎七分，作一服。

【主治】喉闭。

31856 夺命散

《幼幼新书》卷九引《谭氏殊圣》。为《元和纪用经》“至圣散”之异名。见该条。

31857 夺命散

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《婴童妙诀》。

【组成】川乌尖 附子尖各七个（生用，去皮） 蝎梢七枚 石绿少许

【用法】上为末。用软鸡翅上药入喉中，逐旋惹出，频用帕子拭之。

【主治】小儿慢惊。

31858 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《张氏家传》。

【组成】升麻 糯米 紫草 甘草各半两 木通二钱半

【用法】上为散。每服一大钱，水七分，煎四分，去滓温服。

【主治】小儿疮麻已发未发。

31859 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷八引毛彬方。

【组成】赤头蜈蚣一条（去足，生用） 瓜蒂 藜芦（去须葱头者）各一分

【用法】上为细末。每发搐，笔管子抄一字吹入鼻中。

【主治】小儿惊风，涎潮搐搦，眼上不下，喘急，急慢风搐。

31860 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷十二引郑愈方。

【组成】蜈蚣（赤者）一条 轻粉 朱砂 麝香 白附子 牛黄各一分 水银（用枣肉少许研，不见星）一钱 蟾酥半钱 天南星一个（去心） 真珠（末）一字 巴豆霜三个（去油）

【用法】上为末，枣肉为丸。每服三丸，薄荷汤送下；口噤不开，研灌入鼻中；心烦壮热，荆芥汤送下。

【主治】惊风痫病，眼目翻视，牙关噤急，口内无气，唇赤。

【备考】本方方名，据剂型当作“夺命丸”。

31861 夺命散

【方源】《幼幼新书》卷二十六引赵氏方。

【组成】五灵脂 葛苣菜（阴干） 地黄花 黄丹（炒） 白矾（飞） 染胭脂 麝少许

【用法】上为末。看疮大小，浆水洗贴。

【主治】疳疮。

31862 夺命散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】芫花不以多少(用好酒浸一宿,慢火炒令黑色)

【用法】上为细末。每服二钱,食前热酒调下。

【主治】产后血迷、血晕,胎衣不下,恶血停凝,血块枕痛,脐腹疼痛;及赤白崩带,月候不定。

31863 夺命散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】人粪不拘多少

【用法】上用泥球子裹定,柴火内烧红,取出,不用泥,只将粪研细,入麝香少许。干掺上。

【功用】生肌。

【主治】久患漏疮见骨。

31864 夺命散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】干蛇头一个(酒浸,炙黄取肉) 赤头蜈蚣一条(酥炙黄) 干全蝎(去毒)一分 麻黄(去根节)一分 草乌头一个(去皮尖,炒黄,已上为末) 朱砂一分(研) 牛黄一分(研) 龙脑一钱(研)

【用法】拌匀细。每服一字,温酒调下,不拘时候。

【主治】小儿心肺中风,及风痉病。

31865 夺命散

【方源】《普济方》卷三七五引《全要方》。

【组成】白附子 黑附子(炮,去皮) 南星(炮) 天麻 防风 半夏(泡七次) 麻黄(去节) 朱砂 全蝎(新薄荷叶裹,生姜汁蘸炙三两度黄色) 各一钱

【用法】上人麝香半钱,为末。三岁半钱,薄荷、姜汁更同酒泡汤调下。

【主治】小儿急慢惊风。

【加减】急惊,加朱砂、轻粉。

31866 夺命散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】甜葶苈 香白芷 天南星 半夏(汤洗去滑) 巴豆(去壳不去油,并生用)

各等分

【用法】上为细末。每服半钱,用生姜自然汁一呷调下,小儿用半字。须臾,利下恶涎或吐涎立效。中风闭目不语,牙关紧急,汤剂灌不下者,此药辄能治之。

【主治】卒暴中风,涎潮气闭,手足痲痲,项背反张,牙关紧急,眼目上视,不省人事;并破伤风,搐搦潮作;小儿急惊风,属实涎极。

31867 夺命散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】乌头尖 附子底 蝎梢 雄黄各一钱 蜈蚣一对 硃砂 粉霜 轻粉 麝香 乳香各半钱 信二钱半 脑子少许

【用法】上为细末。先破疮,出恶血毕,以草枝头用纸带入于内,以深为妙。

【主治】疔疮。

31868 夺命散

【方源】《普济方》卷三七四引《保生集》。

【组成】赤脚蜈蚣一条(去足,生用) 瓜蒂 藜芦 葱白(去须)一分

【用法】上为末。每发搐,用一字吹鼻中。

【主治】小儿惊风,涎潮搐搦,眼上不下,喘急,急慢惊风。

【备考】方中瓜蒂、藜芦用量原缺。

31869 夺命散

【方源】《百一》卷十五引《既效方》。

【异名】全蝎延胡散(《直指》卷十八)。

【组成】元胡索不拘多少(盐炒过) 干蝎减半。

【用法】上为细末。每服半钱或一钱,温酒调下;若心痛,醋汤调下。

【主治】小肠气。

31870 夺命散

【方源】《百一》卷十九。

【组成】全蝎二十七个 蛇含石(醋淬七遍) 铁华粉 丁头大赭石各一两

【用法】上为细末。薄荷汤调下。

【主治】小儿急慢惊风。

【加减】如身热，入朱砂末少许。

31871 夺命散

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【异名】礞石散（《直指小儿》卷二）、霹靂散（《普济方》卷三七四）、夺命丹（《医统》卷四十九）、青礞石散（《种福堂方》卷四）。

【组成】青礞石一两（入白瓷内，同焰消一两用白炭火煨令通红，须消尽为度，候药冷如金色取出）

【用法】上为细末。急惊风痰发热者，薄荷自然汁入蜜调服；慢惊脾虚者，有以青州白丸子再碾，煎稀糊入熟蜜调下。

【功用】《直指小儿》：利痰。

【主治】急慢惊风，癫痫，卒暴中风。

①《医方大成》引汤氏方：急慢惊风，痰潮壅滞塞于喉间，命在须臾。②《普济方》：风疾癫痫。③《救急选方》：卒暴中风，痰涎壅塞，牙关紧急，目上视等危证。

31872 夺命散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】牛黄夺命散（《保婴集》）、牛黄散（《幼科发挥》卷二）、无价散（《万方类纂》卷五）。

【组成】槟榔 大黄 黑牵牛 白牵牛各等分（皆各半生半熟用之）

【用法】上为细末。蜜水调服。

【主治】小儿胸膈喘满，两肋扇动，痰涎潮塞及急惊风搐。

①《儒门事亲》：小儿胸膈喘满。②《卫生宝鉴》引《杨氏极济方》：肺胀喘满，胸高气急，两肋扇动，陷下作坑，两鼻穹张，闷乱嗽渴，声哑不鸣，痰涎潮塞。③《普济方》：小儿急惊风搐。

【宜忌】《普济方》：切忌不得于胸腹上灸之。

31873 夺命散

【方源】《济生》卷八。

【组成】红蛭（廌石灰慢火炒令焦黄色）半

两 大黄二两 黑牵牛二两

【用法】上各为细末。每服三钱，用热酒调下，如入行四五里，再用热酒调牵牛末二钱催之。须臾腑转下恶血成块或成片，恶血尽即愈。

【主治】金疮打损及从高坠下，木石所压，内损瘀血，心腹疼痛，大小便不通，气绝欲死。

31874 夺命散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施园端效方》。

【组成】川大黄一两 牡蛎（烧）半两 龙脑（服时用）一字

【用法】上为细末。每服三钱，用好酒三盏，煎至二盏，放冷入片白脑半字，分三次服。以利为度。

【主治】诸恶疮疽，毒气传内，呕逆溃乱，神昏不省。

31875 夺命散

《云岐子保命集》卷下。为《卫生家宝产科备要》卷五“血竭散”之异名。见该条。

31876 夺命散

【方源】《经验秘方》引李知州方（见《医方类聚》卷七十五）。

【组成】紫河车 薄荷叶 象牙末 硼砂 甘草各五钱 好茶少许

【用法】上为细末，蜜丸服。

【主治】单双乳蛾，喉闭口疮。

【备考】本方方名，据剂型当作“夺命丸”。

31877 夺命散

【方源】《中国医学大辞典》引《得效》。

【组成】天南星（炮）一两 白附子 天麻各三钱 辰砂（另研）二钱五分 黑附子（炮，去皮脐） 防风 半夏各五钱 全蝎（去毒）七枚 蜈蚣（炙）一条 麝香五分 僵蚕（炒）少许

【用法】上为末。三岁儿每服五分，薄荷生姜自然汁加好酒、沸汤各少许调下。

【主治】小儿急慢惊风。

【加减】急惊，去黑附子，加轻粉、脑子各少许；慢惊，去僵蚕。

31878 夺命散

【方源】《普济方》卷六十一引《卫生宝鉴》。

【组成】胆矾一两（别研） 白僵蚕一两（为末） 乌龙尾一两（别研） 天南星半两（为末）

【用法】上和匀。每用一二字，以鸡羽湿点药扫喉中，涎出，再点药入喉。候涎化为黄水出，方用温水漱口。

【主治】喉风。

31879 夺命散

【方源】《医方类聚》卷九十四引《烟霞圣效》。

【组成】紫菀花半两（醋炒干） 雄黄一钱

【用法】上为细末。每服半字一字，盐汤送下。如噤牙关，斡开灌药。

【主治】九种心气痛欲死者。

31880 夺命散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《烟霞圣效》。

【组成】精明乳香五钱 没药半两

【用法】上为粗末。每服抄一钱半，水一盞，煎三四沸，和滓稍热服，不拘时候。

【主治】脓血泻利遍数频多，腹痛欲绝者。

31881 夺命散

【方源】《永乐大典》卷一四九四八引《经验普济加减方》。

【组成】山梔子二十个（紧小者，去皮，炒） 黑附子一两（炮） 川干姜（炮） 甘草（炙）各半两 茯苓 白术各四钱

【用法】上为细末。每服五钱，水一升，煎至七分，去滓，更入盐半钱，温服三五服见效，老少加减。如阴户肿痛不可忍者，用椒末半两、白面二匙、干姜末半两、盐水和作饼剂，安阴户内，坐三二次，小便取了再坐。

【主治】妇人血气风虚，冷积痲痹，脐腹胀痛。

31882 夺命散

《普济方》卷二十四。为《三因》卷七“仓卒散”之异名。见该条。

31883 夺命散

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】胆矾 牙消 甘草 青黛各一钱

【用法】上为末。每用少许，用筒儿吹在喉中。

【主治】咽喉痛。

31884 夺命散

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】枯白矾 南硼砂 猪牙皂角（皮弦拣去）各等分

【用法】上为细末。吹喉中。痰出即愈。

【主治】急喉风。

31885 夺命散

《普济方》卷一一三。为原书同卷“玉真散”之异名。见该条。

31886 夺命散

【方源】《普济方》卷二五五。

【组成】绵纹大黄四两（去皮，炒存性） 麦蘖一两半（炒） 槟榔七钱半 茴香 瞿麦 地蒿蒿各二钱半

【用法】上为细末。每服虚实加减钱数，随证汤酒服之。

【主治】男子、妇人心中积热停痰，肠垢诸毒变成百病，酒面食积，痲癖气块，小肠疝，诸般膈气，反胃吐食，胸膈痞闷，胁肋疼痛，呕吐痰逆，头目昏重，偏正头风；或惊怖、口苦、舌干、噎气醋心，腹胀如鼓，大便不通；小儿赤沃，饮食过多，不生肌肉，心中烦躁，面色萎黄，肌体羸瘦，困倦少力，夜多盗汗，脾胃不和，泻痢脓血，久而成血癖、血瘕。

【加减】如妇人室女血脉不行，加木香、沉香、枳壳，煎当归汤调服；小肠气，用干漆、麦蘖、木通、炒茴香，煎汤服；木通、干漆二味，量病虚实用。

31887 夺命散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】白扁豆（生，去皮）

【用法】上为末。每服一钱，米饮调下；未下，煎数服亦可。

【主治】胎死腹中危甚。

31888 夺命散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】白矾（枯） 僵蚕（炒去丝） 硼砂 皂角（末）各等分

【用法】上为末。少许吹喉中。痰出愈。

【主治】急喉风。

31889 夺命散

《医方类聚》卷二二九引《徐氏胎产方》。为原书同卷引《济生》“香桂散”之异名。见该条。

31890 夺命散

【方源】《本草纲目》卷十七引《便民方》。

【组成】紫蝴蝶根一钱 黄芩 生甘草 桔梗各五分

【用法】上为末。水调顿服。

【主治】喉痹不通，浆水不入。

31891 夺命散

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】桃仁二十一枚（去皮尖，麸炒） 甘草 人参各半两 鳖甲 知母 天灵盖（醋浸一宿，酥炙）各一两 青蒿 柴胡 阿魏（四枣子大） 葱白一握

【用法】上以天灵盖、鳖甲为末，次下人参、知母、柴胡、甘草同捣，次下葱白、青蒿、桃仁、阿魏杵成饼子，慢火焙干为末。秤二钱，用童便二盏，煎一盏，露一夜，至五更三点暖服半盏。服了衣被盖卧，天明又暖半盏服之，扶病人强行五七步，三日勿洗手面指头，候生毛为验，每日早晨先饮白汤投之。

【主治】传尸劳。

31892 夺命散

《医统》卷七十六。为《百一》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

31893 夺命散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】乌梅 老茄子（经霜者） 芙蓉叶 青地松 威灵仙 过山龙 马鞭草 苍耳草

益母草各等分（煨） 生甘草 草乌 赤小豆

【用法】除甘草等三味，余锉细入瓶内，盐泥固济，火煨存性为末。疔疮，飞盐醋调；脑疽，背疮，加田螺壳灰、皂角灰，加黑背蜒蚰捣烂调；锁口疔疮，搽药在疮口内；阳症红肿，猪胆汁蜜调；小儿丹毒，加青靛花、胆汁调；便毒，猪脑调。

【主治】疔疮，脑疽，背疮，阳症红肿，及小儿丹毒、便毒。

【加减】脑疽、背疮，加田螺壳灰、皂角灰、黑背蜒蚰；小儿丹毒，加青靛花。

【备考】方中生甘草、草乌、赤小豆用量原缺。

31894 夺命散

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】赤脚蜈蚣半条（去头足，炙焦） 麝少许

【用法】上为末。猪乳调服。

【主治】小儿急惊风及撮口。

31895 夺命散

【方源】《外科百效全书》卷三。

【组成】人参五钱 木香一钱 当归一两 雄黄七分 乳香 没药各七分 益母草一两 朱砂八分 槟榔三钱二分

【用法】水搅面糊做饼，中央穿眼，候干，香炉灰为衣，好热酒调服。久不治，用蜈蚣制过入药内，同前服攻之。或用黄鳝串一根韭菜，生姜捣烂敷患处，或将艾火灸，服煎药。

【主治】附骨疽。

31896 夺命散

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【异名】定命散。

【组成】朱砂 寒水石 麝香各等分

【用法】上为末。每服五分，新汲水调下。

【主治】血汗。汗出污衣，甚如苏木水滴染。

31897 夺命煎

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【异名】牛李子膏、必胜膏（《小儿药证直诀》卷下）、夺命膏（《幼幼新书》卷十八引《谭氏殊圣方》）、必圣膏（《普济方》卷四〇三引《谭氏殊圣方》）。

【组成】牛李子（黑熟者）

【用法】上一味，用八月、九月内采，不计多少，沙盆内研，生绢绞其汁，银石器内慢火熬成煎，盛在瓷器内，勿令透风，煎杏胶汤化一皂子大与服，如人行二十里，更进一服，其疮自然红色，毒气便慢，杏胶只于七月内。

【主治】小儿疮疹毒气出不快，及触犯黑色。

【临证举例】疮疹《斑疹备急》：愚少年病疮疹痘疮，危恶殆极，父母已不忍视，遇今太医丞钱公乙下此药得安。

31898 夺命膏

《幼幼新书》卷十八引《谭氏殊圣方》。为《圣济总录》卷一六九“夺命煎”之异名。见该条。

31899 夺命膏

【方源】《洪氏集验方》卷二。

【组成】麻油四两（熬一二沸） 石蟹一枚（烧，米醋淬，才黑又烧，碎为末） 防风一两（切，焙） 蛤蚧一对（煨存性） 灯心灰一分 蜈蚣一条（烧存性） 全蝎七个（烧存性） 血竭一分（别研） 黄连半两（去芦，切，焙） 当归半两（切，焙）

【用法】上为末，用文武火熬麻油，滴水中不散，次入众药一处，急用柳枝不住手搅，候滴入水中成珠为度。候极冷，贴疮如常法。

【主治】肿毒发背，一切痈疽。

31900 夺真丹

【方源】《施园端效方》引王子敬方（见《医方类聚》卷八十九）。

【组成】半夏（姜制）一两 丁香一钱 槟榔 木香各二钱 藿香三钱 附子（炮，去皮）半两 缩砂仁 胡椒各二钱半 草豆蔻半两

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】营卫气虚，内受湿寒，传于胸膜，心腹痞闷，胁肋刺痛。

31901 夺痒散

【方源】《医方易简》卷三。

【组成】花椒一两 滑石二三两

【用法】上为细末，和匀。用生绢袋盛之，摩按痒处。

【主治】痘疮发痒。

31902 夺魂汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参 生枣仁 白芍各一两 茯神五钱 附子一分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，误吐、误汗、误下，而身热未退，死症俱现。

31903 夺魂散

《三因》卷十七。为《产育宝庆》“夺魄散”之异名。见该条。

31904 夺魂散

【方源】《活幼口议》卷十五。

【组成】白僵蚕（去丝，炒令黄色）半两 蛇含石（烧红，用米醋淬七八次，碾碎） 白附子（炮）各一分 生银 生金 牛黄（如无，以胆制，倍加用之） 乌梢蛇头（七、八寸许，酒炙） 白茯苓 天麻各二钱 天南星（秤末一分，生姜汁浸一宿用） 半夏末二钱（生姜汁浸一宿，各焙） 赤脚蜈蚣一条（酒浸，炙令焦） 犀角镑二钱 脑子 麝

【用法】上为末，蒸枣肉为丸，如〇大，朱砂为衣，每服十丸至十五丸、二十丸，煎金银、薄荷汤送下。

【功用】定痫。

【主治】小儿痫疾。

【备考】①本方方名，据剂型当作“夺魂丸”。②方中脑子、麝用量原缺。

31905 夺魄散

【方源】《产育宝庆》。

【异名】夺魂散（《三因》卷十七）。

【组成】生姜(取汁) 白面各三两 半夏七个(汤洗去滑)

【用法】上以生姜汁搜面,裹半夏为七饼子,炙焦熟,为末。每服一钱,热水调下,小便利为效。

【主治】妇人产后虚肿喘促。

【方论选录】①《济阴纲目》:此方甚奇,大概中宫有湿痰留积,致小便不利者宜之,犹服二陈汤能使大便润,而小便长也。②《医略六书》:产后寒痰积饮,留滞中宫而气道闭涩,故小便不利,胸腹肿满焉。半夏醒脾燥湿以化痰,姜汁温胃散寒以涤饮;面灰消溶滞气以和脾胃也。为散饮调,使痰消饮化,则胃调和而气道清利,小便无不畅快,何肿满之有哉。

31906 夺命方丹

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】麝香一钱半 大黄(生用)五钱 黑牵牛半两 甘遂二钱 泽泻半两 香附子二钱

【用法】上为细末。每服一钱,用白樟柳根汁半盏,无灰酒半盏,调药末顿热空心服之。年龄在六十岁以上与十五以下者,只可服半贴。大便取下恶物为效。

【主治】气蛊、劳蛊、血蛊、筋蛊、水蛊。

【宜忌】服此药后三日内,不可食鱼腥、盐、酱、湿面发气等物。

31907 夺命坐丹

【方源】《医方类聚》卷五十九引《必用之书》。

【异名】白虎丸。

【组成】寒水石不拘多少

【用法】上为细末,用两饴饭和成剂,捣千余下,丸如栗子大,晒干。每用一丸,临时于炭火内烧红,乘热研细,滚酒一盏调服,后葱醋汤投。汗出愈。

【主治】男子妇人阴毒。

31908 夺命金丹

【方源】《简易方》引黄医传秘方(见《医

方类聚》卷二五八)。

【组成】天南星(为末,用腊月黄牛胆汁拌和,入于胆内,挂当风处阴干,百日可用) 天竺黄 天麻 防风(去芦) 白附子(炮) 白僵蚕(炒,去丝嘴) 朱砂(另研) 各一两 蝉蜕(去土) 半两 麝香二钱(另研) 天浆子(炒) 二十一个 赤足蜈蚣一条(脊上开路,入麝香一钱于内,却用纸裹,焙干用) 牛黄半钱 蝎梢四十九枚(炒) 干蟾一枚(炙黄,去足)

【用法】上为细末,用东流水煮白面糊为丸,如鸡头子大,金箔为衣。每服先下白末子(即《局方》青州白丸子研为末)半钱,薄荷汤送下,后用生姜自然汁磨化下一粒,不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风,无药可理者。

31909 夺天造化丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】针砂(煅) 大麦粉各三两 红花 木香 泽泻 当归 赤芍 生地 牛膝 苏子 麦冬 川贝 陈皮 枳壳 香附 山楂 神曲 青皮 丹皮 地骨皮 五加皮 秦艽 川芎 乌药 玄胡 木通各一两

【用法】上为末,泛丸。每服三钱,开水送下。

【功用】《中药成药配本》:调理气血。

【主治】五劳七伤,九种心痛,诸般饱胀,胸膈肚痛,虚浮肿胀,内伤脱力,跌打损伤,行走气喘,遍身疼痛,精滑阳痿,肠红痞塞,面黄腰痛,妇女砂淋,白浊淫带,经水不调,产后恶露不尽,小儿疳膨食积。

31910 夺关将军散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】大黄二钱 杏仁(去油)一钱 地龙(焙,研)三条 桃仁二钱 车前二钱

【用法】上为细末。水煎泡服,入麝香三分。

【功用】导阴夺关。

【主治】酒伤蛊胀,小便闭塞不通。

31911 夺命川附汤

【方源】《普济方》卷一四〇。

【组成】川附一双（去皮脐，炮，切片）

【用法】上咬咀，作一服，水一碗，加生姜十三片，煎七分，滤出，水中沉冷，再露一宿，次早五更，冷服一二口，复歇，看腹有无发热，如无热，再进，作二三次服。其热自退。

【主治】体虚感冒，伤寒头疼发热，或日轻夜重，或午或早，或晚或终日，单发大热，虽渴不喜冷，脉沉细，气虚者。

31912 夺命无忧散

《普济方》卷六十引《如宜方》。为《局方》卷七“玉屑无忧散”之异名。见该条。

31913 夺命五毒丹

【方源】《痘疹传心录》卷十四。

【异名】夺命丹（《种痘新书》卷十二）。

【组成】牛黄二分 朱砂一钱 雄黄三分 冰片二分 蟾酥少许

【用法】上为末，用小猪尾血为丸，如麻子大。每服一丸，薄荷汤送下。即时红活。

【主治】痘黑陷倒靥。

31914 夺命回生散

【方源】《永类铃方》卷十二。

【组成】栝丁香 川芎 白姜（洗泡） 神曲 木香 肉桂 罗参各半两 大草果二个（炮，取仁） 诃子七枚（取肉） 砂仁二十一粒 莪术（炮）七钱半 粉草（炙）七钱半 巴豆十四粒（去壳膜，不去油，冷水浸一宿，另研为膏，留钵中）

【用法】上为末，入钵内和匀，巴豆膏再筛过，入瓦盒内，以油纸盖盒口，却用黄蜡和松脂溶，如法封固；每以十二月，于高爽地上埋土中三尺，至次年六月中伏节取出，向风处摊去湿气，以不漏瓦瓶收贮密封。壮实人，每服半钱，临睡百沸汤调半盏，顿服，仰卧片时，徐以温白粥压下。若羸弱，只服一字。

【功用】进饮食，止呕吐。

【主治】五噎五膈，翻胃呕吐不食。

【宜忌】忌生冷、鱼腥、粘腻并硬物一二月。孕妇不可服。

31915 夺命红枣丹

【方源】《拔萃良方》卷一。

【组成】当门麝一钱 梅花片一钱 杜蟾酥一钱（不见火，晒，研净末） 巴豆霜一钱（去油净） 月石三分（净末） 山豆根五分（净末） 老姜粉三分（用汁澄粉，晒干，净末）

【用法】上药照方拣选道地，研细称准，合匀，收贮瓷瓶。临用时，用小红枣一个，切蒂去核，外皮幸勿损伤，入药黄豆大许，将枣摘蒂一头塞入鼻孔，即闭口目避风，稍顷得嚏，喉渐通快，如出脓以银花、甘草漱之，病甚者，再换一枣。凡治喉症，男左女右，若左蛾塞左，右蛾塞右，双蛾更换塞之。塞药必得一周时拔出为妙，否则误事，慎之。

【主治】喉风痹，双单乳蛾。

【宜忌】忌鲜发、鱼、荤、青菜、辛辣等物。愈后忌七日为要。阴虚孕妇忌用。

31916 夺命更生散

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】干葛 知母 荆芥各五钱 防风 细辛 独莲 白芷各半两 青木香 泽兰 甘草节各半两

【用法】上咬咀。每服五钱，酒、水各一盞，加生姜五片，煎至一盞，温服。

【主治】痼疽。

【加减】潮热，皮肤受毒，加大黄（捣烂）、柴胡、地骨皮、麻黄（不去节）；呕吐恶心，脾胃受毒，加母丁香；疮凹不起，加蜜水调蝉蜕；发汗加黄芩、山梔子、灯心；眼花，心经受毒，先另服朱砂、雄黄、麝香为末，姜、酒送下，然后服此方；喘嗽，肺经受毒，加木瓜、黑牵牛、射盐；小腹胀，大小便闭结，脾经受毒，加苦葶苈、枳壳、木通、通草、麝香；疮冷，加当归、肉桂、人参、木香，去独莲；如疮发痛，及身上有热，再进一服，仍服前药；如当日疮痛身热，次日又冷，加¹

子一个，去防风。

31917 夺命还真丹

【方源】《医方类聚》卷二十四引《施圆端效方》。

【异名】神效夺命还真丹（《解围元藪》卷三）。

【组成】天麻 人参 木香 白术 菟丝子 藁本（去土） 川独活 川芎各一两半 白僵蚕（炒） 黄芩 全蝎（去毒） 半夏（姜制） 熟地黄（焙） 蔓荆子 甘草（炒） 桂 生地黄 地骨皮 薄荷叶 黄连（净） 菊花各一两 防风 茴香（炒） 知母 杜仲（炒丝断） 茯苓 柴胡（茸） 桔梗 陈皮（去白） 枳壳（炒，去瓢） 石膏 当归（焙）各二两 羌活三两 白芍药 麻黄（去节）各二两半 细辛（去叶）半两 蛤蚧一对（炙） 金箔四十箔（为衣）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十九。细嚼，热酒、热茶送下，不拘时候；妇人调血，香附子末，食前酒调送下，每日三次。

【主治】一切瘫痪，中风癱病，将死不救，洗头风，惊痫吐涎，暗风血风，妇人产前产后血气不调，及诸筋骨节疼痛。

【备考】《解围元藪》本方用法：遍身筋骨痛及心气痛不省人事，热醋汤下；冷风寒湿气顿抽掣走注，叫号日夜不安，黑豆炒焦烹酒下。

31918 夺命返魂散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】大黄 梔子 连翘各五钱 巴豆四钱（去皮） 杏仁四钱（去皮尖，二味用麸炒） 炒药麸四钱 苦丁香一钱 信一两（独蒜去心，盛信在火内烧去性） 牵牛头末二钱

【用法】上为末。每服重者一铜钱，轻者半钱，无根水调下。不吐可治，汗出愈。

【主治】一切疔疮，发热憎寒，昏闷不语，肿遍皮肤。

【备考】方中苦丁香用量原缺，据《普济

方》补。

31919 夺命沉香散

《普济方》卷一三八。即《博济》卷一“沉香散”。见该条。

31920 夺命抽刀散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】干姜（锉，入巴豆半两，同炒至黑色，即去巴豆） 良姜（入斑蝥一百个同炒，即去斑蝥）各二十两 糯米（炒）二十五两 石菖蒲（不见火）二十二两

【用法】上为细末。每服二钱，用盐少许，空心、食前沸汤点下，或温酒调尤佳，不拘时候。

【功用】醒脾胃，进饮食，解酒毒。

【主治】男子、妇人脾胃积冷，中焦不和，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，噎气吞酸，口苦无味，不思饮食，妇人久患血气刺痛，不可忍者。

【备考】本方方名，《医统》引作“抽刀散”。

31921 夺命轻粉散

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】铁渣一两 轻粉二钱 麝香少许

【用法】上为细末。每疮用针开十字口，将药放入疮内，用醋调面糊敷贴。

【主治】疔疮。

31922 夺命保生丹

《普济方》卷三七九。为《圣惠》卷八十六“青金丹”之异名。见该条。

31923 夺命追魂散

【方源】《普济方》卷二七六。

【组成】麝香一钱 金头蜈蚣一对（炒干黄色） 雄黄三钱 湿生虫四十五个（新瓦焙干焦）

【用法】上为细末。大人每服半钱，小儿半字，热酒调下。

【主治】七十二证恶疮入肠，寒热往来，吐逆。

31924 夺命独参汤

《普济方》卷一三三引《德生堂方》。为

《百一》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

31925 夺命神效膏

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】大黄 土鳖子 当归 川芎 赤芍 生地 麻黄 细辛 白芷 荆芥 防风 苍术 羌活 川乌 草乌 甘草 五灵脂 白芍 虎骨 防己 甘遂 海藻 大戟 芫花 白凤仙根 白薇 附子 乌药 南星 半夏 香附 肉桂 苍耳子 申姜 艾叶 角刺 枳壳 三棱 蓬术 卜子 巴豆 五倍子 独活 桃仁 红花 苏木 川断 连翘 梔子 苦参 干姜 蓖麻 甲片 全蝎 僵蚕 蜂房 山柰 甘松 皂荚 半支莲 过山龙 水红花子 玄参 紫金皮各一两 蛇衣一条 蜈蚣十四条 蛤蟆三只 血余一团 大蒜 葱头 生姜 桃头 柳头 槐头 桑头各三两 阿魏六两 木香 丁香 乳香 没药 血竭各二两 潮脑四两 麝香六钱 (后八味共研末, 收入膏内)

【用法】前七十五味, 用麻油十八斤, 浸春五、夏三、秋七、冬十日, 煎枯去滓, 再熬至滴水成珠, 每净油一斤下炒血丹七两搅匀, 入阿魏化尽, 次入细药, 稍温再下麝香搅匀, 乘热收贮。临用炖化摊贴。

【主治】内外一切恶症。

31926 夺命神蛇散

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】白花蛇 黑梢蛇各一条 (俱用酒浸一宿, 去头尾皮骨听用) 蕲艾 地龙三钱 (去土) 川芎 当归 天麻 蔓荆子 银花 细辛 沙参 甘菊 甘草 胡麻 草乌 木笔子 菖蒲各三钱

【用法】上为末。每服三钱, 温酒送下。须在静室中, 无风处服之, 上用被盖汗出为度, 切忌临风。

【主治】大麻风, 眉落鼻崩。

31927 夺命通关散

【方源】《普济方》卷八十九引《卫生宝鉴》。

【组成】踯躅花 川芎 华阴细辛 龙脑 薄荷各等分

【用法】上晒干为末。每用少许, 以笔管吹入鼻中, 如喷嚏乃可救, 急将生附子一枚, 须重一两以上者, 去皮薄切, 入厚朴, 切连皮老生姜十大片, 水一碗半, 同煎至半碗, 通口灌服。

【主治】中风涎上, 不省人事。

31928 夺命通关散

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】皂角二两 (如猪牙者, 去皮弦, 用生白矾一两, 以苧布包, 入水与牙皂同煮, 化去白矾, 再煮令干, 取出晒干, 为末) 辽细辛 (去土叶, 为末) 五钱

【用法】上合匀。每遇痰厥, 或喉闭不省人事者, 先以少许吹鼻, 候有嚏可治, 无嚏不可治, 却用蜜汤调服二匙, 即吐痰, 不吐再服。

【主治】中风中气, 痰厥不省人事, 牙关紧急, 汤水不下。

31929 夺命接骨丹

《中医伤科学讲义》。为原书“接骨丹”之异名。见该条。

31930 夺命救生散

【方源】《幼幼新书》卷二十。

【组成】桑白皮 白茯苓 杏仁 枳壳 人参 桃仁 陈皮 (焙) 秦艽 (净) 白芷各一两 麻黄 (去节) 柴胡各两半 甘草 (炙) 附子 (炮) 桂心 (生) 槟榔各半两 肉豆蔻三分 当归 (洗, 焙) 二两 麝三钱

【用法】上为末。鲇鱼大者二斤, 汤漂, 去淡血、头、肠、肚入药, 麻皮缚纸裹数重, 盐泥纸筋固济, 约厚六七寸许, 就地掘坑, 可容糠三箩, 先以箩半, 安坑底, 入泥球, 再以箩半铺满四旁, 发火一伏时, 取出将药并肉骨三处焙干, 一处杵末。每服二钱, 温酒调下。不胜酒, 水一盞, 桃、柳枝各三寸, 乌梅半个, 煎七分, 不拘时候服。

【主治】大小传尸，肺痿骨蒸，酒色食气，诸劳。

31931 夺命救痢饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】枳实二钱 大黄三钱 槟榔二钱 甘草一钱 当归八钱 白芍八钱 车前子三钱(引) 黑豆一两 荞麦一两

【用法】水煎服，缓缓一匙一匙咽之。咽之不吐能下，次日必有生机，能进饮食，用救阴煎，调理四五剂，痢全止矣，再以饮食调补。

【主治】噤口痢。

31932 夺命象皮丸

【方源】《寿世保元》卷八引益藩方。

【组成】象皮一两(酒炒，磨下用) 稳小鹅一个(即鹅蛋抱临出死于壳内者是，密纸封皮，煨黄色为度) 大附子五钱(童便煮) 黄花地丁(净花)一两 人参五钱 血竭五钱 沉香二钱 麝香五分 冰片一钱 马槟榔五分 牛黄五分 黄耆(蜜炙)五钱 细辛五分 射干一两 官桂一钱 鹿茸五钱 辰砂一钱 琐琐葡萄(小小无核者是)一两 木香一钱 白附子二钱 仙茅一两(黑豆汁煮) 甘草五钱

【用法】上为末，白酒醇打糯米糊为丸，如龙眼大。每服一丸，酒化下。

【主治】痘疮，气不足，空谷无脓。

31933 夺命雄朱丹

【方源】《普济方》卷二七五引《德生堂方》。

【组成】雄黄三钱 胆矾 枯白矾 铜绿 轻粉 朱砂 血竭各三钱半 蟾酥一钱 黄丹二钱

【用法】上为细末，于五月五日午时修合，以水糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，先用葱白三寸煎汤，患者自嚼烂吐出手心，却用药一丸，于葱裹定，好酒送下，病在上食后服，病在下食前服。切不要嚼药，恐伤牙口。不一时如拽重车行三二里，汗出即愈，或利

一行。

【主治】诸肿疔疮，痈疽发背，丹毒无名恶疮，色黑而痒，心惊呕逆，命在须臾。

31934 夺命紫金丹

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】琥珀一钱(甘草水煮一炷香，以青布裹之打碎，再用糯米泔水浸透，将瓷盘盛糯米，琥珀放米上，饭锅上蒸熟为度，将琥珀利刃切片如纸薄，研极细末) 钟乳石二钱五分(甘草水洗，新瓦略焙，用老姜切片，铺银罐内，乳石放姜上，以铁盏盖之，铁丝扎紧，用文武火煨一炷香，冷定开看，取出另研极细) 珍珠(包豆腐内煮一炷香，火不可太大) 冰片(另研) 西牛黄(另研) 各一钱 朱砂(研细，水飞)五钱

【用法】上为极细末。每服五厘，加飞罗面(炒过)二分五厘，合计三分为一服，土茯苓汤调下。每一小料，用丹药六分，炒面三钱，分作十二服，土茯苓十两，水煎分十二碗，去滓，每早用汤一碗，入药一服，搅匀服之。不可饮茶汤，多煎土茯苓汤当茶。

【主治】杨梅漏疮，并诸疮毒破烂见骨，经年不收口者，或筋骨疼痛不止，或遍身破烂出血，起皮一层，又起一层，或鹅掌风，赤白癫风，诸般顽癣，或骨烂，牙疳口臭，脓疮恶毒。

【宜忌】忌鹅、鸡、羊肉、房事。

31935 夺命箸头散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】真胆矾 草乌各四钱 绿矾六钱 雄黄(一方加白矾二钱)

【用法】上为细末。一箸头，点上咽喉，急吐涎沫，立应。次以大黄、甘草等分，俱为粗末，每次三服，水一盞半，煎至一盞去滓，化乳香一粒，温服，涤去热毒，恐为再发。

【主治】急喉闭，咽喉肿痛堵塞，气不得通，欲死者。

【备考】方中雄黄用量原缺。

31936 夺命揭散子

【方源】《卫生家宝产科备要》卷四。

【组成】甜葶苈(纸上微炒) 芫花(醋煮干,焙燥)各半两 郁李仁(汤浸,去皮) 地榆(锉)各一分

【用法】上为细末。每服一字,煎沉香、人参、钩藤子、防风汤调下。如牙噤者用物斡开灌下,调药汁不过一匙,不拘时候。沉香但磨药汁尤妙。

【主治】胎痫。妊娠四五月以上,忽然仆地,手足抽掣,咽中涎声滚滚,口眼不开,如小儿癰痲之状。

31937 夺命大青金丹

【方源】《卫生总微》卷五引马儿栗家方。

【组成】天竺黄一斤(末) 墨二铤(不计大小,亦不得使尽) 麝香一钱(研) 朱砂一钱(研,水飞) 水银半两 锡半两

【用法】上于铤内先熔锡化,入水银结砂子,乳钵内研开,次入诸药末研匀细,方用浓墨水为丸,如弹子大。以灰顿盆内铺纸,于纸上布药泡干。十岁儿一粒,分三四服,七八岁儿作四服,五六岁儿分六服,三四岁儿分十服,一二岁儿分十六服,新生百晬儿分三十服,并微利。常服者须隔旬日服一服,小儿风热发病,潮搐涎盛嗽喘,并临时加减,如吐泻后生风,服亦不妨。此药性温,宜少服,并用汤化下,如煎汤不可犯铁器。

【主治】小儿诸惊。

31938 夺命将军一枝花

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】血山七花(一名七叶灵芝)

【用法】阴干,水煎服;或鲜叶挤汁服。

【主治】疔疮表解后。

压

31939 压气散

【方源】《苏沈良方》卷四。

【组成】木香 人参 白茯苓 藿香 枳壳 陈橘皮 甘草(炙)各等分 附子(炮)减半

【用法】上服一大钱,煎紫苏、木瓜、生姜汤,再入银盏,重汤煎五七沸,通口服。

【功用】止逆定喘。

【主治】①《苏沈良方》:疏取多后,气乏控上膈者。②《御药院方》:气上及短气少气吃闷。

31940 压风汤

《傅青主男女科·男科》卷下。为《慈幼新书》卷七“压惊汤”之异名。见该条。

31941 压惊丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】紫石英 代赭石 蛇黄(各烧红、米醋淬) 铁粉(筛过净者)各二钱 朱砂 龙齿 白附(焙) 远志肉(姜汁浸,炒)各一钱

【用法】上为极细末,稀面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,金银煎汤调下。

【功用】定心镇痰。

【主治】诸惊虚惕。

31942 压惊汤

【方源】《慈幼新书》卷七。

【异名】压风汤(《傅青主男女科·男科》卷下)。

【组成】茯苓一钱 白术 神曲各五分 甘草 半夏 辰砂各三分 陈皮一分 砂仁一粒

【主治】惊未发时,觉身热面青,心悸不宁,啼叫恍惚,已发搐。

【加减】吐者,去甘草,加砂仁;泻者,加车前子。

31943 压掌散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】麻黄(去节)二钱半 甘草(炙)二钱 银杏四五个(捶破)

【用法】水一钟半,煎至七分,临卧时温服。

【主治】男女哮喘痰嗽。

【备考】本方方名,《本草纲目》引作“鸭掌散”。

31944 压热饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】犀角 大黄 知母 人参 茯苓 黄芩 黑参 麦门冬各一两半 甘草一两

【用法】上为末。每服一钱，以水一盞，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】眼偶被物撞破，外障。

31945 压热饮子

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】犀角 大黄 知母 白茯苓 麦冬 甘草 人参 生地 归尾 赤芍 蒺藜 红花 牛膝 香附

【用法】水煎，饭后服。

【主治】眼被物撞破，外障，撞久血滞不散，无疼痛。

31946 压气木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【异名】木香丸（《普济方》卷一七一）。

【组成】木香 丁香 白豆蔻（去皮） 肉豆蔻（去壳） 吴茱萸（醋浸一宿，炒令黄色）各半两 沉香三分 青橘皮（汤浸，去白，焙）一分 麝香（另研）二钱

【用法】除麝香外，上为末，入麝香研匀，用硃砂煎，猪胆汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】奔豚气，上冲胸膈。

31947 压热抱龙丸

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】天南星一两（切作片子，用雪水一碗，甘草一两匙，碎，煮软，切，焙） 雄黄一钱（水飞过，研细） 朱砂一钱（用乳钵研细） 牛黄半钱（研为末） 天竺黄二钱（研为末） 麝香一字（研入诸药，拌和）

【用法】上药和匀，滴雪水为丸，如鸡头子大。每服一岁以上一丸，三岁左右一丸半，日、午、临卧用薄荷汤化下。

【主治】小儿风热，痰盛惊痫搐弱，五心烦热，睡卧不宁，精神不悦。

31948 压热神白膏

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】大黄 白蔹 黄柏（生用） 南星 赤小豆 黑蛤粉各一两

【用法】上为末。用芭蕉汁调涂，如干仍以汁润之。

【主治】痈疽。

31949 压惊茯神散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】茯神半两 川升麻半两 犀角屑半两 代赭（细研） 钩藤 川大黄（锉碎，微炒）各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盞，煎至四分，去滓，放温，针后渐渐服之。

【主治】小儿无辜疳。

31950 压惊犀角饮子

【方源】《医方类聚》卷二五四引《保童秘要》。

【组成】犀角 升麻各一分 代赭（研） 吊藤皮 防风 大黄各半分

【用法】上切。以水五合，煎取二合，去滓，三岁以下，针烙后一日连连服尽。

【主治】脑后无辜者，是二筋结如弹丸，捏之皮下转。

仄

31951 仄生方

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】血管鹅毛（烧存性，为细末）三钱

【用法】产后，酒送下。一服永不受孕。

【功用】绝孕。

31952 仄红温胃饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】百草霜二钱

【用法】上为细末，糯米汤调下；鼻血，舌上及齿缝出血吹掺即止。

【主治】一切血症。凡伤酒食饱，低头掬损，吐血不止，甚至妄行，口鼻俱出，但声未失者；并鼻血，舌上及齿缝出血。

有

31953 有名漏浆散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】人参 菟丝 楂肉 黄耆 桑皮 归身 川芎 白芷

【主治】痘疹糊涂一片，浆不满足者。

31954 有腐生肌散

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】生石膏(甘草汤泡，飞五次)一两 月石五钱 辰砂三钱 冰片二分

【用法】上为末。掺之。疮疡腐肉凸出，用乌梅煨存性，研末掺之；疮疡冷不收口，以干姜末掺之；不生成皮者，五倍子末掺之；疮疡见风即成僵肉者，用寒水石研末敷疮上，再用铜绿盖之，即不成僵矣。

【主治】疮疡。

灰

31955 灰煎

【方源】《外台》卷二十九引《深师方》。

【组成】石灰一斗五升 湿桑皮四斗 柞栎灰四斗

【用法】上以沸汤令泔泔调湿，纳甑中蒸之，从平旦至日中，还取釜中沸汤七斗，合甑三淋之，澄清，纳铜器中，煎令至夜，斟量余五斗汁，微火徐徐煎，取一斗，洗乱发，干之，如鸡子大，纳药中即消尽，又取五色彩剪如韭叶大，量五寸，着药中亦消尽，又令不强，药成，以白罍子中贮之。外敷

【主治】瘤赘，癰痕，疵痣及痈疽，恶肉。

【备考】其血瘤，瘤附左右胡脉，及上下悬壅，舌本诸险处，皆不可令消，消即血出不止，杀人。

31956 灰水膏

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】木炭灰(择净细者)

【用法】冷水调涂牙痛处之脸上。止即去之。

【主治】牙痛。

31957 灰米膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】白川米 灰碱水

【用法】用成块火灰碱水调稠，将白川米插入灰内，留半米在外，片时许，候米熟，针挑损痣上，用米点痣上。可落矣。

【主治】黑痣浮浅者。

【宜忌】忌酱、醋。

31958 灰皂散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】新出窑石灰 楠皂自然水(楠皂又名石碱或土丙药) 黄丹

【用法】楠皂不拘量，放在房内通风的地方，使其自行吸收空气中的水分，慢慢溶化出液体，即叫自然水，溶多少倒多少，用玻璃瓶装好备用。黄丹原是粉末，不须再加配制，随时可用。用时先取石灰粉(不拘量)放于小杯中，加上黄丹少许，调匀后加入楠皂自然水，调成糊状，不宜过硬，也不宜过稀，调成后稍等几秒钟将药涂于痔核面上。因此药调成糊状后，会很快变成干硬，如发现过于干硬时，可即刻加入一些楠皂水调匀，使保持一定的稀度，所以必须随调随用，如果调好后10分钟以上，便会失去效力。

【功用】有腐蚀性作用，能使痔核发生干性坏死。

【主治】中、后期能脱出肛外的内痔。

31959 灰矿散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】古窑石灰 紫矿各半两

【用法】上为散。敷之。

【功用】止血。

【主治】金疮。

31960 灰草散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】荔枝壳(微烧存性) 草纸(烧存性) 多年陈茅草(晒干)

【用法】上为末。掺于烂处，即收水结痂。

【主治】痘溃烂。

31961 灰韭散

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】新石灰 韭菜 苎麻叶 小秦王草各等分

【用法】先捣三味，烂汁着石灰，再捣烂，和成饼子，乱草裹，放背阴处。用时碾碎末，干掺如神。

【功用】止血。

【主治】金疮。

31962 灰浆膏

【方源】《疡医大全》卷十八引胡公弼方。

【组成】天南星 半夏各一两 草乌(煨存性)五钱

【用法】上煎浓汁，去滓，入木莲蓬蒂上白浆一二两，采时以蛤蜊壳在蒂上刮取，搅匀，再用石灰以竹片拨炒，俟竹片焦黑成炭为度，徐徐投下，调成不稀不厚膏子，入瓷瓶收贮，黄蜡封口。用时如干，以唾津润开，敷瘤上；或木莲蓬浆润敷尤妙。二三日即愈。

【功用】消瘤。

31963 灰弹散

【方源】《普济方》卷三〇二。

【异名】金创灰蛋散(《跌损妙方》)、金疮灰蛋散(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】多年陈石灰 鸡子清

【用法】用多年陈石灰细碾，鸡子清调成团，煨过候冷，再碾细。若刀斧伤，掺之患处；若多年恶疮，以姜汁调敷。

【功用】止血。

【主治】刀斧伤，及多年恶疮，并金疮。

31964 灰糖水

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】古石灰(老塔庙古城墙取)三钱

【用法】入冷水搅浑，澄清去滓，调入砂糖二钱服。

【主治】干霍乱。

31965 灰藿膏

《准绳·疡医》卷五。为《圣济总录》卷十八“灰藿涂方”之异名。见该条。

31966 灰藿涂方

【方源】《圣济总录》卷十八。

【异名】灰藿膏(《准绳·疡科》卷五)。

【组成】灰藿不拘多少(烧灰，用纸衬，淋取汁，炼令如膏，约二匙许) 雄黄 丹砂 膩粉 麝香 蛤蟆灰 石硫黄 矾石灰各一钱

【用法】后七味为末，与炼了灰藿浓汁搅，煎如膏。涂之，干即易，膏硬以醋润之。

【主治】紫癜风。

存

31967 存安曲

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】山楂五斤 川芎 川羌活各二斤 苍耳子三斤 荆芥十五斤 麻黄 茶叶 苍术各五斤 陈皮三斤 紫苏二十斤 白芷 防风各十斤 葛根五斤 川厚朴二斤

【用法】上为粗末，面糊为饼，每块一两。成人每次一块，小儿减半，冰糖水送下。

【主治】伤风感冒。

【宜忌】虚弱忌用。

31968 存阴汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】熟地二两 茯苓 山药各一两 车前子五钱 白术二两 甘草 泽泻各二钱

【用法】水煎服。

【功用】急救肾阴。

【主治】口渴饮水，忽然大泻，一日或十余行，或数十行，昼夜之间，泻至数百次，完谷不化，直下无留。

31969 存命汤

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】羌活9克 防风9克 川芎9克 大黄9克 法夏9克 川乌9克 草乌9克 全虫9克 僵蚕9克 蜈蚣9克 蝉衣9克 南星9克 天麻9克 白芷9克 白附子9克 甘草9克 琥珀粉3克 朱砂3克

【用法】日用一剂。水煎浓缩为180毫升，分三次服。

【功用】祛风定痉。

【主治】破伤风初期。风邪侵袭经络，渐传

入里，内外相引，肝风妄动。

31970 存注丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍 白术 生地各三钱 麦冬 柏子仁各五钱 菖蒲 甘草各一钱 柴胡 花粉各二钱 青皮三钱

【用法】水煎服。

【主治】气郁不舒，忽忽如有所失，目前之事，竟不记忆，一如老人之善忘者。

达

31971 达生丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归三钱 青皮子三钱 阿胶(炒珠)三钱 沉香三钱 山药三钱 川芎三钱 菟丝子三钱 熟地三钱 黄芩二钱 於术二钱 川贝母二钱 艾炭二钱 杜仲炭二钱 续断二钱 麦冬二钱 橘皮二钱 芥穗二钱 厚朴(炙)二钱 枳壳(炒)二钱 羌活一钱五分 生黄耆一钱五分 砂仁一钱五分 甘草一钱五分 木香一钱五分 人参(去芦)六钱 茯苓四钱 杭芍四钱 鹿茸(去毛)一两 龙涎香一钱 苏叶一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。每服二丸，温开水送下，一日二次。

【功用】调经益气，养血安胎。

【主治】妇人气虚血亏，胎动不安，经期不准，胸满腹胀，腰疼腿痠。

31972 达生汤

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】当归二钱五分(酒洗) 川芎六分 益母草一钱(忌铁器) 车前子五分(炒，研末) 甘草三分(炙) 冬葵子一钱(炒，研末) 白术一钱(米泔水浸，炒) 大腹皮(滚水洗数次)四分 牛膝六分(酒浸一宿) 枳壳五分(麸炒) 木香三分(另磨) 生姜一片

【用法】水煎，食远服。怀孕至八、九月之后，连服数贴。

【功用】滑胎易产。

【加减】腹痛，加白芷五分，沉香五分。

31973 达生散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】束胎散(原书同卷)、束胎饮(《丹溪治法心要》卷七)、缩胎饮(《同寿录》卷三)、紫苏饮(《女科切要》卷五)。

【组成】大腹皮三钱 人参 陈皮各半钱 白术 芍药各一钱 紫苏(茎叶)半钱 甘草(炙)二钱 归身尾一钱

【用法】上作一服。加青葱五叶，黄杨树叶梢七个，或加枳壳、砂仁以水煎，食后服。于妊娠八九个月，服十数帖。

【功用】补益气血，顺气安胎，催产。

①《丹溪心法》：固胎。②《医统》：宣扶正气，散滞气。③《女科切要》：补中行滞，下死胎。

【主治】气血虚弱，胎产不顺。

①《万氏女科》：胎气怯，欲防难产者。②《增补内经拾遗》：妊妇九个月及气虚者。③《产孕集》：将产体实而旺者。

【加减】夏月，加黄芩(冬不必加)；春，加川芎；气虚，加参、术；气实，倍香附、陈皮；血虚，倍当归，加地黄；形实，倍紫苏；性急，加黄连；有热，加黄芩；湿痰，加滑石、半夏；食积，加山楂；食后易饥，倍黄杨树叶梢；有痰，加半夏；腹痛，加木香、桂。

【方论选录】①《医方考》：《诗》云，诞弥厥月，先生如达。朱子曰：先生，首生也。达，小羊也。羊子易生而无留难，故昔医以此方名之。然产难之故，多是气血虚弱，营卫涩滞使然。是方也，人参、白术、甘草养其气；当归、芍药养其血；紫苏、腹皮、陈皮流其滞。气血不虚不滞，则其产也犹之达也。②《医方集解》：此足太阴、厥阴药也。当归、芍药以益其血；人参、白术以益其气；腹皮、陈皮、紫苏、葱叶以疏其壅。气血不虚不滞，则临产自无留难之患矣。

31974 达生散

【方源】《女科撮要》卷下。

【组成】大腹皮(用黑豆汁洗,晒)三钱 人参 甘草(炙) 紫苏梗叶 陈皮各五分

【用法】加黄杨叶七茎,葱五叶,水煎服。妊娠八九月,服数剂。

【功用】安胎利产。

【加减】春,加川芎,夏,加黄芩。

31975 达生散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】白芍 黄芩 紫苏 枳壳各八分 陈皮 甘草 当归 川芎各七分 人参 大腹皮各一钱

【用法】加黑枣二枚,水煎服,不拘时候。妊娠九个月,日日宜服,并临产服之。

【功用】利产催生。

31976 达生散

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】人参五钱 白术(土炒) 甘草(炙) 当归 白芍药 紫苏 陈皮各一两 大腹皮三两(黑豆汁洗净,晒干用)

【用法】上为散。每服一两,水煎服。

【功用】临月服之令人易生。

【方论选录】产难之故,多是气血虚弱,营卫涩滞使然。是散用参、术、甘草益其气,当归、芍药益其血,苏、陈、腹皮流其滞,气血不虚不滞,则其产也,犹之达矣。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有生姜三片,大枣一枚。

31977 达生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】大苏梗一钱二分 归身(酒洗) 白术(土炒)各一钱五分(或用白芍一钱) 川芎(炒) 白芷 广皮 大腹皮(黑豆汁洗净,晒干) 枳壳(去瓢,麸炒)各一钱 川贝母(去心)临产用三钱,平日用一钱 炙甘草五分

【用法】每帖用河水二钟,加葱头二个,或加砂仁、生姜、黑枣亦可,煎八分,平时饥时服,产时温服。如不及早服,临产时加入

秋葵子末一钱。

【功用】安胎利产。

31978 达生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】大苏梗 当归(酒洗) 白芍(酒洗) 广皮各一钱 川芎七分 炙甘草五分 大腹皮八分(黑豆汁洗净,晒干) (一方加车前子、黄芩)

【用法】水一钟,加生姜三片,煎至八分,食远服。妊娠每月服三帖,至五个月服五贴,六个月服六贴,逐月递加,至十月不必服。胎前平日,如未服过此药,临产服一贴。

【功用】安胎利产。

【加减】虚者,加人参八分;小便闭结,头目眩晕,恶心呕吐,加黄连一钱(姜汁炒),山梔一钱(姜汁炒黑);有痰,加天花粉八分;胸膈痞闷,加焦神曲一钱;八九月后,可加白芷一钱半,川贝母一钱(去心),麸炒枳壳八分。

31979 达生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】车前子一两 秋葵子(炒,研) 白芷各三钱 枳壳二钱

【主治】难产。

【加减】连日未产,加牛膝二钱;痛而急坠者,加大腹皮八分;血虚无阵痛,加归尾、白芍、红花各三钱。

31980 达生散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归一钱半 白芍 腹皮各一钱 陈皮 甘草各五分 紫苏八分 黄杨树梢七个 葱三寸

【用法】水煎,入童便半盏和匀服。

【功用】调和血气,保产。

【加减】春,加川芎;夏,加黄芩;秋,加砂仁,枳壳。

31981 达生散

《女科切要》卷三。为《郑氏家传女科万金方》卷三“安胎和气饮”之异名。见该条。

31982 达郁汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】升麻二钱 元参九钱 干葛八钱 青蒿四钱 黄耆三钱

【用法】水煎服。

【主治】火郁于胸中，胃火与肝经之火共腾而外越，致生火丹。

【方论选录】此方之奇，奇在青蒿与元参同用，青蒿平胃火，兼能平肝火，然未免性平而味不甚峻；又佐之元参，则火势散漫，无不扑灭矣。然而青蒿虽平胃肝之火，而胃肝二火相形，毕竟胃火胜于肝火，故又佐以干葛之平胃。

31983 达郁汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】桂枝三钱 鳖甲二钱（醋炙焦，研） 甘草二钱 茯苓三钱 干姜三钱 砂仁一钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】积在脐腹、左胁者。

31984 达郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】升麻 柴胡 川芎 香附 桑皮 橘叶 白蒺藜

【主治】木郁呕酸，及阴痿不起者。

31985 达原丸

《全国中药成药处方集》（吉林方）。即《瘟疫论》卷上“达原饮”改为丸剂。见该条。

31986 达原饮

【方源】《温疫论》卷上。

【组成】槟榔二钱 厚朴一钱 草果仁五分 知母一钱 芍药一钱 黄芩一钱 甘草五分

【用法】用水二钟，煎八分，午后温服。

【功用】①《全国中药成药处方集》（吉林方）：避瘟去暑，解热，止呕利便。②《方剂学》：开达膜原，辟秽化浊。

【主治】①《瘟疫论》：瘟疫初起，先憎寒而后发热，日后但热而不憎寒。初得之二三日，其脉不浮不沉而数，昼夜发热，日晡益

甚，头疼身痛，其时邪在伏脊之前、肠胃之后，舌上白苔，甚则如积粉满布无隙。②《方剂学》：瘟疫初起，邪伏膜原，憎寒壮热，或昼夜发热，头疼身痛，胸闷泛恶，脉弦数，苔白腻者。

【加减】胁痛耳聋，寒热，呕而口苦，加柴胡一钱；腰背项痛，加羌活一钱；目痛，眉棱骨痛，眼眶痛，鼻干不眠，加干葛一钱。

【方论选录】槟榔能消能磨，除伏邪，为疏利之药，又除岭南瘴气；厚朴破戾气所结；草果辛烈气雄，除伏邪盘踞，三味协力直达其巢穴，使邪气溃败，速离膜原，是以为达原也。热伤津液，加知母以滋阴；热伤荣气，加白芍以和血；黄芩清燥热之余；甘草为和中之用。以后四味不过调和之剂耳。

【临证举例】①病毒性发热《中医杂志》（1981；5：33）：16例患者均发热，舌苔厚腻为主症，兼有头晕口苦，身体倦怠，胸闷纳呆，脉弦滑。体征有肝脾肿大，淋巴结肿大，体温在37.8℃～40℃。用达原饮加柴胡、葛根、大黄煎服，每日二剂，每煎300毫升，每隔六小时服150毫升。结果：仅二例6天热退，其余为2～3天热退。肝、脾、淋巴结均随体温下降而恢复正常。②水痘《河南中医》（1982；2：27）：梁某某，男，10个月。患水痘，用达原饮改为散剂治疗，共服3.6克，分六次服用而获痊愈。③小儿食积《湖南中医杂志》（1985；2：21）：周某某，男，6岁。伤食便溏，日行5～6次，不思饮食，腹胀大时痛，舌红苔腻，以达原饮加山楂、神曲，服一剂后，腹胀消失，食饮如故。

【备考】本方方名，《杂症会心录》引作“达原散”。改为丸剂，名“达原丸”、“至圣达原丸”（见《全国中药成药处方集》吉林方）。

31987 达原饮

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】黄芩一钱五分 甘草（炙）一钱 白芍一钱 知母二钱 厚朴一钱 槟榔二钱

草果一钱 生姜七片 大枣一枚(擘)

【用法】水煎，发前热服，温覆取微汗。

【主治】疫症壮热，多汗而渴。

【加减】若见少阳、阳明、太阳证、必兼柴胡、葛根、羌活以开泄之；设里气不通，势必盘错于中而内陷，则加大黄以攻下之，又可专工瘟疫。

【方论选录】本方以吴又可达原饮为主方，然表证未罢，误用里药则有结胸传里之变，即尚未离表，但须姜、枣佐芩、芍、甘草，以和解之。

31988 达原散

《杂症会心录》卷下。即《温疫论》卷上“达原饮”。见该条。

31989 达营丸

《中成药研究》(1978; 3: 30)。即原书“达营汤”改为丸剂。见该条。

31990 达营汤

【方源】《中成药研究》(1978; 3: 30)。

【组成】三棱 60 克 莪术 60 克 赤芍 30 克 生大黄 30 克

【用法】上药水煎三次，压榨取汁，制成浓煎，每剂 160 毫升，分二次服用，每日一剂。同服达营丸，直至下月发病日期后一星期，约服 30~40 剂，病情可控制，则停药汤剂，单服达营丸，每次 15 克，一日二次，连服 3~4 个月，疗效明显。

【主治】周期性精神病。

【宜忌】孕妇及月经过多、易出血者忌用。

【临证举例】周期性精神病 44 例周期性精神病(情感性精神病及精神分裂症)患者，经服用达营汤、丸，临床结果表明：有效 40 例，无效 4 例，治愈率为 90.9%。随访中有 8 例复发，经首次治疗而缓解后停药 1~3 年间，再次用药症状缓解，长者达 10 年，未复发者 32 例。

【备考】本方改为丸剂，名“达营丸”(见原书)。

31991 达气和中汤

【方源】《胎产护生篇》。

【组成】姜皮一钱 大腹皮一钱(炒) 苏叶一钱 黄芩一钱 白术(土炒)一钱 砂仁八分 陈皮二钱 人参一钱

【用法】河水煎，空腹服，不拘时候。

【主治】妊妇腹胀满。

31992 达气养营汤

【方源】《陆氏三世医验》卷五。

【组成】人参 黄连 归身 白芍 川芎 茯苓 木香 白豆蔻

【主治】妇人肝胆火郁，月经成块而发热。

【临证举例】火郁发热 董某某之妻，每自小腹气冲则热壅头面，卧不能寐，身似战慄，日中发热无常，至四鼓五鼓其热更甚，发热时腹中有块升起，经期参前而淋漓数日，饮食过于平时，而肌肉瘦削。予诊之脉数而弦，当为气郁，责之肝，起于胆久郁成火。以达气养营汤数剂以去瘀生新，夜热不发而病愈。

31993 达原败毒散

【方源】《言庚孚医疗经验集》。

【组成】杭白芍 15 克 花槟榔 羌活 独活 北柴胡 信前胡 苦桔梗 云茯苓各 10 克 川厚朴 牡丹皮 炒枳壳 薄荷叶 草果仁 粉甘草各 6 克 川芎 3 克 土牛膝 30 克

【功用】清热疏表，祛湿解毒。

【主治】时疫白喉，湿邪挟表，邪客膜原，症见白喉初起恶寒发热，头痛，骨节痠痛，口腔白膜初起，舌苔腻，脉浮数。

31994 达原解毒汤

【方源】《言庚孚医疗经验集》。

【组成】鲜生地 15 克 玄参 白芷各 12 克 麦冬 浙贝母 金银花 牛蒡子 山豆根 花槟榔各 10 克 射干 丹皮 厚朴 甘草 草果仁各 6 克 土牛膝 30 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】①《言庚孚医疗经验集》：疏风透达，清热瘴毒，豁痰开窍。②《古今名方》：清热解毒，滋阴凉血。

【主治】①《言庚孚医疗经验集》：急性喉炎，山岚瘴气，居伏膜原，蕴集肺胃，火动痰生，上蒸咽喉者。②《古今名方》：时疫白喉，表邪已去，恶寒已除者。

【临证举例】急性喉炎 吴某某，男，16岁，学生。咽壁红而肿胀，面青唇紫，呼吸急促，身热，脉弦数，舌红苔黄。诊断为“急性喉炎”（声音嘶哑）。治疗方法，外治刮痧及药贴，内服“达原解毒汤”，一周后痊愈。

戊

31995 戊药

【方源】《咽喉秘集》。

【组成】硼砂三钱 元明粉二钱 青盐一钱（用火煨红，放在地上，越一日去火毒）

【用法】上为末。擦患处。

【主治】重舌，莲花舌。

31996 戊油膏

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】番木鳖子不拘多少

【用法】用油煎枯，去木鳖子，加真轻粉一钱，枯矾三分。一上即愈。

【主治】多年治不好的秃疮。

31997 戊毒丹

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】番八八钱（去壳）

【用法】上为细末。搽咬处，外贴膏药。

【主治】常犬咬破，热疔疮。

31998 戊骨丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】白色狗屎 麝香少许

【用法】取白色狗屎，于长流水中淘出白骨，漂极净，瓦上炙黄，为极细末，入麝香少许，擦疳上。数次愈。

【主治】走马牙疳，并痘后牙疳。

31999 戊粮至宝丹

《痘疹仁端录》卷十四。为《准绳·幼科》卷六“至宝丹”之异名。见该条。

成

32000 成膏

【方源】《肘后方》卷八。

【组成】清麻油十三两（菜油亦得） 黄丹七两

【用法】铁铛文火煎，粗湿柳批篦搅不停，至黑色，加武火，仍以扇扇之，搅不停，烟断绝尽，看渐稠膏即成。齿疮外贴，痔疮内服。

【主治】齿疮，痔疮。

32001 成炼钟乳粉

【方源】《局方》卷五。

【组成】钟乳粉不拘多少

【用法】上取韶州者，无问厚薄，但颜色明净光泽者即堪入炼，唯黄赤两色不任用。欲炼亦不限多少，置钟乳于金银器中，即以大铛中着水，沉金银器于铛水中煮之，常令如鱼眼沸，水减即添。若薄乳，三日三夜即得，若粗肥厚管者，即七日七夜，候乳色变黄白即熟。如疑生，更煮，满十日最佳。煮讫出金银碗，其铛内煮乳黄浊水弃之，勿令人服，服必损人咽喉，伤人肝肺，令人头痛，兼复下利不止。其有犯者，食猪肉即愈。弃此黄水讫，更着清水，准前更煮，经半日许即出之，其水色清不变即止，乳无毒矣。即于瓷钵中，用玉锤着水研之。其钵及锤须夹白练袋，笼口稍长作之，使锤得转，兼通上下，每日着水搅令匀调，勿使着锤体，即封系练袋，自作字记，勿使人开，一即免纤尘入中，二即免人窃吃。研觉干涩，即是水尽，即更添水，常令如稀米泔状，乳细者皆浮在上，粗者沉在下，复绕锤体四边研之，不及者即粗细不均。为此，每日须一开或二开，搅括令匀，勿使着锤，即得匀熟，免有粗细。研至四五日，状若乳汁，研揩视之，状若书中白鱼腻即成。自然光白，便以水洗之，不随水落者即熟。若得水而落者即未成，更须研之，以不落为限。熟讫，澄取晒干。每服称半两，

分为三服，空腹用温酒调下，更量病轻重增减。兼可合和为钟乳丸散。

【功用】通音声，明目益精，安五脏，通百节，利九窍，下乳汁，益气补虚损，强阴，久服延年益寿，好颜色，不老，令人有子。

【主治】五劳七伤，咳逆上气，寒嗽，脚弱疼冷，下焦伤竭。

32002 成炼钟乳散

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】钟乳散（《济阴纲目》卷十四）、钟乳饮（《胎产秘书》卷下）。

【组成】钟乳粉

【用法】上用成炼者。每服二钱，浓煎漏芦汤调下。

【主治】乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。

【备考】本方方名，《普济方》引作“钟乳粉散”。《胎产秘书》本方用：钟乳粉二钱，漏芦三钱，煎汁服。

百

32003 百一膏

【方源】《医方类聚》卷一七二引《千金月令》。

【组成】蓖苳子一合 乌麻油一大升 乱发一拳许（灰汁净洗） 黄丹四两 蜡一两 绯帛子一方寸 松脂桃许大 丁香二七枚 曲头棘针二七枚（破之） 印成盐七枚（破） 柴胡一斤（末） 紫菀一斤 驴耳塞一钱匕

【用法】上药先以炭火煎油一二沸，即下乱发，煎令尽，仍以篦搅至药成，不得住手，次下黄丹，看沸，即下火，沸定，上火，次下蓖苳子，次下松脂，次下盐、丁香、绯帛，次下柴胡等，从旦至暮，杖上看色黑，先以指捻之，堪即熟，后下驴耳塞，仍待经宿，冷后却上火暖，然后置器中。以故帛摊附肿上。

【主治】发背、下疮、孔痢，一切毒疮肿。

32004 百二散

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】护心散（原书）、不二散（《赤水玄珠》卷二十九）。

【组成】甘草节 绿豆粉 朱砂各等分

【用法】上为细末。水调服之。

【主治】①《仙传外科集验方》：发疗疮烦躁，手足不住发狂者。②《赤水玄珠》：痈疽毒气冲心呕吐。

32005 百子酒

《仙拈集》卷三。即《奇方类编》卷下“多子酒”。见该条。

32006 百五散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】五倍子（炒黄） 百草霜

【用法】上为末。以醋调敷患处。一日夜即消。

【主治】鱼口疮初发三五日。

32007 百中汤

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】樗皮（炙） 黄连（去须） 枳壳（去瓢，麸炒） 芫荇各半两 生姜一分 豉半两 葱白三茎

【用法】上各锉细。以水五合浸经宿，平旦煎取三合，空腹服之。初服，经日昏沉后渐渐苏；未全效，更作一剂；热渴，与竹沥饮之。

【主治】小儿疳痢。

32008 百中饮

【方源】《霉疔新书》。

【异名】大百中饮（《汉药神效方》卷十）。

【组成】土茯苓（上好物）一七〇钱 杜仲二钱八分 甘草一钱八分 黄连一钱四分 槟榔 人参 牛膝 大黄（坚实者） 肉桂 黄芩 沉香（上好品） 川芎各一钱

【用法】上一剂，分作七贴，七日用尽。煎法：以水三合半煮取二合，再以水三合煮取二合，又以水四合煮取二合，俱和合，空心温服。

【主治】下疳梅毒，其它一切湿毒，积年不

愈,或头面腐溃,或鼻柱陷塌,已成废瘤者。

32009 百中散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《水鉴》。

【组成】黄葵花 白芷 延胡索各二分
槟榔十分 郁金四分 蚯蚓一条 黄盐六分
虾蟆少许 白米一勺 牛肉脯二分 蜘蛛
(灰)一个

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服一丸,空心煎骨汁送下。虫下除根。

【主治】小儿头发焦黄赤,日渐黑瘦。

32010 百中散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】草薢不拘多少

【用法】上为散。每服二钱匕,精羊肉四两,批作四片,糝药却合如快子,于炭上炙熟,细嚼,以酒半升送下。候腹痛如人行五七里,方上厕取下脓血及虫,只一服。

【主治】痔疾。

32011 百中散

【方源】《百一》卷六引魏不伐方

【组成】罂粟壳(去上下蒂顶鬲,锉成片子,蜜炒令赤色) 厚朴各三斤(去粗皮,用生姜汁淹一宿,炙令姜汁尽为度)

【用法】上为细末。每服二三钱,米饮调下。只一服便疏,再二三服即愈。

【主治】一切痢,不问赤白,或一日之间一二百行。

【宜忌】忌生冷、油腻、鱼鲙、毒物三日。

【备考】本方方名,《普济方》引作“百水散”。

32012 百中散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】罂粟壳(用姜汁浸一宿,炒干)

【用法】上为末。每服二钱,米饮调下。

【主治】久痢。

【宜忌】忌生冷油腻等物。

32013 百风汤

【方源】《女科百问》卷上。

【异名】省风汤

【组成】独活三钱 芎藭 防风 当归

桂心各二两 茯苓 附子 细辛 天麻一两
干蝎(炒) 甘草一两

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盞半,加生姜五片,煎七分,去滓,食前稍热服。

【主治】四肢垂曳,骨节疼痛。

【备考】方中茯苓、附子、细辛、干蝎用量原缺。

32014 百水散

《普济方》卷二〇九。即《百一》卷六引魏不伐方“百中散”。见该条。

32015 百生丸

《疡科选粹》卷二。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

32016 百生方

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】茯苓(去皮) 贯众 甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱,米饮调下。

【主治】百物入咽喉,鲠欲死者。

32017 百当膏

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】丹砂(研) 膩粉(研)各半两 水银 铅各一分(二味结成砂子) 牛黄 龙脑(研) 铅霜(研)各二钱 粉霜(研) 阳起石(研)各一分 黄蜡半两 巴豆(肥者,去皮心膜,研出油,取霜用)一百二十粒 蝎梢(炒)一分 半夏一钱(汤洗七遍,杵罗为末)

【用法】上为细末,熔蜡并熟蜜少许,同和成膏,旋丸如梧桐子大。每服三丸至五丸,吐逆,藿香汤送下;取热积,生姜、蜜水送下;取冷积,乳香汤送下;风凝,薄荷汤送下;便秘,米饮送下。

【主治】一切积聚,心腹疼痛,年月深久者。

32018 百岁丸

【方源】《普济方》卷二一〇引《卫生宝鉴》。

【组成】漏篮子一个(大者) 阿胶半两 木香半两 黄连半两 罂粟壳半两 乳香少许(别研)

【用法】上除乳香外,将其余五味锉成小

块,炒令焦黑色存性,不令烟绝,为末,乳香和匀,面糊为丸,如梧桐子大。每服一岁一丸,因其年数服之,米饮送下,不拘时候。

【主治】恶痢杂下及脾泄。

32019 百岁酒

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】蜜炙黄耆二两 大生地一两二钱 茯苓一两 龟版胶一两 肉桂六钱 抱茯神二两 大麦门冬一两 熟地一两五钱 羌活八钱 川芎一两 潞党参一两五钱 全当归一两二钱 陈皮一两 防风一两 于术一两 五味子八钱 枸杞子一两 大枣仁二斤 枣皮一两 冰糖二斤

【用法】泡高粱烧酒二十斤,合前药入瓶内,隔水共煮一炷香,或埋土中七日更好。每晚随量饮之。

【功用】水火既济,步履强健。

【主治】《集成良方三百种》:虚损劳伤,瘫痪诸风,失精亡血,阳衰气弱。

32020 百伤饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】干葛三两 净香附二两 升麻(净洗) 青皮(去白) 陈皮(去白) 谷芽(净洗,焙干) 麦芽(净洗,焙干) 桔梗(锉,炒) 紫苏(和根) 缩砂仁 甘草 神曲(炒) 赤芍药各一两 麻黄(不去根节) 枳壳(切片,麸炒微焦)各七钱半

【用法】上咬咀。每服二钱,水一盞,煎七分,不拘时候温服;或加生姜、葱白同煎。

【主治】感冒风寒邪气,不拘冷热二证。

【宜忌】慢惊、慢脾不用。

【加减】有积,加水酒曲;热多,添灯心、竹叶。

32021 百全丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】何首乌(雌雄各半)六两 天南星二两半(用生姜二两半制) 白附子(微炮)一两半 黄丹(炒)二两

【用法】上除前项黄丹外,为细末,入黄丹,

用白面二两半,加醋同调为糊,和有色为度,丸如梧桐子大。每服六七十丸,食后生姜汤送下;温酒亦得。

【功用】流行经络,开发郁滞。

【主治】风病。

32022 百合丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百合一两 紫菀一两(洗去苗土) 桂心半两 麦门冬一两(去心,焙) 皂荚子仁半两(微炒) 贝母一两(煨微黄) 五味子一两 干姜一两(炮裂,锉) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,研) 诃黎勒皮一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,入杏仁同研令匀,以枣肉为丸,如半枣大。以绵裹一丸,含咽津,不拘时候。

【主治】咳嗽上气,心膈烦闷,胸中不利。

【备考】《普济方》无皂荚子仁,有白芥子。

32023 百合丸

《卫生总微》卷十九。为《幼幼新书》卷六引张涣方“百合丹”之异名。见该条。

32024 百合丸

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】百合 百药煎 杏仁(去皮尖) 诃子 薏苡仁各等分

【用法】上为末,鸡子清为丸,如弹子大。临卧嚼化一丸。

【主治】①《医统》:失声不语。②《景岳全书》:肺燥失声不语。

32025 百合丹

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【异名】百合丸(《卫生总微》卷十九)。

【组成】桑根白皮 木通 川朴消 杏仁(汤浸,去皮尖) 川大黄 天门冬(去心)各半两 百合一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如黍米大。每服十丸,米饮送下。

【主治】小儿龟胸。

32026 百合丹

【方源】《得效》卷十二。

【组成】川大黄三分(焙) 天门冬(去心, 焙) 杏仁(去皮, 炒) 百合 木通 桑白皮(炒) 甜葶苈(纸上炒) 烂石膏各半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大。每服五丸, 食后、临卧熟水化下。

【主治】乳母酒曲无度, 或夏月热烦, 热乳与儿, 或乳母多食五辛, 小儿肺经受热所致之龟胸, 胸高胀满, 其状如龟。

32027 百合汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】百合 知母(焙) 鳖甲(去裙襕, 醋炙) 柴胡(去苗) 葛根(锉) 桑根白皮(锉) 各一两

【用法】上为粗末, 每服五钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓, 入生地黄汁一合, 搅匀, 食后温服, 一日二次。

【主治】伤寒后四肢烦热, 骨节疼痛。

32028 百合汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】百合 枳壳(去瓢, 麸炒) 麻黄(去根节) 天雄(炮裂, 去皮脐) 款冬花 昆布(洗去咸, 焙) 各一两半 贝母(去心) 当归(切, 焙) 五味子 紫菀(去苗土) 白石脂 黄连(去须) 各一两 黄芩(去黑心) 桂(去粗皮) 旋覆花(炒) 各半两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜三片, 同煎至八分, 去滓温服。

【主治】痰实上焦有热, 壅塞不利。

32029 百合汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】百合 人参 紫苏茎叶(锉) 猪苓(去黑皮) 桑根白皮(锉) 大腹皮(锉) 赤茯苓(去黑皮) 甘草(炙, 锉) 陈橘皮(汤浸去白, 焙) 各一两 马兜铃七枚(和皮) 麦门冬(去心, 焙) 枳壳(去瓢, 麸炒) 各一两

【用法】上为粗末, 每服四钱匕, 水一盞半, 加生姜一枣大, 同煎至八分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】肺气壅滞, 咳嗽喘闷, 膈腕不利, 气痞多渴, 腰膝浮肿, 小便淋涩。

32030 百合汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】百合 人参 甘草(炙, 锉) 甜葶苈(隔纸炒过) 桑根白皮(锉) 款冬花(微炒) 各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 入去皮杏仁七枚, 糯米百粒, 乌梅一个, 同煎至六分, 去滓, 食后温服。

【功用】润益咽喉, 发利声音, 生津液, 解烦劳。

【主治】咳嗽。

32031 百合汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】百合 旋覆花(去枝叶) 桑根白皮(锉) 木通(锉) 前胡(去芦头) 赤茯苓(去黑皮) 防己 槟榔(锉) 天蓼子 半夏(汤洗去滑, 焙) 郁李仁(汤浸, 去皮尖, 炒, 别研) 桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒, 别研) 防风(去叉) 防葵 木香 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞半, 加生姜半分(拍碎), 同煎至七分, 去滓, 食前温服, 一日三次。

【主治】风毒脚气, 痰厥头痛。

32032 百合汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】百合 黄耆(锉) 各二两 麦门冬(去心, 焙) 半两 白茯苓(去黑皮) 人参 防风(去叉) 木通(锉) 桑根白皮(锉) 各半两 枳壳(去瓢, 麸炒) 蒺藜子(炒去角) 酸枣仁 石膏各一两 薏苡仁一合

【用法】上为散。每服三钱匕, 水一中盞, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】眼欲变青盲。

32033 百合汤

【方源】《普济方》卷三八七引《医方妙选》。

【组成】百合 紫菀 白术 人参各一两 白茯苓 青皮 甘草 麦门冬(去心)各半两

【用法】上为细末，每服一钱，水八分，加竹叶三片，薄荷二叶，煎至五分，去滓温服。

【功用】调肺，解风壅。

【主治】《卫生总微》：肺经风寒，痰壅不利。

32034 百合汤

【方源】《内经拾遗》。

【组成】百合

【用法】水二钟，煎八分，不拘时候服。

【主治】肾虚解悸。

32035 百合汤

《伤寒全生集》卷四。为《金匱》卷上“百合地黄汤”之异名。见该条。

32036 百合汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归 川芎 白芍 生地黄 桔梗 黄芩 柴胡 地骨皮 百合 麦门冬 黄耆 远志(甘草水泡，去骨) 枣仁(炒，去壳) 蔓荆子

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】妇人血虚劳怯，午后发热，夜出盗汗，四更汗止热退，咽痛口干，恶心，心慌头痛。

32037 百合汤

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】柴胡(去芦)一钱 人参(去芦)五分 黄芩一钱 甘草五分 知母(去粗)八分 百合一钱二分 陈皮(去白)一钱 生地黄七分

【用法】上咬咀。水一钟，加生姜三片，捶碎，醋煮鳖甲，煎之温服。

【主治】暑病已愈而触犯者。

【加减】渴，加天花粉；胸中烦热，加山栀；有微头疼，加羌活、川芎；呕吐，入姜汁炒

半夏；胸闷，加枳壳、桔梗；食复者，加枳实、黄连，甚重大便实，加大黄；胸中虚烦，加竹茹、竹叶；愈后干呕、错语失神、呻吟、睡不安，加黄连、犀角；咳喘，加杏仁；心中惊惕为血少，加当归、茯神、远志；虚汗，加黄耆；脾虚，加白术；腹如雷鸣，加煨生姜；劳复时热不除，加葶苈、乌梅、生姜、生姜汁。

32038 百合汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】贝母一钱 瓜蒌仁 枳壳 桑白皮各八分 百合五分

【用法】水煎服。

【主治】肺痈，咳嗽脓血。

32039 百合汤

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】枣仁 怀生地 当归 黄耆 汉防己 苏子 瓜蒌仁 桑白皮 川贝母 百合 薏苡仁 牡丹皮 甘草 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】肺痈。

【加减】有嗽，加款冬花。

32040 百合汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】百合(水浸半日) 川芎 当归 白芍 荆芥各二钱

【用法】水煎服。

【主治】跌扑闪挫，呕吐。

32041 百合汤

【方源】《时方歌括》卷下。

【组成】百合一两 乌药三钱

【用法】水二杯，煎七分服。

【主治】心口痛，服诸热药不效者，亦属气痛。

【临证举例】胃脘痛 《中医杂志》(1982；8：16)：陈某某，男，44岁，脘痛而胀，按之痛减，嘈杂，嗳气，泛酸，知饥纳少，舌苔微黄，质淡红，脉弦细。曾服理气止痛诸方，初尚有效，继则复痛如故。因思此证痛

而兼胀，必属气痛；嘈杂泛酸，知饥纳少，服辛温行气药不效，其病偏热无疑，故用百合汤，服三剂之后，胀痛减轻大半，继服数剂而愈。

32042 百合汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】百合 升麻 黄芩 牡丹皮 生地黄 鳖甲 桔梗 沙参各等分 甘草二分

【用法】水煎服。

【主治】寒热虚咳，殆类劳者。

32043 百合汤

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】百合三钱 紫菀一钱 贝母一钱 白芍一钱 当归一钱五分 前胡五分 茯苓二钱 桔梗一钱五分 苏叶三分

【用法】水煎服。

【主治】外感风寒所致子嗽，甚则胎动。

32044 百合饮

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】百合一分 人参一分半 豉（熬）粳米（淘）各半合 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两 薤白（切）五茎 生姜（切）半两

【用法】上锉，如麻豆大。以水五盏，煎至二盏半，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】伤寒后脾胃有余热，气满不能食。

32045 百合饮

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】生百合三两 赤茯苓（去黑皮）二两 麋角（屑）三两 麦门冬（去心，焙）肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两半 黄耆（锉）一两 薏苡仁二合

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，一日二次。

【主治】胞痹。少腹疼痛，小便不利。

32046 百合散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】百合一两 葛根一两 麻黄半两（去根节） 麦门冬半两（去心） 黄芩半两

前胡三分（去芦头） 石膏一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒已经二七日外，潮热不退，四肢无力，昏沉如醉，恐变成百合病。

32047 百合散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】百合三分 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 桑根白皮半两（锉） 郁李仁三分（汤浸，去皮尖，微炒） 大腹皮三分（锉） 汉防己半两 赤茯苓三分 紫苏茎叶三分 陈橘皮二分（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，头目连背膊浮肿，喘促，大小便不利。

32048 百合散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】百合二两 紫菀一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 前胡一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，用水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒百合病，身微热，恶寒烦喘。

32049 百合散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】百合一两 栝楼根一两 牡蛎三分（烧为粉） 梔子仁三分 麦门冬三分（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒百合病，一月不解，变如渴疾。

32050 百合散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】百合一两半 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 木通一两(锉) 麦门冬三分(去心) 甘草三分(炙微赤,锉) 麻黄半两(去根节) 紫菀半两(洗,去苗土) 黄芩一两 甜葶苈三分(炒令紫色)

【用法】上为散。每服五钱,用水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病,心肺热盛,小便赤黄,上气咳嗽。

32051 百合散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】百合三分 柴胡一两(去苗) 桑根白皮三分(锉) 杏仁一分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 麻黄三分(去根节) 赤茯苓三分 甘草半两(炙微赤,锉) 紫苏茎叶一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸劳热,咳嗽损肺。

32052 百合散

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】干百合二合

【用法】上为细散。每服一钱,食后温水调下,一日三次。

【主治】耳聋疼痛。

32053 百合散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百合一两 紫苏子三分(微炒) 桑根白皮一两(锉) 紫菀三分(去苗土) 甘草半两(炙微赤,锉) 款冬花三分 汉防己三分 贝母三分(焙微黄) 杏仁半两(汤浸,去皮尖仁,麸炒微黄) 人参三分(去芦头) 赤茯苓一两 麻黄一两(去根节) 桔梗半两(去芦头)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,

加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】久咳嗽,胸中气不利。

32054 百合散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】百合 桔梗(去芦头) 贝母(煨微黄) 赤芍药 紫菀(洗去苗土) 桑根白皮(锉) 前胡(去芦头) 赤茯苓各一两 甘草半分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:妊娠七八月伤寒,烦热喘嗽,不欲食。②《医方类聚》引《王岳产书》:妊娠一月至十月份,伤寒烦热,咳嗽不欲食,胸前满闷。

32055 百合散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】百合半两 桑根白皮一两(锉) 栝楼根一两(锉) 甜葶苈半两(隔纸炒令微黄) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入葱白五寸,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠心胸气壅,喘促咳嗽。

32056 百合散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】百合 紫菀(去苗土) 麦门冬(去心) 桔梗(去芦头) 桑根白皮(锉) 各一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入竹茹一分,煎至六分,去滓,入蜜半匙,更煎三二沸,不拘时候温服。

【主治】妊娠咳嗽,心胸不利,烦闷,不欲饮食。

32057 百合散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】百合五两

【用法】上为散。用蜜水调涂帛上,匝项系之,甚者不过三五上。

【主治】诸鱼骨鲠在喉中。

32058 百合散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】百合 黄柏各一两 白及一分 蓖麻子仁五十粒(研)

【用法】上为散。用朴消水和作饼贴之，每日三五次。

【主治】颐颊疮，一名独骨疮。

32059 百合散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】百合 人参 贝母 白茯苓 杏仁 甘草 干山芋各一两 鹿角胶二两

【用法】上为细末，入杏仁研匀。每服二钱，水一中盏，黄蜡一皂大，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人肺胃不顺，气逆，呕血不止，咽嗑不利；兼治嗽痰。

32060 百合散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】百合半两(炒黄，为末)

【用法】每服半钱或一钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒腹中满痛。

32061 百合散

【方源】《济生》卷七。

【组成】百合(蒸) 紫菀茸(洗) 贝母(去心) 白芍药 前胡 赤茯苓(去皮) 桔梗(去芦，炒)各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠风热相交，咳嗽痰多，心胸满闷。

32062 百合散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】川芎 赤芍药 当归 百合 生地 侧柏叶 荆芥 犀角 牡丹皮 黄芩 黄连 梔子 郁金 大黄

【用法】水煎，加童便和服。

【主治】打扑伤损，败血流入胃脘，呕黑血汁。

【加减】大便利者，去大黄。

32063 百合散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】百合二钱 桑皮七分 前胡八分 桔梗七分 芍药一钱 赤苓八分 贝母一钱 橘红一钱 甘草五分(或加紫菀 款冬)

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】子嗽。风壅相攻，胸满久嗽。

32064 百合粥

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】生百合一升 蜜一两

【用法】用水煮熟，干投入将熟粥罐中，每碗用二合，空心食。

【功用】补肺止嗽。

32065 百合煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】白花百合

【用法】或煮或蒸，频食即愈，拌蜜蒸更好。

【主治】肺癰。

32066 百问方

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】硫黄五钱

【用法】艾汤调服。即时安卧，良久睡起，汗出而愈。

【主治】伤寒身冷脉微，手足厥而躁。

32067 百寿丸

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】山楂 滑石各五两 苍术 胆南星 天竺黄 木香各二两五钱 砂仁 六神曲 麦芽 钩藤 薄荷 僵蚕各一两五钱 茯苓 桔梗 甘草各一两 橘皮二两五钱(共为细粉) 朱砂一两 牛黄二钱

【用法】上药和匀，炼蜜为丸，重八分，金箔为半衣，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】清热健胃，化滞安神。

【主治】停乳停食，消化不良，痰盛咳嗽，气促抽搐。

32068 百寿散

【方源】《医学纲目》卷三十六。

【组成】黄连一两 朱砂一钱

【用法】水煎服，拭去口涎，灌下；余药倾盆中浴儿，遍身搽妙。

【功用】初生小儿未满月内，服之预防疮疥。

32069 百花丸

【方源】《济生》卷二。

【组成】款冬花 百合（蒸、焙）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，食后、临卧细嚼，姜汤咽下；噉化尤佳。

【主治】七情内伤，酒色无节，虚火妄动，午后潮热，咳嗽喘急，痰中带血，津少声哑。①《济生》：喘嗽不已，或痰中有血。②《丸散膏丹集成》：七情内伤，酒色无节，虚火妄动，午后虚潮，口干声哑，诸虚百损。③《全国中药成药处方集》（武汉方）：津少咽干，虚烦潮热。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴药也。款冬泻热下气，清血除痰；百合润肺宁心、补中益气，并为理嗽要药。

【备考】本方原名百花膏，与剂型不符，据《症因脉治》改。改为膏剂，名“润肺百花膏”（见《全国中药成药处方集》武汉方）。

32070 百花丸

《普济方》卷一五七。为《圣济总录》卷六十五“贝母丸”之异名。见该条。

32071 百花丸

【方源】《医部全录》卷二二一。

【组成】防风 人参 苡蓉 干地黄 羚羊角 麦冬 天门冬各一两半 芍药 独活 干姜 白术 丹参 山茱萸 甘草 茯神 升麻 黄耆 菊花 地骨皮 石斛 牛膝 五加皮 薯蓣各二十铢 秦艽 芎藭 桂心 防己 生姜 黄芩各一两 附子十八铢 石膏三两 寒水石二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜蜜汤送下，一日三次。稍加至三十丸。

【主治】中风后虚热翕翕然。

【宜忌】忌油、面、蒜、生冷、酢滑，及猪、羊、鸡、鱼等肉。

32072 百花丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】冬花三两 五味子（炙）三两 紫菀三两 花粉三两 丹皮三两 桔梗三两 橘皮三两 麦冬三两 前胡三两 百合三两 玄参（去芦）三两 沙参三两 薄荷三两 蒲黄（炒）三两 杏仁（去皮，炒）三两 柿霜三两 川贝三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱五分。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】清热润肺，宁嗽止喘。

【主治】肺热虚火，咳嗽痰喘，口干声哑，痰中带血。

32073 百花汤

【方源】《普济方》卷一五七引《十便良方》。

【组成】杏仁四两 生姜四两（研取汁，与杏仁同研细） 白蜜半斤

【用法】上同搅拌均匀，以瓷器盛，蒸熟，柳木匙捞，候成膏。每以沸汤点一匙头，温水送下。

【主治】肺气不顺，咳嗽气逆，胸膈不利。

【备考】本方方名，据剂型当作“百花膏”。

32074 百花散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】川乌五两

【用法】上为末。凡一切疮毒，以麻油调涂，湿者干掺；耳中出水，吹入。

【主治】腿肚血风疔疮，小儿蜈蚣疮，或耳底出脓，瘰癧痔漏。

32075 百花散

【方源】《杨氏家藏方》（北大本）卷十二。

【异名】葵花散（《得效》卷十九）、五金膏（《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁班经后录》）。

【组成】黄蜀葵花七枚（干者） 黄柏半两

(厚者,去粗皮) 黄连(去须)二钱 山梔子三枚(去壳) 郁金一枚

【用法】上为细末。每用药末五钱许,即入白及末一钱和匀,并花水调。如肿未成头,即用篦子敷药于肿处,以薄纸盖之,肿消纸落,或未消,即再用药;如已有头,以纸条子敷药,放宽围之,渐次围近,使毒气不外侵;生肉如欲溃,别用药蚀头,亦周回用药条围之,撮脓尽以真麻油调,不入白及,以鸡毛扫疮口;如大,即入白及,更别抄桃奴一钱(正名桃泉,乃是桃实,着枝不落,经冬不凋者,正月采),用麻油调,量疮口大小,煎成新熟青绢,早晚蘸药贴疮上,候疮平即止,治小儿软疔尤妙,如患臃疮,只用五味药,新汲水调,摊连纸上,临卧时贴,二、三次见效。

【主治】一切痈疽及诸恶疮。

【备考】本方方名,原书人卫本作“白花散”。

32076 百花散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】黄柏 桑白皮(用蜜涂,慢火炙黄色为度)各等分

【用法】上为细末。每服一二钱,水一盏,入糯米二十粒,同煎至六分,以款冬花烧灰六钱,搅在药内同调,温服之。

【主治】妇人产中咳嗽。

32077 百花散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】百花集(烧烟尽为度) 蛇床子(炒令焦黄)各二两 零陵香 藿香叶各一两

【用法】上为粗末。每用药两大匙,水三碗,煎三五沸,临卧乘热淋洗。

【功用】补元阳,通血脉。

【宜忌】避风寒。

32078 百花煎

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白蜜五合 生地黄汁三合 生姜汁一合 黄牛乳五合 藕汁三合 秦艽一两(去苗) 白茯苓一两 柴胡一两(去苗) 干

柿五枚(煮软,细研如糊) 杏仁二两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 黄明胶五两(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为散,与蜜及诸药汁兼干柿,同于银锅子内,以慢火煎成膏,别收于盒器中。每服一茶匙,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】肺壅热,吐血后咳嗽、虚劳少力。

【备考】本方方名,《普济方》引作“补肺白花煎”。

32079 百花煎

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白蜜二十两 酸石榴七颗 生姜半斤

【用法】上件药,将生姜、石榴并皮同捣,绞取汁,更滤令净,入蜜中相和令匀;用一瓷瓶先称知斤两,然后入药蜜汁,后用三重蜡纸密封瓶头,置于釜中,重汤煮一复时,后时时称,但除瓶斤两外,得二十两便住。每服一茶匙,空心以温酒调下,晚食前再服。

【主治】大风疾。

32080 百花煎

《圣济总录》(文瑞楼本)卷六十八。即原书人卫本“补肺百花煎”。见该条。

32081 百花膏

【方源】《百一》卷十八。

【组成】熟干地黄 生干地黄 川当归 川芎 白芍药 人参各一两

【用法】上为细末,入生藕自然汁、生姜自然汁、蜜各一盏,同煎数沸,令香熟,入药调成膏,用砂器盛贮。每服一匙,用灯心、枣汤化下。

【主治】妇人因失血后气弱,或产后虚羸。

32082 百花膏

【方源】《普济方》卷三二二。

【组成】熟干地黄 生干地黄 川芎 白茯苓 马鞭草 荆芥各四两 官桂 白芍药 当归各二两 枳壳二两 牡丹皮一两

【用法】上为粗末。每服四钱,水一盏半,入乌梅半枝,煎至一大盏,去滓,食后温服,

一日四五次。若此证服至旬日，或半月，经脉自通，诸病皆去。

【主治】妇人因失血后气弱，或产后虚羸。

【备考】本方方名，据剂型当作“百花散”。

32083 百花膏

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】白蜜不拘多少

【用法】涂于疮上。或用羊筒骨髓一两，炼人蜜滚三二沸，入轻粉少许，研成膏，瓷盒内盛之，涂于疮上。

【功用】痘痂易落，且无疤痕，亦不臭秽。

【主治】痘疮痒甚，误搔成疮，及疮痂欲落不落者。

32084 百花膏

《医方类聚》卷一一七引《严氏济生续方》。即《济生》卷二“白花膏”。见该条。

32085 百花膏

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】透骨草 忍冬藤 蒲公英 鹤虱草 九龙藤 野天麻 旱莲草 半枝莲 地杨梅 豨莶草 苍耳草 紫地丁 地锦草 旱辣蓼 大小青 薄荷叶 灵芝草 鱼腥草 见肿消 血见愁 淡竹叶 南天竹 枸杞头 橘树头 枳椇叶 五加叶 接骨木 石楠头 地蜈蚣 篇蓄草 马齿苋 野芥菜 蛇床叶 长青草 慎火草 太湖葱各等分

【用法】捣汁，煎加蜜，炼成膏；再加沉香、檀香、冰片、麝香各等分为末入内，收贮于瓷瓶，勿泄气。每服一匙，酒下，一日三次。

【主治】疔风。

32086 百花膏

《治痘全书》卷十四。为《外科枢要》卷四“当归膏”之异名。见该条。

32087 百劳丸

【方源】陈大夫引张仲景方（见《医学纲目》卷五）。

【异名】仲景百劳丸（《慎柔五书》卷四）。

【组成】当归（炒） 乳香 没药各一钱 人参一钱 大黄四钱 虻虫十四枚（去翅足） 水蛭十四枚（制）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。都作一服，可百丸，五更百劳水送下。取恶物为度，服白粥十日。百劳水者，勺扬百遍，即甘澜水。

【主治】一切劳瘵积滞，疾不经药坏症者。

【备考】《慎柔五书》有桃仁。《张氏医通》有梔子。

32088 百劳散

【方源】方出贾同知引康少尹方（见《宣明论》卷九），名见《本草纲目》卷二十三。

【组成】罂粟壳二两半（醋炒，取一两）乌梅半两

【用法】上为末。每服二三钱，沸汤点，食后服，一日三次。

【主治】①贾同知方引康少尹方：咳嗽。②《本草纲目》：咳嗽多年，自汗。

32089 百劳散

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】天仙藤 当归 川芎 芍药 茯苓 人参 黄耆 知母 贝母 黄芩 五味子 地骨皮 柴胡 甘草 白芷 桔梗各等分（一方有秦艽、前胡）

【用法】每服一两，水二盏，加生姜三片，煎八分，食后服。

【主治】骨蒸劳热。

【备考】《济阳纲目》有半夏，无川芎。

32090 百劳煎

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】杏仁半斤

【用法】上取杏仁于瓶内，以童便二升，浸七日，泻出，去小便，以暖水淘过，于沙盆内研如泥，别用埴瓶，以小便三升，煎之如膏。量其轻重，食上熟水调一匙至半匙，室女，妇人服之妙。以炒面和膏为丸，尤佳。食后白汤送下。

【主治】劳嗽，旦轻夕重，憎寒壮热，少喜多噤，忽进忽退，面色不润，积渐少食，必入肺，脉紧浮者。

32091 百两金

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】破故纸(炒) 茴香(淘去沙,炒) 吴茱萸(汤泡七次,炒) 川楝肉(生用)各一两 木香(不见火) 乳香(别研) 麝香(别研)各少许

【用法】上为末。每服二钱,食前沸汤调下。

【主治】肾气疼痛。

32092 百足散

【方源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】赤足蜈蚣一条 甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱,冷水调下。

【主治】食着蛇余毒,腹中痛不可忍。

32093 百谷丸

《医统》卷二十三。为原书同卷“大健脾丸”之异名。见该条。

32094 百应丸

【方源】《医方类聚》卷一一二引《经验秘方》。

【组成】麦蘖(炒) 神曲(炒) 丁皮 桂皮(去粗皮) 玄胡索 缩砂仁 肉豆蔻各五钱 京三棱 广术(炮) 雄黄(去石) 青皮(去衣) 枳壳(麸炒,去瓢) 槟榔 代赭石 木香各一两

【用法】上为细末,消糊为丸,如小豆大。每服五十丸,小肠气,茴香汤送下;心痛,热醋送下;产后寒热腹痛,当归、红花汤送下;内外积伤,葱白汤送下;常服,茶、酒或盐汤送下,不拘时候。

【主治】年深日近痞癖气块,癥癖积聚,气积、滞积、酒食积、五脏停滞不消,小便黄赤,四肢沉困。

32095 百应膏

《理瀹》。为《奇方类编》卷下“百应神膏”之异名。见该条。

32096 百补丸

【方源】《本草纲目》卷三十五引《杨诚经验方》。

【组成】川柏皮一斤(刮净,分作四份,用酒、蜜、人乳、糯米泔各浸透,炙干,切)

【用法】上为末,粳米饭为丸。每服五十丸,空心,温酒送下。

【主治】诸虚赤白浊。

32097 百补汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】阿胶 地榆 陈皮 川芎 当归 白芍 熟地

【用法】水煎,食前服。

【主治】妇人血淋白浊。

32098 百补汤

【方源】《中国医学大辞典》引《保婴撮要》。

【组成】当归 芍药 地黄 白术 人参 茯苓 山药 甘草

【用法】清水一钟,加大枣二个,煎至六分,温服。

【功用】调理气血,滋养脾胃。

【主治】痘疮八九日,浆足之后,别无它证者。

【加减】气虚,加黄耆二钱,官桂少许。

32099 百补膏

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】玉竹 枸杞 龙眼肉 核桃肉 女贞子各一斤

【用法】砂锅内多次水煎,一汁、二汁、三汁合熬,用文武火俟滴水成珠,加白蜜一斤,再熬成膏,瓷瓶收贮。每服三钱,早、晚滚水调下。

【主治】心血、肾水不足,及诸虚。

32100 百灵丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】黑铅一分 水银一分(二味同结作砂子,细研) 天南星一分(炮裂) 白附子一分(炮裂) 干蝎一分(微炒) 天麻一分 蝉壳一分(微炒) 麝香一钱(细研) 牛黄一分(细研)

【用法】上为末,糯米饭为丸,如黍米大。每服二丸,温酒送下,不拘时候。

【功用】化涎,除搐搦。

【主治】小儿急惊风。

32101 百灵丸

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】芫花(醋浸,炒干) 蒺藜子(炒去角) 地龙(炒) 茴香子(炒) 地丁各一分

【用法】上为末,以醋和蜜炼熟为丸,如梧桐子大。每服五丸,空心、临卧温盐酒送下。

【主治】耳重。

32102 百灵丸

《奇效良方》卷六十一。为《普济方》卷六十四“百霜丸”之异名。见该条。

32103 百灵丸

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】猪牙皂一两 真麝香一钱 梅花冰片一钱 射干片一两五钱 炒牛蒡子一两五钱 大玄参三两 苦桔梗二两 净滑石八两 净雄黄二钱 生甘草一两

【用法】上为末,用好醋及冰糖汁炼为丸,如高粱子大。每服一钱,小儿七分。

【主治】一切咽喉急症。

【宜忌】虚弱者忌用。

32104 百灵丹

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】红枣(烧灰)一钱 枯矾一钱 黄丹一钱 松香一钱 官粉五分 银朱三分

【用法】上为细末。湿则掺之,干则香油调搽。

【主治】小儿肥疮及黄水疮。

32105 百灵丹

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】胡黄连(另研) 川黄连(姜炒) 当归(酒洗) 白术(土炒) 神曲(炒) 各三钱 芦荟(微炒) 阿魏 木香 厚朴(姜炒) 各一钱 甘草(蜜炙) 三棱各一钱 史君子肉 五谷虫 虾蟆(酥炙) 各五钱 麝香三分 槟榔二钱 莪术一钱 公鸡肫皮(不见水,微焙) 一两

【用法】上为细末,神曲醋糊为丸,如黍米大。每服三十丸,小儿一岁一丸,一日三次,

早、午米汤送下,临晚滚水或黄酒送下。

【主治】小儿、室女五劳七伤。

32106 百灵丹

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】赤石脂八钱 雄黄六钱 乳香四钱 没药四钱 蜈蚣二条 冰片四分 珍珠二钱 麝香四分

【用法】上为细末,入小口瓷罐收贮,蜡塞其口待用。用时只掺少许于膏药中。

【功用】溃毒。

【主治】百毒恶肿。

32107 百灵汤

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】罂粟壳 陈皮 木通 乌梅 甘草 黄连各等分

【用法】上锉如麻豆大。每服三大钱,水一盏,加生姜三片,枣子二个(劈破),沙罐内慢火煎至八分,去滓,放瓷器碗内,上面封口,用湿纸两重盖覆,不可令灰入腹。药后且忌口。

【主治】赤白痢。

【临证举例】血痢 温人郑元升云:近日患病,血痢之间数十次,窘不可言,有客惠药两服而止。

32108 百灵粉

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】锅底烟(要烧草者方好,烧柴者勿用)二钱

【用法】上为细末。用煮熟猪肝切片,蘸而食之,即愈。

【主治】鸡蒙眼,夜不见路者。

32109 百灵散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】罂粟壳(去瓤蒂,用好醋炒) 陈皮(去瓤) 木通 乌梅 车前子 甘草 黄连各等分

【用法】上吹咀。每服三钱,水一盏八分,加生姜三片,大枣一个,煎八分,不拘时候服。

【主治】赤白痢。

【宜忌】忌酒、面、鸡、鱼，一切毒物。

【加减】如腹痛者，加芍药。

32110 百灵膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】槐花子(炒焦，为末) 松柏各一两 乳香 腻粉各一两

【用法】上为细末，用清油、黄蜡各一两，瓷器内慢火熬成膏。贴之。

【主治】痈疮久不愈。

32111 百灵膏

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】生地黄 熟地黄 赤芍 白芍 白芷 两头尖各五钱 木鳖 蓖麻各一百粒 巴豆五十 穿山甲五片 真桐油一斤

【用法】将前药浸一宿，煎成炭浮起，用棕滤过，入炒过黄丹六两、水粉二两、百草霜二两，文武火熬成膏，滴水成珠，撚得硬时，便入血竭末五分，乳香、没药、五灵脂各二钱，搅匀。贴恶疮及疔毒未破者用药引子，以五倍煨过为灰五分，笋箬灰四分，白丁香三分，饭为丸，如黄豆大，附于膏药中，一贴即破。

【主治】恶疮及疔毒。

32112 百枝膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】人参(去芦头) 防风(去芦头) 天麻各一两 麦门冬(汤浸，去心，焙干) 白附子(炮) 白僵蚕(炒去丝嘴) 羌活(去芦头) 石菖蒲各半两 朱砂二钱(别研) 麝香一钱(别研)

【用法】除朱、麝外，同为细末，后人朱、麝研匀，炼蜜为丸，每一两分作四十丸。每服一丸，食后、临卧煎荆芥汤放温化下。

【功用】常服安心神，镇惊悸。

【主治】小儿禀赋怯弱，易感惊邪，心神恍惚，睡眠不安。

【备考】本方方名，据剂型，当作“百枝丸”。

32113 百枝膏

【方源】《普济方》卷三七二引《直指小儿》。

【组成】人参 防风 天麻 茯神各一钱半 酸枣仁 琥珀 石菖蒲各一钱 麝香少许 白附子一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂角大。每服二丸，麦门冬汤调下。

【功用】安心宁神。

【主治】小儿惊风。

【备考】本方方名，据剂型，当作“百枝丸”。

32114 百杯丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】生姜一斤(去皮，切作片子，盐二两淹一宿，焙干) 红皮(去白)三两 广茂(炮)三分 干姜三两 益智仁二十个 丁香五十个 甘草二分(炙) 京三棱(炮)三分 缩砂仁三十个 木香 茴香(炒)各一分 白豆蔻仁三十个

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作五丸，朱砂为衣。细嚼，生姜汤送下，不拘时候。如饮酒者先服此药，百杯不醉，亦无诸痰。

【主治】酒停腹中，膈气痞满，面色黄黑，将成癖疾，饮食不进，日渐肌瘦。

32115 百杯丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】沉香半两(细锉) 丁香六钱 缩砂仁一两半 白豆蔻仁二两 红豆 干葛 陈皮(去白) 甘草(炙)各半两 干生姜一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作二十丸。每服一丸，细嚼，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】酒不散，胸膈滞闷，呕吐酸水，心腹疼痛。

32116 百杯丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】丁香五十个 橘红 小茴香 三

棱(炮) 莪术(炮)各三钱 砂仁 白豆蔻各三十枚 干姜三钱 生姜一两(去皮,切片,盐一两,浸一宿,焙干) 炙甘草二钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,朱砂为衣,每一两作五丸。每服一丸,细嚼,生姜汤送下。如欲饮酒先服之,多饮不醉。

【主治】腹中膈气痞满,面色黄并黑,将成癖疾,饮食不进,日渐肌瘦。

32117 百杯丸

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】缩砂仁 高茶各一两 诃子一个 麝香一钱 脑子少许

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作十丸。未饮酒先细嚼一丸,酒送下。

【功用】饮酒不醉。

32118 百杯散

【方源】《普济方》卷二五三。

【组成】甘遂 橘皮(去白) 葛花一两(净)

【用法】上为细末。每服一钱,临卧用温酒调下。至夜利下,酒病方愈,未知再服。

【主治】停酒,胸膈痞闷,饮食不快,及一切酒病。

【宜忌】忌食甘草一二日。

32119 百枣丹

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黑枣百枚 白砒一两 川连二钱 煅月石一钱 黄柏一钱 芦荟二钱 上片三分

【用法】先将枣肉包砒煨存性,再入余末乳匀。

【主治】口疳。

32120 百果酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】香椽 佛手各二个 核桃肉 龙眼肉 莲肉 橘饼各半斤 柏子仁四两 松子三两 红枣二十两 黑糖三斤

【用法】干烧酒五十斤浸。

【功用】补虚益骨。

32121 百和汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】生地 当归 白及 骨碎补 鹿茸 续断 首乌 炙草

【用法】水煎服。

【主治】跌扑损伤。

32122 百和香

【方源】《千金》卷六。

【组成】沉水香五两 甲香 丁子香 鸡骨香 兜娄婆香各二两 熏陆香 白檀香 熟捷香 炭末各二两 零陵香 藿香 青桂皮 白渐香(柴也) 青木香 甘松香各一两 雀头香 苏合香 安息香 麝香 燕香各半两

【用法】上为末,酒洒令软,再宿酒气歇,以白蜜和,纳瓷器中,蜡纸封,勿令泄,冬月开取用,大佳。

【功用】令身体香。

32123 百沸汤

【方源】方出《袖珍》卷三引《经验方》,名见《古今医鉴》卷五。

【组成】吴茱萸 木瓜 食盐各五钱(同炒焦)

【用法】瓷瓶盛水三升,煮令百沸,却入上药同煎至二升以下,每服一盞,随病人意冷暖服之。药入即醒。

【主治】霍乱吐泻,因饮冷或冒寒,或失饥,或大怒,或乘舟车,伤动胃气,令人吐利交作,目眩头旋,手足转筋,四肢厥冷。

32124 百宝丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】枳实(去瓢,麸炒)一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,分作二十五丸。每服一丸,以百宝散送下。

【主治】牝痔下血,肛边生疮。

32125 百宝散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】皂荚(不蛀者四挺烧灰,去皂子不用,研为末,入麝香半钱同研) 皂荚刺针(生杵为末)

【用法】取皂荚末一钱匕，入皂荚刺针末半钱匕，以水一盞，同煎至七分，放温服。发痛时嚼百宝丸一丸，以此散送下。

【主治】牡痔。

32126 百草丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】百草霜四两 黄芩 栀子各一两 黄连 槐花 地榆各五钱

【用法】上为末，糊为丸。每服三钱，清汤送下。

【主治】血箭痔。

32127 百草散

《圣济总录》卷一三九。为《圣惠》卷六十八“大散方”之异名。见该条。

32128 百草散

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】四方草木茎叶各半把

【用法】上于五月五日平旦，使四人出四方，各于五里内采一方草木茎叶，每种各半把。勿令漏脱一件，日正午时细切碓捣，并石灰极令烂熟一石，草断一斗；先凿大实中桑树，令可受药，取药纳孔中，实筑令坚，仍以桑树皮蔽之，用麻油捣石灰极粘，密泥之，令不泄气；又以桑皮缠之使坚牢，至九月九日午时，取出阴干，百日药成，捣之，日晒令干，便捣，绢筛贮放。凡一切金疮出血，伤折，即时以药封裹，治使牢，勿令动转，不过十日，即愈。不肿不脓，不畏风，若伤后数日，始得药，须暖水洗令血出，然后敷此药，大验。平时无事宜多合以备仓卒，金疮之要，无出于此。

【主治】金疮。

32129 百草煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】百草（凡田野山间者，无论诸品皆可取用；然尤以山草为胜，辛香者佳；冬月可用干者，须预为收采之）

【用法】上不论多寡，取以多，煎浓汤乘热熏洗患处。仍用布帛蘸熨良久，务令药气蒸

透，然后敷贴他药。每日二三次不拘，频数更好。若洗水臃肿胀，每次须用草二三十斤，煎浓汤二三锅，用大盆盛贮，以席簟遮风，熏洗良久，每日一次或二次。

【主治】百般痈毒，诸疮损伤疼痛，腐肉肿胀，或风寒湿气留聚，走注疼痛，水臃肿胀等症。

【方论选录】盖其性之寒者，可以除热，热者可以散寒，香者可以行气，毒者可以解毒。无所不用，亦无所不利，汤得药性，则汤气无害，药得汤气，则药力愈行。凡用百草以煎膏者，皆此义也，此诚外科中最要、最佳之法，亦传之方外人者。

32130 百草膏

【方源】《三因》卷十五。

【异名】百草霜（《外科大成》卷二）。

【组成】羊屎不拘多少

【用法】上一味，上下以瓦盛盖，柴木烧令烟尽，末之，麻油调膏。外敷。

【主治】①《三因》：一切恶疮，不问干湿痛痒，日近年深者。②《准绳·疡医》：脚面恶疮如桐油浸淫延漫。

【加减】痒者，加轻粉少许；痛者，加麝香少许。

32131 百草膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】百草

【用法】五月五日采凡可治病草木百种，洗净捣汁，砂锅内熬成膏。每草膏五斤，配麻油十斤，再熬至滴水成珠为度；每油二斤，入黄、白蜡各二两，飞丹八两，松香四两溶化，用铅粉半斤收成膏，加乳香、没药、樟脑各五钱，槐枝搅匀收用。必识草药人采取，不治病野草勿用。

【功用】活血祛风败毒。

【主治】一切疮肿，风气，跌打损伤。

32132 百草膏

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】薄荷八分 玉丹五分 川贝一钱

灯草灰五厘 柿霜八分 甘草一分五厘 天花粉一钱 冰片二分 百草霜一分

【用法】上为末，用白蜜调膏。频咽嚥之。若症重，兼服煎剂，并用吹丹。

【主治】喉痹及喉菌。

【宜忌】如治喉刺，玉丹、薄荷忌用；如见劳病已重，津竭火炎之候，亦不宜用。

32133 百草霜

《外科大成》卷二。为《三因》卷十五“百草膏”之异名。见该条。

32134 百药长

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】当归一两 川芎五钱 白芍一两 怀地黄四两 白术（土炒）一两 白茯苓一两 天门冬（去心）二两 麦门冬（去心）二两 牛膝一两（炒） 杜仲（炒）一两 破故纸一两 茴香一两 五味子一两 枸杞子四两 陈皮一两 半夏一两 苍术一两 厚朴一两 枳壳一两 香附一两 砂仁五钱 官桂一两 羌活一两 独活一两 白芷一两 防风（去芦）一两 乌药一两 秦艽一两 何首乌一两 川萆薢一两 干茄根一两 晚蚕砂一两 干姜一两 红枣一斤 烧酒六十斤

【用法】各药共用一绢袋盛之，悬挂缸中，再入烧酒封固，窖半月。随其量之大小多寡饮之，不拘时候。其药滓晒干，研为细末，为丸服亦妙。

【主治】男妇诸虚百损，五劳七伤，身体羸瘦，胸膈胀满，脾胃不调，四肢无力，筋骨疼痛，并风痰寒湿。

【方论选录】酒为百药之长，然则帅百药而治百病者，莫酒若也。虚损劳伤，身体羸瘦，借此长以帅归、芎、芍、地养血，白术、茯苓益其气，天冬、麦冬润心肺，牛、杜、纸、茴补腰肾，五味助其阴，枸杞壮其阳；胸膈胀满，脾胃不调，借此长以帅陈皮、半夏、苍术、厚朴平其胃，枳壳、香附、砂仁、官桂调其中；风寒痰湿，力乏痛楚，借此长以帅羌活、独活、白芷、防风、乌药、首乌、秦

艽、萆薢、茄根、蚕沙、姜、枣之属去其风，散其寒，燥其湿，行其痰；如此则痰自蠲，力自强，而气血自旺矣，百药之长，名称实也。或疑味多不专，殊不知七情。五贼纷扰其中，正宜此大队之长，以安内攘外也，譬之韩信之兵，多多益善云尔。

32135 百药散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】川百药煎不以多少（一半生用，一半炒令黄）

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前温米饮调下。

【主治】脏毒下血不止。

32136 百药煎

《医统》卷四十四。即《丹溪心法》卷二“定嗽劫药”。见该条。

32137 百点膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】蕤仁（去皮尖）三分 当归身 甘草各六分 防风八分 净黄连二钱（锉如麻豆大，水一大碗，煎至一半入药）

【用法】上锉，如麻豆大，蕤仁别研如泥，同熬，滴在水中不散，入去沫蜜少许，再熬少时为度。令病人心静点之，至目中微痛，一日五七次，临卧点尤效。名之曰百点膏，但欲多点为妙，使药力相继也。

【主治】病弱多年，以至遮瞳仁，视物不明，有云气之状。

32138 百畏丸

《普济方》卷一〇九。即《圣惠》卷二十四“丹砂丸”。见该条。

32139 百钟丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】青皮（去白） 陈皮（去白） 神曲（炒） 荆三棱 蓬莪术（炮） 麦蘖（炒） 萝卜子（炒）各二两 枳实（麸炒）四两 雷丸 益智仁各一两 牵牛（炒）三两

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后煎生姜、陈皮汤送下。

【功用】调顺三焦,理诸痞气,去胀满积聚,酒癖癥瘕。

【主治】积聚胀满。

32140 百钟丸

【方源】《普济方》卷二十四引《德生堂方》。

【组成】干葛 黄连 枳实各四两 青皮 陈皮 神曲 麦蘖 雷丸 三棱 莪术 益智仁 槟榔各一两 牵牛末 木香各二两 杏仁(泡,去皮尖)半斤 萝卜子半斤 葛花二两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,酒、水任意送下。但酒所伤者宜服之,百钟可以再进。

【主治】中酒食吐酒,呕逆恶心,口吐酸水,痰涎壅盛,痰寒气不畅快。

32141 百顺丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】川大黄(锦纹者)一斤 牙皂角(炒微黄)一两六钱

【用法】上为末,用汤浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服五分,或一钱,或二三钱,酌宜用引送下。或炼蜜为丸亦可。

【主治】一切阳邪积滞,气积、血积、虫积、食积、伤寒实热秘结等症。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(武汉方):孕服忌服。

【备考】本方方名,《春脚集》引作“宣化丸”。

32142 百顺散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】芎藭一两半 羌活 防风 木通 荆芥 甘草 大力子各一两 菊花 白芷 麻黄各半两

【用法】上为细末。每服一钱,白汤点下;如解伤寒,加生姜、薄荷煎服。

【功用】解利伤寒。

32143 百顺散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】桑寄生一两 干苏梗三分 白茯苓半两 陈皮一分 人参半两 大腹皮(炙)三分

【用法】上为末。每服一钱,水一盞,煎六分服。

【功用】安胎和气,尤理伤寒。

32144 百顺膏

【方源】《外科医镜》。

【组成】大虾蟆二只(即老蟾酥,多者佳) 木芙蓉叶三两(重阳采用,或根皮,或花,俱妙)

【用法】上药用麻油一斤,照常熬枯,滤去滓,将油称准,凡药油二两入炒过铅粉一两,如数派算,以桑枝搅匀,熬至滴水取丸,不粘指为度。倾入水中去火性。凡遇顽恶烂疮,先用葱椒汤洗净,贴之。

【功用】拔脓、止痛、生肌。

【主治】痈疽发背,及一切无名肿毒初起及已溃者;并治顽恶疔疮。

32145 百神散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】天雄(炮裂,去皮脐) 附子(炮裂,去皮脐) 茵芋(炙) 踯躅 细辛(去苗叶) 乌头(炮裂,去皮脐) 干姜(炮) 菖蒲 甘草(炙) 石南叶各一两 防风(去叉) 白术 独活(去芦头)各二两

【用法】上为散。每服四钱匕,空心温酒送下,一日二次。

【主治】一切癰病,风瘙疮癬,遍身搔痒,百节疼痛,眉毛堕落,毗烂耳聋,四肢痹痹。

32146 百损丸

【方源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】破故纸(羊油炒微黄)二两半 骨碎补(甜酒洗)二两 杜仲(盐水炒断丝,勿令焦)一两 川牛膝(甜酒炒,勿令焦)一两 川续断(甜酒炒,勿令焦)一两 肉苁蓉(酒洗)一两 黑稽豆一两 当归(酒洗)一两 鸡血藤膏(甜酒化开,或用鸡血藤三两代)五钱 三七(另研,可用竹节三

七代)五钱 血琥珀(另研。或用乳香五钱代)三钱 麒麟竭(另研)五钱 沉香(另研。或用降香代)五钱

【用法】前八味,共为细末,连同后五味和匀,入鸡血藤膏,再入炼蜜为丸,每丸重三钱。每服一丸,早、晚空心开水送下。久服自效。

【功用】滋补肝肾,强壮筋骨,活血祛瘀,通经络,续断伤,补骨髓。

【主治】跌打损伤,不论内伤脏腑,外伤筋骨,以及劳伤经络;并治遗精,脚弱,腰膝痠痛,诸虚百损。

32147 百倍丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】败龟版 虎骨(二味各醋浸一宿,蘸醋炙令黄为度) 肉苁蓉(酒浸一宿) 牛膝(酒浸一宿) 木鳖子(去壳) 乳香(另研) 没药(另研) 骨碎补(去毛) 自然铜(醋淬七次) 破故纸(炒) 各等分

【用法】上为细末,以浸苁蓉、牛膝酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒送下。

【主治】男子、妇人腰膝疼痛,筋脉拘急,行步艰难。

32148 百效丸

【方源】《医方类聚》卷一一二引《居家必用》。

【组成】大黄(生用) 黑牵牛(取头末) 各三两 橘红 青皮(汤浸,去白) 各二两

【用法】上为细末,蒸熟萝卜膏子和为剂,丸如梧桐子大。每服三十丸,或加至五六十丸,空心、临卧温汤送下。

【主治】远年近日一切积聚及酒食所伤。

32149 百效丸

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】生地黄(取汁) 乌头一百五十枚 大豆三升半

【用法】上咬咀,乌头以酒一升半,和地黄汁浸乌头至烂,绞去滓,纳豆子于二汁中,至

除日晒之,有余汁更浸至汁尽为度。初服二豆起,渐服至二十豆,有病空腹服,无病食后服,四时合亦得,二月制尤美。

【功用】令人能食,益气,强盛有子,发白反黑,齿落更生。

【主治】痼冷风眩,寒中手足冷,胃寒脐冷,百病五劳。

【宜忌】先病热之人不可服。

32150 百效丸

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】草乌头(酒浸半日,刮去皮,切片,炒) 马钱子(切薄片,炒黄色,筛去毛,净) 全当归(切片,酒拌,晒干,炒) 麻黄(去节,不见火,晒脆) 真僵蚕(酒洗,炒去丝) 穿山甲(炒,去沙) 各一两 大甘草(不见火,晒干,研) 五钱

【用法】上为细末,葱汁熬汤,水为丸,如芥子大,晒干,瓷瓶密贮。高年者五六分,中年者七八分,少年者三分,凡服俱用葱汁白汤送下。务须避风取汗,如汗出后,必须次日辰巳时方可起床见风,如不遵戒守,汗出见风,则手足坚硬。凡犯此者,即用甘草末,调服即解。

【主治】一切大毒恶疮,无论已溃未溃。

【宜忌】孕妇忌服。

32151 百效丸

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】黄柏 苦参 连翘 川牛膝 何首乌 当归尾 生地 牡丹皮 防风 防己 荆芥 紫苏叶

【用法】上为末,神曲打糊为丸。每服三钱,白汤送下。一斤服完,除根不发。加蛇蜕一两研更妙。

【主治】不拘遍身上下手足脓窠,血风疥癣。

【方论选录】黄柏为君,苦参为臣,连翘、川牛膝、何首乌、当归尾、生地、牡丹皮为佐,防风,疮在上为使,防己、荆芥、紫苏叶,疮在下,此三味为使。

32152 百效丸

【方源】《经验奇效良方》。

【组成】贝母二钱 川厚朴二钱 血竭一钱五分 柴胡二钱 上肉桂一钱五分 巴豆(去油)二钱 玄参二钱 肉豆蔻一钱五分 知母二钱 真麝香一分 冰片一分 神金十张 辰砂二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以辰砂为衣，宜盛瓷瓶，不可泄气。未满周岁每服三丸，周岁以上每服五丸，用葱白一寸，灯心七根，煎汤将丸溶化，加白糖少许，温服。

【功用】《全国中药成药处方集》(天津方)：消积理滞，镇惊化痰。

【主治】①《经验奇效良方》：小儿急慢惊风，痰喘气促，寒火结胸，大小便闭塞，一切食积痰症，及发斑出疹，热毒内陷等证。②《全国中药成药处方集》(天津方)：小儿寒热凝结，停食宿水，腹疼腹胀，红白痢疾。

32153 百效汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】升麻 葛根 白芷 酒芩 桔梗 各一钱 防风 薄荷各五分 石膏三钱 甘草六分 天花粉八分 细辛四分

【用法】加生姜三片，水煎服，食后频频少服之。

【主治】肠胃壅热、风热，牙龈肿痛，颊车皆肿。

【加减】头疼及项颈痛者，加羌活一钱；发寒热者，加柴胡一钱。

32154 百效饮

【方源】《霉疔新书》。

【组成】土茯苓一百二十钱 玄参 银花 防风 荆芥 连翘 黄柏 大黄 芒消 蝉蜕 天花粉 龙胆 猪苓 泽泻各二十钱 甘草一钱二分

【用法】上分作十二帖。每帖头煎以水六盏，煮取五盏；第二次煎，以水五盏，煮取三盏；第三次煎，以水三盏，煮取二盏，俱

相和，一日服尽。

【主治】杨梅、下疳、便毒。

32155 百效散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄八两 牙皂二两 当归四两 全蝎一两 黄土五钱 神曲(炒)四两 天麻四两 僵蚕(炒)二两 赤金一百五十张 朱砂四两

【用法】上为细末，袋装，每袋六厘。每服一袋，温开水送下，一日二次。

【功用】清热化滞，镇惊安神。

【主治】食滞火盛，急热惊风，呕吐乳食，红白痢疾。

32156 百效膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】藿香一两五钱 艾绒一两五钱 蓖麻子一两五钱 生草乌一两五钱 荆芥一两五钱 乌药一两五钱 桂枝一两五钱 蜂房一两五钱 藁本一两五钱 秦艽一两五钱 全蝎一两五钱 枳壳一两五钱 灵仙一两五钱 桃仁一两五钱 黄芩一两五钱 玄参(去芦)一两五钱 木香一两五钱 独活一两五钱 杏仁一两五钱 肉桂(去粗皮)一两五钱 麻黄一两五钱 白鲜皮一两五钱 南星(生)一两五钱 归尾一两五钱 檀香一两五钱 僵蚕一两五钱 川附子一两五钱 牙皂一两五钱 竹节香附一两五钱 莱菔子一两五钱 生地一两五钱 苍术一两五钱 羌活一两五钱 紫荆皮一两五钱 贝母一两五钱 牛膝一两五钱 白薇一两五钱 骨碎补一两五钱 防风一两五钱 赤芍一两五钱 清风藤一两五钱 苏木一两五钱 细辛一两五钱 五加皮一两五钱 川芎一两五钱 蝉退一两五钱 良姜一两五钱 大风子一两五钱 连翘一两五钱 丁香一两五钱 甘草一两五钱 山梔子一两五钱 鳖甲一两五钱 白及一两五钱 续断一两五钱 红花一两五钱 紫丁皮一两五钱 生半夏一两五钱 白芷一两五钱 苦参一两五钱 生血余三

大黄三两 蜈蚣三十五条 蛇退二钱 槐枝八钱 桃枝八钱 柳枝八钱 桑枝八钱 榆枝八钱 松香四两 百草霜六两

【用法】上药酌予碎断,用香油一百六十两炸枯,过滤去滓,炼至滴水成珠。每一百六十两油,兑黄丹六十两搅匀成膏,取出入水中浸出火毒后加热熔化摊贴。每张油重一钱五分,纸光。微火化开,贴患处。

【功用】散风活血止痛。

【主治】风湿流注,半身不遂,筋骨麻木,跌打损伤,积聚痞块,小儿疳积,女人瘕瘕。

32157 百效膏

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)

【组成】白芷四两 官桂三两 当归十一两 玄参 大黄 赤芍 木鳖子各四两 血余三两 生地十一两

【用法】上药用香油二百四十两,炸枯去滓,炼至滴水成珠,入黄丹一百两搅匀成膏;另用阿魏二两,乳香二两,没药二两,共为细粉,每十六两膏油兑药粉五钱,搅匀摊贴。微火化开,贴患处。

【功用】活血化痞。

【主治】风湿疼痛,跌打损伤,积聚痞块,及妇女月经不调。

【宜忌】忌劳累,并忌食发物。

32158 百部丸

【方源】《千金》卷十八。

【组成】百部根三两 升麻半两 桂心 五味子 甘草 紫菀 干姜各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,一日三次。以知为度。

【主治】诸嗽,不得气息,唾脓血。

【宜忌】《外台》:忌生葱、海藻、菰菜。

【方论选录】《千金方衍义》:嗽不得息,明明是火逆为患,故用百部导之于下,升麻散之于上,姜、桂之辛以散火,五味之酸以敛津,紫菀、甘草既能治嗽,并可和血。

32159 百部丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百部二两 黄芩一两 桂心一两 五味子一两 甘草一两(炙微赤,銼) 紫菀一两(去苗土) 干姜一两(炮裂,銼) 生干地黄二两 茜根一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】咳嗽唾脓血。

32160 百部丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】天门冬(去心)一斤 杏仁(去皮尖,炒) 黄耆 百部根各六两 瓜蒌根十六两 紫苏 紫菀(去苗,洗) 马兜铃各二十二两 黑参八两 肉桂(去粗皮)四两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后煎乌梅、甘草汤温下。

【主治】肺气不调,咳嗽喘急,胸膈烦闷,唇干口燥,面目浮肿,咽啞不利,积久不愈,及咯唾脓血者。

32161 百部丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】百部(焙) 款冬花(去梗) 天门冬(切,焙) 贝母(去心) 桔梗(炒) 紫菀(去苗土)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后、临卧甘草、乌梅汤送下。

【主治】咳嗽上喘,唾脓血,胸膈不利,咽喉肿痛。

32162 百部丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】百部(炒)三两 升麻 桂(去粗皮) 五味子(炒) 甘草(炙,銼) 紫菀(去苗土) 桑根白皮(炙,銼)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,粥饮送下,日三次,夜一次。

【主治】咳嗽唾脓血。

32163 百部丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】百部(焙)半两 细辛(去苗叶)三两 贝母(去心) 甘草(炙) 紫菀

(去苗土) 桂(去粗皮)各二两 白术 麻黄(去根节) 五味子各三两 杏仁(去皮尖双仁,炒)四两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,生姜、蜜汤送下,不拘时候。

【主治】产后咳嗽,连声不绝,痰涎壅盛。

32164 百部丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】百部八两(为细末) 生地黄五斤(取汁,熬成膏)

【用法】上将地黄膏和百部为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后米饮送下。

【主治】咳嗽,恶热,脉疾,目赤,头眩。

32165 百部丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】百部(焙干,炒)三分 麻黄(去节)三分 杏仁四十个(去皮尖,微炒,煮三五沸,焙干)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如皂子大。每服三十丸,热水化下。加松子仁肉五十粒,糖丸之,含化尤妙。

【主治】小儿肺寒壅嗽,微喘。

32166 百部丸

【方源】《实用中成药手册》。

【组成】百部粉 小雌鸡

【用法】水为丸,每袋重18克。每服9克,温开水送下,一日二次。

【功用】润肺,补虚羸,杀虫。

【主治】骨蒸劳嗽,肺结核。

【宜忌】忌生冷、辛辣食物。

32167 百部汤

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】百部半两 生姜半斤 细辛三两 贝母三两 甘草二两(炙) 杏仁四两(去皮尖双仁者) 紫菀三两 桂心二两 白术二两 麻黄六两(去节) 五倍子二两

【用法】上切。以水一斗二升,煮取三升,分三服。

【主治】咳,昼夜不得眠,两眼突出。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜、生菜。

32168 百部汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】百部一两 款冬花 紫菀(去苗土) 五味子 人参 半夏(汤洗七遍,炒) 前胡(去芦头) 麻黄(去根节,汤煮掠去沫,焙) 桂(去粗皮)各半两 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盂半,加生姜一分(拍碎),大枣三个(掰破),同煎至八分,去滓,食后温服。

【主治】伤寒咳嗽痰涕多,不思食味。

32169 百部汤

《圣济总录》卷四十八。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“百部散”之异名。见该条。

32170 百部汤

《圣济总录》卷六十五。为《圣惠》卷四十六“百部散”之异名。见该条。

32171 百部汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】百部 款冬花 紫菀(去苗土) 贝母(去心) 知母(焙) 白薇 杏仁(去皮尖双仁,炒)各等分

【用法】上为粗末,每服三钱匕,水一盂,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后咳嗽,痰壅烦闷。

32172 百部汤

【方源】《本草汇言》卷六。

【组成】百部 薏苡仁 百合 麦门冬各三钱 桑白皮 白茯苓 沙参 黄耆 地骨皮各一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】久嗽不已,咳吐痰涎,重亡津液,渐成肺痿,下午发热,鼻塞项强,胸胁胀满,卧则偏左其嗽少止,偏右嗽必连发,甚则喘急。

32173 百部汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】白薇 紫菀 百部 玄参 麦冬 甘草 五味子 大力子 白芥子

【用法】水煎服。

【主治】喉痹，由风火郁滞喉间，蒸湿生虫，或痛或痒，干燥枯涸，甚则面红耳热而不可忍。

32174 百部汤

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】百部 桔梗 茯苓 百合 桑白皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】产后咳嗽。

32175 百部汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】地骨皮 麦冬 天冬 知母 玄参 瓜蒌仁 百部根 百合 地茄根

【用法】水煎服。

【主治】麻后余毒未清，留滞肺经，致吐痰如黄脓，乃成肺痈之候。

32176 百部饮

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】百部根 百合 木通(锉) 赤芍药各一两半 枳壳(去瓢，麸炒)二片 白茯苓(去黑皮) 柴胡(去苗)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，加郁李仁七粒(去皮打碎)，入药再煎至七分，食后温服。

【主治】肺壅，胸背疼痛，四肢乏力，咳嗽。

32177 百部饮

《玉机微义》卷五十。为《千金》卷十八“百部根汤”之异名。见该条。

32178 百部饮

【方源】《不居集》上集卷十五。

【组成】桔梗八分 甘草三分 茯苓七分 大贝母 百部各一钱 玉竹三钱 沙参 麦冬各一钱 苏梗三分

【主治】久嗽。

32179 百部酊

《中医皮肤病学简编》。为《赵炳南临床经验集》“百部酒”之异名。见该条。

32180 百部酒

《本草纲目》卷二十五。为方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷六十五“百部根酒”之异名。见该条。

32181 百部酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】百部酊(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】百部六两 75%酒精十二两

【用法】将百部碾碎置酒精内，浸泡七昼夜，过滤去滓备用。以棉棒或毛刷蘸涂。

【主治】①《赵炳南临床经验集》：荨麻疹(痞瘤)，神经性皮炎(干癣)等瘙痒性皮肤病。②《中医皮肤病学简编》：疥癣，虱病。

【备考】《中医皮肤病学简编》本方用百部20克，浸入酒精或烧酒内。一天后，用药水或搽洗头部或阴部。

32182 百部散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】百部一两 桔梗一两(去芦头) 射干一两 川升麻一两 天门冬一两(去心) 木通一两(锉) 甘草半两(炙微赤，锉) 沙参半两(去芦头) 川大黄半两(锉碎，微炒)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】肺痿咳嗽，涕唾稠粘，咽喉不利，心神烦热。

32183 百部散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】百部汤(《圣济总录》卷六十五)。

【组成】百部一两 赤茯苓二两 百合一两 桑根白皮一两(锉) 木通一两(锉) 甘草半两(炙微赤，锉) 柴胡一两(去苗) 枳壳一两(麸炒微黄，去瓢) 赤芍药三分 郁李仁三分(汤浸去皮，微炒)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气暴热咳嗽，气满喘急；又治骨蒸劳，烦热，肩背疼痛，四肢乏力，咳嗽。

32184 百部散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百部一两 细辛一两 贝母一两（煨微黄） 甘草一两（炙微赤，锉） 紫菀一两半（去苗土） 桂心一两 白术一两 麻黄三两（去根节） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 五味子一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，昼夜不得睡卧，胸中不利。

32185 百部散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百部一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 麦门冬一两（去心） 木通一两（锉） 天门冬一两（去心） 紫菀一两（去苗土） 贝母一两（煨微黄） 赤茯苓一两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】久咳嗽，肩胛渐高，唾出脓血，其味腥咸。

32186 百部散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】百部 贝母（煨微黄） 紫菀（洗去苗土） 葛根（锉）各一两 石膏二两

【用法】上为散。每服三钱，以水一小盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，每令乳母于食后温服，令儿饮乳甚佳。

【主治】小儿咳嗽头热。

32187 百部散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】百部汤（《圣济总录》卷四十八）。

【组成】百部一两（炮干） 款冬花一两 杏仁一两（去皮尖，麸炒黄，另研入） 甘

草一两（涂酥，炙黄）

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，加糯米少许，同煎至六分，不拘时候，和滓服。

【主治】肺脏风热，上喘咳嗽，鼻塞生疮，口干咽痛。

32188 百部散

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】百部一两 乌头（炮裂，去皮脐）一分 牛膝（去苗，切，酒洒，焙） 白术各半两

【用法】上为细散。每服一钱匕，温酒调下，渐加至二钱匕，日三次，夜一次。

【主治】中风痹曳，挛蹇不能起。

32189 百部散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】百部二两 款冬花 贝母（去心） 白薇各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，米饮调下。

【主治】肺实，鼻塞不闻香臭。

32190 百部散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】金毛狗脊（去毛） 黑狗脊 蛇床子（炒） 马兜铃根各一两 硫黄（研） 秦艽 百部各半两

【用法】上为细末。生麻油调涂疮上。

【主治】大人、小儿秃疮

32191 百部散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】款冬花 百部各一两 知母 贝母（去心，炒）各半两

【用法】上为细末。每服三四钱，食后用暖齏汁送下。

【主治】咳嗽无问新久，冷热并宜。

32192 百部散

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】百部 款冬花 麻黄（去根节） 杏仁（去皮尖，炒）各一两

【用法】上为末，入杏仁拌匀。每服二钱，水一盞，糯米二十粒，同煎米饮，食后温服。

【主治】新久喘嗽不已。

32193 百部散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】百部三两 桑皮一两半 百合三合 茯苓一两半 桔梗三钱

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】喘咳，脉虚浮数者。

32194 百部煎

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】生百部汁 生地黄汁 生姜汁 生百合汁(如无，以藕汁代) 蜜各一盞 枣四两(去皮核)

【用法】同熬成煎。每服一匙，温麦门冬熟水半盞化下，空心，日午、临卧各一次。

【主治】咳嗽久不已。

32195 百部膏

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】百部

【用法】煎膏服。

【主治】咳血咯血，肺家有热，稍实者。

【方论选录】《医钞类编》：《准绳》云，甘苦泄热，微湿润肺，止久嗽。李时珍曰：百部亦天冬之类。天冬寒，热嗽宜之，百部温，寒嗽宜之。

32196 百部膏

【方源】《外科十法》。

【组成】百部 白鲜皮 蓖麻子(去壳) 鹤虱 黄柏 当归 生地各一两 黄蜡二两 明雄黄末五钱 麻油八两

【用法】先将百部等七味，入油熬枯，滤去滓，复将油熬至滴水成珠，再用黄蜡，试水中不散为度，端起锅来，将雄黄末和入，候稍冷，便入瓷盆中收贮，退火听用。以膏搽之。

【主治】湿热凝聚，虫行皮中，顽厚坚硬之顽癣，俗称牛皮癣。

32197 百部膏

【方源】《类证治裁》卷七。

【组成】百部(肥实者，酒浸，竹刀刮去心皮) 款冬 百合 沙参 麦冬 五味 紫菀 贝母 杏仁 白蜜

【用法】熬膏服。

【功用】杀虫治嗽。

32198 百病丹

【方源】《痘疹专门》卷下。

【组成】沉香 木香 郁金 延胡 当归 甘草 丁香(各为末)各一钱 大黄二钱 朱砂六分 白硼砂六分 巴豆肉(去油)四钱

【用法】上为末。量人之大小强弱，少者重约五六厘，多者重约一分，如今日用，滚水泡服一次，隔一日，再服一次。

【主治】痘后头面周身发肿。

【方论选录】此方本非痘后所宜用，但遇此肿胀，木通、茯苓、猪苓、泽泻等药不能消水，此丹屡试屡验，特附之。

32199 百病汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】黄耆 黄芩 钩藤各一分 蝉蜕三分(炙) 甘草二分(炙) 蛇蜕皮一寸(炙) 牛黄三铢

【用法】以水一升半，煮取六合，百日儿服半合，二岁服三合。取利为度，有汗则以粉扑之。

【主治】小儿惊痫胀满，掣缩吐衄。

32200 百消丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】黑丑(头末)二两 香附(米炒)五灵脂各一两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸，或五六十丸，食后生姜汤送下。

【功用】消酒，消食，消痰，消气，消水，消痞，消肿，消胀，消积，消痛，消块。

32201 百消丸

《经验广集》卷一。为《良朋汇集》卷一“沉香百消丸”之异名。见该条。

32202 百消丸

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】二丑二斤 五灵脂八两 香附子 大黄各一斤半

【用法】上为细末，水为小丸。每服三钱，

开水送下，一日二次。

【功用】消积，消胀，利水。

【主治】肉积、食积、水积、气积及消化不良。

32203 百消丸

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】大黄 五灵脂 醋香附 炒黑白丑各一斤 醋三棱 槟榔 醋莪术 牙皂各八两 炒山楂 炒神曲各四两 甘草五两 炒麦芽 炒枳实 川厚朴各四两

【用法】上为细末，水为丸。每服二钱，开水送下；十岁每服一钱。

【功用】消食消痰，消痞消积。

【主治】饮食过度，不能运化，呕吐嘈杂，胸膈胀满。

【宜忌】虚弱及孕妇忌用。

32204 百消散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】血龟版一大个(须用下半段，断不可用汤版为要) 白蜡一两(为细末)

【用法】先将龟版烘热，取蜡末渐渐掺上，掺完，版自炙枯，放泥土上，出火气，研碎。用黄酒冲服，至醉为度，服后即仰卧，出大汗而愈。如稍有未平，再服半服，断无不愈。惟炙版须用桑柴火，如桑柴难觅，青炭亦可，切不可用煤火。

【主治】一切无名肿毒，对口发背，流注，痈疽，疔疮。

32205 百粉丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】黄柏(童便炒) 知母(童便炒) 蛤粉(略炒) 牡蛎(火煨) 山药(酒炒)

【用法】上为末，捣烂饭为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤、温酒任下。

【主治】肾虚火动遗精。

32206 百祥丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】南阳丸。

【组成】红芽大戟不拘多少(阴干)

【用法】浆水煮极软，去骨晒干，复纳汁中煮，汁尽焙干为末，水为丸，如粟米大。每服一二十丸(研)，赤脂麻汤送下，不拘时候。

【功用】《名家方选》：痘疮初发用之，可预防毒气上迫咽喉。

【主治】痘疮倒压黑陷，寒颤噤牙戛齿，身黄紫肿，热毒便秘里实。

①《小儿药证直诀》：痘疮倒压黑陷。②《普济方》：疮疹倒压黑陷，寒颤噤牙戛齿，身黄紫肿。③《景岳全书》：痘疹紫黑干陷，热毒便秘里实等症。

【宜忌】《本草纲目》：不发寒者，不黑者，慎勿下。

32207 百祥丸

《张氏医通》卷十五。为《保命集》卷下“枣变百祥丸”之异名。见该条。

32208 百粒丸

【方源】《百一》卷十九引钱季华方。

【组成】川黄连 厚朴 吴茱萸各一两(用生姜一两擦碎，同淹一宿，炒令香熟)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，小儿即小丸如黍米大。每服一百丸，陈米饮送下；粟米饮送下尤妙。

【主治】泻痢。

【加减】如泻甚者，加肉豆蔻一个，没石子二个。

32209 百粒丸

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】红椒 胡椒 附子 丁香 干姜 麦蘖各等分

【用法】上为细末，醋煮大蒜为丸。每服一百丸，用米饮汤送下。

【主治】远近便泻，大肠滑。

32210 百御丸

【方源】《谢利恒家用良方》

【组成】真茅术二十两(米泔浸，米拌炒) 甘草二十两(生、炙各半) 半夏二十两(姜制) 云茯苓二十两 白扁豆十两(炒)

厚朴十两(姜汁炒) 麦芽十两(炒) 香附十两(制) 山楂炭十两 广藿香十两 神曲十两 陈皮八两 枳壳(麸炒)八两 黄芩八两(酒炒) 防风八两 桔梗八两 苏叶八两 薄荷八两

【用法】上药各为细末，姜、枣汤为丸。每服二钱，轻者每日一次，重者每日二次。寒热往来，关节烦疼，无汗者，白开水送下；有汗者，葛根一钱煎汤送下。一身尽痛，或不痛而不能转侧者，桂枝一钱煎汤送下；有汗者，生苡米仁三钱煎汤送下。腹满谵语者，焦山栀一钱，豆豉二钱煎汤送下。腹胀泄泻者，煨木香三分煎汤送下。面目及一身俱黄者，茵陈蒿二钱，焦山栀一钱煎汤送下。身黄发热者，焦山栀一钱，黄柏五分煎汤送下。足跗肿或一身俱肿者，木通一钱煎汤送下。

【主治】外感风寒，内伤食滞，腹泻身疼，黄疸湿泻。

32211 百解丸

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】辰砂(研)一两半 硃砂(研)一分 巴豆(去皮心膜、出油)一钱 黄蜡半两

【用法】上除黄蜡外，同研令匀，入前黄蜡溶开，和成剂。丸如绿豆大。每服二丸，新水送下。后少时，用热粥投之。汗出立愈。

【主治】内外伤头痛，壮热憎寒，腹胀喘粗。

32212 百解汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡(去芦头) 柴胡(去苗) 甜葶苈(微炒) 半夏(汤洗七遍去滑) 麻黄(去根节，汤煮掠去沫，焙) 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 桔梗(炒) 人参 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 白术 枳壳(去瓢，麸炒) 甘草(炙，锉) 白茯苓(去黑皮) 芍药 石膏(碎) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁) 各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘

时候。

【主治】中风伤寒，身热头痛，肢体烦疼。

32213 百解散

【方源】《普济方》卷一三〇引《护命方》。

【组成】前胡(去毛) 柴胡(去毛) 知母 贝母 牡丹皮(去心) 桔梗 羌活 独活 荆芥穗 黄芩 山茵陈 山梔 升麻 麻黄(去根) 大黄 麦门冬(去心) 杏仁(去尖) 紫菀 玄参 秦艽(去皮，炒) 各一分

【用法】上为末。每服六钱匕，水二盞半，加生姜三片同煎，取二盞，食后、临卧，去滓热服，留滓，再煎服。若大便不通，忽狂言妄语，即煎此药取汁，用调后面药；半夏半两，芍药、大黄各一分，牵牛二两，消石十铢，研消石，并杵罗众药，合为末，每服三钱，入葱三枝，生姜三片，依法煎前方药，取汁，用调此药末三钱，食后临卧，热服；此药末不撞三钱。若是大便秘甚，任意加减进服，以转为度，仍不得过剂，转后，便吃些小热粥投之。此药须至大便不通，方可进服。

【主治】伤寒四日、五日、六日不得汗，头痛壮热，浑身不知痛疼处，睡卧不安，心神烦躁，脉气洪大紧急，大便秘涩不得通。

【备考】凡人患伤寒，忽热病，经数日饮食不进，大便秘涩不通，医者多以其饮食不进，胃气虚弱，不肯疏转，致令倾损性命。此缘热毒之气，蒸郁脏腑，伤损正气，所以不能食。凡患伤寒之人，经及五六日，未曾得汗，头痛壮热，心神烦躁，浑身骨节，四肢八节俱痛，大便热秘不通者，虽饮食不得，亦当疏转，形不病，气即自然平安，饮食增进。凡下疏药，先当审五脏脉气，观何脏得病，然后下药取之，即万无一失，但三部之中，一部偏大紧者，是即其脏得病也。若脉候未精，只吃此百解散，永无差误，缘此方，皆治五脏之病也。若是狂言妄语，急吃后面药，转下便安，效。

32214 百解散

【方源】《鸡峰》卷五。

【异名】败毒散。

【组成】柴胡 前胡 羌活 独活 桔梗 枳壳 人参 茯苓 甘草 川芎 陈皮 杏仁各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，煎至五分，去滓温服。加薄荷三叶煎为佳。

【主治】风寒咳嗽，鼻塞声重，风痰头痛，呕逆寒热。

32215 百解散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】前胡 柴胡 人参 白术 茯苓 羌活 桔梗 川芎各一两 甘草 陈皮各二分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】风温疫气，头昏壮热，肢节烦疼。

32216 百解散

【方源】《百一》卷七引龚子治方。

【组成】防风(去芦) 麻黄(去根节)各三两半 白芷 白芍药各二两 川乌半两(炮，去皮尖) 甘菊(去枝叶) 荆芥穗 干姜各三两

【用法】上为细末。每服二钱，葱茶或腊茶点下，煎服亦可，不拘时候。

【功用】解截四时伤寒，常服清神爽气，瘟疫瘴疔不生。

【主治】伤寒头痛，肢体沉重，恶寒发热，痰逆咳嗽，困倦少力，及偏正头痛，瘟疫瘴疔。

32217 百解散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】干葛二两半 升麻 赤芍药各二两 黄芩一两 麻黄七钱半 薄荷(去粗皮)二钱半 甘草一两半

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，加生姜三片，葱一根，煎七分，不拘时候温服。

【功用】①《活幼新书》：和解百病。②《幼科折衷》：开通腠理。

【主治】①《幼科折衷》：感冒发热，伤寒潮热，脉虚浮数者。温毒发斑，小儿惊癇，鹤膝风初起。②《医部全录》：小儿木舌。

【宜忌】虚慢阴证不宜。

【加减】风热盛，加薄荷同煎。

【备考】《幼科折衷》无升麻。

32218 百解散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】贝母(炒黄) 麦门冬(去心) 川升麻各一两 赤芍药 甘草(炙)各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分盞，加竹叶二片，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿伤风、疮疹。

32219 百解散

《保婴撮要》卷十。为《局方》卷二(宝庆新增方)“消风百解散”之异名。见该条。

32220 百解散

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】升麻 白芍 甘草 葛根 麻黄 薄桂 川芎 黄芩 白芷

【用法】上为散。内服。

【主治】痘疮，表热疮色焦紫，不起发，寒热往来者。

32221 百解散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】升麻 葛根 赤芍 黄芩 连翘 麻黄 薄荷 半夏 荆芥 金银花 甘草

【用法】水煎，母子同服。

【主治】小儿一切丹毒。

32222 百霜丸

【方源】《普济方》卷六十四。

【异名】百灵丸(《奇效良方》卷六十一)。

【组成】釜底百草霜不拘多少

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，新汲水化开灌下。甚者，不过三丸即愈。

【主治】咽喉中结块核，不通水食，危困欲死。

32223 百嚼丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】槐角(炒) 槐花(炒) 桔梗(炒) 薄荷叶(去土) 蝉蜕(净洗)各半斤 荆芥穗 甘草(炙) 枳壳(麸炒,去瓢) 白僵蚕(炒去丝嘴)各四两 川芎 羌活(去头芦) 防风(去头芦) 香白芷 白茯苓(去皮)各二两 天麻一两(去苗) 细辛(去叶土) 藁本(去土) 白附子(炮) 细松烟墨(烧红,醋淬)各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作十丸。每服一丸,食后、临睡细嚼,茶清送下。

【主治】风壅涎实,头目昏晕,眼多紧涩,肌肉眊动,手足烦热,浑身疼痛,腰重脚弱,大便秘,夜间少睡。

32224 百嚼丸

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效》。

【组成】川芎 皂角(同黑豆一合,水一碗,同煮豆熟)各二两 槐角四两(炒) 甘菊花 荆芥穗各八两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,茶、酒任下。

【主治】诸风。

32225 百日还丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】佛茄子 樟柳根各等分

【用法】上为末,枸杞汁为丸,如鸡头子大。每服十丸,新水送下。

【主治】消渴。

32226 百发神针

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】乳香 没药 生川附子 血竭 川乌 草乌 檀香末 降香末 大贝母 麝香各三钱 母丁香四十九粒 净蕲艾绵一两(或二两)

【用法】作针。各按穴针之。

【主治】偏正头风,漏肩,鹤膝,寒湿气,半身不遂,手足瘫痪,痞块,腰痛,小肠疝气,痈疽发背,对口痰核,初起不破烂者。

32227 百合饮子

【方源】方出《外台》卷二十七引《广济方》,名见《金匱翼》卷八。

【组成】桑白皮六分 通草 百合各八分 白茅根一分

【用法】上锉细。以水四升,煮取二升,去滓,温下前散药。口干渴,含之亦得也。

【功用】《金匱翼》:泻肺火,清肺金,而滋水之化源。

【主治】诸淋。

【备考】本方用法中前散药:滑石、冬葵子各八分,瞿麦、石韦各五分(去毛),蒲黄六分,陈橘皮四分,芍药、茯苓、芒消各六分,子芩六分。捣为散。每服方寸匕,一日二次。

32228 百合洗方

【方源】《金匱》卷上。

【组成】百合一升

【用法】以水一斗,渍之一宿,以洗身。洗已,食煮饼,勿以盐豉。

【主治】百合病一月不解,变成渴者。

【宜忌】宜淡食。

【方论选录】①《千金方衍义》:病无经络可分,百脉一宗致病,故名百合。其病虽有上、中、下三焦之别,皆由伤寒虚劳大病后,虚火扰其血脉所致。治法咸用百合为君,以安心补神,能去血中之热,利大小便,导涤痰积,然必鲜者方克有济。其经月不解,百脉内壅,津液外泄而成渴者,则用百合洗之,一身之脉皆得通畅,而津液行,渴自止。勿食盐豉者,以味咸能凝血也。②《退思集类方歌注》:皮毛为肺之合,外洗皮毛,亦可内除其渴。洗已,食煮饼,勿啖咸豉,恐咸味耗水而增渴也。

32229 百花煎丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参 紫菀 阿胶 百部 款冬花 山药 天门冬 麦门冬 贝母各一两 甘草四两 杏仁半斤 蜡二十两

【用法】上为细末,熔蜡为丸,如弹子大。每服一丸,水一盞,煎至七分,和滓,食后

热服。

【主治】肺虚客热，咳嗽气急，胸中烦悸，肢体倦疼，咽干口燥，多唾痰沫，或有恶物，肌瘦发热，减食嗜卧。

32230 百应神膏

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】百应膏（《理瀹》）。

【组成】南星 川大黄 桃仁 羌活 半夏 草乌 川乌 红花 独活 当归各四钱

【用法】用真麻油一斤，每药一斤加生姜一两，葱白十根，头发一团，同入药内熬枯焦色。滤滓，再用广松香一斤，入滤清油内，又熬至核桃花起，先入陀僧末二两，又徐徐加入硫黄末半斤。投此二味，须慢慢洒入，不可太多太骤，以滴水成珠为度。将此膏药倾入水中，去火毒。

【主治】①《奇方类编》：一切疮毒；并治风瘫，鹤膝。②《青囊秘传》：一切阴毒未溃，色白者；并治寒湿流注，筋骨疼痛。

32231 百灵藤酒

《本草纲目》卷二十五。即《圣惠》卷二十五“百灵藤酿酒”。见该条。

32232 百灵藤粥

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】百灵藤四两

【用法】以水一斗，煎至二升，去滓，入粳米四合煮作粥，于温室中洗浴后服之。衣覆取汗。汗后皮肤风退如麸皮。每隔日一服。五六十日后渐愈，毛发即生。

【主治】大风疾。

32233 百灵藤煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】百灵藤五斤

【用法】上锉细，以水三斗，慢火煎至五升，去滓。别于净锅中，慢火煎成膏，以瓷器密盛。每服一茶匙，以温酒调下，一日三次。

【主治】一切风。

32234 百果仙胶

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】核桃仁二斤一两四钱 真鹿胶三

斤二两 榛子仁二斤一两四钱 松子仁 瓜子仁各五两三钱四分 贡冰糖八斤五两四钱 黄酒二斤一两四钱

【用法】共熬成胶，每块一斤重，置于清凉之处。每服二钱，开水送下，早、晚各一次。

【功用】添精补髓，清肺益气，祛痰止咳，补诸虚损。

【主治】咯痰，喘嗽。

32235 百草霜丸

【方源】《普济方》卷二一一引《卫生家宝》。

【异名】针头丸（《普济方》卷二一一）。

【组成】百草霜半两 巴豆一分 杏仁一分

【用法】上用巴豆、杏仁二味，各于麻油灯焰上烧灰存性，同三味和匀，用蜡二钱熔开，和剂为丸，为芥子大。每服三丸，水泻，并水送下；黑痢，乌梅汤送下。

【主治】心腹痛及白痢。

【备考】《百一》本方用法：白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；如要定转，用枣汤送下。

32236 百草霜方

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【异名】百草霜散（《医方类聚》卷七十七引《济生续方》）。

【组成】百草霜 好盐各半两

【用法】上为末。表里涂之。

【主治】舌忽紧硬，逡巡能塞杀人。

32237 百草霜散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】百草霜一两 生姜二两（去皮，炒令干） 姜黄半两

【用法】上为细散。每服二钱，以生地黄酒调下。

【主治】产后血晕闷绝，如见鬼神，须臾欲绝。

32238 百草霜散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】石灰一斤 刺蓟六两 马齿二两 韭四两 百草霜一斤

【用法】上先将草药四味同捣烂，渐渐入石灰，再捣匀，捏作饼子，阴干为末。干掺之。

【功用】止血。

【主治】金疮。

32239 百草霜散

【方源】《普济方》卷二〇〇引《海上名方》。

【组成】百草霜 黄丹各等分（煅，研细）

【用法】每服二钱，发日空心米饮调下。一方温酒调下。小儿半钱。

【主治】劳疟。

32240 百草霜散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】细面（微炒） 百草霜

【用法】每服二钱，用无灰好酒调下。

【主治】产后下血不止。

32241 百草霜散

《医方类聚》卷七十七引《济生续方》。为《圣济总录》卷一一九“百草霜方”之异名。见该条。

32242 百草霜散

《普济方》卷五十九。为《三因》卷十六“黑散子”之异名。见该条。

32243 百草霜膏

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】百草霜 生蛭螬各等分

【用法】上同研如膏。贴之。如冰，痛即止。

【主治】发背痈疽，一切疮，热痛不可忍。

32244 百药煎散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】百药煎五钱 硼砂一钱五分 甘草二钱

【用法】上为末。每服一钱，米饮调，食后细细咽之。

【主治】咽痛。

32245 百段锦散

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】五苓散 清心莲子饮

【用法】上二方依方制，等分打合。水煎服，每日二次。

【主治】消肾，小便白浊，有浊无渴。

【加减】赤浊，除肉桂，用生姜、莲子。

32246 百部洗方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】百部四两 苦参四两 蛇床子二两 雄黄五钱 狼毒二两五钱

【用法】上为粗末。装纱布袋内，同水五六斤煮沸 30 分钟。用软毛巾焯洗，或焯洗后再加热水浸浴。

【功用】疏风止痒，祛湿杀虫。

【主治】皮肤瘙痒症（隐疹）、神经性皮炎、阴囊湿疹（绣球风）、荨麻疹（痞瘤）。

【宜忌】有抓破疮面慎用。

32247 百部洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生草乌 10 克 百部 10 克 土槿皮 10 克 白鲜皮 10 克 威灵仙 10 克 猪牙皂 10 克

【用法】将诸药放砂锅内，加入 10% 冰醋酸 200 毫升，再加水 200 毫升，加热至沸，药液当有蒸气产生，熏蒸患部，并继续加热 20 分钟，然后置冷，洗患部。

【主治】体癣。

32248 百部根方

【方源】《普济方》卷一五八引《鲍氏方》。

【组成】百部藤根二两

【用法】捣自然汁，和蜜等分，沸煎成膏子。每日三服，粥饮调下。

【主治】暴嗽。

32249 百部根汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】百部饮（《玉机微义》卷五十）。

【组成】百部根 生姜各半斤 细辛 甘草各三两 贝母 白术 五味子各一两 桂心四两 麻黄六两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮取三升，

去滓,分三服。

【主治】①《千金》:咳嗽日夜不得卧,两眼突出。②《玉机微义》:小儿喘嗽。

【方论选录】《千金方衍义》:嗽不得卧,两眼突出,明是寒郁热邪为患,故首取百部之温散肺气,麻、桂、姜、辛之开发肺邪,贝母助百部消寒,术、甘助麻、桂透表,五味收麻、辛之散也。

32250 百部根饮

【方源】《外台》卷十引《延年秘录》。

【组成】百部根一两半 天门冬二两(去心) 紫菀一两半 贝母 干葛 白前 橘皮各一两 生姜二两 葱白(切)三合 豉三合

【用法】上切。以水六升,煮取一升七合,去滓,分温三服;疏数任情,亦可分为四服,欲间食亦得。

【主治】肺气客热,暴伤风寒,因嗽不安。

【宜忌】禁生冷、鲤鱼、蒜。

32251 百部根酒

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《圣济总录》卷六十五。

【异名】百部酒(《本草纲目》卷二十五)。

【组成】百部根四两

【用法】以酒一斗,渍再宿。火暖,每服一升,一日二次。

【主治】卒上气咳嗽。

32252 百病饮子

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】大黄四分 甘草(炙) 芍药各二分

【用法】以水一升六合,煮取八合,分为三服。

【主治】小儿患温壮热实。

32253 百疾消散

【方源】《梅氏验方新编》二集。

【组成】葱头七根 生姜五大片 陈茶叶三钱

【用法】砂糖半酒杯,水二碗共煎,热服,

加陈酒随量饮。盖被汗出。惟暑热天气,不宜多用生姜,天气寒冷,生姜加重。

【主治】胸膈饱闷,肚腹疼痛,及伤风发热。

32254 百一快斑汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】羌活 防风 荆芥 升麻 桔梗 牛子 连翘 干葛 甘草 虫退

【用法】笋尖汤引。

【主治】痘毒壅不起。

32255 百一羌活饼

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】羌活(去芦头) 芎藭 白僵蚕(炒) 鸡苏各一两 干蝎(全者)十四枚(炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大,捏作饼子。每服一饼,荆芥汤化下。

【主治】小儿潮热。

32256 百子归附丸

《济阴纲目》卷一。为《摄生众妙方》卷十一“百子附归丸”之异名。见该条。

32257 百子附归丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【异名】滋血暖宫丸(《医统》卷八十四)、百子建中丸(《回春》卷六)、百子归附丸(《济阴纲目》卷一)。

【组成】真阿胶(蛤粉炒成珠) 蕲艾叶(去筋梗,醋煮干) 当归(肥大者,酒洗,去芦) 川芎(去芦) 怀庆熟地黄(去脑,取沉水者) 白芍药(肥长者)各二两 香附(赤心者,去毛,杵成米,水、醋各淹一宿,晒,焙干)十二两

【用法】上为极细末,用大陈石榴一枚,连皮捣碎,东流水三升熬去滓,打面糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心陈米醋点沸汤送下,一日一次。

【功用】①《摄生众妙方》:调经养血,安胎顺气。②《济阴纲目》:种子。

【主治】①《摄生众妙方》:胎前产后,月事参差,有余不足诸证。②《医统》:阴阳不

利，气血不足，不孕。

32258 百子建中丸

《回春》卷六。为《摄生众妙方》卷十一“百子附归丸”之异名。见该条。

32259 百子建中丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】香附一斤（分作四份：一份童便浸七日，一份酒浸七日，一份泔浸七日，一份盐水浸七日，各炒香）大艾叶四两（米泔浸七日，将米泔慢火煮半日，焙干为末）砂仁五钱 淮熟地（酒浸）三两 白芍药三两 玄胡索一两五钱 五味子五钱 杜仲（酒炒）一两 阿胶（炒）一两五钱 白术一两（麸炒）

【用法】上为末，用壬子日好米泔打粳米面糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心用淡酃汤送下。服至半月必有孕矣。

【功用】温中暖脐，调经，开郁开胃。

【主治】妇人久冷，赤白带下，肚腹疼痛，经水不调，四肢无力，久鲜子息。

【加减】如妇人肥胖者，加陈皮、半夏各一两。

32260 百日咳新药

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】象牙末二分 牛黄五厘 黄连一钱 熊胆一分 梅片五分 人参五分 珍珠一分 朱砂一钱 象皮一钱 麝香五厘

【用法】上为极细末，收贮瓷瓶。每服一厘至一分，量病轻重酌用，白开水送下，一日三次。

【功用】清肺化痰，杀菌止嗽。

【主治】百日咳。初起鼻腔瘙痒，灼热喷嚏，脸肿充血，喉痒咳嗽，甚则连咳不休，呈痉挛性反复不已之短嗽，无吸气之暇，持续二三十秒，作笛样之吸气，夜间最甚，吐出玻璃样之粘液，甚则呛血，数旬不愈。

【宜忌】忌发物、五辛。

32261 百日咳新药

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺

方）。

【组成】制麻黄七钱 生山栀二钱 北细辛一钱五分 五爪红四钱 葶苈子三钱 炒杏仁四钱 北五味二钱 制桑皮三钱 清夏四钱 生石膏七钱 制紫菀三钱 生黄芩二钱 生甘草三钱 制覆花四钱

【用法】上为细末。未周岁小儿每次服半分；满周岁服一分；两岁至三岁服一分五厘；四岁至六岁服二分；七至八岁服三分；九至十岁服四分；十至十五岁服五分。白水送下，一日三次。

【功用】利气化痰，降气行痰，泻肺火，散肺风，消痰解痉。

【主治】百日咳。睡如胶漆，噫气不除，每咳作呕，甚则咳血，两目浮肿。

32262 百岁铁娃丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归二两 枳实（炒）一两 神曲（炒）一两 山楂一两 全蝎一两 麦芽（炒）一两

【用法】上为细末。每三十五两细末兑人牛黄二两，朱砂二十两，豆霜二钱五分，共为极细末，混合均匀，袋装，每袋重五厘。每服五厘，温开水冲下。

【功用】消化积聚，消热祛风。

【主治】小儿停食停乳，积滞不化，腹膨胀满，大便秘结，急热惊风。

32263 百合二母汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】百合 知母 贝母（去心） 麦冬各一钱 白茯苓 天花粉 前胡各八分 陈皮（炒） 白术 黄芩 桔梗各七分 五味子九个 生地（酒炒） 甘草各五分

【用法】上锉。加生姜，水煎，空心、食远各一服。

【主治】上热血虚咳嗽。

32264 百合五味汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】百合三钱 五味一钱（研） 半夏

三钱 甘草二钱 丹皮三钱 芍药三钱

【用法】水煎大半杯，热服。

【主治】右目赤痛。

【加减】热甚，加石膏、知母。

32265 百合代赭汤

《伤寒全生集》卷四。为《金匱》卷上“滑石代赭汤”之异名。见该条。

32266 百合半夏汤

《圣济总录》卷二十九。为《圣惠》卷十三“熟地黄散”之异名。见该条。

32267 百合地黄汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】百合汤（《伤寒全生集》卷四）。

【组成】百合七枚（擘） 生地黄汁一升

【用法】以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，纳地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更服。大便当如漆。

【主治】百合病，不经吐、下、发汗，病形如初者。

【方论选录】①《千金方衍义》：百合病若不经发汗、吐、下，而血热自汗，用百合为君，安心补神，能去中热，利大小便，导涤痰积；但佐生地黄汁以凉血，血凉则热毒解而蕴结自行，故大便当去恶沫也。②《金匱要略心典》：百合色白入肺，而清气中之热，地黄色黑入肾，而除血中之热，气血即治，百脉俱清，虽有邪气，亦必自下；服后大便如漆，则热除之验也。

【备考】本方方名，《外台》引作“百合生地黄汤”。

32268 百合鸡子汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】鸡子汤（《活人书》卷十八）。

【组成】百合七枚（擘） 鸡子黄一枚

【用法】先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，纳鸡子黄，搅匀，煎五分，温服。

【主治】百合病，吐之后者。

【方论选录】①《古方选注》：君以百合，甘凉清肺；佐以鸡子黄救厥阴之阴，安胃气，救厥阴即所以奠阳明，救肺之母气，亦阳病救阴之法也。②《金匱方歌括》元犀按：吐后伤中者，病在阴也，阴伤，故用鸡子黄养心胃之阴，百合滋肺气下润其燥，胃为肺母，胃安则肺气和而令行，此亦用阴和阳，无犯攻阳之戒。

【备考】本方方名，《兰台轨范》引作“百合鸡子黄汤”。

32269 百合茅根汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】苏百合 生桑皮 通草各一钱 鲜茅根五十支

【功用】清肺气以滋化源。

【主治】阳水肿，已用宣上发汗，通利小便，水肿已退者。

32270 百合固金丸

《医钞类编》卷七。即《慎斋遗书》卷七“百合固金汤”改为丸剂。见该条。

32271 百合固金丸

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）

【组成】百合 生熟地各二两 玄参一两半 骨皮一两 川贝八钱 兜铃一两半 当归 紫菀 白芍各一两半 沙参 寸冬 桔梗 炙甘草各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，食前白开水送下，一日二至三次。

【功用】养肺，宁嗽，止血。

【主治】肺病咳嗽，痰中带血，午后癆热，骨蒸盗汗，干嗽无痰，喘嗽音哑。

【宜忌】忌食辛辣等物。

32272 百合固金汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】熟地 生地 归身各三钱 白芍 甘草各一钱 桔梗 玄参各八分 贝母 麦冬 百合各一钱半

【功用】滋肾保肺，止咳化痰。

①《医方集解》：助肾滋水，保肺安神，清

热润燥,除痰养血,平肝清金。②《成方切用》:利咽降火,培元清本。③《成方便读》:利咽宣上。④《全国中药成药处方集》(沈阳方):补肺清火,化痰镇咳。

【主治】肾水不足,虚火上炎,肺阴受伤,喘嗽痰血,头眩耳鸣,午后潮热,口干溲赤,舌红少苔,脉细数。现用于肺结核病。

①《慎斋遗书》:手太阴肺病,因悲哀伤肺,背心、前胸、肺募间热,咳嗽咽痛,咯血恶寒,手大拇指循白肉际间上肩臂至胸前如火烙。②《医方集解》:肺伤咽痛,喘嗽痰血。③《全国中药成药处方集》(杭州方):阴虚肺伤,头眩耳鸣,午后潮热,口干溲赤。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(济南方):忌食生冷、辛辣、油腻等物。

【加减】如咳嗽,初一二服,加五味子二十粒。

【方论选录】①《医方集解》:此手太阴、足少阴药也。金不生水,火炎水干,故以二地助肾滋水退热为君;百合保肺安神;麦冬清热润燥;玄参助二地以生水;贝母散肺郁而除痰;归、芍养血兼以平肝;甘、桔清金,成功上部。皆以甘寒培元清本,不欲以苦寒伤生发之气也。②《医方考》:此方金水相生,又兼养血,治肺伤咽痛失血者最宜。李士材谓,清金之后宜顾母,识解尤卓。予谓咽痛,一定即当培土生金也。③《成方便读》:百合色白,其形象肺,故能独入金家,为保肺宁神,清金润燥之品。又肺肾为子母之脏,《医贯》所谓母藏子宫,子隐母胎,故水虚则金受火刑。地黄、玄参,壮水之主;麦冬、贝母,清肺之烦;白芍平肝以保肺;当归引血以归经;甘、桔本为成方,可以利咽喉而宣上部之结热也。

【临证举例】①肺癌 《黑龙江中医药》(1982;4:25):用本方加鱼腥草、半枝莲、白花蛇舌草,治疗中、晚期肺癌属阴虚内热型者38例。若兼感冒发热、咳嗽,则合麻杏石甘汤;痰血,加白茅根、藕节、白及、三

七粉或云南白药;肾虚,加女贞子、旱莲草;肝风内动,加天麻、钩藤、石决明、全蝎、蜈蚣;胸痛,加丹参、赤芍、三棱、莪术;胸水,加葶苈子、大枣、龙葵;上腔静脉综合症,加商陆、车前子。治疗结果:22例获得症状改善、病灶稳定。②肺结核咯血 《浙江中医杂志》(1986;1:31):黄某某,女,34岁。患结核病多年,形体羸瘦。近因寒温不调而发咳嗽,咯血,频频而吐,大便秘结,舌质红,苔薄黄,脉沉细数。经用庆大霉素、青、链霉素及安络血等治疗,病情未能控制。中医有作肺火不宁,痰热扰络治者,有作木火刑金,络伤血溢治者,俱无效果。改从肺肾阴虚,虚火上炎,以清金保肺,养阴滋肾法,予百合固金汤加味:百合、熟地、生地、玄参、麦冬、炒白芍各12克,川贝10克,当归6克,桔梗8克,甘草2克,生大黄5克。服三剂,咯血稍止,咳嗽未平,余症均有好转。续进二剂,咯血全止。

【备考】按:《金鉴》有天门冬。用法:水煎服。改为丸剂,名“百合固金丸”(见《医钞类编》)、“固金丸”(见《中成药处方配本》)。

32273 百合知母汤

【方源】《金匱》卷上。

【组成】百合七枚(擘) 知母三两(切)

【用法】先以水洗百合,渍一宿,当白沫出,去其水,更以泉水二升,煎取一升,去滓;别以泉水二升煎知母,取一升,去滓;后合和,煎取一升五合,分温再服。

【主治】百合病,发汗后者。

【方论选录】①《古方选注》:君以百合,甘凉清肺;佐以知母,救肺之阴,使膀胱水脏知有母气,救肺即所以救膀胱,是阳病救阴之法也。②《金匱方歌括》元犀按:百脉俱朝于肺。百脉俱病,病形错杂,不能悉治,只于肺治之。肺主气,气之为病,非实而不顺,即虚而不足。百合能治邪气之实,而补正气之虚;知母入肺金,益其水源,下通膀胱,使

天水之气合，而所伤之阴转，则其邪从小便出矣。若误汗伤阴者，汗为阴液，阴液伤故以此汤维其阳，即所以救阴也。

32274 百合前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】生百合三枚（劈，洗） 前胡（去芦头） 麻黄（去节）各一两半 葛根（锉）二两 生麦门冬（去心）半两 石膏三两（碎）

【用法】上咬咀。如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎取七分，去滓温服，后如食顷，再服。

【主治】伤寒愈后，已经二七日，潮热不解，将变成百合病，身体沉重无力，昏如醉状。

32275 百合柴胡汤

《圣济总录》卷二十九。为《圣惠》卷十三“柴胡散”之异名。见该条。

32276 百合消胀汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术 芡实各一两 茯苓 百合各五钱 山药一两 肉桂二钱 人参三钱

【用法】水煎服。

【主治】肺、脾、肾三经之虚，导致胃中积水浸淫，遍走于经络皮肤，气喘作胀，腹肿，小便不利，大便亦溏，一身俱肿。

32277 百合紫菀汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】百合 紫菀（去苗土） 柴胡（去苗） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒令黄） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙令微赤）各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓，空心温服，日晚再服。

【主治】伤寒百合病，似劳，形状如疟。

32278 百合滑石散

【方源】《金匱》卷上。

【异名】滑石散（《活人书》卷十八）。

【组成】百合一两（炙） 滑石三两

【用法】上为散。每服方寸匕，饮下，一日三次。当微利者，止服，热自除。

【主治】①《金匱》：百合病变发热者。②《千金》：百合病小便赤涩，脐下紧急。

【方论选录】①《千金方衍义》：百合病若变发热，乃血脉郁而成热，佐滑石以通利之。②《金匱方歌括》元犀按：百合病原无偏热之证，变发热者，内热充满，淫于肌肤，非如热之比。主以百合滑石散者，百合清金泻火，降逆气，从高源以导之；滑石退表里之热，利小便。二味合为散者，取散以散之义，散调络脉于周身，引内外之热气，悉从小便出矣。

32279 百合滑石汤

《医学入门》卷四。为《金匱》卷上“滑石代赭汤”之异名。见该条。

32280 百花拔毒散

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《烟霞圣效》。

【组成】黄柏三两（蜜炙三二遍） 草乌头半两

【用法】上为细末。用津唾调摊在碎纸花上，敷贴。

【主治】疮肿。

32281 百花定喘丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】冬花二两 丹皮 陈皮各四两 黄芩 桔梗 天门冬 生紫菀 麦冬 杏仁（去皮，炒）各四两 北沙参二两 麻黄 花粉 前胡 薄荷各四两 生石膏二两 百合四两 生五味子二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一九，开水送下。

【功用】疏风解热，止嗽定喘。

【主治】咳嗽痰喘，日夜不息，不能安眠，呼吸困难，胸满不畅，咽干口渴。

32282 百劳猪肚丸

【方源】《不居集》下集卷一。

【组成】真茅山苍术（取肥大者二十四两，米泔水浸七三夜，每日换水一次，去皮，切成二三分厚，晒干）四两 真广陈皮（五两，

去筋膜蒂，切成片，烘干）四两 紫肥厚朴十二两（去粗皮，姜汁拌，炒） 真鲜肥仙茅（四两，清水浸，用竹刀刮去皮，铜刀切二分厚，米泔水浸，去赤汁，烘干）二两 不油杏仁（三两，去皮尖，净干）二两 新鲜骨碎补（三斤，用竹刀割去黄黑皮，铜刀切成二分厚，烘干）二两

上六味分为四制：一用人乳，一用姜汁，一用童便，一用陈酒，拌过一宿，烘晒干为末，同入后药：

北五味二两 枸杞子八两 川贝母二两（去心） 白果肉四两（煮熟，去心） 百劳花二两（水拌，蒸捣。五味干湿同捣为泥，烘晒，同前药为末） 原枝大淮地四两（酒煮烂，捣如泥） 红枣肉一斤（临用煮熟，去皮核，捣） 核桃肉四两（临用捣为极细末） 莲子肉一斤（打碎，去心，微炒，为末）

【用法】用雄猪肚一具，不见水，以刀刮一小孔，倾去秽物，用酒洗净，不闻秽气为度。将莲肉粉入内二三两，陈酒一斤入内，将线缝好，再酒煮极烂为度。将前药共捣千捶如泥，若干，加猪肚汤及枣肉为丸，如梧桐子大。每早、晚服三钱。

【功用】调和五脏，辅正祛邪。

【主治】诸虚百损，风劳。发热咳嗽吐痰，或饮食日减，或吐红，或肌肉化为痰，大肉消瘦。

32283 百补全鹿丸

《饲鹤亭集方》。为《医统》卷四十八“全鹿丸”之异名。见该条。

32284 百补交精丸

《奇效良方》卷三十四。即《中藏经》卷下引葛玄真人方“百补枸精丸”。见该条。

32285 百补枸精丸

【方源】《中藏经》引葛玄真人方。

【组成】熟地黄四两 山药二两 五味子六两 苁蓉三两（酒浸一宿） 牛膝二两（酒浸） 山茱萸一两 泽泻一两 茯苓一两

（去皮） 远志一两（去心） 巴戟天一两（去心） 赤石脂一两 石膏一两 柏子仁一两（炒） 杜仲三两（去皮，锉碎，慢火炒令丝断）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心调酒送下。男子、妇人皆可服。

【主治】《奇效良方》：梦泄，精滑不禁。

【备考】本方方名，《奇效良方》引作“百补交精丸”。

32286 百补保真丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归（酒洗）四两 川芎四两 白芍（酒炒）四两 熟地（酒蒸）四两 生地（酒洗）四两 天冬（去心） 麦冬（去心）各一两二钱 知母（盐炒）二两 白术（土炒）四两 陈皮（去白）二两 香附（童便炒）四两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【主治】虚劳。

【宜忌】制药忌铁器。

32287 百补养原丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】党参四两 熟地八两 焦冬术茯苓 杜仲 杞子 芡实 牡蛎各三两 龙骨 归身 白芍各二两 肉桂心 制附子 橘红 制半夏 川贝 炙甘草各一两 砂仁五钱

【用法】上为末，用大土皮三两，酒、姜汁拌和，炼蜜为丸服。

【功用】培元养气，添精补神。

【主治】戒烟断瘾之后，本元不复，所致遗精腰痠，食少神倦。

32288 百补济阴丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】香附（炙）五十两 当归五十两 熟地五十两 杜仲炭五十两 续断五十两 山药五十两 茯苓十三两 丹皮十三两 泽

泻十三两 山萸(炙)二十二两 巴戟肉(炙)九两 苁蓉(炙)九两 补骨脂(炒)八两 青盐八两 大茴香八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】滋阴补气，养血调荣。

【主治】妇人诸虚百损，经水短少，虚火上升，腰痛耳鸣。

32289 百补鹿胎丸

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为原书“神效鹿胎丸”之异名。见该条。

32290 百补增力丸

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】六神曲 橘皮各十六两 白芍二两 麦芽四两 苍术八两 谷芽四两 山楂八两 枳壳 半夏各四两 川芎二两 厚朴 香附(醋炒)各四两 茯苓四两三钱 甘草四两 鹿角霜 泽泻 人参(去芦)各三钱 大黄炭四钱 棕板炭一两 山药四两 川附片二钱 荷叶三十二两 梔子 侧柏炭各三钱 山茱萸四钱 当归 大小蓟各五钱 茅根 丹皮 白术各四钱 肉桂三钱 茜草四钱 紫河车 黄耆 黄芩各四两 党参二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱五分。每服一丸或二丸，温开水送下。

【功用】健胃消导，益气养血。

【主治】身体虚弱，过劳咯血，精神疲倦，食欲不振。

【宜忌】忌劳碌，气恼。

32291 百补增力丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】麦芽(炒)一百二十八两 陈皮六十四两 苍术(半炒)五十一两二钱 茯苓十六两 神曲(炒)十六两 山药十六两 芡实(炒)十六两 甘草四两八钱 山楂(炒)八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱二分。每服二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】开胃健脾。

【主治】身体瘦弱，精神疲倦，食欲不振。

32292 百灵藤酿酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】百灵藤十斤(以水一石，煎取三斗) 神曲九两(微炒黄色，捣末) 糯米三斗(炊作饭)

【用法】上候饭冷，即熟揉曲末入饭中，并药汁同入于瓮中，一如酿酒法。经三五日，看沫尽，即更炊一斗糯米饭，候冷，投入瓮中，即熟澄清。更三日后，每日不计早、晚，温饮一小盏。服后觉浑身汗出为效。

【主治】①《圣惠》：风。②《本草纲目》：头风脑痛。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“百灵藤酒”。

32293 百药煎油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】百药煎 15 克 白矾 6 克

【用法】上为细末。油调外搽。

【主治】小儿湿疹。

32294 百选肥儿丸

《春脚集》卷四。为《幼幼集成》卷四“集成肥儿丸”之异名。见该条。

32295 百部清金汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】百部 骨皮 人参 麦冬 桔梗 生地 丹皮 芍药 茯苓 甘草

【主治】传尸劳。

32296 百部紫菀丸

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】百部(新瓦上炒) 紫菀(去苗土) 款冬花(择洗)各一两半 桔梗(炒) 贝母(去心，炒)各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎甘草、乌梅汤送下。

【主治】咳嗽。

32297 百病无忧散

《郑氏家传女科万金方》卷一。为《理伤续断方》“五积散”之异名。见该条。

32298 百病欬丹丸

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】铅丹 朱砂(细研,水飞过) 铁粉 牛黄 雄黄(各细研) 细辛 独活 露蜂房(炙黄) 人参(去芦头) 汉防己 桂心 甘草 川椒(去目及闭口者,微炒去汗) 各一分 蛻螂五枚(微炙) 蛇蛻皮五寸(炙黄) 鸡头一枚(炙赤,铍) 赤茯苓一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,粥饮送下。

【主治】小儿惊痫复发,眩闷倒蹶,或汤火不避。

32299 百疾薯蓣丸

《中国医学大辞典》。即《金匱》卷上“薯蓣丸”。见该条。

32300 百益镇惊丸

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为《保婴撮要》卷三“安神镇惊丸”之异名。见该条。

32301 百解发汗散

《北京市中药成方选集》。即《局方》卷二(宝庆新增方)“消风百解散”。见该条。

32302 百解绿蜡丸

《惠直堂方》卷四。为《救产全书》“三清百解绿蜡丸”之异名。见该条。

32303 百合生地黄汤

《外台》卷二。即《金匱》卷上“百合地黄汤”。见该条。

32304 百合鸡子黄汤

《兰台轨范》卷三。即《金匱》卷上“百合鸡子汤”。见该条。

32305 百灵藤牛膝煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】百灵藤五斤(细铍,以水三斗,煎至一斗,滤去滓,更煎至三升) 牛膝(去苗) 附子(去皮脐) 赤箭 仙灵脾 何首乌 鹿角胶 乳香各二两

【用法】上为细末,入前煎中,别入白蜜五合同熬,以柳木篦搅令匀,如稀饧即止,收于瓷器中。每服一茶匙,空心及晚食前以温

酒调下。

【主治】一切风,不以远近。

【宜忌】忌毒滑物。

32306 百合五味姜附汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】百合三钱 五味一钱 芍药三钱 甘草二钱 茯苓三钱 半夏三钱 干姜三钱 附子三钱

【用法】水煎大半杯,温服。

【主治】水土寒湿,而有上热目赤痛。

【加减】如面赤不热而作疼痛,是无上热,去百合、芍药,加桂枝。

32307 百合桔梗鸡子汤

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】百合三钱 桔梗二钱 五味一钱 鸡子白一枚

【用法】煎半杯,去滓,入鸡子清,热服。

【主治】失声,音哑。

32308 百合滑石代赭汤

《千金》卷十。为《金匱》卷上“滑石代赭汤”之异名。见该条。

32309 百花如意酣春酝

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】角沉香一两 玫瑰花一两 蔷薇露一两 梅花蕊一两 桃花瓣一两 韭菜花一两 核桃肉八两 白酒浆五斤 好烧酒五斤

【用法】前七味用一绢袋盛之,悬于坛中,再入二酒,封固窖月余。随意饮之。

【功用】益肾、固精、坚阳。

32310 百草血余棕灰散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】陈棕灰 百草霜 头发灰各一两

【用法】上为细末。每服一钱,陈酒下。

【主治】血崩。

死

32311 死鼠膏

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】死鼠一枚(中形者) 乱发二两

松脂三两 黄丹三两(炒令黄色)

【用法】上药用油一斤,以文火煎鼠、发,候消,以绵滤去滓,同入铛中;然后下松脂、黄丹,以柳木篦搅令匀,膏成,于瓷器中盛。每用涂贴,日二易之。

【主治】鼠瘻。

32312 死人枕煎

【方源】《济阳纲目》卷四十七。

【组成】死人枕(即死人脑后骨也,得半朽者良)

【用法】煎汤服。

【主治】鬼疟。病人颜色、声音、形症与脉不合于病者。

32313 死蛇鼠膏

【方源】《普济方》卷二九三。

【组成】死蛇腹中鼠

【用法】以腊月猪脂煎,候焦,去滓,敷之。

【主治】蚊瘻,鼠瘻。

夹

32314 夹攻饮

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】大黄一两 芒消三钱 苍术三钱 制乳香二钱 瞿麦二钱 篇蓄三钱 滑石一钱 制没药二钱 木通一钱半 梔仁二钱 石膏一钱 水灯芯五茎 桔梗一钱 银花三钱 皂角刺(煨,去尖)三个

【功用】令毒从便出。

【主治】杨梅毒喉。

32315 夹纸膏

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】乳香三钱 血竭二钱半 没药四钱 郁金五钱 麝香一钱半 牡蛎半两 黄连 黄柏各二两 大黄 黄丹各一两 轻粉三十贴

【用法】上为细末,清油调匀。摊油纸上贴疮,每一个贴三日。每日以冷水洗三次,膏药亦翻转三次,两层夹纸,以线缝四边,针刺眼透药气。其药末同和一处收,要用旋调。

【主治】瘰疬久不愈。

32316 夹纸膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引张会山方。

【组成】松香 黄丹 蓖麻子(去壳)各等分

【用法】上为末,用香油调,隔油纸摊药,夹纸中。贴患处。

【主治】瘰疬、顽疮。

32317 夹纸膏

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】百草霜 壮人血余炭各等分

【用法】上为细末。腊月油烛泪化开,调为膏,摊旧柿油伞纸上,夹住,周围线缝,凉水浸之。先以温淘米泔洗疮净,贴药勒住。次日再洗疮、洗药,翻过贴之。三次照前洗换新药贴。

【主治】发背溃烂。

32318 夹纸膏

【方源】《金鉴》卷七十一。

【组成】黄丹(炒) 轻粉 儿茶 没药 雄黄 血竭 五倍子(炒) 银朱 枯矾各等分

【用法】上为末。量疮大小,剪油纸两张,夹药于内,纸周围用面糊粘住,纸上用针刺孔,先将疮口用葱、椒煎汤洗净拭干,然后贴上,以帛缚之。三日一洗,再换新药贴之。

【功用】①《金鉴》:祛腐。②《中医方剂临床手册》:止痛。

【主治】瘰疬溃腐。

32319 夹纸膏

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】定粉四两 糠青三钱 红土八钱

【用法】上药各为末,先将桐油熬热,再下末药搅匀,以厚纸二面拖上,待干,出火气。验疮之大小剪贴,一面贴三日换之。

【功用】生肌收口。

【主治】瘰疬。

32320 夹纸膏

《疡科心得集·补遗》。为原书《家用膏丹丸散方》“十层膏”之异名。见该条。

32321 夹纸膏

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】紫草 当归 细生地 黄柏 白芷 苍术各一两 松香 白蜡 黄蜡 飞丹 密陀僧 血竭各二两 轻粉三钱 樟脑一两 铜绿五钱 炉甘石一两 明矾五钱

【用法】上药用麻油一斤，入前七味煎枯去滓，入二占溶化，再将后药研为极细末和匀，摊纸上贴之。如干，加公猪油。

【主治】年久、新起疔疮。

32322 夹纸膏

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】黄蜡五两 黄丹(飞) 铅粉各四两 轻粉 乳香 没药各五钱 冰片三分(末) 麻油(春夏二两，秋冬三两)

【用法】上先将蜡、油煎五六沸，下乳、没末，再二三沸下轻粉，随下丹、粉，槐柳枝搅十余次，取起，冷定后下冰片搅匀，瓶盛浸水中一宿，出火毒。用时先以苦茶洗疮，将膏用薄油纸(较患处长阔一倍)摊一而，余一面刺孔数十，折束盖膏，以有孔一面向患处贴。三日一换，三贴即愈。

【主治】疔疮。

32323 夹纸膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二引《丛桂堂方》。

【组成】芦甘石二两(煨，用三黄汤淬干) 血竭八钱 黄占一两二钱(三味和猪油熬化，贮瓷碗内) 乌贼骨(去壳) 青果核(炙存性) 大黄各三钱 朱砂六钱 龙骨(醋煨)五钱 白占一两二钱

【用法】上为细末，入前油内调匀听用。以油纸摊膏，刺十数孔贴。一二日翻转，再刺孔贴之。

【主治】远年疔疮。

32324 夹纸膏

【方源】《良方汇录》卷下。

【组成】甲片八钱 生地 当归各六钱 葱叶十五茎 菜油一斤

【用法】上先将甲片煎至黄色，次下生地

等，煎枯去滓，再入锅，下黄蜡八钱烊化，用福倘油纸作大小块，蘸油收贮。

【主治】远近湿疮。

32325 夹纸膏

【方源】《验方新编》卷八。

【组成】樟脑三钱 铜绿一钱

【用法】用猪板油和药捣烂，以油纸夹之，贴患处。一二日翻转贴，三四日脓尽而愈。如四日后脓尚未净，再换一纸。

【主治】疔疮。

32326 夹纸膏

【方源】《外科传薪集》。

【组成】紫草 归身 细生地 黄柏 白芷 冬青桑 川椒各一两 黄白占 飞丹 密陀僧 血竭各二两 轻粉三钱 银粉一两 铜绿五钱 乳没药各五钱 冰片二钱

【用法】用麻油一斤，入前七味煎枯去滓，入二占溶化，再将后药研细和匀。摊纸上贴之。如干，加公猪油调亦可。

【主治】多年新起疔疮。

32327 夹纸膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】麻油四两 水龙骨一两 黄占五钱 白占五钱 铅粉一两 铜青一两

【用法】将油熬好，入占化开，再入药末，加铜青打好。

【主治】疔疮。

32328 夹纸膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】煨石膏一两 炉甘石(童便浸，煨)一两 龙骨(醋煨三次) 轻粉 寒水石(煨)各五钱 嫩松香(放铜勺内，熬至黑色起烟，倒在水内候冷，再用葱白捣液煮滚。候冷为末)五钱

【用法】上为细末，轻粉另研细再和入，以公猪油调匀，作夹膏。每用先以葱汤洗净疮口贴之，将白布紧紧缚定，一二日后开看，见夹膏转黑色即换去，另贴新膏。

【主治】多年新起疔疮。

32329 夹纸膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】乳香(炙去油)二钱 没药(炙去油)二钱 制甘石五钱 铅粉四两 轻粉三钱 梅片二分 老白占三两

【用法】用猪板油一斤煎去滓,入前药,以白皮纸拖之,阴干待用。

【主治】疔疮。

32330 夹纸膏

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】冰片二分 麝香一分 铜绿五分 水银二分

【用法】共研至不见水银星为度,再用黄占五钱、雄猪板油一两,共熬匀,入前药捣成膏,隔纸摊贴好,多刺针孔贴之。

【主治】疔疮。

32331 夹纸膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】乳香 没药各六钱 洋樟四钱 炉甘石(制)二钱 当归一两 轻粉五钱 白占六两 黄占五两 猪油四斤

【用法】上为细末,将猪油,二占同烱化后,和入前药末搅匀,用白皮纸拖之,阴干。将膏以针刺密孔扎之,一日一换。

【功用】《中药制剂手册》:去湿解毒,活血止痛。

【主治】①《中国医学大辞典》:疔疮腐烂臭秽,痛痒不时。②《中药制剂手册》:顽疮,结毒溃烂,久不收口。

【宜忌】《全国中药成药处方集》:不可水洗,不可入口。

32332 夹钟丸

《家塾方》。为《千金》卷十一“消石大丸”之异名。见该条。

32333 夹食丸

《圣济总录》卷七十二。为原书同卷“丁香丸”之异名。见该条。

32334 夹盐散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】鼓子草根一把 大麦三十粒 盐

少许

【用法】上捣令烂。敷疮上,一日一易,三日后三日一易。

【主治】阴疮及恶疮。

32335 夹袋散

《鸡峰》卷二十。为原书同卷“失笑散”之异名。见该条。

32336 夹棍神方

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】肥皂子

【用法】不浸透,去外黑皮,用里白肉并仁,捣如泥。如明日用事,今晚用此敷之,上至脚腓一节,下至脚底板心,并指甲内,处处敷匀,不可有一毫空隙处,以油纸包,外用裹脚缠足。其药与皮肉一样,颜色不变,用事时,一些不碍,毫无干涉。出来时,以黄豆浆温温洗之。其豆浆,须预先一日将豆泡烂,磨浆候着用。

【主治】①《奇方类编》:损伤。②《疡医大全》:刑杖伤。

32337 夹棍软骨神方

【方源】《疡医大全》卷三十七引江仍度方。

【组成】川乌(炒存性) 草乌(炒存性) 猪牙皂(炒存性) 蓖麻子(去壳,炒)各一两 飞面六面 狗油半斤(熬化)

【用法】上捣匀,作四饼。每饼中间包真麝香二分五厘,贴用刑处。先用威灵仙四两煎汤,足胫浴透,然后以药饼贴上。如不用刑,以半夏、生姜、飞面各等分,做四饼贴上即解。

【主治】刑杖伤。

【宜忌】制药时忌铁器。

托

32338 托药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】木鳖子一个 香附一钱 生半夏一钱 黄连三分 冰片一分 天南星一钱(一方有大黄、黄柏各一钱,麝香五厘)

【用法】上为细末。鸡子清调敷脚底，男左女右。

【主治】口疳疮，汤水不下。

32339 托中散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】黄耆（切）一两 甘草（微炙）半两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后汤点下，一日二服。次用取药。

【主治】瘰癧。

32340 托外膏

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】黄耆（锉）一两半 白芷 大黄（锉，炒）各一两 当归（切，炒） 续断各三分 薤白（切）二合 松脂二两（别研） 猪脂五两 生地黄汁一升 蜡一两半

【用法】上将前五味为细末，入地黄汁慢火煎渐稠，次入猪脂、松脂、薤、蜡等，再煎成膏，以新布滤过，新瓷器盛，候冷，摊帛上，看大小贴之，逐日一易。

【主治】产后乳痈肿痛，脓不消散。

32341 托邪饮

【方源】《外科证治全书》卷五。

【组成】西党参（去梢，生用）五钱 归身三四钱 白芷一钱五分 防风二钱 荆芥穗 桔梗各二钱 橘皮二钱 甘草 川芎各一钱

【用法】水煎去滓，对陈酒一杯温服。取微汗。

【主治】阳痈溃后见恶寒发热表证者。

【加减】如头痛项强，加羌活。

32342 托里汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【异名】乳香散（《续本事》卷六）、内消散（《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》）、香粉散（《外科精义》卷下）。

【组成】乳香一两（通明者，用水外浸，以乳钵研细） 真绿豆粉（研）四两

【用法】上为极细末。每服一钱匕，新水调下，水不可多，要药在胸膈上也，次用一醉膏。

【主治】①《圣济总录》：痈疽、发脑。②《续本事》：发背内溃及诸恶毒冲心。呕吐，疼痛不可忍。

32343 托里汤

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】人参 黄耆 当归 防风 青皮 生地

【用法】水煎服。痘不起速服，莫待痘苗枯。

【主治】痘不起。

32344 托里散

【方源】《医学正传》卷六引《千金》。

【组成】羌活一钱五分 防风（酒洗）五分 防风梢五分 藁本一钱五分 当归身三钱 当归梢五分 连翘三钱 黄芩（酒洗）三钱 黄耆一钱五分（生用） 人参一钱五分 炙甘草一钱五分 生甘草五分 陈皮五分 苏木 五味子 酒黄柏 酒防己各五分 桔梗 梔子 生地黄（酒洗）各一钱 酒大黄三钱 酒黄连一钱 木猪苓一钱五分 麦门冬二钱

【用法】上切细，分作二服。每服用水三大盏，浸半日，煎至一盏，稍热服，后一服如前，并滓再煎服。

【主治】背疽并诸恶疮。

32345 托里散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】威灵仙（洗，焙） 当归（切，焙） 牡丹皮 芍药（锉） 黄耆（锉） 桂（去粗皮）各一两 大黄（炮）半两

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】产后乳结核，欲坏不坏。

32346 托里散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 白芍 甘草 白芷 防风 桔梗 连翘 陈皮

【主治】妊娠生痈。

【加减】毒盛作痛，加乳香、没药行血止痛；胎动不安，加阿胶、厚朴。

32347 托里散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】山蜈蚣二两 当归二分 地黄(去土) 甘草(炙) 厚朴(炙) 白术 白芷 川芎各半两 川乌三分(炒) 黑豆一合 麻黄三分(去节)

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下；如不饮酒，水一盞，加生姜三片，薄荷五叶，同煎至八分，一日三五次。

【功用】止痛托里，固济脏腑。

32348 托里散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】栝楼子(去瓢) 鬼腰带皮 皂角刺 射干(即仙人掌根，红花者是) 天罗瓜(取子)各一个 茴香 木鳖五个(去壳) 汉椒各一两

【用法】上焙干为末，面薄糊调为饼，炙干为末。每服二三钱，酒调下；不饮酒，以木香汤调下。

【功用】内托，不使透膜。

【主治】痈疽欲发，未溃及已溃。

【备考】方中茴香用量原缺。

32349 托里散

【方源】《普济方》卷三二四引《卫生家宝》。

【组成】甘草一两 当归一两 天罗一个(炒，丝瓜是也) 栝楼一个(炒紫色) 皂角刺四十九个(炒)

【用法】上为细末。每服二钱，酒调下。

【主治】乳痈。

32350 托里散

【方源】《陈氏小儿痘疹方论》。

【组成】人参 黄耆(炒)各二钱 当归(酒洗) 白术 陈皮 熟地黄 茯苓 芍药(炒)各一钱五分 甘草(炙)五分

【用法】每服三五钱，水煎服。

【功用】消肿溃脓。

【主治】①《陈氏小儿痘疹方论》：痘毒元气虚弱，或行克伐不能溃散。②《景岳全书》：痈毒内虚不能起发。

【备考】《张氏医通》有柴胡。

32351 托里散

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】黄瓜萎一个 忍冬草 乳香各一两 苏木五钱 没药三钱 甘草二钱

【用法】每服用酒三碗，煎二碗，空心、日午、临睡分三服。滓为细末，酒糊为丸，如弹子大，朱砂为衣，细嚼，当归酒送下。

【功用】消肿，溃脓，生肌。

【主治】痈疽，打扑伤损。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“塞里散”。

32352 托里散

【方源】《外科精义》卷下引成子玉方。

【组成】川乌头(炮) 茯苓各三两 干姜(炮) 麻黄(去节) 甘草(炙)各一两五钱 杏仁(炒，去皮尖) 五味子 桂心各一两

【用法】上为粗末。每服五六钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前温服。

【主治】疮疽，丹肿，结核，瘰癧。

32353 托里散

《外科精义》卷下。为《普济方》卷三〇一引《瑞竹堂方》“应效散”之异名。见该条。

32354 托里散

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】栝楼一个(去皮) 生甘草一寸

【用法】上锉细。酒一盞，煎至七分，食后温服。

【主治】痈疽。

32355 托里散

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】甘草一两 黄耆半两 桔梗半两 青橘皮半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，煎三沸，去滓，食后、临卧温服。

【主治】疮毒，疽，疹，发背，肿毒。

32356 托里散

【方源】《普济方》卷二八八。

【组成】山蜈蚣一两 当归 川乌(炒) 白术 白芷 川芎各三钱 麻黄一钱

【用法】上为末。每服二钱，酒下；加生姜、薄荷，水煎亦可。

【功用】止痛，固脏腑。

【主治】痢疽。

32357 托里散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】黄耆 木香 赤芍药 蝉蜕 肉桂各等分

【用法】水煎服。

【功用】补虚，活血，匀气，发疮，通行血，气倍加。

【主治】婴孩痘疹。

32358 托里散

《普济方》卷四〇三。为《局方》卷八（绍兴续添方）“化毒排脓内补十宣散”之异名。见该条。

32359 托里散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【异名】托里护心散（《明医指掌》卷八）。

【组成】大黄 牡蛎 瓜蒌根 皂角针 朴消 连翘各三钱 当归 金银花各一两 赤芍 黄芩各二钱

【用法】上为粗末。每服半两，水、酒各半煎服。三服消尽。

【主治】一切恶疮发背，疔疽，便毒始发，脉洪弦实数，肿甚欲作脓者。

【方论选录】《医方集解》：此足阳明、厥阴药也。金银花清热解毒，疮痈主药；当归、赤芍调营血；大黄、芒消荡胃热；黄芩清肺火；牡蛎软坚痰；连翘、花粉散结排脓；角刺锋锐，直达病所而溃散之也。

32360 托里散

《医方类聚》卷一七四。为《本事》卷六“内托散”之异名。见该条。

32361 托里散

《医学正传》卷六引《疮疡集》。为《局方》卷八（宝庆新增方）“神效托里散”之异名。见该条。

32362 托里散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】人参二钱 黄耆 当归 甘草各一钱 川芎 肉桂各五分 丁香二分 陈皮三分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痘浆不行，顶陷不起。

32363 托里散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】人参 当归 黄耆各二钱 川芎 防风 桔梗 甘草 白芷稍 厚朴（姜炒）各一钱 紫草茸一钱 肉桂二分 红花（酒洗）七分

【用法】水一钟，酒一钟，煎七分，温服。

【主治】痘疹触犯秽气变坏者。

32364 托里散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】托里快斑汤（《片玉痘疹》卷八）。

【组成】防风 羌活 甘草 牛蒡子（炒） 升麻 桔梗 荆芥穗 官桂少许 干葛 连翘 归尾

【用法】加竹叶，水煎服。

【主治】痘稠密，应肿不肿。

32365 托里散

【方源】《外科发挥》卷一。

【组成】人参 黄耆（盐水拌炒） 当归（酒拌） 川芎 白术（炒） 茯苓 芍药各一钱 厚朴（姜制） 白芷 甘草各五分

【用法】作一剂。水二钟，煎八分服。

【主治】疮疡饮食少思，或不腐，不收敛；溃瘍作痛、发背、脑疽、鬓疽、时毒、臂疽、伤损。

32366 托里散

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】人参一钱（气虚多用之） 黄耆（盐水拌炒）一两 白术（炒） 陈皮各七分 当归身（酒拌）一钱 芍药（酒炒） 熟地黄（生者自制） 白茯苓各一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《正体类要》：金疮、杖疮，及一切疮毒，因气血虚不能成脓，或脓成不能

溃敛，脓水清稀，久而不愈。②《外科枢要》：疮疡恶寒发热者。

32367 托里散

【方源】《幼科类萃》卷二十八。

【组成】人参 当归(酒浸) 黄耆各二两 川芎 防风 桔梗 白芷 甘草 厚朴各一两 肉桂

【用法】上为细末。每服半钱，木香、紫草汤调下。

【功用】补虚，调胃，匀气，内托疮毒。

【主治】小儿痘疮，毒根在里，或血气虚弱，或风邪秽毒冲触，使痘毒内陷，伏而不出，或出而不匀快。

【备考】方中肉桂用量原缺。

32368 托里散

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】官桂 黄耆 人参 甘草 白芷 防风 川芎 川当归 桔梗 厚朴 木香 蝉蜕各五分

【用法】用水一钟，煎半钟，温服。

【主治】小儿痘疹初发之先。

32369 托里散

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 白术 茯苓 甘草 芍药 黄芩 肉桂各等分

【用法】上为粗末。每服一钱，水一盞，加生姜一片，大枣一个，煎四分，不拘时候服。

【主治】一切痘疹、疮疡，或热或寒，发出不快，及已出自塌倒陷。

【加减】热，去桂；寒，去芩。

32370 托里散

【方源】《痘疹金镜录》卷下。

【组成】陈皮 贝母 桔梗 人参 黄耆 甘草 当归 川芎 连翘 山楂 肉桂 白芍药

【用法】加生姜三片，水煎服。

【功用】①《痘疹金镜录》：解毒，补气血。②《医方考》：补虚托里。

【主治】①《痘疹金镜录》：痘疮。②《痘学真

传》：痘七朝以后，色淡形塌，乍痛乍痒，气血不足，时寒时热，或虚火上升，上热下冷。

【加减】气滞，加木香磨入。

【方论选录】《医方考》：人参、黄耆、甘草，补气药也，佐之以山楂、木香，则气不滞；当归、川芎、芍药，补血药也，佐之以肉桂，则血不滞；桔梗、连翘流气清热；陈皮、贝母利气开痰。

32371 托里散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】瓜蒌(大者，杵)一个 当归(酒拌) 黄耆(盐水炒) 白芍药 甘草各一两半 熟地 天花粉 金银花 皂刺(炒)各一两

【用法】上为散。每服五两，以无灰酒五茶钟，入瓷器内，厚纸封口，再用油纸重封，置汤锅内，盖煮至药香，取出分服，直至疮愈。始终常服，不致内陷。

【主治】一切疮毒。

32372 托里散

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】穿山甲(酒浸，炒)一两 麝香二分 鹅翎管二钱(炒黄色) 雄黄一钱

【用法】上为末。三岁至五岁，服二分半或五分，酒调下。服不可过多，盖被半时，自然红活易进。

【主治】痘不肥满者。

32373 托里散

《古方汇精》。为《古方选注》卷下“定岩散”之异名。见该条。

32374 托里散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】生黄耆三分 当归二分 白芍二钱 续断三钱 云苓二钱 香附子一钱 枸杞子一钱五分 甲珠一片 银花一钱 甘草七分

【用法】福元十枚为引。

【主治】无论毒之阴阳，溃后气血虚者。

【备考】《中医大辞典·方剂分册》本方用

法：水煎服。

32375 托里散

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【异名】内托散。

【组成】人参 炙耆 当归各二钱 川芎 桔梗（炒） 白芷 厚朴（姜制） 甘草（生） 防风各一钱 紫草 桂心（去黑疔陷去之） 木香各三分 生姜一片 红枣一个

【用法】水煎服。

【主治】痘疮灌脓，表虚里实，气血皆弱，而无大寒大热。

【加减】痘红紫黑陷属热者，去香桂，加紫草、红花、黄芩；痘淡白灰陷而虚寒者，加丁香；当灌不灌，倍参、耆、当归、糯米，入人乳好酒。

32376 托里散

【方源】《外科医镜》。

【组成】人参三钱 生黄耆五钱 当归三钱 甘草二钱（生） 制乳香一钱 制没药一钱 山甲三片（炒） 牛皮胶五钱（黄明者佳，用牡蛎粉炒成珠）

【用法】加酒、水煎服。

【功用】已成未溃者服之不传恶证。

【主治】一切痈毒。

32377 托里煎

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】黄耆 白茯苓各一两 甘草半两 乳香一钱（另研）

【用法】上为细末。每服二钱，酒半盏，慢火煎成膏子，再入酒一角盏，调匀温服。

【主治】伤折疼痛。

32378 托毒丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】羌活 前胡 薄荷 金银花 黄芩各一两 桔梗 乌药 粉草各五钱 独活 川芎 枳壳各一两四钱 连翘 柴胡 天麻 茯神各五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，七分重，朱砂为衣。每服一丸，白开水送下。

【功用】散风解热，托毒清血。

【主治】四时感冒，头痛身痒，鼻流清涕，咳嗽作喘；痘疹将出，乍寒乍热，惊风抽搐，睡卧不宁，呕吐恶心；疔疮，恶疮。

32379 托毒汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】白芷 薄荷 防风 赤芍药 蒺藜 荆芥 角刺 金银花 连翘 生地 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘后毒未尽，复作肿毒疼。

【加减】疮痛，加芩、连、梔子；痒，加参、耆、白术、蝉蜕；在头面，加川芎、升麻、桔梗；在足，加香附、木瓜；在臀，加柴胡、黄柏；在膝，加牛膝、木通。

32380 托毒饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】当归尾 金银花 天花粉 连翘各一钱 赤芍 皂角刺 僵蚕 蝉蜕各六分 芒消 穿山甲 大黄各二钱 蜈蚣一条

【用法】水煎，空心服。

【主治】广疮初起。

32381 托毒散

【方源】《鬼遗·附录》。

【组成】大附子一枚（去皮脐） 当归 麻黄 甘草 桂枝 川芎 羌活 石韦 龙胆草各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，盐少许，同煎至六分，空心、日午、夜卧通口服。

【主治】痈疽不问气毒、风毒，一切毒气所结，初起高肿，发疼不定，喘息气粗。

32382 托胎丸

【方源】《李氏医鉴》卷八。

【组成】杜仲八两（糯米汤煎，浸透，炒断丝） 续断二两（酒拌，焙） 山药六两

【用法】上为末，面糊为丸；或枣肉为丸。米饮送下。

【功用】补肾气，托胎元。

【主治】受孕一二月，惯堕胎者。

32383 托养丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】硫黄 水银各半两（同研细，不见星） 附子半两（炮，去皮脐） 木香半两 当归（去芦，洗净）半两（切，焙） 大黄一两（湿纸裹，煨熟）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，生姜汤化送下，不拘时候。

【主治】伤食吐逆，心胸满闷，阴阳痞，手足厥冷，烦热躁闷。

32384 托珠丹

【方源】《医方类聚》卷二二九引《仙传济阴方》。

【组成】车前子四两（淘洗，略炒，为末） 菟丝子（淘洗，酒蒸，焙，为末）四两

【用法】上用鸦酸（俗名婆酸草）捣自然汁少许，添酸醋，抄少面糊为丸，如鸡头子大，用辰砂为衣，阴干。每服半丸或一丸，用老鸦酸叶捣自然汁磨化，添入百沸醋汤调下。但要进得一二丸，产理自然顺快。

【功用】催生。

【主治】正产时，腰腹坠痛，不可胜任。

32385 托脐饼

《经验广集》卷一。为《仙拈集》卷一“肚脐饼”之异名。见该条。

32386 托杨梅方

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】威灵仙 蝉蜕各一钱 生大黄三钱 麻黄二钱 甘草节五分

【用法】上用精羊肉一斤，水五碗，将肉煮烂，令病人食尽肉，然后用肉汤二碗，煎药六分，去滓，温服。盖被出臭汗，打下恶毒大便；如痢疾不须补，下尽毒气。

【主治】杨梅初起，浑身筋骨疼痛，寒热往来，头目昏眩。

【宜忌】忌七日不出房门，勿令见风。

32387 托里十补散

《局方》卷八（绍兴续添方），为原书同卷“化毒排脓内补十宣散”之异名。见该条。

32388 托里十宣散

《简明医彙》卷八。为《局方》卷八（绍兴续添方）“化毒排脓内补十宣散”之异名。见该条。

32389 托里千金散

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】人参 当归各一钱 广木香 厚朴 甘草 香附各五分 川芎 白芍药各七分 白芷八分 桔梗四分 糯米四十九粒 鸡汁一钟 笋二两

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

32390 托里无忧散

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】黄耆 人参 甘草 僵蚕 白芷 桔梗 当归 川芎 炒占米 大枣

【主治】痘至六七日，身不热，痘不燥，亦不甚红，囊不充肥者。

32391 托里内补散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】人参 当归 官桂五分 川芎 防风 白芷 桔梗 黄耆 炙草 厚朴 木香 白芍药各一钱

【用法】上为末。每服六钱，酒调下。

【功用】消痈，止痛。

【主治】痈疽。

32392 托里内补散

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】人参 川归 川芎 白芍 甘草 白芷 防风 白术 茯苓 官桂 黄耆 金银花各等分

【用法】水煎服。

【主治】一切恶疮，溃烂出脓以后。

32393 托里化毒汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】人参 黄耆 茯苓 金银花 甘草 当归 白术 牛蒡子 白芷 连翘 陈皮

【主治】痘痈成脓。

【加减】下部，加牛膝、木瓜、米仁、独活；

未溃，加穿山甲。

32394 托里化毒散

【方源】《外科医镜》。

【组成】鲜何首乌一两 当归三钱 甘草二钱(生) 没药一钱 乳香一钱 茄蒂七个(干者，焙用) 人参三钱 黄耆五钱(生)

【用法】水煎服。

【主治】对口、痈毒。

32395 托里六倍散

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】黄耆(细锉)一两一分(脓多倍之) 赤小豆三分(口干倍之) 芎藭半两(若肉未生倍之) 白藪三分(疮口不合倍之) 栝楼(去皮)三分(小便不利倍之) 当归(切，焙)一两(若疼倍之)

【用法】上为细散。每服方寸匕，温酒下，日三次，夜二次。

【主治】痈疽。

32396 托里生肌汤

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】洋参 石斛 丹参 川芎 川贝 黄耆 归身 白芍 菟藟子

【主治】乳漏漏脓。

32397 托里生肌散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【异名】芎藭散(《圣济总录》卷一三〇)、生肌散(《普济方》卷二八九)。

【组成】芎藭二两 黄耆一两(锉) 白芷半两 赤芍药一两 桂心三分 人参半两(去芦头) 丁香半两 当归一两

【用法】上为散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【功用】《圣济总录》：托里生肌。

【主治】①《圣惠》：发背溃后，脓水不绝。②《圣济总录》：痈疽，久冷不愈。

32398 托里玄参散

《外科精义》卷下。即《圣济总录》卷一三〇“内托散”。见该条。

32399 托里地脉散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】当归 地蜈蚣 赤芍药 甘草各一两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】痈疡。

32400 托里当归汤

【方源】《外科精义》卷下引何君五方。

【组成】当归 黄耆 人参 熟地 川芎 芍药 甘草(炙) 柴胡各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】痈疽、瘰癧、流注、乳痈、下疳，诸疮气血俱虚，毒气入腹者，及妇人诸疮，经候不调。

①《外科精义》：诸疮毒气入腹。②《外科发挥》：溃瘍气血俱虚发热，及瘰癧、流注、乳痈，不问肿溃。③《外科枢要》：妇人诸疮，经候不调，小便频数，大便不实。④《杏苑》：下疳注干，脓水交流，寒热头疼。⑤《杂病源流犀烛》：腹痈。

32401 托里回生散

【方源】《片玉痘疹》卷十。

【组成】黄耆 当归 连翘 甘草 官桂 人尿(烧过) 大力子

【用法】水煎服。

【主治】痘疮破而无水，便干枯者。

32402 托里回阳汤

《保婴撮要》卷十五。为《外科枢要》卷四“回阳汤”之异名。见该条。

32403 托里冲和汤

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】人参二钱 黄耆三钱 白术(炒) 陈皮 当归各一钱 甘草(炒)五分

【用法】水煎，徐徐服。

【主治】疮疡属半阴半阳，似溃非溃，似肿非肿，因元气虚弱，失于补托所致。

32404 托里抑膏汤

《医学入门》卷八。为《外科枢要》卷四“托里益膏汤”之异名。见该条。

32405 托里护心丸

【方源】《文堂集验方》卷四。

【组成】白矾一两二钱 黄蜡一两 雄黄一两二钱 朱砂六钱(水飞) 琥珀一钱

【用法】上为细末,先将黄蜡化开,入药末和匀,须众手为丸,如梧桐子大。每服三十丸,白滚水送下,一日三次。

【功用】消肿,止痛。可免口舌生疮,黑烂。

【主治】痈疽毒症,不问阴阳。

32406 托里护心散

《奇效良方》卷五十四。为《本事》卷六“内托散”之异名。见该条。

32407 托里护心散

《明医指掌》卷八。为《玉机微义》卷十五“托里散”之异名。见该条。

32408 托里连翘散

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】柏叶半两(干者) 黄耆一两(炙) 萱草根半两 乳香一分(研) 甘草半两 连翘半两

【用法】上为末。每服一钱,温酒或米饮下,不拘时候。

【主治】痈疽。

32409 托里快斑汤

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】当归 黄耆 川芎 木香 青皮 牛蒡子 紫草 连翘 木通 防风 桂枝 蝉蜕

【用法】上锉细,加淡竹叶十片,水煎,温服,不拘时候。

【主治】痘起发迟,热而不出,及痂后发热者。

32410 托里快斑汤

《片玉痘疹》卷八。为《万氏家抄方》卷六“托里散”之异名。见该条。

32411 托里完趾汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】人参二钱 黄耆五钱(生) 远志三钱(去心) 金银花一两 茯苓三钱 牛膝三钱 钗石斛三钱

【用法】水煎服。

【主治】足趾疗毒已溃。

32412 托里败毒散

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】绵黄耆(盐水炒)三钱(或五钱,或八钱,或一两) 甘草节(水炙)二钱(可加至四五钱) 赤芍药二钱 金银花三钱 茜草(江西出,细如灯芯者佳)三钱 何首乌(鲜者)五钱 真白僵蚕(炙,研)六分 白及二钱五分 皂角刺一钱 贝母(去心)二钱 栝楼根三钱 穿山甲(土炒,研)一钱 鼠粘子(炒,研)一钱 蝉蜕(去翅爪)一钱

【用法】先用夏枯草五两,河水五大碗,煎三碗,入前药同煎至一碗,不拘时候服。

【主治】肿毒。

【加减】阴症去后五味,加人参三钱、麦门冬五钱。

32413 托里和中汤

《医学入门》卷八。为《外科枢要》卷四“托里益中汤”之异名。见该条。

32414 托里定痛汤

《金鉴》卷六十二。为《外科正宗》卷一“托里定痛散”之异名。见该条。

32415 托里定痛散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】托里定痛汤(《金鉴》卷六十二)。

【组成】归身 熟地 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各一钱 粟壳(泡去筋膜,蜜炒)二钱

【用法】水二钟,煎八分,随病上下,食前后服之。

【主治】痈疽溃后,血虚疼痛不可忍者。

32416 托里建中汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 半夏 炮姜各一钱 甘草五分

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【功用】建中气。

【主治】痈疽元气素虚,或因寒凉伤脾损胃,饮食少思,或作呕泄泻。

32417 托里建中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 半夏炮姜各一钱 甘草五分 熟附子八分

【用法】水二钟，加煨姜三片，大枣二个，煎八分，不拘时候服。

【功用】建中气。

【主治】痈疽元气素虚，或因寒凉伤脾损胃，饮食少思，凡食无味或作呕、泄泻。

32418 托里茯苓汤

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】防风 桔梗 芍药 五味子 川芎 甘草 麦门冬(去心) 桂(去皮) 熟地黄各一两 当归 黄耆 茯苓各一两五钱

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】①《外科精义》：下疳，大便软。②《东医宝鉴·杂病篇》：痈疽溃后，脓多出内虚。

32419 托里荣卫汤

《医学发明》(拔粹本)。即原书(人卫本)卷六“内托荣卫汤”。见该条。

32420 托里复煎散

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】防风三两(去芦) 地骨皮二两 白茯苓二两 黄芩二两 白芍药二两 人参二两(去芦) 白术二两(炒) 黄耆二两(蜜炙) 肉桂二两 甘草二两 防己二两 当归二两 苍术一斤

【用法】先以苍术加水五升，煎至三升，去术，入前药，煎至四盏，分四次饮之。术滓还可再煎。

【功用】除湿散郁，和平胃气。

【主治】痈疽肿脓于外，根盘不深，形证在表，其脉多浮者。

32421 托里养荣汤

【方源】《痈疽神验秘方》。

【组成】人参 黄耆(炙) 当归(酒拌) 芍药(炒) 川芎 白术(炒) 各一钱 五味子(研，炒) 麦门冬(去心) 甘草

(炙)各五分 熟地黄(用生者，酒拌，铜锅内蒸半日) 生姜三片 大枣二个

【用法】上作一剂。用水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】①《痈疽神验秘方》：痈疽气血俱虚，或脓血大泄，作渴，或兼发热者。②《外科发挥》：瘰癧、流注，及一切不足之证。不作脓，或不溃，或溃后发热，或恶寒，肌肉消瘦，饮食少思，睡眠不宁，盗汗不止。

32422 托里举斑汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】白芍 当归各一钱 升麻五分 白芷 柴胡各七分 川山甲二钱(炙黄)

【用法】生姜为引，水煎服。

【功用】《瘟疫论评注》：扶正达邪，宣透斑疹。

【主治】瘟疫发斑复大下，中气不振，斑毒内陷。

【加减】循衣摸床，撮空理线，脉渐微者，加人参一钱。

【方论选录】《医钞类编》松峰按：此方系专为下启中气不振，斑毒内陷者设，故用归、芍托里；升、柴、白芷以举斑；山甲以走窜经络，则卫气疏畅，而斑可渐出矣。

32423 托里举斑汤

【方源】《痧喉汇言》。

【组成】升麻一钱 柴胡一钱 当归二钱 白芍一钱(酒炒) 白芷一钱 山甲半钱 防风一钱半(汤泡，炒，研) 浮萍草二钱 炙甘草五分

【主治】痧疹体质单弱，不能透达者，经用透邪煎或柴归饮二汤发之，仍不焮赤者。

32424 托里透脓汤

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】人参 白术(土炒) 穿山甲(炒，研) 白芷各一钱 升麻 甘草节各五分 当归二钱 生黄耆三钱 皂角刺一钱五分 青皮(炒)五分

【用法】水二钟，煎至一钟，病在上部，先

饮煮酒一钟，后热服此药；病在下部，先服药，后饮酒；疮在中部，药内兑酒半钟热服。

【主治】侵脑疽，红肿高起，焮热疼痛，脓色如苍蜡，而将溃时。

32425 托里健中汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】托里温中汤（《保婴撮要》卷十五）

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 半夏炮姜各一钱 炙草五分 黄耆一钱五分 肉桂三分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】疮疡元气素虚，或因凉药伤胃，饮食少思，或作呕泻。

32426 托里健中汤

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】羌活三分 木香 附子（炮） 益智 丁香 沉香各三分 茴香五分 陈皮炙甘草五分

【用法】生姜为引，水煎，徐徐服之。

【主治】疮疡，阳气虚寒，肠鸣切痛，大便溏泄，呕逆昏愦，此寒变而内陷也。

【备考】方中陈皮用量原缺。

32427 托里消毒汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】黄耆一钱半 白术一钱 茯苓八分 陈皮五分 赤芍 当归各七分 桔梗一钱 防风 荆芥 连翘 炙甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮十一二日，半收半敛之际。

【加减】若大便频，声不清亮，去连翘，加木香、丁香。

32428 托里消毒汤

《疡科心得集·补遗》。即《外科正宗》卷一“托里消毒散”。见该条。

32429 托里消毒饮

《回春》卷八。为《古今医鉴》卷十五“托里消毒散”之异名。见该条。

32430 托里消毒饮

《东医宝鉴·杂病篇》卷七。为《陈氏小儿痘

疹方论》“托里消毒散”之异名。见该条。

32431 托里消毒饮

《喉科紫珍集》卷上。为《外科正宗》卷一“托里消毒散”之异名。见该条。

32432 托里消毒散

【方源】《陈氏小儿痘疹方论》。

【异名】消毒托里散（《医学六要》卷四）、托里消毒饮（《东医宝鉴·杂病篇》卷七）。

【组成】人参 黄耆（炒） 当归（酒洗） 川芎 芍药（炒） 白术（炒） 陈皮 茯苓各一钱 金银花 连翘 白芷各七分 甘草五分

【用法】每服三五钱，水煎服。

【功用】《外科枢要》：消肿，溃脓，生肌。

【主治】痘疹、痈疽、疮疡、时毒、大头瘟之气血虚弱者。

①《陈氏小儿痘疹方论》：痘毒气血虚弱，不能起发、腐溃、收敛，或发寒热，肌肉不生。②《外科枢要》：疮疡胃气虚弱，或因克伐不能溃散。③《医学入门》：痈疽肿痛俱慢，色不甚赤。④《医统》：时毒表里俱解，肿肉不消，欲其作脓。⑤《济阴纲目》：大头瘟。

【方论选录】《删补名医方论》：参、耆、术、苓、草以益气分；归、芎、芍以滋血分；银花、白芷、连翘以解毒。

32433 托里消毒散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】黄耆 白芷 连翘 羌活 川芎 当归尾 赤芍药 防风 桔梗 柴胡 皂角 金银花 甘草

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发颐，有脓不消，已破或未破。

32434 托里消毒散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【异名】托里消毒饮（《回春》卷八）。

【组成】黄耆（盐水炒） 花粉各二钱 防风 当归（酒洗） 川芎 白芷 桔梗（炒） 厚朴（姜制） 穿山甲（炒） 皂角刺（炒） 各一钱 金银花 陈皮各三钱

【用法】用水、酒各一钟，煎至七分，疮在上，食后服；在下，空心服。二帖后，只用水煎。

【功用】壮气血，固脾胃，消肿溃脓生肌。

【主治】①《古今医鉴》：一切痈疽，六七日未消者。②《杂病源流犀浊》：大头瘟。

32435 托里消毒散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】托里消毒饮（《喉科紫珍集》卷上）、托里消毒汤（《疡科心得集·补遗》）。

【组成】人参 川芎 白芍 黄耆 当归 白术 茯苓 金银花各一钱 白芷 甘草 皂角针 桔梗各五分

【用法】水二钟，煎至八分，食远服。

【功用】消肿溃脓，去腐生肌。

【主治】痈疽已成，不得内消者。

【加减】脾弱者，去白芷，倍人参。

【宜忌】不可用内消泄气、寒凉等药，致伤脾胃为要。

32436 托里消毒散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】保元汤加当归 芍药 茯苓 白术 忍冬 白芷 连翘

【主治】痈疽，痘疹，毒盛不能起发。

32437 托里消毒散

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】黄耆（蜜炙）一钱 白术（土炒）七分 白茯苓五分 陈皮 防风 连翘各四分 白芍 当归各五分 桔梗七分 荆芥 牛蒡子 炙甘草各三分

【用法】水煎。不拘时候服。

【主治】痘十一二日，半收半敛之际。

【加减】如痘正盛时，偶然陷伏而不结痂，此中气虚而脾寒，加人参四分；如内热烦躁，热气熏蒸不结痂，当以水磨犀角汁解之。

32438 托里流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 白芍 甘草 防风 厚朴 乌药 官桂 木香

【用法】加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】疔腿。

32439 托里流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 白芍 乌药 甘草 防风 白芷 厚朴 茯苓 紫苏 桔梗 青皮 黄芩

【用法】生姜三片、大枣一个为引，水煎服。

【主治】中发疽，受在肝经，气血不行，壅聚结成毒。

32440 托里益中汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】托里和中汤（《医学入门》卷八）、托里益黄汤（《杂病源流犀浊》卷二十八）。

【组成】人参 白术 陈皮 半夏 茯苓 炮姜各一钱 木香 炙草各五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】疮疡中气虚弱，饮食少思，或疮不消散，或溃而不敛。

32441 托里益气汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白术二钱 人参 茯苓 贝母 陈皮 香附 芍药 当归 熟地各一钱 桔梗 甘草各五分。

【用法】水煎服。

【主治】痈肿硬，肉色不变，或哺热，或溃而不敛，并一切血气内症。

【加减】如口干，加五味子、麦门冬；寒热往来，加柴胡、地骨皮；脓清，加黄耆；脓多，加川芎；肌肉迟生，加白薇、肉桂。

32442 托里益气汤

【方源】《古方汇精》卷四。

【组成】净银花 玄参各二钱 人中黄五钱 鲜芦根八钱 上黄耆（饭锅蒸熟）三钱 柴胡 升麻各四分

【用法】照服二剂。再接服生地益阴煎和参术和脾饮。

【主治】小儿痘浆不足。

32443 托里益膏汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】托里抑青汤(《医学入门》卷八)。

【组成】人参 白术 茯苓 半夏各一钱 芍药 柴胡各五分 陈皮一钱 甘草五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】疮疡脾土虚弱，肝木所侮，以致饮食少思，或胸膈不利。

32444 托里益黄汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】人参 白术 陈皮 茯苓 半夏各一两 炮姜 丁香 炙草各五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】疮疡脾土虚寒，水反侮土，以致饮食少思，或呕吐泄泻。

32445 托里益黄汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】人参 白术 半夏 陈皮 川芎 香附 山梔 苍术各一钱 甘草五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痈疽脾胃虚寒，水侮土，以致饮食少思，或呕吐泄泻；兼治痈疽六郁所伤，中气虚弱。

32446 托里益黄汤

《杂病源流犀烛》卷二十八。为《外科枢要》卷四“托里益中汤”之异名。见该条。

32447 托里黄耆汤

《圣济总录》卷一三〇。为《鬼遗》卷三“内补黄耆汤”之异名。见该条。

32448 托里黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】绵黄耆(去芦，蜜炙)十两 甘草一两(炙)

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎五七沸，去滓，温热随意服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：诸疮肿发渴。②《玉机微义》：诸疮脉虚。

32449 托里黄耆汤

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】栝楼 黄耆各半两 甘草(炙)二钱

【用法】上作两服。每服水一盏半，酒半盏，煎至一盏，去滓温服。

【功用】定痛，去毒。

【主治】痈疽发背、发髻、发鬓、发眉、发脑；妇人乳痈。

【加减】如已作脓，加皂角刺少许。

32450 托里黄耆汤

《医学正传》卷六。即《兰室秘藏》卷下“黄耆肉桂柴胡酒煎汤”。见该条。

32451 托里黄耆汤

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】黄耆(炒)六钱 甘草(炙) 栝楼根各一钱

【用法】水二钟，煎至八分，频服之。加人参一钱尤妙。

【主治】痈疽大渴，发热，或泻，或小便如淋。

32452 托里黄耆散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】人参半两 白术 茯苓 芍药 桔梗各一两 黄耆二两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】口干微热。

32453 托里排脓汤

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】当归 白芍(酒炒) 人参 白术(土炒) 茯苓 连翘(去心) 金银花 浙贝母(去心)各一钱 生黄耆二钱 陈皮八分 肉桂六分 桔梗(胸之上加)一钱 牛膝(下部加)八分 白芷(顶之上加)五分 甘草四分 生姜一片

【用法】水三钟，煎至一钟，食远温服。

【功用】排脓消肿。

【主治】鱼尾毒脓将成。

32454 托里排脓汤

【方源】《梅氏验方新编》七集。

【组成】生耆二钱 人参 炙术 当归 炒芍 银花 连翘 茯苓 陈皮 贝母各一钱 白芷 桔梗各一钱半 桂心 甘草各五

分

【主治】痈疽初溃。

【备考】《性病》本方用法：加生姜一片，水三钟，煎至一钟，食远温服。

32455 托里排脓散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】木香散（《圣济总录》卷一三〇）。

【组成】木香一分 黄耆三分（锉） 白薇一分 占斯一分 芎藭一分 当归一分（锉，微炒） 细辛一分 桔梗一分（去芦头） 赤芍药一分 槟榔一分 败酱一分 甘草一分（炙微赤，锉） 桂心一分 羌活一分 白芷一分

【用法】上为细散。每服一钱，食前甘草酒调下。

【主治】痈疽，一切疮肿。

32456 托里清中汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】人参 白术 陈皮 茯苓各一钱 半夏八分 桔梗七分 甘草五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】疮疡脾胃虚弱，痰气不清，饮食少思。

【备考】《保婴撮要》有柴胡。

32457 托里清中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参 白术 桔梗 陈皮 半夏 茯苓各一钱 麦门冬 五味子 甘草各五分

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】痈疽脾胃虚弱，咳嗽，痰气不清，饮食少思。

32458 托里清肝散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】人参 黄耆（炒） 当归 川芎 芍药（炒） 白术 茯苓 金银花 白芷（炒） 甘草（炒） 连翘 柴胡各七分 山梔四分

【用法】每服二三钱，水煎服。

【主治】小儿囊痈，肿痛数日不止，欲作脓。

32459 托里清补汤

【方源】《痘科辨要》卷四。

【组成】人参 黄耆 当归 川芎 厚朴 防风 桔梗 白芍 白芷 木香 牛蒡子 地丁 黄芩（酒炒） 甘草

【用法】水煎，温服。

【主治】痘疮气虚毒壅者。

32460 托里越鞠汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】人参 白术各二钱 陈皮 半夏各一钱 山梔 川芎 香附 苍术各七分 炙草五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痈疽六郁所伤，脾胃虚弱，及木侮土，或呕或泄；小儿疮疡。

①《外科枢要》：疮疡六郁所伤，脾胃虚弱，饮食少思。②《保婴撮要》：乳母郁怒，肝脾内热，致儿患疮疡。③《医学入门》：痈疽脾胃虚寒，木侮土，或呕或泄。

【备考】《保婴撮要》本方用法：婴儿、乳母并服。

32461 托里温中汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】托里温中散（《医林纂要》卷十）。

【组成】沉香 丁香 益智仁 茴香 陈皮各一钱 木香一钱半 甘草（炙）二钱 羌活 干姜（炮）三钱 黑附子（炮，去皮脐）四钱 生姜五片

【用法】上咬咀，作一服。水三盏，煎至一盞，去滓温服。

【主治】①《卫生宝鉴》：疮为寒变而内陷者，脓出清稀，皮肤凉，心下痞满，肠鸣切痛，大便微溏，食则呕逆，气短促，呃逆不绝，不得安卧，时发昏愦。②《外科枢要》：疮疡脓溃，元气虚寒，或因克伐胃气脱陷。

【宜忌】忌一切冷物。

【方论选录】《内经》云：寒淫于内，治以辛热，佐以苦温。故以附子、干姜大辛热，温

中外，发阳气，自里之表，故以为君；羌活味苦辛温，透关节；炙甘草甘温，补脾胃，行经络，通血脉；胃寒则呕吐，呃逆不下食，益智仁、丁香、沉香大辛热，以散寒为佐；疮气内攻，气聚而为满，木香、茴香、陈皮苦辛温，治病散满为使也。

32462 托里温中汤

《保婴撮要》卷十五。为《外科枢要》卷四“托里健中汤”之异名。见该条。

32463 托里温中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】白术 茯苓 木香 丁香各五分 半夏 陈皮 羌活 益智 干姜(炮) 人参 白蔻 甘草各一钱 附子二钱 生姜三片 大枣一个

【用法】水二钟，煎至八分，不拘时候服。

【主治】痈疽阳弱阴寒，脉虚身冷；或疮为寒变，反致不疼；或脓水清稀，心下痞满，肠鸣腹痛，大便微溏，食则气短，呃逆不得安卧，时发昏愦者。

【备考】《疡医大全》有半夏。

32464 托里温中散

《医林纂要》卷十。为《卫生宝鉴》卷十三“托里温中汤”之异名。见该条。

32465 托里温经汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】人参(去芦) 苍术各一钱 白芍药 甘草(炙)各一钱半 白芷 当归身 麻黄(去根节)各二钱 防风(去芦) 葛根各三钱 新升麻四钱

【用法】上咬咀。每服一两重，水三盏，先煎麻黄令沸，去沫，再下余药同煎至一盏，去滓，大温服讫，卧于暖处，以绵衣覆之，得汗而散。

【主治】①《卫生宝鉴》：寒覆皮毛，郁遏经络，不得伸越，热伏荣中，聚而为赤肿，痛不可忍，恶寒发热，或相引肢体疼痛。②《疡科选粹》：痈疽脉浮紧，按之洪缓，牙关紧急，涕唾稠粘，饮食难下。

【方论选录】麻黄苦温，发之者也，故以为君；防风辛温，散之者也，升麻苦辛，葛根甘平，解肌出汗，专治阳明经中之邪，故以为臣；香白芷，当归身辛温，以和血散滞，苍术苦甘温，体轻浮，力雄壮，能泄肤腠间湿热，人参、甘草甘温，白芍药酸微寒，调中益气，使托其里，故以为佐。

32466 托里解毒汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】川芎 当归 黄芩 白芷 连翘 花粉 金银花 甘草节各一钱 青皮五分 皂刺七个

【主治】疮毒、乳痈。

【加减】如背上、臀上生者，去青皮，加葛根、升麻各一钱；胸前、两颊生者，去白芷，加柴胡、胆草、桅仁(炒)各一钱；肩膊、腋下生者，去青皮，加陈皮、桔梗、桑白皮、天冬各一钱；胯内、阴旁生者，去白芷，倍青皮；手足、掌内生者，去白芷、青皮、花粉、加黄连、黄柏、木通各一钱。

32467 托里解毒汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归一钱五分 赤芍一钱五分 川芎 生地黄 连翘 黄芩 防风各一钱 黄连(酒炒)二钱 荆芥穗七分 苦参(酒炒) 羌活 薏苡仁各一钱 皂角子十个 防己一钱 木瓜五分 生甘草二分 土茯苓一两(湿者四两)

【用法】上锉。水二碗，煎一碗，温服，滓再煎服。宜服二十帖，每帖煎三次，一日服一帖。外用千里光明汤频频洗浴。

【主治】杨梅疮。手足心皮枯似白鹅掌风，皮后筋骨疼痛。

【加减】虚弱人，加人参一钱；自生者，加黄柏一钱、牛膝一钱、独活一钱。

32468 托里解毒汤

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】银花三钱 当归五钱 生耆二钱 花粉 连翘 黄芩 赤芍各一钱半 大黄

牡蛎 生甘草各一钱 枳壳八分 皂刺五分
(已破者不用)

【用法】水煎服。

【主治】一切红肿疮毒。

32469 托里解毒汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】升麻 生耆 银花 蝉衣 紫草 葛根 炙草 绿豆 马勃 红花

【主治】痘到灌浆，毒返内攻，颗陷浆枯而腹痛者。

32470 托骨大黄散

《伤科汇纂》卷八。为《苏沈良方》卷十引《灵苑方》“大黄散”之异名。见该条。

32471 托痘花蛇散

【方源】方出《幼幼新书》卷十八引《王氏手集》，名见《本草纲目》卷四十三。

【组成】白花蛇(连骨)一两(慢火炙令干，勿令焦) 大丁香二十一粒

【用法】上为末。大人每服一大钱，小儿半钱，以水解淡酒调下。移时身上发热，其疮顿出红活。

【主治】大人、小儿疮子倒靥。

32472 托里金银地丁散

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】金银花 黄连 当归 紫花地丁 赤芍药 黄耆 人参 甘草节 桔梗 大黄 各半两 乳香 白檀香 没药 连翘各三钱 子芩 栀子仁 玄参各二钱 麦门冬(去心) 前胡 甘草(蜜炙)各一两

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞，酒一盞，煎至八分，去滓，随病上下温服。

【主治】诸恶疮，肿毒疼痛。

32473 托里排脓生肌散

《准绳·疡医》卷一。即《本事》卷六“生肌散”。见该条。

32474 托里排脓消毒散

【方源】《普济方》卷四〇五。

【组成】大黄 当归 枳壳 桔梗 天花粉 绵头漏芦 甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱，热服。

【主治】婴孩痢疮。

【宜忌】如体虚则不可服。

32475 托里救苦神应丸

【方源】《医学纲目》卷十九引《得效》。

【组成】川乌附(去皮脐，生用)一两 乌头五两 当归(酒浸一宿) 没药 白芷 陈皮 甘草节各一两 蝉蜕(水洗)半两 大皂角七挺(去皮弦子) 姜黄一两半

【用法】上用皂角敲碎，水四大碗，煎至二大碗，滤去滓，用汁一同煮乌头、川乌，候乌头烂为度，搗如泥，其余诸药，却另为末，和乌头泥为丸，如梧桐子大。每服六十丸，饥饱皆用薄荷汤送下。

【主治】蟠蛇病，多生肩项，或赤或白，或沉或浮，初生如豆，久似核，年月浸久，其大如梅，或如鸡卵，排行成列，或生二三，或生六七；流注病，初生在项，破后脓注四肢，遍体结毒，如梅李状，不疗自破，孔窍相穿，寒热疼痛，或流脓汁。

【备考】《医统》有生地黄，无川乌附。

32476 托毒清热安胎汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】当归 川芎 白芍 桔梗 甘草 柴胡 前胡 防风 荆芥 白芷 干葛 紫草 白术 条黄芩各一钱

【用法】水煎服。

【功用】托表安胎。

【主治】孕妇麻痘初热。

扫

32477 扫云丹

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】草乌(末)

【用法】生姜捣汁调，麻布包擦，自愈。

【主治】大麻风遍身发麻不可忍。

32478 扫气汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】黄连三钱 玄参三两 沙参一两 当归一两 麦冬一两 丹皮一两 瓜蒌二钱

【用法】水煎服。一剂心火降，大便即通，不必二剂。

【主治】大便闭结，舌下无津，胸前出汗，手足冰冷，烦闷发躁，大眦红赤。

【方论选录】此方用黄连以直解其心中之热。然徒用黄连，不益之玄参，则黄连虽寒而性燥，火虽解而大肠之燥如故也，得玄参之润，以助黄连，则浮游之火不特尽除，且润以去燥，不啻如夏热之时，忽得大雨，既去火炎，又沾优渥也。至于沙参生阴，当归生血，麦冬凉肺，丹皮凉肾，无非断四路之氛，使其不来助心中之焰。加入瓜蒌，使火存于心中者，尽随濡润之药下降而消灭之也。火灭水生，则大肠之炎氛顿扫，欲不通得乎？所以一剂而奏功也。

32479 扫风丸

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】大风子 1.75 千克 苡仁 240 克 荆芥 240 克 苦参 白蒺藜 小胡麻 苍耳子 防风各 120 克 白花蛇 30 克 苍术 白附子 桂枝 当归 秦艽 白芷 草乌 威灵仙 川芎 钩藤 木瓜 菟丝子 肉桂 天麻 川牛膝 何首乌 千年健 青礞石(制) 川乌 知母 梔子各 60 克

【用法】上为细末，水为小丸，干燥后待用。成人初用 6 克，一日二次。三天后如无呕吐、恶心等反应，可每次加 1.5 克，至第八天后，一日服三次。

【功用】祛风，利湿，杀虫。

【主治】初期轻型麻风。

32480 扫风汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】荆芥五钱 防风三钱 半夏三钱 陈皮一钱 天花粉一钱五分 茯苓三钱 黄芩二钱 苏叶一钱

【用法】水煎服。一剂而狂定，二剂而痰消，三剂而斑化，疮疖亦寻愈矣。

【主治】真中风，正邪相搏，一时猝倒，口吐痰涎，发狂号叫，自坐自起，自立自行，目

不识人，身中发斑，数日后变成疮疖者。

32481 扫虫汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参五钱 白术一两 大黄三钱 白薇三钱 百部三钱 甘草一钱 乌梅一个

【用法】水煎服。一剂大泻虫尽出矣，不必二剂。服此药后，用四君子汤调理而安。

【主治】面黄体瘦，善食易饥，不食则痛，日以为常，一旦大泻，连虫而下，如团如结，血裹脓包。

32482 扫虫散

《外科证治全书》卷一。为《外科全生集》卷四“扫雪散”之异名。见该条。

32483 扫虫煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】青皮一钱 小茴香(炒)一钱 槟榔 乌药各一钱半 细榧肉三钱(敲碎) 吴茱萸一钱 乌梅二个 甘草八分 朱砂 雄黄各五分

【用法】上药各为极细末，将前八味，用水一钟半，煎八分，去滓，随入后二味，再煎三四沸，搅匀，徐徐服之。

【主治】①《景岳全书》：诸虫上攻，胸腹作痛。②《古方汇精》：目无精光，面色灰白，肌肤消瘦，颊时火晕，胸肋作痛，肚腹搅胀，饮食易饿，饿时痛甚，得食稍止，唇焦口燥，上腭有白点。

32484 扫虫煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 枳实 槟榔各一钱 使君子肉一钱半 干姜(炮) 花椒各五分 苦楝根皮(去粗皮)三钱 乌梅三个

【用法】水煎，露一宿，次日五更空心服，先吃白糖数口后服药。凡打虫，俱要上半个月服药。

【主治】一切诸虫。

32485 扫红煎

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】甘菊花 黄连各一钱半 防风

荆芥 白芷各三钱 红花 当归各一钱 芒消二钱 白矾五分

【用法】上煎汤，先熏后洗。

【主治】诸般眼患，红肿痛烂。

32486 扫疔丹

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】苍术三钱 熟地一两 玄参一两 苍耳子三钱 车前子二钱 金银花二两 薏仁五钱

【用法】水煎服。二十余剂必愈。

【主治】大麻风。头面身体先见红点斑纹，流水成疮，发眉堕落，遍身腐烂臭秽。

32487 扫毒丸

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】玄参 青黛 赤茯苓 赤芍药 黄芩 白蒺藜 荆芥 防风 生地黄 木通 桔梗 朱砂各等分

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸至五丸，量儿大小，用薄荷汤送下。

【主治】小儿麻疹余毒，遍体生疮者。

32488 扫胃汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】石膏 甘菊花各二钱 青蒿五钱 茯苓三钱 甘草一钱 陈皮三分 柴胡五分 厚朴一钱 槟榔八分

【用法】水煎服。

【主治】春温。热留阳明，伤风发潮热，大便溏，小便利，胸膈满。

32489 扫疥散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】大黄 蛇床子 黄连 金毛狗脊 黄柏 苦参各五钱(同为极细末) 硫黄 水银(茶末杀之)各四钱 雄黄 黄丹各二钱五分 轻粉一钱 大风子(去壳) 木鳖子(去壳)各五钱

【用法】上为细散。用生猪脂调，洗浴后搽疮上。此药宜晒合之，不见火。

【主治】诸疥疮，热疮，遍身疮疖。

32490 扫雪散

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】扫虫散(《外科证治全书》卷一)。

【组成】独核肥皂(分开，去核，以洋糖填入) 巴豆仁(每片加二粒半)

【用法】将皂仍旧合好，扎紧泥裹，入火煨，取出，去泥，研细，加入轻粉、槟榔末各八分，再研，剃头后，以滚灰汤洗，以香油调敷，至愈乃止。

【主治】①《外科全生集》：腊梨疮。②《外科证治全书》：秃疮。初起小者如豆，大者如钱，其痒难堪，挠破出水，结白脓痂，日久延蔓成片，发尽根绝，此症多系胎毒。

32491 扫雪膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】松树厚皮(烧灰)三两 黄丹(水飞)一两 寒水石(细研)一两 枯矾 黄连 大黄各五钱 白胶香(熬，飞顽石上)二两 轻粉一分

【用法】上为细末，熟熬。油调，敷疮上，须先洗净疮痂后敷药。

【主治】小儿秃疮。

32492 扫痛丸

【方源】《普济方》卷六十八引《经验方》。

【组成】川乌半两(炮) 鹤虱一两(焙干) 良姜一两(以青盐炒半两)

【用法】上为末。风牙痛，刀上炒盐，同前药擦；蛀牙痛，白梅肉同前药丸塞之。

【主治】风虫牙疼，引太阳穴痛。

32493 扫雾丹

【方源】《眼科秘诀》卷一。

【异名】开疆扫雾丹

【组成】丹头一钱(兔脑炉甘石一两，要上等雪白、轻者方佳，火精石一两，捶为细末，以水合之如泥，作一饼，如无火精石，用混元球煨之，或用煨元灵丹药汁淬之。将甘石打作小块，包入精石内，外再用黄泥包之，待干，入百眼炉内煨之，红透取出，待冷听用，去泥，取甘石入乳钵内，搗极细，用水飞过三五次，有微粗再飞过，以不刺牙为妙，晒干为丹头) 冰片(必上好四六者)二分五

厘 真麝香一分五厘 熊胆三分五厘 蕤仁三分(去油尽)

【用法】上搗万遍,以瓷罐贮之。日点三次,内服揭障丹,外敷冲翳散,再用本方点七八十次。极重者,半月有验矣。

【主治】一切翳膜障眼。

32494 扫霞散

【方源】《遵生八笺》卷十八引《魏斗蓬点眼方》。

【组成】炉甘石一两(销银罐打火,以童便淬七次,烧七次,以罐盛,埋入土,出火毒九日) 石燕子三钱(以醋淬七次,同上埋法) 硃砂一钱(乳汁制) 硼砂二钱 飞丹五钱 黄连三钱 乳香三钱 没药三钱 熊胆二钱 冰片六分 麝香六分 珍珠三钱 珊瑚三钱 血竭二钱 归须三钱五分 石蟹二钱 轻粉二钱五分 白丁香三钱

【主治】眼目症。

【加减】如要去翳,加磁石五分,海螵蛸五分。

32495 扫睛散

【方源】《普济方》卷七十一。

【组成】防风 羌活 川芎 甘草 蒺藜 决明子各半两 柴胡 玄参各二两 白芷 荆芥 瞿麦 木贼 木通 赤芍 梔子 生地 天花粉 夏枯草 薄荷 谷精草各一两 五灵脂 甘菊花 蝉蜕 白皮 大黄各七钱半

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,煎至八分,去滓,食后服。

【主治】眼赤肿痛,瘀肉攀睛,视物茫茫;及时行红眼暴发者。

32496 扫瘡丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归五钱 川芎五钱 白芍五钱 生地五钱 梔子(炒)五钱 连翘五钱 滑石五钱 黄连二钱 柴胡三钱 木通三钱 芦荟三钱 银花三钱 甘草三钱 泽泻四钱 防风四钱 黄芩四钱 麦冬四钱

【用法】上为细末,过罗,每六两九钱细粉,兑薄荷冰二钱,混合均匀,炼蜜为丸,重三钱,蜡皮封固。每服一丸,温开水送下,一日二次。

【功用】和肝调血,清热利湿。

【主治】妇人肝郁气滞,湿热下注,阴门刺痒,各种瘡证。

32497 扫癰丹

【方源】方出《千金》卷二十二,名见《洞天奥旨》卷十六。

【组成】莨菪子(烧末)

【用法】敷之。

【主治】恶疮,十年不愈似癰者。

32498 扫癰丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】黄耆三两 当归 金银花各二两 白术 茯苓 麦门冬 白芍药 熟地黄 玄参各一两 山茱萸 川芎各五钱 生甘草 荆芥 天花粉各三钱 防风二钱

【用法】水煎服。二剂而皮色即润,又服二剂而干燥解,连服十剂痊愈。

【功用】补气血,消湿散热。

【主治】遍身发癰,皮厚而生疮,血出而如疥,或痛或痒,或干或湿,如虫非虫。

32499 扫云开光散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】炉甘石二两(水漂净,火煅,童便浸五次) 海螵蛸(去粗壳) 明硼砂 乳香 没药(箬焙,去油) 麝香 东丹各六钱 血竭三钱 朱砂二钱 珍珠二两

【用法】上药各为极细末。以人乳点大小眼眦。

【主治】一切翳障,并时气热眼。

32500 扫涎立效丹

《白喉全生集》。为《医方类聚》卷七十四引《济生续方》“白矾散”之异名。见该条。

32501 扫尽曹家百万兵

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】大风子肉二两 枯矾四两 樟脑三钱 蛇蛻五分(烧存性) 蜂房五个(烧

存性)

【用法】上为末，入柏油四两、水银五钱，同捣成膏。

【主治】脓窠黄水痒痛，疥癬诸疮。

扬

32502 扬肺利湿汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】桔梗三钱 天花粉二钱 白术五钱 茯苓五钱 桑白皮三钱 茵陈三钱 猪苓二钱 黄芩五分

【用法】水煎服。一剂鼻塞通，二剂咽干润，三剂口淡除，四剂小水大利，十剂头面之黄尽散。

【功用】宣通肺气，健脾胃，开腠理，生津液。

【主治】肺疽。鼻塞不通，头面俱黄，口淡咽干，小水不利。

【方论选录】此方开腠理而生津液，则肺金有润燥之功。合之茯苓、茵陈、花粉、白术则土气大旺，金气亦扬，清肃令行，而膀胱之壅热立通，小便利而黄色乌能独有哉？

邪

32503 邪滞双解散

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】川芎六分 当归 建曲 夏曲 炒苍术各一钱五分 枯谷芽 炒白芍 藿香叶各一钱 云苓 丹参各二钱 大生地三钱(炙) 葱八分 煨黑姜一钱

【用法】二剂后，疟来已正，方内加升麻、炙柴胡各四分，生、熟首乌各一钱五分，投二剂可止，如未止，再投二剂，接服休疟饮与八珍汤，相间服之，可期渐愈。

【主治】产后疟。

【加减】肢冷，加桂枝尖木三分。

过

32504 过气丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】大蒜五枚(剥去皮，碎) 附子一枚(去脐，切作块) 赤小豆(拣)五两(上三味，同于砂锅内，用水五升，煮干为度，只取附子为末，余不用，却入后药) 白花商陆根半两 沉香二钱 木香三钱 车前子三钱半

【用法】上药同苡仁末煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心薏苡仁汤送下，一日三次。

【主治】脾胃气虚，肾水流溢，四肢作肿。

32505 过关散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】山梔子仁 车前子 木通 甘草 瞿麦 赤茯苓 人参 滑石各一分 大黄一钱 篇蓄半两(取嫩枝叶)

【用法】上为末。入灯心草略煎四五沸服。

【功用】通心经。

【主治】婴孩斑疮、水痘，心躁发渴，及小便赤色，口舌生疮。

32506 过夜消

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】冰片 牛黄各一分 硼砂八分 雄黄八分 孩儿茶八分 山豆根二钱 胆矾三分 陈霜梅(去核)三个

【用法】上为末，次将霜梅捣烂，入药和匀为丸，如龙眼大。临卧含口中，过夜即消。

【主治】一切喉证。

32507 过期饮

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】熟地黄 白芍药 当归 香附各二钱 川芎一钱 红花七分 桃仁泥六分 蓬莪术 木通各五分 甘草 肉桂各四分

【用法】水二钟，煎一钟，食前温服。

【功用】补血行气。

【主治】血虚气滞之经水过期不行。

【备考】《金鉴》有木香。

32508 过期饮

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五钱 当归三钱 白芍(酒炒)一钱五分 川芎一钱 肉桂一钱(去皮) 炮姜一钱 附子一钱 香附(酒炒)二钱 艾叶(酒炒)一钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】经候过期，不孕，脉迟涩者。

【方论选录】熟地补血，以滋血室；当归养血，以荣经脉；川芎行冲脉之血；白芍敛任脉之阴；附子补火御寒；肉桂温经通闭；香附解郁调经；炮姜温中逐冷；艾叶理血气以暖子宫也；水煎温服，使伏寒解散，则血室滋荣而子宫温暖，何有经行涩少来迟不孕之患哉。

32509 过街笑

【方源】《回春》卷五。

【组成】木香一钱 麝香三厘

【用法】上为末。吹鼻，右边吹左鼻，左边吹右鼻。令病人手上下和之。

【主治】闪腰痛。

32510 过街笑

《外科全生集》卷四。为原书同卷“刻欢丸”之异名。见该条。

至

32511 至仁丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参一两 白术一两 黄耆一两 茯苓三钱 半夏三钱 肉桂二钱 薏仁三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】中气。身未猝倒，面右手不仁，言语蹇涩，口中流沫。

【方论选录】此证是气虚，可不急补其气乎！补气而右手不仁随补而随效也。气虚者，未有不脾胃寒也。脾胃既寒，难以立化水谷，不变精而变痰矣。故气虚者痰盛，痰即散气之虚而作祟，上达心而旁及手足，故身欲仆面手足不仁，口吐涎沫耳。乃用参、耆以补气，复用苓、术以健上，治湿则痰无可藏之

经；更加半夏、薏仁以逐其已成之痰，则未成之痰涎，又安能再化哉？犹恐脾胃久寒，一时难以建功，增入肉桂，以补其命门之火，则火自生土。土旺而气自郁蒸，气有根蒂，脏腑无非生气，而经络皮肉，何至有不通之患哉！

32512 至仁汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术 黄耆 白芍 天花粉各三钱 茯苓五钱 车前子一钱 防风五分 甘草五分 肉桂三分 益智仁五分

【用法】水煎服。

【主治】猝中之后，手足流注疼痛，久之则麻痹不仁，难以屈伸。

32513 至圣丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】附子(炮裂，去皮脐) 牛膝(去苗，酒浸，焙干) 海桐皮(锉) 肉苁蓉(酒浸，切，焙) 防风(去叉) 萆薢 狗脊(黑者，去毛) 黄耆(锉) 蒺藜子(沙苑者，炒) 茴香子(舶上者，炒) 威灵仙 续断 木香各一两 骨碎补四两 木鳖子(去壳)二两 乳香(研) 没药(研)各半两

【用法】上药除研者外，为细末，再同和匀，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心嚼，木瓜酒送下。

【主治】风气身体疼痛，筋脉拘急，手足痹麻，睡卧多涎，及丹田虚冷。

32514 至圣丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】臭橘一百枚(去核瓤，锉) 枳壳(去瓤，锉)半斤 黄连(去须)五两

【用法】上药用麸五升，同于银石器内慢火炒令麸黑为度，于地上去火毒，不用麸，将药为细末；用皂子一百枚去黄，以水一升，于银石器内煮令熟烂如膏，与前药末同拌为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米饮下，不拘时候一日三次。

【主治】一切痔疾。

32515 至圣丸

【方源】《圣济总录》一七三。

【组成】使君子（去壳）二十枚 肉豆蔻（去壳）一枚 丁香 陈曲（炒） 雄黄（研） 熊胆（研）各一钱 麝香（研）半钱 诃黎勒皮一分

【用法】上为末，白面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，乳食前米饮送下。

【主治】小儿疳痢，腹胀肌瘦，泄泻不止。

32516 至圣丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《吉氏家传》

【组成】厚朴（去皮，姜制） 黄柏（略去皮，以鸡子白涂，炙黄熟，如干再上） 当归（酒浸）各等分。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，小儿细丸。每服四十丸加減，厚朴汤送下。

【主治】小儿五色痢。

32517 至圣丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】木香 胡黄连 黄连（去须，微炒） 陈橘皮（去白） 龙胆草（去苗，焙）各一两 五灵脂二两 川楝子（去核）半两 羌薏仁二钱半（炒，别研） 蟾酥半钱（别研） 芦荟二钱（别研）

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如黍米大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】杀虫，长肌肉。

【主治】小儿五疳黄瘦，食不生肌。

32518 至圣丸

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】丁香 青皮各一钱 木香 紫厚朴（制） 橘红 使君子（焙） 肉豆蔻（湿纸裹煨）各二钱

【用法】上为末，神曲糊为丸，如麻子大。每服七丸，食前米汤送下。

【主治】小儿冷疳，不时泄泻，虚汗不止。

32519 至圣丹

《局方》卷十。为《博济》卷四“至圣青

金丹”之异名。见该条。

32520 至圣丹

【方源】《纲目拾遗》卷五。

【组成】鸦胆子

【用法】用小铁铤轻敲其壳，壳破肉出，其大如米，敲碎者不用，专取全仁用之。三五岁儿二十余粒，十余岁者三十多粒，大人则四十九粒，取大圆肉包之，小儿一包三粒，大人一包七粒，紧包，空腹吞下，以饭食压之，使其下行。

【主治】冷痢久泻，百方无验者。

【宜忌】服时忌荤酒三日，戒鸭肉一月。

【方论选录】虚人冷积致痢，其积日久，渐至下坠，竟至大肠下口直肠上口交界之处，有小曲折隐匿于此，为肠移最深之处，药所不到之地。证则乍轻乍重，或愈或发，便则乍红乍白，或硬或溏，总无一定，任是神丹，分毫无济，盖积不在腹内，而在大肠之下，诸药至此，性力已过，尽成粃糠，安能去此沉匿之积？所以冷痢，有至三五年十数年不愈者，由此故也。古方用巴豆为丸下之者，第恐久病人虚，未敢轻用；今以至捷至稳鸦胆子一味治之，更藉此圆肉包裹，可以直至大肠之下也。

32521 至圣丹

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】全蝎十六只 蝉退 天麻 制白附子 辰砂 僵蚕 制南星各一钱 麝香五分 防风二钱

【用法】上为细末，蜜为丸，金箔为衣。

【主治】小儿吐泻或久痢后，胃虚脾慢，四肢口鼻气冷，沉困不醒者。

32522 至圣汤

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】当归 芍药 干姜 菝葜 桂心 地黄 蒲黄（炒）各半两 黑豆（炒去皮）一两

【用法】上为细末。每服二钱，空心热酒送下。

【主治】妇人血气，产前产后百疾。

32523 至圣散

【方源】《元和纪用经》。

【异名】夺命散（《幼幼新书》卷九引《谭氏殊圣》）。

【组成】紧小干蝎四十九枚（每一蝎，以四叶薄荷包合，绵线系之，火炙焦去线）

【用法】上为末。金银汤调三豆许大，三岁倍之，量大小加至半匕；以麝香、牛黄少许调服益佳。

【主治】①《元和纪用经》：小儿阴阳痫，手足抽掣，病后虚风，百种惊生恶证。②《幼幼新书》引《谭氏殊圣》：小儿急慢惊风，牙关紧急，眼睛上视，胃中胀，时发气。

32524 至圣散

【方源】《幼幼新书》卷二十六引赵舍人方。

【组成】白蚬壳（泥中多年，色白圆小）蜜陀僧（同蚬壳煨）各一两 无各异半两。

【用法】上为细末，入麝半钱研，盐汤温浆水洗，掺药，膏药盖。不五七次即生肥肉，生六分止，不然，疮癰高大。

【主治】疳疮年深见骨，或干或湿。

【备考】本方方名，人卫本作“至宝散”。

32525 至圣散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】香白芷一斤（生锉） 甘草半斤

【用法】上为细末。每服五钱，水一盞半，加枣子一枚，生姜五片，连须葱白三寸，煎至八分，热服。用衣被盖覆，约行五六里，更进一服。汗出即愈。

【主治】一切时行伤寒，不问阴阳，不拘轻重，孕妇皆可服之。

32526 至圣散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】全蝎尾（去毒）二十一个 晚蚕蛾天浆子 白附子（炮）各五钱 辰砂（水飞）一分 麝香一分。

【用法】上为极细末。用薄荷煎汤，入酒二、三滴调化，不拘时服。

【主治】婴孩小儿中风痉病，昏闷不醒。

32527 至圣散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枇杷叶（净刷去叶后毛，锉碎）二两 半夏（咬咀净者）四两

【用法】上用生姜四两重，切作绿豆大，拌匀，酿一宿，慢火炒令微焦色，以皮纸盛，于地上候冷。每服二钱，水一盞，煎七分，去滓，空心少与缓投；或入诸药内同煎服，亦效。

【主治】老幼暴吐，服药不止者。

32528 至圣散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】黄连五个（水洗） 干铜绿半两（研） 生白矾半两（研） 膩粉一钱 麝香一钱（研） 乳香一钱（研）

【用法】上将黄连捣为末，罗过，冲入其余五味拌匀。每用少许，汤泡澄下，乘热洗之。

【主治】小儿眼赤烂。

32529 至圣散

《普济方》卷三六七。为《卫生总微》卷六“通圣散”之异名。见该条。

32530 至圣膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】夜合花白皮 蒺藜 大黄 当归 白敛 槐白皮 白芷 细辛（去苗叶） 杏仁 天麻 芎藭 槐枝 柳枝 败龟 虎骨 附子（去皮脐）各半两 乳香（细研）一两 麝香（细研）二钱 砒霜（细研）半分 自然铜（细研）一分 膩粉（研）半分 牛黄（细研）二钱 定粉（研）半两 铅丹十二两 清油二斤半。

【用法】上药除研药丹粉外，细锉，先熬油令沸，次下诸药，煎候白芷赤黑。以绵绞去滓再煎，下丹，柳篦搅，候变黑色，滴水中成珠，软硬得所，次下乳香等研药，更搅令匀，以瓷合盛。发背、鱼脐、瘰癧，并以膏贴，一日二次。以愈为度。

【主治】一切疮疖肿毒。

32531 至圣膏

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】朱砂一分(水飞) 天南星(腊月牛胆制)半两 铁粉一分(水研) 蝎梢十四个 续随子(去皮)四十九个 脑麝各少许

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服一丸,薄荷温汤化下,不拘时候。

【主治】急惊发搐,手拳紧,多睡啼叫,烦热膈实。

【加减】如涎多,加轻粉半钱。

32532 至圣膏

【方源】《外科精要》卷下。

【异名】汤火至圣膏(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】鸡子黄

【用法】置银石器内熬油,调胡粉敷之。

【主治】汤火疮。

32533 至灵散

【方源】方出《肘后方》卷四,名见《普济方》卷二十四。

【组成】面

【用法】熬面令微香,捣服方寸匕。得大麦生面益佳,无面以麋亦得。

【主治】食过饱烦闷,但欲卧面腹胀。

【备考】《普济方》用曲熬令香黄为末,大麦麋亦佳。

32534 至灵散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】透顶散(《杨氏家藏方》卷二)、细辛散(《朱氏集验方》卷九)。

【组成】雄黄(研) 细辛(去苗叶,为末)各等分。

【用法】上为末。每服一字,左边疼痛入右鼻,右边疼痛入左鼻。

【主治】偏头痛。

【备考】《杨氏家藏方》本方用细辛一两,雄黄半两。

32535 至灵散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】土茯苓二两 白花蛇三分 防风

荆芥 薄荷 金银花 皂角刺 牙皂 白鲜皮 当归 五加皮 地骨皮 川芎 意苡仁 人参 黄芩 牛膝 木通 甘草

【用法】上咬咀。水煎熟,空心服。

【主治】杨梅疮。

【宜忌】忌一切发物。

32536 至妙丹

《圣济总录》卷三十五。为《普济方》卷二〇。引《王氏传信方》“至妙疔丹”之异名。见该条。

32537 至明膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黄连一两(锉) 当归二钱(锉) 蕤仁(去皮)一钱 龙脑一钱 南硼砂一钱 青盐一字

【用法】将前三味用水一大碗,浸一时辰,慢火熬至半碗,澄滤去滓,入白蜜半两,再重汤煮成膏,重绵滤过,出火毒。后三味,研极细,与前药一处同研令匀。每用黄米粒大,或一绿豆许,每日点一次,两眼各点一筋。

【主治】眼暴赤疼痛,泪出眵多,热气上攻,视物昏花。

32538 至宝丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】金银箔各五十片(细研) 川升麻一两 子芩一两 犀角屑一两 蛭螂三枚(去翅足,微炒) 梔子仁一两 龙齿二两(细研) 铁粉二两(细研) 麦门冬一两半(去心,焙) 川大黄一两(锉碎,微炒) 朱砂一两(细研,水飞过)

【用法】上为末,入研了药,同研令匀,炼蜜为丸,如麻子大。每服五丸,煎竹叶汤研下。

【主治】小儿惊痫,频发不定。

32539 至宝丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】螺青半两 京墨四钱 巴豆(去油)一钱 北五灵脂二钱半 轻粉 脑各半钱 使君子十四个(连壳煨取肉) 麝一字 飞白面三钱

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服一丸，水研送下。

【主治】小儿惊风痰热。

32540 至宝丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】真阿魏二钱 芦荟 天竺黄 胡黄连 雄黄 川山甲(炒) 沉香 白草乌(泡) 硃砂 没药各二分

【用法】上为极细末，用好酒和成一块，入铜锅内，再入酒半茶钟，文火熬成膏，量可丸时取出为丸，如碗豆大。十岁以上，服二丸，临卧时服，黄酒送下。待其自然汗出，三日服一次，重者，五七服；轻者，二三服，热即退，块亦消。

【主治】癖疾发热。

【备考】如服后热不止，可后服金花丸；如羸弱不进食者，可先服平胃散。

32541 至宝丸

【方源】《慈幼新书》卷首。

【组成】真金华香附一斤四两(择大而毛净者，童便浸三日，捣碎，晒干，为末，用马料黑豆数升，煮浓汁拌晒三次，复以人乳拌晒一次，磨为末，用十二两) 熟地黄三两 当归 杜仲(盐水炒)各二两 川芎 人参 白茯苓 牡丹皮 延胡索 滴乳香 没药(二味瓦上焙去油，研) 赤石脂(细腻粘唇者，火煨醋淬)各一两 白术 白芍各一两 五钱 鹿角胶(牡蛎粉炒成珠，去粉)四两

【用法】上药为末，炼蜜为丸，如弹子大。每早空心服一丸，白汤送下。

【功用】调经止带，安胎补虚。

【主治】胎前一切症。

32542 至宝丸

【方源】《仙拈集》卷四

【组成】牛角 羊角 穿山甲(三味用湿纸裹煨焦，净末)各二两 皂刺三钱 生大黄十二两

【用法】上为末。每服五钱，陈酒送下。间二日，再一服，至重三服全愈。

【主治】杨梅疮。

【备考】大便时，须于空地以土掩之，恐恶气染人。本方名至宝丸，据剂型当作“至宝散”或“至宝丹”。

32543 至宝丹

【方源】《灵苑方》引郑感方(见《苏沈良方》卷五)。

【异名】至宝膏(《幼幼新书》卷八)。

【组成】生乌犀 生玳瑁 琥珀 朱砂 雄黄各一两 牛黄一分 龙脑一分 麝香一分 安息香一两半(酒浸，重汤煮令化，滤去滓，约取一两净) 金银箔各五十片

【用法】上为丸，如皂角子大。每服一丸，人参汤送下，小儿量减；血病，生姜、小便利化下。

【功用】《方剂学》：清热开窍，化浊解毒。

【主治】①《灵苑方》引郑感方：心热血凝，心胆虚弱，喜惊多涎，眠中惊魇，小儿惊热，女子忧劳，血滞血厥，产后心虚怔忡。②《局方》：卒中急风不语，中恶气绝，中诸物毒暗风，中热疫毒，阴阳二毒，山岚瘴气毒，蛊毒水毒，产后血晕，口鼻血出，恶血攻心，烦躁气喘，吐逆，难产闷乱，死胎不下。又疗心肺积热，伏热呕吐，邪气攻心，大肠风秘，神魂恍惚，头目昏眩，睡眠不安，唇口干燥，伤寒狂语。又疗小儿诸痛，急惊心热，卒中客忤，不得眠睡，烦躁风涎搐搦。

【方论选录】①《古方选注》：至宝丹，治心脏神昏，从表透里之方也。犀角、牛黄、玳瑁、琥珀以有灵之品，内通心窍；朱砂、雄黄、金银箔以重坠之药，安镇心神；佐以龙脑、麝香、安息香搜剔幽隐诸窍。李杲曰：牛黄、脑、麝入骨髓，透肌肤。故热入心包络，舌绛神昏者，以此丹入寒凉汤药中用之，能祛阴起阳，立展神明，有非他药之可及。若病起头痛，而后神昏不语者，此肝虚魂升于顶，当用牡蛎救逆以降之，又非至宝丹所能苏也。

②《阎氏小儿方论笺正》：此方清热镇怯，

定魄安神,凡肝胆火炎,冲击犯脑,非此不可,洄溪所云必备之药。方下所谓诸痛急惊,卒中客忤,烦躁不眠,及伤寒狂语等症,方后所谓卒中不语云云,无一非脑神经之病,投以是丸,皆有捷效,名以至宝,允无惭色。

【临证举例】高热神昏 《浙江中医药》(1979,7:259):一患者,高热40℃,突陷昏迷,头汗如淋,四肢痠痲,呼吸喘促,两目对光反射迟钝,瞳孔散大,角膜混浊,舌苔黄燥,质淡红,脉细数。辨证为暑热挟秽浊之邪蒙蔽心包,肺失清肃,肝风煽动,拟清暑宣肺之剂:用至宝丹一粒合鲜竹沥60克,石菖蒲、六一散各9克,郁金、川贝、麦门冬各6克,扁豆花12克,远志4.5克,鲜芦根30克,金银花18克,浓煎鼻饲,三天后改为至宝丹2粒,同时应用抗菌素、脱水剂等西药治疗,至第六天后神识转清,身热减轻。

【备考】本方改为散剂,犀角改用水牛角浓缩粉,不用金银箔,名“局方至宝散”(见《中国药典》)。《局方》本方用法:将生犀、玳瑁为细末,入余药研匀,将安息香膏重汤煮凝成后,入诸药中和搜成剂,盛不津器中,并旋丸如梧桐子大。每用三丸至五丸,疗小儿诸痛急惊心热,每二岁儿服二丸,均用人参汤化下。

32544 至宝丹

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】生犀角(镑) 生玳瑁(镑) 琥珀(研) 丹砂(研) 雄黄(研) 各一两 牛黄半两(与上二味各研匀) 安息香一两半(酒浸,重汤煮令化,滤去滓,约取一两,净研如膏)

【用法】上七味,内六味捣研为末,以安息香膏为丸,如皂荚子大。每服一丸,人参汤送下。小儿量度加減。

【主治】心热胆虚,喜惊多涎,梦中惊魇,小儿惊热,女子忧劳血厥,产后心虚怔忡等疾。

32545 至宝丹

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】玳瑁(镑) 雄黄(研) 丹砂(研) 安息香(酒化,重汤熬成煎) 白芥子各一两

【用法】上五味,除安息香外,捣研为末,以安息香煎丸,如绿豆大。每服十丸,温酒研下。

【功用】解一切毒。

【主治】中恶鬼注。

32546 至宝丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】辰砂 生犀 玳瑁 雄黄 琥珀 人参各五两 牛黄二两半 麝香 龙脑各一两二钱半 天南星二两半(水煮软,切片) 银箔二百五十片(入药) 金箔二百五十片(半入药,半为衣) 安息香五两(用酒半升,熬成膏) 龙齿二两(水飞)

【用法】上为末,用安息香膏,重汤煮汤搜剂,旋丸如梧桐子大。每服三丸至五丸,小儿一两丸,人参汤送下。

【主治】①《卫生宝鉴》:风中脏。②《普济方》:卒中风,急不语,中恶气、卒中诸物毒,暗风,卒中热疫毒,阴阳二毒、岚瘴毒,误中水毒,产后血晕,口鼻血出,恶血攻心,若烦躁、心肺积热,霍乱吐利,风注转筋,大肠风湿,神魂恍惚,头目昏眩,眠睡不安,唇口焦干,伤寒狂语,小儿急惊风,热卒中,皮痒痒客忤不得眠睡,烦躁惊风搐搦。

32547 至宝丹

【方源】《普济方》卷一一六引《经效济世方》。

【组成】草乌头一斤(用大豆二升,盐四两,入砂锅内煮三复时,令乌头极烂为度,其豆取出埋土中一尺,以乌头入木臼内捣三百杵,拍作饼子焙干)

【用法】上为细末,酒面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心,食前温酒或盐汤送下。

【主治】诸风。

32548 至宝丹

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】戊粮至宝丹(《痘疹仁端录》卷十四)。

【组成】戊腹粮(即将大米净室与犬食饱,取其粪中米洗净)

【用法】上药炙干研细,每一两入麝香一二分。

【主治】①《准绳·幼科》:痘疮黑陷倒靥,干枯不起者。②《张氏医通》:痘疮脾胃虚寒,肢冷不食,伏陷不起。

【备考】《张氏医通》:以生糯米与黄色雄狗饱食,取矢中米淘净,炙干研细,每两入麝香三分,随证用温补脾胃药或独参、保元送下。

32549 至宝丹

【方源】《慈幼新书》卷一。

【组成】滑石六两 甘草 木香 陈皮 莪术 三棱各一两 茯神 白术 山药 远志 青皮各一两五钱 甘松五钱 益智仁七钱五分 麝香一钱五分(一方有人参一两)

【用法】蜜为丸,如芡实大,朱砂为衣。灯心汤调化服。

【主治】小儿胎热,生后气急喘满,眼闭或目赤,眼胞浮肿,精困呵欠,呢呢作声,遍体壮热,小便赤,大便涩,时复惊烦。

【备考】此即时下所常用秘方也。不论内伤外感,变蒸寒热,一切治之。予谓此药,唯蒸症相宜,次则郁热伏暑神剂。小儿夏月,宜多服之。补而不滞,泻而不偏、殊有妙用。

32550 至宝丹

【方源】《何氏济生论·附录》卷八。

【组成】人参一钱 白茯苓二钱 广木香五分 砂仁三钱 朱砂一钱 远志二钱 桔梗(炒)二钱 滑石一两二钱 香附(炒)一两 甘草一两四钱(炙去皮) 蓬莪四钱 黄耆(炙)二钱 山药二钱 甘松(水洗晒)三钱 山楂二两 益智仁(去壳)三钱

【用法】炼蜜为丸,如龙眼大。每服一丸。小儿外感风寒,内伤饮食,发热头痛,惊悸

咳嗽,气粗面赤,无汗,姜、葱汤热服;伤风夹惊,发热咳嗽,面青夜啼,停滞作泄,小便不清,呕吐作渴,肚腹膨胀,灯心、姜汤服,疟疾,葱、姜、桃头汤空心服;出汗、盗汗,灯心、浮麦汤下;腹痛,乌梅、姜汤下。

【主治】小儿外感风寒,内伤饮食,发热头疼,惊悸咳嗽,气粗面赤;或呕吐泄泻,腹胀腹痛及疟疾盗汗。

32551 至宝丹

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】木香 沉香 狗宝各三钱 硼砂二钱 雄黄一钱五分 朱砂一钱五分 鸦片一钱 冰片 麝香各五分 牛黄一钱 金箔四十张

【用法】上为末,用射干四两,煎汁为丸,如稀,加蒲黄末同和,每丸三分,金箔为衣。服时用梨一块,挖一孔入丸一粒,临卧连丸化服。

【主治】膈气痰火重者。

32552 至宝丹

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归 生地 白芍各五钱 栀子 黄连 薄荷 白菊花各一钱五分 防风 白芷 荆芥 黄芩 连翘各二钱 细辛一钱

上用砂锅水煎,去滓,再熬汁一茶钟,入蜜五钱,熬成膏,调后细药为锭子、或为小丸子。

炉甘石一两(煨红,入黄连水淬,飞过) 冰片 熊胆各三分 琥珀(生研) 象牙(煨) 珍珠 乳香 没药(去油)各四分 真麝香一分五厘

先将后八味共为细末,后入炉甘石同研极细,用前膏调成小丸子。

【用法】点时将药一粒,净水在手掌和匀,用银簪或骨簪点药两眼角。暴发过三日,点一次即好。风火烂眼等症,点三晚即愈,云翳点好为度。

【主治】风火流泪、红烂、云翳、肿胀、疼痛。

32553 至宝丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】川乌二钱 草乌二钱（同川乌酒浸，剥去皮，面包煨热，取净肉用） 穿山甲二钱（炒） 胆矾二钱 乳香（去油）三钱 没药（去油）三钱 蝉退（去头足）三钱 全蝎（石灰水洗，去头足尾，瓦上焙干）三钱 熊胆三钱 铜绿（水飞）三钱 荆芥穗（去肉）三钱 僵蚕三钱 血蝎三钱 雄黄三钱 牙皂（去皮，酥炙）二钱 信二钱（用豆腐一块，厚二寸，中挖一孔，纳信于孔中，以豆腐盖信，酒煮三个时辰） 蜈蚣五条（大者，酒蒸去头足，瓦焙小者用） 麝香七分 朱砂七钱（水飞，一半入药，一半为衣）。

【用法】上为细末，面糊为丸，重四分一粒，以黄蜡为壳。临用时，葱头三寸，生姜三片，用黄酒煎一小钟，将药化开送下，随量饮醉。盖被出汗，二三服即愈。

【主治】一切痈疽，肿毒，对口背疽，乳痈。

32554 至宝丹

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】麻黄 防风 荆芥 薄荷 当归 赤芍 大黄 芒消 川芎 黄芩 桔梗 连翘（去心） 白术（土炒） 栀子 石膏（煨） 甘草（生） 滑石 全蝎（去毒） 细辛 天麻 白附子 羌活 僵蚕（炒） 川连 独活 黄柏各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重五分。量儿大小与之，生姜汤化下。

【主治】急惊风属火郁生风者。

32555 至宝丹

【方源】《一盘珠》卷九。

【组成】早米饭一碗

【用法】将米饭炒成黑色，煎水半碗，徐徐饮之。

【主治】痘疹泄泻不止。

32556 至宝丹

【方源】《活人方》卷七。

【组成】西牛黄五分 麝香五分 全蝎七分（去尖、酒洗，焙燥） 白僵蚕七分（取直者焙燥） 朱砂一钱（飞细） 真佛金十张

【用法】共乳细无声，入瓷瓶塞固。大人每服七厘，老弱半分，小儿三厘，用陈胆星七分，南星七分，半夏七分，天麻七分，橘红七分，枳壳七分，防风七分，防己七分，川芎七分，当归七分，麻黄七分，薄荷七分，木通七分，甘草七分，生姜二片，大枣二枚，赤金首饰一事，水煎浓汁，不拘时候，调前末药温服。取微汗；如无汗，以余汁热服催之。

【主治】男妇小儿，风痰入于包络，则心神失守，不省人事；凝滞脏腑，则气道不通，痰壅喘急，二便秘结，阻塞经络，则口眼喎斜，手足搐搦，肢体振掉，或因惊触，或由恼怒，或从心肾不交，虚火冲虐，或产后血脱，阴火妄行，卒然暴中，及癫痫狂躁。

32557 至宝丹

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】牛胆黄六分 琥珀 乳香 没药各三分 珍珠四分 天竺黄一钱四分 生矾 枯矾 雄黄 青鱼胆 白粉霜（即白降丹）各五分 麝香分半 白砒（用人粪尖黄土各和匀包砒，炭火炼，秽气尽为度，打开用砒）五分

【用法】上为末和匀，陈年老米打糊为丸，如绿豆大，晒干，密收瓷器，勿走药气。壮者服五丸，弱者三丸，白滚水送下，不拘时候。

【功用】清痰涎，凉胸膈，开关进食。

【主治】噎膈反胃。

【宜忌】忌酒色、生冷、油腥。

32558 至宝丹

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鹿茸一两（酥油炙脆） 大石燕一对（重六七钱者，真米醋浸一日夜，再以姜汁浸透） 熟地 苁蓉各六钱 穿山甲（烧酒浸一日夜，晒干，酥炙黄色） 枸杞 朱

砂(荞面包蒸一日,去面) 附子(去皮脐,用川椒、甘草各五钱,河水煮三炷香)各五钱 天冬 琐阳(烧酒浸,焙七次)各四钱 破故纸(酒浸焙) 当归(酒浸) 紫梢花(河水漂,取出,酒焙干) 风仙花子(酒浸,焙干) 青盐(拌炒杜仲用) 海马一对(酥炙黄) 淫羊藿(剪去边,人乳浸一日夜,炙黄)各一钱半 砂仁(姜汁煮炒) 丁香(用川椒微火焙香去椒) 地骨(水洗蜜浸) 杜仲(童便化青盐拌炒断丝) 牛膝(酒洗) 细辛(醋浸) 甘菊(童便浸,晒) 甘草(蜜炙)各二钱半

【用法】上药精制如法,各为极细末,以童便、蜜、酥油拌匀,入瓷瓶盐泥封固、重汤煮三炷香,取出露一宿,捏作一块,入银盒内按实,外以盐泥封固,晒干,再入铁铸钟铃内,其铃口向上,将铁线从鼻内十字拴定,用黑铅一二十斤熔化倾铃内,以不见泥毯为度,入灰缸火行三方,每方一两六钱,渐次挨铃,寅戌更换,上置滴水壶一把,时时滴水于内,温养三十五日,用烙铁化去铅,开盒,其药紫色,瓷罐收贮,黄腊封口,埋净土内一宿。每服一分,放手心内,以舌舐之,黄酒送下,渐加至三分为止,久服奇效。

【功用】广嗣延龄。

32559 至宝丹

【方源】《疡医大全》卷十六引《冯氏秘方》。

【组成】雄鼠骨一副(其鼠要八两以上者,越大越好,理毛,用草纸包七层,再用稻草包紧,黄泥封固,用稻糠煨熟去肉,拣出全骨,酥油炙黄,研为细末,入后药) 北细辛(洗净土,晒) 真沉香各一钱五分 破故纸(青盐水炒) 白石膏(青盐水炒) 骨碎补(去净毛,蜜水炒) 全当归(酒炒) 旱莲草(酒炒)各五钱 香白芷(青盐水炒) 怀生地(酒炒)各三钱 绿升麻(焙)二钱 没石子雌雄一对(酒煮、火烘)

【用法】上为细末。同鼠骨末合在一处拌

匀,用银盒或铅盒盛之。每早擦牙漱口,久而不断。牙齿动摇者,仍可坚固,不动者永保不动,甚之少年有去牙一二,在三年以内者,竟可复生,颇小而白,久则如故,妙不可言。

【功用】牢牙固齿。

32560 至宝丹

【方源】《集验良方,续补》引程琢斋方。

【异名】小牛黄丸。

【组成】犀牛黄三分(另研) 天麻三钱 麝香一分(去毛净,另研) 桔梗三钱 僵蚕三钱 橘红三钱 全蝎一钱(洗淡,酒炒) 生半夏二钱 蝉衣二钱 广郁金二钱 茯神三钱 苏薄荷四钱 远志三钱(去心) 枳壳五钱 甘草一钱

【用法】上药晒研,各为细末,称准分两,和匀,共研极细,另加钩藤钩一两煎汁,再加黑沙糖五钱煎水,滤净,捣为丸,如芡实大,一料约一百五十丸,漂净朱砂为衣,外滚赤金箔三十张。

【主治】小儿一切风寒发热,痰滞停食及急惊风。

32561 至宝丹

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】蜗牛(即背包蜒蚰,极大者,煨)五枚 儿茶二钱 活松树皮二钱(煨存性,勿沾灰尘) 冰片七分(研)

【用法】上为细末,吹之。立效。

【主治】结毒喉烂,蒂舌落,上腭穿破。

32562 至宝丹

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】犀角(镑)一两 朱砂(飞) 琥珀(研)一两 玳瑁(镑)一两 牛黄五钱 麝香五钱

【用法】以安息重汤炖化,和诸药为丸一百丸,蜡护。

【主治】太阴温病,发汗过多,神昏谵语者。

【方论选录】此方会萃各种灵异,皆能补心体,通心用,除邪秽,解热结,共成拨乱反

正之功。大抵安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之，主治略同，而各有所长，临用对证斟酌可也。

32563 至宝丹

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】蛇含石（火煨醋淬末）一两 白附子（炒） 胆星（炒） 朱砂（水飞）各五钱

【用法】端午日取粽尖，同杵千下为錠。大人一钱，小人三分，灯心汤磨服。

【主治】疹后发热成疳。

32564 至宝丹

【方源】《人己良方·小儿科》引霍文林秘方。

【组成】人参五钱 木香二钱半 砂仁一两五钱 白茯苓一两五钱 香附五两（童便制） 桔梗一两 黄耆二两（蜜炙） 淮山药一两（酒蒸） 莪术二两（醋制） 甘松一两五钱（洗去泥，研末，另包） 琥珀五钱（另研） 山楂肉五钱 朱砂五钱 远志一两（制） 益智仁一两三钱 滑石六钱（水飞过） 甘草一两（蜜炙） 珍珠四钱（另研包）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每个重一钱。一岁服半丸，三四岁服一丸，看病深浅服之。疝气偏坠，大小茴香汤送下；大便出血，槐花、苍术汤送下；中风痰厥，不省人事，生姜汤送下；咳嗽喘急，麻黄、杏仁汤送下；小便不通，车前子汤送下；霍乱，紫苏、木瓜汤送下；夜出盗汗，浮小麦汤送下；咳嗽痰喘，陈皮汤送下；夜啼不止，灯心、姜汤送下；泄泻，炒黄色米汤送下；慢惊风，人参、白术汤送下；急惊搐搦，薄荷汤送下；痘疹不出，升麻汤送下；发热，金银薄荷汤送下；虫积，苦楝根煎水送下；伤寒挟惊发热，姜、葱汤送下；汗出为妙；停食呕吐腹胀，生姜汤送下；疳症身瘦，腹大而手足细小者，陈仓米汤送下；或淋、或肿、或胀，赤白痢症，俱用陈仓米汤送下。

【功用】止渴止痢、健脾消食积，退身热。

32565 至宝汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】天麻 胆星 白附子 陈皮各五分 僵蚕 钩藤 白术 白茯苓各三分 甘草一分

【用法】加生姜二片，不拘时煎服。

【主治】一切惊风。

32566 至宝饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】桃仁 当归 川芎 红花各一钱二分 乌药 苏木 青皮 大黄（酒蒸）各二钱

【用法】酒、水各一钟，煎服。

【主治】瘀血凝结，肚腹绞痛，如刺割者。

32567 至宝饮

【方源】《痘疹仁端录》卷八。

【组成】桔梗 前胡 山楂 川芎 当归 连翘 木香 茯神 红花 青皮 牛蒡 木通

【主治】初痘起胀前，肺受火毒，不因饮食而呛逆，此为干呛；痘前发热及标胀，

【加减】时呕吐者，加姜制黄连、生姜。

【备考】原书治上症，用本方加沙参、笋兜，少与柴胡、黄芩清之。

32568 至宝散

《幼幼新书》（人卫本）卷二十六。即原书同卷“至圣散”。见该条。

32569 至宝散

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】虎睛一对（酒浸，微炙） 牛黄（别研） 铁粉（别研） 犀角屑 白附子（炮） 天竺黄 人参（去芦头）各二钱半 青黛（细研） 朱砂（别研） 大黄各半两 细松烟墨一两（烧烟尽，地上出火毒） 龙脑一钱（别研） 麝香一分（别研）

【用法】上为细末，次入研者药，和匀。如百日儿，每服一字；周岁儿，半钱，煎葱白、薄荷汤调下。或涎盛，咽喉肿痛，更加研细龙脑半钱，煎薄荷汤调下。不拘时候。

【功用】解潮搐，清神志。

【主治】小儿气血不和，素有实热，复因外受风邪，遂致急惊，涎盛，目睛直视，身热癍痧，大便多秘。

32570 至宝散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】乳香五钱 麝香六分 官桂一钱

【用法】上为末，作一服。酒送下。

【主治】妊娠临产，儿凑心不下者。

32571 至宝锭

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】小儿至宝锭（《全国中药成药处方集》天津方）。

【组成】橘皮五十两 山楂五十两 麦芽（炒）五十两 白附子（炙）五十两 全蝎五十两 蝉蜕五十两 天麻五十两 羌活五十两 钩藤五十两 槟榔五十两 僵蚕（炒）五十两 贝母五十两 紫苏叶五十两 薄荷五十两 藿香五十两 胆南星五十两 白芥子（炒）三十两 滑石五十两 六神曲（炒）二百两 茯苓二百两

共二十味，计一千二百八十两，共研为细末，过罗。每一百二十八两细末兑：

牛黄六钱 麝香四钱 冰片四钱 朱砂十二两 雄黄五两 琥珀三两

【用法】上为细末过罗，混和均匀，炼蜜为锭，重五分。金衣三十六开。每服一锭，每日一至三次，温开水送下。三岁以下小儿酌情递减。

【功用】祛风清热，化痰消积。

【主治】小儿停乳伤食，外感风寒，发热咳嗽，呕吐泄泻。

【宜忌】《江苏省中药成药标准暂行规定汇编》：忌食生冷、油腻之物。

32572 至宝膏

《幼幼新书》卷八。为《灵苑方》引郑感方（见《苏沈良方》卷五）“至宝丹”之异名。见该条。

32573 至真散

【方源】《理伤续断方》。

【异名】夺命散（原书）、玉真散（《本事方》卷六）、防风散（《三因方》卷七）、神助散（《杨氏家藏方》卷十四）、定风散（《卫生宝鉴》卷二十）、胡氏夺命散（《永类铃方》卷二十二）、夺命丹（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】天南星（泡七次） 防风（去芦叉）各等分

【用法】上为末。凡破伤风病，以药敷贴疮口，即以温酒调一钱服之。如牙关紧急，以童便调二钱服，垂死心头微温，童便调二钱，并进三服。

【主治】破伤风，狂犬病。

①《理伤续断方》：打破伤损破脑伤风头疼，角弓反张；②《卫生宝鉴》：疯狗咬破；③《杨氏家藏方》：金疮。

32574 至效散

《活幼口议》卷二十。为原书同卷“丹毒至效散”之异名。见该条。

32575 至慈汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参三分 荆芥（炒黑）三钱 生甘草一钱 柴胡一钱 当归三钱 茯苓二钱 陈皮三分 麦冬二钱 元参三钱 天花粉一钱

【用法】水煎服。十岁为准，如周岁小儿用十分之一，每岁增加可也。若十岁之外，宜加重人参，余味不必加。

【主治】小儿将出痘，身必发热，口必发渴，眼必如醉。

【方论选录】此方用柴胡、荆芥以疏通其表里，得元参以去其浮游之火，得生甘草以败其毒。妙在人参、归、冬之类俱是补气、补津之味，佐其药以充其力，使无壅闭之忧。世人治痘，一见用补，无不惊惧，谁知火毒非补万不能由内而发于外。能于补中用表散之法，何愁小儿之不尽登于寿考也。

32576 至妙疳丹

【方源】《普济方》卷二〇〇引《王氏传信方》。

【异名】至妙丹(《圣济总录》卷三十五)。

【组成】砒霜(研)半两 寒水石(研)一两

【用法】上先研砒在生铁铫内,用寒水石末丸之,以瓷碗合定,湿纸封于碗上,烧候烟出熏纸黄色即止,取出以纸衬于地上,出火毒,须臾细研为末。入研了丹砂、龙脑、麝香各半钱许和匀,汤浸炊饼为丸,如梧桐子大,以丹砂作衣。每服一丸,于未发前用井花水送下。

【主治】疟母。

【宜忌】忌吃热物一时辰,并忌食鱼、面、五果十数日。

32577 至宝锭子

《幼科指掌》卷二。为《冯氏锦囊·杂症》卷五“保婴至宝锭子”之异名。见该条。

32578 至圣一醉膏

【方源】《普济方》卷九十三引《博济》。

【组成】天麻一分 没药 黄明滴乳香各半两 附子一两(炮裂,去皮脐) 安息香一分 麻黄(去根节)四两 生脑子少许

【用法】上为细末,每服四大钱,用法酒一升,于银石器内熬成膏子后,却出分在四盏内。别用法酒,看病人吃酒多少,渐调膏子服尽为度。令枕病处卧,以衣被盖,或汗出,或似虫行,即效。次日再吃一服,手足必已举。

【主治】瘫痪风。

32579 至圣木星饮

【方源】《幼幼新书》卷十八引《赵氏家传》。

【组成】朱砂一分 郁金半两

【用法】上为细末。每用一字或二字,量儿大小入龙脑少许,以新汲水、茶脚少许,同调匀。然后刺猪尾,血滴三点于药汁中令服。不过一二时辰,疮子出便红活,儿无他病。

【主治】小儿疮出不快。

32580 至圣太一散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】犀角(镑) 仙灵脾 真珠末 滑石(研) 胡黄连 恶实(炒) 人参 地丁草(去根) 白茯苓(去皮) 蚕沙(炒) 甜消(研) 板兰根 郁金各一两 大黄(锉) 牛黄(研) 血竭(研) 木通(锉) 梔子仁 马牙消(研) 苍术(削去黑皮) 荆芥穗 芍药 延胡索 玳瑁(镑) 琥珀(研)各半两 甘草(炙)二两半

【用法】上为末。如中风不语,每用一钱匕,新水调服,如口噤即灌下。若能咳嗽,夜半当省人事;灌药四服后不咳嗽者,必不可救。卒中恶风涎不止,用白矾末半钱匕,太一散一钱匕和匀,以新水调下,慢慢灌之即活。

【主治】中风瘫痪,半身不随,口眼喎斜,语言謇涩,形神如醉,惊悸狂言,夜卧不安;或周身麻痹,皮肤不知痛痒,四肢不举,身重如石,腰膝强硬;或筋脉拘挛痠痲,不能行步,百关壅阏,痰涎痞滞;或卒急中恶、客忤、尸注、鬼气、邪魔、尸厥暴亡不省人事。

32581 至圣宁心丹

【方源】《诚书》卷八。

【组成】代赭石(醋煅七次) 全蝎(去毒,炒) 白附子(生) 朱砂 琥珀 南星(去皮脐,煨) 防风 乌蛇(酒浸,炙) 天麻(煨)各一钱 麝一字

【用法】上为末,饭心为丸,麦门冬汤送下。

【主治】小儿惊、风、痰、热四证。

32582 至圣宁心丹

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷五。

【组成】人参 防风 天麻(煨) 蝎梢(去毒) 龙脑 茯神 甘草(炙) 枣仁各一钱 朱砂(水飞)五分 麝香一字

【用法】上为极细末,白米饭心为丸,如芡实大。用去心麦门冬煎汤研化,食远服。

【功用】安神退惊,止焦啼,宁眠。

32583 至圣夺命丹

【方源】《普济方》卷三七三。

【组成】人参(去芦)五钱 白术三钱 天麻(炮)三钱 南星五钱(姜制) 全蝎(去毒)三钱 防风(去芦)三钱 羌活三钱 北细辛(去叶)三钱 独活三钱 荆芥穗三钱 茯神三钱 川乌(炒去皮)三钱 半夏(汤泡)五钱 僵蚕(炒)三钱 酸枣仁(炒) 远志肉 川芎 白附子(炒) 川白芷 桔梗(去芦) 甘草 石菖蒲各三钱 蝉蜕十四个(各制,碾为末,去土) 雄黄一钱 金箔二十片 银箔三十片 麝香一钱(上四味乳钵内研) 白茯苓(去皮)三钱

【用法】上合和令匀,姜汁面糊为丸,朱砂为衣。临用研化,金银薄荷汤送下;搐不止,鸡冠血送下。

【主治】惊风重者。急慢惊风,风痫中恶,客忤恍惚,口眼喎斜,痰壅搐掣。

32584 至圣达原丸

《全国中药成药处方集》(吉林方)。即《瘟疫论》卷上“达原饮”改为丸剂。见该条。

32585 至圣来复丹

【方源】《幼幼新书》卷九引《养生必用》。

【异名】来复丹、正一丹(《局方》卷五吴直阁增诸家名方引铁甕城八角杜先生方)、养正丹、黑锡丹(《医宗必读》卷六)、二和丹(《杂病源流犀烛》卷四)、来复丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】灵脂 青皮 硫黄 消石(于瓷器内,文武火消,令匀,勿令太过,研细,慢火炒黄色) 陈皮(不去白)各二两 太阴玄精石一两

【用法】上为末,水煮面糊为丸,如梧桐子大;小儿如麻子,看大小加减服之。每服二十粒,病甚者三十粒,轻者十五粒;童稚十粒,婴儿三五粒,新生一二粒,化破,早晨粥饮送下。

【功用】《局方》(吴直阁增诸家名方):补损扶虚,救阴助阳,常服和阴阳,益精神,散腰肾阴湿,止腹肋冷疼。

【主治】上盛下虚,里寒外热,身热烦燥,心腹冷痛,伏暑霍乱吐泻,冷热泻痢。

①《幼幼新书》引《养生必用》:阴阳不调,冷热相制,荣卫差错,心肾不升降,水火不交养,凡丈夫,女人、老寿、稚婴危急证候,胃气尚在者。如邪热炎上烦躁;冷气攻注疼痛;膈痞寒热不可忍;肾邪攻胁注痛,不可转动;诸霍乱吐泻,水谷汤药不住;大段吐逆,手足逆冷,脚转筋;着热烦躁,昏塞旋倒,不省人事;泻痢不问赤白冷热;非时吐逆气痞,食饮不下;小儿因惊成痢,发渴多日,变成虚风,作慢惊者。②《局方》(吴直阁增诸家名方):荣卫不交养,心肾不升降,上实下虚,气闭痰厥,心腹冷痛、脏腑虚滑,不问男女老幼危急之证,但有胃气者。③《饲鹤亭集方》:上盛下虚,里寒外热,伏暑霍乱泄泻,中脘痞结,腹痛疝气及小儿惊风。

【备考】《局方》(吴直阁增诸家名方):上用五灵脂、二橘皮为细末,次入玄精石末及前二气末拌匀,以好滴醋打糊为丸,如碗豆大。每服三十粒,空心粥饮吞下。甚者五十粒,小儿三五粒,新生婴儿一粒。小儿慢惊风或吐利不止变成虚风搐搦者,非风也,胃气欲绝故也。用五粒研碎,米饮送下。老人伏暑迷闷,紫苏汤送下。妇人产后血逆上抢闷绝,并恶露不止,及赤白带下,并用醋汤送下。应诸疾不辨阴阳证者,并宜服之。

32586 至圣青金丸

《圣济总录》卷一六九。为《博济》卷四“至圣青金丹”之异名。见该条。

32587 至圣青金丹

【方源】《博济》卷四。

【异名】青金丹(《苏沈良方》卷十)、至圣丹(《局方》卷十)、至圣青金丸(《圣济总录》卷一六九)。

【组成】青黛(上细好者,研)二分 雄黄二分(研) 龙脑少许(研) 熊胆一分(用温水入化药) 胡黄连二分 麝香五分(研) 蟾酥一皂子大 水银一皂子大 铅霜

白附子二枚 芦荟一分(研) 朱砂一钱(研) 膩粉一分

【用法】上为细末后，再都入乳钵内，细研令匀，用猪胆一枚，取汁熬过，浸蒸饼少许为丸，如黄米大、晒干，于瓷器内收密封，或要旋取。每服二丸，各依汤使如后：小儿患惊风天病，戴上眼睛，手足搐搦，状候多端，但取药一丸，用温水化破，滴入鼻中，令嚏喷三五遍后，眼睛自然放下，搐搦亦定，更用二丸，薄荷汤化下；久患五疳，四肢小、肚高，得眉吃土，咬指甲，发稀疏，肚上青筋，每服二丸，粥饮送下；小儿变蒸寒热，每服二丸，薄荷汤送下，化破服；小儿久患泻痢，每服二丸，米饮送下；小儿每患疳虫咬心，每用二丸，苦楝子煎汤送下；小儿患鼻下赤烂，口齿疳虫并口疮等，用儿孩子奶汁，研二丸，涂在患处；小儿患疳眼雀目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批开，纳药二丸，在羊肝子内，以麻缕子缠定，用淘米泔水煮令熟，空腹吃下，仍令乳母常忌毒鱼、大蒜、鸡鸭、猪肉等。此药小儿常隔三两日吃一服，永无病，不染横天之疾。凡有患但与服，必有功效。

【主治】小儿一十五种风疾，五般疳气，变蒸寒热，便痢枣花粪，脚细肚胀，肚上青筋，头发稀疏，多吃泥土，得眉毛，咬指甲，四肢羸瘦，疳蛔咬心，泻痢频并，惊悸多嗽，疳蚀口鼻，赤白疮，疳眼雀目等。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方青黛、胡连、熊胆、蟾酥、雄黄、芦荟清热解毒；水银、膩粉、铅霜、朱砂重坠镇怯；龙脑、麝香通窍醒神；白附子祛风散寒；故以治内热疳积，天钩内风之证。

32588 至圣保元丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】胆南星三两五钱 防风三两五钱 羌活三两五钱 茯苓二两 僵蚕(炒)二两 甘草二两 天竺黄二两 橘皮二两 麻黄二两五钱 钩藤二两五钱 薄荷二两五钱 天麻三两 猪牙皂二两五钱 全蝎四两(如活

的用八十个)共为细末过罗。每三十七两五钱细末兑：琥珀二两 牛黄四钱 冰片二钱 朱砂一两六钱 麝香四钱

【用法】上药研细过罗，混和均匀，炼蜜为丸，重五分，蜡皮封固。每服一丸，日服二次，温开水送下，三岁以下小儿酌情递减。

【功用】解热镇惊，祛风化痰。

【主治】小儿感冒发烧，咳嗽痰盛，气促作喘，急热惊风，手足抽搐，项背强直。

32589 至圣保命丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】全蝎十四枚(去毒，炒) 朱砂(别研) 天麻 白附子(炮) 蝉蜕各二钱 麝香半钱(别研) 防风(去芦头) 白僵蚕(炒去丝嘴)各一钱 金箔十片(临时研入)

【用法】上为细末，用粳米饭和丸，每一两作四十丸，别用朱砂为衣。初生儿，每服半丸，乳汁化下。周岁儿，服一丸，薄荷汤化下。不拘时候。

【主治】小儿胎惊内吊，腹肚坚硬，眠睡不安，夜多啼哭，及急慢惊风，目睛上视，手足抽掣，不省人事。

32590 至圣保命丹

【方源】《普济方》卷三七五引《保生集方》。

【组成】全蝎五两 南星十两 蚯蚓屎十两 朱砂一两 轻粉二钱 岸螺蛳二百个

【用法】上为末，糕糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，用薄荷汤化下。

【主治】小儿急慢惊风。

32591 至圣保命丹

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】真麻油三两 巴豆四十九个 黄丹二两 黄蜡四两

【用法】上先将麻油同巴豆用银锅慢火熬成，色如埤炭黑色，去巴豆不用。次下黄丹煎数沸，再入黄蜡熬，令色黑，滴入水中成膏为度。每服一铤重半钱旋丸，如绿豆大。空

心服，赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，干姜、甘草煎汤送下。

【主治】赤白痢，昼夜无度。

32592 至圣保命丹

【方源】《永乐大典》卷九七八引《施园端效方》。

【组成】防风一两 白附子 天南星（炮）白僵蚕 朱砂 雄黄 甘草（炒）各半两 麝香一字 金箔一片 全蝎十四个（去毒）

【用法】上为细末，糯米粥为丸，一两作四十丸；或炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【功用】镇心安神。

【主治】小儿一切急慢惊风，潮搐反张，涎痰壅塞；及一切风寒伤表证。

32593 至圣保命丹

《直指小儿》卷二。为《卫生总微》卷六“神授至圣保命丹”之异名。见该条。

32594 至圣保命丹

【方源】《幼科发挥》卷二。

【异名】紫金锭子。

【组成】胆星 僵蚕 白附子各一钱 全蝎十四枚 天麻 防风各一钱 辰砂（水飞）一钱半 麝香一字 珍珠五分 琥珀三分 金箔二十片

【用法】上为末，粟米为丸，分为二十锭，金箔为衣。每一锭薄荷叶煎汤磨服。

【主治】小儿惊风、客忤。

32595 至圣保命丹

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】南星（炮去皮，用白矾水浸一宿，再出晒干，再用生姜水浸一宿，晒干再炒）半夏（同上制） 薄荷 青黛各一两 全蝎（去尾尖） 天麻 白附子（略炒） 僵蚕（姜汁炒） 防风 郁金 甘草各五钱 麝香少许 朱砂五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，朱砂为衣，如芡实大。每服一丸，灯心、薄荷汤化下。

【主治】小儿胎惊内吊，肚腹坚硬，目睛上

视，手足搐搦，角弓反张，痰热咳嗽，一切急慢惊风。

32596 至圣保命丹

《杂病源流犀烛》卷十二。为《卫生宝鉴》卷八“至圣保命金丹”之异名。见该条。

32597 至圣既济丹

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】熟硫黄一钱 白矾（枯）二钱 半夏末二钱（姜汁浸半日，干秤）

【用法】上为末，雪膏为丸，如麻子大。每服三五十丸，温米汤送下。

【主治】小儿阴盛阳亏，脏腑虚寒，泄泻不止。

32598 至圣黑龙丹

《普济方》卷三一一。即《御药院方》卷十“至圣黑龙膏”。见该条。

32599 至圣黑龙膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】米粉四两（于银器内炒成块子褐色，放冷研为细末，后入二味） 乳香（研细） 没药（研细）各半两

【用法】上为极细末。每用以好酒或醋调如膏，摊在纸花子上，贴患处。

【主治】一切筋骨损伤疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“至圣黑龙丹”。

32600 至圣缠金丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】朱砂 硫砂各一两（并研细水飞）巴豆七十个（去皮） 黄蜡十枣大

【用法】上先熔蜡作汁，煮巴豆焦色，去巴豆不用，然后入前药二味，在蜡内搜和成剂，有患旋丸。大人豌豆许一丸，小儿绿豆许一丸，骤泄，新汲水送下；赤白痢，黄连艾汤送下；白痢，艾汤送下；赤痢，黄连汤送下。如合剂后止用金箔裹之，老入肌瘦亦可服，甚者不过再服立愈，并空心服。

【主治】赤白痢。

【宜忌】服讫，忌热物少时。

32601 至妙立消膏

《活幼口议》卷二十。为《直指》卷二十“立消膏”之异名。见该条。

32602 至妙通神丸

《普济方》卷一七五。为《圣济总录》卷七十三“通神丸”之异名。见该条。

32603 至宝玉连膏

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】黄连二两 黄柏 黄芩 大黄 生地黄 赤芍 川椒 杏仁 白芷 桂 猪牙皂角 当归尾各半两 葱白七根 净发一拳头 槐 柳 榆 桑 梔 柏 桃枝条各三钱

【用法】用真香油二斤，春浸五日，夏三、秋七、冬十日。砂锅内熬，微黑色，滤去渣，入松香四两，黄丹碾，筛净十两，用药油熬成膏，滴入水中不散，然后入下项药：乳香、没药、朴消、龙骨、枯矾、血竭各半两，轻粉、胆矾、麝香各一钱，共为细末，入膏内。用净瓷器盛顿，旋摊纸上，贴。

【主治】一切疮肿。

32604 至宝回生丹

【方源】《经验汇抄良方》。

【组成】麝香三分 公丁香 倭硫黄(豆腐制) 吴茱萸 肉桂各一钱

【用法】上为细末，用葱汁拌匀，纳入脐中，外再以暖脐膏盖贴于上，用炒蒸麸皮布包熨腹。

【主治】吐泻，手足麻木，筋疼腹痛，痰症。

【宜忌】不可误入口中。

32605 至宝金丝膏

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】当归 羌活 生地黄 黄柏 秦皮 蔓荆子 川芎 黄芩 赤芍 山梔仁 宣连 大黄 细辛各等分

【用法】逐味修制，入净铜锅内，用净水浸过药寸许，煮令透，去滓，取现在浓汁，以上等结沙好蜜，与浓药汁相停和，入铜锅内，再煮令沸，以两重绵绢滤过，铜器内熬成膏如线，四季加減火色，续入没药、国丹飞过

如面，更加脑、麝，随多少尤佳。点眼；或用汤泡溶，洗亦可。

【主治】眼目暴赤客热，一切外障。

32606 至宝健脾丸

【方源】《慈幼新书》卷十。

【组成】半夏曲(炒) 枳实 山药各一两 白术二两 香附(醋炒) 山楂 藿香 黄连 厚朴(姜汁炒) 麦芽(搗粉) 神曲 萝卜子(炒)各七钱 陈皮 茯苓 白扁豆 白芍各八钱 粉草 人参各五钱 滑石(澄飞)一两五钱 砂仁，木香各三钱

【用法】炼蜜为丸，如龙眼大。每服一二丸，不拘时候。

【功用】进食消积，长肉生肌。

【主治】食积。

32607 至宝得生丹

【方源】《急救良方》。

【组成】秦归(酒炒)四两 益母草一斤 木香一两 柴胡(醋炒)一两 川芎五钱 白芍(炒)四两

【用法】上为细末，白蜜为丸，赤金箔为衣，大者一百张。胎动不安及临产时，用黄酒服一丸；胎死腹中，用炒盐汤、童便、黄酒服；产后中风，不省人事，用薄荷汤服，面目浮肿，木瓜汤服；伤寒发热，葱头汤服；血昏，不省人事，荆芥穗汤服；气短，不思饮食，枣汤服；妇人无子，每日用黄酒服一丸。

【主治】妊娠胎动不安，子死腹中，产后中风、伤寒，产后血晕。

32608 至效十精丹

【方源】《魏氏家藏方》卷六引王吉卿方。

【组成】人参(去芦) 沉香(不见火) 鹿茸(燼去毛，酥炙) 朱砂(别研) 琥珀(别研) 附子(炮，去皮脐) 酸枣仁(去壳，麸炒) 当归(去芦，酒浸) 菟丝子(淘净，酒浸一宿，研成饼) 柏子仁(同酸枣仁别研)各等分

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枣汤或温酒送下，日午、临

卧服。

【功用】安神定志，补养精血。

【主治】梦寐不安，睡多盗汗，体发潮热，小便白浊。

32609 至效石绿散

【方源】《普济方》卷一五六引《海上名方》。

【组成】石绿三钱（细研） 膩粉一钱半

【用法】上为末。先疎拔去腋下毛，然后以醋和药末，摩令热。

【主治】腋气，累医不退。

32610 至效独乌膏

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】独活 草乌 南星 肉桂各等分

【用法】上为细末，用好米醋调敷患处，留头，纸盖，干则醋润之。

【主治】背痈疽发毒肿硬痛。

32611 至验金针散

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】皂角针不拘多少（春月取，半青半黑，灰火内炮）

【用法】上为末。每服二三钱，好酒调服。取汗为验。亦分食前后疮上下用之。如疮在头顶角针用树梢上的；背痈取树身上向阳处的；如便毒悬痈取树丫内的刺，乃取象之意也。

【主治】背痈疽疮肿已破未破。

32612 至圣保命金丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】保命金丹（《医学纲目》卷十）、至圣保命丹（《杂病源流犀烛》卷十二）。

【组成】贯众一两 生地黄七钱 大黄半两 青黛 板兰根各三钱 朱砂（研） 蒲黄 薄荷各二钱半 珠子（研） 龙脑（研）各一钱半 麝香一钱（研） 牛黄二钱半（研）

【用法】上为末，入研药和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大，用金箔为衣。每用一丸，细嚼，茶清送下，新汲水亦得；如病人嚼不得，用

薄荷汤化下，不拘时候。

【功用】镇坠痰涎。

【主治】中风口眼喎斜，手足弹拽，语言謇涩，四肢不举，精神昏愤，痰涎并多。

32613 至圣麝香饼子

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】天麻 玄参 地榆各半两 附子一两 白花蛇头一个 朱砂 麝香各半两

【用法】上药放于银器内，入汤更坐，重汤熬成膏，为丸，如梧桐子大，金箔为衣，捏作饼子。每服二饼，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】三种发痫，潮搐痙痙，口眼相引，目睛上视，头项偃仰，口吐涎沫；及吐痢之后，肠胃俱空，气血变乱，卧不得寐，反拗多啼，令儿发惊，手足掣缩，腰背强直，精神暗钝，涎潮汗出，渐加昏塞；或老人虚风，或男子妇人虚风 后风客心脾，暗不能言。

32614 至宝琥珀锭子

【方源】《直指》卷二十。

【组成】炉甘石（童便煅七次） 府丹各四两（水飞） 硼砂四钱 琥珀 硃砂 珍珠 朱砂 明矾 熊胆 轻粉 海螵蛸 净皮消雄黄 乳香 没药各四钱 冰片五分 麝香四分

【用法】上为极细末。又用黄连、黄柏、黄芩、白茯苓、梔子仁、谷精草、菊花各一两五钱，诃子三个，共咬咀，滚水浸一昼夜，铜器熬成老膏；又用蜜一斤六两，熬成老膏，滴水成珠，去火为度，同前膏和匀，下前末药令匀；梨子三个取汁，通和前药成锭子。用乳汁，银簪蘸点眼内。

【主治】眼疾翳障。

32615 至圣真人全功饮

【方源】《普济方》卷一五九引《圣惠》。

【组成】款冬花二两（去梗，净炒） 罌粟壳（刮去内皮净肉，并去蒂，用蜜少许）二两 陈皮一两 甘草一两

【用法】上药微炒，为粗末。每服三钱，水

一盏半，加生姜三片，乌梅二个，煎至八分，去滓，临卧服之。

【主治】久新咳嗽，痰盛气喘，肺痿瘦悴，不能坐卧，服药无效者。

【宜忌】忌咸、酸、酒、面、酢等物。

夷

32616 夷则丸

【方源】《家塾方》。

【异名】海浮石丸。

【组成】海浮石 大黄 桃仁各等分

【用法】上三味，杵筛为末，糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。不知，稍加之。

【主治】腹不满，其人言我满者。

此

32617 此君丹

【方源】《一草亭》。

【组成】淡竹壳不拘多少（用布拭去毛，烧灰存性）

【用法】每用药一钱，加麝香三五厘，同为细末。点在翳上。

【主治】目翳。

贞

32618 贞元饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】正元饮（《证治宝鉴》卷十引《会心录》）。

【组成】熟地黄七八钱，甚者一二两 炙甘草一二三钱 当归二三钱

【用法】水二钟，煎八分，温服。

【主治】肝肾亏损，气短似喘，呼吸急促，提不能升，咽不能降，气道噎塞，势剧垂危，脉象微细无神，若微而兼紧，尤为可畏。

【加减】如气虚脉微至极者，急加人参；如肝肾阴虚，手足厥冷，加肉桂一钱。

32619 贞元散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】甘草 桔梗 人参 白芍药 黄耆 茯苓 木通 红花 白术 生地黄 白芷 升麻 陈皮 天花粉

【用法】加灯草，水煎服。

【功用】凉血卫脾。

【主治】小儿遍身生疮，头颈脓窠旋绕，手足关节如蛇皮缠裹，寒热不时，喷嚏不止，未愈而痘随出。

当

32620 当风散

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】龙脑 雄黄并少许 面干姜（暖水净，捣） 细辛 玄明粉 马牙消（烧）各等分

【用法】上药各修事，细绢罗过，后入乳钵中，研极细。每用时以手拨开眼敷之，又以扇子搨之，频用。

【主治】眼病冲风泪出。

32621 当术散

【方源】《产宝诸方》

【组成】苍术不拘多少（炒黑色，为末） 当归少许

【用法】每服二钱，酒一盏，煎至七分服。

【主治】妇人产后，败血冲心。

32622 当归丸

【方源】《外台》卷七引深师方。

【组成】桔梗二分 葶苈子（熬）五分 藜芦（炙）二分 厚朴（炙）五分 杏仁五十个（去尖皮） 附子（炮）五分 桂心 人参各三分 沙参三分 特生礞石一两（烧半日）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以饮送下，一日三次。稍加之。

【主治】心腹劳强，寒疝邪气往来，坚固结聚，苦寒烦悁，不得卧，夜苦汗出，大便坚，小便不利，流饮在腹中，食不生肌。

【宜忌】忌猪肉、生葱、冷水。

32623 当归丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】当归 葶苈 附子 吴茱萸 大黄各二两 黄芩 桂心 干姜 牡丹 芍药各一两半 细辛 秦椒 柴胡 厚朴各一两六铢 牡蛎（一方无） 甘草各一两 虻虫 水蛭各五十个

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、以酒送下，一日二次。

【主治】女人脐下症结刺痛，如虫所啮，及如锥刀所刺，或赤白带下十二疾，腰背疼痛，月水或在月前，或在月后。

【宜忌】有胎勿服之。

32624 当归丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】当归 芍药各四两 虻虫 乌头 丹参 干漆各一两 人参 牡蛎 土瓜根 水蛭各二两 桃仁五十个

【用法】上为末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以酒送下，一日三次。

【主治】妇人腰腹痛，月水不通利。

32625 当归丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】黑丸（原书同卷）、蜀椒丸（《圣济总录》卷一七七）。

【组成】当归九铢 吴茱萸（一作杏仁） 蜀椒各半两 细辛 干姜 附子各十八铢 狼毒九铢 豉七合 巴豆十个

【用法】上九味，捣八种下筛，称药末令足，研巴豆如膏，稍稍纳末，捣令相得，蜜和，桑杯盛，蒸五升米饭下，出，捣一千杵。一月儿服如黍米一丸，日一夜二。不知稍加，以知为度。

【主治】小儿胎寒嘔啼，腹中痛，舌上黑，青涎下；亦治水癖。

【备考】《圣济总录》本方用法：一月儿服如黍米大一丸，早晨、晚后各一服；一岁儿两丸；三岁至五岁儿服五丸，并用米饮送下。

32626 当归丸

【方源】《千金》卷八。

【组成】当归八两 天雄六两 干姜 酸枣仁各八两 黄耆 地骨皮各七两 芍药 干地黄各六两 桂心 防风 附子 白术各五两 甘草 厚朴 秦艽各四两 大枣二十个 吴茱萸五合 秦椒叶四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，以酒送下，一日二次。

【功用】补脾安胃，调气止痛。

【主治】脾虚寒，身重不举，言音沉鼓，厉风伤痛，便利无度。

32627 当归丸

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《婴童方》。

【组成】当归 人参 芍药 芎各三分 甘草四分

【用法】上为末，乳汁和。先食服麻子大一丸，一日三次。未知，加之。

【主治】小儿胎寒，大便青，不能食。

32628 当归丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】当归一两（锉，微炒） 赤茯苓三分 枳实一两（麸炒微黄） 桂心三分 川大黄半两（锉碎，微炒） 巴豆十个（去皮心，研，纸裹，压去油）

【用法】上为末，入巴豆令匀，炼蜜为丸，如小豆大。每服二丸，食前粥饮送下。以利为度。

【主治】留饮宿食，心下伏痛，四肢烦疼。

32629 当归丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归一两半（锉，微炒） 鳖甲半两（涂醋，炙令黄，去裙襖） 琥珀半两 牡丹半两 桃仁一两（去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄半两（锉碎，微炒） 菴闾子半两 牛膝半两（去苗） 赤芍药半两 芍药半两 桂心半两 虻虫三分（炒微黄，去翅足） 水蛭三分（炒令黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心热酒送下。

【主治】妇人经络涩滞，致有瘀血在脏，结聚欲成癥块。

32630 当归丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归二两（锉，微炒） 硃砂一两半（别研） 桂心一两 没药一两 蓬莪术二两

【用法】上为末，用好醋一大盏，银器内，以慢火熬硃砂成膏，入药末和丸，如梧桐子大。每服十丸，空心及晚食前醋汤送下。

【主治】妇人血气不和，心腹冷痛。

32631 当归丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】当归二两（锉，微炒） 琥珀一两 菴蒿子一两 益母草半两 吴茱萸一两（汤浸七遍，炒令黄） 桂心一两 秦椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 牛膝一两（去苗） 水蛭半两（炒微黄） 芎藭一两 延胡索一两 没药一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前温酒送下。

【主治】妇人月水每来，脐下疔痛，如锥刀所刺，及腰背疼痛。

32632 当归丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】当归一两（锉，微炒） 鳖甲一两（涂醋，炙微黄，去裙襕） 川大黄一两（锉碎，微炒） 白术三分 胡椒半两 诃梨勒皮三分 槟榔三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 草拔半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】妇人带下五色，腹痛，羸瘦食少。

32633 当归丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】当归三分（锉，微炒） 人参三分（去芦头） 白芍药二分 芎藭三分 甘草半

两（炙微赤，锉） 白术半两

【用法】上为末，以面糊和丸，如麻子大。每服五丸，以粥引送下，每日三次；三岁以上，加丸数服之。

【主治】①《圣惠》：小儿冷热不调，大便青黄，心腹多痛，不欲乳食。②《婴童百问》：小儿黄疸，脾弱痿黄、小便清，冷热不调，大便青黄，心腹多痛；或腹中气满；或时呕逆，不吮乳食。

32634 当归丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】当归半两（锉，微炒） 黄连一分（去须，微炒） 龙骨一分 人参一分（去芦头） 没石子二个（微煨） 鹿角灰一分 豆豉一分（炒微焦）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，以粥饮研下，不拘时候。

【主治】小儿赤白痢，腹痛不止。

32635 当归丸

【方源】《普济方》卷三三五引《养生必用》。

【组成】人参 当归 大黄（湿纸裹，三升米下蒸米熟，去纸切，焙） 桂心 瞿麦穗 赤芍药 白茯苓各三两 葶苈（炒黄，研）一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，空心米饮送下。

【主治】妇人经脉不利即为水，水流走四肢，悉皆肿满，名曰血分。

32636 当归丸

《局方》卷九。为《千金》卷四“大补益当归丸”之异名。见该条。

32637 当归丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】当归（切，焙） 杜仲（去粗皮，炙） 丹参 郁李仁（去皮尖双仁） 赤芍药 石斛（去根）三分 牛膝（酒浸，切，炮） 酸枣仁 防风（去叉） 槟榔（煨，锉）各一两 草薢一两半 桂（去粗皮）半

两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下。

【主治】中风，腰脚不随，骨节痠疼，筋脉拘急，行履稍难。

32638 当归丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】当归(切，焙)一两 白术二两 楝实(煨，取肉)一两 干姜(炮) 桂(去粗皮)各半两 附子(炮裂，去皮脐)一两 木香半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心。食前艾汤送下，一日三次。

【主治】肾中寒，脐腹冷疼，腰肋拘急。

32639 当归丸

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】当归(切，焙) 黄连(去须，炒)各三分 乌梅肉(炒干) 阿胶(炙燥)各半两

【用法】上为末。熔蜡为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温粥饮送下。日午再服。

【主治】白脓及诸痢。

32640 当归丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【异名】神效丸(《袖珍》卷一)。

【组成】当归(锉，炒) 黄连(去须) 乌梅(去核，焙)各一两

【用法】上为粗末，以生蒜汁和，众手丸如梧桐子大，焙干。每服三十丸，空心煎厚朴汤下。加至五十丸。

【主治】休息痢。

32641 当归丸

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】当归(切，焙)半两 胡椒(炒)一两 黄连(去须) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)各二两 阿胶(炙燥)一两(别为末) 干姜(炮)一两半

【用法】上除阿胶外，为末，用好醋调阿胶

为膏和剂，丸如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，食前橘皮汤送下。

【主治】冷痢里急后重。

32642 当归丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】当归(切，焙)半两 大黄(锉，炒)一分 干姜(炮裂) 桂(去粗皮) 玄参 芍药 蜀椒(去目及闭口者，炒出汗) 杏仁(去皮尖双仁，炒)各半两 细辛(去苗叶)一分 人参一分 白茯苓(去黑皮)一分 黄芩(去黑心)一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下，一日三次。

【主治】虚劳，脾胃不调，寒热羸瘦，饮食不消，不长肌肉。

32643 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】当归四两 青盐二两

【用法】先以水洗当归，乘润用青盐渗遍，搁在高处，三日取下，去盐，以当归暴干为末，滴水为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】一切风刺，面上生无名疮疖，因饮酒食炙煖物得之。

32644 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【异名】当归没药丸(《妇人良方》卷四)、当归灵没丸(《医级》卷九)。

【组成】当归(切，焙)一两 没药(研)半两 五灵脂(锉)一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，温酒或生姜汤送下，空心、食前服。

【主治】①《圣济总录》：妇人血风血气，腹肋刺痛，不思饮食，筋挛骨痹，手足麻木，皮肤瘙痒。②《医级》：妇人血瘀腹痛、胁痛。

32645 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切，焙)一两半 鳖甲(去

裙 阑, 醋炙) 琥珀 (研) 芎藭 桃仁 (去皮尖双仁, 炒黄, 研) 牛膝 (酒浸, 切, 焙) 水蛭 (糯米炒令焦) 各一两 虎杖 桂 (去粗皮) 大黄 (一半生, 一半炒) 柴胡 (去苗) 各半两 虻虫 (炒令色黄) 牡丹皮 各二分 麝香 (研) 半分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心用薄荷酒送下; 乌梅汤下亦得。

【主治】妇人风劳气疾, 经脉不通, 渐加羸瘦, 不思饮食, 心腹胀满, 遍身疼痛。

32646 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归 (切, 焙) 二两半 芍药 地榆 (炙, 锉) 卷柏 (用叶) 桂 (去粗皮) 白龙骨 (煨) 鹿茸 (酒浸, 去毛, 炙) 人参 蒲黄 (炒) 阿胶 (炙燥) 白术 厚朴 (去粗皮, 生姜汁炙) 石斛 (去根) 各一两 枳壳 (去瓢, 麸炒) 二两 熟干地黄 (焙) 三两 白茯苓 (去黑皮) 一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸至三十丸, 温酒送下, 一日三次。

【主治】妇人月水不断, 或多或少, 四肢烦倦, 身体瘦悴。

32647 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归 (切, 焙) 一两 干漆 (炒烟出) 芎藭各半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 温酒送下。

【主治】室女月水不通。

32648 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归 (切, 焙) 二两 槟榔 (生锉) 赤芍药 牡丹皮 延胡索各一两

【用法】上为末, 醋煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服二十丸至三十丸, 空心温酒送下, 日晚再服。

【主治】室女气血不和, 月水欲来, 先攻少

腹刺痛。

32649 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】当归 (切, 焙) 芍药 吴茱萸 (汤洗, 焙干, 炒) 大黄 (煨, 锉) 干姜 (炮) 附子 (炮裂, 去皮脐) 细辛 (去苗叶) 牡丹皮 芎藭各半两 虻虫 (糯米炒) 水蛭 (糯米炒) 各七十个 桂 (去粗皮) 三分 厚朴 (去粗皮, 生姜汁炙) 桃仁 (汤浸, 去皮尖双仁, 研) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 加至三十丸, 空心、食前温酒送下。

【主治】妇人血积脐下结块, 痛如锥刺, 或下赤白, 月水不调, 腰背痛。

32650 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】当归 (切, 焙) 延胡索各一两 没药 (研) 麒麟竭 硃砂 (研) 各三分

【用法】上为末, 合研匀, 用狗胆为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 加至二十丸, 醋汤或温酒送下。

【主治】妇人虚冷血气, 及血积隐隐疔痛, 血块攻筑疼痛。

32651 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】当归 (切, 焙) 生干地黄 (焙) 泽兰 (取叶) 各二两 防风 (去叉) 黄耆 (锉) 续断 桂 (去粗皮) 各一两 人参 地骨皮 芍药各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 温酒或米饮送下, 不拘时候。

【主治】产后血气不调, 日渐羸瘦, 肢节烦疼, 面无颜色。

32652 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】当归 (锉, 炒) 白术 甘草 (炙, 锉) 各一两半 桂 (去粗皮) 人参各三分 桑根白皮 (锉) 干姜 (炮) 细辛 (去苗

叶)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下，一日三次。

【主治】①《圣济总录》：产后血痢，结涩疴痛。②《普济方》引《大全良方》：利后诸疾不减。

32653 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】当归(切，焙)半两 蜀椒(去目及闭口者，炒出汗)一分 附子一个(炮裂，去皮脐) 杏仁十二个(汤浸，去皮尖双仁，麸炒) 狼毒(锉，炒)半分 巴豆二十个(去皮心，研烂，出油尽) 豉(微炒) 细辛(去苗叶)各一分

【用法】上为末，炼蜜和杵，以瓷器盛之，每用旋丸。未百日儿，服如麻子大一丸，温水送下，一二岁儿二丸，早晨只一服。以利为度。

【主治】小儿胎寒，羸啼惊痛，虚胀不嗜食，大便青或夹脓；并治诸痛证。

32654 当归丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】当归二两(锉碎) 水蛭(好者，炒)三十个 桃仁(去皮尖)三十个(炒，研)

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十粒，以酒送下。未知，加至三十粒。

【主治】留血滞于腰间，致血沥腰痛，痛如锥刀所刺，大便黑色，小便赤黑，脉涩者。

32655 当归丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】当归(去芦) 芍药各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。米饮汤送下，不拘时候。

【主治】小儿肠胃冷袭而痛，啼哭不休。

32656 当归丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】苍术八两(米泔浸一宿，炒黄) 陈

橘皮(去白)六两 前胡四两 荆芥穗三两 高良姜三两(炒) 蓬莪术三两(锉碎，醋炒) 当归(洗，焙)三两 干熟地黄(洗，焙)三两 白芍药二两半 蒲黄二两(纸上炒) 干姜二两(炮) 甘草二两(炙) 刘寄奴二两 泽兰叶二两 木香一两半

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。空心服五十丸，温酒或盐汤送下。

【主治】妇人脾虚血弱，冲任不和，腹胁刺痛，月事不通，赤白带下，腰脚痠疼，四肢无力，上攻头目，致多昏晕，时发寒热，多困少食；产前伤冷，胎气不安；产后血虚，腹胁痠痛；及一切血气之疾。

32657 当归丸

【方源】《癰疽萃英》引张元素方。

【组成】当归半两 甘草一钱 黄连 大黄各二钱半

【用法】先将当归熬膏子，入药末三味为丸。渐加服之，以利为度。

【主治】癰疹、痘疹、疥癣等病热滞中阻，大便秘结者。

①《癰疽萃英》：癰疹大便实秘，能饮食而内实。②《医学纲目》：小儿痘疮大便秘。③《玉机微义》：伤寒癰见，无大热，脉虚，秘闷。④《医学入门》：疥疮血热便秘，及痘疹已出，声哑喘急，便秘等证。

【备考】《医学正传》本方用法：上先以当归熬成膏子，以下三味研为细末，以膏和为丸，如胡椒大。三岁以下儿十丸，七八岁儿二十丸，食前清米饮送下。渐加至以利为度。

32658 当归丸

【方源】方出《百一》卷十三，名见《普济方》卷三〇九。

【组成】当归 赤芍药 川椒(去目) 败龟壳 千金藤 骨碎补 川芎(并生用) 乳香(研) 虎骨(慢火炮黄) 没药(研) 自然铜(火煅通红，醋淬三次)各等分

【用法】上为细末，炼好黄蜡为丸，如弹子大。每服一丸，筋伤骨折用无灰酒半升入药，

以东南柳枝搅匀同煎三五沸，空心热服。五十以上不过十服，旬日如旧；五十以下不过五服。

【功用】接骨定疼。

【主治】打扑伤损，筋伤骨折。

32659 当归丸

【方源】《百一》卷十九引滁州丁医方。

【组成】芫花（未开者，及时采取，晒干摘去枝梗）

【用法】用和淡米醋或康醋浸药面上，醋高一指，隔宿取出控起，带醋于铁铤内以慢火炒之，不住手搅拌，水脉断即以碗器盖之，候冷倾出，著底焦者不用，洗过铤子揩净再炒香熟，焙干为细末，却以先浸药醋打硬糊为丸，如粟米大。每服三二十丸，米饮送下，不拘时候，一时许再进。脏腑必动，不过利一两行即止，甚快而无所损。若去脾胃停滞，见效欲速，即用砂糖水或紫苏汤送下。打糊醋须澄清者用，或少却添别醋不妨。丸时，更作一等，如绿豆大者。治大人酒食所伤，丸数斟量所患，随虚实服之。脏腑既动，当以白粥补之。

【主治】小儿积滞，肠胀食伤等疾。

【宜忌】忌甘草。

【备考】本方名当归丸，但方中无当归，疑误。

32660 当归丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】赤石脂（煨，别研） 当归（去芦，酒浸一宿） 牡丹皮 人参（去芦） 延胡索（蛤粉炒） 白术（炒） 白芍药 甘草（炒） 白茯苓（去皮） 白薇（去芦） 川芎 白芷（炒） 藁本（去土） 官桂（去粗皮，不见火） 没药（别研） 乳香（别研） 各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食前温酒化下。

【主治】妇人气血俱虚，经候过多，羸瘦，全不思食，身体倦疼。

32661 当归丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】当归 香附子（炒） 杜蒺藜 芍药各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服三五十丸，米饮送下。

【主治】湿痹，腰脚大不伸，伛偻蹙蹙而行。

【备考】先以涌泄，再用本方。

32662 当归丸

【方源】《普济方》卷三三二引《济生》。

【组成】当归 赤芍药 川芎 熟地黄 黄耆 京三棱各半两 神曲 百草霜各二钱半

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前水送下。

【主治】妇人月经不调，血积证。

32663 当归丸

【方源】《袖珍》卷一引《济生》。

【组成】当归（去芦，酒浸） 芍药 附子（炮） 白术 干姜（炮） 厚朴（姜制） 阿胶（蛤粉炒） 各一两 乌梅肉二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心，用米饮送下。

【功用】《杏苑》引《济生》：补中散寒，收涩止脱，行滞气，厚肠胃。

【主治】下焦虚寒，下痢纯白，或滑利不禁，腹痛不止，手足冷者。

①《袖珍方》引《济生》：冷留肠胃，下痢纯白，腹痛不止。②《得效》：冷痢凄清，肠鸣，所下纯白，腹痛不止，手足冷者。③《杏苑》引《济生》：下焦积冷，阳气虚脱，滑利不禁。

【备考】按：《杏苑》引《济生》有炙草七钱。

32664 当归丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】当归 芍药（炒） 白鸡冠花（炒） 陈槐花（炒） 各等分

【用法】上为细末，青蒿根煮汁为丸。米饮

送下。

【主治】酒毒下血。

32665 当归丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】生犀 人参 白术 当归 芍药 木香 茯苓 丁香 牛膝(酒炒) 苡蓉 天麻各半两 脑麝少许

【用法】上为末，好酒三升，生羊胆一个，熬成膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，麝香酒送下。

【主治】头疼脑虚，眼目昏矇。

32666 当归丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】当归 川芎 赤芍药 广茂 熟地黄 京三棱各半两 神曲 百草霜各二钱半

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前用温水送下；温酒亦得。

【主治】妇人经血不调，血积证。

32667 当归丸

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】何首乌八两 草乌四两 苦参八两 赤土三钱半 荆芥四两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，温酒送下。

【主治】诸般疮疥。

【备考】本方名当归丸，但方中无当归，疑脱。

32668 当归丸

《普济方》卷二九八。即《直指》卷二十二“芎归丸”。见该条。

32669 当归丸

【方源】《普济方》卷三二二。

【组成】当归 石斛(去根) 柏子仁 紫石英(煨，醋淬七次) 鹿茸 鳖甲(醋炙)各二两 卷柏叶一两 川牛膝(酒洗)一两半

【用法】上和前药末，膏子为丸服。

【主治】妇人血海虚损，荣卫不足，多至潮热心烦，口干喜冷，腹肋刺痛，腰腿疼痛，痰

多喘嗽，惊悸怔忡，经候不调，或闭断不通。

【加减】虚寒者，加炮附子二两；咳嗽者，加紫菀茸二两。

32670 当归丸

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】当归(锉，微炒) 芎藭 赤芍药 苦楝子 硃砂(细研)各一两 蒲黄半两

【用法】上为末，以醋熬硃砂如饴为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】产后腹痛。

32671 当归丸

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】当归(切，焙)半两 黄连(去须) 龙骨 人参各一分 无食子(炮)二个 鹿角(镑) 豉(焙)各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。空心、午后每服五十丸，温米饮送下。

【主治】小儿赤白痢不止，腹痛。

32672 当归丸

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】当归半两 大黄 桂心各三钱 赤芍药 葶苈各二钱 人参一钱 甘遂半钱

【用法】炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心米饮化下。

【功用】《景岳全书》：行血利水通大便。

【主治】腰疽，因水湿所触，经水不行而致肿痛者。

32673 当归丸

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】当归半两 黄连一钱半(炒) 大黄二钱半 甘草(炙)一钱 紫草三钱

【用法】先以当归、紫草熬成膏，以下三味研为细末，以膏和为丸，如胡椒大。三岁以下儿服十丸，七八岁儿服二十丸，食前米饮送下，渐加，以和为度。

【主治】①《痘疹心法》：痘疹大便坚，三五日不通者。②《张氏医通》：小儿热入血分，大便秘结，三五日不通。

32674 当归丸

《葆光道人眼科龙术集》。即原书“秘传黄

耆丸”去黄耆加当归。见该条。

32675 当归丸

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】当归 15 克 川芎 7.5 克 白芍 9 克 生地 3 克 熟地 9 克 防风 6 克 白芥子 6 克 荆芥 6 克 首乌 12 克 玉竹 12 克 黄耆 15 克 甘草 3 克

【用法】上为末。炼蜜为丸，每丸 9 克。早、晚各服一丸。

【功用】养血润燥，益气祛风。

【主治】慢性荨麻疹，银屑病，瘙痒症，皮肤干裂，皮肤萎缩等，属于血燥，症见皮肤干燥，鳞屑，皲裂或萎缩，瘙痒，无热象，脉细，舌淡红者。

32676 当归汤

【方源】《外台》卷二十五引廩丘公方。

【组成】当归一两 生姜八两 大枣二十个

【用法】以水四升，煮取一升半，分作三服。不愈，复作之。

【功用】止诸痛。

【主治】三十年下痢。

32677 当归汤

【方源】《千金》卷十三注文引《小品方》。

【组成】当归 芍药 厚朴 半夏各二两 桂心 甘草 黄耆 人参各三两 干姜四两 蜀椒一两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升二合，分四服，羸劣人分六服。

【主治】心腹绞痛，诸虚冷气满痛。

【加减】大冷，加附子一个。

32678 当归汤

【方源】《鬼遗·附录》。

【组成】当归二两 甘草一两 芎藭一两 芍药一两 地榆三两

【用法】以水五升，煮取三升。洗之，日三夜一。

【主治】①《鬼遗·附录》：妇人阴蚀。②《普济方》：妇人由心神烦郁，胃气虚弱，气

血流滞，致生阴蚀疮，亦名墨疮，或痛或痒，如虫行状，淋漓脓汁，阴蚀几尽，少阴脉数而滑者。

【备考】《千金》有蛇床子一两，无芎藭。

32679 当归汤

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】当归三两 芍药二两 干地黄三两 生艾一把 甘草一两 胶四两(炙) 生姜一两 橘皮二分

【用法】上切。以水一升，煮得三升，去滓，纳胶令烊，分四服。

【主治】妊娠七八月，腰腹痛，胎不安，汗出逆冷，饮食不下，气上烦满，四肢痹僵。

32680 当归汤

【方源】《外台》卷七引《延年方》。

【组成】当归三两 桔梗二两 吴茱萸三两 桂心三两 芍药二两 大黄二两

【用法】上切。以水六升，煮取二升三合，去滓，纳鹤虱一两搅，温一沸，分三服，空腹服之，微利为度。

【主治】心痛，冷痛，腹满如锥针刺，及虫啮心痛。

【宜忌】忌猪肉、生葱。

32681 当归汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】当归二两 生姜五两 芍药二两 羊肉一斤

【用法】上咬咀。以水八升，煮羊肉熟，取汁煎药得三升，适寒温，服七合，一日三次。

【主治】①《千金》：妇人寒疝，虚劳不足，产后腹中绞痛。②《普济方》：卒疝，腹痛里急。

32682 当归汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】当归三两 干姜 白术各二两 芎藭二两半 甘草 白艾(熟者) 附子各一两 龙骨三两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取二升，去滓，分三服，一日令尽。

【主治】产后下痢赤白，腹痛。

【宜忌】《妇人良方》引《千金》：忌猪肉、冷水、桃、李、雀肉、毒物。

【方论选录】《千金方衍义》：产后气血两亏，加以下痢，脾肾俱惫，艾附、术附、姜附协力复阳，当归、芍药温养其血，至于龙骨敛固其津，甘草调和其气，并缓附子之性，一举而两得之也。

32683 当归汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】当归 芍药 黄芩 芍药 甘草 各二两 生竹茹二升

【用法】上咬咀。以水一斗，煮竹茹，取六升，去滓，纳诸药，煎取三升半，分三服。

【主治】崩中去血虚羸。

【宜忌】忌劳动嗔怒，禁百日房事。

【方论选录】《千金方衍义》：方下虽主崩中去血虚羸，必竟血虚火旺，火能消物，所以羸瘦。方用芍、归、芍药专行和血，甘、芩、竹茹专清胃热，然惟始病用之为宜。若久因虚羸，当非此方可治也。

32684 当归汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】当归 干姜 芍药 阿胶各二两 黄芩三两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取二升，分三次服。

【主治】①《千金》：衄血吐血。②《普济方》：引《圣惠》：衄血吐血不止，心胸疼痛。

【方论选录】《千金方衍义》：阿胶主心腹内崩，归、芍归诸经之血，干姜、黄芩以和标本之寒热也。

32685 当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】当归 茯苓各五分 黄耆 紫菀 各四分 高良姜 干姜各六分 肉苁蓉 鹿茸 桂心 昆布 橘皮各三分 甘草二两 桃仁一百个 地骨皮 法曲 大麦蘖各一升 乌头一两 大枣四十个。

【用法】上咬咀。以水一斗五升，煮取四升二合，分为五服。

【主治】虚冷腹痛，不下饮食，食复不消，臌胀。

【加减】下利，加赤石脂、龙骨各三分；渴加麦门冬一升。

32686 当归汤

《千金》卷十三。为《外台》卷七引《小品方》“茱萸汤”之异名。见该条。

32687 当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】当归 吴茱萸 桂心 人参 甘草 芍药 大黄各二两 茯苓 枳实各一两 干姜三两

【用法】上咬咀。以水八升，煮取二升半，分三服，一日三次。

【主治】冷气胁下往来，冲胸膈痛，引胁皆闷，及尸疰。

32688 当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】当归二两 甘草 柑皮各二两 附子一两 干姜四两

【用法】上咬咀。以水八升，煮取二升，分三服，一日三次。

【主治】久寒疾，胸腹中痛，时下痢。

32689 当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】当归 桂心各三两 干姜四两 附子五两

【用法】上咬咀。以水八升，煮取二升，分三服，一日三次。

【主治】久寒宿疾，胸腹中痛，短气，时滞下痢。

32690 当归汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】当归 人参 桂心 黄芩 甘草 芍药 芒消各二两 大黄四两 生姜 泽泻 各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】留饮宿食 不消，腹中积聚。

【宜忌】《普济方》：忌生葱、海藻、菘菜。

【方论选录】《千金方衍义》：中气式微不能输运，而致癖积留著，水道不利，故用参、甘、归、芍平调血气，消、黄、姜、桂攻理痰积，黄芩、泽泻分利支河水道，而通壅阻之热也。

32691 当归汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】当归 干姜 干地黄 柏枝皮 小蓟 羚羊角 阿胶各三两 芍药 白术各四两 黄芩 甘草各二两 蒲黄五合 青竹茹半升 伏龙肝一鸡子大 发灰一鸡子大。

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮取三升半，去滓，下胶取烊，次下发灰及蒲黄，分三服。

【主治】三焦虚损，或上下发泄，吐唾血，皆从三焦起，或热损发，或因酒发。

32692 当归汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】当归 独活各三两 白芷 地榆皮 矾石各二两（熬）

【用法】上咬咀。以水一斗五升，煮取一斗二升，以洗浴之。

【功用】《千金方衍义》：散血消肿。

【主治】妇人产后脏中风，阴肿。

32693 当归汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】当归 桂心 甘草（炙）各二两 芍药各三两 干地黄四两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取五升，分为五服。

【主治】产后血留下焦不去。

32694 当归汤

【方源】《千金翼》卷二十四。

【组成】当归 干姜 桂心 甘草各三两（炙） 糖八两 牡丹 白芷 附子（炮） 芍药 人参各二两 干地黄四两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升二合，去滓，纳糖令消，分为四服。

【主治】诸痔去血过多，气息憊憊，不下食，或腹痛牵引下部。

32695 当归汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】当归 橘皮 细辛 甘草（炙） 生姜各四分 大黄八分（别渍） 鹤虱二分

【用法】上切。以水六升，煮取二升，分温三服，如人行四五里进一服。不利未愈，三日更作服之。

【主治】心腹搅结痛不止，仍似有蛔虫者。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生菜。

32696 当归汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】当归八分 青木香六分 槟榔十个（碎） 麝香一铢（研）

【用法】上切。以小便一大升半，煮取六大合，绞去滓，下麝香末，分三次温服，每服相去如人行四五里。微微利。

【主治】恶疮撮肋连心痛。

【宜忌】忌生菜、热面、猪犬肉、粘食、蒜、陈臭物。

32697 当归汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】当归 桔梗 芍药各八分 厚朴十分（炙） 橘皮八分 人参六分 高良姜十分 桃仁五十个（去皮尖） 生姜八分

【用法】上切。以水八升，煮取二升五合，去滓，分三次温服，每服相去如人行六七里。

【主治】心痛癥块硬筑，心气欲绝。

【宜忌】忌猪肉 生冷、油腻、鸡、鱼、粘食、小豆、大蒜。

32698 当归汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】当归 茯苓 桔梗 橘皮 高良姜 槟榔各八分 生姜八分

【用法】上细切。以水七升，煮取二升三合，绞去滓，分三次温服，每服相去如人行六七里。服讫，利三两行，宜停后服。

【主治】卒心腹痛，气胀满，不下食。

【宜忌】忌猪肉、酢物、生冷、油腻、鱼、蒜、粘食、小豆。

32699 当归汤

【方源】方出《医心方》卷二十一引《广济方》，名见《圣济总录》卷一五一。

【异名】甘草饮《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归 甘草各八两 芍药 茯苓 桂心各十二分

【用法】以水六升，煮取二升，绞去滓。分三次温服，每服相去如人行六七里。

【主治】①《医心方》引《广济》：月水腹痛。②《圣济总录》：妇人月水不调，血气攻刺，脐下疔痛，不可忍；或室女月经不行，腹中疔痛。

【宜忌】忌生冷、海藻。

32700 当归汤

【方源】《经效产宝》卷中引《经效方》。

【组成】当归 桂心 芎藭 橘皮 生姜 吴茱萸各二两 芍药三两

【用法】以水三升，煮取一升，空心服。

【主治】产后气虚，冷搏于血，血气结滞，上冲心满胀。

【备考】《医方类聚》引《产宝》有槟榔仁二两。

32701 当归汤

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《济阴纲目》卷八。

【组成】甘草（炙） 当归 芎藭 人参 阿胶各二两 葱白（切）一升

【用法】以水七升，煎取二升，分为三服。

【功用】安胎止痛。

【主治】胎动冲心，烦闷欲死。

【备考】《济阴纲目》本方用法：上锉细，以水二升，煎四味至升半，去滓，下葱再煎，减三合，入阿胶温服，一剂分为二三服。

32702 当归汤

【方源】《幼幼新书》卷十四引《婴童方》。

【组成】当归 桂心 甘草（炙） 黄芩 芍药 人参 干姜各一两 大黄三两

【用法】上切。用水三升，煮一升，去滓，下芒消一两，再煎两三沸，三百日儿服半合。量加減，利为度。

【主治】小儿伤寒发热，服解肌汤不除者。

32703 当归汤

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《婴童方》。

【组成】当归 黄芩 甘草 芎藭 黄连 各一分 细辛 干姜各二分半

【用法】上切。用水二升，煮八合，温服半合，每日三次。

【主治】小儿吐衄。

32704 当归汤

【方源】方出《圣惠》卷五十九，名见《普济方》卷二一一。

【组成】当归一两（锉，微炒） 黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】冷热气不和，腹痛，下痢不止。

32705 当归汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】当归一两 甘草一两 赤芍药一两 葛根一两 细辛 黄柏各一两 麻黄一两（去根节） 苦参一两 白芷一两 肉桂一两 汉椒一两 防风一两（去芦头）

【用法】上锉细焙干，分为四度。每度以水五升，煎取三升，温暖洗疮，汤冷即住，用热巾拭，宜用别膏贴之。

【主治】痈疽发背，先穿破，出脓水不住。伤外风，毒焮肿疼痛。

32706 当归汤

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归二两 顽荆二两 藁本二两 蔓荆子二两 白芷二两 芎藭一两 丁香皮一两

【用法】上为散。每度用药三两，入盐半匙，葱白一握，浆水一斗，煎十余沸渐添。淋熨痛处，每日二次用之。

【功用】通和血脉，止痛。

【主治】伤折车碾，落马蹉跌，筋脉俱伤，疼痛不可忍。

32707 当归汤

《普济方》卷三二六引《圣惠》。为《千金》卷三“当归洗汤”之异名。见该条。

32708 当归汤

《圣济总录》卷八。为《千金》卷八“仓公当归汤”之异名。见该条。

32709 当归汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】当归（切焙） 白芷 防风（去叉） 白鲜皮 白术 芎藭 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 甘草（炙，锉） 甘菊花 天雄（炮裂，去皮脐）各一两 人参半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，加生姜半分（切），煎至一盏，去滓，与食相间温服，日三夜一。

【主治】中风手足偏枯，口面喎斜疼痛，一目不能合。

32710 当归汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】当归（切，焙） 桑耳 萆薢 牛膝（酒浸，切，焙） 射干各一两半 芎藭 附子（炮裂，去皮脐） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两 桂（去粗皮） 干姜（炮裂） 陈橘皮（去白，炒）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入生姜一枣大（切），煎至八分，去滓温服。

【主治】风冷留著，腰膝疼痛。

32711 当归汤

《圣济总录》卷十三。为《圣惠》卷六“当归散”之异名。见该条。

32712 当归汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】当归（切，焙） 防风（去叉） 黄耆（细锉）各二两 柴胡（去苗）八两 细辛（去苗叶） 麻黄（去根节，煮一二沸，掠去沫，控干） 人参各一两 杏仁（去皮尖

双仁，炒黄）五十个 桂（去粗皮）三两 半夏（汤浸去滑七遍）五两 黄芩（去黑心）一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏，加生姜七片，大枣二个（擘破），同煎至六分，去滓温服，日三夜二，不拘时候。

【主治】肺痹上气，闭塞胸中，胁下支满，乍作乍止，不得饮食，唇干口燥，手足冷痛。

32713 当归汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】当归（切，焙） 黄连（去须，锉，炒） 黄柏（去粗皮） 地骨皮各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，下蜜一合，搅匀，食前温服。

【主治】伤寒时气后，下痢不止。

32714 当归汤

《圣济总录》卷二十七。为方出《肘后》卷二，名见《千金》卷九“甘草汤”之异名。见该条。

32715 当归汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】当归（切，焙） 代赭（研） 黄连（去须）各三分 桑根白皮（锉，焙） 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 黄芩（去黑心）各半两 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 木通（微炙，锉） 地榆各一两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）二十个

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒后夹劳，羸瘦盗汗，寒热不常，喘咳痰唾，饮食减少。

32716 当归汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】当归（切，炒） 升麻 知母 萆薢 黄芩（去黑心） 麦门冬（去心，焙）各半两 桂（去粗皮） 芍药 干姜（炮） 石膏 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉） 白

术各一两 麻黄(去根节)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】伤寒后，咽喉闭塞，疼痛六七日，其人大下后，脉沉迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉痛不利，唾脓血，泄利不止。

32717 当归汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】当归(切，焙)三两 桂(去粗皮) 甘草(炙)各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱中冷，心腹痛。

32718 当归汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】当归(切，焙) 桂(去粗皮) 吴茱萸(汤洗，焙干，炒)各三两 细辛(去苗叶) 木通(锉) 甘草(炙) 干姜(炮)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞，酒半盞，加大枣二个(去核)，煎至一盞，去滓温服。

【主治】霍乱呕哕，手足冷。

32719 当归汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】当归(去芦头) 桂(去粗皮)各一两 甘草(生，锉)半两 干姜(生，锉)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加大枣二个(擘破)，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】心中寒，腹痛。

32720 当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】当归(切，焙) 人参 干姜(炮) 白茯苓(去黑皮) 厚朴(去粗皮，生姜汁涂，炙) 木香 桂(去粗皮) 桔梗(炒) 芍药 甘草(炙，锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】暴冷心腹痛，头面冷汗出，霍乱吐下，脉沉细；及伤寒冷毒，下清水；及赤白带下。

32721 当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】当归(切，焙) 高良姜 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)各一两半 桃仁六十个(去皮尖双仁，麸炒，研) 桂(去粗皮)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】冷热相击，心腹卒痛不可忍。

32722 当归汤

《圣济总录》卷五十七。为《外台》卷七引张文仲方“当归大黄汤”之异名。见该条。

32723 当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】当归(切，焙)二两 白术 干姜(炮) 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 人参各一两 青橘皮(汤浸，去白，焙) 甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风冷内积，腹胀肠鸣疔痛。

32724 当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】当归(切，焙) 枳壳(去瓢，麸炒) 赤芍药 槟榔(锉) 木香 桔梗(炒) 附子(炮裂，去皮脐) 白术各一两 河黎勒(煨，用皮)一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盞，加生姜半分(切)，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】寒气入客，胸胁引痛。

32725 当归汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】当归三两 桂(去粗皮)六两 麦门冬(去心)一两半 大黄(锉，炒)一两 茵陈蒿 黄芩(去黑心) 黄耆 干姜

(炮) 赤茯苓(去黑皮) 芍药 黄连(去须) 石膏(碎) 人参 甘草(炙) 各二两 (一方无黄耆)

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞。加大枣两个(擘破)，煎取七分，去滓温服，每日三次。

【主治】诸疽久不愈，变成黑疽。

32726 当归汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】当归(切，焙) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 阿胶(炙燥) 芍药(炒) 各一两 甘草(炙，锉) 半两 黑豆(炒) 一合 干姜(炮) 赤茯苓(去黑皮) 各三分 乌梅(去核，炒) 二两

【用法】上细锉。每服三钱匕，水一盞，煎取七分，去滓温服。

【主治】赤白痢，疼痛不止。

32727 当归汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】当归(切，焙) 防风(去叉) 甘草(炙) 远志(去心) 猪苓(去黑皮) 茯神(去木) 桂(去粗皮) 黄耆(锉细) 人参 芎藭 白术 芍药 熟干地黄(焙) 各半两 五味子一分 酸枣仁(汤浸，去皮，炒) 三兩

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，加大枣三个(擘破)，生姜一枣大(拍碎)，同煎至七分，去滓，空腹服，夜卧再服。

【主治】虚劳惊恐虚烦，不得眠睡。

32728 当归汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】当归(切，炒) 干姜(炮) 赤芍药 黄耆 蜀椒(去目并闭口，炒出汗) 半夏(为末，姜汁作饼，暴干) 人参 青橘皮(汤浸，去白，炒) 附子(炮裂，去皮脐) 甘草(炙，锉) 各一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 二两 桂(去粗皮) 半两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心疝，心痛，虚冷烦闷。

32729 当归汤

《圣济总录》卷九十四。为《金匱》卷上“当归生姜羊肉汤”之异名。见该条。

32730 当归汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】当归(切，焙) 一两 桔梗(锉，炒) 一两半 陈橘皮(去白，微炒) 桂(去粗皮) 人参各半两 赤芍药三分 鹤虱(去土，微炒) 二分 槟榔(炮，锉) 一分，朴消(别研) 三分

【用法】上除朴消外，为粗末，入朴消拌匀。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心服，后半时辰再服。

【主治】蛔虫心痛，心中如锥刺，时吐白虫。

32731 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】当归 细辛(去苗叶) 桂(去粗皮) 甘草(生用) 各半两 矾石(生用) 一分

【用法】上为粗末。每用五钱匕，以水二盞，煎十余沸，去滓，热漱冷吐，一日三五次。

【主治】牙齿风痛不止。

32732 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】当归(焙干) 一两 桂(去粗皮) 甘草(炙) 各半两 矾石一分(熬枯)

【用法】上为粗末。每用三钱匕，水一盞，煎五七沸，去滓，热漱冷吐，一日两三次，即愈。

【主治】酒后，牙齿血涌出。

32733 当归汤

《圣济总录》卷一三〇。为《圣惠》卷六十二“黄耆散”之异名。见该条。

32734 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】当归(切，焙) 二两半 甘草(炙，锉) 一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，空心、午时、夜卧各

一次。

【主治】风肿。

32735 当归汤

《圣济总录》卷一四三。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

32736 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】当归(切,焙)四两 大黄(生,锉)二两 生干地黄(焙)五两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至七分,去滓温服,不拘时候。微利为效。

【主治】从高坠堕,伤损肢体,发热疼痛。

32737 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】当归(切,焙) 大黄(锉,炒) 白芷 防风(去叉) 乌头(炮裂,去皮脐) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤折皮肉破裂,风毒攻,肿痛不消。

32738 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】当归(切,炒) 芎藭各二两 熟干地黄(焙)四两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】倒仆蹴损,筋骨疼痛。

32739 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】当归(切,焙) 黄耆(锉) 牛膝(酒浸,切,焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 芎藭 羌活(去芦头) 人参 附子(炮裂,去皮脐) 芍药 木香 槟榔(锉) 桔梗(锉,炒) 牡丹(去心) 沉香(锉) 甘草(炙,锉) 地骨皮 半夏(生姜汁浸,炒) 各一两 桂(去粗皮) 蓬莪茂(煨,锉) 陈橘皮(汤浸,去白,炒) 各一两半 柴胡(去苗) 熟干地黄(焙) 荆芥穗 鳖甲(去裙襕,醋炙) 各二两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水

一盞,加生姜三片,乌梅一个,同煎至七分,去滓温服。

【主治】妇人血风,身体百节疼痛,乍寒乍热,经脉不利,日渐羸瘦。

32740 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】当归(切,焙)二两 麻黄(去节煎,掠去沫,焙)六两 桂(去粗皮)二两 芎藭一两 黄芩(去黑心)半两 干姜(炮)一两 杏仁(去皮尖双仁,炒)四十个 石膏(碎)三两半 甘草(炙,锉)二两

【用法】上为粗末。每用六钱匕,以水三盞,煎取一盞半,去滓,分二次温服。

【主治】妇人中风,不能语,不知痛处,拘急不得转侧。

32741 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切,焙) 甘草(炙,锉) 桂(去粗皮) 木贼 大黄(锉炒) 京三棱(炮,锉) 各一两 威灵仙(去土) 生干地黄(焙) 王不留行 槟榔 延胡索 代赭(煨,醋淬) 天雄(炮裂,去皮脐) 鳖甲(去裙襕,醋炙) 各一两半 红蓝花(炒)三分

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人月水不利,脐下撮痛,食减羸劣。

32742 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切,焙) 牛膝(酒浸,切,焙) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒黄) 牡丹皮 大黄(锉,炒) 各一两半 芎藭 土瓜根 赤芍药 朴消 桂(去粗皮) 各一两 虻虫(去翅足,糯米同炒米熟,去米) 水蛭(微炒) 各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盞,煎至六分,去滓温服,日再夜一。

【主治】妇人月候不调,或一月再来,或隔

月不来,或多或少,脐下疔痛,面色萎黄,四体虚羸,不能饮食。

32743 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切,炒) 红蓝花 延胡索 紫葳各一两 琥珀半两(研) 牡丹皮 姜黄 牡蛎 鬼箭羽各三两 麒麟竭各一两 桃仁(去皮尖双仁,麸炒) 菴蒿子 藕节(切,焙) 没药(研) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,酒半盞,同煎至七分,去滓,空心、食前温服。如无牡蛎亦得。

【主治】妇人经水不通,腰腹刺痛,拘倦少力,呕吐恶心,怠惰多睡,头旋眼涩,日渐羸瘦,饮食减少。

32744 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切) 芎藭 桂(去粗皮) 牡丹皮 牛膝(酒浸,切,焙) 芍药(赤者) 延胡索 麦蘖(炒)各半两 没药 琥珀各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盞,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妇人血涩不行,心忪肌热,腰重腹痛。

32745 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(微炙) 生干地黄(微炒) 防风(去叉) 山茱萸 黄耆(微炙,锉) 牛膝(去苗,酒浸,焙)各一两 枳壳(去瓢,麸炒黄) 白术(炒) 人参 甘草(炙微赤,锉) 羚羊角屑 芍药各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎七分,去滓,食前温服。

【主治】妇人月水来,腹内疔痛,或脐下如盘。

32746 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】当归(切,焙) 赤芍药(锉,炒)各一两半 禹余粮(醋淬五七遍) 麒麟竭 黄柏(微炙,锉) 地榆(锉碎,炒)各一两 生干地黄(焙)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎七分,去滓温服,每日三次,不拘时候。

【主治】妇人经血下不止,脐下虚痛。

32747 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】当归(焙)半两 柏叶一两 薤白六茎(切) 禹余粮三分(煨,醋淬三遍,研末)

【用法】上先将三味咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,下禹余粮末一钱匕,去滓,空心温服。

【主治】妇人下血不止,腹痛。

32748 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归(炙香,锉) 生干地黄(焙) 艾叶(炒) 甘草(炙,锉)各一两 芎藭 芍药(锉,炒) 阿胶(炙令燥)各三分 人参二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】妊娠因惊,胎动不安。

32749 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【异名】当归芎藭汤(《鸡峰》卷十七)。

【组成】当归(锉,炒) 芎藭 侧柏(焙) 阿胶(炒令燥) 桑上寄生(锉碎) 艾叶(炒) 淡竹茹 续断各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,枣二个(擘),同煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】妊娠胎动,内结疼痛,血下运闷。

32750 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归(切,焙) 芎藭各半两 艾叶(炒)一分 苎麻根 鹿角胶(炒燥)各

三分

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞半，入葱白三寸（切），同煎八分，去滓，空心、食前温服。

【功用】安胎。

【主治】妊娠胎动，腰痛下血。

32751 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归（切，焙） 甘草（炙，锉） 干姜（炮） 芎藭各一两 白术二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，入大枣三个（擘破），同煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】妊娠胞中虚，胎不荣长，致令萎燥。

32752 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归（切，焙） 桂（去粗皮） 干姜（炮） 木香各半两 草豆蔻（去皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 白术 熟干地黄（焙）各一两 芎藭三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，加大枣二个（去核），煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠心腹引痛。

32753 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归（切，焙） 麦门冬（去心，焙） 芎藭 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙）各一两 大蓟（去根） 柴胡（去苗）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜五片，大枣三个，煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠心腹气攻疼痛。

32754 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归（切，焙） 甘草（炙，锉）各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

加大枣二个（擘），煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠心腹疼痛。

32755 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】当归（切，焙） 芍药 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉） 梔子仁各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至八分，去滓温服。

【主治】妊娠子淋，涩痛烦闷。

32756 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】当归（切，炒） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两半 木通（锉） 滑石（研）各二两 冬葵子（炒）二合 瞿麦穗一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服。未下再服，以下为度。

【主治】妊娠堕胎，胞衣不出。

32757 当归汤

《圣济总录》卷一五九。为方出《千金》卷四，名见《局方》卷九“芎藭汤”之异名。见该条。

32758 当归汤

《圣济总录》卷一五九。为张文仲引《徐王方》（见《外台》卷三十三）“神验胎动方”之异名。见该条。

32759 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】桂枝加芍药当归汤（《云岐子保命集》卷下）、当归散（《普济方》卷三五七）、桂枝芍药当归汤（《准绳·伤寒》卷七）。

【组成】当归（切，焙） 芍药（锉） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：产后胞衣不下。②《云岐子保命集》：妇人怀孕伤寒，脉浮头重、自利，腹中切痛。

32760 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归（洗，切，微炒） 芎藭 桃

仁(去皮尖双仁,炒) 大黄(略炮,锉) 桂(去粗皮) 芍药 牡丹皮各半两

【用法】上为粗末,分作三剂。每剂用水五盏,生姜五片,大枣五个(擘),同煎取三盏,去滓放温,时服一盏。

【主治】产后恶血下少,气逆,头目眩晕,眼花心闷,头重不举。

32761 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归(切,炒)半两 芎藭 芍药 桂(去粗皮) 生干地黄(微炒)各一分 牛膝(去苗,酒浸,切,焙) 独活(去芦头) 刘寄奴各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜五片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后败血不尽,冲心迷闷,旋晕不语。

32762 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归(切,焙) 人参 芍药 酸枣仁(去皮) 黄芩(去黑心) 白鲜皮 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后血气不调,言语谬乱。

32763 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归(切,焙)一两半 芍药一两半 桂(去粗皮)一两 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒黄)四十九个

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后恶血不尽,腹内坚痛,不可忍。

32764 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归(切,焙)三两 桂(去粗皮)二两 荷叶蒂三七个

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水半盏,

酒一盏,加生姜三片,同煎至七分,去滓温服,早晨、日晚各一服。

【主治】产后恶露不尽。

32765 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】当归(切,炒) 干漆(炒烟透) 棕榈(烧灰) 红蓝花 甘草(炙) 鲤鱼皮(烧灰) 白芍药 牡丹(去心) 紫葳各半两 芫花(醋浸半日,炒干焦色) 香墨各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加葱白三寸,生姜三片,水、酒共一盏,同煎至七分,去滓,稍热服。

【主治】产后血气血块攻冲,心腹痛。

32766 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】当归(切,焙)二两 大黄(锉,微炒) 干姜(炮)各一两 吴茱萸(炒) 雄黄(研)各半两 桂(去粗皮) 芍药 甘草(炙) 细辛(去苗叶) 生干地黄(焙)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,羊脂一枣大,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,角弓反张,筋急疼痛。

32767 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】当归(切,炒)二两 干姜(炮)半两 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 芎藭各一两半(锉)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎七分,去滓,空腹食前温服。

【主治】产后霍乱吐利,心腹痛。

32768 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】当归(切,焙) 芍药 木通(锉)各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,入生地黄二寸许(切碎),同煎至八分,去滓

温服，不拘时候。

【主治】产后虚烦腹痛。

32769 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】当归（切，焙） 黄耆（锉） 芍药各一两半 桂（去粗皮） 芎藭 甘草（炙） 人参 柴胡（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，羊肉汁一盞，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血虚，肢体壮热，烦闷，困瘁不食。

32770 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】当归（切，炒）一两半 芍药 吴茱萸（汤淘去涎，轻炒）各二两 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙令赤） 白芷各一两 生干地黄（焙）二两 桂（去粗皮） 续断 芎藭 干姜（炮裂）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食前温服，日二夜一。

【主治】产后虚羸不足，脏腑虚冷，肢体疼痛，时或恶露，脐腹刺痛。

32771 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】当归（切，炒） 犀角屑 黄芩（去黑心）各一两 黄连（去须）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，脐腹撮痛。

32772 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】当归（锉，炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙令香） 黄连（去须）各一两半 肉豆蔻（去壳）五个（炮） 甘草（炙，锉）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】产后下痢赤白，腹痛烦热。

32773 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】当归（切，焙） 酸石榴皮（炒） 地榆各三两 大豆黄（炒）五合 糯米（炒）二合 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，入薤白二寸（切），同煎至八分，去滓，空心，食前温服。

【主治】产后下痢赤白。

32774 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】当归（切，焙）一两 白芷（锉，微炒） 紫葛 芎藭各半两 白茅根 胡荽各三分

【用法】上锉细。每服五钱匕，水一盞半，加葱白五寸，同煎至八分，去滓，食后夜卧温服。

【主治】产后小便秘涩，小腹疼痛。

32775 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】当归（切，焙） 白术 人参 黄耆（锉）各一两 诃黎勒（煨，去核）半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至三分，去滓，分温二服，不拘时候。

【主治】小儿胃虚，血气不充，凶陷。

32776 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】当归（切，焙）半两 柴胡（去芦头）三分 黄芩（去黑心）半两 细辛（去苗叶）三分 大黄（锉，炒）一两 升麻半两 五味子半两 紫菀（去苗土）一两 牛黄（研）一分 杏仁二十个（汤浸，退去皮尖双仁，炒，别研）

【用法】上为粗末。二三岁儿，每服一钱匕，以水七分，煎至五分，去滓温服，每日三次。

【主治】小儿挟实温壮，惕惕微惊。

32777 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】当归（切，焙） 龙骨（研）各半分 甘草（炙）三分 大黄（锉，炒） 芍

药 干姜(炮) 石膏(碎) 桂(去粗皮) 赤石脂 黄芩(去黑心) 细辛(去苗叶) 各一分

【用法】上为粗末。五岁儿，每服一钱匕，水一小盏，入枣二个(擘)，同煎至五分，去滓，分二次温服，一日三次。

【主治】小儿诸痢。

【加减】服后泻者，加赤石脂一分；若有热惊者，加黄芩(去黑心)半两。

32778 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】当归(切，焙) 人参 干姜(炮) 木香各三分 桃白皮(炙，锉) 槐白皮(炙，锉) 丁香 阿胶(炒燥) 甘草(炙，锉) 各半两 龙骨 黄连(去须) 各一两 麝香(研) 一分

【用法】上将前十一味为粗末，与麝香和匀。一二岁儿，每用半钱匕，水一小盏，煎至四分，去滓，分二次温服。

【主治】小儿久患疳痢。

32779 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】当归(切，焙) 赤芍药 鳖甲(醋炙，去裙襖) 柴胡(去苗) 大黄(锉，炒) 甘草(炙) 各一分 桃仁(去皮尖双仁，麸炒) 半两

【用法】上为粗末。五六岁儿，每服半钱匕，水半盏，煎至三分，去滓温服，每日三次。

【主治】小儿疟疾，身体壮热憎寒，发作有时。

32780 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【异名】当归饮(《普济方》卷三九六)。

【组成】当归(切，焙) 黄连(去须) 赤石脂 干姜(炮裂) 龙骨 酸石榴皮(微炙) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙，锉) 各三分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，煎至五分 去滓，分二次温服，每日一次，食

前服。

【主治】小儿冷痢。

32781 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】当归(切，焙) 甘草(炙，锉) 芎藭 远志(去心) 麦门冬(去心，焙) 芍药 赤茯苓(去黑皮) 各二两 生干地黄(焙) 四两 黄芩(去黑心) 桂(去粗皮) 各一两 五味子三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，先以水五盏，入白羊肾一个(去筋膜，切)，煎至三盏，去肾下药，加生姜一枣大(拍碎)，大枣三个(擘破)，更煎至二盏，去滓，空心、食前分二次温服。

【主治】乳石发后，虚热羸乏，胸膈痞滞，心腹胀满，或腰痛肾沥。

32782 当归汤

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】当归 白芍药 人参各一分 甘草(炙) 半分 桔梗 陈皮(不去白) 各一分

【用法】上为细末。水煎半钱，时时少与服。

【主治】小儿夜啼，脏寒腹痛，面青手冷，不吮乳。

32783 当归汤

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】当归 续断 干姜 麦门冬 芎藭 桂各三两 白芍药 吴茱萸各四两 黄耆 甘草 香白芷各二两 熟地黄六两

【用法】上为粗末。水、酒各半盏，煎药二钱，至七分，去滓服，不拘时候。

【功用】大补中下虚弱。

32784 当归汤

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】小蓟根六两 当归 阿胶 续断 青竹茹 芎藭各二两 生地黄八两(用熟者) 地榆 釜下焦土各四两 马通一升(以水调取汁)

【用法】上为粗末。每服四钱，水八分，马

通汁三分，同煎至五分，滤去滓，空心温服，用大盏频服三四剂。未愈止，服续断地榆煎。

【主治】妇人忽暴崩中，出血不断，或如鹅鸭肝者。

32785 当归汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】陈皮 当归 熟地黄 白芍药各一两 阿胶 桃胶 赤茯苓各三分 人参 芒消 香附子各半两 甘草一分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓温服。

【主治】劳淋，小便淋沥疼痛，不可忍者。

32786 当归汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地 人参 茯苓 白术 甘草 麦冬 黄耆 川断 黄芩 陈皮 香附 砂仁

【功用】养气益脾。

【主治】妊娠五月胎不安。

32787 当归汤

【方源】《三因》卷十一。

【组成】当归 干姜(炮) 熟地黄 柏皮 小蓟 羚羊角(镑) 阿胶(炒)各三钱三字 白术 芍药各半两 黄芩 甘草(炙)各一分

【用法】上锉散。每服三钱，水二盞，竹茹一块如指大，煎至八分，去滓，入伏龙肝半钱匕，头发灰半钱匕，蒲黄半钱匕，又煎至七分，不拘时候服。

【主治】三焦虚损，或上下发泄，吐唾血，皆从三焦起，或因热损发，或因酒发。

【备考】按：《得效》本方用当归、干姜(炮)、熟地黄、柏皮、小蓟、羚羊角(镑)、阿胶(炒)各三两三字、芍药半两、黄芩、甘草(炙)各一分

32788 当归汤

《三因》卷十八。为《圣惠》卷八十一“当归散”之异名。见该条。

32789 当归汤

【方源】《洁古家珍》。

【异名】保命当归汤(《原机启微》附录)。

【组成】当归身二钱 黄连(酒洗) 黄芩各二钱 生地黄三钱(酒洗，阴干) 炙甘草三钱 柴胡一两 白芍药二钱

【用法】上咬咀。水煎，临卧服。

【功用】补益肾水。

【主治】肝肾阴虚，风热上攻，瞳子散大，眼黑，或生翳膜。

①《洁古家珍》：瞳子散。②《原机启微》附录：风热上攻，瞳子散大。③《普济方》：肾虚，眼黑，瞳子散。④《准绳·类方》：翳及瞳子散大。

【备考】《原机启微》附录生地黄作熟地黄。

32790 当归汤

【方源】方出《百一》卷十五引郑媪方。名见《普济方》卷二一五。

【组成】淡竹叶 灯心 当归(去芦) 红枣 竹猥绥 麦门冬(并根苗用) 乌梅 甘草 木龙(又名野葡萄藤)各等分

【用法】上药或多少亦不妨，煎汤作熟水，患此疾者多渴，随意饮之。

【主治】血淋及五淋等疾。

【备考】方中竹猥绥，《普济方》引《百一》作竹葳蕤，《准绳·类方》作竹园蓂。

32791 当归汤

《妇人良方》卷六。为《活人书》卷十九“柴胡当归汤”之异名。见该条。

32792 当归汤

《妇人良方》卷十二。为《圣惠》卷七十七“当归散”之异名。见该条。

32793 当归汤

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】当归 矾石 桂心 细辛 甘草各一两

【用法】上咬咀。以浆水五升，煮取三升，含之，每日五六次，夜二三次。无细辛，水煎亦可。

【主治】酒醉，牙齿涌血出；及齿风痛。

32794 当归汤

【方源】《普济方》卷二三〇。

【组成】秦艽(去苗土) 当归(二味用醋、酒浸经宿,焙) 人参 干漆(炒烟) 白茯苓(去黑皮) 白术各半两 前胡(去苗) 鳖甲(去裙襕,醋炙)各一两 木香 乌头(泡裂,去皮脐) 甘草(炙,锉)各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱,水一盞半,加小麦五十粒,同煎取一盞,去滓,稍热服。

【主治】虚劳寒热,四肢羸瘦,不思饮食。

32795 当归汤

【方源】《普济方》卷二四八。

【组成】当归(锉,微炒) 干姜(炮裂,炒) 甘草(炙微赤,锉)各半两 黄耆(锉) 人参(去芦头) 川椒(去目及闭口,微炒出汗) 半夏(汤洗七次,去滑) 青橘皮(汤浸,去白瓢,炒) 附子(炮裂,去皮脐)各一两 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香) 桂心半两

【用法】上为散。每服三钱,水一中盞,加生姜半分,煎六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】寒疝心痛,及诸虚冷气满闷。

32796 当归汤

《普济方》卷二八九。为《圣惠》卷六十一“淋洗当归汤”之异名。见该条。

32797 当归汤

【方源】《普济方》卷三三四。

【异名】当归散。

【组成】当归(切,焙) 赤芍药(锉,炒)各一两半 禹余粮(淬五七次) 麒麟竭 黄柏(微炙,锉) 地榆(锉碎,炒)各一两 生姜 生地黄(焙)一两(一方用熟干地黄)

【用法】上为粗末。每于食前服一钱,粥饮调下,每日三次。

【主治】妇人经血不止,脐腹疼痛。

32798 当归汤

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】川独活 当归 芍药 防风 川

芎 玄参各一两 桂心二分半(一方用天麻二分)

【用法】上锉细。以水八升,煮取二升半,为三服。觉效更作一剂渐愈,须适寒温将息。如不愈,即以此方作丸,每服二十丸。

【主治】产后中风,半身手足不遂,言语謇涩,恍惚精神不定。

【加减】有热,加干葛五两;有冷,加白术五两;有气,加生姜六分;手足不遂,加牛膝五分、草薢二两、黄耆四两;腹痛,加当归、芍药各三分;不食,加人参四分、玄参四分。

32799 当归汤

《普济方》卷三五一。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

32800 当归汤

《普济方》卷三五一。为《产科发蒙》卷四引《经效方》“当归柴胡汤”之异名。见该条。

32801 当归汤

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】当归 人参 生姜各二两(一方用三分) 黄耆三两 淡豉五合 猪肾一个 粳米一合 薤白三合

【用法】用水一斗五升,先煮猪肾取六升,后下诸药,煎至二升,分为三服。

【主治】产后虚劳,骨节疼痛,头痛,汗不出。

32802 当归汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】当归二分 豚卵一双(切细)(一本大枣二十个,大者)

【用法】以醇酒三升,煮取一升,为二服。儿小即用一卵。

【主治】少小惊痫壮热,中风四肢掣痲,舌吐沫。

32803 当归汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】当归 黄耆(炙) 生地黄 麦门冬 甘草 黄连(炒) 白芍 浮小麦

【用法】猪心，竹刀劈开，煮汤煎药服之。

【主治】痘疮收靥之后，盗汗出者。

32804 当归汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】人参 当归 甘草（炙） 黄耆（炙） 黄连（炒） 桂枝

【用法】水煎服。

【主治】痘疮收靥之后而盗汗者。

32805 当归汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】当归二钱（酒洗） 赤芍药（煨）一钱半 独活 防风 赤茯苓 黄芩 秦艽 各一钱 杏仁八分（去皮尖） 甘草六分 桂心三分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，不拘时候温服。

【主治】血痹、风痹等痹证。

①《准绳·类方》：痹证。②《证治宝鉴》：血痹，体常如风吹，汗出，卧则不能，摇动。③《证治汇补》：血痹者，邪入阴分，若被风吹，骨弱劳疲，汗出，卧则摇动。④《医级》：风痹血脉，筋痠热痛。

32806 当归汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】当归五钱 元参三钱 辛夷一钱 炒梔八分 贝母五分 柴胡三分

【主治】小儿鼻渊，由风入胆中，移热于脑，涕浓而臭，属实热证者。

32807 当归汤

【方源】《急救应验良方》引少林寺教师方。

【组成】当归五钱 泽泻五钱 川芎三钱 红花三钱 桃仁三钱 丹皮三钱 好苏木二钱

【用法】酒、水各一碗，煎六分服。虽已气绝，牙关紧闭，照白糖饮治法，擦开灌之亦活。

【功用】散瘀活血。

【主治】跌打损伤，未破口者。

【加减】头伤，加藁本一钱；手伤，加桂枝一钱；腰伤，加杜仲一钱；胁伤，加白芥子一钱；膝伤，加牛膝一钱。

32808 当归汤

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】当归二两 菊花一两 地丁一两

【用法】水煎服。四五剂即愈。

【主治】疗毒溃后。

【宜忌】白色阴疽忌用。

32809 当归饮

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】当归（焙） 防风（去叉）各三两 独活（去芦头） 麻黄（去根节，煎，掠去沫）各一两半 细辛（去苗叶）一两 附子一个（炮裂，去皮脐）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，酒半盏，水一盞，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】贼风口噤，角弓反张。

32810 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归（切，炒） 桂（去粗皮） 干漆（捣，炒令烟出）各一两 虻虫（去翅足，炒） 水蛭（糯米同炒米熟，去米） 芍药 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 藜蘆 甘草各一两 大黄三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，清酒一大盞，煎至六分，去滓，下芒消二钱，烱尽，再煎令沸，食后温服。

【主治】妇人寒气内搏，月水不通，腹中气满，结块寒热。

【备考】本方方名，《普济方》引作“当归散”。

32811 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归（微炙） 肉豆蔻（去壳） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙烟出） 甘草（炙） 芍药 枳壳（去瓤，麸炒黄） 白茯苓（去黑皮） 人参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】妇人月水不调，及欲来脐下痛，肢体烦热。

32812 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归（切，焙） 人参 生姜（切）各七钱 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两 大枣（擘破）五个

【用法】上锉，如麻豆大，分为二剂。每剂以水四盞，煎取一盞半，去滓，食前分二次温服，如人行三五里再服。

【主治】妊娠腹中冷，胎不安。

32813 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归（切，焙）一两 葱白（细切）一握

【用法】上拌匀。每服五钱匕，酒一盞半，煎至八分，去滓温服。

【主治】妊娠胎动，腹痛下血。

32814 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归（切，焙）一两 芎藭 阿胶（炙炮）各三分 白术二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】妊娠胎萎燥。

32815 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】当归（微炙）一两 鬼箭羽二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，酒一盞，煎至六分，去滓温服，相次再服。

【主治】产后血晕欲绝。

32816 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】当归散（《普济方》卷三四五）。

【组成】当归（切，焙） 牛膝（酒浸，切，焙） 苏枋木（锉） 桂（去粗皮） 牡丹皮（锉） 芍药 芎藭 艾叶（微炒） 生

干地黄（锉） 延胡索 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加生姜一枣大（拍破），水半盞，酒半盞，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后月内恶露不下。

32817 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】当归（切，焙） 败酱 续断各一两 芍药一两一分 生干地黄（焙）一两半 竹茹 芎藭各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】产后七八日，恶露下不绝。

32818 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】当归（切，焙） 防风（去叉） 桂（去粗皮） 人参 芎藭 玄参各一两 独活（去芦头）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，手足偏枯，言语迟涩，恍惚多忘。

32819 当归饮

【方源】《圣济总录》一六五。

【组成】当归（切，焙） 赤芍药 艾叶（炒） 地榆 白龙骨 黄耆（锉）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 黄芩（去黑心） 干姜（炮） 甘草（炙）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，脐下疼痛。

32820 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】当归（切，炒） 芍药 牡丹皮 生干地黄（焙） 人参 黄耆（锉） 大黄（生） 升麻 连翘各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后乳痈，欲结未结，发热肿痛。

32821 当归饮

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】当归（去芦，微炒） 熟地（净洗，酒蒸，焙干） 川芎 白芍 黄芩 白术各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水盏半，煎至八分，食前热服。

【功用】抑阳助阴，调理经脉。

【主治】阳气胜阴，月假多者。

32822 当归饮

【方源】《得效》卷五。

【异名】当归散（《赤水玄珠》卷七）。

【组成】苏木 生地黄 当归 大黄 赤芍药

【用法】上为末。酒调服，得利去瘀血即止，服养荣汤调理。

【主治】男子因打损负重，女子因劳苦用力而伤肺经，遇风寒则为咳嗽，或咳血，或至紫黑。

【备考】《赤水玄珠》本方用苏木、生地黄、当归、大黄、芍药各等分，为末，每服四钱，或水、酒煎服亦可。又原书治上症并配合灸肺俞穴。

32823 当归饮

【方源】《普济方》卷四〇一引《傅氏活婴方》。

【组成】当归 赤芍药 白术 甘草 桂皮各等分

【用法】上为末。每服一字。

【主治】小儿客忤，腹内有恶血，夜啼如鬼祟，腹痛，唇青口紫。

32824 当归饮

【方源】《急救仙方》卷四。

【组成】黄连 大麻子 当归各半两

【用法】上为末。每用一钱，嚼温酒下。又将通真丸一粒临卧再服。

【功用】通血积。

【主治】痔证。

32825 当归饮

《普济方》卷三九六。为《圣济总录》卷一七八“当归汤”之异名。见该条。

32826 当归饮

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】当归 白芍药 川芎 生地黄 白蒺藜（炒） 黄耆各一钱 防风 荆芥 何首乌（不见铁器） 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：妇人血风疮，血热瘾疹痒痛，脓血淋漓，发热等症。②《诚书》：疮疥风癣，湿毒燥痒。

【备考】《疡科捷径》有甘菊花。

32827 当归饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归一钱二分 芍药一钱 川芎五分 生地黄一钱 牡丹皮一钱 黄连（酒炒）七分 麦门冬（去心）二钱 地骨皮七分 酒黄芩七分 炒栀子六分 柴胡六分 生甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎，食远热服。

【主治】劳心生热，鼻少见血，五心烦热。

32828 当归饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】牛膝 蒲黄 当归 黄连 生地各二钱 麦冬（去心） 木通 扁柏叶（微炒） 山梔仁各一钱

【用法】加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】血淋。

32829 当归饮

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】当归 黄连 生地 熟地 郁金 杏仁 梔子 黄柏 赤芍

【用法】上分作两服，水煎，乘热洗眼。

【主治】目涩痛痒，羞明怕日。

32830 当归饮

【方源】《诚书》卷十六。

【组成】当归 白芍 人参各一分 甘草（炙）半分 桔梗 陈皮各一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿腹痛内吊，夜啼。

32831 当归饮

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】四物汤加白术 黄芩 地榆 阿胶

【主治】阳气乘阴，经血过多。

32832 当归饮

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】何首乌（制） 白鲜皮 白蒺藜 甘草 当归 生地黄 白芍药 人参 黄耆 川芎

【用法】水煎服。外用稻米粉扑之。

【主治】小儿因月份未足，出生太早，初生无皮，面白肢冷，遍体浸渍，红嫩而光。

32833 当归饮

【方源】《眼科菁华录》卷上。

【组成】当归 白芍 人参 甘草 滑石 柴胡 黄芩 川锦纹 生薏

【用法】水煎服。

【主治】热泪为患。

32834 当归贴

【方源】《外台》卷二十四引《古今录验》。

【组成】当归一分 蛭蟪一分 丹参一分 附子一分（炮） 蜡蜜一分 梔子十个 桂心一分 胶一分

【用法】上合煎，以贴疮上。

【主治】诸痈疮发背有脓血。

32835 当归贴

【方源】《千金翼》二十三。

【组成】当归（一作当陆） 黄芩 黄连 大黄 莽草 白芷 白敛 白及各二两

【用法】上为末。消胶汁稍稍和如泥，涂纸贴肿上。干则易之。

【主治】疮痈诸肿。

32836 当归饼

【方源】《圣济总录》一四一。

【组成】当归四两 杏仁（去皮尖双仁，研）半两 白芷 桂（去粗皮）各三分 芸蓂子（研）二两

【用法】上五味，三味为末。与杏仁、芸蓂子和匀，以醋面调，捻作饼子如钱大，坐之。药干频易，以愈为度。

【主治】牡痔有头，痛楚不可忍。

32837 当归酒

【方源】方出《外台》卷二十七注文引《肘后》，名见《景岳全书》卷五十三引《元戎》。

【异名】当归煎（《卫生鸿宝》卷一）、当归止血汤（《医方易简》卷六）。

【组成】当归四两 酒三升

【用法】煮取一升，顿服之。

【功用】《本草纲目》：和血脉，坚筋骨，止诸痛，调经水。

【主治】血不归经之小便出血、吐血、呕血及闪挫努力以致的血溢；血虚头痛欲裂。

①《外台》引《肘后》：小便出血。②《证类本草》引《外台》：头痛欲裂。③《景岳全书》引《元戎》：血虚头痛欲裂。④《外科全生集》：吐血多者。⑤《卫生鸿宝》：血不归经之吐血、呕血、及闪挫努力致血溢者。

【宜忌】《卫生鸿宝》：火升者忌服；血伤燥者慎用。

32838 当归酒

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】当归（炙令香，锉） 芍药（锉，炒）各二两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，以无灰酒一盞，加生地黄汁一合，于银器内，慢火煎至七分，去滓温服。以恶血下为度。

【主治】妊娠堕胎后，血不出。

32839 当归酒

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】当归（切，焙，粗捣）一分 猪肉一两（薄切小片）

【用法】上相和，以清酒一碗，煮至七分，去滓。每服取半呷许，令儿咽之，日三夜一。

【主治】小儿五十日以来，胎寒腹痛微热，聚唾弄舌，囟啼上视。

32840 当归酒

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】辣桂(去粗皮)半两 当归四钱
木香 白芷各二钱

【用法】上锉细。每服三钱半，醇酒一碗，慢火煎七分，加乳香末半钱，不饥饱温服，以排脓内补散、加味不换金正气散为佐，以熟饘、猪蹄、胛肉为养，养麦面能起发，可煮食之。如更不发起，用《局方》姜附汤加当归、木香、炙甘草煎服。又更不发起，用穿山甲(头截片，蘸醋，炒焦)、生人牙(煨留性)各一分，为末，分作两服，用辣桂、当归、去节麻黄煎酒，食前调下。患处用生姜汁和面厚涂，或用川乌、硫黄、人牙(煨)，并细末，酒调敷之。

【主治】痈疽阴证，头平向内，沉黯不疼，浑身患处不热。

32841 当归粉

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】当归(末) 胡粉各半两

【用法】上相和研匀。敷脐中，仍炙絮熨之，以啼呼止为候。

【主治】小儿脐疮，脐中水湿，肿赤汁出，时时啼呼。

32842 当归散

【方源】《金匱》卷下。

【异名】芍药汤(《永类铃方》卷十八)。

【组成】当归 黄芩 芍药 芎藭各一斤
白术半斤

【用法】上为散，每服方寸匕，酒饮调下，一日二次。

【功用】养血清热安胎。

①《鸡峰》：快利恶露。②《回春》：养血清热。③《成方便读》：安胎清热。

【主治】孕妇血少，有热，胎动不安，素有堕胎之患；月经不调，腰腹疼痛。

①《金匱》：妇人妊娠常服，即易产，胎无苦疾；及产后百病。②《鸡峰》：产后气血俱虚。③《永类铃方》：妊娠伤寒，五个月以前者。④《普济方》：腹痛。⑤《回春》：瘦人

血少有热，胎动不安，素惯半产者。⑥《叶氏女科》：天癸已过，经行不匀，三四月不行，或一月再至而腰腹疼痛者。

【方论选录】①《医方集解》：此足太阴，厥阴，冲任药也。冲任血盛，则能养胎而胎安。芎、归、芍药能养血而益冲任；又怀妊宜清热凉血，血不妄行则胎安；黄芩养阴退阳，能除胃热，白术补脾燥湿，亦除胃热；脾胃健则能运化精微，取汁为血以养胎，自无恶阻呕逆之患矣。②《金匱要略心典》：妊娠之后，最虑湿热伤动胎气，故于芎、归、芍药养血之中，用白术除湿，黄芩除热。丹溪称黄芩、白术为安胎之圣药。夫芩、术非能安胎者，去其湿热而胎自安耳。③《金匱要略方义》：本方用药，具安胎之常法。方中以当归、白芍养血益阴；配以川芎，又可调肝和血，使肝血充盈，肝气条达；复以黄芩清热，白术去湿，使湿去热清、血气调和，则胎元自安，母体无恙；且胎系于脾，白术更有健脾益胃之功，既实脾气以固胎，又助后天以培本，俾胎得其养。孕妇体壮，非但胎前安然，即产后亦少生诸疾。

【临证举例】堕胎 《古今医案按》：一妇人三十余，或经住，或成形未具，其胎必堕。察其性急多怒，色黑气实，此相火太盛，不能生气化胎，反食气伤精故也。因令住经第二月，用黄芩、白术、当归、甘草，服至三月尽，止药，后生一子。

【备考】本方改为丸剂，名“安胎丸”(见《回春》)、“五味安胎丸”(见《东医宝鉴·杂病篇》)。《鸡峰》本方用法：用温童便或酒调下二钱。

32843 当归散

【方源】《幼幼新书》卷七引《肘后方》。

【组成】当归(末之)小豆大

【用法】以乳汁咽之，日夜三四度。若不愈，当归半两，小豆卵一具，并切之，以酒一升二合同煮，取八合，服半合至一合，随儿大小，日三夜四。

【主治】小儿喜啼。

32844 当归散

【方源】《医心方》卷十一引《古今录验》。

【组成】当归二两 黄连二两 黄柏二两 干姜一两

【用法】上为末。每服方寸匕，以乌梅汁调下，一日三次。

【主治】下腹中绞痛，重下，下赤白。

【加减】腹中绞痛，加当归；下赤，加黄柏；重下，加黄连；白下，增干姜。

32845 当归散

【方源】《千金》卷三。

【异名】五味当归散（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】当归 黄芩各二两 芍药一两六铢 蟅皮半两 牡蛎二两半

【用法】上为散。酒服方寸匕，每日三次。

【主治】妇人阴脱。

【宜忌】①《千金》：禁举重。②《普济方》：忌登高。

32846 当归散

【方源】《千金》卷二十五注文引《救急方》

【异名】补损当归散（《局方》卷八，续添诸局经验秘方）。

【组成】当归 桂心 蜀椒 附子各二分 泽兰一分 芎藭六分 甘草五分

【用法】上并熬令香，为末。酒服方寸匕，每日三次。凡是伤损，皆服之十日愈，小儿亦同。

【主治】落马堕车，诸伤腕折臂，脚痛不止。

【宜忌】《局方》（续添诸局经验秘方）：忌海藻、菰菜、生葱、猪肉、冷水。

32847 当归散

【方源】《理伤续断方》。

【组成】泽兰十两 川当归十两 芍药白芷 川芎 肉桂（去粗皮）各五两 川续断十两 牛膝十两 川乌 川椒（去目）各三两 桔梗 甘草各四两 白杨皮（不用亦

可） 细辛五两

【用法】上为极细末。每服二钱，热酒调下，不拘时候。

【功用】续筋接骨。

【主治】打扑伤损，皮肉破碎，筋骨寸断，瘀壅滞结，肿不散，或作痈疽，疼痛至甚；因损后中风，手足痿痹，不能举动，筋骨缝纵，挛缩不舒，及劳役所损，肩背四肢疼痛。

32848 当归散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】当归汤（《圣济总录》卷十三）、当归人参汤（《圣济总录》卷四十九）。

【组成】当归半两（锉，微炒） 人参三分（去芦头） 桂心三分 干姜半两（炮裂，锉） 白术半两 白茯苓半两 甘草半两（炙微赤，锉） 芎藭半两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 细辛半两 白芍药半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】肺脏伤风冷，鼻中多涕，四肢疼痛，不思饮食。

32849 当归散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】当归 赤芍药 黄芩 伏龙肝 阿胶（捣碎，炒令黄燥）各一两 干姜半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒吐血，目眩烦闷。

32850 当归散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】当归半两（锉，微炒） 桂心一两 芎藭一两 干姜半两（炮裂，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱。以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒，脾胃虚冷，心腹胀痛，不思饮食。

32851 当归散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】当归一两(锉,微炒) 梔子仁一两 木香半两 犀角屑半两 豉一合 黄耆三分(锉) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,葱白三茎,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后未平复,合阴阳为易病,小腹里急疔痛,溺血,气力乏劣。

32852 当归散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】当归三分(锉,微炒) 子芩半两 葵子半两 车前子半两 榆白皮半两(锉)

【用法】上为散。每服二钱,用暖生地黄酒一小盏调下,不拘时候。

【主治】热病,小便不通,小肠中疼痛。

32853 当归散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】当归二两(锉,炒) 甘草一两(炙微赤,锉) 黄连二两(去须,微炒) 黄柏一两(微炙炒) 干姜一两(炮裂,锉) 阿胶二两(捣碎,炒令黄燥) 醋石榴皮二两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病热毒,痢下赤白,腹中疔痛。

32854 当归散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】当归一两(锉,微炒) 细辛一两 防风一两(去芦头) 桂心一两 独活二两 麻黄二两(去根节) 附子一两(炮裂,去皮脐) 芎藭一两 薏苡仁一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水、酒各半中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风痉,摇头口噤,身体强直。

32855 当归散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】当归一两(锉,微炒) 川升麻半两 川乌头半两(炮裂,去皮脐) 天门冬

一两(去心,焙) 五味子半两 赤芍药半两 远志半两(去心) 独活半两 麻黄一两(去根节) 防风半两(去芦头) 芎藭半两 干姜半两(炮裂,锉) 秦艽一两(去苗) 桂心半两 大豆一合(炒熟) 石斛半两(去根节) 甘草一分(炙微赤,锉) 人参半两(去芦头) 白茯苓二两 紫菀半两(洗,去苗土) 石膏一两 黄耆半两(锉) 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,入酒一合,更煎一两沸,温服,不拘时候。

【主治】风湿痹躄曳,或手脚不遂,或风入五脏,恍恍惚惚,多语喜忘,又时恐怖,或肢节疼痛,头眩烦闷,或腰脊强直,腹满不食。

32856 当归散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】当归三分 羚羊角屑三分 川乌头半两(炮裂,去皮脐) 黄芩半两 赤芍药半两 远志半两(去心) 独活三分 五味子半两 防风半两(去芦头) 芎藭半两 麻黄二两(去根节) 秦艽三分(去苗) 桂心半两 石斛半两(去根,锉) 人参半两(去芦头) 白茯苓半两 黄耆半两(锉) 五加皮三分 石膏一两 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】毒风痹曳,手脚不遂,身体缓弱,或风入五脏,精神恍惚,多语喜忘,有时恐怖,肢节烦疼,头眩心闷,腹满不食。

【宜忌】忌生冷,猪、鸡、犬肉,毒鱼,滑物。

32857 当归散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】当归一两 防风一两（去芦头）麻黄一两（去根节） 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 白茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 生干地黄一两 山茱萸一两 黄芩一两 桂心一两 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒中柔风，身体缓弱，四肢不收，烦热，腹内拘急，大小便涩。

32858 当归散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【异名】地龙散（《圣济总录》卷十）。

【组成】当归一两 桂心一两 地龙一两（微炒） 白僵蚕一两（微炒） 威灵仙一两 漏芦一两 芎藭一两 白芷一两

【用法】上为细散。每服二钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：白虎风，疼痛不止。②《圣济总录》：白虎风疼痛，游走无定。

32859 当归散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】当归二两（锉，微炒） 麻黄四两（去根节） 桂心二两 芎藭一两 海桐皮一两（锉） 干姜一两（炮裂，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 独活二两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风，四肢不仁，及不能语，但拘挛背痛，不得转侧。

32860 当归散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】当归 细辛 川升麻各半两 防风（去芦头） 藁本 莽草 芎藭各一分 白杨枝一两

【用法】上为散。每用五钱，以水一大盏，

煎至七分，去滓，热含冷吐。

【主治】牙齿宣露挺出，齿断，肿痛且痒。

32861 当归散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】当归 桂心 甘草各半两 白矾一两（烧令汁尽）

【用法】上为粗散，分为三度用。每度以浆水二大盏，煎至一盞，去滓，热含冷吐。

【主治】牙齿缝忽然出血。

32862 当归散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】当归二两 黄芩二两 干姜一两（炮裂，锉） 白芍药一两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服二钱，以生地黄汁调下。不拘时候。

【主治】吐血不止，心胸疼痛。

32863 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归一两（锉，微炒） 桔梗一两（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤芍药半两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 桂心一两 人参半两（去芦头） 槟榔二两 木香三分

【用法】上为细散，每服二钱，生姜、大枣煎汤调下，不拘时候。

【主治】九种心痛，及冷气攻两胁，胸背疼痛，欲吐。

32864 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归一两（锉，微炒） 桔梗一两（去芦头） 赤芍药一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 鹤虱一两 人参一两（去芦头） 桂心一两 槟榔二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】诸虫心痛，多吐不食。

32865 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归(锉,微炒) 干姜(炮裂,锉) 青橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 艾叶(炒令微焦) 白术 附子(炮裂,去皮脐) 厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 各一两 木香半两

【用法】上为散。每服二钱至三钱,水一中盏,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】冷气攻心腹痛,时复下利。

32866 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归(锉,微炒) 赤茯苓 桔梗(去芦头) 陈橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 人参(去芦头) 高良姜(锉) 槟榔 桂心 各一两 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙,微炒)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三枚,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】心腹痛,胁肋气胀满,食不下。

32867 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归(锉碎,微炒) 木香 槟榔 麝香(细研) 各一两

【用法】上为细散,入麝香研令匀。每服二钱,以童便一中盏,煎至五分,和滓温服,不拘时候。

【主治】恶疟,胁肋连心刺痛。

32868 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归一两(锉,微炒) 槟榔一两 青橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 赤芍药一两 桂心一两 干姜半两(炮裂,锉) 吴茱萸一两(汤浸七遍,焙干,微炒) 人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】冷气相引,心腹痛不可忍。

32869 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归一两(锉,微炒) 桂心一两 干姜三分(炮裂,锉) 红豆蔻一两(去皮) 木香一两 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】伤冷卒腹痛。

32870 当归散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】当归一两(锉,微炒) 赤茯苓一两 桔梗一两(去芦头) 青橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 高良姜一两(锉) 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心腹气滞,卒胀满,不下食。

32871 当归散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】当归一两(锉,微炒) 干姜一两(炮裂,锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 赤芍药一两 黄耆一两(锉) 川椒一两(去目及闭口者,微炒去汗) 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 半夏一两(汤洗七遍,去滑) 人参一两(去芦头) 桂心半两 青橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半斤,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】寒疝心痛,及诸虚冷气满闷。

32872 当归散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】当归一两(锉,微炒) 干姜半两(炮裂,锉) 羊肉半斤(细切) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 白术一两(锉) 茱萸半两

【用法】上除羊肉外,为散。以水五大盏,合煮取两大盏半,去滓,稍热服一小盏,不拘时候。

【主治】寒疝，心腹痛，不下饮食，痛甚引胁肋间及腹里急者。

32873 当归散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】当归二两（锉碎，微炒） 梔子仁一两 桃白皮二两 附子一两（炮裂，去皮脐） 赤芍药一两 蓬莪茂一两 桂心一两 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加豉五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中恶，心腹痛，胸胁短气。

32874 当归散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】当归三分（锉，微炒） 乱发灰一分 猪苓三分（去黑皮） 海蛤三分（细研） 汉防己三分 甘遂三分（煨令黄） 蒲黄三分 赤芍药三分

【用法】上为细散。每于食前服一钱，煎木通、葱白汤调下。

【主治】卒淋沥，小便痛涩。

32875 当归散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 乌梅肉二两（微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 干姜一两（炮裂，锉） 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎取六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】白痢，腹痛不止。

32876 当归散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 樗树皮一两（炙黄，锉） 黄连一两（去须，微炒） 地榆一两（锉） 艾叶一两（微炒） 酸石榴皮三分（烧灰） 阿胶三分（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】久血痢不止，腹中疝痛，面黄羸瘦。

32877 当归散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 地榆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤石脂二两 乌梅肉一两（微炒） 梔子仁半两 白术一两 黄芩一两 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】脓血痢，腹痛心烦，口干，不欲饮食。

32878 当归散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】当归二分 黄芩三分 地榆一两（锉） 黄连一两（去须，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 犀角屑一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热痢，下赤黄脓，腹痛烦热。

32879 当归散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】当归三分（锉，微炒） 木香半两 桂心三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 附子半两（炮裂，去皮脐） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为细散。每于食前服一钱，以粥饮调下。

【主治】气痔，肛肠疼痛。

32880 当归散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】当归一两 羊桃根一两（锉） 桂心半两 白薇半两 木香半两 丁香半两 榆白皮一两（锉） 汉防己一两

【用法】上为细散。用醋浆水调如膏，贴于肿上，干即易之。

【功用】止痛搜脓。

【主治】痈肿疽疮，热毒炽盛不散，已成脓

溃，疼痛不可忍。

32881 当归散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归一两（锉，微炒） 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 泽兰半两 芎藭一两 槟榔一两 甘草半两（炙微赤，锉） 川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】落马坠车诸伤，踉折，遍身疼痛。

32882 当归散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归三分（锉，微炒） 蒲黄半两 芸薹子半两 生姜汁一合 好酒五合 生地黄汁三合 膩粉一分

【用法】上为末。先煎生姜、地黄汁并酒等三两沸，然后都下药末，和调令匀，分为三服，每日空心服之。当转下腹内恶血了，便宜服补药。

【功用】下瘀血。

【主治】伤折。

32883 当归散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归一两（锉，微炒） 桂心一两 败蒲一两（烧灰） 没药一两半 赤芍药一两 骨碎补一两半 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，日三四服。

【主治】伤折疼痛，青肿滞血。

32884 当归散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】当归半两（锉，微炒） 川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 泽泻半两 芎藭一两 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，日三四服。

【功用】辟风，止痛。

【主治】金疮有折瘀血。

32885 当归散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】当归半两（锉，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉） 芎藭半两 肉苁蓉半两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 白芍药半两 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干微炒） 川椒一分（去目及闭口者，微炒去汗） 干姜一分（炮裂，锉） 桂心一分 白及一分 黄耆半两（锉） 厚朴半两（去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参半两（去芦头）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【功用】内补，止痛，生肌。

【主治】金疮去血，虚竭羸弱。

32886 当归散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 防风二两（去芦头） 羌活二两 麻黄一两半（去根节） 细辛一两 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，筋脉拘急，腰背反张，状如角弓，言语謇涩。

32887 当归散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】当归一分（锉，微炒） 赤芍药一分 芎藭二分 鬼箭羽一分 牛李子一分 木香一分 牡丹半两 延胡索半两 桂心半两 槟榔半分 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血风，气冲心烦闷，昏沉不能言语，腹内刺痛不可忍。

32888 当归散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】当归半两（锉，微炒） 虎胥骨半两（涂酥，炙令黄） 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 羚羊角屑半两 防风半两（去芦头） 草薢一两 牛膝半两（去苗） 羌活半两 芎藭半两 琥珀二分（细碎） 水蛭半两（炒令黄）

【用法】上为细散。每服二钱，以豆淋酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血风，身体骨节疼痛，筋脉拘急。

32889 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归三分（锉，微炒） 木香半两 京三棱一两（炮裂，锉） 槟榔三分 桂心半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妇人瘀癖，气攻心腹疼痛，不能饮食。

【宜忌】《准绳·女科》：虚人禁用。实者亦须以四君、四物汤药兼服乃可。

32890 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归一两（锉，微炒） 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襕） 芎藭半两 桂心一两 蓬莪茂三分 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 赤芍药三分 木香半两 槟榔一两 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 川大黄一两（锉，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妇人疝瘕及血气，攻刺心腹，疼痛

不可忍。

32891 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归三分（锉，微炒） 槟榔三分 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 桂心三分 蓬莪茂三分 白术三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妇人血气攻心痛，面无颜色，四肢不和。

32892 当归散

【方源】方出《圣惠》卷七十一，名见《普济方》卷三三五。

【组成】当归三分（锉，微炒） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干微炒） 桂心三分

【用法】上为细散。每服一钱，食前以生姜、热酒调下。

【主治】妇人血气攻心疼痛，及一切积冷气痛。

32893 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【异名】玄胡当归散、延胡索散（《景岳全书》卷六十一）、玄归散（《医级》卷九）。

【组成】当归半两（锉，微炒） 赤芍药半两 刘寄奴半两 没药 枳壳各半两（麸炒微黄，去瓤） 延胡索半两

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血瘀成积，小腹疔刺疼痛，四肢无力，不能饮食，或气逆腹胀，月经不行。

①《圣惠》：妇人久积血气，小腹疔刺疼痛，四肢无力，不能饮食。②《景岳全书》：气逆，月经不行。③《医级》：血瘀成积，小腹块硬疼痛，或气阻腹胀，切痛之极者。

【备考】方中没药用量原缺，据《普济方》补。

32894 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归三两(锉, 微炒) 赤芍药二两 黄耆二两(锉) 人参一两(去芦头) 蒺藜子二两(微炒, 去刺) 枳实二两(麸炒微黄) 鸡骨香一两 桂心一两 薏苡仁一两(微炒) 附子一两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为细散。每服一钱, 以温酒调下, 一日三次。

【主治】①《圣惠》: 乳痈, 肿硬如石, 疼痛。②《普济方》: 产后乳结核, 坚硬疼痛。

32895 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】当归三分(锉, 微炒) 甘草一两(锉) 川芒消一两 黄连三分(去须) 黄药三分 川大黄一两 蒲公英三分 玄参三分

【用法】上为细散。用鸡子白调为膏, 于生绢上涂贴。取效为度。

【功用】散毒气, 止疼痛。

【主治】妇人乳生结核, 疼痛。

32896 当归散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】当归半两(锉, 微炒) 延胡索半两 川大黄半两(锉, 微炒) 铅霜一分(细研) 桃仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 虻虫一分(炒令微黄, 去翅足) 木通三分(锉) 水蛭一分(炒微黄)

【用法】上为细散。铅霜同研令匀。每服一钱, 食前以温酒调下。

【主治】室女月水不通, 时作寒热。

32897 当归散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】当归半两(锉, 微炒) 刺薊叶三分 赤芍药半两 生干地黄一两 羚羊角屑半两

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】妇人小便出血, 或时尿血。

32898 当归散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】当归一两(锉, 微炒) 麒麟竭一两 禹余粮一两(烧醋淬七遍) 赤芍药一两 黄柏一分(微炙, 锉) 地榆三分(锉) 熟干地黄一两

【用法】上为细散。每服一钱, 食前以粥饮调下。

【主治】妇人漏下不止, 脐腹多痛。

32899 当归散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】当归二两(锉, 微炒) 木香一两 桂心一两 芎藭一两 鹿角胶一两(捣碎, 炒令黄燥) 干姜一两(炮裂, 锉) 龙骨一两 续断一两 附子一两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以热酒调下。

【主治】妇人白崩, 脾下疼痛不止。

32900 当归散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】当归(锉, 微炒) 白芍药 茯神 枳壳(麸炒微黄, 去瓤) 白术 鳖甲一两半(涂醋炙令黄, 去裙襖) 甘草(炙微赤, 锉) 各一两

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠患疟, 憎寒体颤。

32901 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】当归一两(锉, 微炒) 芎藭一两 黄芩半两 熟干地黄一两半 伏龙肝一两

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加淡竹茹一分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠劳热, 胎动不安, 下血, 腹痛不止, 心中烦闷。

32902 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】地榆当归散(《鸡峰》卷十五)。

【组成】当归三分(锉, 微炒) 白龙骨半两 熟干地黄一两 地榆三分(锉) 阿胶

三分(捣碎,炒令黄燥) 白芍药半两 干姜半两(炮裂,锉) 蒲黄半两 熟艾半两(微炒) 牛角觔一两半(炙令黄)

【用法】上为细散。每服二钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】妊娠因损动,下血,腹痛不止。

32903 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】当归三两(锉,微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 熟干地黄半两 艾叶二两(微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 白芍药一两 芎藭一两 干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,加大枣三枚,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠胎动不安,腹内疼痛。

32904 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】当归一两(锉,微炒) 续断一两 芎藭一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠胎动不安,腹痛不止。

32905 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】当归饮子(原书卷七十六)。

【组成】当归一两(锉,微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加葱白七寸,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠腰痛。

32906 当归散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】当归一两(锉,微炒) 阿胶二两

(捣碎,炒令黄燥) 艾叶一两(微炒) 芎藭一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,次加生姜汁一匙,地黄汁半合,马通汁半合,更煎三四沸,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠卒惊奔走,或从高坠下,腹痛,下血不止。

32907 当归散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】当归一两(锉,微炒) 芎藭一两 桑寄生一两 艾叶一两(微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为散。每服四钱,以水一大盏,煎至五分,去滓,加酒一合,更煎三二沸,放温服之,不拘时候。

【主治】妊娠八九月,因误损胎,或胎不安,腹内疼痛,下血不止,胎死活未知,但妊娠腹内疼痛,或漏胞。

32908 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】当归(锉,微炒) 芎藭 阿胶(捣碎,炒令黄燥) 人参(去芦头) 白茯苓各一两 艾叶半两(微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:妊娠被惊,胎动向下不安,小腹连腰痛。②《医学正印》:妊娠下血。

【备考】《医学正印》用生姜三片、大枣二枚,煎服。

32909 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【异名】保安散(《产乳备要》)、当归汤(《妇人良方》卷十二)、保全散(《女科指掌》卷三)。

【组成】当归一两(锉,微炒) 甘草一两(炙微赤,锉) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《卫生家宝产科备要》：安胎。

【主治】妊娠血气不调，胎上逼心，烦闷疲劳；或心腹疼痛，胎动不安。

①《圣惠》：胎上逼心，烦闷委顿。②《卫生家宝产科备要》：妊娠胎气不安，心腹疼痛，胎动。③《妇人良方》：妊娠胎动，荡心闷绝，烦躁口干，横生倒产，上冲下筑，迷闷，唇口青黑，手足厥冷。

32910 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】当归三分（锉，微炒） 龙骨三分 地榆半两（锉） 艾叶半两 阿胶三分（捣碎，炒令黄燥） 牛角觿一两（烧灰） 熟干地黄三分 芎藭三分 白芍药半两 干姜半两（炮裂，锉） 黄耆半两（锉） 柏叶三分（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】妊娠损胎后，下血不止。

32911 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】当归三分（锉，微炒） 熟干地黄一两 鹿茸三分（去毛，涂酥炙） 白胶一两（捣碎，炒令黄燥） 艾叶二两（微炒） 甜葶苈根三分 附子半两（炮裂，去皮脐） 黄芩半两

【用法】上为散。每服三钱，食前以粥饮调下。

【主治】妊娠损胎后，下血不止。

32912 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】当归三分（锉，微炒） 芎藭三分 青橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 鸡舌香三分 吴茱萸半两（汤浸三遍，炒令微黑色）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下

不拘时候。

【主治】妊娠中恶，心腹疼痛。

32913 当归散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】当归（锉，微炒） 羌活 附子（炮裂，去皮脐） 防风（去芦头） 薏苡仁 麻黄（去根节）各二两 茵芋 羚羊角屑 菖蒲 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 干蝎（微炒） 木香 牛膝（去苗） 柏子仁各一两 芎藭一两半 桂心一两半 麝香一分（细研） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙微黄）

【用法】上为细散，入麝香，相和令匀。每服二钱，以豆淋酒调下，不拘时候。

【主治】产后中风，手脚顽痹，缓弱无力。

32914 当归散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】当归（锉，微炒） 白豆蔻（去皮） 木香 白术 高良姜（锉） 白芍药 甘草（炙微赤，锉）各半两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 吴茱萸一分（汤浸七遍，炒令黑）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】产后霍乱吐利，腹中疝痛。

32915 当归散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】当归（锉，微炒） 白芍药 木通 熟干地黄 牡蛎粉 苍术（锉，微炒）各二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后恶露少，汗出多，虚无力。

32916 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 水蛭一两（炒熟） 虻虫一两（去翅足，微炒） 小儿胎发一两（烧灰） 瓷药一两（细研，水飞过） 芫花一两（醋拌，炒令

干) 延胡索一两

【用法】上为细散。每服一钱，空心以温酒调下。

【主治】产后腹内血痕疼痛。

32917 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归一两(锉，微炒) 骨碎补一两 牛膝一两(去苗) 赤芍药一两 桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 琥珀一两 芎藭一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以豆淋酒调下。

【主治】产后腰痛，不能转侧，壮热汗出，身体急强。

32918 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归半两(锉，微炒) 生干地黄三分 石韦半两(去毛) 梔子仁半两 赤芍药半两 赤茯苓三分 王不留行半两 瞿麦三分 麦门冬三分(去心) 木香三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】产后卒淋涩，小腹疼痛。

32919 当归散

【方源】方出《圣惠》卷七十九。名见《普济方》卷三五四。

【组成】当归一两(锉，微炒) 黄芩一两 紫葛一两(锉) 白茅根三分(锉) 川朴消二两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后大小便秘涩，小腹疼痛。

32920 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【异名】当归芍药汤(《圣济总录》卷一六五)。

【组成】当归一两(锉，微炒) 白芍药一两 地榆一两(锉) 龙骨一两 黄连一两

(去须，微炒) 艾叶二分(微炒) 甘草半两(炙微赤，锉) 黄芩三分 厚朴三分(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 干姜三分(炮裂，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，脐下疔痛。

32921 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归一两(锉，微炒) 犀角屑一两 黄芩一两 黄连一两(去须，微炒) 地榆一两(锉) 白术一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后赤白痢不止。

32922 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归一两(锉，微炒) 干姜一两(炮裂，锉) 赤芍药半两 芎藭半两 甘草半两(炙微赤，锉) 熟干地黄一两半 艾叶一两半(微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】产后下痢，腹中疔痛。

32923 当归散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】当归三分(锉，微炒) 赤芍药一两 刘寄奴半两 芎藭三分 红兰花三分 桂心半两 延胡索半两 没药半两

【用法】上为细散，每服二钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后恶血不散，攻击心腹疼痛。

32924 当归散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】当归三分(锉，微炒) 牡丹半两 牛膝半两(去苗) 姜黄半两 川大黄一两(锉，微炒) 虻虫三分(炒微黄，去翅足) 生干地黄三分 琥珀半两 虎杖半两 桃仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 川

芒消一两 肉桂三分(去皱皮) 水蛭一分(炒微黄) 蒲黄三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水、酒各半中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，气攻心腹，烦闷，胁肋刺痛。

32925 当归散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】当归三分(锉，微炒) 赤芍药三分 桂心三分 川大黄三两 桃仁一百三十个(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后恶露不下。

32926 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】当归一两(锉，微炒) 白芍药一两 芎藭一两 黄耆一两半(锉) 防风一两(去芦头) 人参一两(去芦头) 熟地黄二两 甘草半两(炙微赤，锉) 白茯苓一两

【用法】上为粗散。用羊肉二斤，大枣二十枚，先以水五升，煮至二升半，每服入药四钱用肉汁一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三次。

【主治】产后风虚劳损，四肢疼痛，不欲饮食。

32927 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【异名】当归汤(《三因》卷十八)。

【组成】当归一两(锉，微炒) 鬼箭羽一两 红兰花一两

【用法】上为散。每服三钱，以酒一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：产后败血不散，结聚成块，俗呼儿枕，疼痛发歇不可忍。②《三因》：新产风寒乘虚内搏，恶露不快，脐腹坚胀。

32928 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】当归一两(锉，微炒) 胡椒一分 蓬莪术半两 白术三分 木香半两

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后血刺，连心疼痛。

32929 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】当归三分(锉，微炒) 鬼箭羽一两 白术三分 木香三分 桂心半两 川大黄一两(锉碎，微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，生地黄一分，煎至五分，次入酒一小盏，更煎三两沸，去滓稍热服。

【主治】产后气血不散，心腹刺痛，胀满喘促。

32930 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】当归一两(锉，微炒) 赤芍药一两 桔梗一两(去芦头) 白术一两 干漆一两(捣碎，炒令烟出) 牛膝一两(去苗) 桂心一两 木香一两 川大黄一两(锉，微炒)

【用法】上为细散。每服一钱，食前以热酒调下。

【主治】产后血气攻胁肋，胀满疼痛。

32931 当归散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】当归半两(锉，微炒) 黄耆半两(锉) 细辛半两 黄芩半两 龙骨半两(细研) 桂心半两 赤芍药半两

【用法】上为细散。每服一字，以乳汁调下，一日三次，更看儿大小，以意加减服之。

【主治】①《圣惠》：小儿胎寒，聚唾弄舌，羸啼反张怒惊。②《医方大成》引汤氏方：小儿胎中受寒，生下再感外风，面色青白，四肢厥冷，大便青黑，心腹疼，盘肠内疝。

32932 当归散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】当归(锉, 微炒) 枳壳(麸炒微黄, 去瓢) 赤芍药 川大黄(锉, 微炒) 各半两

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓, 放温, 量儿大小, 分减服之。

【主治】小儿冷热不调, 腹内多痛。

32933 当归散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】当归(锉, 微炒) 麻黄(去根节) 各半钱 羌活 酸枣仁(微炒) 人参(去芦头) 杜仲(去粗皮, 微炙, 锉) 桂心各一分

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 加生姜少许, 煎至五分, 去滓, 量儿大小, 乳食前, 分减服之。

【主治】①《圣惠》: 小儿脚不展, 指拳缩。②《幼科指掌》: 小儿变蒸, 有寒无热, 并吐泻, 不乳多啼者。

32934 当归散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】当归三分(锉, 微炒) 黄连三分(微炒, 去须) 干姜半两(炮裂, 锉) 黄耆三分(锉) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿痢渴, 腹内疼痛不止。

32935 当归散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】当归黄连汤(《圣济总录》卷一七八)、黄连汤(《普济方》卷三九七)。

【组成】当归一两(锉, 微炒) 黄连三分(去须, 微炒) 桂心三分 赤石脂一两 人参三分(去芦头) 干姜三分(炮裂, 锉) 龙骨一两 白头翁三分 甘草三分(炙微赤, 锉) 附子半两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓放温, 量儿大小, 分减服之, 不拘时候。

【主治】①《圣惠》: 小儿冷痢腹痛。②《圣济总录》: 小儿脓血滞痢。

32936 当归散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】当归五分(锉, 微炒) 阿胶三分(捣碎, 炒令黄燥) 人参半两(去芦头) 黄芩三分 甘草一分(炙微赤, 锉) 龙骨三分

【用法】上为细散。每服半钱, 以粥饮调下, 每日三四次。

【主治】小儿一切痢久不愈, 腹痛羸瘦, 不欲饮食。

32937 当归散

【方源】《博济》卷四。

【组成】延胡索 当归 蒲黄(炒) 京芎 滑石(炒, 先研细) 干地黄 天麻 肉桂(去皮) 泽兰 蓬莪术(炮) 赤芍药各等分 地榆(醋炒, 焙干) 减半

【用法】上为细末。每服一钱半, 温酒调下; 或薄荷茶清调下亦可; 如手脚冷, 卒患血气奔心撮痛, 炒生姜酒调下二钱。

【主治】妇人血风攻注, 百骨节痠痛, 皮肤虚肿, 筋脉拘急, 或生瘾疹, 寒热不时, 饮食无味。

32938 当归散

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】当归(切、焙) 桂(去粗皮) 各一两 牡丹皮 附子(炮裂, 去皮脐) 各半两。

【用法】上为细散。每服二钱匕, 空心温酒调下, 晚再服。

【主治】伤寒后腰间冷痛。

32939 当归散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】当归(切, 焙) 桔梗(去芦头, 炒) 枳壳(去瓢, 麸炒) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 赤芍药 桂(去粗皮) 各一两 人参 木香各半两

【用法】上为散。每服二钱匕。煎生姜、大

枣汤调下，不拘时候。

【主治】心掣少气，善咳善泄，腹痛上攻。

32940 当归散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】当归（切，焙）

【用法】上为散。每服一钱匕，米饮调下。

【主治】鼻衄不止。

32941 当归散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】当归（切，焙） 木香 干姜（炮） 肉豆蔻（去壳，炮）各半两 诃梨勒（炮，去核） 黄连（去须，炒）各三分

【用法】上为散。先用水四盏，加甘草、生姜各一分，黑豆一合，并半生半炒，同煎至二盏，去滓，分作二服，每服用调散三钱匕，空心日午服。

【主治】肠胃寒湿濡泻，腹内疔刺疼痛。

32942 当归散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】当归三分（锉，微炒） 黄连一两（去须，微炒） 龙骨二两

【用法】上为细散。每服二钱匕，粥饮调下。一日二次，不拘时候。

【主治】血痢，里急后重，肠中疼痛。

32943 当归散

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】当归（去芦头，焙干） 石斛（去根） 天门冬（去心，焙） 菴藟子 地肤子 肉苁蓉（酒洗，去皱皮，切，焙干）各一两 白薇 覆盆子 甘草（炙令赤，锉） 五味子各三分 桂（去粗皮） 牛膝（锉，酒浸，焙干） 附子（炮裂，去皮脐）各半两 石钟乳（炼成者）一两一分

【用法】上为散。每服三钱匕，以温酒入少熟蜜调下，空心、日午、夜食后服之。

【主治】虚劳羸瘦，面目黧黑，四肢苦重，短气，不思饮食。

32944 当归散

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】当归（切，焙） 甘草（炙，锉）

各二两 人参 生于地黄半斤（以生姜半斤，取汁，浸一宿，切、焙） 白茯苓（去黑皮） 杏仁（麸炒，去皮尖双仁）各一两

【用法】上为散。每服二钱至三钱匕，米饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳吐血，咳嗽烦满。

32945 当归散

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】当归（切，焙） 鹤虱（去土，微炒）各二两 陈橘皮（去白，微炒） 人参各一两半 槟榔（炮，锉）三两 枳壳（去瓢，麸炒黄色） 芍药各一两半 桂（去粗皮）一两一分

【用法】上为散。每服二钱匕，空心煎枣汤调下，至晚再服。

【主治】蛔虫痛发作，冷气先从两肋连胸背撮痛，欲变吐逆。

32946 当归散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】当归（切，焙）一分 防己 龙胆各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，温水调下。食后服。

【主治】赤眼疼痛不可忍。

32947 当归散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】当归（洗，锉，焙干） 赤芍药（洗，锉） 黄连（去须，锉）各一两

【用法】上为散。每用一钱匕，沸汤浸去滓，乘热洗，如冷，用石器内再煖，洗两三遍。

【主治】风毒气攻眼目，连脸赤烂，及暴赤眼疼痛不可忍者。

32948 当归散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】当归（末） 鲫鱼（洗去腹中物，留鳞，内当归末令满）

【用法】上以纸裹泥固济，烧成黑灰，入烧盐同和，揩牙如常漱之。

【功用】揩牙乌髭。

【主治】髭发黄白及牙疳出血久不愈。

32949 当归散

《圣济总录》卷一三一。为《千金》卷二十二“内补散”之异名。见该条。

32950 当归散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】当归(切,焙) 芍药 续断 生干地黄(焙) 白芷 黄芩(去黑心) 甘草(炙,锉) 牛膝(酒浸,切、焙)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心以酒调下,一日二次。

【主治】扑损筋骨,恶血不散,迷闷疼痛,小便血下。

32951 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】当归(切,焙) 乌头(炮裂,去皮脐) 芍药 延胡索 京三棱(煨,锉) 蓬莪术(煨,锉) 芎藭各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下,空心、日午、临睡服。

【主治】妇人血风走注,攻头目昏眩,四肢疼痛,皮肤癰疹。

32952 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切、炒) 牡丹皮 芍药 延胡索 芎藭各一两 桂(去粗皮) 黄芩(园小者) 甘草(炙) 水蛭(糯米同炒米熟,去米)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心温酒调下。

【主治】妇人血劳气滞,经脉不通,腹内疼痛。

32953 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切、焙) 芍药 蓬莪术(炮,锉) 陈曲(炒) 麦蘖(炒) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 京三棱(炮,锉) 大腹(锉) 木通(锉)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下,

一日三次,不拘时候。

【主治】室女月水不利,断续不匀。

32954 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切,焙) 牡丹皮 芍药 延胡索 芎藭各一两 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 生干地黄(焙) 甘草(炙) 水蛭(糯米同炒米熟,去米) 紫葳各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心温酒调下。

【主治】室女月水不利,少腹刺痛。

32955 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】当归(锉,炒) 桂(去粗皮) 白龙骨 白术 鹿角胶(炙燥)各一两 附子(炮裂,去皮脐)二两

【用法】上为散。每服二钱匕,食前粥饮调下。

【主治】妇人白带不止,面黄体瘦,绕脐冷痛。

32956 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归(切,焙) 桑根白皮(锉) 续断 芍药 芎藭各一两 干姜(炮)半两

【用法】上为散。每服二钱匕,酒调下,不拘时候。

【主治】妊娠胎动,下血不止。

32957 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归(切,焙) 阿胶 蒲黄 熟干地黄(焙)各三分 龙骨 芎藭 牛角觶(烧灰)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,煎艾汤调下,米饮亦得。

【主治】妊娠胎不安,卒下血不止。

32958 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】当归(切,焙) 桑寄生 续断各半两 赤芍药一分

【用法】上为散。每服三钱匕,空心、食前

温酒调下。

【主治】妊娠卒下血，腰腹疼痛。

【加减】有冷，加干姜一两；腹痛，加芎藭一两。

32959 当归散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】当归（切，焙） 桂（去粗皮）各半两 芍药 人参 枳实（去瓢，麸炒）各三分 葵藜子（炒，去角） 鸡骨（炙）各一两 木通（锉） 黄耆（锉）各一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，空腹酒调下，一日二次。

【主治】乳结核坚硬。

32960 当归散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】当归（切，焙）半两 甘草（炙，锉）一分 铅丹（研）半分

【用法】上除铅丹外，捣为散，入铅丹合研令匀，以敷脐中。

【主治】小儿着脐风汁出。

32961 当归散

【方源】《普济方》卷七十三引《圣济总录》。

【组成】轻粉一分 当归（切，焙）一分 防己 龙胆各半两

【用法】上为散。每服一钱，食后温水调下。

【主治】目赤涩，翳膜遮障，时多热泪。

32962 当归散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】当归二钱 木香 官桂 甘草（炙） 人参各一钱

【用法】上咬咀。每服二钱，水七分盏，加生姜三片，大枣一枚（去核），同煎服。

【主治】小儿变蒸，有寒无热。

32963 当归散

【方源】《幼幼新书》卷七。

【组成】当归 白芍药 人参各一分 甘草（炙）半分 桔梗 陈皮各一钱

【用法】上为散。每服半钱，水煎，时时服。又有热痛，亦啼叫不止，面夜赤，唇焦，小

便黄赤，人参汤下三黄丸。

【主治】小儿脏冷腹痛，以致夜啼，面青手冷，不吮乳者。

32964 当归散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】御米皮 干姜 当归各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食前米饮调下。

【主治】血痢。

32965 当归散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】当归 京三棱 鳖甲 槟榔各一两 赤茯苓 赤芍药 桑白皮各二分 川大黄二两 郁李仁一两半 牵牛子三两 桂心 枳壳各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一中盏，加生姜十片，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人血分，腹胁膨胀，四肢浮肿，肩背壅闷。

32966 当归散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】附子 桂 当归各半两 白术一两半 甘草一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，空心服。

【功用】温补。

【主治】《普济方》：宫脏虚冷。

32967 当归散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】龙胆 当归各等分

【用法】上为细末。每服一大钱，冷酒调下。

【主治】风毒攻注，眼目疼痛，或赤眼疼不可忍者。

32968 当归散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】当归一两 香附子一两二钱 生于地黄 白芷各一两（以上四味锉碎，不犯铁器，炒黑色存性为末） 青盐半两（烧干，入诸药中一处和） 皂角五斤（刮皮去子用） 草乌头二两 生姜五斤（穿地坑烧红，

埋在坑内五次，其生姜自干)

【用法】上先将草乌头、生姜皆切作片子，及将皂角刮去黑皮，分作两片，内铺乌头、生姜了，用麻片缚夹定，炭火上用铲炙令通红，于地上用新瓦盆盖，如麸炭状，研细，与前药一处合和。每日两次搽齿如常法，须发白者，一月变黑，遇旦望日用河水洗髭。

【功用】乌髭鬓，牢牙齿。

32969 当归散

【方源】《本事》卷十。

【组成】当归(洗，去芦，薄切，焙干) 川芎(洗) 白芍药 黄芩(锉，炒) 各一两 白术半两 山茱萸一两半(连核用)

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前酒调下，一日三次。

【主治】①《本事》：妇人天癸已过期，经候不匀，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。②《景岳全书》：经水妄行不止，及产后气血虚弱，恶露内停，憎寒发热。

【加减】如冷，去黄芩，加桂一两。

32970 当归散

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】当归(去芦并土)一分(焙) 芍药一分(炒) 黄连(去须)一分(炒) 枳壳一分(去瓢，麸炒黄)

【用法】上为细末。每服半钱，水五分，煎至三分，温服。

【主治】热痢下血。

【加减】下血多者，加甘草一寸同煎，乳食前服。

32971 当归散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】归身 川芎 白芍 陈皮 木香 香附 乌药 吴茱萸 砂仁 白术 甘草 前胡 紫苏 葱白 生姜

【主治】妊娠中恶，忽然心腹刺痛，闷绝欲死。

【方论选录】是方芎、归、术、芍以安胎固本；前、苏、葱、姜以解表驱邪；附、乌、陈、

砂、木香以顺气理中；甘草和中解毒。但茱萸大辛，且能泄厥阴经之气，不可轻用，或冬月中寒，酌用可也。

32972 当归散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】当归(洗) 木香(煨) 赤茯苓 桂心 槟榔 赤芍药 牡丹皮 陈皮 木通 白术(各锉，焙干) 各等分

【用法】上为末。脚膝头面肿，大小便不快，每服二钱，水一盞，紫苏二叶，淡木瓜一片如指大，同煎八分温服，一日三次；如已愈，常服，早晚二次。觉气下，或小便快，是效。

【主治】水肿，喘息奔急，皮肤溢满，足胫尤甚，两目下肿，腿股间冷，口苦舌干，心腹坚胀，不能正偃，偃则咳嗽，小便不通，梦中虚惊，不能安卧。

【加减】脏寒，去槟榔；脐已凸，加大腹皮、木猪苓各一两。

【宜忌】忌乌鸡肉，咸酸海味物。

32973 当归散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷六。

【组成】官桂半两(去皮称，用生姜二两取自然汁涂炙，令姜汁尽为度) 当归一分(去芦须，洗，切，焙)

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下，未止再服。

【主治】产后痢。

32974 当归散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷六。

【组成】肉桂(去粗皮，不见火) 当归(去芦须，酒洗，焙) 芍药(白者，锉) 干姜(炮裂，锉) 干地黄(汤洗，锉，焙干) 蒲黄(隔纸上炒) 甘草(炙，锉) 各一两 黑豆二两(炒熟，去皮)

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，一日三次，不拘时候。常服一日二次或一次。

【主治】妇人产后血气血刺，血晕，血崩，恶露不止，或虚或肿，或见神鬼，或如中风，或泻或痢，或如疟疾者。兼治产后一十八病。

32975 当归散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】当归 黄耆 栝楼 木香 黄连各等分

【用法】上为粗末。煎服一两。

【主治】诸疮肿已破未破，焮肿甚。

【加减】如痛而大便秘者，加大黄三钱。

32976 当归散

【方源】方出《保命集》卷下，名见《活法机要》。

【组成】当归 芫花（炒）

【用法】上为细末。每服三钱，酒调下。

【主治】妇人产后恶物不下。

32977 当归散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】当归头散（《杏苑》卷八）。

【组成】当归一两 龙骨二两（炒赤） 香附子三钱（炒） 棕毛灰五钱

【用法】上为末。每服三四钱，空心米饮送下。

【主治】血崩。

【宜忌】《普济方》：忌油腻、鸡、猪、鱼、兔等物。

32978 当归散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】当归 白芍药 香附（炒）各等分

【用法】上为末。米饮汤调下，食前服。

【主治】①《儒门事亲》：血崩。②《普济方》引《神效方》：妇人产后虚弱。

32979 当归散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】当归 杜蒺藜各等分

【用法】上为末，食前米饮汤调服。

【功用】行经。

32980 当归散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】当归（以米醋微炒） 玄胡索（生用） 没药（另研） 红花（生用）

【用法】上为末。温酒调下二钱，服之。

【主治】月经欲来前后，腹中痛。

32981 当归散

【方源】《普济方》卷二八六引《神效方》。

【组成】当归半两 甘草一两 山梔子十二个 木鳖子一个（去皮）

【用法】上为细末。每服三五钱，冷酒调下。

【主治】附骨痈及一切恶疮。

32982 当归散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】当归 川山甲（灰炒） 蒲黄各半两（炒） 辰砂一钱 麝香少许

【用法】上为细末，研停。每服二钱，热酒调下；如不吃酒，薄荷、醋汤亦可。

【功用】《景岳全书》：通经络，行血滞。

【主治】妇人血脉不通。

32983 当归散

【方源】《妇人良方》卷六。

【组成】当归二两 芍药 延胡索 不灰木 熟地黄各一两 大黄三分（蒸） 桂心半两 甘草一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，胭脂一小角子，煎至六分，去滓，如躁时，放冷服，细呷清者。

【主治】妇人血风潮热。

32984 当归散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】当归三两 阿胶 甘草各二两 葱白一升

【用法】上细锉。以水七升，煮取三升，去滓，分五次温服。

【主治】妊娠气塞攻腰，痛不可忍，兼治腹痛。

32985 当归散

【方源】《妇人良方》卷十五。

【组成】当归一两 赤茯苓 枳壳 白芍药 川芎各二两 川白姜（炮） 木香（煨） 粉草各半两

【用法】上咬咀。每服三大钱，水一盞半，加生姜三片，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】胎前诸疾，或因怒，中气充子脏，

或充腴脉，腹急腹胀，腰腹时疼，不思饮食，四肢浮肿，气急时喘，大便忽难，小便忽涩，产门忽肿。

【加减】如禀受气弱及南人，枳壳减半；如气实及北人，于内加分量服之；或连日大便秘涩，加蜜同煎。

32986 当归散

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】当归 干姜各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，煎八分，入盐、醋少许，食前热服。

【主治】产后腹痛，腹胁胀满。

32987 当归散

【方源】《妇人良方》卷二十一。

【组成】当归 羌活各一两 延胡索半两

【用法】上为细末。用猪腰子一只，切作片，以水一盞入药末二钱，同煎至七分，同腰子吃。

【功用】产后补虚益血。

32988 当归散

【方源】《普济方》卷二一五引《余居士选奇方》。

【组成】当归 白芷 川芎 蒲黄各等分

【用法】上为末。每服二钱，温米饮调下。

【主治】小便下血不止。

32989 当归散

【方源】《直指》卷九。

【异名】团参汤（《直指小儿》卷四）、参归汤（《杏苑》卷五）、团参散（《景岳全书》卷六十二）。

【组成】人参 当归各一分

【用法】上为粗末。分两服，以雄猪心一个，新水煮熟取汁两次，煎药，空心、临卧服。

【主治】①《直指》：虚汗，盗汗。②《竹林女科》：小儿惊啼。

32990 当归散

【方源】《普济方》卷三九八引《直指》。

【组成】辣桂 牵牛（炒取仁）各半两 北大黄 桃仁（浸去皮，焙）各二钱半 全蝎一钱

【用法】上锉散。每一钱，入蜜煎，温服。已利后，以青皮、陈皮、茯苓、木香、缩砂、甘草为散，生姜煎。和胃。唇青不治。

【主治】疝气。大腑秘，小腹阴囊牵引撮聚痛甚。

32991 当归散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】川芎 菊花 川归尾 荆芥 羌活 生熟地黄 防风 干葛 北芍药各等分

【用法】上为粗末。白水煎，候熟，入生地黄汁数点服。

【主治】一切眼病。

32992 当归散

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】当归 没药各一两 芍药 木香 川白芷 川乌各半两 川芎 生地黄各三钱 郁金二钱

【用法】上为末。每服二钱，空心酒调下。如未愈加川牛膝、红花、苏木各半两调服。

【主治】打扑损伤。

32993 当归散

【方源】《女科万金方》。

【组成】香附 当归 赤芍药 熟地 元胡索 白术 枳壳 黄芩 青皮各一两五钱 三棱 川芎 砂仁 干漆各一两 红花五钱 甘草五钱

【用法】上为末。每服三钱，空心用酒调下；米汤亦可。

【主治】妇人禀气虚弱，三十八九岁经脉断绝，肚中作块痛，眼花头眩，饮食少进。

32994 当归散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】当归 牛膝（生）各一两 细辛 丁香 木香各半两

【用法】上为细末。每用指蘸贴于齿龈病处，吐津咽津不妨，不拘时候。

【主治】血气不调，风毒攻注，齿龈肿闷生疮，时有脓血，或成齿漏，久而不愈。

32995 当归散

《医方类聚》卷二一八引《吴氏集验方》。

为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

32996 当归散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】当归（去芦酒洗） 赤芍药各二两大黄（半生半炮）一两二钱 川芎 麻黄（制）各半两 甘草（半生半炙）一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盞，加生姜二片，煎七分，温服。

【功用】顺调气血，和解表里，爽利心腹，疏理百病。

【主治】①《活幼心书》：温热停积，白痢，烦燥不宁。②《幼科折衷》：疳积囊泻，面赤萎黄，肚胀脚弱，头大项小，发稀直竖，肌肉削瘦，不思饮食，昼凉夜热，或腹内有疝瘕气块，泻则颜色不等，其臭异常，其泻有时，或一月半月一番，自泻自止；及小儿阴囊肿，阴茎全缩不见。

【备考】《幼科折衷》治疳积囊泻，先用本方加三棱、陈皮煎服；治阴囊肿，用本方加槟榔、苍术服。

32997 当归散

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】黄连（去须） 当归（去芦） 赤芍药 杏仁（去皮尖）各等分

【用法】上同煮，绢帛滤过，乘热洗，冷即再温，勤洗立效。

【主治】暴赤眼。

32998 当归散

【方源】《得效》卷六。

【组成】地榆 陈皮 罂粟壳（去蒂萼穰） 当归（去尾） 赤芍药 甘草 肉豆蔻（煨） 黄连各等分

【用法】上为末。每服二钱，冷水调服。

【主治】泻痢。

32999 当归散

【方源】《普济方》卷三六一引《傅氏活婴方》。

【组成】当归 桂心各一钱 甘草半钱 木香二钱 白茯苓三钱

【用法】上为末。每服一钱或半钱，乳汁调入口中。

【主治】小儿胎寒啼叫。

33000 当归散

【方源】《普济方》卷三一二引《德生堂方》。

【组成】当归 桂心 川椒 附子各三钱 泽兰一钱 芎藭六钱 甘草五钱 没药 乳香各二钱半（另研）

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调，病上食后，病下空心服，一日三次。筋骨相连，二十日痊可。

【主治】落马坠车伤损。

33001 当归散

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《医林方》。

【组成】夏枯草 当归 白芍药 干姜各等分

【用法】上为细末。每服三钱，食前、空心米汤调下。

【主治】妇人赤白带下。

33002 当归散

【方源】《医方类聚》卷二三八引《医林方》。

【组成】牡丹皮 川芎 蒲黄各二两 桂半两 大豆卷二两

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下；血晕，童便调下。

【主治】产后恶血上行，抢心痛疼，恶血过多，血晕不省人事，或恶血不下行。

【备考】本方名当归散，但方中无当归，疑脱。

33003 当归散

【方源】《普济方》卷一八九。

【组成】当归 干姜 芍药 阿胶各二两 黄芩三两

【用法】上为散。每服二钱，以生地黄汁调

下。

【主治】衄血、吐血不止，心胸疼痛。

33004 当归散

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】当归五两 白术五两 细辛四两 桂心三两 大黄五两 朴消四两

【用法】上为散。初服一方寸匕，平旦空肚以酒饮下，日再服。稍加之，得利为度。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌桃李、雀肉、生葱、生菜。

33005 当归散

【方源】《普济方》卷二〇一。

【组成】当归(微炒) 人参(去芦头) 附子(炮裂，去皮脐) 各一两 干姜 甘草(炙微赤，锉) 各半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱呕吐，及下后腹中干痛，手足逆冷。

33006 当归散

《普济方》卷二八三。为《外台》卷二十四引《范汪方》“卓氏白膏”之异名。见该条。

33007 当归散

《普济方》卷三〇三。为《鬼遗》卷二“内补苁蓉散”之异名。见该条。

33008 当归散

《普济方》卷三〇三。为《鬼遗》卷二“内补当归散”之异名。见该条。

33009 当归散

【方源】《普济方》卷三一〇。

【组成】川芎二两 当归二两 没药一两(别研) 乳香一两(别研) 苏木一两

【用法】上为粗末，酒二升，水一升，同煎至半升，旋饮尽为度。食后、临卧服。服讫再依方煎，常服。如肿血散，即不用苏木。

【主治】跌扑伤损。

33010 当归散

《普济方》卷三一。为《圣惠》卷六十七“芍药散”之异名。见该条。

33011 当归散

【方源】《普济方》卷三二九。

【组成】当归 白芍药 香附(炒) 棕毛皮各等分(一方无棕毛皮)

【用法】上为末。食前米饮汤调下。

【主治】血崩。

33012 当归散

《普济方》卷三三三。即《圣济总录》卷一五一“当归饮”。见该条。

33013 当归散

《普济方》卷三三四。为原书同卷“当归汤”之异名。见该条。

33014 当归散

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】生干地黄(微炒) 桃仁(汤去皮尖双仁，麸炒黄) 一两一分 芎藭 白芷 蒲黄各一两 当归(微炒) 牛膝(酒浸去苗) 各一两 甘草 芍药 牡丹 干姜(炮裂) 人参 桂(去粗皮) 各三分 水蛭(以糯米少许同炒，未熟为度) 虻虫(去翅足，微炒) 各三十枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，米饮亦得，一日三次。

【主治】妇人月事欲下，腰腹刺痛，或多或少，月内再来，或如清水，或似豆汁，心下坚满，沉困虚乏，日渐黄瘦。

【备考】本方方名，据剂型，当作“当归丸”。

33015 当归散

《普济方》卷三四二。为《金匱》卷下“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

33016 当归散

《普济方》卷三四二。为方出《经效产宝》卷上，名见《圣惠》卷七十五“桑寄生散”之异名。见该条。

33017 当归散

《普济方》卷三四四。为《圣济总录》卷一五五“蒲黄散”之异名。见该条。

33018 当归散

《普济方》卷三四五。为《圣济总录》卷

一六〇“当归饮”之异名。见该条。

33019 当归散

【方源】《普济方》卷三四五。

【组成】当归三分(锉,炒微黄) 牡丹半两 牛膝半两(去苗) 姜黄半两 川大黄一两(锉,微炒) 虻虫一两(微炒黄,去翅足) 生地黄三分 琥珀半两 川芒消一两 桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒黄) 肉桂三分(去粗皮) 蒲黄三分 虎杖半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水、酒各半中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】产后恶露不下,气攻心腹,烦闷,胁肋刺痛。

33020 当归散

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】当归 荆芥穗各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,酒少许,煎至七分,灌之。如牙关紧急,用匙斡微微灌之。但下咽即生,不问多少便服,不可以药味寻常忽之。

【主治】妇人产后中风,不省人事,口吐涎沫,手足牵搐。

33021 当归散

《普济方》卷三五七。为《圣济总录》卷一五九“当归汤”之异名。见该条。

33022 当归散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】人参 当归 白术 甘草 藿叶少许 桂少许

【用法】上咬咀。水煎,温服,不拘时候。

【主治】小儿夜啼。

33023 当归散

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】当归 罂粟壳 甘草 地榆 木通 乌梅 陈皮 诃子(炮去核) 木香各三钱

【用法】上咬咀。三岁一钱,水半盏,煎三分去滓,食前服。

【主治】小儿泻痢,腹痛,烦渴不食。

33024 当归散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】川当归一两 甘草一分

【用法】上为细末。每服二钱,水一中盏,豆豉十粒,同煎至六分,去滓,量儿大小服。以利动为度。逐日令吃甘草汁,三岁以下,一岁以上,加减服。

【主治】痘疹。

33025 当归散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】川芎 当归 白茯苓 白芷 甘草 人参 荆芥穗 防风 羌活各等分

【用法】上为散。每服用钩藤钩子同煎。

【主治】惊疮,颜色清淡。

33026 当归散

《袖珍》卷四。即《活人书》卷十九“柴胡当归汤”。见该条。

33027 当归散

【方源】《秘传外科方》引李世安治疗法。

【组成】当归尾二两 川芎 荆芥穗、干葛 乌药 川独活 赤芍药 白芷 升麻各一两 羌活 甘草 防风(去芦) 枳壳各半两 红花 苏木各二分半

【用法】上咬咀。每服五钱,灯草十数茎,乌豆十粒,水一钟半,煎至八分,病在上,食后服,病在下,食前服,连进取效。

【主治】疔疮。

【加减】疮疼痛者,加乳香、没药、白芷各五分;疮热不退,加笔竹青、山梔仁各少许;大便秘,加枳壳一两;燥烦,加灯芯十茎、竹茹一块;渴者,加天花粉一两;肿者,加甘草节、降香节各半两;眼晕者,倍加川芎、白芷、荆芥、防风;渴而小便闭者,加滑石一两。

33028 当归散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】当归(炒) 黄耆(蜜炙) 北细辛(去上叶) 肉桂(去皮) 陈皮(去白) 白姜(炮) 缩砂仁 甘草(炙) 各

等分

【用法】上锉碎。每服五钱，水一钟，加生姜三片，糯米五十粒，煎至六分，空心服。

【主治】小儿胎寒腹痛，面唇青，身温肢冷，多啼。

33029 当归散

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】甘草(炙)半钱 桔梗 陈皮 当归各一钱

【用法】上锉。水一盞，煎六分服，不拘时候。

【主治】小儿囟门陷下；小儿夜啼，脏寒而腹痛，面青手冷，不吮乳。

33030 当归散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】当归 官桂 川芎 白姜(炮) 香附子 木香 甘草各等分

【用法】上为末。每服一字，以乳汁调下，一日二次。

【主治】小儿胎中受寒，面色青白，腹痛，啼哭不宁。

33031 当归散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 生地黄 赤芍药 川芎 甘草 菊花 木贼 黄芩 大黄 白蒺藜 木通 梔子各等分

【用法】水煎服。

【主治】眼睑停瘀血者。

33032 当归散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】当归 防风苗(泡) 蒺藜(炒) 牡丹皮各等分

【用法】上为末。每服二钱，生葱、薄荷、茶清调下，或作呷咀，煎服亦可。

【主治】目中红筋附睛者。

33033 当归散

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】当归 木香 人参 甘草(炙) 肉桂 破故纸(炒) 小茴香(炒) 各等分

【用法】共为末。煎姜、枣汤调服，或以枣

肉为丸亦可。

【主治】寒邪入肾经，小腹急痛，面青手足冷者。

33034 当归散

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】归尾(酒洗) 黄耆(蜜炙) 人参 细辛 龙骨 桂心 赤芍 甘草(炙)各半分

【用法】上为细末，每服一字，以乳汁调下。

【主治】小儿胎中受寒，生下再感外风，面色青白，四肢厥冷，大便青黑及腹痛盘肠内病。

33035 当归散

《赤水玄珠》卷七。为《得效》卷五“当归饮”之异名。见该条。

33036 当归散

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】当归(酒洗)二钱 川芎 熟地 防风 黄耆各三钱 芍药一钱半 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】血虚及去血过多发瘕。

33037 当归散

【方源】《便览》卷四。

【组成】乳香 没药各三钱 茴香四钱 当归一两 自然铜(火煅，醋淬七次)

【用法】上为细末。每服五钱，温酒调下。

【主治】杖疮。

【加减】气虚者，加参、耆、芍、芎、生地黄。

33038 当归散

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】当归 桂心 木香 赤茯苓 木通 槟榔 赤芍药 牡丹皮 陈皮 白术各一钱三分

【用法】上作一服。水二钟，加紫苏五叶，木瓜一片，煎一钟，不拘时服。

【主治】土不制水，水气盈溢，气脉闭塞，渗透经络，发为浮肿之证，心腹坚胀，喘满不安。

33039 当归散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】当归(去芦) 赤芍药 苦参(去芦) 各半两 赤土一两

【用法】上为细末,生猪脂二两,熬油去滓,同蜜一两,作一处调药,隔一宿。每服一大匙,热酒调下,空心、食后各一服。

【主治】皮风,紫白癫风。

【宜忌】鸡、鸭、无鳞鱼,豆腐等物。

33040 当归散

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】木香(煨) 桂心 木瓜各五分 赤茯苓 当归须 陈皮 白术各一钱 赤芍药一钱二分 木通 牡丹皮 槟榔各七分 紫苏四分

【用法】上哎咀。水煎八分,不拘时服。

【主治】停血不散,腹肿喘满,夜甚于昼,或血虚而膨,或胀,或散。

33041 当归散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归三钱 赤芍二钱 生地黄三钱 黄连六分 红花八分 石膏二钱

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血分有热发斑者。

33042 当归散

【方源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归 赤芍药(酒炒) 刘寄奴 枳壳(麸炒) 玄胡索 没药各等分

【用法】上为末。热酒调下二钱,不拘时服。

【主治】妇人久积,血气痞痛,小便刺痛,四肢无力。

33043 当归散

《济阴纲目》卷八十八。为《活法机要》“乳香散”之异名。见该条。

33044 当归散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】人参 桔梗 白茯苓 玄参 黄芩 大黄 羚羊角

【用法】水煎,食后服。

【主治】大眦赤脉穿睛外障。

33045 当归散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】当归 赤芍各一钱 川芎五分 大黄三钱 甘草(生)五分

【用法】上为散,加生姜一片,水煎服。

【主治】口舌生疮,牙根毒发,大便秘结。

33046 当归散

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】当归 赤芍 肉桂 蒲黄 延胡 血竭

【用法】上为末。每服二钱,酒调下。

【主治】儿枕块痛。

33047 当归散

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】川芎 当归 羌活 防风 赤芍 桂 甘草 枣仁 牛蒡 羚羊角

【主治】产后劳役太早,伤动脏腑,虚损未复,为风所乘,风邪冷气客于皮肤经络则顽麻,入于筋脉则挛急。

33048 当归散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】当归二两(锉,微炒) 赤芍药一两半 刘寄奴二两 延胡索一两半(炒) 牛膝二两 没药二两

【用法】上为散。每服三钱,葱管汤煎服。

【主治】血积小腹,小便刺痛,经愆,脉涩滞者。

【方论选录】血积阻塞,窍道不利,故小便刺痛,月经不调焉。当归养血脉以荣经脉,赤芍泻肝火以行滞血,延胡活血调经,没药散瘀止痛,寄奴破血以通经脉,牛膝通经以利小便。为散以散之,葱管以通之,使血积消散,则窍道自通,而小便无刺痛之患,月经无不调之愆矣。

33049 当归散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】当归三钱 川芎八分 桑寄生三钱(酒炒) 淡豉一钱半 阿胶三钱(梗粉炒) 葱白头三枚

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】子烦，脉浮涩者。

【方论选录】妊娠血亏，邪伏遏抑心气而心血不荣，亦令心烦，是亦为子烦。当归养血荣心，阿胶补阴益血，川芎行血海以通心气，寄生补腰膝以壮肾气，淡豆豉解散伏邪，葱白头宣通阳气也。水煎温服，使阳气通而伏邪解，则心血荣而心气通，其心烦无不自退，何子烦心足虑哉？

33050 当归散

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】当归 川芎 鳖甲 吴茱萸 桃仁 赤芍 肉桂 槟榔 青皮 木香 大黄 蓬莪术

【主治】妇人痼病攻冲刺痛。

33051 当归散

【方源】《一盘珠》卷六。

【组成】当归身(酒洗)五钱 大川芎二钱半 白芍(酒洗)二钱半 白术(土炒)三钱 故纸(盐水炒) 小茴香(盐水炒)各钱半 炙甘草 砂仁(炒)各五分

【用法】煨姜、黑枣为引，水煎服。

【功用】安胎(妊娠二三月安胎主方)。

【加减】气虚加蜜炒黄耆一钱、人参一钱；火呕加黄芩(酒炒)五分；腰痛加杜仲一钱半(盐水炒)、续断一钱半(酒炒)。

33052 当归散

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】当归三钱 白芍二钱半 人参二钱半 甘草(炙)一钱 桔梗一钱 橘皮(去白)一钱 半夏一钱 茯神一钱

【用法】水煎，时时与之服。

【主治】小儿中寒夜啼。

33053 当归散

【方源】《异授眼科》。

【组成】当归 白芷 羌活 甘草 梔子 牛蒡(炒)

【用法】上为末。滚水调服。

【主治】血眼，目有赤筋扳睛，服三黄汤不退者。

33054 当归散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归 白芍 人参 玉竹 羌活 防风 炙草

【主治】风寒偏盛，发为刚痉，头摇口噤，脊背反张，项强拘急，转侧艰难，身热足寒，目面赤色，无汗者。

33055 当归散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】油归 尖生(地) 知母 滑石 川贝 黄芩 瓜蒌 大黄 酒芍 甘草

【主治】牙疳便闭，胃中腐烂，内毒上冲。

33056 当归散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参一钱 当归一钱 白芍一钱(炒) 炙草三分 桔梗五分 陈皮三分 薏米二分(研)

【用法】水煎服。

【主治】小儿夜啼不乳，或心肝热。

33057 当归煎

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】当归一两 没药三分 麝香半两(细研) 乳香半两 桂心半两 朱砂半两(细研) 黄耆三分 漏芦半两 自然铜半两 丁香半两 木香三分 芎藭半两 麒麟竭三分 槟榔半两 云母粉半两 沉香半两 甘草半两 白薇半两 白芷半两 密陀僧半两 赤芍药三分 野驼脂三分 黄犬脂三分(两) 生地黄半斤(绞取汁)

【用法】上除脂，并为末，银锅内，先用好酒五升，以慢火煎去二升，即下地黄汁，更煎渐浓，次入野驼脂，不住手以柳木篦搅如膏，即下药末，更搅令匀，以瓷盒盛。每日空心、午时、晚间服一弹丸大，以甘草酒调下。外取涂贴患处，亦良。

【主治】肠内生痼肿，令人心膈间气滞，急痛，肚热，呕逆，小便黄赤熇，腹表发肿，肠中夜间如汤沸声。

33058 当归煎

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归(去芦,酒浸) 赤芍药 牡蛎(火煨,取粉) 熟地黄(酒蒸,焙) 阿胶(锉,蛤粉炒成珠子) 白芍药 续断(酒浸) 各一两 地榆半两

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮送下。

【主治】妇人室女,赤白不止,腹内疼痛,四肢烦疼,不欲饮食,日渐羸瘦。

【方论选录】《医略六书》:血亏挟滞,冲任不调,故腹痛而赤白带下,淫溢不已焉。熟地补血,以滋任脉;当归养血,以荣冲脉;赤芍活血化滞,地榆凉血涩血,续断续筋脉,牡蛎涩带下也。醋丸以收之,饮下以和之,使血气调和,则腹痛自退,而赤白带下无不自除矣。

【备考】本方方名,《玉机微义》引作“当归煎丸”。

33059 当归煎

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】四物汤加甘草半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每两八九丸,酒、水共半盏,煎汤同化调停下。如人行五里,再进一丸,以愈为度。

【功用】去败血,生好血。

33060 当归煎

【方源】《宋氏女科》。

【组成】当归(酒洗,浸) 牡蛎(火煨) 阿胶(炒) 白芍药(酒炒) 续断(酒浸) 各一两 地榆五钱 白茯苓 荆芥(炒黑) 各一两

【用法】上水煎服;或为末,醋糊为丸,每服五十丸,米汤送下。

【主治】赤白带不止,腹内疼痛,四肢烦疼,不用饮食,日渐羸瘦。

33061 当归煎

《卫生鸿宝》卷一。为方出《外台》卷二十七注文引《肘后》,名见《景岳全书》卷五十三引《元戎》“当归酒”之异名。见该条。

33062 当归膏

【方源】方出《千金》卷六,名见《圣济总录》卷一一七。

【组成】当归 射干 升麻各一两 附子半两 白蜜四两

【用法】上咬咀,以猪脂四两先煎之,令成膏,下著地,勿令大热,纳诸药,微火煎,令附子色黄药成,绞去滓,纳蜜,复上火一两沸,令相得,置器中,令凝。取如杏仁大含之,日四五遍,嗽咽之。

【主治】热病口烂,咽喉生疮,水浆不得入。

33063 当归膏

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《普济方》卷五十四。

【组成】当归半两 细辛 芎藭 防风(去芦头) 附子(生用) 白芷各半两

【用法】上为末,以雄鲤鱼脑一斤,合煎三上三下,膏香,去滓。以绵裹枣核大,塞耳中。

【主治】耳鸣兼聋。

33064 当归膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】当归 白芷 乌鸡粪(以猪脂三斤,饲鸡三日,令尽,收其粪) 各一两 鹰屎白半两(与鸡屎同研细)

【用法】上先将当归、白芷锉碎,酒浸一宿,别溶猪脂一斤,消后入浸药并酒,文火煎之,候白芷黄色,去滓,将鸡屎、鹰屎纳膏中,搅匀倾入瓷盒中。每日三次涂癰痕上。避风。

【主治】面上癰痕。

33065 当归膏

《圣济总录》卷一一六。为《千金》卷六“香膏”之异名。见该条。

33066 当归膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】当归(切,焙) 甘草(锉) 胡粉(研) 羊脂各二两 猪脂三两

【用法】上除羊猪脂、胡粉外,为末,先熬脂令沸,下诸药末粉等,以柳篦搅令匀,瓷盒盛。取涂敷疮上,以故帛贴之亦得,一日

一易。以愈为度。

【主治】灸疮。

33067 当归膏

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】当归(为末)一两 阿魏(研)一分 绯帛(细剪)五寸 胎头发(细剪)半两 铅丹二两 麻油四两

【用法】上先煎麻油令沸热,次入头发并绯帛,煎令焦,滤去滓,再煎油候沸,入铅丹、阿魏、当归,以柳枝搅令匀,候黑色,滴水中成珠子,即以厚瓷盒盛之。涂疮口,或摊纸上贴之。

【主治】伤折损破,痛不止,肉不合。

33068 当归膏

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】当归(洗,切,焙) 续断(锉) 细辛(去苗叶) 木通(锉) 白芷(切) 芎藭(锉) 甘草(锉) 蜀椒(去目及闭口者) 牛膝(去苗) 附子(去皮脐,生切) 各一两

【用法】上为粗散,用猪脂半斤,先煎取油,次下诸药,煎如膏,以绢绞去滓,瓷盒盛。每用少许,抹患处,热手摩之。

【主治】骨出臼,蹉跌不复,疼痛。

33069 当归膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】当归 川芎 木鳖子 川山甲 蓖麻子 败龟版 油头发 白薇 白及 白芷 草乌各等分 四物汤一贴 败毒散一贴 以上香油一斤,于罐内浸此药,春五夏三,秋七冬十日。然后用松香三十两,夏使油四两。冬使油四两半,次用:

乳香一两 没药一两 血竭少许 麝香少许 龙骨(煨)三钱 白矾半两(飞)

【用法】上为末。待松香入油,用槐条搅匀,文武火熬,去烟净,入药,滴入水成珠子则膏成。水浸,再下油十两或九两,使黄丹四两,槐、柳、桃枝各七寸,杏仁半两,再煎匀烟净,用没药末半两,乳香半两,皂针搅

匀成膏,收于罐内,大小摊之。

【主治】诸般痈疽发背,瘰癧恶疮。

33070 当归膏

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】神效当归膏(《校注妇人良方》卷二十四)、百花膏(《治痘全书》卷十四)。

【组成】川当归一两 麻油(真正者)四两 淮庆生地一两 黄蜡一两

【用法】上先将当归、地黄入油煎黑,去滓,入蜡溶化,候温搅匀,即成膏矣。用涂患处,将纸盖之。肉未坏者,用之自愈;肉已死,而用之自溃,新肉易生,亦不结痂,又免皱揭之痛。

【功用】去腐肉,生新肉。

【主治】发背痈疽汤火诸症,不论肉未坏或已死者。

33071 当归膏

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】当归一斤四两(酒洗) 芍药八两(微炒) 生地黄半斤(酒洗) 薏仁一斤(糯米炒,去粉) 茯苓六两 白术十两(泻者,黄土微炒) 莲肉半斤(去心) 山药八两(炒) 陈皮四两 人参三两(脉微者,倍之) 甘草一两(半炙半生) 枸杞子四两

【用法】上咀净称,用水二十斤,文武火熬成膏,加熟蜜于内,冬用四两,春用五两,夏秋用六两,依法再熬。

【功用】养血和中。

【主治】脾胃虚弱。

【加减】内外俱热如蒸者,加青蒿汁一碗,银柴胡一两,胡黄连五钱;内热蒸者,加地骨皮四两,牡丹皮二两、知母一两;女人,加童便浸香附子一两,乌药二两,玄胡二两;男女胃脘痛者,加草豆蔻一两;寒,加肉桂;虚火阵阵作痛,加炒黑山栀仁半两;头昏目晕者,加天麻二两、钟乳粉一两;头虚痛者,加大川芎二两;咳嗽,加贝母三两,紫菀一两,五味子一两;肺热者,加麦门冬三两,天门

冬一两，桔梗、百部各一两；足膝软弱或痿者，加牛膝四两，石斛二两；腰背痛者，加杜仲六两，橘核仁一两。

33072 当归膏

《医统》卷七十九。为《圣惠》卷六十八“神效白膏”之异名。见该条。

33073 当归膏

《医学入门》卷七。为《直指》卷九“秘传当归膏”之异名。见该条。

33074 当归膏

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】当归 生地各一两 紫草 麻黄木鳖子(去壳) 大风子(去壳) 防风 黄柏 玄参各五钱 麻油八两 黄蜡二两

【用法】先将前九味，入油熬枯，滤去滓，再将油复入锅内，熬至滴水成珠，再下黄蜡，试水中不散为度，候稍冷，倾入盖碗内，坐水中，出火毒，三日听用。外搽。

【主治】疔风及赤游丹、鹅掌诸风。

33075 当归膏

【方源】《理渝》。

【组成】新发 当归二两 生地一两 生甘草五钱

【用法】用麻油熬，黄丹收，入黄蜡、白蜡，和匀摊贴。或加乳香、没药、明矾。

【功用】生肌止痛，补血续筋。

【主治】痈毒，汤火伤，一切疔疔，诸般烂疮。

【备考】方中新发用量原缺。

33076 当归膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】当归 1000 克 香油 500 克（一方加生地）

【用法】先将香油烧热后，将当归放入，烧至呈焦状，过滤，投入黄蜡适量，成油脂状即可。外用。

【主治】烫火伤。

33077 当合丸

【方源】《中国接骨图说》。

【组成】百草霜十钱 赤豆（炒至红色为

度）一钱 萍蓬（炒黑）五钱 蝮蛇（酒炙）一钱

【用法】上为末。温酒送下。

【主治】打扑伤损，兼下血。

33078 当面可

《普济方》卷六十八引《海上方》。为原书同卷“华茇散”之异名。见该条。

33079 当归头散

《杏苑》卷八。为《儒门事亲》卷十二“当归散”之异名。见该条。

33080 当归含丸

【方源】《外台》卷二十三引《范汪方》。

【组成】当归末二两 杏仁一两

【用法】上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。含口中二丸，渐渐咽汁，日三夜再。

【主治】口中、咽喉不利。

33081 当归饮子

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】当归（锉，微炒） 芎藭 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 豉 桑寄生各半两 葱白半茎

【用法】上锉细，和匀。以水二大盏，煎至一盞二分，去滓，分三次温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎动，心烦热闷。

33082 当归饮子

《圣惠》卷七十六。为原书卷七十五“当归散”之异名。见该条。

33083 当归饮子

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归（去芦） 白芍药 川芎各一两 生地黄（洗） 白蒺藜（炒，去尖） 防风 荆芥穗各一两 何首乌 黄耆（去芦） 甘草（炙）各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心血凝滞，内蕴风热，皮肤遍身疮疥，或肿或痒，或浓水浸淫，或发赤疹痞瘤。

33084 当归饮子

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】当归 柴胡各二两 人参一两

半夏七钱半 白芍药一两半 黄芩一两 甘草半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，去滓服，不拘时候。

【主治】妇人血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发擗盗汗，减食嗜卧；及血热相搏，月水不调，脐腹胀满疼痛，寒热如疟；又疗室女血弱，阴虚荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

33085 当归饮子

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草 芍药各一两 滑石半两

【用法】上锉细。每服三钱至五钱，水一盞，加生姜三片，同煎七分，去滓温服。

【主治】目泪不止。

33086 当归饮子

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】当归三钱 生地黄四五钱 白蒺藜（去刺） 荆芥 赤芍 连翘（去心） 金银花 僵蚕各二钱（生，研）

【用法】上加竹叶五片，水煎，空腹服。

【主治】干疥，沙疥。

【加减】干疥，加丹皮二钱；沙疥，加枯芩一钱五分。

33087 当归须散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】归尾一钱半 红花八分 桃仁七分 甘草五分 赤芍 乌药 香附 苏木各一钱 官桂六分

【用法】水、酒各半煎，空心腹。

【主治】①《医学入门》：打扑，以致气凝血结，胸腹胁痛，或寒热。②《杏苑》：月经适来，被气凝聚，或产后恶露不尽，腹痛。

【加减】如挫闪气血不顺，腰胁痛者，加青皮、木香；胁痛，加柴胡、川芎。

33088 当归洗汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】当归汤（《普济方》卷三二六）。

【组成】当归 独活 白芷 地榆各三两 败酱 矾石各二两

【用法】上咬咀。以水一斗半，煮取五升，适冷暖，稍稍洗阴，一日三次。

【主治】①《千金》：产后脏中风，阴肿痛。②《圣惠》：妇人阴挺出下脱。

【方论选录】《千金方衍义》：产后阴肿，无非风热瘀血。独活、白芷散风，当归、地榆散血，败酱解毒，矾石消肿，如法洗之最良。

33089 当归煮散

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】当归（切，焙） 鳖甲（用醋频蘸，炙令黄色） 桂（去粗皮） 木香 桔梗（炒） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，别研如膏）各一两半 吴茱萸（陈者，水淘七遍，炒干）半两

【用法】上除桃仁外，为末，入桃仁同研令匀。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，逐日空腹、日午、夜卧各一。

【主治】诸癥结痛，起于胁下，按之而坚，妨痛不能饮食，渐加羸瘦。

33090 当归煎丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】川当归（去土）二两 槟榔 赤芍药 牡丹皮 延胡索各半两

【用法】上先将当归用米醋一升二合慢火熬成膏，人众末，和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午温酒送下。

【主治】妇人久积，血气时发，发刺痛，肌瘦力乏，月候不调。

33091 当归煎丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】当归（切，焙） 附子（去皮脐，生用）各半两 没药（研） 硃砂（研） 血竭各一分 禹余粮（煨赤，醋淬七遍） 延胡索各半两

以上捣研为末，用酒三升调匀，于石器

内慢火熬成膏，和下药：

柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襖，醋炙黄） 人参 生干地黄（焙） 芍药 磁石（煅，醋淬七遍） 牡丹皮各一两 木香一分 泽兰半两

【用法】上将后九味捣罗为细末，入前膏内为丸，如豌豆大。每服二十丸，空心、食前淡醋汤送下。

【主治】妇人血积血癖，脐腹疼痛，心膈满闷，四肢烦疼，口苦舌干，饮食减少，渐成劳瘦。

33092 当归煎丸

《玉机微义》卷四十九。即《济生》卷六“当归煎”。见该条。

33093 当归膏子

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】当归三两 大生地三两

【用法】浸麻油一斤八两内，煎枯去滓，再加黄蜡一两五钱、白蜡一两五钱，焙化搅匀。再加大风子肉三两，鹅儿不食草一两，更妙。

【主治】脱皮疥疮，血虚、血热、风燥等外症。

33094 当归摩膏

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】当归（切，焙） 细辛（去苗叶）各一两半 桂（去粗皮）一两 生地黄一斤（切，研，绞取汁） 天雄十枚（去皮脐，生用） 白芷三分（留一块不锉，全用） 芎藭半两 丹砂（研）一两 干姜（炮）三分 乌头（去皮脐，生用）一两三分 松脂四两 猪脂五斤（别炼，去滓）

【用法】先将八味锉如大豆粒，以地黄汁浸一宿，与猪脂、松脂同慢火煎，候至留者一块白芷黄色，以厚绵滤去滓，瓷盒盛，入丹砂末，不住搅，至凝即止，每用药用火炙，手摩病处千遍。

【主治】诸风寒湿，骨肉痹痛。

33095 当门吹鼻丹

【方源】《跌损妙方》。

【组成】麝香 冰片 金粉 银粉 朱砂 明矾 牙皂 细辛 枪消各三钱 金箔 银箔各二两 金不换叶一两

【用法】上为细末。每吹八分。此药入鼻，如不转气，将红药与服，用手在眼上一揉，片时自转。

【主治】跌打损伤。

33096 当归一味散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷七引《全生指迷方》。

【组成】当归三两（去芦须，切片，焙）

【用法】上为细末。每服二钱，童便或酒调下，一日三次，从产下便服之。

【功用】调养血气。

【主治】产后诸疾。

33097 当归一物汤

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】川当归四两（锉）

【用法】上以酒三升，煮取一升，空心顿服。

【主治】小便血；亦治小便涩。

33098 当归二香汤

【方源】《医抄类编》卷七。

【组成】当归一两 沉香 降香各五钱

【用法】先将当归煎汤，后将二香磨入，童便和服。

【主治】七窍流血，死在须臾。

33099 当归二黄汤

【方源】方出《妇人良方》卷十九，名见《济阴纲目》卷十三。

【异名】当归二黄散（《医略六书》卷三十）。

【组成】当归 黄耆各一两 麻黄根二两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】产后虚汗不止。

33100 当归二黄散

《医略六书》卷三十。为方出《妇人良方》卷十九，名见《济阴纲目》卷十三“当归二黄汤”之异名。见该条。

33101 当归十味丸

【方源】《外台》卷九引《许仁则方》。

【异名】十味丸（《圣济总录》卷一六四）。

【组成】当归（切） 细辛 甘草（炙）各五两 桂心 吴茱萸 人参各三两 蜀椒三合（汗） 橘皮 干姜各四两 桑白皮八两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十丸，一日二次，稍加至三十丸，煮干枣饮送下。服此丸经三五日觉热，每服药后，良久吃三数口粥食压之。

【主治】①《外台》：冷嗽，服大干枣汤未能断其根，遇冷便发。②《圣济总录》：产后肺感寒，咳嗽上气，咽嗑不利，声重鼻塞。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、生菜。

33102 当归人参汤

《圣济总录》卷四十九。为《圣惠》卷六“当归散”之异名。见该条。

33103 当归人参汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】当归二钱 肉桂一钱 木香一钱 甘草（炙）一钱 人参一钱

【用法】每服二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿变蒸，有寒无热者。

【方论选录】当归滋阴而行于阳，以足其血；肉桂补命门而生肝木，以壮阳气；木香宣达阳气于上下；甘草以和其中，人参保安元气，生姜补肝行阳气，大枣补中厚脾土。

33104 当归人参散

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】当归 白术 黄芩 芍药 大黄 茯苓（去皮） 陈皮各半两 人参 黄耆（锉） 川芎 厚朴（去皮，姜制） 官桂肉各三钱 甘草一两 枳壳四钱（去瓢，麸炒）

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，加生姜三片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。如大秘，以此散下和中丸。

【主治】产后虚损痿弱，难以运动，疼痛胸满，不思饮食。

33105 当归干姜汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】当归（切，焙） 干姜（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 人参 甘草（炙，锉） 细辛（去苗叶） 芍药各一两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】厥疝，腹中冷痛。

33106 当归大黄丸

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 大黄

【用法】应急下者，合天水散；应缓下者，合戊己汤。

【主治】燥伤血分，下痢赤积，腹中作痛。

33107 当归大黄汤

【方源】方出《千金》卷十二。名见《普济方》卷一八八。

【组成】芍药 干姜 茯苓 桂心 当归 大黄 芒消各三两 阿胶 甘草 人参各二两 麻黄一两 干地黄四两 虻虫 水蛭各八十一个 大枣二十个 桃仁一百个

【用法】上咬咀。以水一斗七升，煮取四升，分五服，日三夜二。

【主治】吐血，胸中塞痛。

33108 当归大黄汤

【方源】《外台》卷七引《张文仲方》。

【异名】当归汤（《圣济总录》卷五十七）。

【组成】当归三两 芍药八分 桂心三分 干姜六分 茱萸五分 人参一两 大黄一两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。

【主治】冷气牵引腰背肋下，腹内痛。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

33109 当归大黄汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】大黄（湿纸裹，略煨） 甘草（炙） 当归 赤芍药各三钱 半夏（制） 川芎各一钱五分

【用法】上为末。每服三字，加生姜、大枣，

水煎服。

【主治】小儿诸痢，壮热利下，心中恶血。

33110 当归大黄汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】当归 大黄 生地 甘草

【主治】燥火下血，及吐血、嗽血，大便干结。

33111 当归大黄汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】当归 大黄 广皮 甘草

【功用】专清大肠

【主治】下血。

33112 当归大黄汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】当归 生大黄 川黄连 甘草

【主治】发斑。热重便硬，有下症者。

【方论选录】此方凉大肠血热。以斑症属血，故加当归；斑症不宜大下，故加甘草。

33113 当归川芎汤

【方源】《校注妇人良方》卷十三。

【组成】当归 川芎 熟地黄 白芍药(炒) 元胡索(炒) 红花 香附 青皮(炒) 泽兰 牡丹皮 桃仁

【用法】上水煎，加童便、酒各小半盏服。

【主治】小产后瘀血，心腹疼痛，或发热恶寒。

33114 当归川芎散

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】当归 川芎各半两 甘草二两 黄芩四两 薄荷一两 缩砂仁一分

【用法】上为末。每服一钱，食后温水调下，渐加至二钱，一日三次。

【功用】保护胎气，调和营卫。

【主治】风壅头目，昏眩痛闷，筋脉拘倦，肢体麻痹。

33115 当归川芎散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】当归 川芎 柴胡 白术(炒) 芍药(炒)各一钱 牡丹皮 茯苓各八分 蔓荆子 甘草各五分 山梔(炒)一钱二分

【用法】水煎服。

【主治】手足少阳经血虚疮证，或风热耳内痒痛，生疮出水，或头目不清，寒热少食；或妇女经水不调，胸膈不利，腹胁痞痛，小便不调。

【加减】若肝气不平，寒热往来，加柴胡、地骨皮；肝气实热，加柴胡、黄芩；肝脾气血虚热，加参、耆、熟地；脾虚饮食少思，倍加白术、茯苓；脾虚胸膈不利，加人参、黄耆；脾虚痰滞，胸膈不利，加半夏；肝气不顺，胸膈不利，加木香；肝虚小腹痞满，或时作痛，加熟地；脾血不足，小腹作痛，加肉桂；日晡发热，加熟地。

33116 当归元参饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】当归身 9 克 酒白芍 6 克 酒生地 15 克 玄参 9 克 牡丹皮 6 克 车前子 9 克 酒茺蔚子 3 克

【功用】滋补肝肾之阴，以清余邪。

【主治】花翳白陷、凝脂翳转变而来，白睛淡赤，干涩不适，视物不真、青睛出现凹陷者。

【方论选录】方中当归身、酒白芍、酒生地、玄参、车前子滋补肝肾之阴；玄参且能降胃中浮游之火；生地甘寒滋阴，能使阴生而热退，牡丹皮清芬透达，能使热退而阴生，二味相须为用，其效更雄；酒茺蔚子祛瘀生新，能使低陷平起。

33117 当归木香丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】当归(去芦)一两 蓬莪术一两(炮，锉) 木香(半两) 人参(去芦)半两 桂心半两(不见火) 黑牵牛一钱(炒微黄)

【用法】上为细末，曲糊为丸，如黍米大。每服十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】小儿心腹疼不可忍，闷乱，啼哭不止。

33118 当归木香汤

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陈皮 地骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕榈皮 (上药全烧为灰末)十大钱 当归一两 木香 红芍药各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，入小油二点，钱一文，同煎至七分，温服。

【主治】妇人血气虚劳，令人头目昏眩，谵语声沉重，舌根强硬，言语謇涩，口苦不思饮食，白日间睡，夜发虚汗，神思恍惚，梦寐狂言，面色萎黄，频发喘咳，遍身疼痛，骨节气走注，四肢沉重，背胛拘急，发寒热，五心烦躁，唇干多渴，胸膈不利，咽喉噎塞，疝瘕瘦弱。

【加减】如妇人血脏、脐下冷痛似刀搅，遍身肿满，室女经脉不通，用斑蝥半两，大黄一两（炒，銼），二味为末，用黄狗胆汁，以温酒调下一钱；如脐下痛止，心间痰未止，不服二味。

33119 当归木香汤

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】京楂核 全当归 正川芎 川木通 小茴香 川楝肉 杭青皮 结猪苓 宣泽泻各一钱 南木香 黑梔仁各五分

【用法】用净水浓煎，空心热服。

【主治】小儿久疳不愈。

33120 当归木香散

【方源】《女科指南》。

【组成】木香 当归 肉蔻 官桂 甘草 人参 白术 白芍 粟壳 茯苓 枳壳 陈皮 阿胶

【用法】水煎服。

【主治】胎前产后痢疾。

33121 当归止血汤

《医方易简》卷六。为方出《外台》卷二十七引《肘后方》，名见《景岳全书》卷五十三引《元戎》“当归酒”之异名。见该条。

33122 当归止血汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】当归一钱 香附一钱（便制） 生地一钱 白芍药一钱（酒炒） 牡丹皮一钱 苏子一钱 炙甘草三分 广陈皮一钱

【用法】加焙扁柏叶一钱，水煎服。

【主治】血症脉弦，胁痛气逆者。

33123 当归止痛汤

《便览》卷一。为《医学启源》卷下“当归拈痛汤”之异名。见该条。

33124 当归内补丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】熟地二百四十两 茯苓一百二十两 当归一百二十两 黄耆一百二十两 川芎一百二十两 肉桂（去粗皮）六十两 白芍一百二十两 苁蓉一百二十两 白术（炒）一百二十两 甘草三十两。

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】补气和荣，调经养血。

【主治】血虚崩漏，月经不准，腰痠腿痛，身体瘦弱。

33125 当归化毒汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】升麻 当归 麻仁 枳壳 红花 生地 桃仁 槟榔

【用法】水煎服。

【主治】燥屎不解而腹结痛者。

33126 当归六黄汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】六黄汤（《周慎斋遗书》卷五）。

【组成】当归 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芩 黄连各等分 黄耆加一倍

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盞，煎至一盞，食前服。小儿减半。

【功用】《中医方剂学讲义》：滋阴清热，固表止汗。

【主治】阴虚有火，盗汗发热，面赤口干，唇燥心烦，大便干结，小便黄赤，舌红脉数。

①《兰室秘藏》：盗汗。②《麻科活人》：自汗，盗汗。③《兰台轨范》：阴虚有火，盗汗。

发热；或血虚不足，虚火内动，盗汗不止。

【宜忌】《中医方剂学讲义》：气虚挟寒者慎用。

【方论选录】①《医方集解》：此手足少阴药也。盗汗由于阴虚，当归、二地所以滋阴；汗由火扰，黄芩、柏、连所以泻火；汗由腠理不固，倍用黄耆，所以固表。②《金鉴》：用当归以养液，二地以滋阴，令阴液得其养也。用黄芩泻上焦火，黄连泻中焦火，黄柏泻下焦火，令三火得其平也。又于诸寒药中加黄耆，庸者不知，以为赘品，且谓阳盛者不宜，抑知其妙义正在于斯耶！盖阳争于阴，汗出营虚，则卫亦随之而虚，故倍加黄耆者，一以完已虚之表，一以固未定之阴。

【临证举例】盗汗 《新医学》(1974；8：431)：以本方治疗 25 例盗汗患者，发病最短者 3 天，最长者一年。经辨证认为本组病例是阴虚热扰，心液不能收敛所致。根据虚则补之，热者寒之的治则，以养阴清热，固表敛汗为治。基本方用当归 9 克，生熟地各 12 克，黄连 3 克，黄芩 9 克，黄柏 9 克，黄耆 9 克，麻黄根 6 克。结果：痊愈 24 例，好转 1 例。服药最少者 1 剂即效，最多者 9 剂汗止，平均服药 3 剂。

33127 当归六黄汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】当归 黄连 黄芩 黄柏 黄耆 生地 熟地黄 知母

【用法】加生姜、大枣，浮小麦一撮，水煎服。

【主治】杂症盗汗，寸脉虚浮，尺脉数大无力，乃阴虚火动。

【备考】原书治上症，加白术，肉桂少许。

33128 当归六黄汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】当归二钱 熟地二钱 生地 黄连 黄芩 黄柏各一钱 黄耆(生)三钱 防风一钱 麻黄根一钱 浮麦一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】阴虚盗汗。

33129 当归六黄汤

【方源】《麻症集成》卷上。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 黄耆 地黄(生熟各半) 当归 栀子 浮小麦

【主治】火盛逼迫，致汗妄流。

33130 当归六黄汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】当归 黄柏 黄芩 麦冬 黄连 生地 熟地

【用法】加浮小麦或旧草席化灰，同煎服。

【主治】火迫夺汗，血虚者。

33131 当归龙荟丸

《丹溪心法》卷四。为《宣明论》卷四“龙脑丸”之异名。见该条。

33132 当归龙荟丸

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】当归(酒拌) 龙胆草(酒拌炒) 栀子仁(炒) 黄连 青皮 黄芩各一两 大黄(酒拌炒) 芦荟 青黛 柴胡各五钱 木香二钱五分 麝香五分(另研)

【用法】上为末，炒曲糊为丸。每服二三十丸，生姜汤送下。

【主治】瘰癧肿痛，或胁下作痛，似有积块，及下疳便痢，小便涩，大便秘，或瘀血凝滞，小腹作痛。

33133 当归龙荟丸

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】当归 龙胆草 柴胡各一两 青黛 胆星 大黄 芦荟各五钱 麝香五分 栀子 酒黄芩 酒黄连 黄柏各一两 木香二钱五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，生姜汤送下。

【功用】常服宣通血气，调顺阴阳。

【主治】小儿肝胆风热，耳中鸣，出青脉，名曰震耳，大便秘，小便黄。

33134 当归龙荟丸

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】当归三两 大黄三两 龙胆草三

两 芦荟三两 黄连一两半 青黛三两 黄芩一两半 木香一两 黄柏一两半 梔子一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，竹叶汤送下。

【主治】肝火内壅，胃气不化，胁腹疼痛，大便闭结，脉数大者。

【方论选录】方中当归养血荣肝胆，大黄泄热通大肠，龙胆草清肝火、泻湿热，芦荟清胃火除积热，梔子清利三焦，青黛清解郁热，黄柏清下焦湿热，黄芩清上焦燥火，木香调诸气之逆，当归和诸血之滞，白蜜为丸以润其燥，竹叶汤下以清其热，使大便一通，则火热自降，而肝胆肃清，胃气自化，安有胁腹疼痛之患，洵为通闭泻热之专方。

33135 当归龙荟丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】当归 龙胆草 芦荟 甘草 甘菊花 黄芩 荆芥 生地 赤芍

【主治】耳病左聾。

【加减】有痰，加姜制半夏。

33136 当归龙骨丸

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】当归 芍药 黄连 梁槐子 艾叶（炒）各半两 龙骨 黄柏各一两 茯苓半两 木香一分

【用法】上为末，滴水为丸，如小豆大。每服三四十丸，食前温水饮送下，一日三四次。

【主治】月事失常，经水过多，及带下淋漓，无问久新赤白诸症；并产后恶物不止，或孕妇恶露，胎动不安，及大小儿痢泻。

33137 当归龙胆丸

《宣明论》（四库本）卷四。即原书（千顷堂本）“龙脑丸”。见该条。

33138 当归龙胆汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】羌活退翳散（《审视瑶函》卷三）。

【组成】防风 石膏各一钱五分 柴胡 羌活 五味子 升麻各二钱 甘草 酒黄连

黄耆各三钱 酒黄芩（炒） 酒黄柏（炒） 当归身（酒洗） 草龙胆（酒洗） 芍药各五钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，入酒少许，临卧热服。

【主治】眼中白翳。

【备考】本方方名，《保婴撮要》引作“羌活退翳汤”。

33139 当归龙胆散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】香白芷 当归梢 羊胫骨灰 生地黄各五分 麻黄 草豆蔻皮 草龙胆 升麻 黄连各一钱

【用法】上为细末。以热浆水漱牙外，以粗末熬浆水刷牙。

【主治】寒热牙痛。

33140 当归四圣散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】当归（切，焙） 芍药各二两 御米壳（蜜炒）四两 甘草（炒）一两 茯苓半两 黄耆三两二钱（如无，地榆同用）

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盏半，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】一切下痢，脓血频并，脐腹绞痛不可忍者。

33141 当归四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】当归三两 桂枝三两（去皮） 芍药三两 细辛三两 甘草二两（炙） 通草二两 大枣二十五个（擘，一法十二个）

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。

【功用】①《成方便读》：发表温中。②《中医方剂学讲义》：温经散寒，养血通脉。

【主治】血虚受寒，手足厥寒，舌淡苔白，脉沉细或沉细欲绝者；并治寒入经络，以致腰股、腿、足疼痛或麻木。现于早期雷诺氏病及冻伤。

①《伤寒论》：伤寒厥阴病，手足厥寒，脉细欲绝者。②《伤寒论今释》引清川玄道：冻疮。③《汉方处方解说》：雷诺氏病。

【宜忌】《医方发挥》：本方只适用于血虚寒凝之四肢逆冷，其它原因之肢厥不宜使用。

【方论选录】①《金镜内台方议》：阴血内虚，则不能荣于脉，阳气外虚，则不能温于四末，故手足厥寒，脉细欲绝也。故用当归为君，以补血，以芍药为臣，辅之而养营气；以桂枝、细辛之苦，以散寒湿气为佐；以大枣、甘草之甘为使，而益其中，补其不足；以通草之淡而通行其脉道与厥也。②《古方选注》：当归四逆不用姜、附者，阴血虚微，恐重劫其阴也，且四逆虽寒，而不至于冷，亦惟有调和厥阴，温经复营而已，故用酸甘以缓中，辛甘以温表，寓治肝四法，桂枝之辛以温肝阳，细辛之辛以通肝阴，当归之辛以补肝，甘、枣之甘以缓肝，白芍之酸以泻肝，复以通草利阴阳之气，开厥阴之络。③《医宗金鉴》：此方取桂枝汤君以当归者，厥阴主肝为血室也；佐细辛味极辛，能达三阴，外温经而内温脏；通草其性极通，善开关节，内通窍而外通营；倍加大枣，即建中加饴用甘之法；减去生姜，恐辛过甚而迅散也。

【临证举例】①血痹 《新中医》(1979; 2: 45): 患者周某，女，25岁。夜睡醒来，两手发麻，似蚁走感，手指活动不利，持针不便，但握力尚存。手微冷，触觉痛觉无异变，脉沉细而稍弦紧，舌淡苔白。此寒邪凝滞，经脉受阻，血行不运，肢端络脉失养之候，治以本方加川芎、黄耆、麻黄。两剂后症状减轻，再服三剂而愈。②早期雷诺氏病 《江苏中医》(1963; 6: 15): 此病病机属阳气虚弱不能温养四末，寒邪外袭，血脉凝滞所致。当用温阳活血，祛寒通散之法，当归四逆汤颇为适合。用本方治疗两例，1例用原方加艾叶、红花，服30余剂痊愈；1例服18剂痊愈。均经随访未见复发。③血栓闭塞性脉管炎 《上海中医药杂志》(1965; 8: 19): 本组10

例。症见下肢厥冷，剧烈疼痛，脉细涩，病程分别为2月~3年。以本方合普附汤、四妙勇安汤治疗。结果：9例痊愈，1例好转。④冻伤 《岳美中医案集》：赵某，男，30余岁。风雪交加，冻仆于地，爬行数里，偃卧于地而待毙，邻人发现后抬回，手足厥逆，卧难转侧。此冻伤，投本方，以厥回肢温为度。四剂后身起紫泡如核桃，转为冻疮。数日后即能转动，月余而愈。

33142 当归四逆汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】当归尾七分 附子(炮) 官桂 茴香(炒) 柴胡各五分 芍药四分 茯苓 玄胡索 川楝子各三分(酒煮) 泽泻二分

【用法】上咬咀，作一服。用水二盏半，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】疝气，脐腹冷痛相引腰膝而痛。

【方论选录】方以附子、肉桂甘辛大热，助阳退阴，用以为君。玄胡、茴香辛温，除下焦虚寒；当归辛温，和血止痛，故以为臣。芍药之酸寒，补中焦之气，又防热药损其肝阴；泽泻咸平，茯苓甘平，去膀胱中留垢；川楝子苦寒，酒煮之止痛，又为引用，乃下者引而竭之之意也；柴胡苦平，行其本经，故以为使也。

33143 当归四逆汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】当归 官桂 白芍药 细辛各一钱五分 甘草(炙) 通草各一钱 吴茱萸五分

【用法】上咬咀。用生姜五片，水煎熟，空心温服。

【主治】阴癰大如斗，诸药不能效者。

33144 当归四逆汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】附子一钱半(炮) 官桂一钱半 白芍一钱半(酒炒) 柴胡五分 当归三钱 吴茱萸一钱(醋炒) 楝子二钱(酒炒) 小茴三钱(醋炒) 泽泻一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阳虚寒疝，脉紧细者。

【方论选录】阳虚于下，寒束于经，虚阳不能布敷而经气被遏，故虚疝时时发作焉。附子补火扶阳，官桂温经散寒，当归养血荣经，白芍敛阴柔筋，柴胡升清阳以除邪，吴茱降逆气以下达，泽泻泻浊阴清肾府，小茴温经气却疝疾，川楝子泻湿热以平虚疝也。

33145 当归四逆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】全当归三钱 桂枝尖五分 北细辛三分（蜜炙） 鲜葱白一个（切寸） 生白芍三钱 清炙草五分 绛通草一钱 陈绍酒一瓢（冲）

【功用】滋阴通脉。

【主治】手足厥寒，脉细欲绝。

【方论选录】方中归、芍荣养血络为君；臣以桂、辛，辛通经脉，使经气通畅，络气自能四布，尤必佐以绛通、葱、酒者，一取其速通经隧，一取其畅达络脉；使以炙草，辛得甘助而发力愈速也。此为养血滋阴，活络通脉之良方。

【加减】如宿病寒疝，小腹痛甚，口吐白沫者，则加吴茱萸以止疝痛，生姜汁以止吐沫。

33146 当归失笑散

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】当归五钱 蒲黄（炒黑）五钱 五灵脂五钱

【用法】上为末。每服二钱，醋调熬成膏子，白滚汤送下。

【主治】产后心腹绞痛欲死，及儿枕作痛。

33147 当归白术丸

《鸡峰》卷十四。为《圣惠》卷五十九“白术丸”之异名。见该条。

33148 当归白术汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】白术一分 当归一分 桂枝一分（去皮） 附子一分（生，去皮，破八片） 生姜半两 甘草一分（炙） 芍药一分 人参

一分 黄耆一分

【用法】上锉如麻豆大。以水三升，煎取一升半，去滓，通口服一汤盏，食顷再服。温覆微汗愈。

【主治】妇人病未平复，因有所动，小腹急痛，腰膝疼，四肢不仁，举动无力，热发者。

【备考】本方方名，《永类铃方》引作“当归白术散”。

33149 当归白术汤

【方源】《三因》卷十。

【异名】当归茵陈汤（《杏苑》）。

【组成】白术 茯苓各三两 当归 黄芩 茵陈各一两 前胡 枳实（麸炒，去瓤） 甘草（炙） 杏仁（麸炒，去皮尖）各二两 半夏（汤洗七次）二两半

【用法】上锉散。每服四大钱，水二盏，加生姜七片，煎七分，去滓，食前服。

【主治】酒疸发黄，结饮癖在心胸间，心下纵横坚满，骨肉沉重，逆害饮食，小便赤黄，脉弦涩，此由本虚，饮食生冷，与脾胃痰结所致。

【备考】《直指》有葛根；《东医宝鉴·杂病篇》有葛根，无白术。

33150 当归白术汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】当归一钱二分 川芎 白术各一钱 黄连二分 黄芩 木通各四分 厚朴二分 白芍药八分 橘皮 熟地黄各五分 甘草（生）二分

【用法】上咬咀。水煎熟，空心热服。

【主治】血虚臌胀，腹胀形黑，时或见血，脉涩重似弱。

【加减】若产后血虚腹胀，去芩、连，加人参。

33151 当归白术散

《永类铃方》卷八。即《活人书》卷十九“当归白术汤”。见该条。

33152 当归立效散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】当归 大黄各一两 乳香一钱

【用法】上锉碎，分作三服。每服七钱，水二盏，煎至一盏半，去滓，食后、临卧温服。

【功用】凉血定痛。

【主治】眼睛疼痛。

33153 当归地黄丸

【方源】《产育宝庆》卷下。

【组成】当归 熟地黄 川芎 白芍药各二两 牡丹皮 延胡索各一两 人参 黄耆各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下，一日二次。

【功用】常服平养气血。

【主治】妇人血气不和，月事不匀，腰腿疼痛。

【方论选录】《济阴纲目》汪箕笈：禀弱者，先天之气弱也。血生于气，气生于下，故用熟地为君，人参佐之，以生下焦之气，使阴气旺而生血也；臣以乌梅以生液，而敛血入肝。夫既生矣，敛矣，而不为流行之，则血凝而不通，故以芎、归为使。其或瘀也，以赤芍破之；其或溃也，以炒蒲黄涩之，庶乎生而不壅，止而不塞，降中有升，温之而不热。细玩铢锱之多寡，便知立方之妙用。

33154 当归地黄丸

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】当归一两（大者，去芦，酒浸） 熟地黄（洗净，再酒浸一宿，焙干，切）二两 川芎一两 鹅卵矾二两（火煅，以盆覆地上出火毒） 黄耆（蜜炙）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心盐汤送下；或温酒服亦得。

【主治】男子妇人肠胃气伤，下血不止，或鲜血，或黑血，日夜频频；及血气衰弱，皮肤枯燥，腰脚疼痛，荣卫不足，浑身痠痛，血气虚，肌肤瘦者。

33155 当归地黄丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】怀熟地（酒蒸）八钱 山茱萸（酒蒸，去核） 山药（蒸） 泽泻（去毛） 牡丹皮（去梗） 白茯苓（去皮） 当归（酒洗）各三钱 一方加鹿茸（酥炙） 牛膝（酒洗）各四钱（去芦）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每用热水研化，食前服。仍以大南星炮去皮脐，研细末，入米醋调敷绢帛上，烘热贴之。

【主治】小儿血气不充，故肌瘦薄，骨节呈露，如鹤之膝。

33156 当归地黄汤

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】当归 芍药 川芎 白术 染槐子 黄药子各半两 生地黄 甘草 茯苓（去皮） 黄芩 白龙骨各一两

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】嗽血、衄血、大小便血；或妇人经候不调，月水过多，喘嗽者。

33157 当归地黄汤

【方源】《医学正传》卷七引《良方》。

【组成】当归一钱 熟地黄二钱

【用法】上细切。水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】胎痛。

33158 当归地黄汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身 白芍 熟地（俱酒洗） 人参 甘草 陈皮 桂各一钱

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】产后去血太多，肝虚胁下痛，喜人按，其气闪动肋骨，状若奔豚者。

33159 当归地黄汤

《周慎斋遗书》卷五。为《保命集》卷中“养血当归地黄散”之异名。见该条。

33160 当归地黄汤

【方源】《回春》卷四。

【异名】当归地黄散（《杂病源流犀烛》卷七）。

【组成】当归 熟地 生地 白芍（酒炒）

各一钱 人参五分 白术(去芦)一钱 茯苓(去皮) 黄耆(蜜炙)各一钱 黄柏(蜜水炒) 知母(蜜水炒) 陈皮各八分 甘草三分

【用法】上锉一剂，加大枣一个，浮小麦一撮，水煎温服。

【主治】盗汗，属气血两虚者。

33161 当归地黄汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】当归 白芍药 白术 苍术各一钱 黄耆七分五厘 熟地黄 橘皮各二分半 甘草(炙)一分半 柴胡一分 生地黄一分五厘

【用法】上咬咀。水煎熟，空心温服。

【主治】脾胃虚弱，经漏鲜血，时值秋初，困倦无力，不思饮食，身热闷乱，大便时泄。

33162 当归地黄汤

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】四物汤加秦艽 钩藤 天麻 防风

【用法】水煎服。

【主治】破伤风，营血虚者。

33163 当归地黄饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二三钱 熟地三五钱 山药二钱 杜仲二钱 牛膝一钱半 山茱萸一钱 炙甘草八分

【用法】水二钟，煎八分，空腹服。

【主治】肾虚，腰膝疼痛等证。

【加减】如下部虚寒，加肉桂一二钱，甚者仍加附子；如多带浊，去牛膝，加金樱子二钱，或加故纸二钱；如气虚者，加人参一二钱，枸杞二三钱。

33164 当归地黄散

《杂病源流犀烛》卷七。为《回春》卷四“当归地黄汤”之异名。见该条。

33165 当归地黄膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】当归一斤 生地黄一斤

【用法】俱用竹刀切碎，入瓷锅中，水浮于

药一手背，文武火煎。凡煎膏，只要用慢性人不疾不徐，不令焦与泛滥。凡盛膏须用净瓷瓶，每三四日在饭锅上蒸一次，使不生白花。凡服膏须自以意消息之。自觉因言因怒与劳伤气，精神短少，言语不接续，便服人参膏；若觉脾胃不和，饮食无味，便服白术膏；或血少生疮疡，肌肤燥痒，自汗遗精，便多服当归膏，平时二件间用，若嫌苦，人炼蜜一二匙。

【功用】补养。

【主治】血少生疮疡，肤燥痒，自汗遗精。

33166 当归芍药片

《重庆市中药成方制剂标准》。即《金匱》卷下“当归芍药散”改为片剂。见该条。

33167 当归芍药汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】当归一两半 芍药 人参 桂心 生姜 甘草各一两 大枣二十枚 干地黄一两

【用法】上咬咀。以水七升，煮取三升，去滓，分三服，每日三次。

【主治】产后虚损，逆害饮食。

【方论选录】《千金方衍义》：此以内外建中汤除去胶饴，易人人参、地黄，平调血气，虽有虚羸寒热，无不可治，岂特逆害饮食而已哉。

33168 当归芍药汤

《圣济总录》卷一六五。为《圣惠》卷七十九“当归散”之异名。见该条。

33169 当归芍药汤

【方源】《医学正传》卷七引《局方》。

【组成】白芍药一钱 当归 白茯苓 泽泻 白术 条芩各半钱 甘草 黄连 木香 槟榔各三分

【用法】上切细，作一服。水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】妊娠下痢赤白，腹中疝痛。

【加减】如白痢腹痛甚，有寒者，去芩、连，加干姜三分。

33170 当归芍药汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】当归 芍药各二钱

【用法】水煎，热服。

【主治】中暑下血，血痢腹痛。

33171 当归芍药汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】归须 生地 川芎 赤芍 丹皮 人参 甘草 天花粉 麦冬 泽泻 干姜 香附 陈皮 炒黑蒲黄

【主治】产后渴不止，由阴血去多，津液枯竭所致，病名曰血渴。

【方论选录】产后之渴，与伤寒常病之渴不同。产后血渴，血虚而渴也。血虚当补血，而必兼补气者，血脱则补气，气盛则血充也。是方四物而地用生，归用尾，芍用赤，补血、凉血、破血；丹皮、麦冬滋阴补水，以培天乙之源；花粉润肺止渴；泽泻引热下行；炒蒲黄以佐四物；附、陈、参、草补气行气；引以干姜，反治之义，防瘀未尽也。但其性辛热，宜临症酌用。

33172 当归芍药汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】柴胡二分 炙甘草 生地黄各三分 橘皮（不去白） 熟地黄各五分 黄耆一钱五分 苍术（泔浸，去皮） 当归身 白芍药 白术各二钱

【用法】上咬咀，如麻豆大，分作二服。水二盏半，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

【主治】妇人经脉漏下不止，其色鲜红，时值七月处暑之间，先因劳役，脾胃虚弱，气短气逆，自汗不止，身热闷乱，恶见饮食，沉懒困倦，四肢无力，大便肘泄，后再因心气不足，经脉再下不止，惟觉气下脱，其元气逆上全无，惟觉心腹中气下行，气短少，无力以言。

【临证举例】崩漏《济阳纲目》：予族一妇，因劳役下血，每来两旬不止，医者拘血热之说，用四物加芩、连，累治不愈。一日血大

下，昏迷不醒，急以问予，予用此药一剂，少顷顿醒，过两小时血遂止，后常用此药，其病遂不发作。

33173 当归芍药汤

《济生》卷九，为《金匱》卷下“当归芍药散”之异名。见该条。

33174 当归芍药汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地 黄耆 香附 柴胡

【用法】水煎，食前服。

【主治】妇人淋病，出三四色，内热口干，小腹日夜并痛。

33175 当归芍药汤

【方源】《云岐子脉诀》卷四。

【组成】当归 白芍药 熟地黄各一两 干姜半两

【用法】上咬咀。每服一两，水煎，食前服。

【功用】养血补虚。

【主治】崩中白帶。

33176 当归芍药汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身 人参 白芍（酒炒） 白茯苓各一钱 炙草 木香各五分 枳壳（炒）七分 黑干姜五钱 陈皮一钱 乌梅一个

【用法】水煎，食前服。

【功用】行气和血。

【主治】虚痢，无新旧食积，下痢赤白，腹痛窘迫，脉沉数者。

33177 当归芍药汤

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】白芍药四两 当归三两 白茯苓一两 泽泻一两 川芎二两 炙草二两

【用法】上为细末。每服三钱，食前温酒调下；蜜丸亦可。

【主治】妊娠腹中绞痛，心下急痛者。

33178 当归芍药汤

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】当归 芍药 白术各一钱 牡丹皮 桃仁 梔子（炒黑）各八分 甘草三分

青皮五分

【用法】以水一盞半，煎七分，空腹服。

【主治】咳血。

33179 当归芍药汤

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】当归 川芎各一钱五分 芍药(酒炒)三钱 生地 黄连(酒炒) 木香各一钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】血虚而下血痢。

33180 当归芍药汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】当归 白芍 熟地 川芎 柴胡 升麻 防风

【主治】产后内虚气乏而下痢者。

33181 当归芍药汤

《张氏医通》卷十五。即《千金》卷三“人参当归汤”去竹叶，加生姜。见该条。

33182 当归芍药汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】当归 白芍 枳壳(面炒) 山楂 各一钱 厚朴八分 陈皮六分 木香三分 甘草四分 黄芩二钱

【用法】水煎服。

【主治】妊娠下痢赤白，腹中疼痛，心下结满。

【宜忌】忌生冷。

33183 当归芍药汤

《金鉴》卷五十三。为《保命集》卷中“芍药汤”之异名。见该条。

33184 当归芍药汤

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】当归 白术 赤芍 茯苓 泽泻 黄芩 辛夷花 白菊花 干地龙 甘草 薄荷 川芎

【功用】调和气血，行滞化瘀。

【主治】慢性鼻炎，鼻甲肿实色暗，呈桑椹样，鼻塞无歇，涕多或黄稠或粘白，嗅觉迟钝，语言不畅，咳嗽多痰，耳鸣不聪，舌质红或有瘀点，脉弦细。

【加减】头痛者，加白芷、藁本；咳嗽痰多者，加桔梗、杏仁。

33185 当归芍药饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归五钱 赤芍三钱 生地四钱 防风三钱 黄芩三钱 栀子三钱 牛蒡子三钱(炒) 连翘三钱 大黄四钱 白芷三钱 红花三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】风赤疮痍症。(沙眼胞性湿疹)。

33186 当归芍药散

【方源】《金匱》卷下。

【异名】当归芍药汤(《济生》卷九)、当归茯苓散(《普济方》卷三三九)。

【组成】当归三两 芍药一斤 茯苓四两 白术四两 泽泻半斤 芎藭半斤(一作三两)

【用法】上为散。每服方寸匕，酒和服，一日三次。

【功用】《金匱要略方义》：养血调肝，健脾利湿。

【主治】妇人妊娠或经期，肝脾两虚，腹中拘急，绵绵作痛，头晕心悸，或下肢浮肿，小便不利，舌质淡、苔白腻者。现子纠正胎位。

①《金匱》：妇人怀妊，腹中疝痛；妇人腹中诸疾痛。②《三因》：产后血晕，内虚气乏，崩中，久痢。③《金匱要略今释》引汤本氏：眩冒心悸，或心下悸，肉瞤筋惕。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：此与胞阻痛不同，因脾土为木邪所克，谷气不举，浊淫下流，以塞搏阴血而痛也。用芍药多他药数倍以泻肝木，利阴塞，以与芎、归补血止痛；又佐茯苓渗湿以降子小便也；白术益脾燥湿，茯、泽行其所积，从小便出。盖内伤六淫，皆能伤胎成痛，不但湿而已也。②《金匱要略论注》：疝痛者，绵绵而痛，不若寒疝之绞痛，血气之刺痛也。正气乃不足，使阴得乘阳，而水气胜土，脾郁不伸，郁而求伸，土气不调，则痛绵绵矣。故以归、芍养

血，苓、术扶脾，泽泻泻其余之蓄水，芎芩畅其欲遂之血气。不用黄芩，疝痛因虚，则稍挟寒也。然不用热药，原非大寒，正气充则微寒自去耳。

【临证举例】①纠正胎位《新医药通讯》(1972; 5: 49): 用当归芍药散纠正妊娠七个月以上胎位不正者 100 例，复查 87 例，胎位转正者 78 例，未转正者 9 例。对 63 例(其余尚未分娩)追踪观察结果，分娩时头位 56 例，足位 3 例，臀位 2 例，横位 2 例。说明对妊娠七个月以上胎位异常者，本方能促进胎位转为正常。但在分娩时，发现少数产妇又转为异常胎位，提示胎位还会反复变动。②经后腹痛《新医学杂志》(1979; 3: 45): 郑某，女，30 岁。患经后腹痛已半年，近月加剧，前来诊治。体矮小、孱弱，年幼多疾，初潮后月经不调，经期尚准，经后下腹拘急胀痛，时痛时止，时喜按，时按之反剧。舌苔薄腻，脉小弦。此肝肾不足，气滞湿阻之腹痛。治以当归芍药散合枳实芍药散加味。处方：茯苓、全当归各 12 克，白芍、白术、川芎各 9 克，枳实 6 克，菟丝子、丹参各 18 克，川断、桑寄生各 15 克。服五剂后，腹痛已除，腰痠已愈，精神亦振，并嘱下次月经后再服此方。隔二月后随访，经后下腹已无痛感。

【备考】本方改为丸剂，名“六气经纬丸”(见《元和纪用经》)。改为片剂，名“当归芍药片”(见《重庆市中药成方制剂标准》)。

33187 当归芍药散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】当归 白芍 川芎 茯苓 泽泻 陈皮 砂仁 白术 甘草 香附 木香 乌药 紫苏 葱白

【主治】妊娠因宿冷在于上、中二焦，或脏气虚，新触风寒，邪正相搏，心腹俱痛，痛伤胞络，必致胎动不安。

【方论选录】是方陈、术、砂、附、乌药祛心腹上下之宿冷客寒，葱、苏、芎、苓兼能解达寒邪，归、芍、白术自能保护胎气，微

嫌泽泻一味为不可解也。

33188 当归芍药汤

《鸡峰》卷十七。为《圣济总录》卷一五四“当归汤”之异名。见该条。

33189 当归百合汤

【方源】《周慎斋遗书》卷七。

【组成】归身三钱 熟地 麦冬各一钱半 川芎一钱 沙参 甘草 香附 橘红各八分 桔梗五分 小麦一钱 大枣三个

【用法】煎汤服。

【主治】阴虚证。

33190 当归百解散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】当归 赤芍 大黄 川芎 升麻 薄荷叶 干葛 麻黄 黄芩 甘草 枳壳 皂角刺

【用法】葱、姜为引。

【主治】小儿惊风后，风从气行，血从气使，毒气蓄于皮肤，流为肿毒，多在腮颊、耳根间，成痈成疔，谓之毒风。

【备考】原书治上症，外用拂毒散敷之。

33191 当归血竭丸

【方源】《产育宝庆》卷下。

【组成】当归(炒，锉) 血竭 蓬莪术(炮) 芍药各二两 五灵脂四两

【用法】上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，温酒送下，或温粥饮送下，空心食前服。

【主治】妇人产后，恶物不下，结聚成块，心胸痞闷，脐下坚痛。

33192 当归血竭散

《御药院方》卷八。为《圣惠》卷六十七“麒麟血散”之异名。见该条。

33193 当归合气散

《摄生众妙方》卷九。为原书同卷“接骨膏”之异名。见该条。

33194 当归羊肉汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】羊肉一两(水煮烂如稀糊) 当归末(酒炒) 三两 山药末二两 白术末(土

炒)三两 砂仁末一两 杜仲末(盐水炒)二两 白糯米一升

【用法】同煮如食粥法，日三服，夜一服。若嫌味苦，或暑天味变，捣成饼，晒干再磨，炼蜜为丸。每服一钱，日二夜一服。

【主治】妊娠阴吹之病，子室内聒聒有声，如矢气状，或赤白带，或先有浊气臭液出流阴户，然后有声。此系足少阴、厥阴二经血虚所致。失久不治，必致漏而半产。

【方论选录】是方羊肉补形，人参补气，主治虽异，功用则同。羊肉甘温能补阴血，配当归、白术之苦温，和营健脾；山药、杜仲之苦涩固肾益精，砂仁之辛温，糯米之甘凉和中益胃。

33195 当归羊肉汤

《妇人良方》卷二十一。即《外台》卷三十四引《许仁则方》“羊肉当归汤”。见该条。

33196 当归羊肉汤

【方源】《医方集成》引《济生》(见《医方类聚》卷二三八)。

【异名】羊肉汤(《普济方》卷三四九)。

【组成】当归(去芦，酒浸) 人参各七钱 黄耆(去芦)一两 生姜半两

【用法】上咬咀。用羊肉一斤，煮清汁五大盏，去肉，入前药煎四盏，去滓，作六七服，早、晚三四服。

【功用】收汗，止痛。

【主治】产后蓐劳发热，自汗，肢体痛。

【方论选录】《医方集解》：此手足太阴，厥阴药也。参、耆补气而固卫；当归养血而调荣；生姜辛温，引气药入气分而生新血；羊肉甘热，用气血之属以补虚劳，热退而汗收矣。

33197 当归导气汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】当归一钱 甘草一分半 芍药一钱 青皮七钱 槐花七分 生地黄一钱半或二钱(酒浸，阴干)

【用法】上为末。水煎，食前温服。

【主治】脓血痢无度，小便不通，腹中痛。

【加减】如后重，加木香、槟榔各三分，泽泻半钱；如小便利，去泽泻。

33198 当归导气汤

【方源】《准绳·类方》卷六引东垣方。

【组成】甘草一钱半 当归 芍药各一钱 木香 槟榔各三钱 青皮 槐花(炒)各七分 泽泻七分 生地黄一钱半或二钱(酒浸，阴干)

【用法】上为末。用水煎，食前温服。

【主治】滞下。

【加减】如小便利，去泽泻。

33199 当归导气散

《张氏医通》卷十四。为《医学发明》卷三“当归导滞散”之异名。见该条。

33200 当归导滞汤

【方源】《玉机微义》卷十七。

【组成】大黄 当归各等分

【用法】上咬咀。每服一两或半两，水煎服。

【主治】①《玉机微义》：跌仆堕击损伤，血滞于中。②《正体类要》：跌仆瘀血在内，胸腹胀满，或大便不通，或喘咳吐血。

【备考】本方改为散剂，名“当归导滞散”(见《正体类要》)。

33201 当归导滞汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】当归一两 白芍一两 莱菔子四钱 车前子(炒，研) 枳壳(麸炒) 槟榔 甘草(炙)各一钱

【用法】水煎，入蜜温服。

【主治】痢疾。

【加减】红痢，加桃仁；热，加黄连二钱，黄芩二钱；日夜无度，或里急后重之甚者，再加大黄、木香；温病后痢疾，加白僵蚕、蝉蜕。

【方论选录】此方之奇妙，全在当归、白芍。盖泄泻最忌当归之滑，而痢疾最喜其滑也；白芍味酸，入肝以和木，使木不侵脾土；枳壳、槟榔消逐湿热之邪；车前分利其水湿，而又

不耗真阴之气；莱菔辛辣，除热去湿，又能上下通达，消食利气，使气行于血分之中，助归、芍以生新血而荡涤其瘀血也，加甘草、蜂蜜以和中，则又无过烈之患，奏功之神奇，实有妙理耳。

33202 当归导滞汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】大黄一钱 当归三钱 麝香少许 丹皮三钱 桃仁三钱 红花一钱 白芍三钱 乳香三钱 没药三钱 生地三钱 桂枝三钱 柴胡二钱 黄芩三钱 枳壳一钱 甘草一钱

【主治】跌打损伤，内外瘀血。

【方论选录】此方综合通窍活血、桃仁承气、小柴胡、小调经诸方之义。

33203 当归导滞散

【方源】《医学发明》卷三。

【异名】当归导气散（《张氏医通》卷十四）。

【组成】川大黄一两 川当归一分 麝香少许

【用法】上除麝香另研外，为极细末，研匀。每服三钱，食前热酒一盏调下。

【主治】①《医学发明》：落马坠车，打扑损伤瘀血，大便不通，红肿青黯，疼痛昏闷，蓄血内壅欲死。②《张氏医通》：跌扑瘀血内壅，喘急便秘。

33204 当归导滞散

《正体类要》卷下。即《玉机微义》卷十七“当归导滞汤”改为散剂。见该条。

33205 当归防风散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】当归 防风 川芎 生地 白芷 羌活 人参

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】伤寒汗多亡血发痒。

【加减】恶寒自汗，加桂枝、白术。

33206 当归防葵丸

《普济方》卷三九一。即《幼幼新书》卷二十二引《婴童方》“防葵丸”去桔梗，加枳壳。见该条。

33207 当归红花汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】当归 红花

【功用】调血养血。

【主治】蓄血，蓄结既行。

【加减】血虚有停瘀，加山楂、桃仁。

33208 当归红花饮

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】当归（酒炒） 红花 葛根 连翘 牛蒡子 甘草（一书有升麻，一书有生白芍、桔梗）

【主治】麻已出而复收。

33209 当归红花酊

【方源】《浙江中草药制剂技术》。

【组成】当归 150g 红花 50g 60%乙醇适量

【用法】取当归切成薄片后与红花混匀，按浸渍法浸渍七天，制成酊剂 1000 毫升即得。每次口服 2~5 毫升，每日三次。

【功用】调经养血。

【主治】月经不调，痛经。

33210 当归赤芍汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】全当归六钱 延胡索三钱 桃仁泥三钱 红木香一钱五分 赤芍五钱 红花二钱（炒） 枳壳三钱（炙） 地榆三钱（炒） 银花三钱（炒） 山楂肉三钱 藕节三个

【主治】赤痢腹痛，里急后重，乃湿热伤于小肠血分。

33211 当归连翘汤

【方源】《普济方》卷八十三引《卫生家宝》。

【组成】当归三分 黄连五分 甘草三分 连翘四分 南黄柏五分

【用法】上作一服，水二盏，煎一盏，去滓，热洗之。

【主治】眼白睛红，隐涩难开。

33212 当归连翘汤

【方源】《幼科类萃》卷二十五。

【组成】当归尾 连翘 川白芷各三钱
大黄(煨) 甘草各一钱

【用法】上咬咀。用水一小盏煎，食前服。

【主治】①《幼科类萃》：小儿心脾有热，舌下有形如舌而小者，谓之重舌。②《回春》：重舌，及唇口两旁生疮。

33213 当归连翘汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归 连翘 防风 黄芩 荆芥 白芷 芍药 生地 山梔 白术 人参 阿胶 地榆各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加乌梅一个，大枣一个，水煎，食前服。

【主治】痔漏。

33214 当归连翘饮

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 生地黄 川芎 连翘 防风 荆芥 白芷 羌活 黄芩 山梔 枳壳 甘草各等分 细辛减半

【用法】上锉一剂。水煎，食远服。

【主治】牙齿病，开口呷风则痛甚者，胃肠中有风邪也；开口则臭不可闻者，胃肠中有积热也。

33215 当归连翘散

【方源】《女科万金方》

【组成】当归 连翘 大黄 山梔 芍药 金银花

【主治】①《女科万金方》：一切风热痛疮，大小便结滞喉舌之症。②《普济方》：脑疽、发背、诸恶疮，咽颊不利，舌肿喉闭，鼻衄出血，咳嗽痰实。

【备考】《普济方》本方用法：上为粗末。每服二钱，酒一盏半，煎至六分，去滓，食后温服，一日三次。一方加生姜五片，水煎服。方中金银花，《普济方》作“鹭鹭藤”。

33216 当归连翘散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】当归 连翘 前胡 甘草 枳壳 桔梗 黄芩 玄参 生地黄 鼠粘子 天花

粉 白芍药

【用法】水二钟，加灯心，水煎服。

【主治】锁喉疮，心经毒气，小肠风邪，发于听会之端，注于悬壅之侧，初生如瘰癧，不能饮食，闭塞难通，渐次肿破化脓。

【备考】本方方名，《喉科枕秘》引作“连翘当归散”。

33217 当归连翘散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】当归 连翘 梔子仁 芍药 金银藤各一两 黄芩五钱

【用法】上咬咀。每服五钱，用水二盏，煎至七分，空心温服。

【主治】发背，痈疽，发脑，发鬓，发髻；又治脑虚头晕，风湿之症。

【加减】要行者，加大黄二钱，待药熟，入大黄煎一二沸，去滓服。

33218 当归连翘散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】当归 连翘 黄芩 山梔 荆芥 防风 款冬花 忍冬藤 大黄 升麻 生姜

【用法】加酒煎服。

【主治】腹痈，脐中出脓，失护进风，角弓反张。

33219 当归没药丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】没药(研) 丁香各三分 木香一两 丁香皮 桂(去粗皮) 麒麟竭(研) 延胡索 干漆(炒烟出) 牡丹皮 当归(锉，炒) 肉豆蔻各半两 槟榔一两(锉) 安息香 乳香各一两(二味同捣末，再用酒研，滤去滓，银器内熬成膏)

【用法】上十二味为末，以二香膏和丸，如膏少即少入炼蜜，丸如梧桐子大，以丹砂为衣。每服二十丸，至三十丸，温酒或生姜汤送下，早、晚食前各一服。

【主治】妇人血气不调，月水滞涩，身体麻痹痒疼痛，饮食减少，面黄肌瘦，背脊拘急，骨间痠痛，多吐清水，脐腹胀闷。

33220 当归没药丸

【方源】《产乳备要》。

【组成】当归(锉,炒) 没药 天仙子(炒黑色) 干姜(炮) 苍术(炒黄色) 芍药 熟干地黄 川芎各等分

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前温粥饮送下。

【主治】妇人真气虚惫,血气极少,不能荣养,致使经气不来,或发寒热,饮食减少;怠惰嗜卧,以致虚劳。

33221 当归没药丸

《妇人良方》卷四。为《圣济总录》卷一五〇“当归丸”之异名。见该条。

33222 当归羌活汤

《医学正传》卷六。为《医学纲目》卷十八“羌活当归汤”之异名。见该条。

33223 当归羌活汤

【方源】《活人心统》。

【组成】当归身(酒浸) 羌活 半夏 陈皮 川芎 甘草 红花 酒芩 芍药 北梗 细辛 贝母 姜

【用法】水煎,空腹服,滓再煎服。

【主治】咳嗽,血少痰多,臂疼胁痛。

【加减】热甚者,加竹沥、姜汁;痰入肢体,加白芥子。

33224 当归羌活汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参(去芦,炒)二钱 当归 秦艽 独活 钩藤各一钱五分 白芍(酒炒) 羌活各一钱 炙草七分

【用法】加生姜二片,水煎服。

【主治】风中经络,口眼喎斜,手足拘急。

33225 当归羌活汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】当归二钱 川芎一钱 白芍(酒炒) 羌活 独活各一钱五分 炙草七分

【用法】加生姜二片,水煎服。

【主治】历节风证。

【加减】热,加黄芩、黄柏各一钱;寒,加肉桂四分、制附子六七分或一钱;小便不利,

加茯苓一钱五分。

33226 当归补中汤

【方源】《女科指掌》卷四。

【组成】当归 川芎 阿胶 艾叶 甘草 人参 黄耆 杜仲 白术 白芍 北味

【用法】水煎服。

【主治】过期不产者。

33227 当归补血汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归(去尾)一两二钱 炙黄耆一两 生姜三片 大枣五个

【用法】水煎服。每日一剂

【主治】妇人气虚血少,经水三月一来,名曰居经,艰于子息,其脉微而涩。

【方论选录】脉微而涩,微者,阳气虚;涩者,阴血少。黄耆味甘温,以补气;当归味辛温,以补血。耆救其脉之微,归救其脉之涩。更有姜、枣之一辛一甘以和营卫,立方之最当者。每日一剂,气血自然充满。

33228 当归补血汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】黄耆当归汤(《兰室秘藏》卷上)、补血汤(《脉因症治》卷上)、耆归汤(《周慎斋遗书》卷五)、黄耆补血汤(《产科心法》下集)。

【组成】黄耆一两 当归(酒洗)二钱

【用法】上咬咀,作一服。水二盏,煎至一盏,去滓,空心、食前温服。

【功用】《中医方剂学讲义》:补气生血。

【主治】劳倦内伤,气血虚弱,阳浮于外,肌肤燥热,面红目赤,烦渴引饮,脉洪大面虚,以及妇人经行、产后血虚发热头痛;或疮疡溃后久不愈合者。

①《内外伤辨》:肌热,燥热,困渴引饮,目赤面红,昼夜不息,其脉洪大而虚,重按全无。此病得之于饥困劳役。②《兰室秘藏》:热上攻头目,沿身胸背发热。③《口齿类要》:口舌生疮,血气俱虚,热渴引饮,目赤面热,脉大而虚,重按全无。④《准绳·

疡医》：疮疡溃后，气血俱虚而见上证者。⑤《寿世保元》：妇人素禀怯弱，血气虚耗，产后无乳。⑥《济阴纲目》：产后血脱，烦燥引饮，昼夜不息，脉洪大而虚，重按全无者。⑦《傅青主女科》：产妇气血两脱，子方下地，即昏晕不语。

【宜忌】《医方发挥》：阴虚潮热者慎用。

【方论选录】①《医方考》：血实则身凉，血虚则身热。或以饥困劳役虚其阴血，则阳独治，故令肌热、目赤、面红、烦渴引饮。此证纯象伤寒家白虎汤之证，但脉大而虚，非大而长，为可辨耳。《内经》所谓脉虚血虚是也。当归味厚，为阴中之阴，故能养血，而黄耆则味甘补气者也。今黄耆多于当归数倍，而曰补血汤者，有形之血不能自生，生于无形之气故也。《内经》曰：阳生阴长，是之谓尔。②《成方便读》：如果大脱血之后，而见此等脉证，不特阴血告匱，而阳气亦欲散亡。斯时也，有形之血不能速生，无形之气所当急固。故以黄耆大补肺脾元气而能固外者为君。盖此时阳气已去里而越表，恐一时固里不及，不得不从卫外以挽留之。当归益血和营，二味合之，便能阳生阴长，使伤残之血，亦各归其经以自固耳。非区区补血滋腻之药，所可同日语也。

【临证举例】①血虚发燥《正体类要》：有一患者，扑伤之后，烦躁面赤，口干作渴，脉洪大，按之如无。余曰：此血虚发燥也。遂以当归补血汤，二剂即止。②虚劳发热《寿世保元》：一人虚劳发热，自汗。诸药不能退其热者，服当归补血汤一剂如神。

【现代研究】当归补血汤及其单味药对鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响《新医药学杂志》(1979; 3: 56)：从当归补血汤及单味药黄耆、当归对巨噬细胞吞噬功能的影响的实验中可以看出：黄耆水煎剂组能明显增强巨噬细胞的吞噬功能；当归补血汤水煎剂组稍逊于黄耆水煎剂组，而当归水煎剂组与对照组比较未见到明显差异。当归补血汤水煎剂

组的作用稍逊于黄耆水煎剂组，并非由于当归存在拮抗作用，因为当归水煎剂组没有抑制巨噬细胞吞噬功能现象，而可能是由于复方中黄耆的浓度较低的关系，当归补血汤水煎剂中黄耆含83%，而单味黄耆水煎剂中含100%。

33229 当归补血汤

【方源】方出《妇人良方》卷十五，名见《玉机微义》卷五。

【组成】糯米一合 当归(炒) 黄耆各一两

【用法】上细切，和停。以水二盏，煮取一盏二分，去滓，分四次温服。

【主治】妊娠下痢腹痛，小便涩。

【备考】本方方名，《医统》引作“当归黄耆饮”，《景岳全书》引作“当归黄耆汤”。

33230 当归补血汤

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】熟地黄 当归各六分 川芎 牛膝 白芍药 炙草 白术 防风各五分 生地黄 天门冬各四分

【用法】作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【主治】男子衄血、便血，妇人产后、崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，不能视物，羞明痰涩，眼睫无力，眉骨太阳俱各痠痛。

【加减】恶心不进食者，加生姜。

【方论选录】上方专补血，故以当归、熟地黄为君，川芎、牛膝、白芍药为臣，以其祛风续绝定痛而通补血也。甘草 白术，大和胃气，用以为佐。防风升发，生地黄补骨，天门冬治血热，谓血亡生风燥，故以为使。

33231 当归补血汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷七。

【组成】黄耆三两 当归五钱(酒浸) 防风 羌活各一钱 荆芥穗一钱半 甘草半钱

【用法】水煎服。

【主治】一切去血过多，因无血养筋，令人四肢挛急，口噤如痙。

33232 当归补血汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归 生地黄 川芎 白芍各一钱 防风五分 荆芥四分 藁本四分 黄芩一钱(酒炒) 柴胡五分 蔓荆子五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血虚头痛。

33233 当归补血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 芍药 生地黄 熟地黄各三钱 人参五分 白术(去芦) 茯苓(去皮) 麦门冬(去心) 山梔仁(炒) 陈皮各八分 甘草三分 辰砂(研末, 临服入)二分 乌梅一个(去核) 炒米一百粒

【用法】上锉一剂。加大枣二个, 水煎温服

【主治】心血少而嘈, 兼治惊悸怔忡。

33234 当归补血汤

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】红花五钱 黄耆 当归 独活各一两

【用法】水一钟, 煎服。

【主治】打伤, 血气不足。

【宜忌】忌风

【加减】有风, 加羌活一两。

33235 当归补血汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地 防风 连翘 羌活 独活 乳香 没药 白芷 续断 杜仲

【用法】上加生地黄煎, 入童便和服。不可用酒。

【功用】止痛兼补。

【主治】金刃所伤及跌磕打扑, 皮肉破损, 亡血过多。

【宜忌】若皮肉不破损者, 宜作瘀血停积治之。

【加减】气虚, 加人参、白术、黄耆。

33236 当归补血汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 黄耆 柴胡 白芍药

【主治】三阴久疟不愈, 并一切血虚发热。

【宜忌】邪盛者不可用。

33237 当归补血汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】当归五钱 黄耆一两 荆芥(炒黑)三钱 人参三钱 白术五钱 生地五钱

【用法】水煎服。

【主治】血热妄行, 九窍流血, 气息奄奄, 欲卧不欲见日, 头晕身困。

33238 当归补血汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】黄耆五钱 当归一两 熟地五钱

【用法】水煎服。

【主治】男子血少, 面色痿黄, 不能生子者。

【方论选录】方中用当归为君, 用黄耆为臣, 佐之熟地之滋阴, 是重在补血, 轻在补气, 自然气以生血, 面非血以助气, 气血两旺, 无子者易于得子, 根深本固, 宁至有夭殇之叹哉。

33239 当归补血汤

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】薄荷五分 羌活五分 羌藟子一钱 柴胡八分 蒺藜一钱 菊花八分 防风八分 甘草四分 生地黄二钱 当归一钱五分 白芍药一钱 川芎八分

【用法】上为粗末。以水二盏, 煎至一盏, 去滓, 食后温服。

【主治】经行去血过多, 肝经虚损, 眼目涩痛, 头痛眩晕, 肿涩难开, 生翳于黑睛上, 或如粟米, 或花翳白陷。

33240 当归补血汤

【方源】《金匱翼》卷三。

【组成】黄耆一两 当归二钱 生地黄五钱 生草一钱

【用法】上作一服。水煎, 食前温服。

【主治】血虚发热。

33241 当归补血汤

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】当归 黄芩(炙) 茯苓

【主治】产后乍寒乍热, 血虚而渴。

33242 当归补血汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】荆芥穗 当归 生地 熟地 川芎 赤芍 黄耆 陈皮

【用法】加大枣二个，乌梅一个，水煎服。

【主治】虚损劳瘵，吐血泻血，女人产后，或崩漏，或诸血失道妄行，眼花头晕，渐至吐血不止，或干血癆。

33243 当归补血散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 川芎 白芍药 防风 细辛 菊花 甘草 车前子 蒺藜 白术 羌活 羌蔚子 薄荷各一两 大黄五钱

【用法】每服八钱，水煎，入酒三盏，温服。

【主治】妇人肝虚，遇行经之际，眼目疼痛，肿涩难开，头痛眩晕，生翳于黑睛上，或如粟米，或如花翳白陷者。

33244 当归良姜散

《产乳备要》。为《全生指迷方》卷三“良姜散”之异名。见该条。

33245 当归灵没丸

《医级》卷九。为《圣济总录》卷一五〇“当归丸”之异名。见该条。

33246 当归阿胶汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】当归二钱 白芍一钱半 熟地三钱 茯苓二钱 阿胶三钱（制） 麦冬一钱半 栝楼仁（去油）一钱 甘草一钱

【用法】加大枣三枚，水煎，空腹服。

【主治】一切干燥，口渴便焦，津涸血枯。

【加减】如渴甚，加花粉二钱；如大便干焦，加肉苁蓉二三钱、蕤蕤七钱；或再加火麻仁、郁李仁各二钱；血燥，加桃仁捣膏调服、红花五分；如大便风秘，加秦艽三钱、防风一钱半。

33247 当归阿胶散

【方源】《圣济总录》一五四。

【组成】当归（切，焙） 阿胶（炙燥）各半两 龙骨二分半 地榆 蒲黄（炒）各三分 熟干地黄（焙） 黄牛角觔（炙焦）各一

两 熟艾半分

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹米饮调下，一日三次。

【主治】漏胎，下血不止。

33248 当归附子汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归二分 炒盐三分 蝎梢 升麻各五分 甘草六分 柴胡七分 黄柏少许（为引用） 附子一钱 干姜 良姜各一钱

【用法】上为粗末，每服五钱，水五盏，煎至一盏，去滓，稍热服；或为细末，酒、面糊为丸，亦可。

【主治】妇人脐下冷痛，赤白带下。

33249 当归附子汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】川芎 当归 熟地 芍药 附子 阿胶 地榆 甘草 干姜 乌梅 赤石脂

【用法】加生姜，水煎，磨墨调服。

【主治】阴症下利脉血。

33250 当归拈痛汤

【方源】《医学启源》卷下。

【异名】拈痛汤（《兰室秘藏》卷中）、当归止痛汤（《便览》卷一）。

【组成】羌活半两 防风三钱 升麻一钱 葛根二钱 白术一钱 苍术三钱 当归身三钱 人参二钱 甘草五钱 苦参（酒浸）二钱 黄芩一钱（炒） 知母三钱（酒洗） 茵陈五钱（酒炒） 猪苓三钱 泽泻三钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服一两，水二盏半，先以水拌湿，候少时，煎至一盏，去滓温服。待少时，美膳压之。

【主治】湿热为病，肢节烦痛，肩背沉重，胸膈不利，遍身疼，下注于胫，肿痛不可忍。

【方论选录】《经》云：湿淫于内，治以苦温。羌活苦辛，透关节而胜湿；防风甘辛，温散经络中留湿，故以为君。水性润下，升麻、葛根苦辛平，味之薄者，阳中之阳，引而上行，以苦发之也。白术苦甘温，和中除湿；苍术体轻浮，气力雄壮，能去皮肤腠理

之湿，故以为臣。血壅而不流则痛，当归身辛温以散之，使气血各有所归。人参、甘草甘温，补脾养正气，使苦药不能伤胃。仲景云：湿热相合，肢节烦痛，苦参、黄芩、知母、茵陈者，乃苦以泄之也。凡酒制药，以为因用。治湿不利小便，非其治也，猪苓甘温平，泽泻咸平，淡以渗之，又能导其留饮，故以为佐。气味相合，上下分消，其湿气得以宣通矣。

【备考】《便览》有茯苓。

33251 当归拈痛汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】当归三钱 羌活一钱半 苍术一钱半（炒） 防风一钱半 白术一钱半（炒） 黄芩一钱半（酒炒） 泽泻一钱半 黄柏一钱半（酒炒） 猪苓一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】湿热脚气，表邪不解，脉浮数者。

【方论选录】湿热不化，经气不得流行，故发热身痛，足胫肿痛，为湿热脚气，表邪不解焉。羌活散邪于表，黄芩清热于里，苍术燥湿强脾气，白术燥湿健脾元，防风疏腠理以散风，黄柏清湿热以存阴，泽泻泻膀胱之湿，猪苓利三焦之湿，当归养血以舒筋脉也。水煎温服，使表邪解散，则湿热顿消，而经气流行，营血灌溉，安有发热身痛脚气之患乎？此强中分解之剂，为湿热脚气表不解之专方。

33252 当归拈痛汤

【方源】《医门补要》。

【组成】苦参（炒） 海南子 当归 茵陈 独活 木通 防己 川柏（炒） 苏叶 苍术 知母 木瓜

【主治】湿脚气。

33253 当归拈痛散

【方源】《玉案》卷二。

【组成】当归 防风 黄耆各一钱 甘草五分 黄柏 玄参 人参 茯苓 白术 苍术各八分 干葛 升麻 知母 茵陈 羌活

各六分

【用法】水二钟，煎八分服。

【主治】湿热为病，肢节烦疼，肩背沉重，流注足胫，痛不可忍，口干壮热，两足湿毒疮痛痒。

33254 当归拈痛散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】当归 苦参 人参 猪苓 泽泻 羌活 黄芩 苍术 白术 茵陈 葛根 升麻 防风 知母 茯苓 甘草

【主治】两足或左或右忽肿而痛者，乃湿热也，恐成脚气。

33255 当归和血汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归二钱 川芎一钱五分 白芍（炒）一钱 生地（炒）一钱五分 熟地一钱五分 香附（酒醋和炒）一钱二分 鳖甲（酥炙）一钱二分 丹皮一钱五分 丹参二钱 川断一钱五分 秦艽一钱五分 红花少许

【主治】妇女血热气滞，经水乍多乍少。

【方论选录】是方四物为君，生地、二丹补血凉血，红花、香附行气祛滞，秦艽祛血分之风、鳖甲色青，入东方肝木，滋阴养血，川断得秦艽能行周身经络，使关节通利，气行血和矣。

33256 当归和血汤

《济阳纲目》卷六十三。为《脾胃论》卷下“当归和血散”之异名。见该条。

33257 当归和血饮

【方源】《慈幼心传》。

【组成】四物汤加连翘 牡丹皮 荆芥 防风

【主治】疮疥。

33258 当归和血饮

《疡科选粹》卷三。为《儒门事亲》卷十五“当归活血散”之异名。见该条。

33259 当归和血散

《医方类聚》卷一九二引《神效名方》。为《儒门事亲》卷十五“当归活血散”之异名。见该条。

33260 当归和血散

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】槐花散（《兰室秘藏》卷下）、当归和血汤（《济阴纲目》卷六十三）。

【组成】川芎四分 青皮 槐花 荆芥穗 熟地黄 白术各六分 当归身 升麻各一钱

【用法】上为细末。每服二三钱，清米饮汤调下，食前服。

【主治】肠癖下血，湿毒下血。

33261 当归和血散

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】当归 白芍 川芎 桔梗 秦艽 黑姜

【用法】水煎服。

【主治】泄泻。大便欲了不了，亦或夜间发热，午后脉大，子午前数而无力，为血虚者。

【备考】原书用本方治上症，水煎送下升阴丸。

33262 当归泽兰丸

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】香附子（去衣，分作四处，童便四两、酒四两、醋四两，米泔四两各浸一宿）一斤 当归（去须，酒浸）二两 白芍药（炒）二两 熟地黄（酒制）二两 生地黄二两 泽兰叶 艾叶 白术各一两五钱 黄芩一两 川芎二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如赤豆大。每服六十丸，空心白汤或酒送下。

【主治】妇人经脉不调，赤白带下，久无子者。

【方论选录】《医略六书》：血亏气滞，天癸愆期，而带脉不能收引，故赤白带下，经久不能生子焉。熟地补阴滋血，生地凉血滋阴，当归养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血，川芎行血中之气，艾叶暖子宫之血，泽兰去宿生新，白术健脾燥湿，黄芩清肺气以肃生水之源，香附解郁结以调冲任之气。醋以丸之，汤以下之，使经脉有资，则血气调和，而天癸无不如度，带脉约束有权，何赤白带下之

不除哉？自此带愈经调，天下应无不孕之妇矣。

【备考】方中香附子用量原缺，据《济阴纲目》补。

33263 当归泽兰汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】当归 泽兰 白芍（酒炒） 川芎 大熟地（九制）各一钱五分 延胡索（酒炒） 红花 香附 丹皮各五分 桃仁（去皮尖及双仁者，炒，研）七粒

【用法】水煎，入童便、热酒各半盏，热服。

【功用】祛瘀生新。

【主治】半产后因瘀血而腹痛拒按者。

33264 当归治痛饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 羌活 猪苓 泽泻 黄芩 苦参 升麻 茯苓 白术 甘草 木通 人参 苍术 知母 防风（一方有白芍）

【用法】水二钟，加生姜、大枣煎，食前服。

【主治】产后足踏湿地，以成湿毒。

33265 当归建中汤

《千金翼》卷六。为《千金》卷三“内补当归建中汤”之异名。见该条。

33266 当归建中汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】当归二两 桂心一两半 芍药二两 黄耆一两半

【用法】上锉散。每服水二盏半，加生姜三片，大枣二枚同煎，食前温服。

【主治】血滞身疼及劳伤虚羸腹痛，呼吸少气，小腹拘急连腰背，时自汗出，不思饮食。

33267 当归建中散

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】当归四两 白芍六两 桂心三两 黄耆一两半

【用法】上锉。每服四钱，加生姜、大枣，水煎，入饴糖一块，再煎，稍热服。

【主治】产后劳伤，虚羸不足。腹中疼痛，呼吸少气，小腹拘急，痛连腰背，时自汗出，不思饮食。

【加减】崩中衄血，加阿胶、地黄。

33268 当归承气汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】当归 大黄各一两 甘草半两 芒消九钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服二两，水一大碗，入生姜五片，大枣十枚，同煎至半碗，去滓热服。

【主治】①《保命集》：阳狂奔走，骂詈不避亲疏。②《景岳全书》：燥热里热，火郁为病，或皮肤枯燥，或咽干鼻干，或便溺结闭。

【方论选录】阳狂奔走，骂詈不避亲疏，此是阳有余阴不足。大黄、芒消去胃中实热，当归补血益阴，甘草缓中，加生姜枣，胃属土，此引至于胃中也。经所谓微者逆之，甚者从之，此之谓也。

33269 当归承气汤

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】当归尾一两 大黄(酒洗) 芒消枳实各五钱 甘草(蜜炙)三钱 厚朴五钱

【用法】水二钟，先煎枳、朴、草、归至九分，次下大黄，煎三五沸，末下芒消，随即就起，去滓服。

【主治】内有实热，致发阳厥、癲狂或溺血。

①《内经拾遗》：阳厥善怒。②《增补内经拾遗方论》：亦治男子妇人痰迷心窍，逾墙越壁，胡言乱走。③《丹溪心法》：溺血属实热者。

【方论选录】胃气为湿热所伤，必泻其上实，而元气乃得上下同流，此承气所由名也。三一承气汤外加当归，故名。

33270 当归承气汤

【方源】《保命歌括》卷二十四。

【组成】调胃承气汤三钱 当归梢一钱半

【用法】上咬咀。水煎二沸，入桃仁泥一钱，再煎，调槟榔末一钱服。

【主治】大便闭，少腹中满痛。

33271 当归枳壳汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】土八(《痧症全书》卷下)、四十八号同人方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】归身 山楂 枳壳 红花 赤芍 青皮 茜草 连翘 丹参 续断各一钱

【用法】水二钟，煎七分，微温服。

【功用】养血和中。

【主治】①《痧胀玉衡》：痧胀。②《痧症全书》：吐衄便红。

33272 当归枳壳汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】匏三(《痧症全书》卷下)、三十五号家人方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】归尾 枳壳 赤芍各一钱 山楂 卜子各二钱 紫朴八分

【用法】水煎，微冷服。

【功用】消食顺气和血。

【主治】痧胀。

33273 当归荆芥散

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】荆芥穗 川芎 人参(去芦头) 当归(洗，焙) 桔梗(去芦头) 附子(炮，去皮脐) 柴胡(去苗) 防风(去芦头) 丁香 白芍药 蒲黄(炒) 鳖甲(醋炙令黄) 香白芷 牛膝(酒浸一宿，焙干) 白薇 肉桂(去粗皮) 半夏(汤洗七遍) 羌活(去芦头) 杏仁(汤洗，去皮尖，麸炒) 木香 白茯苓(去皮) 续断 槟榔 没药(别研) 肉苁蓉 柏子仁 地骨皮各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】妇人血风攻注，四肢疼痛，饮食减少，胸满恶心，日渐羸瘦。及血海虚冷，经脉不调，夜梦多惊，痲痹气块。

33274 当归茵陈汤

《杏苑》卷五。为《三因》卷十“当归白术汤”之异名。见该条。

33275 当归茴香散

【方源】《疝瘕积聚编》。

【组成】当归 茴香 附子 良姜各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】寒疝，小腹痛。

33276 当归茺萸汤

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】当归 吴茺萸(炮，焙干) 小茴香(炒) 甘草 木香

【主治】小儿内钓。肝受寒，小腹痛，大叫哭，目直视，但不搐。

33277 当归茯苓散

《普济方》卷三三九。为《金匱》卷下“当归芍药散”之异名。见该条。

33278 当归厚朴汤

【方源】《直指》卷十三。

【组成】当归(炒) 厚朴(制)各二两 官桂三两 良姜五两

【用法】上锉散。每三钱，食前服。

【主治】肝经受寒，面色青惨，厥而泄利。

33279 当归钩藤汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归 钩藤 秦艽 丹皮 防风 青皮 黄芩 柴胡 甘草

【主治】内伤口眼喎斜，左关脉弦数者。

33280 当归复元汤

《医略六书》卷二十。为《医学发明》卷三“复元活血汤”之异名。见该条。

33281 当归独活汤

《医略六书》卷三十。为方出《千金》卷三引《小品方》，名见《普济方》卷三五〇“独活当归汤”之异名。见该条。

33282 当归独活汤

【方源】《女科指南》。

【组成】贝母 干葛 丹皮 防风 防己 川芎 甘草 泽泻 官桂 当归 人参 茯苓 独活 石膏

【用法】加生姜五片煎，入竹沥更妙。

【主治】孕妇子痢。

33283 当归活血丸

《女科指掌》卷五。为《局方》卷九(续添诸局经验秘方)“当归养血丸”之异名。见

该条。

33284 当归活血丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 赤芍一两半(酒炒) 桂心一两半 延胡一两半 秦艽一两半 丹皮一两半 乳香二两 牛膝一两半(酒炒)

【用法】为末，酒丸。白茄根三钱，煎汤送下。

【主治】产后腰脚疼痛，脉弦涩滞者。

【方论选录】产后血瘀经络，挟湿热而流布下注，故腰脚红肿，疼痛不止焉。全当归养血以营运乎经脉；赤芍药破血以运行其血滞；桂心温经暖血，秦艽活血疏经；丹皮凉血散瘀，乳香活血散血；延胡索破血滞以通经，杜牛膝降瘀血以下行也。酒糊为丸，以行其经血，茄根汤下，以疏其经气。使瘀化血行，则经络通畅而湿热自化，红肿无不退，何腰脚疼痛之不痊乎？

33285 当归活血汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】当归八分 赤芍药三分 甘草三分 红花三分 桂心三分 干姜三分 枳壳三分 生地黄一钱 人参八分 柴胡八分 桃仁泥三分

【用法】水二钟，加生姜一片，煎之。槌法入酒三匙调服。

【主治】伤寒挟血，无头痛、无恶寒，止身热发渴，小便利，大便黑，语言无伦，神志昏沉，如见鬼祟。

【加减】服三贴后，去桃仁、红花、干姜、桂，加白术、茯苓。

【备考】方中诸药用量原缺，据《伤寒六书纂要辨疑》补。《张氏医通》有茯苓，无人参。

33286 当归活血汤

【方源】《奇效良方》卷十三。

【异名】桃花散(原书同卷)、当归活血散(《便览》卷三)。

【组成】当归身 升麻各一钱 槐花 青皮 荆芥穗 熟地黄 白术各六钱 川芎四

钱

【用法】上为末。每服三钱，米饮汤调下，不拘时候。

【主治】肠癖下血，湿毒下血。

33287 当归活血汤

【方源】《医便》卷三。

【组成】当归（酒浸） 杜仲（姜汁炒去丝）各五钱 赤芍药 白芷 威灵仙各三钱 肉桂一钱

【用法】水、酒各一钟，煎至一钟，空心服。

【主治】寒湿，气血凝滞腰痛。

【加减】加羌活二钱，防风一钱亦好。

33288 当归活血汤

【方源】《医方考》卷六。

【异名】当归活血散（《治痘全书》卷十三）。

【组成】当归 川芎 赤芍药 红花 紫草各一钱 生地黄一钱五分（取汁更良）

【功用】活血凉血。

【主治】痘疮血热壅滞者。

【方论选录】色紫为血热，色枯为血滞。热者凉之，枯者泽之，调血之道也。是方也，生地黄，凉血之品也；当归、川芎、赤芍药、红花、紫草、滑血之品也。凉者性寒，滑者质润，气利而已。

33289 当归活血汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】当归 芍药 抚芎 桃仁（去皮尖）各一钱 红花五分 牡丹皮 香附 乌药 枳壳（去瓢） 青皮各三分 官桂 干姜（炒黑） 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】血郁证。能食，便红，或暴吐紫血，痛不移处，脉数涩者。

【加减】血结硬痛加大黄。

33290 当归活血汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 川芎 荆芥 薄荷 芍药 红花 甘草 牡丹皮 桔梗 防风 山栀

黄芩 连翘 白芷各等分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，细茶一撮，水煎，食后温服。

【主治】鼻准头紫黑，血冷凝滞。

33291 当归活血汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 红花 桃仁 楂肉 甘草 牡丹皮

【功用】生新去旧。

【主治】劳役痢。起于大劳之后，下利纯血，或腰背作楚，胁肋作痛，四肢倦怠，嗜卧减食，节劳稍缓，劳重即发。

【加减】血寒，加黑炮姜；血热，加黑山栀。

33292 当归活血汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】归尾 黄耆 没药 川芎 苍术 熟地 生地 赤芍 蒺藜 红花 香附 牛膝各等分

【用法】上为末，水煎，食后温服。

【主治】惊振内障，或后生人患云翳小小，阴看不大，阳看不小，不见三光者。

33293 当归活血汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】当归 赤芍 川芎 牛膝 紫苏 生地 乌豆 蒲黄 桂心 乳香 没药

【用法】水煎，食后服。

【主治】被物撞破外障，撞久血滞不散，无疼痛。

33294 当归活血汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 红花 紫草 黄芩 黄连 大黄

【用法】水煎服。

【主治】痘之毒火入于血分，灼伤阴血，痘体干枯。

33295 当归活血汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱 川芎二钱 白鲜皮二钱 银花三钱 白芍三钱 蒺藜三钱（炒） 防风二钱 大贝三钱 荆芥穗二钱（炒） 白

芷三钱 青皮二钱 甘草一钱 地肤子三钱

【用法】水煎服。

【主治】眼脸痒痒，犹如虫行，不红不疼，痒无定时，两眼胞带黑暗色，视力稍减。

【临证举例】贾某某，男。素日身体衰弱，头晕耳鸣，忽觉两目痒极难当，针药罔效。经余诊治，六脉短涩，惟少阴为甚，面带黑色，精神恍惚，此阴阳将脱之证。以本方加黄耆一两，党参八钱，枣仁三钱，连服四剂，痒虽愈而黑色不退。隔数日又痒，再服前方无效。后闻此人不数日而亡。书之以为后车之戒。

33296 当归活血饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】苍术（制） 当归身 川芎 苏薄荷 黄耆 熟地黄 防风 川羌活 甘草（减半） 白芍药各等分

【用法】上锉剂。水二钟，煎至八分，去滓，食后服。

【主治】肝脾血虚而气不和顺，脾轮振跳，即目脾不待人之开合，而自率拽振跳。

33297 当归活血饮

【方源】《医钞类编》卷十九引万氏方。

【组成】归尾 红花 黄芩（酒炒） 连翘 炙北耆 人参 骨皮 牛子 甘草

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】痘疮抓破出血。

33298 当归活血散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】当归和血散（《医方类聚》卷一九二引《神效良方》）、当归和血饮（《疡科选粹》卷三）。

【组成】当归二钱 没药一钱半 乳香半钱 白芍药三钱

【用法】上为细末。每服一钱，水一中盏，煎至七分，和滓温服，日二服。妇人酒煎。

【主治】疮疡未发出，内痛不可忍，及妇人产前后腹痛。

【宜忌】疮既发，不须用。

【加减】疮疡者，加人参、木香；妇人，加

赤芍药。

33299 当归活血散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《黄帝七十二证眼论》。

【组成】当归 黄耆 没药 川芎 羌活 苍术（米泔水浸七日） 麻黄 熟地黄各等分

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下。

【主治】血虚头晕目昏，见赤白星乱者。

33300 当归活血散

《便览》卷三。为《奇效良方》卷十三“当归活血汤”之异名。见该条。

33301 当归活血散

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】赤芍药 生地黄 当归须（酒洗）各一钱半 桃仁（去皮尖，炒） 红花（酒洗） 香附（童便浸）各一钱 川芎 牡丹皮 玄胡索 蓬术各八分（炮） 三棱（炮） 青皮各七分

【用法】水二钟，煎七分，空心服。

【主治】瘀蓄死血而胀，腹皮上见青紫筋，小水反利，脉扎涩，属虚人不可下者。

33302 当归活血散

《治痘全书》卷十三。为《医方考》卷六“当归活血汤”之异名。见该条。

33303 当归活血散

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】当归（酒焙） 赤芍（酒炒） 川芎 紫草 红花各五钱 木香二钱 血竭一钱

【用法】上为末，每五岁者服一钱，十岁以上服二钱，酒调下。

【主治】痘色淡白。

33304 当归活血煎

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】当归 黄耆 没药 川芎（血气旺者勿用） 苍术 荆芥 薄荷 熟地黄 羌活 菊花 麻黄各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每食后细嚼一丸，清茶送下，日进三次。

【主治】风冷久积，两睑粘眼。

【备考】本方方名，据剂型，当作“当归活血丸”。

33305 当归养心汤

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】当归身 麦门冬 升麻(炒) 甘草(炙) 人参 生地黄(酒洗)

【用法】上锉细。加灯心十二茎，水一盞，煎七分，去滓，食后服。

【功用】养心血，利心窍。

【主治】女子种痘，经水忽行，暴暗不能言语者。

33306 当归养血丸

【方源】《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。

【异名】当归活血丸(《女科指掌》卷五)。

【组成】当归 牡丹皮 赤芍药 延胡索(炒)各二两 肉桂一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒、米饮送下；痛甚，细嚼咽下。

【主治】产后恶血不散，发歇疼痛，及恶露不快，脐腹坚胀，兼室女经候不匀，赤白带下，心腹腰脚疼痛。

33307 当归养血丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】当归 白芍 茯苓 黄耆 香附 阿胶各三两 生地八两 白术 杜仲各四两 丹皮二两

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】妇人经水不调，赤白带下，子宫寒冷，久不受孕。

33308 当归养血丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】当归三两 生地八两 白芍三两 黄耆三两 炒白术四两 茯苓三两 阿胶四两 艾叶二两 杜仲四两 制香附三两

【用法】将生地切薄片，用开水浸透，与诸药打和晒干，共研细末，用白蜜二两，炼熟

化水，将阿胶烱入泛丸，如绿豆大，约成丸二十九两。每日二次，每次二钱，开水吞服。

【功用】补气养血。

【主治】血虚气弱，月经不调。

33309 当归养血汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【异名】当归养荣汤(《杂病源流犀烛》卷二)。

【组成】当归 川芎 生地黄 麦门冬(去心) 木通 甘草 淡竹叶 山梔仁 灯心

【主治】①《痘疹全书》：疹后浑身壮热，未至羸瘦，但多抽搐，烦躁不宁。②《杂病源流犀烛》：疹癆。

【加减】便闭，加大黄。

33310 当归养血汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】当归 秦艽 天冬 灵脂 腹皮 云皮各一钱 川芎 玄胡 茯苓 熟地 丹皮各一钱五分 甘草三分

【用法】葱三茎为引。

【主治】胸膈疼痛，筋弱抖搐，气胀，胁痛。

33311 当归养血汤

【方源】《点点经》卷三。

【组成】当归一钱 熟地 生地 二花生耆各一钱半 穿甲 黄柏 知母 山梔 条芩 七厘 蝉蜕各一钱 甘草四分

【用法】生石膏为引。

【主治】酒伤疥癬入腹后，托里复发。

33312 当归养血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 白芍(炒) 熟地黄 茯苓(去皮)各一钱 贝母(去心) 瓜蒌(去壳) 枳实(麸炒) 陈皮 厚朴(姜汁炒) 香附 抚芎 苏子(炒)各七分 沉香五分 黄连(用吴茱萸同炒，去茱萸，用连)八分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎，竹沥磨沉香调服。

【主治】年老之人，阴血枯槁，痰火气结，

升而不降，饮食不下，乃成膈噎之病。

33313 当归养血汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】当归 尖生 鲜斗 川贝 瓜蒌 丹参 麦冬 栀子 云连 甘草

【主治】麻疹血虚心热，烦躁搐掣，热在心脾。

【加减】不食，加麦芽、建曲；便秘，加生军。

33314 当归养荣汤

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】防风 白芷各七分半 白芍药 熟地黄 当归 川芎各一钱 羌活七分半

【用法】上作一服。水二盏，煎至一盏，去滓。食后热服。

【主治】睛珠痛甚不可忍；又治红赤羞明，泪多眵少。

【方论选录】以七情五贼劳役饥饱重伤脾胃，生意已不升发，又复血虚不能养睛，故睛痛甚不可忍。以防风升发生意，白芷解利，引入胃经为君；白芍药止痛益气，通血承接上下为臣；熟地黄补肾水真阴为佐；当归、川芎，行血补血，羌活除风引入少阴经为使。血为邪胜，睛珠痛者，及亡血过多之病，俱宜服也。

33315 当归养荣汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】当归 条参 延胡 熟地 茯苓 陈皮 仙皮各一钱半 黄耆 白术 薄荷 羊苁各一钱 加皮二钱

【用法】加生姜、大枣为引。

【主治】正气虚耗，阳不胜阴，酒伤经络，瘫痪不仁，身热作渴，间有畏寒。

33316 当归养荣汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】归身二钱 人参 黄耆 熟地 白术 川芎 白芍各一钱 五味子 麦冬 远志 甘草 茯苓各五分 丹皮 砂仁各三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】瘰癧马刀。

【备考】原书治上症，配合夏枯草汤、散肿溃坚汤间服。

33317 当归养荣汤

《杂病源流犀烛》卷二。为《痘疹全书》卷下“当归养血汤”之异名。见该条。

33318 当归秦艽丸

《中国医学大辞典》。即《准绳·类方》卷五“当归秦艽散”改作丸剂。见该条。

33319 当归秦艽散

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】白术 茯苓 秦艽 当归 川芎 芍药 熟地黄（酒蒸） 陈皮各一钱 半夏 炙甘草各五分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】五疸。口淡咽干，倦怠发热微寒。

【备考】本方改为丸剂，名“当归秦艽丸”（见《中国医学大辞典》）

33320 当归桂枝汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒洗） 黄耆（酒洗） 官桂 炙甘草 苍术 黄柏

【用法】水煎服。

【功用】补脾养血。

【主治】痘之后，血少不能养筋，或感风寒水湿，手足忽然拘挛，不能伸屈转运者。

【加减】气虚，加川乌、人参；如感风寒，以至骨节疼痛者，加羌活防风散治之。

33321 当归桂枝汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】当归三钱 桂枝八分 白芍一钱半（酒炒） 甘草六分 煨姜二片 大枣三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇寒多热少，脉弦浮涩者。

【方论选录】妊娠营气大虚，寒邪得以逗留经中，故寒多热少，不烦不渴焉。当归益营

气之虚、白芍敛营中之血，桂枝温经散寒，炙甘草缓中益胃，煨姜温胃以散寒邪，大枣缓中以益脾元也。水煎温服，使营气内充，则寒邪不复留恋，而寒热之往来顿解，胎孕无不自安矣。

33322 当归桂枝汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】人参 当归身 正川芎 白芍药 炙黄耆 漂苍术 川黄柏 炙甘草

【用法】加生姜、大枣为引，水煎。微加好酒一杯对服。

【主治】痘后血少，手足拘挛，不能转运。

【加减】气虚肢冷，加附片；感冒风寒，以致筋骨痛，加羌活、防风；血气大虚者，加鹿茸、虎胫、淮牛膝。

【备考】本方名当归桂枝汤，但方中无桂枝，疑脱。

33323 当归桃仁汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】当归 桃仁 红花 丹皮 山楂 泽兰叶

【主治】血蓄上焦发狂者，如狂喜忘，漱水在口，不能下咽，寸脉见芤者。

【加减】倘不应，再加枳壳、大黄，直达大肠。

33324 当归桃仁汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】当归 桃仁

【主治】蓄血。

33325 当归柴胡汤

【方源】《产科发蒙》卷四引《经效方》。

【异名】当归汤（《普济方》卷三五一）。

【组成】当归 芍药 桔梗 槟榔 枳壳 桂枝 柴胡 青木香

【用法】以水二合，煮取一合服。

【主治】产后血气胁肋胀痛。

33326 当归柴胡汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】柴胡五钱 半夏二钱（以生姜一钱同捣） 当归一钱 甘草五分

【用法】加生姜、大枣，以水二盏，煎至八分，热服。取汗微微即止。

【主治】伤寒头痛，发热恶寒，肢节痛，吐逆。

33327 当归胶艾汤

【方源】《穷乡便方》。

【组成】川芎 当归 白茯苓 白术 人参 杜仲 阿胶 北艾 熟大黄 伏龙肝各八分 甘草三分

【主治】劳损冲任，胎被触动，腰腹痛，经渗漏。

33328 当归凉血汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【异名】当归凉血饮（《片玉痘疹》卷十）。

【组成】红花 地骨 生地 酒芩 牛蒡 人参 当归 黄耆 连翘 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮抓破，破而出血者。

【备考】《治痘全书》有黄柏、无黄耆、酒芩、牛蒡。

33329 当归凉血饮

《片玉痘疹》卷十。为《痘疹全书》卷下“当归凉血汤”之异名。见该条。

33330 当归消毒饮

《医林纂要》卷十。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

33331 当归消毒散

【方源】《普济方》卷二八六。

【组成】荆芥 牛蒡子 甘草 防风 当归 赤芍药各等分

【用法】上咬咀。每服半两，水二盏，煎八分服。

【主治】痈肿初发。

33332 当归流气饮

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】陈皮七钱 半夏 茯苓 甘草 槟榔 紫苏 川芎 防风 枳壳 乌药 桔梗 青皮 枳实各五钱 木香二钱五分 香附子五钱

【用法】每服五钱，水煎服。

【主治】胃脘痛。

【备考】本方名当归流气饮，但方中无当归，疑脱。

33333 当归流浸膏

【方源】《中药单味制剂操作工艺》。

【组成】当归 100 克

【用法】上为粗末，按渗漉法，用 70% 醇湿润 4 小时，再以 70% 醇浸渍 48 小时后，以每分钟 35 毫升/50 公斤之速度渗漉，收集初滤液 850 毫升，另器保存，继续渗漉使可溶性成分完全漉出，收集漉液，用 60℃ 以下之温蒸发至软膏状，加入初滤液 850 毫升混合，用 70% 醇稀释，使每毫升含总提取物 300 毫克时，静置 2~3 天后，取上层清液过滤即得。每次口服 2~8 毫升，日服二次。

【功用】补血活血，行气止痛，滑肠润燥。

【主治】妇女胎前产后诸病；痈疽疮疡；瘀血作痛；血虚肠燥的便秘。

33334 当归润肠汤

《医方集解》，即《兰室秘藏》卷下“润肠汤”。见该条。

33335 当归润燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】止渴润燥汤（《普济方》卷一七八引鲍氏方）、润燥汤（《东垣试效方》卷三）。

【组成】细辛一分 生甘草 炙甘草 熟地黄各三分 柴胡七分 黄柏 知母 石膏 桃仁（泥子） 当归身 麻子仁 防风 荆芥穗各一钱 升麻一钱五分 红花少许 杏仁六个 小椒三个

【用法】上咬咀，都作一服。水二大盏，煎至一盞，去滓，食远热服。

【主治】消渴。大便闭涩，干燥结硬，兼喜温饮，阴头退缩，舌燥口干，眼涩难开，及于黑处见浮云。

【宜忌】忌辛热物。

33336 当归润燥汤

《东垣试效方》卷七。为《兰室秘藏》卷下“润燥汤”之异名。见该条。

33337 当归润燥汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】当归 芍药 川芎 桃仁 熟地 生地 麻仁

【用法】水煎服。

【主治】肠胃燥，大便不通。

33338 当归润燥汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】归身二钱 白芍一钱五分 红花五分 木瓜一钱 秦艽一钱 丹参二钱 牛膝二钱 川断二钱 独活一钱 橘饼四钱 红枣十个。

【主治】肝受燥凉，血涩不行，筋短胁痛。

33339 当归益荣丸

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】当归二钱 川芎二钱 黄连一钱半 芦荟二钱二分 使君子肉一钱二分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸。米饮送下。

【主治】平素肌肥，痘后羸瘦，虽能饮食，亦不能发肌肤者。

33340 当归益荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归 黄芩 牡蛎 赤芍 防风 龙骨 陈皮 蛇床子 白芷 黄耆 川芎 生地 升麻 甘草

【主治】妇人元气素弱，胎前失于调养，产后去血太多，肝脏少血，不能摄血束筋，产后七日外，玉门不闭；兼治阴脱，阴挺。

【方论选录】产后玉门不闭与阴脱各不相同。总由血虚筋骨懈弛，一者外不能闭，一者内不能系。阴脱，当大补药中兼升提；玉门不闭，当大补药中加敛涩。升提之药，防风、升麻之属；收敛之药，龙骨、牡蛎之类。蛇床子兼暖子宫，补命门，四物补阴血，参、耆、陈、草补卫气。脱者升之，弛者敛之，虚者补之，虚寒者温而补之。至于阴脱之症，或肿痛，或淋漓，则方中有防风、地榆、白芷、黄芩之药为佐使也。

33341 当归调中汤

【方源】《普济方》卷二十五引《海岱居士秘方》。

【组成】大黄五钱 当归一钱 甘草四钱 朴消六钱 芍药二钱

【用法】上咬咀，作一服。用水二大盏，生姜三片，大枣一枚，同煎至一大盏，去滓，食前温服，滓再煎。以利为度。

【功用】和中顺气。

【主治】脾胃不和，肠鸣腹痛，四肢无力，大便难，小便数，或大便便血，饮食无味，久而面黄肌瘦，渐潮热，发作有时。

33342 当归调血汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】当归二钱五分 川芎一钱 白芍三钱 黄连一钱 黄芩一钱 桃仁（去皮另研）一钱 升麻五分

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】下痢红多，不拘新久。

【加减】如白痢，加吴茱萸（炒）一钱，芩、连用酒炒；赤白痢，加白术、茯苓、陈皮、香附各一钱。

33343 当归黄连丸

【方源】方出《圣惠》卷九十三，名见《普济方》卷三九六。

【组成】黄连三两（去须，锉，微炒） 当归一两（锉，微炒） 乌梅肉一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，以粥饮送下。

【主治】小儿冷热痢，心神烦渴，腹痛，胸膈滞闷。

33344 当归黄连丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】当归（锉，焙） 黄连（去须）各二两 木香 吴茱萸（汤洗，焙干炒） 赤茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 诃黎勒（炮，去核）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下，每日三次。

【主治】胃寒肠热，腹胀泄利。

33345 当归黄连丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引王氏方。

【组成】芍药 当归 黄连 黄柏各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温米饮送下。

【主治】壮热烦渴，赤白痢，腹痛后重，昼夜无度，小便涩。

33346 当归黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】当归（切，焙）三分 黄连（去须，炒）一两半 赤茯苓（去黑皮）三分 地榆一两 犀角屑三分 甘草（炙，锉）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，入生姜一枣大，拍碎，同煎至八分，去滓空心温服，一日二次。

【主治】后重下痢，赤白滞下，腹内结痛。

33347 当归黄连汤

《圣济总录》卷一七八。为《圣惠》卷九十三“当归散”之异名。见该条。

33348 当归黄连汤

【方源】《己任编》卷三。

【组成】当归 黄连 生地 银花 花粉 大力 荆芥 僵蚕 丹皮 灯草

【主治】痘疮，色灰白而不痒者。

33349 当归黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】黄耆（锉） 当归（切，焙） 人参 桔梗（锉，炒） 芍药 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），大枣二个（擘破），同煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】骨蒸，肺痿。

33350 当归黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】当归（锉，焙） 黄耆（锉细） 芍药各二两 生姜（切，焙）五两

【用法】上为粗末，分作八服，每服水二盏

半，煎至一盞，去滓溫服。

【主治】产后腰脚痠疼，转侧不得，壮热汗出，气短心怔。

33351 当归黄耆汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】当归 黄耆 地黄 川芎 地骨皮 芍药各等分

【用法】上咬咀。每服一两，水一碗，煎至五分，去滓溫服。

【主治】疮疡，脏腑已行，而痛不可忍者。

【加减】如发热者，加黄芩；如烦热不能卧者，加梔子；如呕，则是温气侵胃，倍加白术。

33352 当归黄耆汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】黄耆(蜜炙) 当归(去芦)各二两 熟干地黄(洗) 白芍药各一两半 人参(去芦) 牡丹皮 白茯苓(去皮) 白术各一两(炒) 甘草(炙) 肉桂(去皮，不见火)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，枣子一个，煎至七分，去滓，食前溫服。

【功用】补诸虚不足，调营卫，退虚热，进饮食。

33353 当归黄耆汤

【方源】《普济方》卷三五。

【组成】当归 黄耆 芍药各六分 干地黄 白术各八分 桂心 甘草各四分 枣十四个

【用法】上咬咀。以水二升，煮取八合，去滓，空心作两次服。

【主治】产后余疾，腹中绞痛，不下食，瘦乏。

【宜忌】忌生葱。

33354 当归黄耆汤

《景岳全书》卷五十三。即方出《妇人良方》卷十五，名见《玉机微义》卷五“当归补血汤”。见该条。

33355 当归黄耆汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】白芍 厚朴 陈皮 川芎 当归 甘草 生地 黄连 黄柏 柴胡 茯苓

【用法】加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】产后乳内热，口舌无皮，大便不实。

【备考】本方名当归黄耆汤，但方中无黄耆，疑脱。

33356 当归黄耆饮

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【异名】当归黄耆散（《济阴纲目》卷十四）。

【组成】当归 白芍 黄耆 人参各二钱 升麻半钱

【用法】上切细，作一服。水煎溫服，未收再服。

【主治】产后阴脱。

【备考】《济阴纲目》治上症，并外用五倍子泡汤洗，又用末敷之。又《杂病源流犀烛》有甘草，无芍药。

33357 当归黄耆饮

《医统》卷三十六。即方出《妇人良方》卷十五，名见《玉机微义》卷五“当归补血汤”。见该条。

33358 当归黄耆散

《济阴纲目》卷十四。为《医学正传》卷七引《产宝》“当归黄耆饮”之异名。见该条。

33359 当归银花汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 银花 生地 生甘草

【功用】凉血润燥。

【主治】燥热痢，燥火伤血，下痢赤积，腹中作痛，脉息细数。

33360 当归鹿茸散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】当归 鹿茸 熟地黄 葵子 蒲黄 续断各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒调下，一日三次。

【主治】妇人劳损，虚弱尿血。

33361 当归清营汤

【方源】《疡科心得集》卷中。

【组成】当归 生地 山梔 赤苓 白芍 柴胡 川芎 甘草 贝母 丹皮 花粉 连翘

【主治】肝胆二经风热血燥，筋挛结核，乳痈乳痞，并一切耳项肝火之证。

33362 当归寄生汤

【方源】《广嗣纪要》卷七。

【组成】当归 川芎 艾叶 白术各一钱 人参 续断 桑寄生 熟地黄各二钱

【用法】水二钟，煎一钟，空心服。

【主治】妊娠漏胎，非时下血，气虚血虚，有热，脉弦细者。

【备考】《医学正印》有黄芩。

33363 当归续断丸

【方源】《产宝诸方》。

【组成】当归（去芦） 川芎 续断 干姜（炮） 阿胶（炒焦，碎） 甘草（炙）各四两 白术 吴茱萸（汤洗七遍） 附子（炮裂去皮） 白芷各三两 桂心（不见火） 白芍药各二两 熟干地黄十两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心淡醋汤送下。

【主治】产后虚乏少气，腹痛引腰背，多血不止，昼夜不得眠，崩中漏下，唇口干，面无色。

33364 当归续断膏

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】当归 续断 骨碎补 桂（去粗皮） 附子 泽兰 芍药 白及 牛膝 羌活 芎藭 木香 麒麟竭 生干地黄 白僵蚕 白附子各一两 沉香 丁香各半两 栝楼二枚（大者） 乌蛇肉 白敛 白芷 玄参各一两 杏仁 桃仁各三分

【用法】上细锉，入麻油四斤，猪脂一斤半，驼脂三两，用文武火煎三日后，滤去诸药，入乳香三两，松脂六两，更煎一日，用生绢滤却粗滓。再用五斗大生铁锅，细罗铅丹三斤，

炒令紫色，旋旋入前药油煎，以柳枝子搅令紫色，旋即退火。以药油滴少许水碗内，成珠子为度，以瓷石器密收，于疮口上涂摩之。

【功用】辟风敛疮。

【主治】箭头入肉赤肿。

【备考】本方方名，《普济方》引作“续断膏”。

33365 当归葱白汤

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】当归四两 人参二两 厚朴二两 葱白一虎口 胶二两 芎藭二两

【用法】以水七升，煮取二升半，分三服。

【主治】妊娠中恶，心腹暴痛，逐动胎，少腹急。

33366 当归黑豆汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】当归 黑豆 生地 麦冬 黄柏 知母 山梔 条芩 白薇 竹叶 炙草

【主治】虚热带下。

33367 当归腊茶散

【方源】《普济方》卷二十四。

【组成】细芽茶半斤 川百药煎五个（烧存性）

【用法】上为细末。每服二钱，用米汤饮调下；或乌梅汤亦可。

【主治】荣卫气虚，风邪冷气进袭脏腑之内，或食生冷，或啖炙博，或饮食过度，积热肠间，致使肠胃虚弱，糟粕不聚，大便下利鲜血，脐腹疼痛，里急后重，久患酒毒便血诸疾，一切大便下血。

【备考】本方名当归腊茶散，但方中无当归，疑脱。

33368 当归温疝汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】当归 白芍 附子 肉桂 延胡索 小茴香 川楝子 泽泻 吴茱萸 白茯苓

【主治】中寒冷疝。

33369 当归蒺藜煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 熟地 芍药(酒炒) 何首乌各二钱 炙甘草 防风 川芎 荆芥穗 白芷各一钱 白蒺藜(炒,捣碎)三钱或五钱

【用法】上或水或酒,用二钟煎服,然水不如酒。或以水煎服,后饮酒数杯,以行药力亦可。

【主治】痈疽疮疹,血气不足,邪毒不化,内无实热而肿痛淋漓者。

【加减】阳虚不能化毒者,加桂枝,甚者,再加干姜、附子;气虚不化者,加黄耆、人参;毒陷不能外达者,加穿山甲或皂刺。

33370 当归蒲延散

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】当归八分 桂心 芍药(炒) 血竭 蒲黄(炒)各六分 延胡索(炒)四分

【用法】上为末。每服二钱,空心酒调下。

【主治】产后血瘀作痛,脐下胀满,或月经不行,发热体倦。

【方论选论】《医略六书》:产后冲任不调,瘀血乘虚留结而成血瘀,故小腹胀满疼痛不已焉。当归养血荣经脉,蒲黄破瘀消瘀积,白芍敛阴和血,血竭去瘀生新,桂心温经暖血以开结,延胡破血活血以消瘀。为散酒煎,使瘀血消化,则新血自生,而冲任融和,安有血瘀痛胀之患乎?

33371 当归解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】生地 归身 麻仁 紫草 大黄 枳壳 连翘

【用法】水煎服。

【主治】痘疮里热太甚,大便秘结,不能收靥。

【备考】《种痘新书》,有牛子,无连翘。

33372 当归鹤虱散

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】当归八分 鹤虱八分 橘皮六分 人参六分 槟榔十二分 枳实六分(炙) 芍药六分 桂心五分

【用法】上为散。每服方寸匕,空腹煮姜枣饮调下,一日二次。不利,渐渐加至一匕半。

【主治】九种心痛,蛔虫冷气,先从两肋,胸背撮痛,欲变吐。

【宜忌】忌生葱、生冷物、油腻、粘食。

33373 当归蒲梗汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】薄荷 桔梗 知母 黑参 赤芍药 黄芩(酒炒) 生地黄 菊花 羌蔚子 当归 桑白皮 防风 川芎 白芷 甘草

【用法】水一钟煎服。

【主治】眼生翳,泪出差明,发久不愈。

33374 当归玄胡索汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身尾 玄胡索各一钱半 五灵脂 蒲黄各一钱 赤芍 桂心各七分 红花五分

【用法】水酒各一盏,煎一盏,入童便一盏同服。

【主治】产前聚血,产后气虚,恶露未尽,新血与故血相搏,腹中有块,上下时动,痛不可忍,俗谓之儿枕痛,亦血瘀之类。

33375 当归赤小豆散

《三因》卷九。为《金匱》卷上“赤小豆当归散”之异名。见该条。

33376 当归郁李仁汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】郁李仁汤(《医级》卷七)。

【组成】郁李仁 皂角仁各一钱 枳实七分 秦艽 麻仁 当归梢 生地黄 苍术各五分 大黄(煨) 泽泻各三分

【用法】上锉,如麻豆大。除皂角仁别为末,水三盏,煎至一盏,去滓,入皂角仁末调,空心、食前服之。

【主治】①《兰室秘藏》:痔漏大便硬,努出大肠头下血,苦痛不能忍。②《医级》:结热肠燥不便。

【宜忌】避风寒,忌房事、酒湿面、大辛热物。

【临证举例】痔漏 《外科发挥》：一男子，素不慎酒色，患痔焮肿，肛门坠痛，兼下血，大便干燥，脉洪大，按之则涩，以当归郁李仁汤加桃仁，四剂少愈；更以四物汤加红花、条芩、槐花，数剂而愈。

33377 当归贝母苦参丸

【方源】《金匱》卷下。

【异名】苦参丸（《三因》卷十七）。

【组成】当归 贝母 苦参各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，加至十丸。

【主治】①《金匱》：妊娠小便难，饮食如故。②《金匱要略方义》：妇人妊娠，小便淋沥不爽，或渡时涩痛，尿色黄赤，心胸烦闷。亦治孕妇大便干燥，以及痔疮便秘，属大肠燥热者。

【加减】男子加滑石。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：小便难者，膀胱热郁，气结成燥，病在下焦，不在中焦，所以饮食如故。用当归和血润燥。《本草》贝母治热淋，乃治肺金燥郁之剂，肺是肾水之母，水之燥郁，由母气不化也。贝母非治热，郁解则热散，非淡渗利水也，其结通则水行。苦参长于治热，利窍逐水，佐贝母入行膀胱以除热结也。

②《金匱要略心典》：小便难而饮食如故，则病不由中焦出，而又无腹满身重等证，则更非水气不行，知其血虚热郁，而津液涩少也。《本草》当归补女子诸不足，苦参入阴利窍除伏热，贝母能疗郁结，兼清水液之源也。

③《金匱要略简释》：小便难而饮食照常的，用当归、贝母、苦参来治，很难理解，古今注家多望文生训，理论脱离实际。金华沈介业中医医师指正“小便难”，当作“大便难”，经他祖父五十年的经验和他自己试用，效验非凡。孕妇患习惯性便秘，有时因便秘而呈轻微燥咳，用当归四份，贝母、苦参各三份，研粉，白蜜为丸，服后大便润下，且能保持一天一次的正常性，其燥咳亦止。

【临证举例】热淋《治验回忆录》：樊氏，青年农妇。1944年夏伤于湿热，饮食如常而小便不利，有涩痛感。某医先以湿热服五苓散去桂加滑石不应，继服八正散亦不应。迁延半月，饮食减退，肢倦无力，不能再事劳作。余切其脉象细滑，观其面色惨淡，气促不续，口干微咳，少腹胀痛，大便黄燥，小便不利而痛。此下焦湿热郁滞与上焦肺气不宣，上下失调，故尿道不通，如仅着重下焦湿热，徒利无益。因师古人上通下利之旨，用宣肺开窍诸品，佐渗利清热药为引导，当可收桴鼓之效。拟用当归贝母苦参丸（改汤）加桔梗、白蔻、鸡苏散等。果二剂而小便通利，不咳，尿黄而多，此湿热下降之征兆。更以猪苓汤加海金沙、瞿麦滋阴利水，清除积热，数剂小便清，饮食进，略为清补即安。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“归母苦参丸”。

33378 当归生姜羊肉汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】小羊肉汤（《千金》卷三（注文）引《胡洽方》）、当归汤（《圣济总录》卷九十四）。

【组成】当归三两 生姜五两 羊肉一斤

【用法】以水八升，煮取三升，温服七合，日三服。如加生姜等者，亦加水五升，煮取三升二合服之。

【功用】《医方发挥》：温中补血，祛寒止痛。

【主治】寒疝腹中痛及胁痛里急者；产后腹中疝痛，腹中寒疝，虚劳不足。

【加减】若寒多者，加生姜成一斤；痛多而呕者，加橘皮二两，白术一两

【方论选录】①《金匱要略论注》：寒疝至腹痛胁亦痛，是腹胁皆寒气所主，无复界限，更加里急，是内之荣血不足，致阴气不能相荣，而敛急不舒，故以当归、羊肉兼补兼温，面以生姜宣散其寒。然不用参而用羊肉，所谓“精不足者，补之以味”也。

②《金匱要略心典》：此治寒多而血虚者之

法，血虚则脉不荣，寒多则脉绌急，故腹痛而里急也。当归、生姜温血散寒，羊肉补虚益血也。

③《古方选注》：寒疝为沉寒在下，由阴虚得之，阴虚则不得用辛热燥烈之药重劫其阴，故仲景另立一法，以当归、羊肉辛甘重浊、温暖下元而不伤阴、佐以生姜五两，加至一斤，随血肉有情之品引入下焦，温散沍寒。若痛多而呕，加陈皮、白术奠安中气，以御寒逆。本方三味，非但治疝气逆冲，移至产后下焦虚寒，亦称神剂。

【临证举例】①寒疝《本草衍义》：一妇人产当寒月，寒气入于产门，脐下胀满，手不敢犯，此寒疝也。医将治之以抵当汤，谓其瘀血。予教之曰：非其治也，可服张仲景羊肉汤，二服而愈。②产后腹痛《得心集医案》：冬月产后，少腹绞痛，诸医谓为儿枕之患，去瘀之药，屡投愈重，乃至手不可触，痛甚则呕，二便紧急，欲解不畅，且更牵引腰胁俱痛、势颇迫切。急延二医相商，咸议当用峻攻，庶几通则不痛。余曰：形羸气馁，何胜攻击，乃临产胎下，寒入阴中，攻触作痛，故亦拒按，与中寒腹痛无异。然表里俱虚，脉象浮大，法当托里散邪。但气短不续，表药既不可用，而腹痛拒按，补剂亦难遽投。仿仲景寒疝例，与当归生姜羊肉汤，因兼呕吐，略加陈皮、葱白，一服微汗而愈。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作“羊肉汤”。

33379 当归芍药和疟汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】全当归一两（酒洗） 白芍一两（酒炒） 益母草三钱 炮姜一钱五分 青皮一钱五分 柴胡八分（炒） 草薢仁一钱（研） 炙甘草五分

【用法】河、井水各半煎，露一宿，早服。三服全愈。

【功用】补血和解。

【主治】产后疟疾，夹痰夹滞，寒热不止。

【加减】如腹痛积瘀，恶露未清，加炒山楂三钱，酒炒元胡索三钱；如恶心，加灶心土五钱；如头痛，加川芎二钱；如大便结，加桃仁泥三钱，酒洗红花三钱；如作泻，加车前子三钱；如胸口饱胀，加炒枳壳一钱五分；如热盛，加青蒿三钱；如寒多，加入煨姜三钱、大枣三枚。

33380 当归保命承气汤

【方源】《慈航集》卷上。

【组成】当归一两 大黄五钱 元明粉三钱 生甘草一钱五分 枳实三钱（炒） 厚朴二钱（炒）

【用法】水煎服。

【主治】结胸之证，大便干燥，脉沉弦有力者。

【加减】如手按胸腹，痛而坚硬恙久者，此有死血热结，加桃仁五钱，酒洗红花三钱，必下黑粪而愈。

33381 当归桃仁承气汤

【方源】《保命歌括》卷七。

【组成】桃仁（研）半两 大黄一两 归梢七钱半 甘草 桂 芒消各三钱

【用法】上咬咀，作二服。水一盞半，加生姜三片，入盐，再煎一沸服。

【主治】血滞胸中，心下痞满，呕血。

33382 当归黄芩芍药汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】当归 黄芩（炒） 芍药（炒） 黄连（炒） 白术（土炒） 枳壳（麸炒） 茯苓 陈皮 生地 生草各一钱 木香五分 乌梅一个

【用法】水煎，空心服。

【功用】清热和胎，行气养血，预防损胎。

【主治】妊娠痢疾，虚坐努力者。

33383 当归补血加葱白汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归二钱 黄耆一两 葱白十根

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后无乳。

【方论选录】《医方考》：乳者，气血之所成也。故气血充盛之妇，未尝无乳，凡见无乳者，皆气体怯弱之妇也。是方也，用当归、黄耆大补其气血，此养乳汁之源也；葱白辛温，直走阳明，阳明达于乳房，故用之为使，此通乳汁之渠也。如依古方用猪悬蹄、漏芦辈亦可。

33384 当归补血汤合桂枝汤

《医学摘粹》。为《医钞类编》卷十七“桂枝合补血汤”之异名。见该条。

33385 当归拈痛合苏子降气汤

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】人参 白术 苦参 秦艽各四分 知母 黄芩 当归 羌活 萝卜子各五分 升麻 葛根各二分 茵陈 苍术 苏子各三分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】肩背痛湿热甚者。

33386 当归四逆加吴茱萸生姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四逆汤（《千金》卷二十）、吴茱萸散（《圣惠》卷四十七）、四逆茱萸汤、吴茱萸汤（《圣济总录》卷三十八）、四逆加吴茱萸生姜汤（《注解伤寒论》卷十）、四逆茱萸汤（《杏苑》卷七）。

【组成】当归三两 芍药三两 甘草二两（炙） 通草二两 桂枝三两（去皮） 细辛三两 生姜半斤（切） 吴茱萸二升 大枣二十五枚（劈）

【用法】以水六升，清酒六升和，煮取五升，去滓，温分五服。一方酒、水各四升。

【功用】《伤寒方苑荟萃》：散寒涤饮，降逆温中，养血通脉。

【主治】①《伤寒论》：手足厥寒，脉细欲绝，内有久寒者。②《伤寒方苑荟萃》：现用于血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病、慢性荨麻疹、冻疮等；亦可用于慢性消化道疾病而疼痛呕吐较剧者、头痛、溃疡病、慢性风湿性关节炎、风湿性肌炎、痛经、闭经等。

【方论选录】①《千金方衍义》：阳邪传入厥阴而厥寒，脉沉细欲厥与直中阴寒之治截然两途。直中阴寒用姜附四逆以回阳，惟恐药之不力而变虚阳发露，陷阴之邪用当归四逆以通阳，仍须桂枝汤，但去生姜加当归助芍药以和营，细辛、通草助桂枝提出阳分，使阳邪仍以阳解。其去生姜者，恐其性暴，不待气味入阴，便从太阳开发也。在霍乱则不然，专取生姜、吴茱萸速破逆上之厥气，则阳通脉复。盖回阳用干姜、通阳用生姜，一定不易之法。②《古方选注》：厥阴四逆，证有属络虚不能贯于四末而为厥者，当用归、芍以和营血。若久有内寒者，无阳化阴，不用姜、附者，恐燥劫阴气，变出涸津亡液之证，只加吴茱萸从上达下，生姜从内发表，再以清酒和之，何患阴阳不和，四肢不温也耶？③《伤寒贯珠集》：手足厥寒，脉微欲绝者，阳之虚也，宜四逆辈。脉细欲绝者，血虚不能温于四末，并不能荣于脉中也。夫脉为血之府，而阳为阴之先，故欲续其脉，必益其血，欲益其血，必温其经。方用当归、芍药之润以滋之；甘草、大枣之甘以养之；桂枝、细辛之温以行之；而尤藉通草之入经通脉，以续其绝而止其厥。若其人内有久寒者，必加吴茱萸、生姜之辛以散之，而尤藉清酒之濡经浹脉，以散其久伏之寒也。④《伤寒方论》：手足厥寒，脉细欲绝，是经络无所不寒，气血俱虚之至，故当归四逆允为合剂也。更察内有久寒，是一阳不足以为开泰之本，而经络之虚，乃相因以至、故以吴茱萸、细辛通逆而润燥，通草为引，复以桂枝全汤而君以当归，血由气生，寒从阳化也；并可通于杂证之血虚极寒者矣。

【临证举例】①血虚寒厥证《天津医药》（1978；5：215）：吴某某，男，38岁。1970年冬季，外出检查线路，下班后自觉四肢寒冷，并有麻木疼痛，以后每逢外出，两手及面部出现青紫，尤以手指鼻尖耳廓最明显，回室内温暖后，青紫逐渐消失。诊其两手逆冷

至腕,手足均呈青紫,脉沉细,舌质胖嫩,舌苔白。属阳气虚弱,不能温营四肢,寒邪外袭,致血脉凝涩,经脉不通。治拟温经通络,活血祛寒。当归、白芍各9克,桂枝、吴茱萸各6克,细辛、甘草、通草各3克,生姜三片,大枣5枚。药后病情好转,续诊两次而愈。②痛经《新医药学杂志》(1978;3:7):万某某,女,22岁,学生。患者经来腹痛已有五年之久,曾服温经汤及调经诸药,收效甚微。自述平时身冷,恶寒,四肢痿软无力,小腹常觉不温,月经愆期,白带多而清稀,每逢经期,小腹剧痛,痛时手足冰冷,口不渴,时吐清涎,小便量多。查其舌质淡暗,苔薄,脉沉迟细弱,证属虚寒逆经,拟用当归四逆加吴茱萸生姜汤治之。当归15克,桂枝12克,白芍(酒炒)15克,细辛6克,大枣18克,木通9克,炙草6克,官桂6克,台乌6克,艾叶(炒)6克,吴茱萸9克,生姜9克,加白酒一杯同煎。嘱在经前服本方三剂,下月经期前再服三剂。后六剂而愈。③缩阴证《治验回忆录》:刘妇,年四旬余,邮亭圩北村人。体素虚弱,某日农作过劳,傍晚归途遇雨,衣履尽湿,归仅更衣,不甚介意。晚间又经房事,而风雨之夜,寒气砭骨,夜半时起入厕,未久,睡感寒甚,数被不温,少腹拘急绞痛,次第加剧,待至天将明时,阴户遽现紧缩,自觉向腹中牵引,冷汗阵出,手足厥冷,头晕神困,不能起立,服药鲜效。脉象微细,舌润不温,其夫且曰:“内子阴户收缩,成一杯大空洞形,时流清液,令人见而生畏”。此乃阴寒证也,与当归四逆加吴茱萸生姜汤,嘱一日服完两大剂,并用艾灸气海、关元十余炷,又锡壶盛开水时熨脐下。次日即笑逐颜开,操作厨下,惟身觉略倦而已。④子宫下垂《新中医》(1983;2:33):戴某某,女,49岁。农民,自诉近三年来劳动增强,缺乏休养和调补,身体渐差。夜睡不宁,有时醒来烦热汗出,头痛,小腹挛痛,小便频数,或夜间遗尿。休息几天即好转,如仍持续劳

动则觉小便有物垂出,疼痛不安。月经二、三月一来,量少,色鲜红。每年此时恒发疟疾。其脉沉细难触,手足较常人为冷。舌质淡润无苔,面色萎黄。断为当归四逆加吴茱萸生姜汤证。处方:当归12克、木通、细辛、桂枝、吴茱萸、枳壳、白芍、炙甘草各9克,生姜18克,红枣25枚,赤豆脂30克(一半包煎,一半研末,分二次冲服)、水煎,加白酒半两,冲服。二诊:药后睡安,汗止,少腹不痛,尿不频数,下身下垂刺痛好转。手足依然冰冷。照原方续服三剂,各症均愈,惟手足仍冷。第二个月中旬来月经,又服三剂。以后每月服三剂。至年底患者来告,谓此后未复发,月经亦未再行。⑤产后胃冷如冰《中医杂志》(1984;8:25):青年女工傅某某,1981年夏初生难产,入产房两天两夜,胎儿未能娩出,周身大汗淋漓,神疲力竭。当时产床置于电风扇下,凉风直吹,及至胎儿娩出后,始觉凉意。因腹中饥饿,急食冷鸡汤两碗,即感胃脘痞塞不畅,胃中发冷,犹如冰块阻塞一般,且全身关节痠痛、曾服温胃散寒之方药,诸如香砂六君子汤、附子理中汤等,未获缓解,半年后来诊。其时患者面色皤白,唇甲少华,两手欠温。自述周身关节在气候突变时发痠发痛。胃冷如冰逐渐加重,并时感胸闷恶心。诊见舌淡苔白,脉象沉细。乃胃有久寒,阴血虚亏所致。其分娩时正当血脉空虚,外受寒邪之袭,内伤鸡汤之冷,胃阳大伤,安得不病之理。处方:全当归10克,川桂枝10克,杭白芍10克,北细辛5克,炙甘草3克,小木通6克,肥大枣4枚,淡吴萸12克,鲜生姜12克。酒水各半,煎后温服。每日一剂,未及半月,胃中已无冷感,诸恙尽失。⑥乳房窜痛《新中医》(1984;12:41):潘某某,女,29岁,医务人员。患者近年来右侧乳房周围窜痛。呈阶段性、阵发性、伴憋胀感,用手扪之,右侧乳房外上象限内有桃核大区域皮肤温度明显低于周围,但未扪及肿块或囊状物。自贴伤湿止痛膏无效,又曾经用理气通络止

痛之剂亦无效。别无所苦,月经正常。乳头属肝经,乳房属胃经,局部冷痛,总属脉络凝滞。试投当归四逆加吴茱萸生姜汤以暖肝温胃,通络止痛。处方:当归、白芍各12克,桂枝、吴茱萸、通草各6克,细辛、甘草各3克,生姜三片,大枣三枚。水煎,连服二剂后,乳房窜痛发冷消失,随访一年,未见复发。

33387 当归补血汤加防风连翘方

【方源】《医方考》卷六。

【组成】当归 防风各一钱 黄耆五钱 连翘二钱

【主治】疥疮有血无脓,瘙痒不止者。

【方论选录】有血无脓,此表气不足也。诸痒属虚,虚者可补,故用当归、黄耆大补其气血。乃防风者,引归、耆直达于表,二物得之而效愈速也。若连翘者,解诸经之客热而已。此药服之数剂,诸疮化毒生脓,又更服之,得脓满毒尽,则去病根,而无温癰之患;若脓日久不干者,去黄耆,加白术、茯苓以燥之,如治烂豆之法则善矣。

光

33388 光明丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】光明砂半两 恒山一两 杏仁十个

【用法】上为细末,研入朱砂令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,未发前用粥饮送下,欲发再服。

【主治】久疟。

33389 光明丸

【方源】《寿世保元》卷六引李中山方。

【组成】生地黄 白芷 羌活 独活 甘草 薄荷 防风 荆芥 木贼 甘菊花 草决明 黄连 黄芩 黄柏 太黄 连翘 桔梗各五钱 归尾 川芎各三钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三五十丸,白滚汤送下,早、晚各进一服。

【主治】眼疾暴发,新久肿痛,痛不可忍者,

皆缘心家火起所致,并治障翳。

33390 光明丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归八两 川芎八两 羌活八两 生地八两 防风八两 薄荷八两 草决明(炒)八两 覆花八两 蝉退八两 白蒺藜(炒)八两 蛇退(炒)四两 蒙花十二两 木贼十二两 黄连二两

【用法】上为细末,过罗,用冷开水为小丸。每服二钱,温开水送下,一日二次。

【功用】散风明目,拨云退翳。

【主治】肝热受风,云翳火蒙,头痛眼花,眼边刺痒。

33391 光明丹

【方源】《元和纪用经》。

【异名】金光明丹。

【组成】黄丹 雌黄(细研,炒)各二两

【用法】入牛乳二升,熬成膏,下麝香末一分,搅匀,丸如梧桐子大。每服七丸、十丸,温酒送下,不拘时候。

【主治】风痼痲舌,吐沫。

33392 光明丹

《医统》卷六十一。即《医学正传》卷五“点眼光明丹”。见该条。

33393 光明丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【异名】光明散(《经验奇方》卷上)。

【组成】制炉甘石三钱 朱砂 硃砂各一钱 麝香一分 片脑三分

【用法】上药各为细末。点眼。

【主治】①《准绳·类方》:一切眼目翳膜、胬肉、烂弦、赤眼、毳膜、紧涩、羞明恶日。②《经验奇方》:时眼红肿,疼痛多眵,流泪羞明。

【备考】《济阳纲目》有轻粉五分,无冰片。

33394 光明丹

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】川芎 当归 白芍 生地各七钱 防风 羌活各六钱 白菊花二两 谷精 荆芥 草决明 蜜蒙 绿豆皮各一两 蔓荆

旋覆各八分 兔屎四两 羚羊角 犀角各五钱

【用法】炼蜜为丸，如弹子大。每日食后薄荷汤送下。先用吹耳丹，再看何经用药引之。

【主治】痘后神白星翳。

【加减】眼赤，加黄连、龙胆各五钱。

33395 光明丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】甘石一钱 珍珠 玛瑙 雄黄 麝香 冰片

【用法】上为细末，听用。点眼。

【功用】明目。

【备考】方中珍珠、玛瑙、雄黄、麝香、冰片用量原缺。

33396 光明丹

【方源】《会约》卷六。

【组成】炉甘石(制)一两 朱砂一钱 硼砂二钱 轻粉五分 乳香(制)五分 没药(制)五分 胆矾三分 铜绿五分 冰片三分 麝香一分 黄丹五分

【用法】上为极细末，瓷瓶收用。点眼。

【主治】风热目赤肿痛，烂弦风眼及内外翳障。

33397 光明丹

【方源】《疑难急症简方》卷一引赵占一方。

【组成】浮水甘石(煨，研，用川连、川柏、条芩、木鳖子等分煎浓汁去滓，入甘石晒干，取净粉)三钱 老港潼珠一钱 煨石蟹一钱 煨石燕一钱 海螵蛸二钱 镜面朱砂三分 头梅三分

【主治】远近红白翳障，迎风流泪，睫毛倒入，蟹珠凸出，视物昏花。

33398 光明汤

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】白矾一字(捶) 铜绿一钱(捶) 干姜三分(捶) 杏仁一钱(嚼) 甘草一钱(嚼)

【用法】上药用生绢袋盛贮，顿放于瓷器内以沸汤浸，用纸封盖定，待冷。临卧洗之。

【主治】一切暴眼。

33399 光明油

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】蜗牛一百个 蚕皮三个 冰片一分 香油五两

【用法】蜗牛洗净，装瓶内，入香油，每日晒之，冰片水飞同蚕皮入油内。点于眼内。

【主治】眼中一切疾病。

【备考】有效期二年。

33400 光明散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】苍术一斤(米泔浸七日，去皮、切、焙干) 蛤粉四两(膩者) 木贼四两

【用法】上为末。每服一钱匕，茶酒调下。

【主治】眼目涩痛。

33401 光明散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】鲤鱼胆(鲤鱼一头，长一尺二寸者，取胆用)

【用法】上药刺破，滴汁在铜照上阴干，用竹刀子刮下，为细末。每用少许，时时点眼。

【主治】眼睛上生晕，不问久新。

33402 光明散

【方源】《普济方》卷八十三引《卫生家宝》。

【组成】夜明砂(炒) 蚌粉(炒) 苍术(米泔浸、炒) 海螵蛸各等分 黄丹

【用法】上为细末。用羊肝作片子，安药在中，用水一盞，煮干，细嚼，用白汤送下。

【主治】雀目不见路。

【备考】方中黄丹用量原缺。

33403 光明散

【方源】《普济方》卷七十三引《海上方》。

【组成】黄连一两 当归一分 淡竹叶三十片 赤芍药二钱 赤枣五个

【用法】上为细末。分为四次，各用水一碗半，煎至三分，以纸盖上，小取一孔熏之，随手即洗之。

【主治】赤眼。

33404 光明散

【方源】《普济方》卷八十六引《海上方》。

【组成】炉甘石 黄连各四两

【用法】上先将黄连锉细，用新汲水二升，将黄连浸之三四日后，药味已出，去黄连滓，用汁，将炉甘石火内煅至黄连汁尽了，地上出去火毒，用乳钵内慢慢细研之，用水半碗，水内飞之，去砂以尽为度，用甘石末四两，再入乳钵内细细研之，入脑子一钱，麝香一钱，再研细为度。每用一匙，或点或沸汤泡洗之。一方无麝香，用水煮。

【主治】一切眼疾，不问病因。

33405 光明散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】秦皮（去粗皮） 黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 甘草（生用） 五倍子各等分

【用法】上咬咀，每用一大匙，水一中碗，入沙糖一弹子大，同煎至八分，绵滤令净，乘热洗至冷，觉口中苦为度，药冷再暖，两次洗。

【功用】截赤眼，定疼痛。

【主治】肝经风热，目赤睛痛，隐涩难开，经久不愈。

33406 光明散

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】白矾（枯） 宣连 铜青 杏仁（去皮尖） 当归各等分

【用法】上为粗散，用净绢袋装盛，五更初取井花水一碗，浸十日，用指甲常点洗目眦头。如合得药多，用罐子盛浸，经年不坏。洗之。

【主治】翳障，及久年老眼不明。

33407 光明散

【方源】《普济方》卷七十六。

【组成】当归 藿香五钱 细辛三钱半 两头尖一两 白芷二两 枯矾二钱半 蝎梢半钱 石膏二两 何首乌一两半 薄荷半两 黄连一两半 川芎半两 甘草一两半 皂荚

一两半（烧存性）

【用法】上为细末。每服一二钱，临卧茶清调下。

【主治】眼痛。

【宜忌】忌热物。

【备考】方中当归用量原缺。

33408 光明散

【方源】《普济方》卷八十三。

【组成】白藜 赤藜 并泉石 虢丹 龙骨各等分

【用法】上为细末。每服一两，水二大碗，入猪肝四两，切一片，同煎一碗，食后先吃猪肝，然后服煎药送下。

【主治】雀目。

33409 光明散

【方源】《直指：附遗》卷二十引程东阳方。

【组成】水银五钱 铅锡三钱（一方五钱） 枯矾 炒盐 炒消各五钱

【用法】上为细末，入于阳城罐内，用铁灯盏盖之，再用铁线扎定，外用旧草鞋烧灰和盐泥固济，用文武火升之，勿令泄气，铁灯盏上常常以水渍之，依法三炷官香时退火，候冷轻手开罐取下灵气雪白，重五钱者为佳，用瓷罐收贮入后炉甘石煅炼听用。羊脑炉甘石一两，用捶熟黄泥包封甘石在内，再将前灵气五分掺于泥上，再用青盐合黄泥捶熟，又裹于外固密，晒干用髻条铁线团团绑定，用炭火煅红，用童便渍之，依法七次，取出去土，将炉甘石研为极细末。点之立效，或加冰片少许。

【主治】目翳。

【加减】翳膜，加硼砂、硃砂各一钱。

33410 光明散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】炉甘石（用上好的）四两 珍珠四钱

【用法】上药用竹纸包定，将新倾银紫泥罐为饼，包石珠在内为丸，外用熊胆一钱，硼砂二钱，火消三钱，研末为衣，再用紫泥罐

包裹，晒干，用炭灰煅炼，以七根线香为度，炼四炷香，用童便淬之；浸黑色为妙，又炼一根半香，以好醋淬之；再炼一根半香，歇火听用。前炼过末药一钱，加熊胆一分、火消一分，为极细末。点眼。

【主治】两目翳障，烂弦风热，昏瞤色眼。

33411 光明散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】川连三钱 黄柏三钱 黄芩三钱 炉甘石（水飞）三钱 梅片二分 辰砂三分 荸荠粉二钱

【用法】先以三黄浸，煮汁，入后药研至无声，澄清晒干，为细末。白蜜调点。

【主治】一切目疾。

【加减】眼湿痒，加胆矾。

33412 光明散

《经验奇方》卷上。为《准绳·类方》卷七“光明丹”之异名。见该条。

33413 光明散

【方源】《全国中药成药处方集》（武汉方）。

【组成】珍珠四分半 地栗粉一两 朱砂五分 煅硼砂三钱 麝香四分半 冰片一钱 海螵蛸三钱 熊胆四分半 煅甘石一两半

【用法】取上药混合碾细，成净粉 85～90%即得。每服用此粉少许，点眼角内，目闭片时，即觉舒适。

【主治】内障青盲，目赤肿痛。

33414 光明膏

《普济方》卷七十八。为《杨氏家藏方》卷十一“明上膏”之异名。见该条。

33415 光明砂丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】光明砂半两（细研，水飞过） 古子花半两 雄黄半两（细研） 槟榔三枚 桃仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 金箔三十片（细研） 紫石英半两（细研，水飞过） 远志一分（去心）

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿骨热，日渐瘦弱，不能饮食。

33416 光明眼药

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】熊胆一钱 片脑一钱 胆矾一钱 脑砂一钱 枯矾二钱 五灵脂三分（水飞过） 老鸦翅十根（去绒，新瓦上烧灰）

【用法】上为细末，分一半用乳汁调于碗内，将碗覆入无油铁锅底，用面固济碗口锅下用炭火烧底，待碗热取药和不煎半生药细研为末，用童便为丸，如麦子大。用时以乳汁调开，点眼极效。

【主治】眼目疾。

33417 光明眼药

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】海螵蛸（水煮淡）一钱 西玉石一钱五分 浮水甘石（煅，童便淬）六钱 熊胆三分 四六（即冰片）二分 野荸荠粉六分 朱砂三分

【用法】乳至无声。以人乳和点眼角。

【主治】新久眼珠赤肿、痒痛、羞明。

33418 光明眼药

《全国中药成药处方集》（杭州方）。为原书“龙脑黄连膏”之异名。见该条。

33419 光明眼药

【方源】《全国中药成药处方集》（南昌方）。

【组成】牛黄三分 珊瑚五分 冰片一钱五分 玛瑙五分 蕤仁霜一钱 飞炉甘石五钱 熊胆六分 珍珠（人乳制）一钱 青鱼胆二个 麝香三分 荸荠粉二钱五分 海螵蛸七分 黄连二分

【用法】上为细末，瓷瓶固封。用玻璃棒蘸药点眼内，仰卧片时。

【主治】暴发火眼，红肿疼痛，羞明畏日，云翳遮睛。

【宜忌】忌食辛燥、烟、酒。

33420 光明散子

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】制甘石（末）一两 硼砂一钱 冰片二分

【用法】上为极细末。点眼。

【主治】一切眼疾，时热翳膜。

33421 光明水眼药

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】甘石一两 琥珀一钱 地栗粉二钱五分 当门子二分 熊胆八分 元明粉八分 冰片八分 飞硼砂二分 辰砂六分 海螵蛸(漂净)一两(用大黄、黄芩、黄连各二钱,煎汁制)

【用法】上为细末,用黄连膏二两调匀。每用少许,点于眼角,合眼静坐半小时。

【主治】风热目疾,红肿作痛,痒而多泪,畏光羞明,翳障胬肉,烂眼,一切新久风热目疾。

33422 光明夜灵散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】石决明(煅复煮) 夜明砂(另研)各二钱 猪肝一两(生用,如不食猪,以白羯羊肝代之亦可)

【用法】上药和匀,以竹刀切肝作二片,以药铺一片,以一片合之,用皮纸包住,又用麻皮缠定,勿令药出,淘米泔水一大碗贮瓷罐内,不犯铁器,入肝药于中煮至小半碗。临卧连肝药并汁脂尽。

【主治】目至夜便昏,虽有灯月,亦不能视。

33423 光明洗眼方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】古青钱十文 黄连一钱 杏仁七枚(去皮) 艾叶三片

【用法】用水一钟,煎去其半,澄清一宿,次日频频洗之。

【主治】风热眼眶红烂者。

【方论选录】铜性清肃,可以胜热明目;黄连苦燥,可以泻热坚肤;艾叶辛温,可使驱风胜湿;杏仁辛润,可使利气泽皮。

33424 光明眼药水

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】胆矾一钱二分 青盐四钱 明矾七钱 乌梅七钱 川椒三钱 木贼草一钱五分 白丁香六分 冰片二分 绣花针三枚

【用法】用清冷水浸药于碗中,隔水悬煮一炷香时取起,勿开看,放洁处,停三五日开,看针化则水可用。验针法:其针于未煮时,用线穿好放入,将线头挂于碗外,验时只须将线拉起,看针有否便知。每日用新软毛笔蘸水,点入四眼角;将头抬起,少顷觉有热泪,任其流出,一日四五次。

【主治】风火时眼,及眼目昏花。

33425 光明眼药水

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】乌梅一两 铜绿一两 归尾一两 甘石一两 苦参五钱 胆矾五钱 新针十四个

【用法】开水泡之,水绿即可过滤澄清,兑冰片粉五钱,瓶装,重五钱。用药水点入眼内,每日点三次。

【功用】明目退翳,散风消肿。

【主治】暴发火眼,眼目红肿,云翳火蒙,眼边刺痒。

33426 光明燥眼药

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】制甘石一两 地栗粉五钱 梅冰片二钱

【用法】上为细末。每用少许,早晚点于眼角,合眼静坐半小时。

【主治】风热上炎,目红肿痛,畏光羞明,翳膜遮睛,迎风流泪,视物昏花,一切新久目疾。

【宜忌】忌酒、葱、大蒜。

33427 光明拨云锭子

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】炉甘石末(一斤煅过,用黄连半斤,水二碗煎五七沸,淬七次止,取净末)二两 硼砂一两 片脑一钱 海螵蛸二钱 麝香二分 珍珠一钱 血竭三钱 乳香 没药各一钱

【用法】上为细末,以黄连膏子和剂捻成锭子。净水磨化点。

【主治】远年近日一切眼疾。

吐

33428 吐风散

【方源】《普济方》卷三七〇引《全婴方》。

【组成】全蝎一个(炒) 瓜蒂一个(炒) 赤小豆三十粒

【用法】上为末。一岁一字，温米汤调下，未吐再服。

【主治】①《普济方》引《全婴方》：小儿急卒中风，口噤不开，不省人事。②《寿世保元》：小儿急慢惊风，发热口噤，不省人事，手心伏热，痰涎咳嗽，上壅喘急。

33429 吐血丹

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】真阿胶(蛤粉炒)五钱 天冬(去心)一两 川贝(去心)五钱 茯苓五钱 杏仁(去皮尖)五钱 (或加生甘草五钱尤妙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼核大。每服一丸。不拘时候。

【主治】吐血。

33430 吐血散

【方源】方出年氏《集验良方》卷三，名见《吉人集验方》。

【组成】藕节(为末) 炒蒲黄 血余灰各等分

【用法】水调服。

【主治】吐血。

33431 吐乳散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】扁豆一钱半(炒) 薏米三分(研) 砂仁三分(炒) 法夏三分

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾胃积滞，乳食则吐，受寒则吐，受湿则吐，受热则吐。

【加减】夏天或南省加伏龙肝一钱，云苓一钱，竹茹一分。

33432 吐泻丸

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】肉豆蔻五钱 滑石(冬、春一两二钱五分，夏二两五钱，秋二两)

【用法】上为末，姜汁打神曲糊为丸服。

【主治】寒泻。

33433 吐涎散

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】膩粉一两 猪牙皂荚末一分

【用法】上为细末。每服半钱，生油一椀斗，水半盞，同调匀，分二服，以吐为度。

【主治】时发惊风，变成痼疾。

33434 吐涎散

【方源】方出《经验良方》引《吴氏集验方》，名见《医方类聚》卷七十五。

【组成】鹤虱二钱半 酒一盏 醋少许

【用法】同煎至半盞，吞下。吐出毒涎安。

【主治】喉风，吞药不得，不能饮食。

33435 吐津丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】雄黄 巴豆 木香 白矾各三钱 公丁香 肉桂 胡椒各五钱 五灵脂(去砂石，醋炒)一两

【用法】上为细末，烧酒打糊为丸，如芥菜子大。每服十五丸，虚弱与小儿减半，烧酒送下，不拘时候。

【主治】九种心痛。

33436 吐蛊散

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】白矾 建茶 土常山 马兜铃根 雄黄 刺猬皮灰 桑枝汁 蒜汁 鸡翅下血(赤雄) 败鼓皮灰 甘草节(麻油浸)各等分

【用法】上为末。每服五分，以吐为度。

【功用】吐蛊毒。

【方论选录】雄黄解五蛊之毒；刺猬制五蛊之神；蒜汁纯阳，制五阴之毒；桑汁杀腹内虫，专制蜈蚣；赤雄鸡翅下血入血而性升，善祛伏风，故解蛇、蝎、蜈蚣之风毒；败鼓皮灰以其久鸣而败，能令病人自言造蛊者之名；土常山出天台，性凉味甘如蜜，岭南人呼为三百头牛；马兜铃根味苦，能吐五蛊、草虫之毒，非此不除，岭南人呼为三百两银，甘

苦同行，必发吐也；白矾出闽中北苑，性寒味苦，治热毒，苦涩寒热相佐以行，当发吐也；常山、兜铃、白矾、建茶，皆攻毒涌越之品，再以甘草载引于上，则无有不倾囊而吐者矣。

33437 吐痰丸

《普济方》卷一六七。为《千金》卷十八“擦膈散”之异名。见该条。

33438 吐痰丹

【方源】《救急选方》引《危症简便验方》。

【组成】生雄黄一钱 胆矾一钱 生滑石一钱

【用法】上为细末。大人五分，小儿三分，白汤调下。牙关开后，即宜进此。一时即吐顽痰。

【功用】善吐顽痰。

【主治】痰厥。

33439 吐痰散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】瓜蒂一分 丁香一分 赤小豆半合（炒熟）

【用法】上为细散。每服二钱，空腹以温水调下。服之当吐，后便可吃葱豉粥补之。

【主治】伤寒四日，毒气入胃，喉中闭闷。

33440 吐痰散

《点点经》卷二。为《证类本草》卷十四引孙尚药方“救急稀涎散”之异名。见该条。

33441 吐痰散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】牙皂二分 玄胡索五分 甜瓜蒂五分 青黛二分 矾（煅）三分

【用法】上为末。每服三五分，淡豆豉汤调下。如不吐，以鹅翎探吐之。

【主治】肾中风，目黑眼合不开，或窜逆口张吐沫，气不转，腰痛，小便不利，面如土色者。

33442 吐疟妙方

【方源】《续名家方选》。

【组成】千岁蓼（极细末）二钱许 常山（细末一钱）

【用法】调和。发日早晨冷水顿服，须臾而吐乃截。

【主治】疟。

33443 吐血神效方

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】鲜生地一两 参三七八分（开水磨冲） 鲜白芦根一两 陈金墨二分（开水磨冲） 鲜茅柴根一两（去心） 紫苏叶三分 飞净青黛二分（冲服） 川贝母三钱（去心） 油秋水梨汁一两（冲） 生枳壳四分 青皮甘蔗汁一两（冲） 鲜藕节六钱

【用法】将苏叶、生地、枳壳、川贝、茅柴根、芦根、藕节七味同煎浓汁，然后再取前五汁冲和服之。

【主治】男妇吐血。

【宜忌】忌食酸辣等物。

33444 吐血猪肺汤

【方源】《吉人集验方》。

【组成】猪肺一个

【用法】洗极净，以朱砂三分，川椒每岁一粒，灌入肺中，将肺挖七孔，每孔放桃仁一粒，放瓦钵内煮出自然汁来，不可放水，连肺食尽。

【主治】吐血。

33445 吐血紫云膏

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】紫草四两 大生地四两 云苓三两 麦冬三两 白果肉一百粒

【用法】清水煎浓，绞汁，用蜂蜜六两收膏。每服二调羹，早晚冲服。

【主治】吐血。

【备考】久则成癆不治，照方常服，自可除根。

33446 吐血除根奇方

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】真童子鸡一只

【用法】真童子鸡一只，男用雌，女用雄，先择无人走动处掘一地潭，用竹刀将鸡在潭内杀之，血滴潭中，干得毛剖开，肠杂收拾干

净,毛屎亦放潭中,不可狼藉一点,俱不可经勺水,只用干布拭净肚内,用六月雪草,每病人一岁,摘头一个,同肠杂仍放在肚内,将新近平底钵一个,以鸡放人盖好,用面糊封口,放干灶锅,亦盖好封固,烧柴草把三个,约缓热茶时许取出,鸡已熟矣,去六月雪,空口淡吃,一顿净尽,将鸡骨亦放潭内,泥盖捶结,重物压住,永不可开。重病吃两次可除根。勿以草把三个,隔锅钵干烧为疑,已试过果然。

【主治】吐血。

吃

33447 吃疔虎

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】上牙消六钱 明雄黄一两 大青盐三钱 麝香五分 冰片五分

【用法】上为细末。每用少许,香油调敷患处。

【功用】消炎解毒。

【主治】无名肿毒,诸般恶疮。

33448 吃力伽丸

【方源】《外台》卷十三引《广济方》。

【异名】①安息香丸(《中藏经》卷下)。②苏合香丸(《苏沈良方》卷五)。③乞力伽丸(《普济方》卷二三七)。④苏合丸(《赤水玄珠》卷四)。

【组成】吃力伽(即白术) 光明砂(研) 麝香(当门子) 诃梨勒皮 香附子(中白) 沉香(重者) 青木香 丁子香 安息香 白檀香 藿芰(上者) 犀角各一两 薰陆香 苏合香 龙脑香各半两

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。腊胎之,藏于密器中,勿令泄气。每朝用四丸,取井花水于净器中研破服。老小每碎一丸服之,另取一丸如弹丸,蜡纸裹,绯袋盛,当心带之,冷水暖水,临时斟量。

【功用】芳香开窍,行气止痛。

①《得效》:散疫气。②《奇效良方》:顺气化痰。③《中医方剂学》:解郁开窍。

【主治】中风、中气,猝然昏倒,不省人事,牙关紧急,或中寒气闭,心腹猝痛,甚则昏厥;或痰壅气闭,突然昏迷,以及时疫霍乱,腹痛胸痞,欲吐泻不得,甚则昏闭者。

①《外台》卷十三引《广济方》:传尸骨蒸,殓殍肺痿,疰忤鬼气,卒心痛,霍乱吐痢,时气鬼魅,瘴疟,赤白暴痢,瘀血月闭,痲癧疔肿,惊痢,鬼忤中人,吐乳狐魅。②《普济方》:从高坠下,挟惊悸,血气错乱,昏迷不醒。③《玉案》:厥证。④《会约》:梦与鬼交,脉息乍大乍小,乍有乍无,或绵绵不知度数,时常悲笑,其状不欲见人。

【宜忌】忌生血肉、桃、李、雀肉、青鱼、酢等。

【方论选录】①《医方考》:病人初中风,喉中痰塞,水饮难通,非香窜不能开窍,故集诸香以利窍;非辛热不能通塞,故用诸辛为佐使。犀角虽凉,凉而不滞;诃梨虽涩,涩而生津。世人用此方于初中之时,每每取效。丹溪谓辛香走散真气,又谓脑、麝能引风入骨,如油入而,不可解也。医者但可用之以救急,慎毋令人多服也。②《成方便读》:此为本实先拨,故景岳有非风之名;若一辨其脱证。无论其为有邪无邪,急以人参、桂、附之品,回阳固本,治之尚且不暇,何可再以开泄之药,耗散真气乎?须待其根本渐固,正气渐回,然后再察其六淫七情,或内或外,而缓调之,则庶乎可也。此方汇集诸香以开其闭,而以犀角解其毒,白术、白蜜匡其正,朱砂辟其邪,性偏于香,似乎治邪中气闭者为宜耳。

【临证举例】①中风 《名医类案》:邱信,年四十三岁,患中风,肚甚疼,口眼喎斜,苏合香丸服之就愈。后加姜汁、竹沥全愈。②血叶淋病(腹痛、胁痛) 《辽宁中医杂志》(1988;1:31):冯某,女,48岁。右胁痛如锥刺,痛处固定不移,拒按,伴全腹剧烈胀

痛,昼轻夜重,间歇发作,达13年之久。兼见面色黧黑,夜寐不安,恶梦纷纭,口苦口涩,口渴但不欲多饮,纳差,舌紫暗胖嫩边有齿印,苔白而厚,脉沉涩,每次发作,剧痛难忍,疼痛持续2~3小时不等,之后即缓解,但余痛不息(其母亦患此证早亡)。近来病情加重,肝大肋下3~4cm,质硬中等;腹部膨隆,鼓之如鼓,但无青筋暴起。化验室检查:尿卅胆原试验阳性;尿液新鲜时呈深黄色,经日晒或加酸后转为红色。开始用酚噻嗪类、氯丙嗪、麦啉等药治疗,剧痛未减。急投苏合香丸一粒,令病者嚼碎,以温开水吞服。服后2分钟,疼痛大减,3分钟后,疼痛立止。其后每3天服1粒,共服用4粒,另外加服疏肝理气止痛的中药50余剂,病愈出院。追访2年未见复发。③阴缩 《辽宁中医杂志》(1988;1:31):马某,男,46岁。小便频数,日10余次,色白面短,淋漓不尽年余,伴见精神萎靡,面色黧黑,少腹冷痛,舌淡苔白,脉沉细。前医用补肾法治疗,月余未见好转。3月25日下午3时许,突感阴部抽吸样疼痛,逐渐加重,呼痛声不绝,精神恐慌,面色苍白,额头冷汗渗出,手足冰凉。其妻一手握住患者阴茎,一手握住阴囊,用力往外拉扯。舌淡苔白,脉沉伏不现。笔者令其妻松开手,见患者阴茎短小,仅寸许,阴囊团缩,小如鸡卵,阴茎和阴囊呈阵发性向腹中收宿,每收缩1次,病人即呼痛1次。证为“阴缩”。嘱服苏合香丸2粒,先以1粒,令病人嚼碎吞服,5分钟后,少腹转温,阴部抽搐停止,疼痛亦止,随即阴囊皮肤松弛,阴茎外挺,恢复原状。次日上午复诊,病人阴部无不适感。嘱其将剩余1粒照服,以巩固疗效。④木薯中毒 《广东医学》(1966;1:15):刘某之子,一为7岁,一为10岁,二孩乘家长外出,共煮未去毒的木薯同食。饱食后,至黄昏时,突觉发冷、头晕、胸闷、呕吐,其家长收工回家,始发觉是木薯中毒。当天晚上即邀我们医生二人前往抢救。一因呕吐较

多,中毒较浅,当时除给予盐汤探吐,使之继续吐水一些清涎外,复磨服苏合香丸二枚,即安然无事。另一病孩因食木薯较多,中毒较重,当时已肢冷,脉伏,手足微抽,面青、唇绀,鼻扇,气促,呈半昏迷状态,情况十分严重。当即注射可拉明一支急救。注射后,情况未见好转。复以针刺人中穴,反复行针数次,虽有功效,但是未脱离危险。因山区交通不便,离城市较远,购药较难。后来细辨其表现症状,属痰厥气闭的寒证,根据中医辨证施治的原则,即用温开水磨苏合香丸一枚灌服,边磨边灌。服一丸后,其气即顺,效果十分显著,迅即温回脉复,神态安和,语言亦甚清楚,再无中毒证状。为着确保病孩安全,使再服苏合香丸一枚,送韶关市人民医院治疗。在送院途中(约3~4小时)病孩精神安和无异,翌晨回家一切如常人。⑤吐血 《上海中医药杂志》(1986;7:26):一病人,素有咳嗽宿疾,性情忧郁寡欢,一日暴怒后咳呛吐红,胸闷胁痛,治以清肺宁嗽,凉血止红,但咳不止,血不宁。因思吐红乃木郁化火、气逆动血面致。木郁不达,气火不平,血何以归经?郁甚者,仅以疏肝,力怯难畅,必投香窜,气雄易通,故投以苏合香丸一粒,辛香宣达,解郁疏气,再配以肃肺降气之品,药后竟获良效。此法古有记载或可佐证,如《世医得效方》失血门即有以“苏合香丸治因气作衄,或吐呕血”的载述;《苏沈良方》有谢执方一案,“呕血甚久,遂奄奄而绝,羸败已久,手足都冷,鼻息皆绝”,“研苏合香丸灌之,尽半两遂安”。⑥胆道蛔虫 《陕西中医》(1985;7:322):用苏合香丸治疗胆道蛔虫病9例,获得满意疗效。每服一丸,一日2至3次,温水送下,服药间隔时间为4至5小时。服药后剧痛30至60分钟内症状消失或缓解者,一般用药不超过3丸为疗效好。显效:服药1至2丸后,症状与体征消失,两天以上不复发者6例,占66.7%;有效:服药3丸后,症状与体征基本消失,两天内有复发者2例,占22.3%;无效:服药后,症状体征稍有

好转,一日内复发三次以上者。总有效率89%。⑦过敏性鼻炎 《吉林中医药》(1986; 6: 17);王某某,男,45岁,工人,1985年11月26日就诊。两年前曾在某医院五官科确诊为过敏性鼻炎。每遇寒冷气候时则出现鼻塞流涕、喷嚏、头痛流泪、反复发作,近日因气候变化症状加重,经西药对症治疗,效果不显而转中医诊治。证见鼻塞声重,喷嚏流涕,头痛,舌苔薄白,脉浮紧。诊为:鼻渊(寒闭型),治宜辛温芳香开窍,药用苏合香丸,嘱其早、午、晚各服一丸,经服40丸病愈,一年后追访未见复发。

33449 吃药即效散

【方源】《秘传外科方》。

【组成】白芷 贝母(去心)各等分

【用法】上为细末。南酒调服。若无乳行者,加漏芦 煎酒调服即行。

【主治】乳痈。

吸

33450 吸散

《千金》卷十八。为《外台》卷九引《古今录验》“四味石钟乳散”之异名。见该条。

33451 吸筒

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】五倍子多用 白矾少用些子

【用法】用慈竹削去青,和上药煮了收起,用时再于沸汤煮令热,用箸钳筒,乘热安于患处。

【主治】疮肿。

33452 吸针丸

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】透活磁石

【用法】用透活磁石生研,将黄蜡和捻如针。凉水送下。裹针从大便出。

【主治】误吞针。

33453 吸烟散

【方源】《续名家方选》。

【组成】辰砂 硫黄 甘松 木香各一钱 石膏 沉香 赤石脂 生地黄 当归各二钱

明矾 樟脑 杉梢叶灰各三钱 茶一钱

【用法】上为末,盛纸袋,为七帖。渍麻油,点火吸油烟。日尽一袋。

【主治】霉疮结毒,淋疾痔疾,脱肛疥疮,风毒痈疔。

【宜忌】勿含口中,恐损齿舌。

33454 吸毒仙膏

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】吸铁石五钱 忍冬藤八两 当归三两 天花粉一两 夏枯草八两 香油五斤

【用法】熬成膏,加黄丹二斤收之。疮口一破,即用此膏贴之。

【功用】呼毒吸脓兼生肌。

【主治】诸般痈疽已破。

33455 吸毒竹筒

【方源】《秘传外科方》。

【组成】苍术 白蔹 乌柏皮 厚朴 艾叶 好茶芽 白及 白蒺藜各等分

【用法】用苦竹筒三五七个,长一寸,一头留节,削去其青,令如纸薄,随大小用之,却用前药煮竹筒十余沸,待药干为度,乘竹筒热,以手按上,紧吸于疮口上,脓血水满自然脱落,不然用手拔脱,更换别个竹筒,如此三五次,毒尽消之,即敷生肌药,内满后,用膏药贴之。

【主治】发背,痈疽,疔疮,肿毒。

33456 吸药仙丹

【方源】《回春》卷二。

【组成】鹅管石二两 寒水石四钱半 金星礞石七钱(焰消煨后用醋淬) 白附子七钱 白矾七钱(枯过四钱半) 孩儿茶四钱 款冬花(净蕊)七钱 粉甘草四钱

【用法】上药各为极细末,方用总箩过筛匀。热嗽,用茶汤送下;寒,用生姜汤送下;咳如浮肿,用木瓜、牛膝汤送下;咳而有红痰,吐血,白芥子汤送下。

【主治】咳嗽

【加减】如有气逆,加沉香五分,木香七分,官桂七分;如心下虚悸,加朱砂三分。

33457 吸药如神散

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】雄黄 佛耳草 鹅管石 款冬花 甘草 寒水石 青礞石(煅过) 白附子 枯矾 孩儿茶各等分

【用法】上为细末。纸燃烧烟，令病人吸之。

【主治】风入肺中，久嗽不愈。

岁

33458 岁桃浆

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】核桃

【用法】用核桃按岁一枚，取白肉，竖排砂锅内，每桃上放细茶一撮，以酒煎。嚼桃饮酒。速愈。

【主治】疔疮初起。

33459 岁旦屠苏酒

《千金》卷九。为《外台》卷四引《肘后方》“屠苏酒”之异名。见该条。

吕

33460 吕雪丹

《玉钥》卷上。即原书同“回生丹”去麝香、提牙消。见该条。

33461 吕雪丹

【方源】《温氏经验方》。

【组成】冰片六厘 硼砂一钱

【用法】用萝卜一个，同煮熟，入冷水内一夜，水底沉结如冰者佳，取出，加青黛一分，为极细末，收瓶内。用时吹患处。

【主治】孕妇咽喉破烂疼痛。

33462 吕祖仙膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】生山药一段(洗净，去皮) 碎火石数钱

【用法】和匀捣烂。涂患处，中留一孔出气，易二三次。

【主治】一切无名肿毒，痈、疽、疮疖阴阳等症。

33463 吕祖一枝梅

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】一枝梅(《同寿录》卷尾)。

【组成】朱砂三钱 银朱一钱五分 五灵脂三钱 麝香二分 蓖麻仁五分 雄黄 巴豆仁各五钱(不去油)

【用法】上药各为细末，于端午日净室中午时共研，加油胭脂为膏，瓷盒收藏。临用豆大一丸捏饼，贴印堂中。

【主治】大人男妇、小儿新久诸病，生死难定之间；小儿急慢惊风，一切老幼痢疾。

【备考】用药炭实大一饼，贴印堂之中，点官香一支，香尽去药，以后一时许，药处有红斑晕色肿起飞散，谓红霞捧日，病虽危笃，其人不死；如贴药处，一时后无肿无红，皮肉照旧不变，谓白云漫野，病虽轻浅，终归冥路。

33464 吕祖发背方

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】栝楼五个(取子) 乳香五块如枣大

【用法】上为末，以白蜜一斤同熬膏。

【主治】痈疽发背。

33465 吕祖奇灵膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】巴豆肉 血余 蓖麻仁 葱白 苍耳子 穿山甲(炒)各四两 天南星 半夏 大川乌 当归 肥草乌 生地 番木鳖 金银花各二两 老生姜十六片 蜈蚣二十条 全蝎四十九个 干蟾一个 大鲫鱼一斤(去肠，切碎) 肉桂一两

【用法】用真麻油五斤，浸七日，熬至滴水成珠，去滓，入炒铅粉，收成膏。摊贴。

【功用】生肌收口。

【主治】一切痈疽肿毒，诸般疼痛，疔疮顽癬，血疯外证；瘤。

33466 吕祖塞鼻丹

【方源】《疫痧二症合编》卷五。

【组成】沉香末 木香末 乳香 硼砂 皂角 良姜 细辛 当归各等分 巴豆 川

椒 麝香 朱砂 雄黄 血竭 硃砂 熟枣
瓢(捣烂)

【用法】上为丸,如梧桐子大。呼吸补泻便离床,口含冷水面朝上(仰卧),不问轻重一炷香闻之。

【主治】瘟疫。

【备考】方中巴豆以下诸药用量原缺。

33467 吕祖师如意丸

【方源】《经验良方》。

【组成】人中白十二斤(先用甘草一斤,浸汁漂七日,再以火煨,以药红为度,待火自灭尽取出,捣碎研末,水漂四十九日,其水日换一回)神曲六斤 琥珀十二两 川厚朴(姜汁炒)十二两 软柴胡十四两 天竺黄十二两 白芷十五两 四制香附十二两 炒苍术十四两 家园紫苏十二两 秦艽一斤 漂制半夏十二两 炒小青皮十二两 广砂肉十二两 薄荷十二两 广木香十二两 木通一斤 广陈皮十二两 防风十二两 川芎十二两 白茯苓十二两 净车前十二两 川羌活十二两 枳壳十二两 广藿香十两 槟榔十二两 乌药(酒浸)十两 山楂肉十四两 酒炒黄芩十两 金樱子(去心毛)十二两 草果肉十两 炒麦芽十二两 西香菇十两 上沉香八两 飞滑石十两 川贝母(去心)五两 炒蒲黄九两 土红花五两 白附子九两 蒙花三两 川郁金八两 生甘草八两 化矾九两

【用法】上为极细末,用水打丸,如龙眼大,先以雄黄一斤,水飞净为衣,再加朱砂三十两,水飞净为衣,晒七日,存贮。每服一粒,老幼及虚弱者宜服半粒,用开水化服。

【主治】时行之气,及感冒,风痰,伤寒,伤食。

33468 吕祖师铁拐杖

【方源】《回生集》卷上。

【组成】天门冬(去心)一斤 熟地(炒)一斤 白茯苓(去皮)一斤(乳拌)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,弹子大。每

服三丸,黄酒送下。

【功效】悦颜,乌须发。

33469 吕祖发背灵宝膏

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】瓜蒌五枚(取子去壳) 乳香五块如枣大者

【用法】上为细末,以白蜜一斤同熬成膏。每服三钱,温黄酒化下。

【主治】痈疽发背。

【临证举例】发背 桐庐一人,因母患发背百治不全,用此方得痊,以传于世。

33470 吕祖师清瘟神方

【方源】《卫生鸿宝》卷一引《鲍问梅手抄方》。

【组成】细辛 白芷 藜芦 延胡 川芎各一两 牙皂(去子弦)五钱 朱砂一钱 雄黄二钱

【用法】上为细末。吹鼻。

【主治】一切瘟疫。

【临证举例】嘉庆癸亥年,夏热异常,人死者众,以此药陆续吹鼻内数次,俱下恶血,得活无算。

33471 吕祖紫金夺命膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】川黄连 全蝎 穿山甲 黄芩 川黄柏 当归 香白芷各二两 赤芍 番木鳖(切片) 生地各一两 官桂 海藻各四两

【用法】用水煎汁去滓,用麻油二十二两,将药汁入内熬尽水气,滴水成珠,方下炒过飞净血丹十一两,搅匀成膏,再下黄蜡七钱,又下阿魏六钱(切片),掺膏药上,令其自化,候微冷,又下乳香(去油)、没药(去油)、轻粉各六钱,麝香、血竭、朱砂、雄黄各二钱,雄鼠粪一两五钱,燕窝当底泥一两,俱乳细末,入膏搅匀,收贮摊贴。

【主治】一切多年久不收口恶疮结毒,瘰癧,冷瘤,痞块,跌打骨断两截者。

33472 吕洞宾仙传化毒汤

【方源】《回春》卷八。

【组成】防风 甘草节 白芷 茯苓 贝母 黄芩 连翘 白芍各一钱 天花粉 金银花各一钱二分 半夏七分 乳香 没药各五分

【用法】上锉。好酒煎。胸前，饭前服；背上，饭后服；下部，空心服；上部，食后服。俱要出汗为度。如无汗，用木香熏脚膝腕内，被盖汗出而愈。

【主治】痈疽、发背、乳痈，一切无名肿毒初起，已成已溃。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“仙传化毒汤”。

33473 吕洞宾仙传芦吸散

【方源】《回春》卷二。

【组成】款冬花蕊五钱 鹅管石二钱五分 陈皮二钱五分

【用法】上为细末，分作七帖，作七日服。每服一帖，夜仰卧将药一帖作三次入竹筒内，病者口噙竹筒，近咽喉用入一吸，将白温水一口送下。

【主治】新久咳嗽，百药无功。

【加减】年老人及虚者，加人参五分；冬月，加肉桂一钱五分。

【宜忌】上忌铁器，不可多吃水；忌诸般油腻盐一七日，药服完之后，亦少用些油盐，至半月后不忌。

吊

33474 吊药

【方源】《喉科秘诀》卷上。

【组成】鹅腿草（即剪刀铰根） 山大黄（即水推沙根） 野南星（即石蒜头）

【用法】上药共磨水吞下。

【功用】吐膈中痰。

【主治】喉风，喉痹肿痛。

33475 吊药

【方源】《伤科方书》。

【组成】赤芍二钱 麝香五分 没药二钱

乳香二钱

【用法】上为细末。临用糯米饭、烧酒调涂。

【功用】接骨入骹，止痛去伤。

【主治】打伤骨头。

33476 吊肠丸

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验秘方》。

【组成】黄柏

【用法】上为末，烧热，新砖撒药于上，坐久。

【功用】去虫。

【主治】痔。

【备考】本方方名，据剂型当作“吊肠散”。

33477 吊肾丹

【方源】《医林绳墨大全》卷五。

【组成】大黄 小茴香 黑牵牛（去头末） 破故纸（去皮） 牛蒡子（去壳）各等分

【用法】上为末。每服二钱五分，空心热酒调下。至巳时行下黄痰涎水、脓血。

【主治】双肾肿疼及坠。

【宜忌】服后不可洗手，恐解药力；忌生冷、鸭、粉、面、白酒之物。

33478 吊筋药

《中药成方配本》。为原书“钓筋药”之异名。见该条。

33479 吊痰膏

【方源】《普济方》卷一六五。

【组成】皂角二斤

【用法】用水五碗，煎至一碗，去滓，净一碗内，再熬成一钟，于煨灰上，用纸倒膏在纸上，用半夏醋煮过成膏子，入皂角膏内和匀，明矾三两（末）同和，入松杨柿捣为丸，如弹子大。噙化。

【主治】痰饮。

早

33480 早夺汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】人参一两 生黄耆一两 当归一两 远志三钱 生甘草三钱 金银花一两

大黄一两 石膏一两 柴胡二钱 白术一两 天花粉二钱

【用法】水煎服。一剂而大泻恶物，臭秽不堪，再服二剂而臭物恶秽无留于肠胃矣，后可减去大黄、石膏，加土茯苓二两同煎药，再煎服四剂，则一身上下与头面之间，必有隐隐疮影现于皮肤之内，再服二剂，疮影亦渐消矣，再服二剂，永不发矣。

【功用】补中攻泄。

【主治】杨梅疮疮初发，鱼口将生。

【加减】病人阴虚阳燥，方中再加熟地数两，或玄参一两亦可，余品不可乱加。

【方论选录】大黄以泄毒，石膏以清毒，甘草、金银花以化毒，柴胡、天花粉以散毒，非多助之以大补气血之药，妙在用参、耆、归、术之类，自获全胜。

【备考】《洞天奥旨》有茯苓。

33481 早起避秽丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】避秽丹（《仙拈集》卷四）。

【组成】苍术（米泔水泡，去皮，炒黄） 于白术（炒） 广皮 厚朴（姜炒）各三两 生甘草 白藜藜（去刺，炒） 丹参各一两五钱

【用法】炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，白滚汤送下。

【主治】早起或冷暖不时，或食油腻，或闻秽气，多有呕吐腹痛、泄泻等症，并治感冒风邪、寒暑疟疾。

同

33482 同气散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】五谷虫（洗净，焙干）三钱 人中白三钱 黄连（去须） 薄荷叶 细辛 硼砂各一钱 青黛二钱 冰片二分

【用法】上为细末。掺齿缝中。

【主治】走马牙疳，牙间红肿，渐变紫黑臭

秽

33483 同归汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白术 玄参各一两 熟地二两 北五味一钱 荆芥（炒黑）三钱 贝母五分

【用法】水煎服。

【功用】止血。

【主治】唾血不止。

33484 同春丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】①八味茴香丸（《医学入门》卷七）、②茴香丸、回春丸，（《便览》卷三）。

【组成】茯苓一两 白术一两 山楂子一两（炒） 枳实八钱 八角茴香一两（炒） 茱萸一两（炒） 橘核三两（炒） 荔枝核一两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸重一钱五分。每服一丸，空心细嚼，生姜汤送下。

【主治】疝气。

团

33485 团鱼丸

【方源】《普济方》卷二三六引《经效良方》。

【组成】贝母 前胡 知母 杏仁 柴胡各等分 团鱼二斤

【用法】上药同团鱼煮，候鱼熟提起团鱼，除去鱼头不用，取肉连汁食之，却将前药焙干为末，就用团鱼裙甲及骨更煮一盞，和药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎黄耆汤空心送下。病安，仍服《局方》黄耆益损汤补理；须用市店中自死团鱼。

【功用】《血证论》：调肝利肺，金木交和。

【主治】①《普济方》引《经效良方》：骨蒸潮热，咳嗽。②《医学心悟》：久咳不止，恐成劳瘵。

【方论选录】《血证论》：团鱼乃甲虫之长，能破肝之癥结，肉亦带酸，入肝养阴，合清利痰火，疏理凝滞之品，凡肝经血郁、气郁、火郁、痰郁，以致骨蒸咳嗽者，此丸力能治

之。盖此丸以调肝者利肺，金木交和，则血气清宁，癆瘵不作。

33486 团鱼汤

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子(卸成事件) 草果五

【用法】上药熬成汤滤净，团鱼五六个煮熟，去皮骨，切作块，用面二两作面丝，生姜汁一合，胡椒一两同炒，葱盐醋调和。

【功用】益气，补不足

【主治】伤中。

33487 团参丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】团参 白术 山芋 枣(焙干为末) 陈仓米(炒黄色) 各一两 甘草(炙)一分 草豆蔻(去皮)半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，米饮嚼下，一日三次。

【主治】脾胃气虚，肌体羸瘦。

33488 团参丸

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《王氏手集方》。

【组成】阿胶 皂儿黄 人参各半两

【用法】除胶，上为细末，汤少许，烱胶和，如鸡头子大。白汤化下。

【主治】嗽血。

33489 团参丸

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】人参(去芦) 草龙胆 防风(去芦) 枳壳(炒) 白茯苓 甘草(炙) 黄耆 胡黄连(炒) 鳖甲(醋炙)各等分

【用法】上为末，以猪胆汁为丸，如绿豆大。每服十五丸，食后米饮送下。

【主治】小儿肌瘦，骨蒸潮热，夜多盗汗。

33490 团参丸

《袖珍》卷三。即《济生》卷二“团参散”改为丸剂。见该条。

33491 团参丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】人参 黄耆 麦冬各二两

【用法】炼蜜为丸。每服四钱，开水送下。

【主治】肺虚咳嗽，吐血不止，阴虚内热。

33492 团参汤

《直指小儿》卷四。为《直指》卷九“当归散”之异名。见该条。

33493 团参汤

《永类铃方》卷二十一。为《鸡峰》卷十一“团参黄耆散”之异名。见该条。

33494 团参汤

【方源】《永类铃方》卷二十一。

【组成】罗参 白术 白茯苓 黄耆 当归 甘草各等分 生姜三片

【用法】上咬咀。加麦麸，水煎服。

【功用】收敛心血。

【主治】盗汗。

33495 团参汤

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】团参 川麻 甘草各等分

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】小儿伤寒，发汗吐下后，毒气不散，表虚里实，热发于外，身斑斑如锦纹，甚则烦躁谵语；兼治喉闭肿痛。

33496 团参散

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】人参一两 桑白皮(锉、炒)二两大腹皮(锉、炒)一两 橘皮(洗) 麦门冬(去心)各一两 吴茱萸(炒) 槟榔(锉、炒) 芫花(炒) 附子(炮，去皮脐) 泽泻各半两 半夏曲 桂心 杏仁(去皮尖，研)各一两 枳实(麸炒，去瓢)半两 白术 诃子(炮去核)各半两

【用法】上为细末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮调下。

【主治】喘证。

【备考】本方方名，据剂型，当为“团参丸”。

33497 团参散

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】白术 人参 五味子各半两 甘草一分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，加

生姜二片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】补气生津。

33498 团参散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【异名】团参饮子（《证治汇补》）。

【组成】人参（去芦头） 款冬花 紫菀（洗去土）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，乌梅一枚，同煎至七分，食后温服。

【主治】①《杨氏家藏方》：肺气不利，咳嗽上喘。②《不居集》：久嗽肺虚成痼痰。

33499 团参散

【方源】《济生》卷二。

【组成】人参一两 黄耆一两（蜜水炙） 百合（蒸）半两 飞罗粉一两

【用法】上为细末。每服二钱，食后用白茅根煎汤调下；茅花煎汤亦可。

【主治】唾血咳嗽，服凉药不得者。

【备考】本方改为丸剂，名“团参丸”（见《袖珍方》）。

33500 团参散

【方源】《朱氏集验方》卷十引黄常卿方。

【组成】干姜七钱（炒） 苍术（炒） 天仙藤 甘草 川乌 北白芍药 北细辛各一两 麻黄（去节）

【用法】上咬咀。每服三钱，加生姜五片，大枣一个，荆芥七穗，水煎七分，通口服。病者只吃白粥及猪肝，此药临产断手却服三日，赶恶血尽毕，亦可以暖药补之，即用后青枣散养新。

【主治】产后恶血未尽，浑身憎寒发热，小腹剌刺痛，心气膨胀，不纳饮食，面目虚肿，脚手浮肿，耳聋眼晕，腰痛。

【备考】本方名团参散，但方中无团参，疑脱。方中麻黄用量原缺。

33501 团参散

《景岳全书》卷五十三。为《直指》卷九“当归散”之异名。见该条。

33502 团参散

《景岳全书》卷六十一。为《卫生家宝产科备要》卷六“人参散”之异名。见该条。

33503 团参饮子

【方源】《济生》卷二。

【组成】人参 紫菀茸（洗） 阿胶（蛤粉炒） 百合（蒸） 细辛（洗去叶土） 款冬花 杏仁（去皮尖，炒） 天门冬（汤浸，去心） 半夏（汤泡七次） 经霜桑叶 五味子各一两 甘草（炙）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五大片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】病因抑郁忧思喜怒、饥饱失宜，致脏气不平，咳嗽脓血，渐成肺痿，憎寒壮热，羸瘦困顿，将成劳瘵。

【加减】因气而咳者，加木香；咳而唾血有热者，加生地黄；咳而唾血有寒者，加钟乳粉；痰极而咳嗽者，加黄耆；因咳损而唾血者，加没药、藕节；咳而呕逆、腹满、不食者，加白术，仍倍加生姜；咳而小便多者，加益智仁；咳而大便溏者，去杏仁，加钟乳粉；咳而面浮气逆者，加沉香、橘皮煎。

【备考】方中天门冬，《杏苑》引作麦门冬。

33504 团参饮子

【方源】《玉案》卷四。

【组成】团参 胆星 半夏 甘草 麦门冬 杏仁各一钱二分 辽五味十五粒 阿胶（蛤粉炒） 紫菀 百部 旋覆花各一钱 桑叶（经霜者）五片

【用法】加生姜五片，水煎，食远服。

【主治】七情六郁所伤，以致脏气不平，咳嗽脓血，将成肺痿，憎寒发热，羸瘦困倦。

33505 团参饮子

《证治汇补》卷五。为《杨氏家藏方》卷八“团参散”之异名。见该条。

33506 团参太一丹

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】人参（去芦头） 酸枣仁（炒） 山梔子仁（微炒） 阿胶（蚌粉炒）各半两 天南星（牛胆制者）一两 甘草一两（炙） 玄

精石(别研) 麝香(别研)各一分 脑子(别研)一分 辰砂(别研)三钱 金箔十片

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作十丸,金箔为衣。每服一丸,食后临卧荆芥茶嚼下。

【主治】心经蕴热,神情恍惚,睡卧不安,烦躁健忘,小便赤涩,口苦舌干,头目昏痛。

33507 团参补气丸

《鸡峰》卷九。为《金匱》卷上“薯蓣丸”之异名。见该条。

33508 团参阿胶煎

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】人参 阿胶各一两 五味子 紫菀各二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服一丸,食后含,咽津服。

【主治】妊娠肺气不足,寒壅相交,痰唾稠粘,咳嗽不已。

33509 团参黄耆散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【异名】团参汤(《永类铃方》卷二十一)。

【组成】人参 黄耆各等分 甘草减半

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,煎至六分,加生姜三片,大枣二个同煎,去滓温服,不拘时候。

【功用】《永类铃方》:收敛心血。

【主治】①《鸡峰》:肺虚热,咳嗽气急,胸中烦悸,肢体倦痿,口燥咽干,情思不乐,多唾涎沫,或有恶物,肢瘦发热,减食嗜卧。②《永类铃方》:盗汗。

回

33510 回元汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】黄耆(蜜炒)一两 当归二钱半 益母草三钱 黑干姜五七分

【用法】水煎就,冲热童便服。即用补虚生荣汤亦可。

【功用】回元气。

【主治】产后血晕。

33511 回元饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】熟地十两 萸肉四两 北五味 麦冬 甘菊各二两 川芎 玄参 山药 当归各三两 玉竹八两 醵泉脑一个(酒蒸,炙,研)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服三钱,盐汤送下。

【主治】经年头疼,终朝眩晕,诸虚百损,火嗽潮热。

33512 回正散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参一钱 白薇一钱 茯苓三钱 白术五钱 半夏一钱 白芥子三钱 陈皮五分 甘草五分

【用法】水煎服。醒后服一剂痊愈。

【主治】中邪,尸厥,卒倒,中毒,中恶。

33513 回令丸

《丹溪心法》卷一。为原书同卷“左金丸”之异名。见该条。

33514 回令丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】川楝子五两(酒炒) 小茴三两(盐水炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服三钱,淡盐水送下。

【主治】孕妇小腹疼痛,脉弦紧数。

【方论选录】妊娠湿热内蕴,寒邪外束,故小腹疼痛,胎因不安焉。川楝子泻内蕴之湿热,小茴香温外束之寒邪,炼蜜以丸之,盐水以下之,使寒邪外散,则湿热自化而经气清和,小腹疼痛无不退,胎孕有不安者乎?

33515 回生丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【异名】回生丹(《普济方》卷二三八)。

【组成】巴豆(去皮心膜,出油)十枚 雄黄(水飞,研)半两

【用法】上为末,面糊为丸,如鸡头子大,阴干。每服一丸,新汲水送下。

【主治】鬼注如中恶,气急,腹胀满如鼓。

33516 回生丸

【方源】《幼幼新书》卷十三引《保生信效方》。

【组成】麻黄(去根节,称) 桑根白皮一斤(锉,须土下者,自采为佳) 续随子四两 白药子三两(为粗末)

上四味,用河水五石先浸一宿,于大釜器中旋添浸药,慢火熬,以麻黄心黑、水只有二三斗为度;取出滓,用来生绢袋滤过,再入银、石器或砂器内熬成膏。

没药(研)透明乳香(水中坐乳钵研之) 桔梗 白芷 钟乳(研五日,极细入内) 当归(去芦头,汤急洗过,切,焙干,称)各二两 人参 木香各半两 白茯苓(去皮)二两 沉香一两 苦参六两

【用法】上为细末,用麻黄膏为丸,如弹子大,须腊月合。每服一丸,百沸汤半盏化下,觉怔忡肉咽汗出是效。小儿量与,常以零陵香、白芷为末养此药。

【主治】伤寒八九日,汗不出,及日数多,沉重,精神不与人相当,汗欲出不出危殆者;伤寒坏病,手足筋挛,筋受寒邪而厥冷,及高年人虚劳烦喘;妇人经水不匀,气血虚劣;破伤风,痰嗽,肺痿,盗汗,寒热,身痛,小儿郁督,昏迷癰疽。

33517 回生丸

【方源】《顾松园医镜》卷十一。

【组成】地黄十二两(一半制) 萸肉(蒸、晒) 枸杞(晒干) 菟丝子(自制) 牛膝(酒蒸,晒干) 山药(蒸) 茯苓(人乳拌,晒,至加倍重) 白芍(酒炒) 莲肉(去心,炒) 麦冬(去心,晒干) 天冬(去心,晒干) 北五味(蜜水拌蒸,焙干) 枣仁(炒) 园肉(炙干) 莲须 玄参(蒸) 骨皮 女贞子(酒蒸,晒)各四两 龟甲胶 鳖甲胶八两(俱地黄汁溶化) 鳔胶(牡蛎煅粉拌炒,净)八两 猪脊髓三十条(去筋膜,捣烂,入炼蜜熬) 黄牛肉(去油)十斤(熬膏) 紫河车膏四两,(如

无,用紫河车四具至十具,泔水洗净,隔汤煮熟,捣烂,药拌,晒干)

【用法】诸胶髓为丸,如梧桐子大。每服三四五钱,淡盐汤或园肉汤任下。

【主治】男妇阴虚内热。

【方论选录】此方补肾理脾保肺,兼而有之。补肾用熟地、萸肉、枸杞、菟丝、牛膝,有理脾药以佐之,则不嫌其滋润。理脾用山药、茯苓、白芍、莲肉者,无香燥伤阴之患,以其能兼入肾经也。二冬清脾,五味敛肺,皆所保肺也,保肺金正以生肾水,理脾土亦为生金以生水也。枣仁、圆肉养心,一恐水虚而火旺血耗,一恐心虚不下交于肾。莲须潜精固肠;玄参、骨皮、女贞、龟鳖二甲退热除蒸。猪髓、鳔胶填精益髓,牛肉膏补脾消痰,紫河车峻补精血,是以血肉之物,补血肉之躯,功效速也。嘉言云:虚劳之疾,百脉空虚,非粘腻之物,不能填空;精血枯涸,非滋润之品,不能濡润。是以治虚劳,纵遇能消丸药之人,必煎膏服方效。若脾弱难化者,尤当膏服,胃弱者,腥膻之品勿用。此丸功在六味左归之上,不可忽之。

33518 回生丸

《女科指掌》卷五。为《回春》卷六引孙奎亭经验方“回生丹”之异名。见该条。

33519 回生丸

【方源】《方症会要》卷一。

【组成】熟地四两 山药三两 知母 丹皮各一两五钱 枸杞 茯神 泽泻 黄柏 山萸 杜仲各二两

【主治】肺嗽,喉痹,潮热盗汗,梦遗。

33520 回生丹

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】天麻一分 白附子一分(炮裂) 白僵蚕一分(微炒) 桃胶一分 天南星一分(炮裂)

【用法】上为末,烂饭为丸,如黍米大。每服三丸,用温薄荷酒送下。

【主治】小儿慢惊风,痰涎壅闷,发歇搐搦。

33521 回生丹

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】乳香 光明礞砂 釜煤 没药(与乳香同作细块,火上烧,放于通风处吹) 水银 礞石 轻粉各一钱 巴豆(十四粒,去壳并心膜,出油)五分

【用法】上同研,不见水银,蒸枣肉为丸,如梧桐子大,朱砂为衣,晒干,加干姜末内收。临时用针钻一眼,每服一丸,别用生姜三片,葱白二寸,皂角一寸,不捶破,三味同煎汤放冷,入醋少许送下;五更初不效,以热粥投之。取下恶物为效。别以和气药补之。

【主治】一切积聚。脐腹上下左右,胁下心下,久积三五十年,气块、血块、食块,大如盏碗,或如数个球子。

33522 回生丹

《普济方》卷二三八。为《圣济总录》卷一〇〇“回生丸”之异名。见该条。

33523 回生丹

【方源】《痢疽验方》。

【组成】金脚信 明礞砂 明乳香 半夏上红丹各五分 巴豆肉(不去油) 明雄黄 大南星 南礞砂各一钱 大斑蝥十五个(去头足翅)

【用法】上为细末,旋取蟾酥为丸,如麻子大,朱砂为衣。每服十五丸,好酒送下。看疮生上下,食前后服,能饮者至醉为佳。

【主治】疗毒,及肿毒失治,毒气入腹。

【备考】《治疗汇要》有麝香一分。

33524 回生丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】石膏一大块(薄荷煎浓汁一碗,将石膏火煨七次,淬七次) 生白矾三钱

【用法】上为细末。每服三钱,生姜汤调下。令吐痰出效。

【主治】痰。

33525 回生丹

【方源】方出《本草纲目》卷九引《集玄方》,名见《摄生众妙方》卷六。

【组成】千年石灰一合。

【用法】水一盏煎滚,去清水,再用一盏煎至极滚,澄清,灌之。少倾痰下白苏。

【主治】痰厥气绝,心头尚温者。

33526 回生丹

【方源】《回春》卷二引王长方

【组成】葱管藜芦二两(用河水一桶,煮为汁) 青礞石二两(火煨通红,投入汁内,如此数次,滤净) 雄猪胆十个(取汁搅前汁内)

【用法】用重汤煮成膏,候温,入片脑末一钱五分,装入瓷罐内,黄蜡封口。每用黄豆大一粒,新汲水化开,男左女右,鼻孔吹进。其痰自吐。若牙关紧不能吐,将口拨开,其痰得出,任下别药。

【主治】中风痰厥,不省人事。

33527 回生丹

【方源】《回春》卷六引孙奎亭方。

【异名】回生至宝丹(《玉案》卷五)、回生丸(《女科指掌》卷五)、回生保产至宝丹(《经验各种秘方辑要》)。

【组成】大黄一斤(为末) 苏木二两(锉,用河水五碗,煎汁三碗,去滓不用,存汁) 红花三两(炒黄色,入好酒一大壶,同煮三五滚,去红花不用,存汁用) 黑豆三升(煮熟取汁三碗,去豆不用,只用豆汁)

先将大黄末以好米醋三四碗搅匀,以文武火熬成膏,如此二遍,次下红花酒、苏木汤、黑豆汁搅开,大黄膏入内,又熬成膏取出,如有锅巴,再焙干,入后药:

当归 川芎 熟地黄 白茯苓(去皮) 苍术(米泔浸) 香附米 乌药 玄胡索 桃仁(另研) 蒲黄 牛膝(去芦)各一两 白芍(酒炒) 甘草 陈皮 木香 三棱 五灵脂 羌活 地榆 山萸(酒浸,去核)各五钱 人参 白术(去芦) 青皮(去瓢) 木瓜各三钱 良姜四钱 乳香 没药各一钱

【用法】上为细末,用大黄膏为丸,如弹子大。每服一丸,酒顿化,通口咽。

【功用】①《回春》:养胎益血和子,调和

阴阳，密腠理，实脏腑。②《北京市中药成方选集》：破血通径，化瘀止痛。

【主治】妊妇失宜，劳复胎动，或胎漏恶露时下；脏极寒，久不成胎，痿燥不长，过期不产；日月虽满，动作无力，或致损坠；产时未至，恶露先下，胞终枯燥，致令难产；或逆痼闷乱，连日不产，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，出冷沫；恶露上攻，昏闷不省，喘促汗出；及血未尽，脐腹冷痛，寒热往来；或因产劳虚损，身羸而黄，体瘦心怯，盗汗，饮食不进，渐成劳疾；妊妇胎前产后，崩漏带下；室女绝闭，月水不调。

【加减】若产后头疼，身热有汗，加桂枝末三分，生姜、葱煎汤顿化服之；若产后头疼、身热无汗，加麻黄末三分，生姜、葱煎汤，顿化服之；若产后无乳，加天花粉三分，当归尾三分、穿山甲（炙）三分，黄连三分，为末，同入酒内化开服，不拘时候，令乳母将乳头揉千余转，其乳如涌泉自出。

【备考】本方方名，《采艾编翼》引作“宁坤丸”。《类证治裁》有楂肉，无羌活。

33528 回生丹

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】青皮 陈皮 三棱 莪术 连翘各三钱（用巴豆去壳一两半，于砂锅同炒入药） 木香 甘遂（炒） 商陆 泽泻 木通（炒） 干漆（炒尽烟） 萝卜子（炒）各三钱 赤茯苓 桑白皮（炒） 椒目（炒）各五钱 胡椒（炒）一钱 黑牵牛一两（生）

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服十五丸至二十丸。第一服用生葱二十四根，搯碎，同温酒五更送下；第二服用陈皮、桑白皮煎汤，第三服用射干汤送下。

【功用】退水。

【主治】浮肿腹胀。

【宜忌】忌食盐。

33529 回生丹

【方源】《活幼心法》卷末。

【组成】丁香九枚 干姜一片

【用法】水煎，热服。

【主治】痘灰白，虚寒吐泻，手足冷。

33530 回生丹

【方源】《诚书》卷八。

【组成】天麻 防风 白附子（炮） 雄黄（飞） 辰砂（飞） 人参各三钱 冰片 麝香各五分 僵蚕（炒） 茯苓 木香各四钱 桂七分 肉豆蔻（制）一钱 半夏曲五钱

【用法】上为末，甘草汁打糊为丸。灯心汤送下。

【主治】急慢惊风。

33531 回生丹

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】真蟾酥 血竭各二钱 乳香 没药（俱去油） 胡黄连各一钱 天月闲来丹六分 轻粉六分 麝香 朱砂 冰片各四分

【用法】上为细末，生蟾酥为丸，如黍米大。每服一丸，葱白煎汤送下。发汗避风。如疮走遍身发肿，昏迷不省，仍用三丸，研为末，葱白煎汤灌下。

【主治】杨梅结毒，疮走遍身发肿，昏迷不省。

33532 回生丹

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】附子（童便制） 人参各五钱 天麻一钱 紫河车二钱 全蝎一钱五分（炒） 山药三钱（炒） 朱砂一钱 珍珠五分 天竺黄 钩藤各二钱五分 琥珀 牛黄各五分 茯苓二钱 金箔十贴

【用法】上为细末。一岁服一分，麻油、老酒下。

【主治】小儿慢脾风。

33533 回生丹

【方源】《金鉴》卷四十八。

【异名】仙传保产回生丹（《卫生鸿宝》卷五）、人参回生丹（《饲鹤亭集方》）、妇科黑豆丸、保育回生丸（《全国中药成药处方集》武汉方）。

【组成】锦纹大黄（为末）一斤 苏木（打

碎，用河水五碗，煎汁三碗，听用）三两 大黑豆（水浸，取壳，用绢袋盛壳，同豆煮熟，去豆不用，将壳晒干，其汁留用）三升 红花（炒黄色，入好酒四碗，煎三五滚，去滓，取汁听用）三两 米醋（陈者佳）九斤

将大黄末一斤入净锅，下米醋三斤，文火熬之，以长木筋不住手搅之成膏，再加醋三斤熬之，又加醋三斤，次第加毕，然后下黑豆汁三碗，再熬，次下苏木汁，次下红花汁，熬成大黄膏，取入瓦盆盛之，大黄锅粑亦铲下，入后药同磨：

人参 当归（酒洗） 川芎（酒洗） 香附（醋炒） 延胡索（酒炒） 苍术（米泔浸，炒） 蒲黄（隔纸炒） 茯苓 桃仁（去皮尖油）各一两 川牛膝（酒洗）五钱 甘草（炙） 地榆（酒洗） 川羌活 广橘红 白芍（酒炒）各五钱 木瓜 青皮（去瓢，炒）各三钱 乳香 没药各二钱 益母草三两 木香四钱 白术（米泔浸，炒）三钱 乌药（去皮）二两五钱 良姜四钱 马鞭草五钱 秋葵子三钱 熟地（酒浸，九次蒸晒，如法制就）一两 三棱（醋浸透，纸裹煨）五钱 五灵脂（醋煮化，焙干，研细）五钱 山萸肉（酒浸，蒸捣）五钱

【用法】上药并黑豆壳共晒，为末，入石臼内，下大黄膏拌匀，再下炼熟蜜一斤为丸。每丸重二钱七八分，静室阴干，须二十余日，不可日晒，不可火烘，干后只重二钱有零。纸蜡护之，即蜡丸也。用时去蜡壳调服。

【功用】①《兰台规范》：催生。②《中药成方配本》：活血化瘀。

【主治】①《金鉴》：产后诸疾。②《饲鹤亭集方》：妇人素体虚弱，经产诸疾，污秽未净，及一切寒热疼痛，死胎不下，瘀血冲逆。

33534 回生丹

《仙拈集》卷四。为原书同卷“内府蟾酥丸”之异名。见该条。

33535 回生丹

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】五倍子（整个大者，去一角，入上好银朱，不拘多少，再用银箔糊住角口，放铜勺内，微火慢慢焙之，烟绝为度，研细末，放地下出火气）

【用法】用雄雉鸡蛋尖头者取蛋清调末，务要多搽匀浓，其药稍干，即以鸡翎或硬笔蘸药敷疮，自肿处，由外往里周围敷之，留疮口，一连三四次。破后敷之亦效。

【功用】住痛消肿。

【主治】痈疽发背诸毒，恶疮。

33536 回生丹

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】黑豆（炒去皮） 蒲黄 当归 桂心 赤芍药 干姜各八两 茄种（晒干）四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服二钱，童便冲酒送下。

【主治】跌打损伤。

33537 回生丹

【方源】《羊毛瘟证论》。

【组成】生黄耆二两 白术五钱 青皮三钱（醋炒） 木瓜三钱 全当归一两五钱（酒洗） 川芎八钱 香附（醋炒）八钱 地榆（炒）五钱 蒲黄五钱 赤茯苓八钱 桃仁（炒，研）八钱 大熟地一两五钱 怀牛膝五钱（盐汤炒） 山萸肉五钱 京三棱（酒炒）三钱 五灵脂（醋炒）五钱 甘草五钱 荆芥穗五钱 新会橘皮五钱 白芍五钱 乌药一两 乳香（煨）一钱 没药（煨）一钱 广木香一钱 白僵蚕一两 蝉蜕五钱 广姜黄三钱 红曲八钱

【用法】上为细末，用大黄膏为丸，如弹子大，金箔为衣。大黄膏法：用苏木三两，河水五碗，煎至三碗，去滓；红花三两，炒黄色，用无灰酒二斤，煮十数滚，去滓；小黑豆一升，煮留汁三碗，黑豆晒干研末，俱听用；生大黄一斤，为末。用米醋八碗，熬成膏，次下苏木汤，红花酒、黑豆汁搅匀，又熬成膏，贮于盆。将锅焦焙干为末，同黑豆

末、前药末合丸。治羊毛温邪，新产后，用秋石四分，泡汤和丸温服；治产后伏毒，面青忽红，唇干舌赤，鼻中流血，烦热头痛，遍身影点成斑，用丹三粒，加黄蜜一匙，黄酒一钟，童便一钟，调匀温服；治妊妇因患温症，子死腹中，务须审脉辨证，察舌有无青黑，方用川芎一钱，当归二钱，煎汤去滓，加童便一杯，黄酒三钱，黄蜜三钱，玄明粉一钱，化丹三粒，服之即下；治产后败血停滞，并毒火扰乱，如见鬼神，语言颠倒，用灯草一团，黄连三分，水煎去滓，加秋石三分，化丹两粒温服；治产后温毒扰乱，败血腹痛，周身浮肿，或四肢浮肿，食方气喘，皮肤俱见赤色，用桑皮一钱，水煎去滓，加童便一钟，黄蜜三钱，化丹三粒温服；催生遇难产之际，用丹一粒，研碎贮碗，加葱白三枚，黄酒一茶钟，重汤蒸热，去葱服之，立刻就生；产时横逆难生，并胞衣不下，用丹一粒，开水和，加黄蜜一匙，童便一杯，黄酒一杯温服；产后儿枕痛，恶露不尽，用丹一粒，开水和，加沙糖一匙温服；产后头痛、身热、有汗，用开水化丹一粒服之；产后眼昏腰痛，身似角弓，用川芎五分，全当归一钱，白薇一钱，生黄耆一钱，荆芥八分，水煎，去滓，化丹二粒服之；产后血晕，头旋眼黑，语言错乱，用白芍一钱，菊花五分，水煎，去滓，化丹一粒，加童便一杯服之；产后胸闷，口干烦渴不宁，因停滞饮食，用炒山楂一钱煎汤，化丹一粒服之；产后寒热如疟，用开水化丹一粒，加黄酒一杯温服；产后忽寒忽热，咳喘，心烦惊悸、口渴，用生黄耆、全当归各一钱，荆芥、川芎各三分，水煎，去滓，化丹一粒服之；产后二便不通，用枳壳五分煎汤，化丹一粒，加黄蜜一大匙服之；产后失音，用甘菊五分、桔梗八分、诃子四分煎汤，化丹一粒服之；产后无乳，用丹一粒，加天花粉、归身、炒三甲各三分，研细末，入黄酒开水化服；妇人经水不调，用葱白二枚，泡汤化丹二粒服之。

【主治】妇人产后诸疾，污秽未净，及实邪胀痛，瘀血冲逆，及羊毛温毒症。

33538 回生丹

【方源】《玉钥》卷上。

【异名】冰硼散（原书同卷）、吹喉回生丹（《喉科枕秘》）。

【组成】大梅片六厘 麝香四厘 硼砂一钱 提牙消三分（用萝卜同煮透，再滤入清水内，露一夜，沉结成马牙者佳）

【用法】上为细末，以洁净为妙，入瓷瓶封固。临用挑少许，吹患处。

【主治】一切喉证。

【加减】开关后，次日并体虚头晕者，去麝香（名品雪丹）；毒肿渐平，并用刀破后者，再去牙消（麝、消双去者，名吕雪丹），加青黛（名青雪丹）。

33539 回生丹

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】五加皮一两五钱 川牛膝一两五钱 当归身五钱 炙甘草四钱 木耳一两三钱（蜜炙） 黄麻灰五钱 鹿角胶一两（麸炒） 川山甲一两八钱 自然铜一两八钱（煅） 骨碎补一钱

【用法】除自然铜外，上药共为细末，用老米饭打糊为丸，分作六十丸，每丸加自然铜末三分，辰砂为衣。每服一丸，酒磨下。

【主治】极重损伤垂危证。

33540 回生丹

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】金银花八两 玄参 蒲公英各三两 川芎一两 甘草五钱 花粉 柴胡各三钱

【用法】水煎服。

【主治】无名肿毒。

【加减】头面，加附子一钱；身之前后左右，加当归二两，甘菊一两，附子三分；四肢，加白米二两，茯苓一两，附子五分。

【方论选录】《青囊秘诀》：此毒原系水亏之极，而泻毒之药，无不有损于阴阳，惟金银

花攻补兼妙，故用以为君，若少用，其味单而力薄，多用则味重而力厚。又加玄参以去火，甘草以泻毒，蒲公英以清热，天花粉以清痰，川芎以散结，自然相助而奏效也。

33541 回生丹

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】番木鳖四两 麻黄四两 生草一两（三味用水煮透，木鳖刷去毛，用麻油五两，燥浮取起，以纸包压去油）僵蚕三钱（烘黄色）乳香 没药各五钱（去油）川蜈蚣（火酒浸，瓦上炙）全蝎（酒洗，瓦上炙）雄黄 朱砂各三钱 川山甲五钱（香灰炒）羌活 白芷 生草各四钱 当归 大川乌（洗淡，姜汁炒）草乌（洗淡，姜汁炒）闹羊花（火酒炒）各五钱 虎骨一两（羊油炙酥）

【用法】上为细末，用麻油四两打神曲糊为丸，如萝卜子大，外以金箔为衣。每服五分，临卧火酒送下。盖被取汗；如无汗，再进一服，以出汗为度。如见风即作吐发战，以黄泥水服之即解。

【主治】麻疯。

【宜忌】须避风。

33542 回生丹

《咽喉秘集》。为原书“亥药”之异名。见该条。

33543 回生丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】生军 黑豆各一斤 人参 姜黄各二两 茅术 茯苓 当归 香附 川芎 桃仁各一两 地榆 广皮 白芍各五两 良姜四两 熟地 蒲黄 蓬术 红花 没药 苏木 益母膏各三两 乌药二两五钱 乳香 青皮 木瓜各三钱 玄胡二钱 萸肉 牛膝 广木香 五灵脂 三棱 甘草各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每重二钱七分，蜡封。临产，人参汤送下，桂圆汤亦可；瘀露未净，益母草汤送下；寒热腹痛，砂仁汤送下；胎衣不下，人参汤送下；血晕冲逆，童

便送下；月闭不通，陈酒送下；干血劳疾，枸杞子汤送下。

【主治】妇人经产诸疾。

33544 回生丹

【方源】《外科全生集·新增马氏试验秘方》。

【组成】活地鳖（瓦上炙微黄，研末）五钱 自然铜（瓦上煅红，醋淬九次，净）三钱 滴乳香一两（用灯心二钱同炒枯，吹去灯心，研取）二钱 真血竭（水飞）二钱 朱砂（水飞）二钱 巴豆霜（用巴豆去壳，纸包压净油，白如雪，取霜）二钱 当门子三分

【用法】上为末，贮瓶，勿泄气。大人每服一分五厘，小儿七厘，酒冲下。牙关紧者，撬开灌之即活，再下一服即愈。

【主治】跌打。

33545 回生丹

【方源】《温氏经验良方》。

【异名】神仙活命丹。

【组成】贯众 甘草 板兰根 干葛 甜消各一钱 川军一两半 牛黄（研）珠子粉 生犀角 薄荷各五钱 朱砂四钱 麝香（研）肉桂 青黛各三钱 龙脑二钱（研）金箔三十片

【用法】上为细末，收贮瓶内，封口，不可泄气。解百毒，新汲水下；汗后热劳病，及小儿惊风热症，薄荷汤下；急症用一分，开水送下。如不张口，撬开牙齿灌下。

【主治】中风不语，半身不遂，肢节顽麻，痰涎上涌，咽嗑不利，饮食不下，牙关紧闭，及一切酒毒，药毒，紧急霍乱，中暑。

33546 回生汤

【方源】《羊毛瘟证论》。

【组成】南沙参二两 麦冬（去心）三钱 云茯苓二钱 生地黄五钱 当归一钱 犀角尖二钱 黄连一钱 黄芩二钱 山梔子一钱 丹皮二钱 知母二钱 滑石（水飞）三钱 甘草八分 蝉蜕壳十枚 白僵蚕二钱 钗石斛四钱 玄明粉二钱 黄蜜三钱

【用法】水煎，去滓，下玄明粉、黄蜜，和匀，温服。

【功用】扶元气，救元阴，除邪定风，解释毒火。

【主治】羊毛温邪，七八日后表里大热，或误服温燥药，又毒火发动，致神昏不语，胸胀气急，或哭笑无常，手舞足蹈，谵妄不宁，脉象洪数，重按不足。

33547 回生饮

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 山梔 苦参 车前子 芍药 青皮 陈皮 乌药 枳壳 桃仁

【用法】加谷芽、灯心，水煎服。

【主治】痢疾下血如芋荷汁者。

33548 回生饮

【方源】《外科十三方考》(红蓼山馆经效方补遗)。

【组成】大黄一钱 梔子三钱(炒) 牡蛎一钱 银花一两二钱 连翘二钱 木香一钱(后下) 乳香一钱半(制) 没药一钱半(制) 牛蒡子一钱 栝楼二钱 皂角刺五分 地骨皮二钱

【用法】用水、酒各半煎服。一剂即愈。

【主治】疔疮走黄，全身无不疼痛，卧地乱滚，眼见火光。

33549 回生酒

【方源】《古今医鉴》卷十六引周梅江方。

【组成】扛板归不拘多少(其草四五月生，九月见霜，即败叶青，如犁头尖，藤上有小茨子，园黑味酸，用藤叶)

【用法】上药研烂用汁，与生酒调服，随量饮之，用滓贴患处。

【主治】毒蛇所伤致死。

33550 回生散

【方源】方出《小儿药证直诀》卷下，名见《医学纲目》卷三十六。

【组成】大天南星一个(重八九钱以上者良)

【用法】用地坑子一个，深三寸许，用炭火五斤，烧通赤，入好酒半盏在内，然后入天南星，却用炭火三二条，盖却坑子，候南星微裂，取出刺碎，再炒匀熟，不可稍生，候冷，为细末。每服五分或一字，食前浓煎生姜防风汤调下，不拘时候。

【主治】小儿吐泻或误服冷药，脾虚生风，因成慢惊。

33551 回生散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】甘遂(生用) 黑牵牛(生，取面) 郁李仁(去皮) 槟榔(生用) 大黄(生用) 大戟各等分

【用法】上为细末。每服一钱，入轻粉一字匕，蜜水少许，用柳枝调匀服之，不拘时候。

【主治】伤寒失下或成坏症，谵言妄语，发黄发斑，大便不通，小便如血，内有燥粪、蓄血，舌缩神昏。

【备考】此证不能服大汤剂，但服此药一呷，须臾下过，溲然汗出而愈。

33552 回生散

【方源】《百一》卷六。

【组成】陈皮(去白) 藿香叶(去土) 各等分

【用法】每服五钱，水一盞半，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】①《百一》：霍乱吐泻，但存一点胃气。②《医略六书》：孕妇呕泻脉虚者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠脾气不调，感冒暑邪，而胃气不化，故呕哕泄泻，胎孕不安焉。藿香快胃气以祛暑，陈皮调脾气以和中，为散水煎，使暑邪解散，则气化调和，而呕哕无不止，泄泻无不除，何胎孕之不安哉？

33553 回生散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】鸭嘴胆矾(别研) 草乌头(不去皮) 各等分

【用法】上为细末，和调。遇喉闭吞咽不下，

以芦管吹一字入鼻中，先含水一口，药入咽中，即时涎出。若觉涎少，复用川大黄三块如骰子大，水一盞，煎至七分，入朴消一钱，再煎一沸，令温服，搐鼻了，咽喉即开。

【主治】喉闭危急之疾。

33554 回生散

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】沙参

【用法】上为细末，每服方寸匕，酒调下。

【主治】寒疝疼痛，汗出欲死。

33555 回生散

【方源】《医学纲目》卷三十七。

【组成】人牙（烧存性） 麝香少许

【用法】上为细末。每服半钱，用黄耆、白芍药煎汤调下。

【主治】疮疹倒靨黑陷。

33556 回生散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】防风五钱 白芷四钱 黄耆一两

【用法】上为末。每服一钱。

【主治】痘正起壮灌浆时痒者。

33557 回生散

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】急性子一两 硃砂三分（二味用水二钟，煮干听用） 朱砂五钱 雄黄五钱 硼砂三钱 沉香三钱 木香五钱 丁香三钱 麝香一钱

【用法】上为细末。每服三分，火酒送下。

【主治】隔食隔气。

33558 回生散

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】番木鳖（净末）四两（用水泡透，去皮净，咀片，少用麻油，炒紫黄色，以透为度，研细） 川山甲一两（麻油炒透） 瓜儿血竭五钱（炙） 乳香三钱（去油净） 没药三钱（去油净）

【用法】上为细末，收固。每服三分至五分止。切不可多用，预嘱病者，倘晕麻发战，切勿惊疑，一时性过即安。若炼蜜为丸，可加六肾散，以乳、没、血竭为衣。服后麻战，饮

热酒或生姜汤一钟即止。

【主治】肿毒初起。

【宜忌】服时忌风。

33559 回生散

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】生白丑一两 熟白丑一两 桔梗五钱 五加皮二两 甘草五钱 熟白鲜皮二两 生白鲜皮二两 连翘二两 花粉一两 银花一两 苏薄荷二两 皂角子一两（炒） 山梔一两 山豆根二两 土茯苓四两（一方有玄参）

【用法】灯心为引，上药或酒煮，或煎服。

【主治】一切口鼻喉疳。

33560 回生散

【方源】《医方易简》卷十。

【组成】半夏一钱 藿香一钱 牙皂一钱二分

【用法】上为细末，用瓷瓦瓶装好。每用一钱，用竹管向鼻孔吹入。

【主治】从高楼树上坠地过伤，不省人事，不能食药者。

33561 回生散

【方源】《疑难急症简方》。

【组成】皂矾（置新瓦上煨红，放地候冷）

【用法】上为末。掺舌上。如口噤，须撬开牙关，擦舌上即醒。

【主治】喉痛咽哽，舌忽胀大，渐至如肿，或伸出不能缩者，此名囊舌。

33562 回生锭

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参五钱 白术（去芦油）一两 白茯苓（去皮） 怀山药 桔梗各一两 甘草三钱 胆星五钱 赤石脂（煨）五钱 辰砂二钱 乳香二钱五分 礞石（煨金色）三钱 牛黄一钱 麝香一钱

【用法】上为末，捣匀，印作锭子，金箔为衣，阴干。每服三五分，薄荷汤化下。

【主治】小儿慢惊慢脾。

33563 回生膏

【方源】《村居救急方》卷一。

【组成】明矾 黄丹 干姜各等分

【用法】上为末，连须葱数茎同捣。敷脐，以热砖烙之。

【主治】阴症腹痛。

33564 回生膏

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】人乳（男用女胎乳，女用男胎乳）藕汁 白蜜 白酒头浆 童便（后入）各等分

【用法】煎膏，滴水不散。每服半盏，空心白汤调下，病深者多服。

【主治】血虚火旺，消补两难者。

【宜忌】忌服寒凉药。

33565 回生膏

《经验广集》卷三。为《仙拈集》卷三“延生膏”之异名。见该条。

33566 回生膏

【方源】《集验良方》卷六。

【组成】川贝母八两 猫儿服睛草一斤 夏枯草一斤 芝麻油二十斤

【用法】将药入油内浸，冬五日，夏三日，春、秋四日，放铜锅内用桑柴火先文后武，以药熬枯为度，去滓再将黄丹一斤八两炒紫色，水飞入油内，总以二油一丹用桃、柳、槐、杏、桑五枝手不住搅匀，以滴水成珠为度。熬此膏，最要洁净。治发背、痈疽、瘰癧、乳岩、痰核，一切疮毒，贴上，毒水即出，每日换三贴，未破者即消，已破者即收口痊愈。

【主治】一切疮毒，疔毒，发背，痈疽，瘰癧，乳岩，痰核。

33567 回头散

《金匱翼》卷五。为《古今医鉴》卷九“回首散”之异名。见该条。

33568 回光丸

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】九里光花 菊花（二件蒸） 黄连 黄柏 当归 玄参 苦参

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，青黛为衣。每服五十丸，食后茶清送下。

【主治】眼赤肿涩疼痛。

33569 回光散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】荆芥 黄连 赤芍 谷精草 菊花 木贼 桔梗 牛蒡子 前胡 独活 甘草各等分。

【用法】上锉。加生姜、灯草，水煎服。

【主治】痘疹伤眼。

33570 回阳丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】牡蛎（煅通赤） 干姜（炮）各半斤

【用法】上为细末，生姜汁煮半夏为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】补益元气，悦泽肌体，开心明目。

33571 回阳丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】明矾 火消 胡椒各一钱 真黄丹八分

【用法】上为细末，陈醋为丸。男左女右握在手心，以帛缚之，出汗而愈。

【主治】阴症肚疼。

33572 回阳丹

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】硫黄半两（细研入） 木香半两 草澄茄半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 干姜一分（炮裂，锉） 桂心半两 干蝎半两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为末，炼蜜面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜汤送下，不拘时候，频服。以热酒一盏投之，以衣覆取汗。

【主治】阴毒伤寒，面青，手足逆冷，心腹气胀，脉候沉细。

33573 回阳丹

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】羌活 全蝎 升麻根 甘松各二分 草乌头 水蛭（炒）各三分 大椒 三索子 草茺 枯矾各五分 柴胡 川乌各七分 炒黄盐（为必用之药，去之则不效） 破故纸 蒜各一钱 虻虫三个（去翅足，炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，绵裹留系在外，入丸药阴户内，一日一换。脐下觉暖为效。

【主治】①《兰室秘藏》：带下。②《准绳·女科》：下焦虚冷，脐腹疼痛，带下五色，月水崩漏，淋漓不绝。

33574 回阳丹

【方源】《简易方》引桃溪方（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】川乌（洗） 草乌各三两（洗） 地龙（洗） 灵脂（洗） 南星（洗）各一两 脑子 麝香各少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。初服半丸，渐加小丸至大丸，生姜汁磨化，先嚼薄荷，日午、夜卧温酒送下。瘫痪不能行，服三十丸必愈；如中风不软，只口眼喎斜，服二三丸效。

【主治】卒暴风中医中瘫痪，手足不遂，语言謇涩，口眼喎斜，筋脉挛急，半身不举，不省人事。

33575 回阳丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十五。

【组成】川乌（炮） 牡蛎（烧） 不灰木（烧） 良姜（炒） 白芍药各二钱 麝香少许

【用法】上为末。每用一钱，男病女津唾调，涂外肾上，女病男津唾调，涂乳上。

【主治】阴毒伤寒，手足厥冷。

33576 回阳丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】干姜一两 牡蛎一两

【用法】上为细末。以火酒调稠，搽手上，男子用双手揉外肾即愈；女子以男子手搽药，急按两乳，仍揉擦热，汗出则愈。

【主治】痼冷。

33577 回阳丹

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】白及二钱 胡椒二钱

【用法】上为细末，黄酒为丸，如麦粒大。

每服九丸，用热黄酒送下。

【主治】阴症，手足厥冷，心腹病痛。

33578 回阳丹

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】弥月将生胞羊（酒洗净，随用黄麻缠扰一团，把腊糟裹外，置新瓦上，四围炭火炙之，俟其外糟焦了，如墨样，削去其糟，再焙干，另为末） 官桂末 丁香末各五钱 人参末一两 木香末三钱

【用法】上为细末。十岁以上服二钱，十岁以下服一钱，十五岁以上服三钱，升麻煎酒浆调下。此方用于四五朝前其效甚速，若用于六七日后则噬脐矣。

【主治】痘塌陷不起。

33579 回阳丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】沉香 木香 鹿茸 大茴 小茴（盐水炒） 青皮 梔子（去壳，炒） 补骨脂 木通 生地 熟地 肉苁蓉 地龙（洗净土，炒干） 石菖蒲各一两 胡巴二两（生熟各半） 大海马一对（酥炙） 人参

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一钱，早、晚二服。二七见效。

【功用】补益。

33580 回阳汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】延胡索（炒） 半夏（切，生姜汁炒黄） 甘遂（醋炒干）各一两 陈橘皮（汤浸去白，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 麻黄（去根节，汤煮去沫，焙）各半两 槟榔一枚 天南星一枚（炮）

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，酒八分，煎至七分，去滓温服。服后炊顷，患人面浑身觉热时，便与衣服盖覆，令汗出。

【主治】伤寒阴盛，手足厥冷，体寒脉微。

33581 回阳汤

【方源】《百一》卷三。

【组成】干姜（炮） 益智仁 大川乌（炮，去皮脐）各一两 青皮半两 附子一只七八

钱重者(生用,去皮脐)

【用法】上咬咀。每服半两,水二大盏,加生姜十片,大枣一个,入盐少许,同煎七分,去滓,空心、食前温服,并滓再煎。

【主治】①《百一》:丈夫妇人无问老幼,卒暴风中气中,左瘫右瘓,手足不遂,语言蹇涩,口眼喎斜,筋脉挛缩,半身不举,不省人事。②《普济方》引《瘡痍》:中寒脉弱,大段虚怯。

33582 回阳汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】附子 人参 当归 川芎 赤芍药 茯苓 五味子 细辛 车前子 甘草

【用法】加大枣一个,生姜三片,水煎,空腹服。

【主治】眼珠淡红,羞涩难开。

33583 回阳汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】托里回阳汤(《保婴撮要》卷十五)、回阳酒(《疡科选粹》卷二)。

【组成】干姜(炮) 附子(炮)各二钱 人参 白术 黄耆各三钱 当归 陈皮 甘草(炙)各二钱 柴胡 升麻各五分

【用法】酒、水煎服。不应,姜、附倍之。

【主治】脾肾虚寒,疮属纯阴,或药损元气,不肿痛,不腐溃;或腹痛泄泻,呕吐厥逆,或阳脱陷。

33584 回阳汤

《寿世保元》卷八。为《回春》卷七“回阳酒”之异名。见该条。

33585 回阳汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】大附子三钱 人参二钱 白术 干姜各一钱 广木香一钱五分

【用法】水煎,热服。

【主治】脱阳。

33586 回阳汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】炮附 人参 黄耆 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 莨肉各一钱 木香五分

甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各五分 皂角树上白皮二钱 煨姜三片

【用法】水、酒各半煎服。三服取效。

【主治】阴毒不肿不疼,不热不红,但坚硬者。

33587 回阳汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】当归三钱(泄泻者去之) 白术三四钱 附子(制)二三钱 干姜(炮)二三钱 熟地五钱 黄耆(蜜炙)三四钱或加倍 乌梅三个

【用法】水煎服。加人参二钱更效。若血再不止者,加醋炒五倍子一钱半。

【主治】阴阳将脱,便血大下。

33588 回阳饮

《医学集成》卷一。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

33589 回阳饮

《喉科种福》卷五。为《会约》卷三“八味回阳饮”之异名。见该条。

33590 回阳饮

《中国医学大辞典》。为《活幼心法》卷末“六味回阳饮”之异名。见该条。

33591 回阳酒

【方源】《回春》卷七。

【异名】回阳汤(《寿世保元》卷八)。

【组成】鹿茸(酥炙,焙) 大附子(面包煨,去脐皮) 嫩黄耆 当归(酒洗)

【用法】上锉。好酒煎服。

【主治】①《回春》:痘疮。②《寿世保元》:痘属虚寒,八九日色白如水泡,顶陷根白,痒塌寒战,咬牙。

【加减】兼有痰嗽,加牛胆南星。

33592 回阳酒

《疡科选粹》卷二。为《外科枢要》卷四“回阳汤”之异名。见该条。

33593 回阳散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】川乌头半两(炮裂,去皮脐) 益智子半两 青橘皮半两(汤浸,去白瓢。

焙) 桂心半两 麻黄一两(去根节) 干姜半两(炮裂, 锉)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 稍热服, 不拘时候。衣覆取汗, 如人行十里未有汗, 再服。

【主治】阴毒伤寒。

33594 回阳散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】硫黄一两 寒水石三分 消石半两

【用法】上药入砂瓶子内盛, 以瓦盖瓶口, 黄泥固济, 阴干, 用炭火五斤, 煨令火尽, 研为末。每服一钱匕, 温水调下。

【主治】阴毒伤寒。

33595 回阳散

【方源】《证类本草》卷十一引《集效方》。

【异名】天南星散(《普济方》卷二〇一)

【组成】天南星

【用法】上为末。每服三钱, 加京枣三个, 同煎八分, 温服; 未省再服。

【主治】吐泻不止, 或取转多, 四肢发厥, 虚风不省人事。

33596 回阳散

【方源】《幼幼新书》卷十四引茅先生方。

【组成】苍术一两(米泔浸一宿) 甘草(炙) 白术(炮) 陈皮(去白)各半两 木香 大附子(炮, 去皮)各一钱

【用法】上为末。每服一钱, 空心盐汤点下。可夹伤寒药, 更看形候。

【主治】夹惊伤寒。

33597 回阳散

《幼幼新书》卷二十一引《惠眼观证》。为原书同卷“附子散”之异名。见该条。

33598 回阳散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】附子(大者)一个(炮, 去皮脐) 天南星(大者)一个(炮, 为末, 生姜汁和作饼, 焙干) 木香一分 人参(去芦)一分 硫黄一分 朱砂一钱 麝香少许

【用法】上为细末。每服半钱, 乳食前艾汤调下。

【主治】下泻虚极, 或因服转药泻脱, 四肢逆冷, 目睛项强, 大便不禁, 心胸烦闷, 不能乳食。

33599 回阳散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】附子(汤浸, 炮裂, 去皮) 甘草(半生半炙)各二钱半 人参(去芦)七钱半 细辛(去叶)一钱半 桔梗(锉, 炒)五钱 厚桂(去粗皮) 白茯苓(去皮) 川独活各二钱 半夏(汤煮透, 滤, 仍锉, 焙)三钱

【用法】上咬咀。每服二钱, 水一盞, 加生姜二片, 煎七分, 温服, 不拘时候。或入枣子同煎。

【功用】理脾虚。

【主治】感受风寒湿气, 传作吐泻, 手足逆冷, 腹痛有痰, 及阴证脱肛, 疝疾, 盗汗。

33600 回阳散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】硫黄四分 胡椒六分

【用法】上为细末。每服三分, 烧酒调下。

【主治】阴症, 腹痛身冷。

33601 回阳散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】丁香 干姜 乳香 没药 胡椒各三钱

【用法】上为末。每服三钱, 以唾调涂在手内, 两掌心安于两膝间, 以手帕缚定。用棉被盖之, 其汗自出。

【主治】阴症, 不能服药, 不得汗出者。

33602 回阳散

【方源】《证治汇补》卷一。

【组成】附子二枚(炮制为末)

【用法】生姜酒和匀调服。

【主治】中寒。

33603 回阳散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】煨姜三两 肉桂五钱 赤芍(炒)

三两 南星一两 草乌(炒)三两 白芷一两

【用法】上为细末。以热酒调敷。

【主治】痈疽阴疮，皮色不变，漫肿无头，坚硬疼痛，风痹脚气，手足麻木，筋骨不舒，寒热流注，鹤膝风。

33604 回阳散

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】朱砂三分五厘 血竭二钱 乳香二钱 没药二钱 雄黄二钱 红粉二钱七分 梅片三分五厘 银砂三分五厘 轻粉一钱四分 麝香七厘

【用法】上为细末。将此药涂于患处，每日二三次。

【功用】回阳生肌，消毒止毒。

【主治】痈疽发背，溃后余毒不净，身发黑紫，诸疮内郁火毒。

33605 回阳膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】肉桂 草乌 均姜 南星 白芷 赤芍

【用法】上为末，酒调敷。

【主治】痈疽不痛属阴。

33606 回阳膏

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】白矾(煮)三钱 黄丹二钱 干姜五钱 母丁香十个 胡椒十五六粒

【用法】上为末，用醋调得所，以男左女右，握药搭脐上。盖被出汗即愈。

【主治】因女色成阴症者。

33607 回阳膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生香附一钱八分(或用吴茱萸亦可) 公丁香一钱二分 上桂心八分 倭硫黄五分 当门子四分

【用法】上为极细末。每用二三分，安入脐中，外以膏药封之。

【主治】中寒阴痧。

【宜忌】①《重订通俗伤寒论》：惟口渴苔

黄，二便俱热者，虽见肢冷脉伏，亦勿妄贴此膏。②《随息居霍乱论》：孕妇忌帖。

33608 回苏散

【方源】《温病刍言》。

【组成】犀角粉 羚羊角粉各1克 麝香0.3克 牛黄0.3克 冰片0.3克 龙涎香0.3克 珍珠粉0.3克 琥珀3克 朱砂3克 薄荷冰0.15克

【用法】先将冰片、薄荷冰研成水样，再将其它粉剂和入研匀。成年人每服1.3至2克，小儿每服0.6至1.3克，日夜服4次。

【功用】醒脑开窍，安神。

【主治】温邪内陷心包，高烧惊厥，重度昏迷。

【方论选录】犀角入血分以清神智，且能解毒；羚羊角入气分以熄肝风，兼能安神。二者清热退烧之力胜于白虎，凡温病之高烧不退者，非此不除。牛黄入心、肝二经，功能泄热利痰，通窍镇惊；麝香、冰片、薄荷冰芳香通窍，以清神明，且薄荷冰发挥迅速，轻扬上行，为解暑热清头目之良品，服下少许，立觉头目凉爽，醒脑清神。龙涎香芳香透窍之力虽稍逊麝香，而兼有化痰之力；珍珠粉入心养阴，泄热潜阳，安神定惊；朱砂、琥珀入心、肝二经，安神定惊，兼有镇痛解毒之效，且朱砂能清镇少阴君火，使火不妄炎，则肝风自熄，而神明自安。

33609 回疔丹

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】蟾酥 银朱 雄黄各等分

【用法】上为末，枣肉为丸，如绿豆大。每服一丸，胡椒煎汤一钟，磨铁锈于汤内少许，灌下。

【功用】回生。

【主治】疔疮走黄。

33610 回疔丹

《全国中药成药处方集》(上海方)为《外科正宗》卷二“立马回疔丹”之异名。见该条。

33611 回疔饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】苍耳子(炒)四两 生甘草二两

【用法】水煎浓一大碗，温服之。亦可烧存性，米醋调敷。

【主治】疔疮走黄。

33612 回疔散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】有子土蜂窠一两 蛇蛻一条(不经地上者佳)

【用法】泥裹，煨存性，为细末。每服二钱，白汤送下。

【主治】一切疔走黄。

33613 回乳方

【方源】《谢利恒家用良方》。

【组成】焦麦芽一两 枳壳二钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿断乳，须停止母乳者。

33614 回乳方

【方源】《临证医案医方》。

【组成】麦芽 30 克 瓜蒌 15 克 枳壳 9 克 青皮 6 克 苏梗 6 克 桔梗 6 克 当归 9 克 益母草 12 克 蒲公英 15 克 金银花 9 克 连翘 9 克 丹皮 6 克

【功用】回乳，理气，活血，清热。

【主治】产后因故不欲授乳或婴儿一岁后欲断乳者。

【方论选录】麦芽回乳，瓜蒌、枳壳、苏梗、桔梗、青皮理气，当归、丹皮、益母草活血，蒲公英、金银花、连翘清热解毒。

33615 回乳汤

【方源】《外科大成》。

【组成】麦芽(炒)二两 归尾 赤芍 红花 牛膝各二钱。

【用法】水煎服。外以脚布束紧两乳，以手按揉之。

【主治】无儿吃乳，致乳汁胀痛者。

33616 回命散

【方源】《幼幼新书》卷十引郑愈方。

【异名】开关圣散(《直指小儿》卷一)、圣

散子(《普济方》卷三七四)、开关如圣散(《婴童百问》卷二)、开关左右散(《医林纂要》卷九)。

【组成】蜈蚣一条(赤者，中分为两处) 蝎一个(亦中分为两处，各记左右)

【用法】上药左者与左，右者与右，各作两处为末，左右吊眼，各将药吹入左右鼻中。

【主治】惊风吊眼。

33617 回金丸

《医学纲目》卷二十一。即《丹溪心法》卷一“左金丸”。见该条。

33618 回毒散

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】大黄三钱 白芷六钱 木香 没药 穿山甲(拌蛤粉，炒) 木香各五分(另研) 人参二钱(煎汤，调前药末下)

【主治】乳痈未溃。

【宜忌】虚人不宜用。切不可轻用外科，攻击太过。

33619 回毒膏

【方源】《同寿录》卷末。

【组成】麻油四两 番木鳖一两(去毛) 壮人头发三两 飞丹二两

【用法】番木鳖入麻油中煎枯，捞出木鳖，入壮人头发熬化，候滴水成珠，加飞丹收成膏。贴之。

【主治】痘后疮毒。

33620 回春丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】茯苓 白术 山楂(炒) 大茴香 吴茱萸各一两 荔枝核(炒)一两 枳实八分 橘子核(炒)三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱五分重。每服一丸，空心细嚼，姜汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：舒肝顺气，温中散寒。

【主治】疝气。

33621 回春丸

《便览》卷三。为《摄生众妙方》卷七“同春丸”之异名。见该条。

33622 回春丹

《理瀹》。为原书“健阳丹”之异名。见该条。

33623 回春丹

【方源】《谢利恒家用良方》。

【异名】小儿万病回春丹（《丸散膏丹集成》）、万病回春丹（《全国中药成药处方集》福州方）、小儿回春丹（《上海市中药成药制剂规范》）。

【组成】川贝母一两 制白附子三钱 雄黄三钱 天竺黄一两 防风三钱 羌活三钱 天麻三钱 陈胆星二两 制僵蚕三钱 全蝎三钱（酒洗） 蛇含石八钱（煨） 朱砂三钱 冰片 麝香各一钱五分 西牛黄一钱

【用法】上为细末，以甘草一两，钩藤二两，煎浓汤，炼蜜为丸，如花椒大，外用蜡壳封固，每匣五粒。小儿一岁一粒，二岁二粒，三四岁三粒，打碎，钩藤麦芽汤化下；乳汁及开水亦可。或研碎擦乳头令儿吮之，腹痛者，打碎一粒，贴脐中。

【主治】小儿急惊、慢惊，发搐痰厥，内外天钓，伤寒邪热，斑疹烦躁，痰喘气急，五痛痰厥，大便不通，小便溺血，及一切昏闷之症。

33624 回春方

【方源】《女科秘要》卷一。

【组成】茯苓 半夏 厚朴 苍术各一钱 陈皮 砂仁各五分 炙甘草 干姜各三分 麝香八分 乌梅一个 姜三片

【用法】水煎服。

【主治】恶阻。

33625 回春酒

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】人参一两（切片） 荔枝肉（去核）二斤

【用法】用上好烧酒五斤，将上药入袋内，浸三日可服，每日早晚饮一二杯。

【功用】助阳道，益精神。

【主治】老年阳痿。

33626 回春散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】白矾一钱 黄丹八分 胡椒二分 焰消一分

【用法】上为细末，醋调，推于手内，合阴处。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：温肾散寒，暖子宫。

【主治】①《古今医鉴》：阴冷。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：房事之后感风寒，饮食生冷，小腹疼痛，阴部收缩，四肢冰冷，呼吸无力，阴寒危症。

33627 回春散

《卫生鸿宝》卷一引《从桂堂方》。为原书同卷“手握丹”之异名。见该条。

33628 回脉散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大黄三钱 白芷八分 乳没药各五分 木香五分 山甲（蛤粉炒）五分

【用法】上为末。人参二钱，煎汤调服。

【主治】一切乳症，毒从大便出。

33629 回音饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】甘草 桔梗 乌梅 乌药各等分

【用法】水煎服。

【主治】声音哑。

33630 回疮锭

《中国医学大辞典》。为《外科精义》卷下“回疮锭子”之异名。见该条。

33631 回津丸

【方源】《普济方》卷三五三引《便产须知》。

【组成】白芍药一钱 白术二钱 泽泻 茯苓 川芎各一钱 当归二钱 五味子三钱 乌梅肉一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服二三十丸，或嚼或熟水调下。可加甘草二钱，诃子肉一钱。

【功用】养血通气，回津补肾。

【主治】产后虚渴，去血多，津液少，肾气

虚，饮无度。

33632 回首散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】回头散（《金匱翼》卷五）。

【组成】乌药顺气散加羌活 独活 木瓜

【主治】头项强急，筋痛，或挫枕，转项不得者。

33633 回神膏

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】生姜汁 红糟 猪脂 盐

【用法】研烂炒熟，搽入皴拆内。一时虽疼，少顷便皮软皴合。三二次搽即安。

【主治】手足皴裂，如蒸梨状，虽春、夏亦如此。

33634 回索散

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】泽泻四两

【用法】上为细散，入丹砂、云母粉各一分和之。每日服一钱匕，米饮调下。

【功用】返神归元，助气于坎室。

33635 回脓散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】归尾一钱五分 大黄三钱 炙山甲五片 黑丑（生熟各半）三钱 角针一钱 蜈蚣一条 炒僵蚕二钱 乳香 没药各五分

【用法】水、酒各半煎服。

【功用】内消。

【主治】便毒初起作痒。

33636 回疳散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】鹿角（煨） 白矾（枯）各一两 头发五钱（烧存性）

【用法】上为末。先用花椒汤洗净，掺药于疳上。三四次即愈。如疮不收口，瓦松烧存性，为末，搽即收。

【主治】疳烂通鼻孔。

33637 回浆饮

《医学集成》卷三。为《赤水玄珠》卷二十八“回浆散”之异名。见该条。

33638 回浆散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】回浆饮（《医学集成》卷三）。

【组成】何首乌 白芍 黄耆 人参 甘草 白术 白茯苓 生姜

【用法】水煎服。

【主治】痘不收浆结痂。

【方论选录】《痘科类编释意》：痘因服热药过多，以致热毒猖狂，痘烂不靨者，合柴胡汤服之。参、耆补气，甘草和中，首乌滋阴解毒，茯苓补脾渗湿，芍药和血收敛，如浆足回迟，用补气和中渗湿收敛，则回自速，再加首乌，则无余毒之患矣。

33639 回浆散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】何首乌 白芍 炙耆 炙草 人参 白术 茯苓 淮山药 苡仁（或以苍术易白术）各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘不收浆结痂。

33640 回稍散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】白芷 茯苓 半夏各六分 当归 川芎 甘草 肉桂 白芍各六分 枳壳 麻黄 陈皮各一钱 桔梗四分 厚朴 干姜各八分 苍术四分 姜黄五分

【主治】坐卧伤湿，或睡时手在被外受寒，致手臂疼痛。

33641 回魂散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】人参（去芦） 茯苓（去黑皮） 甘草 白僵蚕（去丝嘴） 朱砂（水飞）各一分 白附子一钱半（炮） 全蝎一钱 蝉壳（去土，净洗，去足）二十个

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，乳食前煎冬瓜子、薄荷、清米饮调下。

【主治】痫搐愈后，多吐逆腹胀，气急不食，及罢惊之后，一切虚候。

33642 回魂煎

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】天南星一枚重三钱者(烧地坑子令赤,用醋泼,下天南星,以碗子合定,勿透气,去皮脐,取二钱) 白附子三枚(生用) 乌蛇四寸(用酒浸,去皮骨,炙) 蜈蚣一条(酒炙) 棘刚子三十枚 干蝎全者七枚(炒) 水银沙子两皂子大 丹砂 膩粉各一分 麝香 犀角末 乳香各一钱 金薄三片(共炒于一处研) 牛黄 龙脑各半钱(研)

【用法】上为细末,用石脑油为膏,旋丸如豌豆大。每服一丸,薄荷汤化下。

【主治】小儿慢惊风。

【备考】本方方名,据剂型当作“回魂丸”。
33643 回燕膏

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】真芝麻油二斤 胎发四两(如无,以童男发洗净代之) 穿山甲五钱 白矾(飞过)一两 黄蜡四两 飞丹二两 松香六两 轻粉五钱(研) 乳香 没药各五钱(另研) 燕窝泥(朝北者)二两(微炒) 五灵脂(淘净)五钱 麝香(另研)五钱 密陀僧五钱

【用法】将穿山甲、五灵脂煎数沸,下胎发熬溶,滤去滓,称净熟油二十四两,仍入锅内,下白矾,煎二三沸,下黄蜡、黄丹,煎一沸,下松香、官粉六两,再煎一沸,下燕土,如沉香色,滴水成珠,住火,方下乳香、没药,搅匀,少顷,下轻粉,桃柳枝搅,温可入手,然后投麝香搅匀,水浸去火毒七日。用贴瘰癧,未破者软,已溃者干。内服夏枯草汤。

【主治】瘰癧。

33644 回瘰方

【方源】《疯门全书》。

【组成】良姜五钱 三柰五钱 肉桂五钱 丁香二钱 草蔻仁三钱

【用法】上为末。浓酒煮熟,敷患处。先以艾绒敷患处,以熨斗运之,觉热,去艾叶。敷药即回,如不回,再敷一次。

【主治】麻风。

33645 回燕膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】穿山甲 全蝎 白芷 黄连 黄柏 黄芩 当归各二两 生地 赤芍药各一两 官桂 海藻各四两 番木鳖一两

以麻油一斤四两,共熬枯黑,去滓,下飞丹十两,黄蜡七钱,白占三钱,粉心二两,收成膏药,投入水浸,加细药:

乳香 没药 阿魏 轻粉各六钱 麝香二钱 血竭四两 燕窝泥一两 雄黄 朱砂各二钱 雄鼠屎一两五钱

【用法】上为极细末,筛过,将膏药取起溶化,离火下细药搅匀。依病大贴之,三日即消。此药又能贴诸般恶毒。

【主治】瘰癧痰核。

33646 回燕膏

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】穿山甲五钱(锉片) 五灵脂(研罗去滓)五钱 男子头发四两(皂角水洗净)

【用法】上用香油一斤四两,慢火煎至发熔尽,穿山甲已黑,滤去滓,称油实重若干两,以折半为准,将淘洗净炒过黄丹,炒过官粉,共合油之半,徐徐以柳枝搅油而下,候丹粉已发,下枯白矾末二两,再下煮洗过松番末四两,再下煮洗过黄蜡四两,又下朝北燕窝土(研细末)二两,候药成酱庵色,离火稍冷,下轻粉、乳香、麝香各五钱,即倾入水,拔洗去火毒。

【主治】瘰癧已溃。

33647 回漏汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】荆芥三钱 枳壳三钱(同炒) 人参三钱 蚬子一对(存性)

【用法】上为末。每服三钱,用升麻煎酒浆调下,又用猪蹄一只,绵花一两,橘红五钱,酒浆煨热服之。

【主治】怀胎七八个月患痘疹。

33648 回澜饮

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】紫丹参三钱 净桃仁三钱 白茯苓四钱 菟蔚子三钱 原生地三钱 怀牛膝三钱(盐水炒) 飞滑石四钱 嫩白薇一钱五分(酒炒)

【主治】倒经。癸水逾期不至，忽患齿衄、鼻衄，或吐血不止。

33649 回癫汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参三钱 白术九钱 茯神五钱 山药三钱 薏仁五钱 肉桂一钱 附子一钱 半夏三钱

【用法】水煎服。

【主治】羊癫症。

33650 回生神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参五钱 白术 薏仁 肉桂 茯苓 半夏须略大于常用之量 南星三钱 附子一钱

【用法】水十碗，煎至四碗，分作二次服。早晨服二碗，即卧，上以棉被盖之，令极热，汗出如雨，任其口呼大热，不可轻去其被，任其自干，再用后二碗晚服亦盖之如前，不可轻去其被。一夜必将湿气冷汗，尽行外出，三日可步履矣。后用八味地黄丸，四料为丸，可永不再发。

【主治】中风手足不仁，不起立行步者。

33651 回生神膏

【方源】《阴证略例》。

【组成】牡蛎 炼粉 干姜(炮裂)各一钱

【用法】上为细末，男病用女唾调，手内擦热，紧掩二卵上，得汗出愈；女病用男唾调，手内擦热，紧掩二乳上，得汗出愈。卵与乳，男女之根，蒂坎离之分也。阴证大小便不通，及诸杂病阴候，大小不通者，并宜此外治法。

【主治】男女阴毒伤寒，大小便不通，及诸杂病阴候大小便不通者。

【宜忌】数日不通为急，非急勿用。

33652 回生锭子

《丹溪心法附余》卷十六。即《外科精义》卷下“回疮锭子”。见该条。

33653 回阳煮散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】天南星二两(酒浸七日，取出，锉，炒令黄) 附子(炮裂，去皮脐)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，酒一盏半，慢火同煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】阴毒伤寒，四肢厥冷，脉候微细，心胸痞闷。

33654 回声饮子

【方源】《养老奉亲》。

【组成】皂角一挺(刮去黑皮并子) 萝卜三个(切作片)

【用法】以水二碗，同煎至半碗以下服之。不过三服便语，吃却萝卜更妙。

【主治】失音。

33655 回香草散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】回香草 高良姜各等分。

【用法】晒干为末。用此先吹鼻痔上两次。片时许，随后方行取法，其痔自然易脱。

【主治】鼻痔。

33656 回疮锭子

【方源】《外科精义》卷下。

【异名】回疮锭(《中国医学大辞典》)。

【组成】草乌头一两 蟾酥七钱 巴豆七分(去皮) 麝香一字

【用法】上为细末，面糊和，熬作锭子。如有恶疮透丁不痛无血者，用针深刺到痛处有血，用此锭子烘之，上用膏贴之，疔疮四畔红之。其疮三二日自然拔出。此药最当紧用。

【主治】疔疮。

【备考】本方方名《丹溪心法附余》引作“回生锭子”。

33657 回天大补膏

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】人参六两 白术四两 白茯苓三两 当归四两 白芍四两 川芎二两 生熟

地各一斤 二冬各五两 知母三两 八制香附八两 红花一两 山药二两 自制龟胶四两 清阿胶四两 鳖胶四两 玄参二两 丹皮三两 柴胡三两 人乳二碗 牛乳半斤 羊乳半斤 梨汁一碗 柿霜三两

【主治】虚损癆瘵之血枯。血枯则月水断绝，其外症畏寒发热，肌肉消瘦，皮肤干涩，爪甲青而不润，饮食减少，大便溏泄，小便痛而数，口干，咽燥，渐成劳瘵。脉候左寸、左右尺必微而涩，右关必沉弦，左关必虚细。

【方论选录】是方参、苓、术、草四君子汤也；归、芍、芍、生熟地四物汤也；二冬、知母、玄参补肺金以培生化之源；丹皮、龟鳖甲煎胶以制浮游之火；人乳、牛乳、羊乳燥者润之；梨汁、柿霜热者清之；银柴胡以退肌热；香附以开气郁；红花以通血滞；山药以达腰膝营卫，生津液，健脾和胃，真有回天之功。

33658 回天甘露饮

《顾氏医径》卷五。为《寿世保元》卷八“甘露回天汤”之异名。见该条。

33659 回天再造丸

【方源】《经验百病内外方》。

【组成】真蕲蛇（去皮骨并头尾各三寸，酒浸，炙取净末）四两 两头尖（系草药，出在乌鲁木齐，非鼠粪也，如不得真者，以白附子代之，其性相似，制过用）二两 真山羊血五钱 北细辛一两 龟版一两（醋炙） 乌药一两 黄耆二两（蜜炙） 母丁香一两（去油） 乳香一两（瓦焙去油） 麻黄二两 甘草二两 青皮一两 熟地二两 犀角八钱 没药一两（焙去油） 赤芍一两 羌活一两 白芷二两 虎胥骨一对（醋炙） 血竭八钱（另研） 全蝎二两五钱（去毒） 防风二两 天麻二两 熟附子一两 当归二两 骨碎补一两（去皮） 香附一两（去净皮毛） 玄参二两（酒炒） 首乌二两（制） 川大黄二两 威灵仙二两五钱 葛根二两五钱 沉香一两（不见火） 白蔻仁二两 藿香二两

冬白术一两（土炒） 红曲八钱 川草薢二两 西牛黄二钱五分 草薢仁二两 川连二两 茯苓二两 姜黄二两（片子） 僵蚕一两 松香五钱（煮过） 川芎二两 广三七一两 桑寄生一两五钱 冰片二钱五分 当门麝五钱 辰砂一两（飞净） 桂心二两 天竺黄一两 地龙五钱（去土） 穿山甲二两（前后四足各用五钱，麻油浸）

【用法】上药必须地道，炮制必须如法，为细末，择天月二德日，于净室内炼蜜为丸。每丸重一钱，金箔为衣，外用蜡壳包裹。牙关紧闭，不可用铜铁器撬开，恐伤牙及唇舌，并恐惊其心，用乌梅一二个分开，塞左右腮擦之自然开矣。

【主治】真中、类中，痰迷厥气，左瘫右瘓，半身不遂，口眼喎斜，腰腿疼痛，手足麻木，筋骨拘挛，步履艰难。及小儿急慢惊风，诸般危急之症。

【宜忌】此丸力大势猛，未及双周岁者，筋骨柔软，究非所宜，非十分险重者勿服。孕妇忌服。

【加减】如左边疼痛，不能运动用四物汤（当归、生地、川芎、白芍）；如右边疼痛，不能运动，用四君子汤（人参、茯苓、白术、甘草、朝东桑枝）；如两边疼痛，则两方并用，其桑枝只用三钱，俱空心服。凡服此药后，神气清爽，渐思饮食。间有一二处屈伸不利，此系热痰留于关节，须用豨薟草二钱，防风一钱，归身一钱，白芥子一钱，红花八分，煎汤，以新白布拧热药水擦摸，一日二三次，便能运动如常。

33660 回风外解汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】柴胡一钱 薄荷一钱 前胡一钱 桔梗一钱 枳壳一钱 葛根二钱 豆豉三钱 广皮一钱 茯苓二钱 白术一钱 姜皮六分 荷叶一角

【主治】感风下利，身热脉微弦。

33661 回风养脏汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】沙参四钱 苏子一钱半 枳壳一钱 前胡一钱 桑叶一钱 茯苓二钱 白术一钱 苡仁四钱 橘红一钱 贝母二钱 荷叶蒂一枚

【功用】培土化热，熄风。

【主治】风阳外烁，肺热移于大肠，咳而遗尿。

33662 回生再造丸

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】真水安息香四两 人参二两 真蕲蛇(小者为佳，去骨并头尾三寸，酒浸，炙，取净末)四两 当归 川芎 川连 羌活 防风 玄参(以上酒炒) 藿香 白芷 茯苓 麻黄 天麻 川草薢 片子姜黄(以上炒) 甘草(炙) 肉桂(研，不见火) 白蔻仁(研，不见火) 首乌 料豆(水蒸拌九次) 西琥珀(研) 黄耆(蜜炙) 大黄(酒蒸) 草蔻仁(研) 雄鼠粪(双头尖者是)各二两 穿山甲(前后四足各用五钱，麻油浸，炙)二两 全蝎尾(去头足) 灵仙(酒炒) 葛根(炒) 桑寄生(烘干)各二两五钱 北细辛 赤芍(炒) 乌药(酒炒) 青皮(面炒) 于术(土炒) 僵蚕(洗，炒) 乳香(去油) 没药 辰砂 骨碎补(酒炒) 香附(去皮毛，酒炒) 天竺黄 制附片 生龟版(火炙，熬过者不用) 沉香 母丁香 胆星各一两 红花(酒浸，烘干净)八钱 犀角尖八钱 厚朴地龙(炙干) 松香(煮九次)各五钱 广木香四钱(不见火) 梅花冰片 犀牛黄各二钱五分 血竭八分 虎胥骨一对(煨酥)

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸重一钱，金箔为衣，蜡壳封固。每服一丸，生姜汤送下。

【主治】男妇中痰中风，口眼喎斜，手足拘挛，言语不清，左瘫右痪，筋骨疼痛，半身不遂，步履艰难，初起气绝者。

【宜忌】孕妇忌服。

33663 回生再造丹

【方源】《秘传打损扑跌药方》。

【组成】川芎 当归 羌活 独活 木瓜各一两 角茴(炒) 小茴各五钱 肉桂 甘草各八钱 乌药少许 川乌三钱 虎骨(炙)五钱 然铜五钱

【用法】各依法制末。用一半酒，一半童便煎服。

【主治】妇人跌扑伤损，遍身疼痛，昏闷将死。

【加减】气喘，加沉香、木香；伤头，加肉桂、前胡、天麻、肉苁蓉；夜作惊悸，加雄鸡胆；乱语恍惚失主，加人参、朱砂、金银箔、远志。

33664 回生再造饮

【方源】《跌损妙方》。

【异名】回春再造丹(《秘传打损扑跌药方》)、回春再造散(《外科百效》卷五)。

【组成】五铢钱五文(火煨七次) 木香 自然铜各一钱 麝香一分

【用法】上为细末。每服一钱，无灰酒送下，先嚼丁香一粒，方进此药，伤在上，饭后服，伤在下，饭前服。

【功用】接骨。

【宜忌】如骨未断勿轻服。

33665 回生夺命丹

【方源】《中国麻风病学》。

【组成】羌活 藁本 防风 苍术 独活 白芷 乌药 防己 川乌 桔梗 柴胡 黄芩 薄荷 甘松 白芍 大黄 白蒺藜 天南星 川续断 五加皮 海风藤 大腹皮 仙灵脾 皂角刺 明天麻 北细辛 蔓荆子 川草薢各三两 红花 玄参各七两 草乌四两 苦参二斤

【用法】用阴阳水各一大桶浸，春五、夏三、秋七、冬九日，煎百沸去滓，加炼蜜一斤，煎成膏如漆。

【主治】麻风初起，灼热疼痛。

33666 回生至圣丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】生甘草五钱 金银花半斤 玄参三两 蒲公英三两 天花粉三钱 川芎一两

【用法】水煎服。一剂而头轻，青紫之色淡矣。再服二剂，青紫之色尽消而疮亦尽愈，不必三剂也。

【主治】无名肿毒。人头面无故忽生小疔，痒甚，第二日即头重如山，第三日面目青紫。

【方论选录】此方化毒而不耗其气，败毒而不损其精，所以建功甚奇也。此毒原系水亏之极，而泻毒诸药无不有损于阴阳，惟金银花攻初兼妙，故必须此品为君，但少用则味单力薄，多用则味重而力厚；又加玄参以去火，甘草以泻毒，蒲公英之清热，天花粉之消痰，川芎之散结，自然相助而奏效。

【备考】此乃至危至急之病，苟不速救，数日之内，必一身发青黑而死。若青不至心胸者，尚可救疗。

33667 回生至宝丹

《玉案》卷五。为《回春》卷六引孙奎亭经验方“回生丹”之异名。见该条。

33668 回生至宝丹

《胎产秘书》卷下。为原书卷下“济坤丹”之异名。见该条。

33669 回生至宝丹

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】胆星 雄黄 琥珀 朱砂 冰片 全蝎各二钱 巴豆霜一钱 麝香二分

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如黍米大。大人用一分，小儿论大小，三四厘以至七八厘。感冒风寒，生姜汤送下；瘟疫，新汲水送下，中风不语，生姜汤送下；霍乱吐泻、绞肠痧，生姜汤送下；中暑，水送下；大小便不利，灯心汤送下；红痢，茶送下；食积，麦芽汤送下；风痰头眩，生姜汤送下；妇人血崩及月水不止，京墨磨童便送下。

【主治】感冒风寒，瘟疫，中风不语，霍乱吐泻，绞肠痧，中暑，大小便不利，红痢，食积，风痰头眩，妇人血崩及月水不止。

【宜忌】孕妇忌服。

33670 回生至宝膏

《千金珍秘方选》。为《金鉴》卷六十二“巴膏”之异名。见该条。

33671 回生至神汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参三两 肉桂三钱 白术二两 生姜汁一合 葱十条（捣汁）

【用法】水煎服。一剂而厥定，再剂而身热解矣。

【主治】冬月伤寒，身热十一日，而热反更盛，发厥不宁，一日而三四见，是邪不能传肝，此厥乃似热而非热，内寒之甚，逼阳外见而发厥。

【方论选录】此虽在用参、术之多，第不佐之姜、葱二汁，则不能宣发于外，而邪伏于肾中而不得出也，惟参、术得姜、葱之助，导之外出，不必走肝，而厥反安矣，此治法之巧者。

33672 回生保命丹

【方源】《古今医鉴》卷十五引杨西塘方。

【组成】当归（炒）二钱 川芎三钱 白芷梢三钱 旧槐花一两 乳香五分 没药五分 轻粉四钱二分 朱砂四钱 雄黄三钱 牛黄四分 血竭一钱 孩儿茶一钱 小丁香一钱

【用法】上为末，用红枣、大米粉打糊为丸，如黍米大。每服十丸，以土茯苓四两，牙皂半个，同煎送下，一日三次。

【主治】一切杨梅天泡顽疮，筋骨痛，下疳疮，及轻粉毒，风痹，漏，肿毒，不拘新久。

【宜忌】忌母猪、牛肉、酱、醋、茶、房事。

33673 回生养胃丹

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】苍术（米泔水浸三日，洗净晒干，再换浸三日）四两 莲肉（酒浸一宿）四两 雄猪肚一个（壁土揉擦洗净，入苍术、莲肉在内，以线缝紧，用好酒煮烂，取入石臼内捣如泥，捻作小饼，烘干加后药） 南星四两（切细，姜汁浸一宿，以伏龙肝同炒，去

伏龙肝用。或用黄土炒亦可) 半夏四两(泡,晒干,细切,好醋浸七日,蒸熟) 橘红四两(以灶心上炒,去土用) 粟米四两(姜汁浸、蒸、焙) 人参一两 白术一两 白茯苓一两 厚朴(姜汁炒)一两 蓬术一两(醋炒) 草澄茄一两 砂仁一两 三棱一两(醋炒) 白豆蔻一两 谷芽(炒)一两 麦芽(炒)一两 甘草一两 丁香五钱 木香五钱 沉香五钱

【用法】上为末,稀面糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心陈米汤送下。

【主治】真元虚损,心胃不交,精神耗散,脾脏受湿,饮食不纳,五味不成,津液反成痰饮聚于中脘,不能传道,以至大肠燥涩,小便反多而赤,或时呕吐酸水,久成翻胃结肠之症。

33674 回生起死丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】丁香九枚 干姜一钱

【用法】水煎服。被盖片时,令脾胃温暖,阴退阳回,痘自红活。

【主治】痘出灰白,寒气逆上,不食腹胀,呕吐肚痛,泄泻清水,手足俱冷。

33675 回生消毒散

【方源】《麻科活人》卷一。

【异名】消毒散。

【组成】牛蒡子 蟾酥 地龙(即蚯蚓,晒干,去土)各二钱 僵蚕 贝母 防风 荆芥各一钱

【用法】上为末。每服一钱,以淡竹叶煎汤调下。

【主治】麻出而又收,腹胀喘急。

33676 回生救急散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】天南星(炙)四两 黄芩四两 天竺黄一两 木香一两 柴胡一两 白附子(炙)一两 莲子心一两 荆芥穗一两 天麻一两六钱 川乌(炙)一两 橘皮三两 薄荷四两 葛根(用粉)二两 山川柳(去

梗)二两 滑石二两 大黄三两 玄参(去芦)三两 牛蒡子(炒)二两 僵蚕(炒)一两二钱 桔梗三钱 黄连一钱

【用法】上为细末,每三十二两细粉兑入雄黄二两,麝香三钱,牛黄一钱,朱砂六两,冰片六两五钱。混合均匀,再研细过罗,瓶装,每服二分,温开水送下,一日二次。小儿三岁以下者酌情递减。

【功用】清热散风,镇惊化痰。

【主治】小儿发热咳嗽,痰涎壅盛,烦燥口渴,惊悸抽搐。

33677 回生第一丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】土鳖虫(活的最好,应用十六两)十两 血竭四两 当归二十两 自然铜(煅)六两 乳香(炙)四两

【用法】上为细末。每八两八钱细粉兑入麝香四钱,朱砂八钱。共研为细粉,过罗,混合均匀装瓶,每瓶重二分。每服二分,温黄酒送下,温开水亦可,一日二次。按病状酌情增减。

【功用】接骨,活血止痛。

【主治】跌打损伤,闪腰岔气,血瘀疼痛。

【宜忌】孕妇勿服。

33678 回生续命丹

【方源】《跌损妙方》。

【组成】川乌 草乌 自然铜各二两 地龙 乌药 青皮 禹余粮(醋淬)各四钱

【用法】上为细末。每用二钱。

【主治】筋骨断折,疼痛不止。

33679 回生续命丹

【方源】《秘传打损扑跌药方》

【组成】川乌三两(泡) 草乌二两(泡) 自然铜二两(火煅) 地龙(去土) 乌药 青皮 陈皮(去白) 茴香各二两五钱 乳香(另研) 红娘子 没药半分 禹余粮(醋淬)四钱

【用法】上为细末。每服五钱,用好酒送下。

【主治】打损扑跌伤。

33680 回生续命丹

【方源】《外科百效》卷五。

【组成】川乌二两(泡) 草乌二两(泡) 五灵脂 木鳖子 骨碎补 威灵仙 金毛狗 自然铜二两(火煅) 地龙(去土) 乌药 青皮 陈皮(去白) 茴香各二两半 乳香(另研) 红娘子 没药 麝香一分半 牵牛五钱 禹余粮(醋淬)四两

【用法】上为末。每服一钱，酒调下。后服再生活血止痛散。

【主治】筋骨断折，损伤疼痛不止。

33681 回阳三建汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】附子 人参 黄耆 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 萸肉各一钱 木香 甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各五分

【用法】加煨姜三片，皂角树根上白皮二钱，水二碗，煎八分，入酒一杯，随病上下，食前后服之。用绵帛盖暖疮上，预不得大开疮孔走泄元气为要。

【主治】阴疽发背，初起不疼不肿，不热不红，硬若牛皮，坚如顽石，十日外脉细身凉，肢体倦怠，皮如鳖甲，色似土朱，粟顶多生孔，孔流血，根脚平散，软陷无脓，又皮不作腐，手足身凉者，俱急服之。

【方论选录】凡背疽属阴者，皆由脏腑先坏而内毒不得发越于外也。旧有用鸡冠剪血滴于疽上者，有醋煮雄艾敷用者，猪脑热药敷围者，神灯火气灼照者。此数法皆阴疽之用，予虽常用，未见其实，但阴疽不起者，如树木之根坏，强力培植枝叶，而终无发生之理。予常据理用药，固有得其生者，十中三四。譬如先要疏其嫁土，通其地脉，助其根本，回其阳气，此四者缺一不可。用苍术、厚朴、茯苓、陈皮疏其土；川芎、当归、紫草、红花通其脉；人参、黄耆、枸杞、山萸助其本；附子、木香、甘草、独活回其阳。如此用之，但根本内有一脉未绝之气，服之俱可得其生。又验其手足温暖，疮便发热，渐作焮肿，复生

疼痛，色暗得活，坚硬得腐，胃气得回，此是药之效验。必在三服中应之为吉，外兼照法，接助回阳，此通治阴疽之大法也。

33682 回阳大附散

【方源】《幼幼新书》卷九引茅先生方。

【组成】大附子(炮) 人参 前胡 桔梗各半两 木香一分

【用法】上为末。每服半钱，生姜汤调下。

【功用】退伏热

【主治】慢惊，下涎后伏热。

33683 回阳升陷汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆八钱 干姜六钱 当归身四钱 桂枝尖三钱 甘草一钱

【主治】心肺阳虚，大气又下陷者，其人心冷、背紧、恶寒，常觉短气。

【临证举例】①心肺阳虚 一童子，年十三四，心身俱感寒凉，饮食不化，常常短气，无论服何热药，皆分毫不觉热。其脉微弱而迟，右部兼沉。知其心肺阳分虚损，大气又下陷也。为制此汤，服五剂，短气已愈，身心亦不若从前之寒凉。遂减桂枝之半，又服数剂全愈。俾停药，日服生硫黄分许，以善其后。②大气下陷 一人年五十余，大怒之后，下痢月余始愈。自此胸中常觉满闷，饮食不能消化，数次延医服药，不外通利气分之品，即间有温补脾胃者，亦必杂以破气之药，愈服病愈增重。后愚诊视，其脉沉细微弱，至数甚迟。询其心中，常有觉凉之时。知其胸中大气下陷，兼上焦阳分虚损也。遂投以此汤，十剂全愈。后因怒病又反复，医者即愚方加厚朴二钱，服后少腹下坠作疼，彻夜不能寐，复求为诊治，仍投以原方而愈。③大气下陷兼寒饮结胸 赵姓媪，年近五旬，忽然昏倒不语，呼吸之气大有滞碍，几不能息，其脉微弱而迟。询其生平，身体羸弱，甚畏寒凉，恒觉胸中满闷，且时常短气。即其数日资禀及现时病状以互截病情，其为大气下陷兼寒饮结胸无疑。然此时形势将成痰厥，住在乡

村取药无及，遂急用胡椒二钱捣碎煎二三沸，澄清汤灌下。须臾胸中作响，呼吸顿形顺利。继用干姜八钱煎汤一中，此时已自然饮下，须臾气息益顺，精神亦略清爽，而仍不能言，且时作呵欠，大余呼吸之倾必发太息，知其寒饮虽开，大气之陷者犹未复也。遂投以拙拟回阳升陷汤。服数剂，呵欠与太息皆愈矣，渐能言语。

33684 回阳化毒汤

【方源】《万氏家抄方》卷六上。

【异名】回灵化毒汤（《痘疹全书》卷下）。

【组成】人参 官桂 茯苓 白术 附子（制） 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疹阴燥，曾吐泻，脉沉弱，手足宜冷而反热，阴极似阳。

33685 回阳玉龙丹

《疡科选粹》卷二。为《仙传外科集验方》“回阳玉龙膏”之异名。见该条。

33686 回阳玉龙膏

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】回阳玉龙丹（《疡科选粹》卷二）、玉龙膏（《理瀹》）。

【组成】草乌三两（炒） 南星一两（煨） 军姜二两（煨） 白芷一两（不见火） 赤芍药一两（煨） 肉桂半两（不见火）

【用法】上为末，用热酒调敷。发背发于阴，又为冷药所误，又或发于阳而误于药冷，阳变为阴，满背黑烂，四周好肉上用洪宝丹，把住中间，以此药敷之。流注冷证多附骨，内硬不消，骨寒而痛，筋缩不伸，若轻用刀针，并无脓血，若只有乳汁清流，或有瘀血，宜用此药敷之。鼓椎风起于中湿，或伤寒余毒，又或起于流注之坏证，或起于风湿虚痹。未破则肌肉尚未死，急以此药，热酒调敷膝肘骨上腿处，以住骨痛，回阳气。又以冲和涂下肢冷处，引其血气，使流动而下通贯血脉。又以此方敷胫骨交处，以接所引之血脉，以散所积之阴气。内则用追风丸，倍加乳香以

伸筋，如法服之，无不愈者。男子妇人久患冷痹血风，手足顽麻，或不能举动，可用绵子夹袋此药在中心，却以长布缠在痛处，用绢袋系定，此药能除骨痛附在肉上，觉皮肤如蚁缘，即其功也；如痹，可加丁皮、吴茱萸、没药、大草乌等分，然后全在追风丸，表里交攻，去病如神。风脚痛不可忍，内用追风丸，外用此方加生面，姜汁调热敷，欲得立止，可依法加乳香、没药化开，酒调为妙。久损入骨者，以致死血在所患之处，遇风寒雨湿，其病即发，宜此方热酒调敷；内则用搜损寻痛丸，表里交攻为妙。虽然血气虚弱之入，病在胸胁腰背之间者，谓之脱垢，不除变为血结劳，不论老少，年远近岁，大而遍身，小而一拳半肘，医之则一，此等乃根蒂之病，此非一剂可愈，磨以岁月，亦可安。治石痢，用此方热酒调敷，外却用洪宝箍住四周，待成脓后破。妇人乳痢，或经候不调，逆行失道；又有邪气内郁，而后结成痢肿，如初发之时，宜于此方中用南星、姜汁、酒二停调匀热敷，即可内消。欲急则又佐以草乌，此药味性烈，能破恶块，逐寒热，遇冷即消，遇热即溃。宿痰失道，痢肿无脓者，可用此药点头，病必旁出，再作为佳，不然，则元阳虚耗，此为败症，元阳虚耗败证者，急用全体玉龙敷之，拔出成脓。服药则通顺散加桔梗、半夏、当归、肉桂等药。肚痢证，初觉腰痛，且以手按之痛苦，走闪移动，则为气块。若根不动，外面微有红肿，则为内痢，急以此方拔出毒气，作成外痢，然后收功冲和，内则用通顺散加忍藤，治法如前。

【主治】发背，流注，鼓椎风，久损痛，冷痹，血风，风脚痛，石痢，妇人乳痢，痢肿无脓，肚痢。

【方论选录】此方有军姜、肉桂足以为热血生血，然既生既热而不能散，又反为害，故有草乌、南星足以破恶气，驱风毒，活死肌，除骨痛，消结块，唤阳气。又有赤芍、白芷足以散滞血，住痛苦，生肌肉。加以酒行药

性，散气血，虽十分冷证，未有不愈。端如发寒灰之焰，回枯木之春。大抵病冷则肌肉阴烂，不知痛痒。其有痛者又多，附骨之痛不除，则寒根透髓，非寻常之药所能及。惟此药大能逐去阴毒，迎回阳气，住骨中痛，且止肌肉皮肤之病，从可知矣。但当斟酌用之，不可太过，则为全美。

33687 回阳玉龙膏

《保婴撮要》卷十六。为原书同卷“抑阴散”之异名。见该条。

33688 回阳正气饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】人参 附子各一钱 生耆三钱 生白术 当归 枣仁各二钱 炙甘草五分 麻黄根二钱（醋炒）

【功用】回阳止汗固脱。

【主治】过汗误汗，阳虚自汗，脉沉细者。

33689 回阳生肌散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】干姜（炒黑）

【用法】上为末。搽患处，觉热如烘，生肌甚速。

【功用】生肌。

【主治】冷疮久不收口。

33690 回阳生肌散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】人参五钱 鹿茸五钱 雄黄五分 乳香一两 琥珀二钱五分 京红粉一钱

【用法】薄撒于疮面上或制药捻用。

【功用】回阳生肌，止痛收敛。

【主治】鼠疮，慢性顽固性溃疡及属于阴疮久不收口者。

【宜忌】火毒疮疖属阳症脓毒未净者及汞过敏者禁用。

33691 回阳发表汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 人参 泽泻各半两 半夏（汤浸七遍，炒令干） 干姜（炮） 天南星（炮） 甘草（炙）各一分

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】阴毒伤寒。

33692 回阳返本汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】熟附子 干姜 甘草 人参 麦门冬 五味子 腊茶 陈皮

【用法】面戴阳者，下虚，加葱七茎、黄连少许，用澄清泥浆水一钟煎之，临服入蜜五匙，顿冷服之。取汗为效。

【主治】①《伤寒六书》：阴盛格阳，阴极发燥，微渴面赤，欲坐卧于水井中，脉来无力，或脉全无欲绝。②《会约》：阴极发燥而厥，阴盛格阳，腹痛，吐泻不渴，畏寒肢冷，脉弱。

33693 回阳返本汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】人参一钱 白术一钱 干姜一钱（炒） 丁香八分 甘草一钱 陈皮一钱 半夏（制）一钱 大附子（制）一钱 茯苓八分 神曲（炒）六分 白豆蔻八分 沉香五分

【用法】上锉，加生姜三片，大枣二个，盐少许，水煎服。外于脐上，用熟葱贴，冷则复易。外肾并阴囊，以绢帛扎住，用炒盐款款烙之。再用炒盐熨胸膈、胁肋、上下小腹。如急阴不省人事，用盐填满脐中，艾火灸之，以醒为度。或大便秘结，以利气丸通之。

【主治】急阴证。手足冷，指甲青，小腹疼痛，外肾挛缩。

33694 回阳返本汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】附子 干姜 人参 肉桂 麦门冬 五味 茯苓 甘草 童便

【用法】加生姜、大枣，水煎，临服入蜜二匙，顿服之。服热而燥不止者，宜再服，燥自定矣。

【主治】阴极发燥，微渴面赤，欲于泥水井

中坐卧者，脉沉迟无力或脉伏。

【宜忌】不可服凉药。若误认为热症，而用凉药，死不可复生矣。

【加减】无脉者，加猪胆汁一匙；面赤者，加葱七茎；呕者，加姜汁炒半夏。

33695 回阳返本汤

【方源】《救偏琐言·备用良方》卷十。

【组成】人参 黄耆 鹿茸（酒炙，锉片，用酒蒸膏配药） 当归 川芎 肉桂 甘草 山楂 熟附 大枣二枚

【主治】痘，气血虚剧，皮薄浆清，锡皮灰白，虚惕寒战。

33696 回阳返本汤

《锦京直指》。为《伤寒六书》卷三“回阳救急汤”之异名。见该条。

33697 回阳软坚汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】上肉桂一至三钱 白芥子三至五钱 炮姜二至四钱 熟地五钱至一两 白僵蚕二至四钱 橘红三至五钱 三棱三至五钱 麻黄一至二钱 莪术三至五钱 全丝瓜二至五钱

【功用】回阳软坚，温化痰湿。

【主治】胸前疽、腋疽及一切表面皮肤不变，肿硬聚结的阴疽症。

【方论选录】方中麻黄、肉桂、白芥子、炮姜回阳软坚，通络散结；三棱、莪术化痰软坚散结；熟地养血和阴；桔红、白僵蚕理气化痰散结；全丝瓜通经活络，健脾祛湿化痰。

33698 回阳固精丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参 黄耆 肉桂 巴戟 锁阳各二两 山药 故纸 小茴香各四两 菟丝八两 川芎 杜仲各一两 附子一个

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，白汤送下。

【主治】阳萎不举，心肾不交。

33699 回阳急救汤

《寿世保元》卷二。为《伤寒六书》卷三“回阳救急汤”之异名。见该条。

33700 回阳急救汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】附子 干姜 人参 甘草 肉桂 陈皮

【用法】水一钟半，加大枣二个，生姜自然汁半盏煎，临服入泥浆水澄清。每次温服一匙。

【主治】直中阴经，无热，恶寒，面惨，手足厥冷，唇紫舌卷，爪甲青黑，身重难以转侧，不渴，卧多踈足，大便泄利，小便清白，脉沉细微。

【加减】腹痛甚，加芍药、木香、老姜汁；利不止，加陈壁土炒升麻少许；口吐涎沫，加吴茱萸（盐炒）；无脉，加五味子、猪胆汁；战慄，加附子、麻黄；小腹绞痛，加青皮、吴茱萸。

33701 回阳急救散

【方源】《湿温时疫治疗法》。

【异名】五香感应散（《感证辑要》卷四）。

【组成】吴茱萸一两八钱 母丁香一两二钱 上桂心八钱 硫黄五钱 当门子四钱

【用法】上为极细末，瓷瓶密收。每二三分安脐中，以膏药封之。一时即愈。

【主治】外中阴寒，内伤生冷，为寒霍乱，吐泻清水，多生腥气，胸膈坚满，脘腹痛甚，手冷至臂，足冷至股，溺短或秘，甚则吐泻，冷汗自出，脉多沉微欲绝，或沉细似伏，舌苔白，无神。

【宜忌】此方药虽猛峻，而仅取其气，由脐入腹，自能温通脏腑，以逐寒邪，不致伤阴，诚为上策，惟口渴苔黄，下利极热者，显为阳症，虽见肢冷脉伏，亦勿妄用此散，更张其焰也。孕妇忌贴。

33702 回阳救产汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】人参 当归（酒洗）各一两 肉桂 干姜（炒） 炙甘草各一钱 白术（蜜炙）五钱

【用法】水二钟，煎七分服。

【主治】妊娠中寒。

33703 回阳救产汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】人参三钱 当归一两 川芎五钱 荆芥一钱 上捣桂一钱 益母草三钱

【用法】水煎服。

【主治】产后阴疽。

33704 回阳救阴丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参三两 黄耆三两 当归一两 茯神五钱 生枣仁三钱 北五味一钱

【用法】水煎服。一剂阳回，二剂阴生。然后方中再加熟地一两，山茱萸五钱，一剂煎饮，连服一月，可以还原如故。

【主治】阳脱。妇人爱风月者，尽情浪战，以致虚火沸腾，阴精下脱，死去更苏，头目眩晕，止存游气。

【方论选录】此方先用参以挽回子一时，后用熟地、山药以善后于平日。盖人参实能救脱以回阳，而不能救涸以填阴。先补阳而后补阴，则已脱之精可生，未脱之气易长，庶不至阳旺而阴消也。

33705 回阳救阴汤

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】麦冬 黄肉 金银花 归身各一两 熟地二两 人参 白术各五钱 肉桂一钱

【主治】背疽将愈，疮口不敛，阴虚似阳症。

33706 回阳救胃汤

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】人参 熟地 麦冬各二两 黄耆 归身 黄肉各一两 白术 金银花各四两 远志 肉桂 茯苓各二两 五味子一钱

【主治】疮口黑烂，直至肺脏阴虚无阳，胃气未绝者。

33707 回阳救急丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】鹿茸 人参 小茴香 故纸各三钱 附子 肉桂 吴萸 沉香各二钱 麝香一钱 官桂二钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，生姜水送下。

【功用】镇痛散寒，强心助气。

【主治】阳气衰弱，肾寒精冷，性交感寒，小腹绞痛，腰膝痠软。

【宜忌】忌食生冷，孕妇忌服。

33708 回阳救急汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】回阳急救汤(《寿世保元》卷二)、回阳返本汤(《儒京直指》)。

【组成】熟附子 干姜 人参各五分 甘草 白术各一钱 肉桂 陈皮 五味子 茯苓 半夏

【用法】水二钟，加生姜三片，煎后，临卧入麝香三厘调服。中病以手足温和即止，不得多服，多服则加别病。如止后，可用加味理中饮加减治之。

【主治】寒邪直中阴经真寒证。初病起无身热，无头疼，只恶寒，四肢冷厥，战慄腹疼，吐泻不渴，引衣自盖，踡卧沉重；或手指甲唇青；或口吐涎沫；或至无脉；或脉来沉迟无力。

【加减】呕吐涎沫，或小腹痛，加盐炒吴萸；无脉者，加猪胆汁一匙；泄泻不止，加升麻、黄耆；呕吐不止，加姜汁。

【方论选录】①《医方集解》：此足三阴药也。寒中三阴，阴盛则阳微，故以附子、姜、桂辛热之药祛其阴寒，而以六君子温补之药助其阳气；五味合人参可以生脉；加麝香者，通其窍也。②《重订通俗伤寒论》何秀山按：少阴病下利脉微，甚则利不止，脉厥无脉，干呕心烦者，经方用白通加猪胆汁汤主之。然不及此方面面顾到。故俞氏每用之奏功。揣其方义，虽仍以四逆汤加桂温补回阳为君；而以《千金》生脉散为臣者，以参能益气生脉，麦冬能续胃络脉绝，五味能引阳归根也；佐以白术、二陈健脾和胃，上止干呕，下止泻痢；妙在使以些许麝香，斩关直入，助参、术、附、桂、麦、味等温补收敛药用，但显其助

气之功，而无散气之弊矣。此为回阳固脱，益气生脉之第一良方。廉勘：此节庵老名医得心应手之方。凡治少阴中寒及夹阴伤寒，阳气津液并亏，及温热病凉泻太过，克伐之阳，而阳虚神散者多效。妙在参、术、附、桂与麝香同用。世俗皆知麝香为散气通窍之药，而不知麝食各种香药，含莫咀华，蕴酿香精而藏于丹田之间。配合于温补回阳之中，殊有卓识。吴鞠通辄诋其谬，亦未免所见不广，信口雌黄者矣。以余所验，服此方后，脉渐渐缓出者生，不出者死，暴出者亦死，手足不温者亦死。若舌卷囊缩，额汗如珠不流，两目直视者速死。

【备考】方中肉桂、陈皮、五味子、茯苓、半夏用量原缺。《寿世保元》本方用大附子(制)八分，干姜八分，人参二钱，肉桂五分，半夏二钱，五味子四分，白茯苓三钱，甘草(炙)八分，陈皮钱半。方中白术，《寿世保元》作白米(炒)一撮。

33709 回阳救急酒

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】公丁香一两 肉桂一两 樟脑一两

【用法】上为粗末，稀布袋盛装入有嘴瓷坛，灌入顶上千酒三斤，端午节午时浸备用(坛口及嘴封固)。每服十五至二十滴，冷白开水冲下(不可太热冲服)，十分钟未效，再服二十滴。转筋者可以用酒擦患处。

【主治】阴寒霍乱，吐泻交作，手足厥冷，转筋，唇淡而白；并治阴寒腹痛。

【宜忌】泄泻后重不畅者忌服，忌食生冷瓜果。

33710 回阴散瘰汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】巴戟天五钱 茯苓一两 山药五钱 防风五分 炒栀子一钱 白芍五钱 当归三钱 白术一两 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】厥阴瘰症。感湿热又感风邪，厥逆

下利，舌卷囊缩，背曲肩垂，项似拔，腰似折，手足俱冷，其腹胀大。

【方论选录】此方补肝经之血，而佐之去湿、去火、去风之味，自是正治之法。而又补肾中之火，益之巴戟天何居？正补少阴之谓也。第厥阴之木，非少阴之水不生，何必补肾中之火？诎知汗发亡阳，阳气尽从外泄，肾中已无真火，单用寒凉以祛热，则脾胃不胜其寒矣。巴戟天温肾不至大热，肾温而阳回，肝清而阴足，阴阳和合，内之正气既固，风热湿之外邪不必攻而自破，况原有攻之者乎。此有益无损之治法，又何患厥阴瘰症之无传久哉。

33711 回灵化毒汤

《痘疹全书》卷下。为《万氏家抄方》卷六“回阳化毒汤”之异名。见该条。

33712 回乳四物汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地各二钱 麦芽二两(炒，为粗末)

【用法】水二钟，煎八分，食远服。用脚布束紧两乳，以手按揉其肿，自然消散，甚者再用一服。

【主治】产妇无儿吃乳，致乳汁肿胀，坚硬疼痛难忍。

33713 回毒即消丹

【方源】《医部全录》卷四九六。

【组成】净金银花五钱 生甘草一钱 人参二钱 黑参三钱

【用法】水二碗，煎三分，与小儿服之。一剂即消大半，二剂全愈。

【主治】痘疹回毒。

33714 回毒银花散

《外科正宗》卷二。为《保命集》卷下“回疮金银花汤”之异名。见该条。

33715 回春再造丹

《秘传打损扑跌药方》。为《跌损妙方》“回生再造饮”之异名。见该条。

33716 回春再造散

《外科百效》卷五。为《跌损妙方》“回生

再造饮”之异名。见该条。

33717 回春泻痢膏

【方源】《理渝》。

【组成】诃子肉 粟壳 赤石脂各四两
煅龙骨二两 乳香 没药各五钱

【用法】熬膏贴。

【主治】泻痢。

【宜忌】初起勿用。

【加减】冬，加肉蔻仁末。

33718 回春健脾丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 茯苓五钱 薏仁一两
山药四钱 陈皮五分 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【主治】臌胀，人弱极。

【宜忌】忌食盐者一月，犯则无生机矣。

33719 回春凉膈散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】连翘一钱二分 黄芩 黄连 山
梔 桔梗 薄荷 当归 生地 枳壳 赤芍
甘草各七分

【主治】口糜。

33720 回春脱疳散

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】黑铅五钱（火化开） 水银二钱五
分（研不见星为度） 寒水石三钱五分 轻
粉二钱五分 硼砂一钱

【用法】上为细末，先用葱、艾、花椒煎汤，
洗患处，再撒此药。

【主治】下疳蚀烂。

33721 回春辟邪丹

《杂病源流犀烛》卷二十。为《回春》卷
二“辟邪丹”之异名。见该条。

33722 回急保生丹

【方源】《沈氏女科辑要笺疏》卷下。

【组成】大红凤仙子九十粒 白凤仙子四
十九粒 自死龟版一两（麻油涂，炙） 怀
牛膝三钱 桃仁一钱五分 川芎五钱 白归
身五钱

【用法】凤仙子研末包好，临产时，将余药

称明分两，为末配入。每服二钱，临盆时米
饮调下。迟则再服一钱，交骨不开者即开，难
产者，不过三服。临盆一月内，本方去凤仙
子，入益母膏二两，每日早米饮调下二钱，则
临盆迅速。

【功用】催生。

【主治】临产交骨不开。

【宜忌】胎元不足者勿服。

【加减】产后瘀血不净变生病者，或儿枕
痛，于本方内加炒红曲三钱、酒炒马料豆二
合，共为末，用童便半杯、陈酒半杯，调服
二三钱即愈。惟凤仙子临盆时用。

33723 回疮银花汤

《观聚方要补》卷八。为《保命集》卷下
“回疮金银花汤”之异名。见该条。

33724 回浆合宜散

【方源】《救偏琐言·备用良方》卷十。

【组成】白芍 防风 米仁 甘草 茯苓
山楂 扁豆 大枣

【主治】痘疹血收浆足，别无燥热之证者。

33725 回鹤五神散

【方源】《丹溪心法附余》卷八。

【组成】芫花独根（以水洗净） 木香 青
木香 商陆（白者，洗净） 乌白根（取黄
土内一寸深，用皮）各等分

【用法】晒干为末。每服二钱，如人弱服一
钱半，临卧腊酒调下。至寅卯时利下水气，辰
时以白粥补之，若病浅三日一服，病深隔日
一服，限五六日后服金丹。

【主治】十种水气臌胀。

33726 回生夺命神丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】羌活 白蒺藜 藁本 天南星
防风 川续断 苍术 五加皮 独活 海风
藤 白芷 大腹皮 乌药 仙灵脾 防己
皂角刺 川乌 明天麻 桔梗 北细辛 柴
胡 蔓荆子 黄芩 川草薢 薄荷 甘松
白芍 大黄各三两 红花 玄参各七两 草
乌四两 苦参二斤（上用阴阳水各一大桶浸，

春五、夏三、秋七、冬九日，煎百沸去滓，加炼蜜一斤，煎成膏如漆。白术 胡麻 人参（酒浸，蒸熟晒干） 砂仁 礞石（硝煨） 蕤仁（去油）各二两 沉香 白茯苓 木香 檀香 降香 安息香 乳香（去油） 没药（去油） 川芎 牛膝 红花 香蛇（酒浸，焙干） 血竭 白僵蚕 松脂（煮去苦水） 云母石 冰片 鹅管石 磁石 肉苁蓉 原蚕蛾 桑螵蛸各一两 蟾酥 麝香各五钱 人牙（炙黄色）五个 白花蛇一条（酒浸，去皮，晒干）

【用法】上为末，用前药膏共为丸，如弹子大，朱砂为衣，金箔包裹。年深久远者，每服十丸；四五年者，每服四五丸；一二年者，每服一二丸，须麻姑酒磨下。随汗愈。

【主治】三十六痼，十四癩。

33727 回生第一仙丹

【方源】《验方新编》卷十三引彭竹楼民部家传秘方。

【组成】活土鳖虫（去足，放瓦上小火焙黄研细，用净末）五钱 自然铜（放瓦上木炭火内烧红，入好醋内淬半刻取出，再烧再淬，连制九次，研末）三钱 真乳香（每一两用灯草二钱五分同炒枯，同研细，吹去灯草，用净末）二钱 真陈血竭（飞净）二钱 真朱砂（飞净）二钱 巴豆（去壳研，用纸包压数次，去净油，用净末）二钱 真麝香三分（要当门子）

【用法】上为极细末，收入小口瓷瓶，用蜡封口不可泄气。大人每服一分五厘，小儿七厘，酒冲下。牙关不开者，打开一齿灌之，必活。

【主治】跌打、压伤、打伤、刀伤、锐伤、割喉、吊死、惊死、溺水死。

【宜忌】宜避风调养。

【临症举例】道光初年，民部率直隶时，有人被毆死已三日矣。民部往验，见其肢体尚软，打开一齿，以此丹灌服一分五厘，少刻其尸微动，再灌一分五厘而活。其余甫经毆

杀或毆死一二日者，全活。

33728 回阳生肌药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】人参五钱 鹿茸五钱 雄精五分 乳香一钱 琥珀二钱五分 京红粉一钱二分五厘

【功用】回阳生肌，补血定痛。

【主治】阴症窦道、瘰管、脓疡久不收口者。

【宜忌】对汞剂过敏者禁用。

33729 回毒金银花汤

《医学纲目》卷十八。即《保命集》卷下“回疮金银花汤”。见该条。

33730 回毒金银花汤

《医林纂要》卷十。为《张氏医通》卷十五“归耆饮”之异名。见该条。

33731 回疮金银花汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】回疮金银花散（《活法机要》）、金银花汤（《脉因证治》卷下）、回毒银花散（《外科正宗》卷二）、回疮银花汤（《观聚方要补》卷八）。

【组成】金银花（连衣）二两 黄耆四两 甘草一两

【用法】上锉细，酒一升，入瓶内，闭口，重汤内煮三二时辰，取出去滓温服。

【主治】疮疡痛，色变紫黑者。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“回毒金银花汤”。

33732 回疮金银花散

《活法机要》。为《保命集》卷下“回疮金银花汤”之异名。见该条。

33733 回疮蟾酥锭子

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】天南星 款冬花 巴豆仁 黄丹 白信各一钱 独活五分 斑蝥（去头足）十个

【用法】上为极细末，用新蟾酥和药如黍米大，搦作锭子。每遇疮，先以针刺其疮，必不知痛，有血出者，下锭子。用锭子法度：以银作细筒子一个，约长三寸许，随针下至疮

痛处，复以细银丝子纳药于筒内，推至痛处。如觉痛，不须再用，若不知痛，再随疮所行处，迎夺刺之，至有血知痛即止。其元疮亦觉疼痛，以膏药敷之，脓出自瘻。治疗疮毒气攻心欲死，以针刺其疮向心行处，但觉有血处下铍子。若累刺至心侧近，皆不痛无血者，急刺百会穴，痛有血者下铍子。若无血，以亲人热血代之，犹活三四。况疮初发，无不有效。

【主治】疗疮毒气攻心欲死。大抵疗疮生于四肢及胸背、头项、骨节间，唯胸背、头项最急。初生痛痒不常，中陷如丁盖，撼之有根，壮热恶心是也。

33734 回生保产至宝丹

《经验各种秘方辑要》。为《回春》卷六引孙奎亭方“回生丹”之异名。见该条。

33735 回生保命玉咽丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】真犀黄一钱 飞青黛(以青鱼胆汁减半拌透)五钱 硼砂一钱 儿茶一钱 梅片五分 天竺黄一钱五分 珠粉(豆腐内煮过)一钱 制甘石一钱(制炉甘石法，每以甘石煨过五钱，用川黄连、黄柏、黄芩各一钱，煎浓汁同甘石再制，将汁尽收入甘石内为度) 煨中白四钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】咽喉各证，兼口疳、口内腐烂，并口中无端大痛出血。

【加减】若治咽喉，需去甘石，加生蒲黄一钱；如喉中已烂，用珠粉；倘不腐，加薄荷一钱。

33736 回生保命黑龙丹

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】五灵脂二两(净) 川芎二两 大生地二两 良姜二两 全当归二两(上五味入砂罐内纸筋盐泥封固，煨红候冷，取出研细，再入后药) 百草霜三钱 生硫黄二钱 真血珀二钱 乳香二钱 花蕊石二钱

【用法】后五味为细末，同前药和匀，米醋

煮面为丸，如弹子大。每临服用炭火煨药通红，投生姜自然汁内浸碎，以无灰酒童便调下。不过二服神效。

【主治】①《良方集腋》：产后瘀血沉入心脾间，命在垂危。②《寿世新编》：产患及胞衣不下，血迷血晕，不省人事，危急恶候垂死者。

33737 回生救苦上清丹

【方源】《经验方》卷下。

【组成】白僵蚕(焙存性)一钱 生硝尖 煨硝尖 白硼砂各五分 明矾 熟矾各二分 海螵蛸三分 冰片一分

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。每用少许吹上。吐出痰涎即愈。

【主治】咽喉十八种急症。

33738 回阳无价至宝丹

【方源】《遵生八笺》(炫雪居本)卷十七。

【组成】川楝子(取肉) 乌药各二两 川牛膝 熟地黄 蛇床子 茯神 穿山甲 肉苁蓉 巴戟 五味子 人参 泽泻 大茴香 槟榔各一两 乳香三钱 沉檀香各五钱 凤眼草二钱 鹿茸 仙灵脾 甘草 破故纸 菟丝子 葫芦巴 莲心各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以好酒送下。

【主治】五劳七伤，四肢无力，下元虚冷，夜梦遗精，阳痿。

【备考】本方方名，原书巴蜀本作“壮阳无价至宝丹”。

曲

33739 曲末酒

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】好曲末五升

【用法】微熬令香，温清醇酒令热，和曲末一升，空腹顿服之，一日三次。若至食时，捣蒜一升令至熟，下姜、椒末调和，如常食之法，惟须稠，勿加盐，以水和面二升作淳饼，极烂煮之，干漉，热纳蒸蒜薤，白中相和，一

顿食之，少与余食。至饥时，仍准前食曲末酒，比至愈来，少食余食。以此法治不过两日，无有不愈。

【主治】久冷痢不纯白者，由积卧冷处，经久病发，遂令脾胃俱冷，日夜五六十行，大小腹痛不可忍。

33740 曲末粥

【方源】《养老奉亲》。

【异名】曲米粥（《医统》卷八十七）。

【组成】神曲二两（炙，捣罗为末） 青梁米四合（净淘）、

【用法】上相和煮粥，空心食之。常三五服立愈。

【功用】《医统》：温中。

【主治】老人脾虚气弱，食不消化，泄痢无定。

33741 曲术丸

【方源】《本事》卷二。

【异名】椒曲丸（《普济方》卷二十三引《医方集成》）。

【组成】神曲十两（微炒） 白术五两 干姜（炮） 官桂（去粗皮，不见火）各三两 吴茱萸（汤浸七次，焙） 川椒（去目并合口，微炒地上出汗）各二两

【用法】上为细末，薄糊丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤下，食前稍空腹。

【主治】①《本事》：脾元久虚，不进饮食，停饮胁痛。②《普济方》引《医方集成》：腹胀满，脏腑虚滑，止而复作，痼冷积伤久不愈。

【加减】有饮，加半夏曲二两。

33742 曲术丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】神曲（炒）三两 苍术（泔浸三宿，洗净晒干，炒）一两半 陈皮一两

【用法】上为末，生姜汁别煮神曲末糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】中脘有宿食留饮，酸蜇心痛，口吐

清水，暖宿腐气。

33743 曲术丸

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】神曲（炒） 苍术（米泔浸一宿，焙干）各等分（为末）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【功能】壮脾温胃，进美饮食。

【主治】时暑暴泻，饮食所伤，胸膈痞闷。

33744 曲术丸

【方源】《脉因症治》卷下。

【组成】缩砂 陈皮 苍术 曲（炒）

【用法】曲为丸。姜汤送下。

【主治】吞酸。中脘有饮则嘈，宿食则酸。

33745 曲术汤

【方源】《三因》卷十六。

【组成】白术一两 神曲二两（炒） 甘草一分

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。一方以土朱研炒，每服二钱，冷酒调下；不饮，以茶调之。

【主治】因浴出 风冷，遍身瘾疹，搔之，随手肿突，眩晕，呕哕。

33746 曲术散

【方源】《三因》卷七。

【组成】神曲二两（炒） 白术三两

【用法】上为末。每服二钱，生姜煎汤调下，或以酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，汤饮任下。

【主治】冒湿头眩晕，经久不愈，呕吐涎沫，饮食无味。

33747 曲芎丸

《得效》卷五。为《本事》卷四“鞠莠丸”之异名。见该条。

33748 曲米丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】神曲 大麦蘖各四两 厚朴八两 洪术二两（或白术）

【用法】上为细末，以醋煮面糊为丸，如梧

桐子大。每服三五十丸，食后以温水送下。

【主治】新久一切痔漏及饮食不消，有谷穴者。

33749 曲米粥

《医统》卷八十七。为《养老奉亲》卷一“曲末粥”之异名。见该条。

33750 曲芽丸

《济阳纲目》卷十一。为《济生》卷四“曲蘖丸”之异名。见该条。

33751 曲附丸

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】香附米 神曲 川芎 梔子 滑石 山楂 红曲 青黛 桃仁

【用法】上为末，面糊为丸服。

【主治】食积痢。

33752 曲直汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】萸肉一两（去净核） 知母六钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 当归三钱 丹参三钱

【主治】肝虚腿疼，左部脉微弱者。

【加减】服药数剂后，左脉仍不起者，可加续断三钱，或更加生黄耆三钱，以助气分亦可；觉凉者，可减知母。

【临证举例】①腿疼 一人，年三十许，当大怒之后，渐觉腿疼，日甚一日，两月后，卧床不能转侧。医者因其得之恼怒之余，皆用舒肝理气之药，病转加剧。后愚诊视，其左脉甚微弱，自言凡疼甚之处皆热。为制此汤，以萸肉补肝，以知母泻热，更以当归、乳香诸流通血气之药佐之，连服十剂，热愈疼止，步履如常。②臂热 安东友人刘某，年五十许，其左臂常觉发热，且有酸软之意。医者屡次投以凉剂，发热如故，转觉脾胃消化力减少。后愚诊之，右脉和平如常，左脉微弱，较差于右脉一倍。询其心中，不觉凉热。遂治以曲直汤，加生黄耆八钱，佐萸肉以壮旺肝气，赤芍药三钱，佐当归、丹参诸药以流通经络，服二剂，左脉即见起，又服十剂全

愈。

33753 曲鱼膏

【方源】《千金》卷七。

【组成】大黄 黄芩 莽草 巴豆 野葛 牡丹 踯躅 芫花 蜀椒 皂荚 附子 藜芦各一两

【用法】上咬咀，以苦酒渍药一宿，以煎成猪膏三斤，微火煎三沸。别入白芷一片、三上三下，白芷色黄药成，去滓，微火炙手，摩病上，一日三次。

【主治】风湿疼痛，四肢骀弱，偏跛不仁，并痈肿恶疮。

33754 曲香散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】赤曲 藿香叶各半两（去土） 丁香（不见火） 肉豆蔻（面裹煨）各二钱

【用法】上为细末。每服一钱，一岁小孩半钱，煎香楠木汤调下。

【功用】止吐。

【主治】小儿慢惊，皆因吐泻所致。

33755 曲桂汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】陈曲（銕，炒） 桂（去粗皮） 百合 麻黄（去根节） 黄连（去须） 枳壳（去瓢，麸炒） 白石脂各一两半 桑根白皮（銕，焙） 地骨皮 附子（炮裂，去皮脐）各二两 款冬花 羚羊 角屑 旋覆花（微炒）各一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）十枚 黄芩（去黑心）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒食毒咳嗽。

33756 曲蘖丸

【方源】《外台》卷二十五引《胡洽方》。

【组成】麦蘖（炒） 曲（炒）各一升 附子（炮） 桂心 乌梅肉各二两 人参 茯苓各四两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前饮送下，一日三次，稍

稍增之。

【功用】消谷下气。

【主治】数十年休息痢下，不能食，虚羸。

33757 曲蘖丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】好曲 大麦蘖各一升 附子 当归 桂心各二两 蜀椒一两 黄连 吴茱萸 乌梅肉 干姜各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食已服二十丸，一日三次。

【功用】消谷下气，补虚羸。

【主治】①《千金》：数十年下痢不止。②《杨氏家藏方》：赤白痢久不愈。

【备考】按①本方方名，《外台》引作“乌梅肉丸”。②《杨氏家藏方》本方用法：粟米糊为丸，每服五十丸，米饮下，不拘时候。

33758 曲蘖丸

《鸡峰》卷十二。为《千金》卷十五“消食丸”之异名。见该条。

33759 曲蘖丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】曲芽丸（《济阳纲目》卷十一）

【组成】神曲（锉，炒） 麦蘖（炒）各一两 黄连（去须）半两 巴豆三粒（去壳同炒，令转色，去巴豆不用）

【用法】上为细末，沸汤为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后生姜汤送下。

【主治】酒癖不消，心腹胀满，噎醋吞酸，呃逆不食，胁肋疼痛。

33760 曲蘖汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】陈曲（捣碎，炒）一两 大麦蘖（炒）半两 寒食干饭半合 雄鼠粪三七粒（炒令烟尽，为末）

【用法】上药除鼠粪外，略捣过，拌令匀，分作二服。每服用水一盏半，入葱白五寸，薤白五寸，豉一百粒，同煎至八分，去滓，入鼠粪末一半，搅匀空心温服。

【主治】伤寒后，伤食，食劳困绝。

33761 曲蘖汤

【方源】《普济方》卷二十三引《十便良方》。

【组成】麦蘖一斤 神曲四两 半夏一两 甘草 茯苓二两 陈皮二两 生姜一斤 盐半斤（炒）

【用法】上为细末，干净瓷瓶盛，停三五日，令气味调和，方用沸汤点服，不拘时候。此方妙处，全在陈皮制令浑无药味方可。

【主治】脾胃虚弱，中脘不健，饮食迟化。

【备考】方中甘草用量原缺。

33762 曲蘖散

【方源】《千金》卷十五。

【组成】法曲 杏仁 麦蘖各五两

【用法】上药治下筛。每服一合，食后酒下，一日三次。

【功用】消谷能食，除肠中水气膨胀。

【方论选录】《千金方衍义》：气下则水散。杏仁下气，曲、蘖消谷，肠胃清肃而膨胀除矣。

33763 曲蘖丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】干地黄 蛇床子 薯蓣 牡蛎 天雄 远志 杜仲 鹿茸 五味子 桂心 鹿药草 石斛 车前子 菟丝子 雄鸡肝 肉苁蓉 未连蚕蛾各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸酒送下，加至七丸，日三次，夜一次。

【功用】补虚弱。

【主治】风冷。

【方论选录】《千金方衍义》：无底曰囊。膀胱有上窍无下窍，因以囊喻。夫人之肾气不虚，则膀胱有制。今以肾气失职，不能司闭藏之令，则膀胱亦不能秉气化之权，或时频数，或时不禁，故专取鹿茸、鸡肝、菟丝、蛇床以助氤氲之气；五味、苁蓉、原蚕、牡蛎以收耗散之津。盖肾得咸则固蜜，膀胱得酸则拳曲。曲囊之名未必不本诸此。他如天雄、桂心助真阳，消阴翳；地黄、薯蓣济真阴，除假热；其余杜仲、远志、薇衔乃鹿茸之匡佐，

车前、石斛则地黄之通使耳。

33764 曲末索饼

《医统》卷八十七。为《养老奉亲》“曲末索饼子”之异名。见该条。

33765 曲末索饼子

【方源】《养老奉亲》。

【异名】曲末索饼（《医统》卷八十七）。

【组成】曲末二两（捣为面） 白面五两 生姜汁三两 白羊肉二两（作臛头）

【用法】上以姜汁搜曲末，和面作之，加羊肉臛头及下酱椒五味煮熟。空心食之，一日一次，常服尤佳。

【主治】老人脾胃气弱，食不消化，羸瘦，举动无力，多卧。

33766 曲术香棱丸

【方源】《普济方》卷一七六引《德生堂方》。

【组成】荆三棱 莪术 陈皮 香附子各四两（作一处，用好醋二斤煮一沸时，去醋，焙干） 白豆蔻四两 沉香四两 缩砂仁 革澄茄 木香 川姜 乌药各二两 枳壳（炒） 槟榔 干葛 半夏曲（炒） 神曲 干葛花各二两

【用法】上为末，熬萝卜水煮糊为丸，如绿豆大。每服五七十丸，随意酒、生姜汤送下。

【主治】脾积气滞，胸膈痞闷，肚腹胀满，痞痞气块，往来走注，刺痛大肠，酒食呕吐酸水，饮食不思，妇人血气癥瘕，小儿伤食。

33767 曲麦二陈汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 茯苓 甘草（生） 黄连（姜制） 山楂 麦芽（炒） 神曲（炒） 栝楼仁 枳实（麸炒）

【用法】生姜、红枣为引，水煎服。

【主治】食积咳嗽、便溏。

33768 曲麦补中汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】补中益气汤加神曲 麦芽

【主治】中虚微滞，饮食减少。

33769 曲麦枳术丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白术（炒）一百六十两 橘皮一百六十两 枳实（炒）一百六十两 桔梗三十二两 山楂三十二两 神曲三十二两 麦芽（炒）三十二两 枳壳（炒）三十二两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二至三钱，温开水送下，一日二次。

【功用】开胃健脾，消食化滞。

【主治】气滞胸满，饮食不消，肚腹膨胀，两胁刺痛。

33770 曲蘖二姜丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】高良姜（炒） 干姜（炮，洗）各二两 神曲（炒） 麦蘖（炒）各三两 枳壳（麸炒，去瓢） 肉豆蔻（面裹煨）各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温熟水送下，不拘时候。

【主治】脾胃不和，胸膈痞闷，泄泻下痢，水谷不消。

33771 曲蘖枳术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】枳实（麸炒，去瓢） 大麦蘖（面炒） 神曲（炒）各一两 白术二两

【用法】上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远，温水送下。

【主治】①《内外伤辨》：为人所勉劝强食之，致心腹满闷不快。②《济阳纲目》：食积泻。

33772 曲蘖枳术丸

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】白术（米泔浸一日）四两 黑枳实（去瓢，麸炒）二两 陈皮（去白） 半夏（姜汤泡七次） 神曲（炒） 麦芽（炒） 山楂肉各一两五钱

【用法】上为细末，用鲜荷叶数片，煮汤去叶，入老仓米，如寻常造饭法，甑内以荷叶铺盖方全气味，乘热捣烂，以细绢绞精华汁，

揉拌成剂为丸,如梧桐子大。每服一百丸,食远白汤送下。

【主治】泄泻。

【加减】胃寒或冬月,加砂仁一两;气滞不行,加木香五钱;常有痰火,又兼胸膈痞闷,加黄连、茯苓各一两。

33773 曲麦山楂地骨知母汤

【方源】《温热经解》。

【组成】神曲二钱 山楂二钱 麦芽二钱 知母三钱 地骨皮三钱

【功用】消食降火。

【主治】外邪已解,五更咳嗽,胃中有积食。

虫

33774 虫牙散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】雄黄五钱 萆薢八钱 上冰片八分

【用法】上为末,瓷瓶收贮。牙齿虫蛀作痛用擦之。

【主治】虫牙痛。

33775 虫积丸

【方源】方出《准绳·类方》卷八,名见《中国医学大辞典》。

【组成】槟榔 牵牛各半斤 雷丸一两半 苦楝皮一两 大黄四两 皂角半斤 三棱 蓬术各二两(另锉,同醋煮) 木香随意加入

【用法】上为细末,煎皂角膏子煮糊为丸,如黍米大。每服二钱,四更时分冷茶送下,小儿一钱。下虫,以白粥补之。

【主治】虫积。

33776 虫积串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】青蛤粉一两 代赭石五钱

【用法】上为末。每服一钱,钩藤汤送下。

【主治】小儿惊搐。

33777 虫糖散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】五谷虫(炒黄,为末) 黑糖

【用法】拌匀,新汲水送下,先以金蟾捣膏,贴脐,引热下行。

【主治】噤口痢。

33778 虫牙漱方

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】羌花 细辛 川椒 雷丸 鹤虱 蕲艾 小麦 细茶

【用法】煎汤漱口。

【主治】虫牙。

33779 虫心痛汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 半夏一钱 羌藁一钱 苍术一钱 乌梅三钱 槟榔一钱 丹皮一钱

【用法】水煎服。

【主治】虫心痛。

肉

33780 肉丹

【方源】《普济方》卷二二六引《十便良方》。

【组成】精羊肉一斤(去尽筋皮横纹,切块,以好酒半斤加水五升烂煮,焙干,研为细末) 鹿茸 白术 神曲各二两 附子 肉果 缩砂仁 干生姜(制)各一两 陈仓米半斤

【用法】上为细末,拌匀,以沸汤洗泡,蒸饼和为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前温酒或米饮任下。

【功用】补虚。

【主治】老人一切虚证,又治胃弱,饮食不进。

33781 肉汁汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白芷 甘草 羌活 蜂房 黄芩 赤芍 当归各一钱

【用法】用猪蹄爪肉一斤煮汁,分二次去油花肉渣,方入前药煎十沸,俟温以绢蘸汤揩洗。恶血随洗而下。

【主治】疮疽有口。

【宜忌】忌风冷。

33782 肉汤丸

【方源】《博济》卷四。

【组成】铜青末一钱 皂角末 大黄末各二钱

【用法】上为末，油饼面和为丸，如小豆大。每服五七丸，肥猪肉汤送下。

【主治】①《博济》卷四：小儿瘦，呷咳不止。②《普济方》引《全要方》：小儿咳嗽，痰涎不通，气急，或痰壅成块。

【宜忌】①《博济》：忌酸咸。②《普济方》引《全要方》：此药宜壮实小儿，久嗽胃寒莫服。

33783 肉红膏

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】猪脂油二两（炼去渣） 黄蜡一两（入一处化开） 银朱五分 花椒末一钱

【用法】上调匀。用纸摊贴。

【功用】止疼，起疔。

【主治】贴棒疮、疔疮。

33784 肉附丸

《百一》卷六引高瑞朝方。为《圣济总录》卷四十四“肉豆蔻丸”之异名。见该条。

33785 肉枣丸

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【异名】黑枣散（《普济方》卷三八一引《经验良方》）、胜金散（《普济方》卷三八一）

【组成】肉枣二个（去核，入青矾如核大在内，以火煨存性）

【用法】上为末，加入麝香少许，油调涂。

【主治】小儿因疳而疮侵口鼻。

【备考】本方方名原作“肉枣丸”，与剂型不符，据《赤水玄珠》改。

33786 肉果饮

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】厚朴（姜制）二两 肉豆蔻一枚（面裹煨）

【用法】上咬咀。每服五钱，加生姜三片，水

煎服。

【主治】妊娠脏气本虚，脾胃衰弱，脏腑虚滑，脐腹疼痛，日夜无度。

33787 肉果散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】米囊皮（炙） 肉果 木香 陈皮 甘草各三钱

【用法】上为细末。分八服，白者米汤送下，赤者白汤送下。

【主治】赤白痢。

33788 肉桂丸

【方源】方出《本草纲目》卷三十四，名见《仙拈集》卷一。

【组成】肉桂（去粗皮）

【用法】研末，饮和丸，如绿豆大。每服五六丸，白滚水送下，未消再服。

【主治】食瓜果生冷所伤。

33789 肉桂片

《仙拈集》卷一。即《冯氏锦素·杂证》卷十三“治疟神方”。见该条。

33790 肉桂汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇二。

【组成】肉桂（末）一两 诃黎勒皮（末）一分 巴豆一枚（去皮心，研，纸包压去油）

【用法】上药除桂，先将二味绵裹，入一中盏汤，浸良久，搗下黄汁，更入酒一合，下桂末令匀，顿服。须臾得吐痢。

【主治】干霍乱。

33791 肉桂酒

【方源】《寿世青偏》卷下。

【组成】辣桂（末）二钱

【用法】温酒调服。

【主治】感寒身体疼痛。

33792 肉桂散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】肉桂二两（去皱皮） 麻黄一两（去根节） 海桐皮一两（锉） 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 黑豆二两（炒熟） 五加

皮一两 防风一两(去芦头) 牛膝一两(去苗) 附子二两(炮裂,去皮脐) 松节一两(锉) 道人头一两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以温酒调下。

【主治】历节风,四肢疼痛,筋脉不利。

【备考】本方方名,《普济方》引作“桂心散”。

33793 肉桂散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】肉桂一两(去皴皮) 当归半两(锉,微炒) 蒲黄半两 牛膝三分(去苗) 鬼箭羽三分 虻虫半两(去翅足,微炒) 琥珀三分 赤芍药三分 桃仁三分(汤浸去皮尖双仁,麸炒微黄) 水蛭半两(炒令黄) 川大黄一两(锉,微炒)

【用法】上为细散。每于一钱,食前以温酒调下。

【主治】产后恶血不尽,结聚为血瘕,腹中坚满,不下饮食。

33794 肉桂散

【方源】《苏沈良方》卷十引《灵苑方》。

【异名】乌金散(《产乳备要》)、黑神散、八味黑神散(《卫生家宝产科备要》卷七)。

【组成】黑豆二两(炒熟,去皮) 肉桂 当归(酒浸) 芍药 干姜(炮) 干地黄 甘草 蒲黄(纸包,炒)各一两

【用法】上为末。每服二钱,温酒调下,一日三次。疾甚者三次,无疾二次,七日止。

【功用】《医方集解》:行血下胎。

【主治】妇人产后,寒瘀肉停,恶露不下,心胸痞满,腹部胀痛,以及血晕神昏者。

①《苏沈良方》引《灵苑方》:产后众疾,气血崩运,肿满发狂,泻痢寒热。唯吐而泻者难愈。②《经效产宝续编》:热病胎死腹中。③《局方·绍兴续添方》:妇人产后恶露不尽,胞衣不下,攻冲心胸,痞满或脐腹坚胀撮痛,及血晕神昏,眼黑口噤,产后瘀血。

【方论选录】此足太阴厥药也。前证皆因血

瘀不行,熟地,归,芍之润以濡血,蒲黄,黑豆之滑以行血,桂心,干姜之热以破血;用甘草者,缓其正气;用童便者,散其瘀逆;加酒者,引入血分以助药力也。

【备考】《局方·绍兴续添方》本方用法:上为细末,每服二钱,酒半盏,童便半盏,同煎调下;急患不拘时候,连进二服。

33795 肉桂散

【方源】《活人书》卷十六。

【组成】肉桂三分(去皴皮) 赤芍一两 陈皮一两 前胡一两(去芦头) 附子一两(炮,去皮脐) 当归一两 白术三分 高良姜三分(锉) 人参一两(去芦头) 吴茱萸五钱(汤浸) 厚朴三分(去皮,姜汁炙令香熟) 木香三分

【用法】捣为粗末。每服四钱,以水一中盏,入枣子三枚,煎至六分,去滓,不拘时候,稍热频服。

【主治】伤寒服冷药过度,心腹胀满,四肢逆冷,昏沉不识人,变为阴毒。

33796 肉桂膏

【方源】《疡科心得集》(家用膏丹丸散方)。

【组成】川乌 草乌 海藻 当归 甘草 白及 甘遂 白芷 细辛 芫花 半夏 肉桂 红花 大戟 虎骨各七钱五分 麻黄一两 五倍子一两

【用法】麻油二斤、青油一斤五两,入药煎枯,去滓;下净东丹(炒)一斤,收成膏;再下乳香(去油、研)、没药(去油、研)各一两,寸香(研)五钱,百草霜一两,搅匀、用红布摊帖。

【主治】一切寒湿痹痛,乳痰、乳癖、瘰癧。

33797 肉核油

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】防风 荆芥 首乌 花粉 苦参各三两 冷饭团一两 肥皂核肉四两 猪脂油四两

【用法】水一碗，煎至半，作五六服。如疮多不效，再一服。

【主治】疔疮。

【宜忌】忌铁器。

33798 肉蔻丸

《医学纲目》卷二十二。即《洁古家珍》卷八“肉豆蔻丸”。见该条。

33799 肉蔻散

《直指》卷十三。为《杨氏家藏方》卷七“肉豆蔻散”之异名。见该条。

33800 肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】肉豆蔻一两（去壳） 木香一两 丁香半两 当归半两 京三棱一两（炮，锉） 神曲一两（捣碎，微炒） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 麝香一分 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 安息香半两 麦蘖一两（炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸食前以热酒送下。

【主治】虚劳，心腹胀满刺痛，食不消。

33801 肉豆蔻丸

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇一。

【组成】肉豆蔻（去壳） 人参（去芦头） 白术 陈橘皮（汤浸去白，焙）各一两 高良姜（锉） 桂心各三分 胡椒 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸如梧桐子大。粥饮送下三十丸，不计时候。

【主治】霍乱，脾胃虚冷，气逆，呕吐不止。

33802 肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】肉豆蔻一两（去壳） 诃黎勒一两（煨，用皮） 白梅肉一两（微炒） 黄连一两（去须，微炒） 白矾二两（烧令汁尽）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每于食前，以粥饮送下二十丸。

【主治】休息气痢久不愈，食即呕吐，腹内疼痛。

33803 肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】肉豆蔻一两（去壳） 附子二两（炮裂，去皮脐） 白石脂二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每于食前，以热酒下三十丸。

【主治】妇人白带下，腹内冷痛。

33804 肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】肉豆蔻一分（去壳） 人参半两（去芦头） 木香一分 诃黎勒皮一分 麝香一钱（细研） 朱砂一分（细研）

【用法】上为末，都研令匀，面糊为丸，如麻子大。三四岁儿，每服三丸，以粥饮送下不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿脾胃气逆，呕吐不止。②《幼幼新书》卷引《刘氏家传》：小儿疳痢，不食，瘦弱。

33805 肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】肉豆蔻一枚（去壳） 胡黄连一分 砒霜半分（细研） 巴豆十枚（去皮心，清油煮色黑，纸裹压去油）

【用法】上为末，以糯米饭为丸，如黍米大。每服一丸以冷水送下。

【主治】小儿疳痢不止。

【宜忌】忌热物。

33806 肉豆蔻丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】肉豆蔻一两（去皮） 桂心三分（去粗皮） 干姜三分（微炮） 诃黎勒皮三分

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温米饮送下。

【主治】胃气虚冷，胸膈痞闷，腹中疼痛，呕吐痰饮。

33807 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】肉豆蔻（去壳，炮） 丁香 甘草

(炙) 陈橘皮(汤浸去白,焙) 高良姜 藿香叶各半两

【用法】上为细末,用枣肉为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,温生姜米饮送下,不拘时候。

【主治】霍乱吐泻渴燥,烦闷不止。

33808 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【异名】肉附丸(《百一》卷六引高瑞朝方)。

【组成】肉豆蔻(去壳)五两 附子(炮裂去皮脐)五枚

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,加至二十丸。空心食前温米饮送下。

【主治】脾藏久冷,滑泄不止。

33809 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】肉豆蔻(面裹煨,去壳) 硫黄(研细) 干姜(生) 附子(炮裂,去皮脐) 龙骨(研)各二两

【用法】上为末,再同研匀,水煮白面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,以艾汤或米饮送下。

【主治】脾藏虚冷,泄痢不止,四逆不思饮食,心腹疼痛。

33810 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】肉豆蔻(去壳)二枚 人参 天雄(炮裂,去皮脐) 当归(切,焙) 大腹(锉) 地榆 京三棱(煨,锉)各一两半 黄连(去须) 白术 木香各一两 白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 干姜(炮裂)各半两 赤石脂二两 桃仁二十枚(去皮尖双仁,炒)

【用法】上为末,烂粟米饭为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】脾胃虚弱,冷物积滞,脐腹撮痛,饮食无味。

33811 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】肉豆蔻(去壳) 干姜(炮) 陈橘皮(汤浸去白,焙) 半夏(汤洗去滑七遍,焙) 桂(去粗皮) 吴茱萸(汤浸,焙干,炒) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 乌头(炮裂,去皮脐) 白茯苓(去黑皮)各半两

【用法】上为末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食前生姜醋汤送下。

【主治】脾脏虚冷,气攻心腹,疝痛肠鸣。

33812 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】肉豆蔻(去壳)一分 诃黎勒一两(面裹,火炮,去皮) 吴茱萸(汤洗,焙干,炒) 防风(去叉) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 芎藭 苍术(米泔浸一宿,切,焙) 藿香叶 独活(去芦头)各一分 石硫黄一两(别研)

【用法】上药除硫黄外,为细末,同拌匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。三十丸,空心米汤送下。

【主治】脾胃虚弱,肌体羸瘦。

33813 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】肉豆蔻(去壳) 木香 桂(去粗皮) 沉香(镑) 益智子(去皮) 革澄茄 胡椒 青橘皮(汤浸去白,焙) 附子(炮裂去皮脐)各等分

【用法】上为末,用木瓜一枚,切盖去子,纳硃砂一两飞过者,饭上蒸熟,研如膏,后拌诸药,如干,更入炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心、临卧温酒送下。

【主治】膈气痰结,不入饮食。

33814 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】肉豆蔻(去核)半两(面裹煨,锉) 半夏三分(与茱萸半两同用水一升,慢火煮干,只用半夏,焙干) 巴豆七枚(去

皮心膜，研出油)

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，食后茶、酒任下。

【主治】留饮宿食不消。

33815 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻五枚(去壳) 木香一分 蝎稍(炒)一钱 陈橘皮(去白焙) 附子(炮裂去皮脐) 干姜(炮) 胡椒各半两

【用法】上为末，面糊为丸，如豌豆大。每服十五丸，食前米饮送下。

【主治】脾胃虚寒，洞泄注下，腹胀肠鸣。

33816 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】肉豆蔻一两 陈米一两半 椋子一两

【用法】上药前二味为粗散，同米拌令匀，同炒黄色去米，一分单炒，一分生用，同焙，捣为末，研粟米粥和捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温陈米饮送下。一二服效。

【主治】血痢久不差，脐腹刺痛。

33817 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】肉豆蔻仁 人参 陈橘皮(汤浸去白，炒)各一两 木香 槟榔(煨，锉) 赤芍药 柴胡(去苗) 枳壳(去瓢，麸炒)各一两半 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙令烟尽) 桂(去粗皮) 高良姜各三分 吴茱萸(汤洗，焙干，炒黄)半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，日晚再服。

【主治】久患脚气，腹胀膝肿。

33818 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】肉豆蔻(去皮)一枚 生姜(切，焙干)一钱 木香一钱 人参一分 青橘皮(汤浸，去白，焙)一分 白术一分

【用法】上为末，白面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，米饮送下，不拘时服。

【主治】小儿胃虚，不思乳食，嘔逆膈闷。

33819 肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】肉豆蔻(去壳) 木香 诃黎勒(炮去核)各三钱 密陀僧一钱 人参 白茯苓(去黑皮)各一分

【用法】上为细末，用烧粟米饭为丸，如绿豆大。每服七丸，温米饮送下。

【主治】小儿下痢脓血，腹痛虚烦。

33820 肉豆蔻丸

【方源】《幼幼新书》卷二十七引相湾方。

【组成】肉豆蔻(面裹，煨令香熟为度，去面不用)半两 丁香一钱

【用法】上为末，水煮白面糊为丸，如芥子大。每服三五丸，浓煎藿香柿蒂汤送下便止。如大小患吐，加丸数，亦如此汤使服之。如渴，以所煎汤作熟水饮之。

【主治】小儿胃冷呕吐不止。

33821 肉豆蔻丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】肉豆蔻 赤石脂 钟乳粉 石斛 干姜 附子 椒 当归 茯苓 龙骨 人参 各一两 诃子皮 桂各二两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下。

【功用】逐寒，渗湿，补虚，止痢。

【主治】脾胃俱虚，寒湿气胜，心腹绞痛，胁肋牵痛，手足厥，身冷，胃哽呕吐，不思饮食，无力怠惰，嗜卧，滑泄频数，米谷完出，久痢滑肠或变脓血，腹痛肠鸣，里急后重。

33822 肉豆蔻丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】肉豆蔻 槟榔 轻粉各一分 黑牵牛一两半(取头末)

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服十丸至二十丸，食后，煎连翘汤送下，日三服。

【主治】水湿胀如鼓，不食者病可下。

33823 肉豆蔻丸

【方源】《洁古家珍》卷八。

【组成】破故纸 肉豆蔻(面裹煨)各等分

【用法】上为末,枣肉为丸,如梧桐子大。空心米饮送下。

【主治】肾泄久不愈,脉沉细无力者。

【备考】本方方名,《医学纲目》引作“肉蔻丸”。

33824 肉豆蔻丸

【方源】《局方》卷三(吴直阁增诸家名方)。

【组成】诃黎勒皮 龙骨 木香各三分 丁香三两 肉豆蔻仁 缩砂仁各一两 赤石脂 白矾灰各半两(枯)

【用法】上为末,粟米饮为丸,如梧桐子大。每服二十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】气泻,脾胃气虚弱,饮食减少。

33825 肉豆蔻丸

【方源】《小儿痘疹方论》。

【异名】七味肉豆蔻丸。

【组成】木香半两 缩砂仁二钱 白龙骨半两 诃子肉半两 赤石脂七钱半 枯白矾七钱半 肉豆蔻半两

【用法】上为细末,稠面糊为丸,如黍米大。一周岁儿,每服三五十丸;三岁儿服一百丸,温米饮送下。泻甚者,煎木香散或异功散送下。泻止住服,不止多服。

【主治】①《小儿痘疹方论》:泻水谷,或白或淡黄,不能止者。②《普济方》:痘疮已出,泄泻发渴,水谷不化,或泻或涩,或泻淡黄色,致令疮痘难出难靥。非特痘疮一证,其余脏寒泄痢,尤宜服之。

【方论选录】①《小儿痘疹方论》:薛己已校注:本方治阳气虚寒,肠滑泄泻之涩剂。盖肾主大便,若因肾气不固而致前症者,宜用木香散送四神丸,如不应,急煎六君子汤送四神丸补之。豆蔻丸涩滞之功多,补益之功少也。②《医方考》:痘至七八日,瀰脓起胀之时也;若大泻而虚其中,则痘必陷下而不可为矣。然有湿有泻,有滑有泻,有积有泻。湿面泻者,宜燥之,枯矾、石脂是也;滑而

泻者,宜涩之,龙骨、诃子是也;积面泻者,宜消之,豆蔻、砂仁是也。乃木香者,调其滞气,和其腹中而已。

【备考】方中木香用量原缺,据《普济方》补。

33826 肉豆蔻丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】肉豆蔻(面裹煨) 黑附子(炮,去皮脐) 川姜(炮) 桂(去粗皮) 硫黄(研) 白术(炒) 当归(去芦头) 诃子皮各一两 川乌头(炮,去皮脐) 红豆蔻各半两

【用法】上为细末,醋面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心食前米饮送下。

【主治】肠虚胃弱,停积风冷,大便泄泻,水谷不化,腹胁胀痛,下痢脓血,遍数频并,里急后重,呕逆恶心,肢体困倦,饮食减少。

33827 肉豆蔻丸

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】肉豆蔻(去壳)一枚 诃黎勒(炮,去核) 三枚 黄连(去须)一钱 赤石脂(细研)一钱 木香一分 蟾头(生姜汁炙)一枚

【用法】上为末,蜗牛肉研为丸,如黍米大,焙干。每服三丸至五丸,食前粥饮送下。

【主治】小儿疳痢。

33828 肉豆蔻丸

《景岳全书》卷五十八。即《局方》卷六(吴直阁增诸家名方)“肉豆蔻散”改为丸剂。见该条。

33829 肉豆蔻丸

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】肉果一钱半 诃子(面煨)七钱半 木香二钱 枯矾七钱半 白龙骨(煨)三钱 赤石脂(煨)三钱 砂仁三钱 白扁豆(炒去壳)五钱 猪苓五钱(去皮) 山楂肉二钱 泽泻(煨,去皮)五钱 厚朴(姜汁炒)一钱 白豆蔻(炒)二钱

【用法】用糕粉打糊为丸,如弹子大。每服

一丸，饭饮化下。寒战咬牙者，用肉桂、丁香各五分，川椒三十粒，姜一片，人参一钱煎汤一小盏，磨化服下，凡有泻多须用之；如粪中有冻胶样者，乃寒积毒下也，名曰痘后痢，不可用前药煎汤送下，宜分利，用木通、甘草、滑石、蒿子、炒香煎汤送下，如有红者，可只将泽兰捣汁，蜜和送下。

【主治】痘疮泄泻。

33830 肉豆蔻丹

【方源】《普济方》卷三八〇引《医方妙选》。

【组成】肉豆蔻 使君子 青橘皮（炒黄）各一两 牵牛（炒）一分 芦荟（研）一分 麝香一钱

【用法】上为末，糯米饭为丸，如黍米大。每服十丸，食后生姜汤送下，量儿大小加减。

【主治】①《普济方》《医方妙选》：肌瘦挟积。②《卫生总微》：小儿脾疳，因不知饥饱，积滞内停，腹大脚细，下利无度。

33831 肉豆蔻丹

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】木香 肉豆蔻各一两 青橘皮半两（炒黄） 黑牵牛一分（炒）

【用法】上为细末，滴水为丸，如黍米大。每服十丸，食前米饮送下。

【主治】小儿泄泻，水谷不消。

33832 肉豆蔻方

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】肉豆蔻散（《普济方》卷三九五）。

【组成】肉豆蔻一分（去壳） 藿香半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿霍乱不止。

33833 肉豆蔻汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】肉豆蔻一个 石莲肉（炒） 茴香各一分 丁香半分 生姜 人参各二分 枇杷叶五片（拭去毛，炙）

【用法】上咬咀。水三升，煎至一升半。分

四服，空心暖饮之。

【主治】伤寒后咳噎。

33834 肉豆蔻汤

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷二十六。

【组成】肉豆蔻仁 高良姜（炒） 枇杷叶（拭去毛，炙）各半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 桂（去粗皮） 各一两 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，大枣一个，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】伤寒后霍乱，吐泻不止，及脚转筋。

【备考】本方方名，原书（文瑞楼本）作“豆蔻汤”。

33835 肉豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】肉豆蔻（去壳）半两 人参二两 桂（去粗皮） 吴茱萸（汤洗净，炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，人生姜三片，水一盞，煎至六分，去滓温服。

【主治】霍乱转筋。

33836 肉豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】肉豆蔻（去壳） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空心、日午温服。

【主治】冷痢。

33837 肉豆蔻汤

【方源】《洪氏集验方》卷三引景卢方。

【组成】肉豆蔻（炮） 草果子（去皮） 石菖蒲 干木瓜 良姜 干姜 厚朴（姜炙） 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服一钱，盐汤点下。

【主治】胸膈痞塞不快，脾胃有伤。

33838 肉豆蔻饮

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】肉豆蔻（炮去壳）四枚 高良姜 白芷 人参 赤茯苓（去黑皮） 槟榔（锉）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，薤白三寸，切，煎至一盞，去滓，空腹温服，如人行五里再服。

【主治】反胃，饮食入口即吐。

33839 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】肉豆蔻三枚（去壳） 白术半两 木香半两 半夏半两（汤浸七遍去滑） 丁香半两 青橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 蓬莪术半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 芎藭半两 甘草一分（炙微赤，銼） 当归三分（銼，微炒） 桂心半两 干姜半两（炮裂，銼） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盞，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】脾脏冷气，时攻心腹疼痛，面色青黄，常多呕逆，四肢虚乏。

33840 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】肉豆蔻三枚（去壳，以大麦面用水和如饼剂子，裹豆蔻于灰火内煨，面黄熟为度，放冷取出豆蔻，别研为末） 黄连半两（去须） 木香半两

【用法】上药除豆蔻外，为散。每服二钱，以水一中盞，煎至五分，去滓。调下豆蔻末一钱，不拘时候。

【主治】虚劳久痢，腹内疼痛不可忍者。

33841 肉豆蔻散

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇一。

【组成】肉豆蔻（去壳） 人参（去芦头） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一大盞，加生姜半分，粟米二撮，煎至五分，去滓温服不拘时候。

【主治】霍乱，呕吐不止。

33842 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】肉豆蔻半两（去壳） 白术半两 高良姜三分（炙） 桂心半两 甘草一分（炙微赤，銼） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服。不计时候。

【主治】霍乱吐泻不止，冷气入脾胃，攻心腹切痛。

【备考】本方原名“肉豆蔻丸”，与剂型不符，据《普济方》改。

33843 肉豆蔻散

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷三十六。

【组成】肉豆蔻五钱（去壳） 胡椒 茱萸 各一两 甘草三分（炙微赤，銼）

【用法】上为细散。每服一钱，水一中盞，煎五分，加羊乳半合，不拘时候温服。

【主治】反胃，呕啰吐食。

33844 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】肉豆蔻三分（去壳） 茱萸二两 高良姜一两（銼） 桂心半两 木香一两 白术一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桃仁一两（汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄） 厚朴四两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散，用生姜一斤，细切相拌，更捣作丸，以面裹灰火中煨令通熟，去面候干，捣细罗为散。每服一钱，煮枣粥饮调下，不拘时候。

【主治】痼气，胃中寒，不思食。

33845 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】肉豆蔻一两（去壳） 木香一两 甘草半两（炙微赤，銼） 干姜一两（炮裂，銼） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

熟)

【用法】上为散。每服三钱，用水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】水谷痢，心腹胀满，不能饮食。

33846 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】肉豆蔻一两(去壳) 厚朴三两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 甘草半两(炙微赤，锉) 诃黎勒一两半(煨，用皮) 干姜一两(炮裂，锉) 陈橘皮一两(汤浸去白瓢，焙)

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】白痢，心腹胀满，不能饮食。

33847 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】肉豆蔻一两(去壳) 鹿角屑一两(用酥炒令焦) 定粉二分(炒令黄色) 密陀僧三分(烧黄，细研)

【用法】上为细散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】久赤白痢。

33848 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】肉豆蔻(去壳) 槟榔 人参(去芦头) 桂心各半两

【用法】上为细散。以粥饮调下，每服一钱，不拘时候。

【主治】产后心腹疼痛，呕吐清水，不下饮食。

33849 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】肉豆蔻一分(去壳) 人参一分(去芦头) 藿香一分 白茯苓一分 厚朴半两(去皱皮，涂生姜汁炙令香熟) 白术一分 干姜半两(炮裂，锉) 诃黎勒半两(煨，用皮) 木香一分 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿胸中有寒，乳哺不消，腹中痞满，气逆不能乳食。

33850 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】肉豆蔻一枚(去壳) 丁香半两 桂心半两 人参半两(去芦头) 白茯苓半两 枇杷叶半两(拭去毛，炙微黄) 黄耆半两 陈橘皮一分(汤浸，去白瓢，焙) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。一岁儿每服半钱，用温水调下。

【主治】小儿霍乱，吐泻不止，饮食不下。

33851 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】肉豆蔻一分(去壳) 桂心一分 人参半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，煎至五分，去滓，量儿大小，分减温服，不拘时候。

【主治】小儿霍乱，吐泻不止，腹痛。

33852 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】肉豆蔻一枚(去壳) 川大黄一分(锉碎，微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。更量儿大小，以意加減。

【主治】小儿宿食不消。

33853 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】肉豆蔻三分(去壳) 青橘皮半两(汤浸，去白瓢，焙) 当归半两(锉，微炒) 黄牛角觔半两(炙令微焦) 厚朴半两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 地榆半两(微炙，锉) 黄连半两(去须，微炒) 干姜一分(炮裂，锉)

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿久赤白痢，腹内疔痛，全不思食，渐至困羸。

33854 肉豆蔻散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】肉豆蔻一分（去壳） 干姜一分（炮裂，锉） 厚朴一分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 朱砂一分（细研） 龙骨一分 诃黎勒一分（煨，用皮） 茅香一分（锉） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为细散。每服半钱，以温浆水调下，一日三四次，量儿大小，加减服之。

【主治】小儿囊痢不止，腹痛。

33855 肉豆蔻散

【方源】《普济方》卷二一一引《圣惠》。

【异名】豆蔻散（《圣济总录》卷七十六）。

【组成】肉豆蔻一分 诃黎勒二分

【用法】上为散。每服二钱，米饮调下。未效再用一两服。

【主治】赤白痢不止，水泻。

33856 肉豆蔻散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】肉豆蔻仁半两（面裹，火煨熟） 黑附子半两（去皮脐，盐炒） 缩砂半两（去皮） 木香半分

【用法】上为散。每服一钱，空心、食前米饮调下。

【主治】脾脏气不和，多痰逆，饮食无味，腹胁疼痛，大肠虚滑。

33857 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】肉豆蔻（去壳，面裹煨令黄） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心陈米饮调下。

【主治】脾胃虚冷，泄利水谷，两胁气胀，饮食无味，稍食即壅。

33858 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】肉豆蔻仁 枳壳（去瓤，麸炒）各三分 羌薺（炒）二两 吴茱萸（汤洗，焙） 木香各半两 高良姜一两 生姜（并皮用）一斤

【用法】上锉，如麻豆大，拌匀，面裹煨令香熟，去面取药，捣罗为散。每服二钱匕，冷生姜茶清调下。

【主治】痼气，胃中寒癖，不思食。

33859 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻（去壳，为末）一两 生姜（汁）二合 白面二两

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心米饮调下，日午再服。

【主治】水泻无度，肠鸣腹痛；产后冷泻不止。

33860 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】肉豆蔻（去壳，炮） 黄连（去须，炒） 诃黎勒（炮，去核）各三分 甘草（炙，锉） 白术 干姜（炮） 赤茯苓（去黑皮）各半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心、食前米饮调下，一日三服。

【主治】①《圣济总录》：肠胃受湿，濡泻不止。②《普济方》：暴泻。

33861 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】肉豆蔻（一半生，一半炮） 诃黎勒皮（一半生，一半煨） 木香（一半生，一半炮）各一两 白术（锉，炒）三分 甘草（锉，一半生，一半炙） 茱萸 干姜（炮）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下。

【主治】气痢腹胀，不下食。

33862 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】肉豆蔻十枚(大者,去壳,用白面作面饼子裹,文武火煨令黄色,去面) 草豆蔻十枚(去皮,白面裹,文武火煨令黄色,去面用) 木香一两 诃黎勒二十枚(十枚炮过,熟为度,十枚生,俱去核) 甘草一分(蜜炙)

【用法】上为散。每服二钱匕,食前米饮调下。

【主治】妊娠下痢,不可疗者,及丈夫脾虚泄泻。

33863 肉豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】肉豆蔻二枚(去壳) 当归(锉,焙) 蜜陀僧(研) 诃黎勒(煨,去核) 黄连(去须) 枳壳(去瓢,麸炒) 各一分 龙骨半分 干姜(炮裂) 半两

【用法】上为散。每服半钱匕,空心米饮调下,随儿大小,以意加減。

【主治】小儿脓血痢。

33864 肉豆蔻散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引丁时发方。

【异名】白豆蔻散(《普济方》卷三九四)。

【组成】白豆蔻 肉豆蔻 甘草(炙) 芎藭 陈皮(去白) 枇杷叶(去毛,炙) 各一分 黄耆(炙) 干木瓜 人参各半两

【用法】上为末。每服一钱,水五分,加生姜、大枣,同煎三分,去滓服。

【主治】小儿脾胃不和,憎寒壮热,腹痛呕吐,不纳乳食。

33865 肉豆蔻散

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《张氏家传》。

【组成】肉豆蔻 大诃子肉 青皮 附子(炮,去皮) 厚朴(姜制过,炒熟) 各半两

【用法】上为末。每服量儿大小加減,空心粥饮调下。

【主治】泻痢。

33866 肉豆蔻散

【方源】《洪氏集验方》卷一引韩子温方。

【组成】肉豆蔻(切片子,炒黄色) 罂粟壳(捣碎,用蜜诺,拌匀,炒黄黑) 甘草(切碎,炒黄黑色) 干生姜(切细,炒黄黑) 各等分

【用法】上为末,每服六钱,用水二大盏,煎至一盏半,不拘时候服。却将二次滓再煎服,无不愈者。

【主治】赤白痢,无药可治者,或上吐下痢。

【加減】如赤痢,多加甘草一寸(炙黄)同煎;若白痢,多加炒生姜一块,同煎。

33867 肉豆蔻散

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【异名】肉蔻散(《直指》卷十三)。

【组成】肉豆蔻一枚(剉小窍子,更入乳香三小块在内)

【用法】上以面裹煨,面熟为度,去面碾为细末。每服一钱,小儿半钱,米饮调下。

【主治】脾虚泄泻,肠鸣不食。

33868 肉豆蔻散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】诃子四个 木香一钱 肉豆蔻六个(用面煨香熟,去面,只用肉豆蔻)

【用法】上为细末。每服二钱,空心食前,陈米饮调下,一日三次。

【主治】赤白痢。

33869 肉豆蔻散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】肉豆蔻(面裹煨) 白枯矾各一两

【用法】上为末。每服一钱或半钱,空心温米饮调下。

【主治】胃寒下泻。

33870 肉豆蔻散

【方源】《局方》卷六(吴直阁增诸家名方)。

【组成】苍术(米泔浸一宿,去皮,焙) 八两 茴香(炒) 肉桂(去粗皮) 川乌(炮,去皮脐) 诃子皮各二两 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,姜炒) 陈皮(去白) 肉豆蔻(面裹煨) 甘草(燉) 各四两

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜二片，枣子一个，煎七分，温服。

【主治】脾胃气虚，腹胁胀满，水谷不消，脏腑滑泻，腹内虚鸣，困倦少力，口苦舌干，不思饮食，日渐瘦弱。

【备考】本方改为丸剂，名“肉豆蔻丸”见《景岳全书》。

33871 肉豆蔻散

《普济方》卷二一一。即《圣惠》卷五十九“肉豆蔻散子”。见该条。

33872 肉豆蔻散

《普济方》卷三九五。为《圣惠》卷八十四“肉豆蔻方”之异名。见该条。

33873 肉豆蔻散

【方源】《奇效良方》卷十四。

【组成】肉豆蔻七枚（每一枚剉一窍，纳木香一粒在内，以面裹炖熟，去面不用）

【用法】上为末。分作二服，用米饮汤调下，不拘时候。

【主治】脾虚肠鸣，泄泻不食。

33874 肉豆蔻膏

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】肉豆蔻二钱（锉） 人参一钱 白术二钱 甘草一钱 丁香一钱（不见火） 木香一钱（不见火） 藿香五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，空心、奶前米饮送下。

【主治】小儿挟惊，大便清泻，腹疼不稳。

33875 肉苁蓉丸

【方源】《医心方》卷二十八（《范汪方》）。

【组成】肉苁蓉 菟丝子 蛇床子 五味子 远志 续断 杜仲各四分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。平旦服五丸，一日二次。

【功用】补精，益气力，令人好颜色。

【主治】男子五劳七伤，阳痿不起，积有十年痒湿，小便淋沥，潮时赤时黄。

【加减】阴弱，加蛇床子；不怒，加远志；少精，加五味子；欲令洪大，加苁蓉；腰痛，加杜仲；欲长，加续断；所加者倍之。

33876 肉苁蓉丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一四。

【异名】补肾丸（《三因》卷十六）、羊肾丸（《得效》卷十）。

【组成】山茱萸 干姜 巴戟天 芍药 泽泻 桂心 菟丝子 黄耆 干地黄 远志 蛇床子 石斛 当归 细辛 苁蓉 牡丹 人参 甘草 附子各二两 菖蒲一两 羊肾二枚 防风一两半 茯苓三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至三四十丸。食后服，一日三次。

【功用】补肾，利九窍。

【主治】①《千金》：劳聋、气聋、风聋、虚聋、毒聋、久聋、耳鸣属肾虚者。②《三因》：肾虚耳聋，或劳顿伤气，中风虚损，肾气升而不降，致耳内虚鸣。

【方论选录】①《医方考》：味之甘者，可以补虚，亦可以却劳。人参、黄耆、羊肾、山茱萸、干地黄、菟丝子、巴戟、苁蓉、泽泻、芍药、当归、茯苓、甘草，均味甘之品也，能疗虚聋、劳聋。味之辛者，可以驱风，亦可以顺气，防风、细辛、菖蒲、远志、丹皮、石斛，均味辛之品也，能疗气聋、风聋。性之毒者，可以开结毒，亦可以疗久痹，蛇床、桂心、附子、干姜，均之辛温微毒之品也，能疗毒聋、久聋。②《千金方衍义》：诸聋总不出肾虚而为湿热痰火所袭，故专温补利窍，则诸聋悉宜。其防风一味，昔人所谓鸟在高巅，惟射以取之也。

33877 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皴皮，炙令干） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 熟地黄一两 黄耆一两（锉） 巴戟一两 防风三分（去芦头） 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 五味子一两 菖蒲一两 山茱萸一两 牛膝一两（去苗） 附

子一两(炮裂,去皮脐) 泽泻一两 干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒送下。晚食前再服,渐加至五十丸。

【主治】肾脏风虚,耳内常鸣。

33878 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 鹿茸二两(去毛,涂酥炙微黄) 白龙骨二两(烧过) 泽泻一两 附子二两(炮裂,去皮脐) 补骨脂一两(微炒) 山茱萸一两 椒红二两(微炒) 菟丝子一两(酒浸三宿,晒干,别研为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前,以温酒送下。

【主治】膀胱虚冷,小便滑数,白浊,梦中失精。

33879 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】肉苁蓉三两(酒浸一宿,刮去皱皮炙干) 赤石脂三分 石韦三分(拭去毛) 天雄一两(炮裂,去皮脐) 远志三分(去心) 石菖蒲三分 薯蓣二两 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 山茱萸一两 白马茎一两(炙黄) 石斛一两(去根,锉) 柏子仁三分 续断一两 牛膝一两(去苗) 蛇床子三分 石南一两 细辛三分 防风三分(去芦头) 菟丝子一两半(酒浸三宿,别捣为末) 熟干地黄一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹及晚食前以温酒送下。

【主治】五劳六极七伤,阴萎内虚,口干汗出,失精,阴下湿痒,小便赤黄,阴中疼痛,卵偏大,小腹里急,腰脊俯仰苦难,胫胫痠疼,目视眈眈,腹胁胀满,膀胱久冷,致生百疾。

33880 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 石斛一两(去根,锉) 麋角胶二两(以酥拌,微炒) 枸杞子二两(微炒) 远志一两(去心) 续断一两 熟干地黄三两天雄二两(炮裂,去皮脐) 干姜一两(炮裂,锉) 菟丝子二两(酒浸一宿,晒干,别捣罗,为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹及晚食前以温酒或炒盐汤送下。

【功用】补益精血。

【主治】虚损。

33881 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮炙令干) 熟干地黄二两 钟乳粉一两 五味子三分 龙骨三分 山茱萸三分 车前子一两 桂心三分 人参三分(去芦头) 牛膝一两(去苗) 枸杞子三分 远志三分(去苗) 白茯苓一两 黄耆三分(锉) 杜仲一两半(去粗皮,微炙,锉) 防风三分(去芦头) 薯蓣三分 石菖蒲三分 附子一两(炮裂,去皮脐) 石斛一两(去根,锉) 菟丝子二两(酒浸三日,焙干,别捣为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳,肾气不足,梦交,心多忪悸,头目昏闷,四肢少力,不欲饮食。

33882 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 菟丝子(酒浸三日,晒干,别捣为末) 薯蓣 牛膝(去苗) 巴戟 杜仲(去粗皮,炙微黄) 续断 白茯苓 枸杞子 五味子 蛇床子 山茱萸各一两 茯神 远志(去心) 柏子仁各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹以温酒送下,晚食前再服。

【主治】虚劳羸瘦，心神健忘，腰膝多疼，脏腑气虚，阳事衰绝。

33883 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮炙干） 薯蓣一两 巴戟一两 车前子一两 黄耆一两（锉） 覆盆子一两 菟丝子一两半（酒浸二宿，晒干，别捣为末） 山茱萸一两 熟干地黄一两 人参一两（去芦头） 牛膝一两（去苗） 续断一两 犀角屑半两 甘菊花一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】虚劳，目睛远视无力，四肢乏力。

【宜忌】忌生冷、油腻、热面。

33884 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 磁石（烧醋淬七遍，细研，水飞过） 神曲（炒微黄） 青盐各一两 雀儿十个（去毛嘴爪翅足，存肠胃去骨，烂研） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】上为末，以好酒二升，入少炼熟蜜，入雀肉及盐，研令极烂成膏，和诸药为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】眼昏，翳赤涩，远视似有黑花，及内障不见物。

33885 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 菖蒲一两 磁石一两（烧令赤，醋淬七遍，捣碎研，水飞过） 附子一两（炮裂，去皮脐） 巴戟一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，捣为末） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄） 石斛一两（去根，锉） 桂心一两半 桑螵蛸半两（微炒） 杜仲一两（去皱皮，炙微黄，锉） 牡蛎粉一两 补骨脂一两（微炒） 熟干地黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，晚食前再服。

【主治】劳聋，肾气虚损，腰脚无力，面黑体瘦，小便滑数。

33886 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】苁蓉丸（《鸡峰》卷十九）。

【组成】肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 熟干地黄一两半 麦门冬二两（去心，焙） 泽泻半两 五味子半两 桂心半两 巴戟半两 地骨皮三分 当归半两 磁石一两（烧醋淬七遍，捣碎，研如粉） 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 鸡肫脰一两（微炒） 赤石脂半两 韭子半两 白龙骨半两 甘草半两（炙微赤，锉） 禹余粮三分（烧醋淬三遍，研如粉） 牡丹半两 桑螵蛸一两半（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】痼肾，小便滑数，四肢羸瘦，脚膝乏力。

33887 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】苁蓉丸。

【组成】肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 远志一两（去心） 巴戟一两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 五味子一两 桂心一两 蛇床子一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 山茱萸一两 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，渐加至四十丸。

【主治】肾脏虚惫，膀胱久冷，腰膝疼重，筋力衰弱。

33888 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】苁蓉丸（《普济方》卷二二〇引）

《圣济总录》)

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 熟干地黄一两 钟乳粉一两 天雄一两(炮裂,去皮脐) 天门冬一两半(去心,焙) 五味子一两 桂心一两 人参一两(去芦头) 干姜一两半(炮裂,锉) 白术一两 远志一两 杜仲一两(去粗皮,炙微赤,锉) 巴戟一两 牛膝一两(去苗) 山茱萸一两 覆盆子一两 甘草半两(炙微赤,锉) 川椒一两(去目及闭口者,微炒去汗) 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别捣为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒送下。

【功用】驻颜,益髭发,补神益气。

【主治】下元久冷,水脏伤惫,风虚劳损,不思饮食。

33889 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 附子一两(炮裂,去皮脐) 巴戟一两 茴香子一两 石斛一两(去根,锉) 补骨脂一两 桂心一两 川椒三分(去目及闭口者,微炒去汗) 麝茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 木香三分 牛膝一两(去苗) 五味子一两 泽泻一两 槟榔一两 丁香三分 黄耆三分(锉) 熟干地黄一两 人参三分(去芦头) 诃黎勒皮三分 山茱萸三分 白术三分 干姜三分(炮裂,锉) 朱砂一两(细研,水飞过) 麝香半两(细研)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒送下。

【功用】暖水脏,壮筋骨,益精气,利腰脚,聪耳明目,强志倍力,悦泽颜色,充益肌肤。

33890 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 蛇床子 远志(去心) 五味子 防

风(去芦头) 附子(炮裂,去皮脐) 菟丝子(酒浸三日,晒干,别捣为末) 巴戟 杜仲(去粗皮,炙微黄,锉) 各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心以温酒送下,盐汤送下亦得,渐加至四十丸为度。

【功用】暖下元,益精髓,利腰膝。

【主治】虚损。

33891 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】肉苁蓉(酒浸,切,焙)一两 獭肝一具(涂酥炙,切) 柴胡(去苗) 秦艽(去苗土) 各三分 巴戟天(去心) 黄耆(锉) 各一两 人参半两 白茯苓(去黑皮) 三分 熟干地黄(切,焙) 半两 泽泻 附子(炮裂,去皮脐) 各三分 远志(去心) 一两 山芋 蒺藜子(炒,去角) 各半两 石斛(去根) 三分 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 五味子 桂(去粗皮) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒,别研) 丁香 木香 各半两 当归(切,焙) 三分 芍药 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 赤石脂 槟榔 白术 干姜(炮) 郁李仁(汤浸,去皮尖,炒,研) 甘草(炙,锉) 牡丹皮 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗) 山茱萸 芎藭 牡蛎(炒) 各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒送下,一日三次,不拘时候。

【功用】补骨髓。

【主治】寒湿骨痹。

33892 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】肉苁蓉(酒浸,切,焙) 山芋 熟干地黄(焙) 各三两 菟丝子(酒浸,别捣) 五味子 杜仲(去粗皮,炙,锉) 泽泻 覆盆子 山茱萸 远志(去心) 续断 桂(去粗皮) 附子(炮裂,去皮脐) 甘草(炙,锉) 白茯苓(去黑皮) 石斛

(去根) 鹿茸(去毛, 酥炙) 人参 蛇床子 巴戟天(去心) 各一两半

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心、日午、夜卧温酒送下。

【主治】痼病, 筋脉相引; 及五劳七伤, 小便数, 腰疼, 久立不得, 坐即脚痹, 腹肚不安。

33893 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿, 切, 焙) 石斛(去根) 磁石(火煨, 醋淬二七遍) 鹿茸(酥炙) 桂(去粗皮) 巴戟天(去心) 杜仲(锉, 炒尽丝) 木香 覆盆子(去茎) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸至三十丸, 温酒送下, 盐汤亦得, 空心、日午、临卧各一次

【主治】肾气虚损, 羸瘦, 饮食不为肌肤, 骨痿无力, 腰脚痠痛。

33894 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】肉苁蓉(去皱皮, 酒炙) 附子(炮裂, 去皮脐) 白茯苓(炒去角) 桑螵蛸(炒) 各二两 五味子(炒) 龙骨(研) 各一两 黄耆(锉, 炒) 菟丝粉 石斛(去根) 各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心以盐汤送下。

【主治】痼肾, 肾脏虚损, 小便多, 骸胫无力, 日渐羸瘦。

33895 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】肉苁蓉(去皱皮, 酒浸, 切, 焙) 泽泻 五味子 巴戟天(去心) 当归(切, 焙) 地骨皮各一两 磁石(煨, 醋淬七遍) 人参 赤石脂各一两半 韭子(炒) 白龙骨 甘草(炙, 锉) 牡丹皮各一两 熟干地黄(焙) 一两 禹余粮(煨) 三分 桑螵蛸(炙) 四十枚

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 用牛乳送下, 一日三次。

【主治】消渴, 尿脂小便如泔。

33896 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿, 切, 焙) 二两 泽泻 熟干地黄(焙) 五味子 巴戟天(去心) 地骨皮 人参 栝楼根 韭子(炒) 甘草(炙, 锉) 牡丹皮各一两 桑螵蛸(炙) 三十枚 赤石脂(研) 磁石(煨, 醋淬二七遍, 研) 龙骨 禹余粮(煨, 醋淬二七遍, 研) 各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 牛乳汁送下。

【主治】消中虚极, 小便无度。

33897 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】肉苁蓉(去皱皮, 酒浸, 炙令干) 白术 龙骨 牡蛎(熬) 杜仲(去粗皮, 涂酥炙) 胡桃肉(别研) 各三分 附子(炮裂, 去皮脐) 巴戟天(去心) 远志(去心) 丁香 鹿角胶(炙令燥) 各半两 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 生用, 别研) 一两

【用法】上十味为末, 入研杏仁、胡桃肉, 再研令匀, 以煮熟枣肉及熟蜜, 砂盆内研如面糊, 和药为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空腹米饮下。

【主治】肺劳虚损, 咳嗽唾血, 下焦冷惫, 腹肋疼痛。

33898 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】肉苁蓉(酒浸, 切, 焙) 一两 巴戟天(去心) 石斛(去根) 各半两 牛膝(酒浸, 切, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 羌活(去芦头) 各一两 栝楼(炒) 远志(去心) 萆薢 独活(去芦头) 枳壳(去瓢, 麸炒) 黄耆(锉) 各半两 熟干地黄(焙) 当归(切, 焙) 各一两 海桐皮(锉) 一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮或温酒任下。

【主治】肾劳，心忪乏力，夜多梦泄、肌瘦发热，口内生疮，脐腹冷痛。

33899 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 磁石（煨，醋淬） 威灵仙（去土）各一两 槟榔三枚（炮，锉） 肉豆蔻（去壳） 木香桂（去粗皮） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 牛膝（酒浸一宿，切，焙） 远志（去心） 黄耆（锉） 补骨脂（炒） 茴香子（炒） 硃砂（别研） 附子（炮裂，去皮脐）各半两 生姜二两（切，焙） 沉香一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、食前温酒送下。

【主治】元脏气虚，脐腹紧痛，腰脚少力，行步艰难，面黄肌瘦，耳内虚鸣，精神不爽。

33900 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】肉苁蓉（去皴皮，酒浸，切，焙） 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉） 泽泻 牡蛎（火煨，研） 五味子 龙骨 当归（切，焙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，空心，日午、临卧各一次。

【主治】蛊病。少腹冤热而痛，便溺出白。

33901 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 鹿茸（去毛，酥炙） 附子（炮裂，去皮脐）各二两 草薢 龙骨（煨，醋淬） 山茱萸各一两 补骨脂（炒）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心，食前姜汤送下。

【主治】膀胱久冷，小便数，泄精不止。

33902 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 熟干地黄（焙） 山芋 石斛（去根） 牛膝（酒浸，切，焙） 桂（去粗皮）各半两 黄耆（锉） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 黄连（去须）三分 甘草（炙） 细辛（去苗叶）各一分 槟榔（锉）五枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，盐酒送下，不拘时候。

【主治】冷淋。

33903 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 菟丝子（酒浸，别捣） 白茯苓（去黑皮） 山芋 人参 熟干地黄（切，焙） 桂（去粗皮） 防风（去叉） 芍药（锉） 黄耆（锉）各半两 羊肾一对（薄批去筋膜，炙干） 附子（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头） 泽泻（锉）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】肾虚耳聋。

33904 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 石斛（去根） 白术 五味子 桂（去粗皮） 巴戟天（去心） 防风（去叉） 人参各二两 白茯苓（去黑皮） 泽泻 山茱萸各三两 熟干地黄（焙） 磁石（煨，醋淬七遍）各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心，食前温酒送下。

【主治】男子患耳内虚鸣，腰肾疼痛，髀膝风冷，食饮无味。

33905 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 熟干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮）各一两 人参半两 菟丝子（酒浸，别捣为末）一两半 白

石英 五味子 乌贼鱼骨(去甲)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,温酒或米饮任下,空心,日午夜、卧各一次。

【主治】妇人胸胁支满,闻腥臊气,唾血目眩,不进饮食,泄血不已,日久使血枯燥。

33906 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】肉苁蓉二斤(酒浸三日,细切,焙干)

【用法】上为末。分一半醇酒煮作膏,和一半入白中为丸,如梧桐子大。每服二十丸加至三十丸,空心食前温酒或米饮任下。

【主治】下部虚损,腹内疼痛,不喜饮食。

33907 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】肉苁蓉(酒浸,切,焙) 牛膝(去苗,酒浸一宿,切,焙) 葫芦巴(炒) 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗) 楝实(去核,炒) 茴香子(炒)各一两 青盐(炒,研)半两

【用法】上为细末,用猪肾一只,去筋膜细切,将浸药酒煮熟,研烂,入前药末和匀为丸,如梧桐子大。每服二十丸,稍加至三十丸,空心温酒送下。

【功用】补元气,壮筋骨,益精驻颜。

33908 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿,切,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 牛膝(去苗,酒浸一宿,切,焙) 菟丝子(酒浸二宿,别捣末)各一两 鹿茸(酥微炙,去毛)半两

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,盐汤或酒任下。

【功用】补壮筋骨。

33909 肉苁蓉丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山茱萸一两 苁蓉二两(酒浸) 楮实 枸杞 地肤子 狗脊(去毛) 五味

覆盆子 菟丝子 山药 故纸(炒) 远志(去心) 石菖蒲 萆薢 杜仲(去皮,炒) 熟地 石斛(去根) 白茯苓 牛膝(酒浸) 泽泻 柏子仁各一两(炒)

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服六七十丸,空心温酒送下。

【功用】壮元气,养精神。

33910 肉苁蓉丸

【方源】《普济方》卷二〇〇。

【组成】乌梅肉(微炒) 恒山(锉) 附子(炮裂,去皮脐) 桂心各一两 虎头骨一两半(涂酥炙令黄) 桃仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 香豉一合(炒干) 麝香一分(细研) 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去粗皮,炙干)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以粥饮送下。晚食前再服。

【主治】久症不愈,羸瘦无力,寒热不能饮食。

33911 肉苁蓉丸

【方源】《普济方》卷二三四。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去粗皮,炙干) 黄耆一两(锉) 熟地黄 巴戟各一两 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 白藜 五味子 白术各三分 牛膝一两(去苗) 附子一两(炮裂,去皮脐) 牡蛎粉三分 泽泻一两 干姜三分(炮裂,锉) 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别捣为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳,肾气不足,耳聋。

33912 肉苁蓉丸

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【异名】四神丸(《医统》卷七十三引《医林集要》)、四味肉苁蓉丸(《景岳全书》卷五十九)、苁蓉丸(《证治宝鉴》卷四)。

【组成】肉苁蓉八两 熟地黄六两 五味子四两 菟丝(捣饼)二两

【用法】上为细末,酒煮山药糊为丸,如梧

桐子大。每服七十丸，空心用盐酒送下。

【主治】禀赋虚弱，小便数，亦不禁。

33913 肉苁蓉丸

《金匱翼》卷六。为《圣济总录》卷八十一“苁蓉丸”之异名。见该条。

33914 肉苁蓉丸

《不知医必要》卷三。为《济生》卷四“润肠丸”之异名。见该条。

33915 肉苁蓉汤

【方源】《外台》卷九引深师方。

【组成】肉苁蓉五两 干地黄四两 大枣二十枚（擘） 乌头一两（炮） 甘草（炙） 豁心 紫菀 五味子各二两 生姜石膏（碎，绵裹） 麦门冬（去心）各三两

【用法】上切，以水一斗五升，煮取七升，去滓，分为七服。日四次，夜三次。一方用大枣五十枚，水一斗二升，煮取九升。

【主治】伤中，咳嗽短气，肠中痛，流饮厥逆，宿食不消化，寒热邪癖，五内不调。

33916 肉苁蓉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】肉苁蓉一两（泡淡） 附子二钱 人参二钱 干姜炭二钱 当归二钱 白芍三钱（肉桂汤浸，炒）

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次缓缓服，胃稍开，再作服。

【主治】噤口痢，胃关不开，由于肾关不开者。

【方论选录】方之重用苁蓉者，以苁蓉感马精而生，精血所生之草，而有肉者也。马为火畜，精为水阴，禀少阴水火之气，而归于太阴坤土之药，其性温润平和，有从容之意，故得从容之名。补下焦阳中之阴有殊功。《本经》称其强阴益精，消癥瘕。强阴者，火气也；益精者，水气也。癥瘕乃气血积聚有形之邪，水火既济，中土气盛，积聚自消。兹有噤口痢阴阳俱损，水土两伤，而又滞下之积聚未清，苁蓉乃确当之品也。佐以附子，补阴中之阳，人参、干姜补土，当归、白芍补

肝肾。苟用桂制者，恐其呆滞，且束入少阴血分也。

33917 肉苁蓉汤

【方源】《医学摘粹·杂证要法》。

【组成】肉苁蓉三钱 麻仁三钱 茯苓三钱 半夏三钱 甘草二钱 桂枝三钱

【用法】水煎一杯，温服。

【主治】阳衰土湿，粪若羊矢者。

33918 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】肉苁蓉一两半（酒浸，去皴皮，微炙） 石斛一两（去根） 五味子一两 黄耆一两（锉） 丹参二两 牛膝一两（去苗） 肉桂二两（去粗皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归一两（锉，微炒） 人参一两（去芦头） 沉香一两 白茯苓一两 石南一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 枳实一两（麸炒微黄） 熟干地黄一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁，以绢包之）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，每用磁石包子同煎至六分，去滓，空心及晚食前热服。

【主治】肾气不足，体重嗜卧，骨节痠疼，目暗耳鸣，多恐喜唾，腰背强痛，小腹满急，食饮无味，心悬少气。

33919 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】肉苁蓉二两（酒浸一日，刮去皴皮，炙干） 菟丝子一两半（酒浸三宿，晒干，别捣） 钟乳粉二两 蛇床子一两 远志一两（去心） 续断一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 石龙芮一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】肾脏虚损，精气衰竭，阳道萎弱。

33920 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 菟丝子(酒浸一宿,焙干,别捣) 牛膝(去苗) 附子(炮裂,去皮脐) 杜仲(去粗皮,炙令黄,锉) 白茯苓各一两 防风(去芦头) 桂心 巴戟 续断 枸杞子各三分 五味子半两 蛇床子半两 山茱萸半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以温酒调下。

【功用】补益脏腑,利腰膝,止烦疼,强志力,充肌肤。

【主治】风劳。

33921 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【异名】苁蓉散(《魏氏家藏方》卷四)

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 熟干地黄一两 石斛一两(去根,锉) 防风半两(去芦头) 附子一两(炮裂,去皮脐) 黄耆一两(锉) 白茯苓一两 人参半两(去芦头) 牛膝一两(去苗) 白术半两 五味子半两 桂心半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳伤惫,四肢羸瘦,腰膝无力,不能饮食。

33922 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去粗皮,炙令干) 黄耆一两(锉) 五加皮三分 牡蛎粉 熟干地黄一两 枸杞子一两 白茯苓一两 石斛一两(去根) 五味子半两 当归一两 白术一两 牛膝一两(去苗)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,食前服。

【主治】虚劳盗汗,四肢无力,腰脚冷疼。

33923 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 五味子三分 韭子一两(微炒) 熟干地黄一两 蛇床子一两 续断三分 车前子三分 当归三分 天雄三分(炮裂,去皮脐) 桑螵蛸一两(微炒) 天门冬一两半(去心,焙) 白石英一两(细研,水飞过) 白龙骨三分 鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 菟丝子一两(酒浸一宿,晒干,别捣为末) 磁石一两(须醋淬七遍,捣碎,细研,水飞过)

【用法】上为细散。每服二钱,食前用温酒调下。

【主治】虚劳,小便余沥,或黄或白,茎中疼痛,囊下湿痒。

33924 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙) 石斛三分(去根,锉) 枸杞子一两 远志半两(去心) 续断三分 原蚕蛾三分(微炒) 菟丝子二两(酒浸三日,晒干,别研为末) 天雄一两(炮裂,去皮脐) 熟干地黄一两

【用法】上为细散。每服二钱,食前用温酒调下。

【主治】虚劳羸损,阳痿,精气乏弱。

33925 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 熟干地黄一两 白茯苓三分 白芍药半两 桂心半两 牛膝三分(去苗) 麦门冬一两(去心) 白石英一两(细研) 附子三分(炮裂,去皮脐) 黄耆一两(锉) 牡蛎一两(烧为粉) 磁石一两(捣碎,水淘去赤汁) 五味子三分 人参三分(去芦头) 续断三分 萆薢半两(锉) 地骨皮半两

【用法】上为粗散。每服用猪肾一对,切去脂膜,先以水一大盏半,煎至一盏,去滓,入药五钱,加生姜一分,薤白三茎,煎至五

分，去滓，食前温服。

【主治】大渴后，下元虚乏，日渐羸瘦，四肢无力，不思饮食。

33926 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干) 干姜半两(炮裂，锉) 地脉三分 菟丝子三分(酒浸三日，晒干，别捣为末) 巴戟一两 远志一两(去心) 人参一两(去芦头) 甘草一两(炙微赤，锉) 麦门冬一两(去心) 石韦一两(去心) 白芍药一两 桂心一两 芎藭一两 熟干地黄二两 山茱萸一两 五味子一两 当归一两(锉，微炒) 附子半两(炮裂，去皮脐) 白茯苓一两半

【用法】上为细散。每服二钱，食前用荆芥汤调下。

【功用】补虚。

【主治】痢经年不愈，脓血出过多不止。

33927 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】肉苁蓉四两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干) 白芍药四两 甘草四两(炙微赤，锉) 干姜二两(炮裂，锉) 当归一两(锉，微炒) 川椒三分(去目及闭口者，微炒去汗) 桂心一两 黄芩一两 白及一两 黄耆一两(锉) 吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒) 人参一两(去芦头) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙香熟)

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日三次。

【主治】金疮出血多。

33928 肉苁蓉散

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】肉苁蓉 麋茸 牛膝 石斛 远志 菟丝子各一两 石龙芮三分 雄蚕蛾半两 五味子 蛇床子 天雄 巴戟各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】肾脏虚损，精气衰竭，阳道萎弱。

33929 肉苁蓉粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】肉苁蓉二两(酒浸一宿，刮去皱皮，细切) 粳米三合 鹿角胶半两(捣碎，炒令黄燥，为末) 羊肉四两(细切)

【用法】上药，煮羊肉、苁蓉、粳米作粥，临熟，下鹿角胶末，用盐、酱、味末调和，作两顿食之。

【主治】五劳七伤，久积虚冷，阳事都绝。

33930 肉苁蓉膳

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮) 葱白三茎(去须切) 糯米一两 羊肉三两

【用法】上将苁蓉、羊肉细抹，和末糝及葱，都依寻常法，煮着盐、醋、椒酱五味调和，空腹食之。

【主治】脏腑虚损，四肢乏弱，不欲饮食。

33931 肉鹿茸丸

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】鹿茸二两(先用草火燎去毛，锉，酒浸三宿，炙令黄色) 菟丝子(净水淘，酒浸三宿，焙，别捣) 茯苓(去粗皮) 肉苁蓉(汤浸，刮去粗皮，酒浸三宿，作片，焙干) 紫菀(去土，水淘洗，焙干) 蛇床子(淘净，酒浸三宿，焙干) 黄耆(锉碎，慢火炙黄) 桑螵蛸(锉开，慢火炙黄) 阳起石(炒令赤色) 沙苑蒺藜(净拣，微炒，别捣) 大黑附子(拣，慢火炮，去皮脐) 官桂(去粗皮) 各一两

【用法】上药并须修制精细，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【功用】补阴阳，益精神，止遗沥。

【主治】五劳七伤。

33932 肉豆蔻散子

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】肉豆蔻一两(去壳) 干姜半两

(炮裂，锉) 白术三分 诃黎勒一两(煨) 荜茇半两 木香半两 陈橘皮一两(汤浸)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】久冷痢，腹胁满，食不消化。

【备考】本方方名，《普济方》引作“肉豆蔻散”。

33933 肉苁蓉煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】肉苁蓉(好肉者，酒浸，薄切，焙干秤)一斤 牛膝(去苗，用半斤酒浸一宿，炒干，二味捣罗为末，用无灰酒二升，入银石器中重汤煎成膏) 巴戟天(去心) 附子(炮裂，去皮脐) 茴香子(微炒)各四两 葫芦巴 桂(去粗皮) 木香 肉豆蔻(去壳) 青橘皮(酒浸白，焙) 白附子(炮) 山芋 干蝎(用黄色头尾全者，微炒)各二两

【用法】上药，除膏外，为细末，候膏成，稍稠得所，便入诸药末，一处为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心，温酒或盐汤任下。恐药软，但于盘内摊，可丸即丸，入新瓷器中盛。服药一月见效，百日后诸病俱退。

【功用】补益。

【主治】上热下冷，元藏风虚，膀胱气攻，四肢腰脚无力疼痛，头目昏眩，腹胁妨闷。

33934 肉果理中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参一两半 白术三两(炒) 干姜一两半(炒) 肉果一两半(面包煨) 炙草八钱

【用法】上为散。每服三钱，乌梅汤煎下。

【主治】泄泻，脉虚缓者。

【方论选录】产后脾胃阳虚，寒邪袭入，而胃气不固，失纳化蓄泄之权，故泻利不禁焉。人参扶元以补胃气；白术扶土以健脾气；干姜温中补火，力主散寒；肉果涩阳固胃，功专止泻；炙草缓中以益胃气也；乌梅汤煎，使脾能健运，则胃阳自强，而寒邪消散，中气

完固，安有泻痢不禁之患乎。

33935 肉桂七味丸

《证治宝鉴》卷三。为《摄生秘剖》卷一“七味地黄丸”之异名。见该条。

33936 肉桂三棱散

【方源】《顾氏医经》卷五。

【组成】三棱 木香 神曲 陈皮 半夏 肉桂

【主治】积滞者，脾气虚弱，乳食入胃，不能运化，积滞日久，再为冷食所伤，传至大肠，遂成泄泻。

33937 肉桂理中丸

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】理中丸加肉桂一两

【主治】阴寒腹痛，霍乱呕吐，停食呃噎。

33938 肉豆蔻猪肝丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】肉豆蔻一两(去壳) 草豆蔻一两(去皮) 诃黎勒二两(煨，用皮) 缩砂一两(去皮) 陈橘皮一两(一半生，一半炙)

【用法】上为末，用猪肝一叶，可重四两以来，切为片子，以乌梅十枚捶碎，以米泔汁同浸猪肝一宿，后却用湿纸裹煨，令肝熟后，入醋少许，同细研如糊，入前药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及食前，以粥饮送下。

【主治】虚劳泄痢，兼脾胃不和，不思饮食。

33939 肉苁蓉牛膝丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】黄狗脊骨一条(两头去节，截段，留少许，取硝砂一两研，以浆水一升调匀，消化作水，方下脊骨在汁中，浸三日，炭火炙干，以汁旋刷，汁尽令黄) 肉苁蓉 肉桂 附子 干姜各一两 蛇床子 牛膝 五味子 胡椒 阳起石各半两 鹿茸一只

【用法】上为细末，用枣肉五两、酥一两相和为丸，如绿豆大，晒干。每服十丸，盐汤下。服之一月其精如火；二月精结实；三月精秘不泄。

【功用】补伤惫，驻颜悦色，壮筋力，百病不生。

【主治】下元虚损。

竹

33940 竹一

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“冰硼散”之异名。

33941 竹二

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“荆芥银花汤”之异名。见该条。

33942 竹七

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“连翘薄荷饮”之异名。见该条。

33943 竹八

【方源】《痧症全书》卷下。

【异名】三十二号随象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】大黄三钱 茵陈 连翘 瓜蒌 枳实 桃仁 青皮 赤芍 银花 酒芩 山梔各一钱

【用法】水煎，微温服。

【主治】痧毒结于大肠。

【备考】方中青皮，《杂病源流犀烛》作“陈皮”。

33944 竹三

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“如圣散”之异名。见该条。

33945 竹五

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“苏木散”之异名。见该条。

33946 竹六

【方源】方出《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下。

【异名】三十号井象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】苏木 红花 泽兰 桃仁 乌药 桔梗 川芎 牛膝

【用法】水煎，温服。

【主治】紫疱痧，痧毒之气存肌表。

【临症举例】紫疮痧 《痧胀玉衡》：余邻许秀芝女，手足、下半身俱肿，大腹亦胀，发出两腿足紫血疱，如圆眼大，密难数记，皆云此烂痲之症，服药益甚。求余治，视疱多可畏，及见有痧筋，发现于腿弯，方知痧者犹树之根，疱者犹树之叶也。遂为放痧三针，又刺指头痧二十一针，尽去其毒血。复诊其脉，六部俱和，殆其痧毒之气已散，但存肌表紫疱而已，用苏木、红花、泽兰、桃仁、乌药、桔梗、川芎、牛膝、二剂，温服。凡紫血疱尽收靥结痲而愈。

【备考】按：方中苏木，《痧症全书》作“蓬术”。

33947 竹四

《痧症全书》卷下。为《救偏琐言·备用良方》“和脾宣化饮”之异名，见该条。

33948 竹节丸

【方源】《外台》卷二十六引《范汪方》。

【组成】烧竹节 雷丸各三分 锡屑二分 橘皮一分半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八丸，一日三次。

【主治】三虫。

33949 竹节霜

【方源】《疡医大全》卷二十四引《百效》。

【组成】新竹节上霜

【用法】将新竹节上霜刮下。一搽即愈。

【主治】龟头因热毒马口结蕊，或粗衣擦损。

33950 竹龙散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】竹笼散（《保命集》卷下）。

【组成】五灵脂 黑豆（生，去皮）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，煎冬瓜汤调下，一日二次。无冬瓜即用冬瓜苗、叶、子煎汤俱可，小渴只一服愈。

【主治】消渴。

【宜忌】渴定后不可服热药。

33951 竹叶汤

【方源】《金匱》卷下。

【异名】竹叶防风汤(《活人书》卷十九)。

【组成】竹叶一把 葛根三两 防风 桔梗 桂枝 人参 甘草各一两 附子一枚(炮) 大枣十五个 生姜五两

【用法】以水一斗,煮取二升半,分三次温服。温覆使汗出。

【功用】《金匱发微》:清太阳、阳明风热,温脾脏之虚寒。

【主治】产后中风,发热面正赤,喘而头痛。

【加减】颈项强,用大附子一枚(破之如豆大),煎药物去沫;呕者,加半夏半升(洗)

【方论选录】①《金匱要略心典》:此产后表有邪而里适虚之证,若攻其表,则气浮易脱;若补其里,则表多不服。竹叶汤用竹叶、葛根、桂枝、防风、桔梗解外之风热,人参、附子固里之脱,甘草、姜、枣以调阴阳之气面使其平,乃表里兼济之法。②《金鉴》:产后汗多,表虚而中风邪病瘥者,主之竹叶汤,发散太阳、阳明两经风邪。用竹叶为君者,以发热、面正赤,有热也;用人参为臣者,以产后面喘,不足也;颈项强急,风邪之甚,故佐附子。③《金匱发微》:竹叶、葛根以清胃热,防风、桔梗以散风而定喘,余则仍从阳旦汤意,去芍药而加人参,所以去芍药加人参者,则以阴虚不任苦泄而急于营养之故。

33952 竹叶汤

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《鸡峰》卷十七。

【异名】竹叶橘皮汤(《普济方》卷一六三)。

【组成】竹叶三斤 橘皮三两

【用法】以水一斗,煮取三升,去滓,分为三服,三日一剂。

【主治】大走马及奔趁喘乏,便饮冷水,因得上气发热。

33953 竹叶汤

【方源】《外台》卷六引《小品方》。

【组成】竹叶一虎口 小麦一升 生姜十两 甘草一两(炙) 人参一两 附子一两

(炮) 肉桂二两 当归二两 芍药一两 白术三两 橘皮二两

【用法】以水一斗半,先煮小麦、竹叶,取八升汁,去滓,纳诸药,煮取二升半,分三次服。

【主治】热毒霍乱、吐痢。

【宜忌】忌生葱、海藻、菰菜、猪肉、桃、李、雀肉。

【加减】吐痢后腹满,加炙厚朴二两;上气,加吴茱萸半升。

【方论选录】《千金方衍义》:《金匱》竹叶汤治产后中风,发热面正赤,喘而头痛,用人参、桂心、附子以救本虚,即兼甘草、生姜、竹叶以散标热,彼以草蓐中发露得风,故用葛根、防风、桔梗、大枣,此以吐利后余热不解,故用归、芍和营,术、橘健胃,小麦以助生阳之气,《金匱》一脉相承,分支异治。

33954 竹叶汤

【方源】《外台》卷三引《深师方》。

【组成】竹叶一把 小麦一升 甘草一两(炙) 石膏二两(碎) 茯苓二两 半夏一升(洗去滑) 前胡二两 知母二两 黄芩二两 人参二两 生姜四两 大枣二十个(擘)

【用法】上切。以水一斗二升,煮竹叶、小麦减四升,去滓,纳药,煮取三升,分三服。

【主治】天行后虚热牵劳食复,四肢沉重,或一卧一起,气力吸吸羸弱。

【宜忌】忌海藻、菰菜、醋物、羊肉、饴等物。

33955 竹叶汤

【方源】《医心方》卷二十引《深师方》。

【组成】生竹叶二两 甘草一两 黄芩一两 大黄一两 梔子十枚 茯苓一两 干地黄六分

【用法】以水五升,煮取二升一合,每服七合,一日三次。

【主治】上气。

33956 竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】淡竹叶(切)三升 小麦二升 干地黄 人参 黄芩 前胡 升麻各二两 麦门冬(去心) 生姜 黄耆 芍药各三两 大枣十四枚 桂心半两 远志半两(去心) 当归一两 甘草(炙)

【用法】上切。先以水一斗八升煮竹叶、小麦，取一斗，去滓，纳诸药，又煮取三升，分二服，羸者分四服，日三次，夜一次。

【主治】发痈疽取利，热小便退，不用食物。

【备考】方中甘草用量原缺。

33957 竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】淡竹叶(切)三升 小麦三升 干地黄四两 黄耆 人参 甘草(炙) 芍药 石膏(末) 通草 升麻 黄芩 前胡各二两 大枣十四枚 麦门冬三两(去心)

【用法】先以水一斗六升煮竹叶、小麦，取九升，去滓，纳诸药，煮取三升二合，强即分三服，羸即四服，日三次，夜一次。

【主治】痈疽取下后，热少退，小便不利。

33958 竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】竹叶(切)三升 小麦二升 人参 黄芩 前胡 芍药 甘草(炙) 干地黄 当归 桂心各二两 黄耆三两 麦门冬三两(去心) 龙骨三两(碎) 牡蛎一两(末) 赤蛸螬三十枚(炒) 大枣十四枚(去核)

【用法】以水二斗，煮竹叶、小麦，取一斗，去滓，纳诸药，煮取四升，分四服，日三次，夜一次。

【主治】痈疽取利后，热，小便不利。

33959 竹叶汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】竹叶(切)二升 半夏二两(汤洗) 甘草二两(炙) 厚朴三两(炙) 小麦二升 生姜五两 当归一两 麦门冬二两

(炙) 人参 桂心各一两 黄芩三两

【用法】上切。以水一斗半先煮竹叶、小麦，取九升，去滓，又煮诸药取二升，分三次温服。

【主治】痈去脓多，虚满上气。

33960 竹叶汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】竹叶(切)一升 麦门冬(去心) 小麦 生地黄(切)各一升 生姜六两 干枣十枚(擘，去核) 麻黄三两(去节) 甘草一两(炙)

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】气极。伤热气喘，甚则唾血，气短乏，不欲食，口燥咽干。

【宜忌】忌海藻、菰菜、茺蓂。

【方论选录】《千金方衍义》：气极伤肺而致喘乏、唾血，用越婢全方以治旺气，惟恐津血愈伤，故加竹叶以清喘乏，冬、地以滋阴血，小麦以除脏躁，然小麦入于越婢方中，则与厚朴麻黄汤中匡佐麻黄、石膏发越内动肝风无异。

33961 竹叶汤

【方源】《医心方》卷二十引《古今录验》。

【组成】竹叶二两 甘草十两 白术一两 大黄二两

【用法】以水七升，煮取二升半，分五合一服。

【功用】除胸中热，益气。

33962 竹叶汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】生淡竹叶 麦门冬各一升 甘草二两 生姜 茯苓各三两 大枣十四枚 小麦五合

【用法】上咬咀。以水一升，先煮竹叶、小麦，取八升，纳诸药，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】产后心中烦闷不解。

【加减】若心中虚悸者，加人参二两；其人食少无谷气者，加粳米五合；气逆者，加半夏二两。

33963 竹叶汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】竹叶三升 甘草 茯苓 人参各一两 小麦五合 生姜三两 大枣十四个 半夏三两 麦门冬五两

【用法】上咬咀。以水九升煮竹叶、小麦，取七升，去滓，纳诸药更煎，取二升半，每服五合，日三次夜一次。

【主治】产后虚渴，少气力。

33964 竹叶汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】竹叶(切)五合 小麦三合 柴胡半两 黄芩一两六铢 茯苓十八铢 人参 麦门冬 甘草各半两

【用法】上咬咀。以水四升，煮竹叶、小麦，取三升，去滓，下诸药，煮取一升半，分三次服。

【主治】①《千金》：小儿夏月患腹中伏热，温壮来往，或患下痢，色或白或黄，三焦不利。②《普济方》：伤寒，两尺浮，身无大热，郁冒，或下利烦渴者。

【加减】若小儿夏月忽壮热烧人手，洞下黄溏，气力憊然，脉极洪数，加大黄二两。

33965 竹叶汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】竹叶(切)一升 小麦半升 甘草 黄芩 栝楼根 泽泻 茯苓 知母 白术 大黄各二两 桂心二铢 生姜一两半 人参 麦门冬 半夏各一两 当归十八铢

【用法】上咬咀。以水七升，煮小麦、竹叶，取四升，去滓，纳药煎取一升六合，分四服。

【主治】五六岁儿温壮，腹中急满，息不利，或有微肿，极羸，不下饮食，坚痞，手足逆冷。

33966 竹叶汤

【方源】《千金》卷九。

【组成】竹叶二把 人参 甘草各二两 半夏半升 石膏一斤 麦门冬一升 生姜四两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取六升，去滓，纳粳米半升，米熟去之，每服一升，每日三次。

【主治】伤寒发汗后，表里虚烦，不可攻者。

33967 竹叶汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】竹叶 小麦各一升 知母 石膏各三两 黄芩 麦门冬各二两 人参一两半 生姜五两 甘草 栝楼根 半夏各一两 茯苓二两

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮竹叶、小麦，取八升，去滓，纳药，煮取三升，分三服，老小五服。

【主治】五心热，手足烦疼，口干唇燥，胸中热。

【方论选录】《千金方衍义》：竹叶石膏汤本治大病后虚羸烦渴。《千金》乃于方中除去粳米之益胃，易入小麦以清肝，加栝楼根以佐麦冬，茯苓以佐人参，黄芩以佐石膏，生姜以佐半夏，仍用白虎汤中知母以佐竹叶，以治胃气暴虚之烦渴，固为合剂。

33968 竹叶汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】小麦 地骨白皮各一升 竹叶(切)三升 麦门冬 茯苓各四两 甘草三两 生姜 栝楼根各五两 大枣三十个

【用法】上咬咀。先以水三斗，煮小麦，取一斗，去滓澄清，取八升，去上沫，取七升，煮药，取三升，分三服。

【主治】下焦虚热，注脾胃，从脾注肺，好渴利。

33969 竹叶汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】竹叶(切)二升 地骨皮 生地黄

(切)各一升 石膏八两 茯苓(一作茯苓) 萎蕤 知母 生姜各四两 生麦门冬一升半 栝楼根八两

【用法】上咬咀。以水一斗二升,下大枣三十个并药,煮取四升,分四服。

【功用】消热止渴。

【主治】渴利虚热,引饮不止。

33970 竹叶汤

【方源】《外台》卷三引《崔氏方》。

【组成】甘草二两(炙) 枣十五枚(擘) 半夏一两(洗) 芍药三两 前胡一两 黄芩一两 小麦五合 人参二两 粳米一升 知母二两 麦门冬四合(去心) 栝楼一两 生姜四两 竹叶一把

【用法】上切。以竹葢饮一斗五升,煮取五升,分三服。

【主治】天行虚羸,烦躁而渴不止,恶寒仍热盛者。

【宜忌】忌羊肉、海藻、菰菜、饴。

【加减】若非天行而虚羸久病,胸生痰热,加黄耆二两,除黄芩、栝楼,减知母一两。

33971 竹叶汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】竹叶(切)五升 小麦一升 麦门冬一升(去心) 知母 茯苓各三两 石膏四两(碎) 芍药 栝楼 泽泻 人参 甘草(炙)各二两

【用法】上咬咀。以水二斗,煮竹叶、小麦,取一斗,去滓,纳药,煮取四升,分四服。

【主治】胃虚,阳气外蒸,泄津液,口干苦渴,气喘呕逆,涎沫相连。

33972 竹叶汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】竹叶一把 粳米 麦门冬(去心) 半夏(洗)各一升 人参 当归各二两 生姜一斤(切)

【用法】上咬咀。以水一斗五升,煮竹叶、生姜,取一斗,纳诸药,煮取八升,分十服,日三次,夜二次。

【功用】下气。

【主治】胸中烦闷,闷乱气逆。

33973 竹叶汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】淡竹叶 小麦各三升 生姜六两(切) 大枣十四个(擘) 茯苓 麦门冬(去心) 枳实(炙) 芍药 人参各二两 黄耆 前胡 干地黄 升麻 射干 黄芩 芎藭 甘草(炙)各三两

【用法】上咬咀。以水一斗七升,先煮竹叶、小麦,取一斗二升,去滓,纳诸药,煮取四升,分五服。

【主治】痢、发背、诸客热肿始作。

【加减】若热盛秘涩不通者,加大黄二两,已下勿加。

33974 竹叶汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】竹叶(切)五升 小麦 生姜五两(切) 桂心一两半 大枣二十个(擘) 芍药 干地黄各三两 茯苓 升麻 当归 甘草(炙)各二两

【用法】上咬咀。以水一斗七升,煮小麦、竹叶,取一斗一升,去竹叶,纳诸药,煮取三升五合,分四服,如人行七八里再服。

【主治】痈肿,发背。

【备考】方中小麦用量原缺。

33975 竹叶汤

《外台》卷三引《张文仲方》。为《伤寒论》“竹叶石膏汤”之异名。见该条。

33976 竹叶汤

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】淡竹叶(切)五升 茯苓 石膏各三两(碎) 小麦三升 栝楼二两

【用法】上切。以水二斗,煮竹叶,取八升,下诸药,煮取四升,去滓温服。

【主治】石发热渴。

33977 竹叶汤

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】竹叶二两 石膏一两 麦门冬半两(去心) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 人

参半两(去芦头) 甘草一分(炙微赤, 锉) 陈橘皮一分(汤浸, 去白瓢, 焙) 生姜半两

【用法】上锉细, 和匀。每服半两, 以水一盞, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】时气表里未解, 烦躁不可忍者。

33978 竹叶汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】淡竹叶五十片 赤茯苓一两 石膏一两(捣碎) 小麦一合 甘草一两(生用) 栝楼根一两 麦门冬一两(去心) 芦根一两

【用法】上锉细, 和匀。每服一两, 以水一大盞, 煎至七分, 去滓, 分二次温服, 一日三四次。

【主治】乳石发动, 烦热大渴。

33979 竹叶汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七, 名见《圣济总录》卷四十。

【组成】竹叶一握

【用法】以水一大盞, 煮取汁五升, 分二次温服。

【主治】①《圣惠》: 霍乱吐泻, 心烦闷乱。②《圣济总录》: 霍乱利后, 烦热躁渴, 卧不安。

33980 竹叶汤

【方源】方出《圣惠》卷五十五, 名见《圣济总录》卷六十一。

【组成】小麦一两 竹叶一握 生姜半两(切)

【用法】以水一大盞半, 煎至八分, 去滓, 入马粪汁一合搅匀, 分为二服, 如人行三二里服尽。

【主治】走马黄。眼目黄赤, 烦乱狂言, 起卧不安, 气力强壮, 唯爱嗔怒, 努目高声, 打骂他人, 犹如癫醉。

【备考】走马黄, 速宜点烙肝俞二穴、百会穴、风府穴、关元穴、肾俞二穴、下廉二穴、上管穴、中管穴, 次烙手足心, 并服本方。

33981 竹叶汤

【方源】《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》。

【组成】竹叶二七片(细切) 石膏二两 麦冬一两(去心) 半夏一两(汤洗七次) 人参一两 甘草半两(炙)

【用法】上为粗末。如桂枝汤法煎服。

【主治】虚烦病, 如不解。

33982 竹叶汤

【方源】《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。

【异名】竹叶石膏汤(《玉机微义》卷十一)。

【组成】竹叶二七片(细切) 石膏二两 人参一两 麦门冬一两(去心) 半夏一两(汤洗七遍去滑) 甘草一两(炙微赤)

【用法】上为末。每服四钱, 用水一中盞, 加生姜半分, 煎五分, 去滓温服, 不拘时候。

【功用】《玉机微义》: 益气。

【主治】①《医方类聚》引《神巧万全方》: 诸虚烦热, 与伤寒相似, 其身不疼痛, 不恶寒, 脉不紧数。②《医统》: 暑热烦躁。

33983 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】苦竹叶(切) 小麦各二两 石膏(碎) 三兩

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】伤寒时气, 发疮如豌豆, 烦闷。

33984 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】淡竹叶(切) 一两 柴胡(去苗) 二兩 犀角(镑屑) 芍药各一两半 黄芩(去黑心) 大黄(锉, 炒) 各半兩 梔子仁七枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓, 下朴消半钱匕, 温服。

【主治】脾痺。烦懊口甘, 咽干烦渴。

33985 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】竹叶一握 麦门冬(去心,焙) 白茯苓(去黑皮) 栝楼实(炒) 地骨皮 生姜各二两 甘草(炙)三两 大枣五两 小麦(淘)六合

【用法】上咀咀,如麻豆大。每服五钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓,食后温服。

【主治】膈消烦渴,津液燥少。

33986 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】青竹叶(锉碎) 白茯苓(去黑皮) 地骨皮(锉) 栝楼根各一两 桂(去粗皮) 甘草(炙,锉)各半两 麦门冬(去心,焙)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏,入小麦一撮,煎至八分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】积年消渴,好食冷物。

33987 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】甘竹叶(切) 大麻仁(炒) 赤秫米各一升(淘净) 鹿脚四只(汤浸,去皮毛骨,细研肉) 白茯苓(去黑皮)一两 薤白二两(切)

【用法】上锉,如麻豆大,分作八服。每服先以水二盏,煎麻仁、竹叶取二盏,去滓澄清,入诸药鹿脚,又煎,去滓,取一盏,微微饮之。渴止为度。

【主治】消渴,饮水不辍,多至数斗。

33988 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】淡竹叶 犀角屑 木通(锉,炒) 黄芩(去黑心)各一两 玄参 黄连(去须) 车前子各一两一分 大黄(微炒) 梔子仁各一两半 芒消二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】肝脏实热,眼赤疼痛。

33989 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】苦竹叶(切)一升 柴胡(去苗)二两 蛇衔二两 黄连(去须) 芒消(研) 细辛(去苗叶)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓,食后温服。

【主治】目暴肿痛。

33990 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄芩(去黑心) 黄连(去须)各一两 升麻一两半 甘草(炙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,入竹叶十片,煎至八分,去滓,入芒消半钱匕,温服,如人行五里再服。通利即止。

【主治】时气病后目赤涩痛。

33991 竹叶汤

《圣济总录》卷一一〇。为《圣惠》卷三十二“洗眼汤”之异名。见该条。

33992 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】竹叶一握(净洗,锉,煎取汁三盏) 生地黄二两 黄芩(去黑心) 人参 芍药 知母 甘草(炙) 赤茯苓(去黑皮)各一两 升麻 黄耆 栝楼根 麦门冬(去心,焙)各一两半

【用法】上药除竹叶外,锉如麻豆大。每服三钱匕,以竹叶汁一盏,加大枣三个(擘破),同煎至七分,去滓温服,一日三次,早晨、午时、夜卧各一。

【主治】痈疽发背,四肢虚热,大渴。

33993 竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】淡竹叶半两(切) 人参 芍药 黄芩(去黑心) 石膏 麦门冬(去心,焙) 甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣二个(擘破),同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后伤寒,烦躁迷闷,热渴头痛。

33994 竹叶汤

【方源】《幼幼新书》卷十八引《全生指迷

方》。

【异名】竹叶石膏汤(《赤水玄珠》卷二十八)。

【组成】石膏四两 知母二两 麦门冬(去心) 甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加竹叶一握，煎至七分，去滓温服。

【主治】小儿痘疹虚热，烦渴，小便赤。

①《幼幼新书》引《全生指迷方》：小儿痘疹已出未出。②《鸡峰》：痘疹虚热虚烦，不恶寒，但烦躁，小便赤色，多渴，成赤斑点。③《痘科类编》：痘疮痂落后，虚烦不眠者。

33995 竹叶汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】生干地黄五两 芍药四两 黄耆茯苓 泽泻 甘草(炙) 麦门冬(去心)各三两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，淡竹叶十片，煎七分，去滓，不拘时候服。

【主治】精实极，眼视不明，齿焦，发落，形衰，通身虚热，甚则胸中痞痛，烦闷，泄精。

33996 竹叶汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】麦门冬汤(《明医指掌》卷九)、竹叶麦冬汤(《顾氏医径》卷四)。

【组成】防风(去叉) 黄芩 麦门冬(去心)各三两 白茯苓四两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加竹叶十数片煎，去滓温服。

【主治】子烦。妊娠心惊胆寒，多好烦闷。

33997 竹叶汤

【方源】《普济方》卷三十六引《卫生家宝》。

【组成】竹叶半斤 白茯苓一两(锉) 珍珠小半夏(洗)一两 生姜四两(切)

【用法】以水十碗，煎一碗，去滓温服，每服一盏，不拘时候，连服亦可。

【主治】热吐翻胃，及伤寒遍身发热，冷吐。

33998 竹叶汤

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】苦竹叶不拘多少

【用法】水煎浓汤，漱之。

【主治】齿衄。

33999 竹叶汤

《普济方》卷十六。即《千金》卷十三“石膏汤”。见该条。

34000 竹叶汤

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】淡竹叶(洗净)三握 黄连一两 青钱二七文 大枣十个(去核) 车前子(切)五合

【用法】上锉。以水三升，煎取一升，去滓，微热淋洗眼。冷重暖，不拘次数，以愈为度。

【主治】眼赤痛。

34001 竹叶汤

《普济方》卷七十三。为《外台》卷二十一引《延年秘录》“竹叶饮”之异名。见该条。

34002 竹叶汤

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】麦门冬三两(去心) 小麦五合(绵裹) 竹叶(切)一升 生姜二两 石膏(碎，棉裹) 茯苓二两

【用法】上切。以水五升，煮取一升二合，食后再服，相去七八里久。

【主治】脚气冲心，心闷风热，多唾，或唾觉心忪者。

34003 竹叶汤

《普济方》卷三三八。即《济生》卷七“麦门冬汤”。见该条。

34004 竹叶汤

【方源】《女科撮要》卷下。

【组成】白茯苓 麦门冬 黄芩各三两

【用法】每服四钱，加竹叶五片，水煎服。

【主治】子烦。妊娠心惊胆怯，烦闷不安。

【加减】若因血虚烦热，宜兼用四物；若因中气虚弱，宜兼四君。

34005 竹叶汤

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】竹叶二十个(揉) 防风 黄芩 栀子仁各八分 白茯苓 当归各一钱 麦门冬(去心)一钱半

【用法】水煎服。

【主治】子烦，孕妇烦闷不安。

34006 竹叶汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】淡竹叶 黄芩 升麻 木通 车前子 黄连 玄参 芒消 栀子 大黄(炒)

【用法】食后服。

【主治】肝脏实热，眼赤肿痛。

34007 竹叶汤

【方源】《广嗣纪要》卷九。

【组成】白茯苓 防风 麦门冬 条芩 知母各一钱 淡竹叶十片

【用法】水煎服。

【主治】子烦，气实体壮者。

34008 竹叶汤

【方源】《医方集解》。

【组成】麦冬一钱半 茯苓 黄芩一钱 人参五分 淡竹叶十片

【功用】《医方论》：清心解烦，养正补虚。

【主治】子烦。妊娠心惊胆怯，终日烦闷。

【方论选录】此手太阴、少阴药也。竹叶清烦，黄芩消热，麦冬凉肺，茯苓宁心，人参补虚，妊娠心烦，固多虚也。

【备考】方中茯苓用量原缺。

34009 竹叶汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】人参一钱 白术 当归各二钱 川芎七分 甘草四分 陈皮三分 黄芩八分 枣仁 麦冬各一钱 远志八分 生地五分 竹叶十个

【主治】妊娠心惊胆怯，烦闷不安。

【加减】渴，加竹茹七分。

34010 竹叶汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】白茯苓二钱 麦门冬(去心) 黄

芩各一钱五分 淡竹叶七片 灯心十茎

【用法】水煎服，每日二次。

【主治】子烦，责之心虚有火。平素火盛，或值天时炎热，内外之火相亢而心惊胆怯，烦躁不安者。

34011 竹叶汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】麦门冬一钱五分 茯苓 黄连各一钱 人参五分 淡竹叶十片

【主治】子烦。妊娠心虚而心惊胆怯，终日烦闷。

【加减】相火重，加知母；有痰，加竹沥。

【方论选录】麦门冬甘淡微苦，以补心泻火，且以清金保肺；茯苓宁心安神，且去胸膈积湿；黄连降泄心火，兼能泻肝胆火。妊娠之火，虚火也，火必伤肺，伤肺则气不足，人参、麦冬以补之。淡竹叶升肝胆之阳于膈上而舒散之。故能治惊怯，解心烦。

34012 竹叶汤

【方源】《女科切要》卷五。

【组成】淡竹叶 麦冬肉 黄芩 人参 茯苓 防风 知母

【用法】水煎服。

【主治】子烦。

34013 竹叶汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】茯神四钱 麦冬 黄芩 知母各二钱 竹叶十四片

【主治】子烦。妊娠烦躁闷乱。

34014 竹叶汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归一钱 川芎五分 黄芩 熟地 麦冬(去心) 白芍(酒炒) 茯苓各一钱 竹叶五片

【主治】子烦。妊娠心惊胆怯，烦闷不安。

【加减】如胃寒，去黄芩。

34015 竹叶饮

【方源】方出《延年秘录》引蒋孝璋方(见《外台》卷二十一)，名见《普济方》卷七十三。

【组成】竹叶一握 麦一升(淘) 地骨白皮三分

【用法】以水五升,煮取二升,以麦烂为度,食后分二服。

【主治】痰热眼赤头痛。

34016 竹叶饮

【方源】《外台》卷二十一引《延年秘录》。

【异名】竹叶汤(《普济方》卷七十三)。

【组成】竹叶一握 犀角屑 升麻 干葛各二两 黄芩 麦门冬(去心)各三两

【用法】上切。以水六升,煮取二升,分为三服。

【主治】痰热眼赤头痛。

34017 竹叶饮

【方源】《千金》卷十七。

【异名】竹叶饮子(《千金方衍义》卷十七)。

【组成】竹叶 紫苏子各二升 紫菀 白前各二两 百部 甘草 生姜各三两

【用法】上咬咀。以水八升,煮取三升,温以送下桂心丸。

【主治】热发气上冲,不得息,欲死不得卧。

34018 竹叶饮

【方源】《外台》卷十三引《崔氏方》。

【组成】竹叶一握 麦门冬一升(去心) 大枣二十个(擘) 甘草三两(炙) 半夏一升(汤洗令滑尽) 粳米五合 生姜三两

【用法】上切。以水五升,煮取二升半,分三次温服。

【主治】骨蒸,唇干口燥,欲得饮水止渴。

【宜忌】忌羊肉、饴、海藻、菰菜。

34019 竹叶酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】淡竹叶

【用法】煎汁,如常酿酒饮。

【功用】清心畅意。

【主治】诸风热病。

34020 竹叶散

【方源】方出《圣惠》卷三十二,名见《普济方》卷七十三。

【组成】淡竹叶一两 黄连一两(去须) 黄柏一两半

【用法】上锉细。以水三大盏,煎取一中盏,绵滤去滓,每日三四次点之。

【主治】眼赤烂。

34021 竹叶散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】苦竹笋叶不以多少

【用法】上烧灰,为细末。食后入蜜少许调服。

【主治】小儿倒嵌不发。

34022 竹叶散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】青竹叶二两(烧灰) 灶中黄土一两

【用法】上为细散。看丹发处,每用少许,以鸡子白调,涂患处。

【主治】小儿野火丹,丹发斑如梅子,遍背腹。

34023 竹叶粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】苦竹叶粥(《圣济总录》卷一九〇)。

【组成】竹叶五十片(洗净) 石膏三两 沙糖一两 折梗米二两

【用法】以水三大盏,煎石膏等二味,取二盏,去滓澄清,用米煮粥,粥熟,入沙糖食之。

【功用】《药粥疗法》:清心火,除烦热。

【主治】风热目赤头痛;温病口渴心烦,口舌生疮,小便黄赤;痈疽肿毒。

①《圣惠》:膈上风热,头目赤痛,目视眈眈。②《圣济总录》:发背痈疽,诸热毒肿。③《饮食疗法》引《老老恒言》:内热目赤头痛;时邪发热。④《饮食疗法》:温热病口渴多饮,心烦,目赤,口舌生疮糜烂,小便黄赤短少,或淋痛,以及小儿高热惊风,中暑。

【宜忌】《饮食疗法》:凡胃寒病人或阴虚发热者不宜选用。在发热期间,竹叶粥宜煮稀

薄，不要稠厚。

34024 竹叶粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】甜竹叶一握（细切） 粟米二合（净淘）

【用法】以水二升，煮竹叶，取一升，去滓，投米作粥食。

【主治】风热风痢，心烦惊悸。

34025 竹叶煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】竹叶二握（洗净，切） 大枣五枚（擘碎） 古字钱七枚 黄连半两（去须，捣为末）

【用法】上药令和，纳铜器中，以水一盞，煎至五分，绵滤去滓，又重煎取三分，纳瓷瓶子中盛。每以铜箸头取少许，点目眦头，一日三五次。

【主治】眼赤痛。

34026 竹叶膏

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】小网虾三十尾（去头壳尾）

【用法】先用小网虾同糯米饭一合研细。临卧以帛扎患处上下，次以青纱罩疮，却将虾饭敷青纱上，别用青纱罩饭之上系定，至五更初解纱，连虾饭揭起，挂空闲处，皆是小赤虫，即以汉椒、葱白煎汤，候温淋洗，次用旧茶笼内白竹叶，随疮大小剪贴，软帛系之，一日二换，直待汁水出尽，方以好膏药贴，逐日煎苦楝根汤淋洗，仍换膏药，直待生肉将满，则不用膏药，其疮口只如筋尾许，乃可以血竭或降真香节夹白薇收平疮口。

【主治】两脚骨臃疮。

【宜忌】切忌动风发气等物。

34027 竹叶膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】生竹叶（去梗净）一斤 生姜四两 净白盐六两

【用法】先将竹叶熬出浓汁，又将姜捣汁，同熬沥净，将盐同熬干。擦牙。

【主治】①《青囊秘传》：牙痛。②《慈禧光绪医方选议》：皮肤湿热疮疡。

【方论选录】《慈禧光绪医方选议》：此宫中秘方。竹叶体轻气薄，味甘而淡，性寒，方书谓其凉心缓脾，清痰止渴，属清利之品。古方竹叶石膏汤、导赤散并皆用之。竹叶分鲜竹叶与淡竹叶两种，都能清心除烦，利小便，但鲜竹叶清心热力大，且能凉胃，多用于上焦风热；淡竹叶渗湿泄热为优，实验提示对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用。光绪帝久病知医，留意方药，用此熬膏外敷，当系治皮肤湿热疮疡。用生姜汁同熬，意在辛能散结，助竹叶清热渗湿之力。

34028 竹皮汤

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二。

【组成】青竹茹二升

【用法】以水三升，煮令五六沸，然后绞去滓，温服之。

【功用】《济阴纲目》：清心凉肝。

【主治】时病交接劳复，瘴气，妊娠心痛，胎动不安，或妇人月水不断。

①《肘后方》：时气病交接劳复，阴卵肿，或缩入腹，腹中绞痛或便绝。②《外台》引《千金》：瘴气。③《普济方》引《千金》：妊娠心痛，因落床或倒地，胎有所伤。④《普济方》引《圣惠》：妊娠烦躁，或胎不安，或口干。⑤《圣济总录》：妇人月水不断。

【备考】本方方名，《外台》卷四引作“竹茹汤”。

34029 竹皮汤

【方源】《外台》卷九（注文）引《深师方》。

【组成】生竹皮三两 紫苑二两 饴糖一斤 生地黄汁一升

【用法】上切。以水六升，煮取三升，分三服。

【主治】咳逆，下血不息。

【宜忌】忌芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：咳逆下血，而用竹茹清胃，紫苑和血，饴糖滋津，地黄逐血，然必不经火焙之鲜者方有散血之功，若止血之用，必明标干地黄矣。设无鲜者，不妨以干者酒浸，或稍加桂心，热因热用，要在临时权变可也。

34030 竹皮汤

【方源】《千金》卷十六。

【异名】竹皮散（《奇效良方》卷十六）。

【组成】竹皮（一方用竹叶） 细辛各二两 甘草 生姜 通草 人参 茯苓 麻黄 桂心 五味子各一两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮竹皮，减二升，去竹皮下药，煮取三升，分三次服。

【主治】噎，声不出。

【方论选录】《千金方衍义》：噎本胃病，加以暴寒折之，所以声瘖不出，但欲彻外邪先固正气，麻黄、细辛专散暴邪，生姜、通草专通声气，人参、茯苓专培本元，竹皮清肺胃之虚火，桂心助参、苓之温补，五味收麻黄之开发，甘草和敛散之味也。

34031 竹皮汤

【方源】《千金》卷二十五。

【组成】青竹刮取茹鸡子大二枚 乱发鸡子大二枚

【用法】上药于炭火炙令焦燥，合治下筛。以酒一升煮之，三沸止，一服尽之。三服愈。

【主治】为兵杖所加，木石所连，血在胸背，及胸中痛，不得气息。

【方论选录】《千金方衍义》：身为木石所连，兵杖所加而蕴热，故用竹茹以治烦热胃逆，发灰以散蓄血也。

34032 竹皮汤

《千金翼》卷七。为《千金》卷三“竹茹汤”之异名。见该条。

34033 竹皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】竹皮 甘草（炙）各一两 人参 赤茯苓（去黑皮） 麻黄（去根节，先煎，掠

去沫，焙） 桂（去粗皮） 五味子 木通（锉）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分（拍破），煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】喉中如有物噎塞，声气不出。

34034 竹皮汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】青竹皮 甘草（炙） 芎劳 黄芩 当归（洗）各六分 芍药 白术 人参 桂心各一两

【用法】上为散。每服五钱，水二盞，煎至一盞，去滓温服。

【主治】血证，由怒气伤肝胆，血随呕出，胸中痞闷，呕毕则目睛痛而气急。

34035 竹皮散

《奇效良方》卷十六。为《千金》卷十六“竹皮汤”之异名。见该条。

34036 竹麦饮

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】竹叶 小麦 石膏分量临时酌定

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫发黄。

34037 竹豆汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】新青竹（碎如箬子）四十九茎 乌豆二升

【用法】以水八升，煮令豆烂，去滓，再煎取一升。每服二合灌之；或口噤不开者，即斡口灌之。

【主治】中风失音不语。

34038 竹沥丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】白术（蜜炒） 厚朴 甘草（水煎）各二钱半 附子 犀角各一钱 全蝎七个（每个用薄荷叶裹，汤泡一宿，炙黄）

【用法】上为末，竹沥为丸，如黑豆大。每服一丸，金银薄荷煎汤化服。

【功用】清心豁痰。

【主治】血滞心窍，邪气在心，积惊成痫。

34039 竹沥丸

《医学金针》卷三。为《摄生众妙方》卷六“竹沥达痰丸”之异名。见该条。

34040 竹沥水

《全国中药成药处方集》(天津方)。为《圣济总录》卷一三九“竹沥饮”之异名。见该条。

34041 竹沥曲

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】生半夏(漂净)八十两 白芥子二十六两七钱

【用法】上为细末,用竹沥三十两拌和,加糊成曲。每次三钱,包煎,服汤。

【主治】痰涎上逆,喘不得卧,气急咳嗽。

34042 竹沥汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】秦艽 甘草(炙) 防风 当归各二两 茵芋 乌头(炮) 干姜 细辛 人参 黄芩 桂心 天雄(炮) 木防己 茯苓 白术各一两

【用法】上切。以竹沥一斗半,煮取五升。

【主治】大虚挟风,及贼风入腹,腹中拘痛,烦乱恍惚,妄语迷惑不知人,口噤不开,手足缓纵,饮食不作肉,卧惊见屋中光,口干恶风,时时失精,梦寐沉重,及妇人产后余病,体虚受风,躁愤欲死。

【宜忌】忌海藻、菰菜、猪肉、冷水、生葱、生菜、桃、李、雀肉、酢物等。

【加减】胸胁满,加前胡二两半,半夏二两(洗),术、附(炮)各一两;腹中痛,加芍药二两、椒一两;汗烦,加知母一两;口干,加麦门冬一两(去心);体痹,加麻黄二两(去节)。

34043 竹沥汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】淡竹沥一斗 防风 葛根各一两 菊花 细辛 芍药 白术 当归 桂心 通草 防己 人参各一两 甘草(炙) 附子(炮) 茯苓 玄参各一两 秦艽 生姜各二两 枫寄生三两

【用法】上切。以淡竹沥一斗,煮药取四升,分为四服。

【主治】卒中恶风,噎倒闷,口噤不能语,肝厥。

34044 竹沥汤

【方源】《证类本草》卷十三引《梅师方》。

【组成】茯苓三两 竹沥一升

【用法】用水四升,合竹沥煎取二升,分三服,不愈重作,亦时时服竹沥。

【主治】子烦,妊娠恒若烦闷。

34045 竹沥汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】竹沥一升 防风 黄芩 麦门冬各三两 茯苓四两

【用法】上咬咀。以水四升,合竹沥,煮取二升,分三服,不愈再作。

【主治】子烦,妊娠常苦烦闷。

【宜忌】《外台》:忌酢物。

34046 竹沥汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】竹沥五合 黄芩三十铢 木防己 羚羊角各六铢 大黄二两 茵芋三铢 麻黄 白薇 桑寄生 葶藶 甘草各半两 白术六铢(一方作白鲜)(一方无葶藶)

【用法】上咬咀。以水二升半,煮取药减半,加竹沥,煎取一升,分服二合,相去一食久,进一服。

【主治】小儿头身患小疮,咳嗽,经治后变痼证,四肢缩动,背脊𦓐𦓐,眼反。

【方论选录】《千金方衍义》:咳嗽有六淫七情,经络脏腑,种种不侔,此专因胎毒发疮后变发痼。与竹沥治痰涤热,虽得小疏,然非吐下不能大朽其势,故用麻黄、白薇开发肺气于上,即用大黄、黄芩、竹沥疏利大肠于下,羚羊、防己、葶藶、寄生、茵芋专为热毒发痼而设,白术、甘草和中实脾,师旅之粮饷也。

【备考】小儿出胎二百许日,头身患小小疮,治获小瘥,复发,五月中忽小小咳嗽,微

温和治之，因变痢，一日二十过发，四肢缩动，背脊𦏧𦏧，眼反，须臾气绝，良久复苏，已与常治痢汤，得快吐下，经日不间，尔后单与竹沥汁，稍进，一日一夕中合进一升许，发时小疏，明日与此竹沥汤，得吐下，发便大折，其间犹稍稍与竹沥汁。

34047 竹沥汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】竹沥饮子（《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》）。

【组成】竹沥二升 生葛汁一升 生姜汁三合

【用法】上药相和，分三次温暖服，平旦、日晡、夜各一服。

【功用】《法律》：消风清热开痰。

【主治】风痲。四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。

【宜忌】《外台》：服药当须慎酒、面、羊肉、生菜、冷食、猪、鱼、鸡、牛、马、蒜。

【备考】服訖，觉四体有异似好，次进后汤方。

34048 竹沥汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】麻黄 防风各一两半 芎藭 防己 附子 人参 芍药 黄芩 甘草 桂心 各一两 生姜四两 石膏六两 杏仁四十枚 竹沥一升 羚羊角二两，生葛汁五合

【用法】上咬咀。以水七升煮减半，加沥煮取二升五合，分三服取汗，间五日更服一剂，频与三剂。

【主治】风痲。四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菰菜、生葱。

【方论选录】《医略六书》：人参补气以生阴血，附子扶阳以振生气，黄芩、石膏清热于内，防风、麻黄疏风于外，防己泻血分湿热，杏仁降胸中逆气，芎藭活血脉，芍药敛营阴，羚羊清肝火，甘草缓中州，桂心温血于营，姜

汁行气于卫，竹沥、葛汁解燥热以滋液豁痰，俾痰化液充，则筋脉得养，何患痲风之不愈哉。

【备考】服訖，渐觉少损，仍进后方。本方方名，《张氏医通》引作“竹沥饮子”。

34049 竹沥汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】竹沥三升 防己 升麻 桂心 芎藭 羚羊角各二两 麻黄三两 防风二两

【用法】上咬咀。以水四升，合竹沥，煮取二升半，分三服，两日服一剂，频进三剂。

【主治】①《千金》：风痲。四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。②《外台》：卒暴风口面僻，半身不随不转。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菰菜、生葱。

【加减】常用加独活三两最佳，若手足冷者；加生姜五两、白术二两。

【备考】服訖，若未除，更进后汤方。

34050 竹沥汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】防风 麻黄 芍药各一两半 防己 桂心 黄芩 白术 附子（一本作杏仁四十枚） 羚羊角 竹沥一升 甘草（一本作葛根二两） 人参 芎藭 独活 升麻 各一两 生姜 石膏各二两

【用法】上咬咀。以水八升，煮减半，加沥煮取二升半，分三服，相去如人行十里更服。

【主治】风痲。四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菰菜、桃、李、生葱、雀肉等。

【加减】若有气者，加橘皮、牛膝、五加皮各一两。

【备考】方中用量不全，《外台》引《千金》用防风、麻黄、芍药各一两半，防己、桂心、黄芩各一两，附子三分，甘草、白术、人参、芎藭、独活各一两，竹沥一升、羚羊角二两，升麻一两，石膏二两，生姜二两。

34051 竹沥汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】淡竹沥一升 石膏八两 芍药 白术 栀子仁 人参各三两 知母 茯神 赤石脂 紫菀各二两 生地黄汁一升

【用法】上咬咀。以水九升，煮十味，取二升七合，去滓，下竹沥更煎，取三升，分三服。

【主治】心实热，惊梦喜笑，恐畏悸懽不安。

【宜忌】《外台》：忌桃、李、雀肉、酢物、茺莢。

【加减】若须利，加芒消二两，去芍药。

【方论选录】《千金方衍义》：胃为五脏之本，心为五脏之主。胃气不得转运，外则身热，内则便难，包络之火散漫，无以主持神识，故用参、术、茯神实其中土，则火不致于乘虚内扰，地黄、芍药、石膏、知母、竹沥、栀子仁得以建清心降火之功，紫菀开结气于上，石脂固药力于下也。

34052 竹沥汤

【方源】《妇人良方》卷三引《必效方》。

【异名】小竹沥汤（《三因》卷二）。

【组成】秦艽 防风 独活 附子各一分

【用法】上咬咀。以水四盏，煎至二盏，加生地黄汁、淡竹沥各半盏，再煎四五沸，去滓，分作四服，不拘时候，温服。病势去，以他药扶持，未愈再作。

【主治】中风涎潮，谵语昏塞，四肢缓纵。

34053 竹沥汤

【方源】《外台》卷三十六引《广济方》。

【异名】竹沥葛根汤（《幼幼新书》卷十四引《婴童方》）。

【组成】淡竹沥一升二合 葛根汁五合 牛黄豆粒大三颗（研）

【用法】上药相和。与儿服，一岁至五六岁，一合至三合五合，再服，以意增减之。

【主治】小儿壮热隐疹。

34054 竹沥汤

【方源】方出《圣惠》卷三，名见《普济方》卷八十九。

【异名】竹沥饮（《医略六书》卷十八）。

【组成】竹沥三合 荆沥三合 生姜汁半合 白蜜一合 葛根汁二合

【用法】上药都拌匀。每温服一合，宜频服。

【主治】肝中风，心神烦热，言语謇涩，少得眠卧。

【方论选录】《医略六书》：中风遇热直入厥阴，木火不得发舒，故烦热语涩，不能眠卧焉。弦为肝脉，数主火炎，可见木郁火伏，乃不可以直折奏功，所以取用竹沥、姜汁行经豁痰，葛汁、白蜜疏风润燥，荆沥清气化痰也。俾痰化风消，则遏热顿降，而肝脏肃清，无不神宁语朗，何眠卧之有不安哉。

34055 竹沥汤

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】竹沥三升 川大黄一两 黄连一两 苦参一两 黄芩一两 栀子仁一两 石灰一两 木兰皮一两 黄柏一两

【用法】上锉细。以水五升，入竹沥，煮药至三升，去滓，以绵搵汤搗疮上，一日十余次。

【主治】发背肿痛。

34056 竹沥汤

《圣济总录》卷七。为《圣惠》卷八十三“竹沥饮子”之异名。见该条。

34057 竹沥汤

《圣济总录》卷七。为《圣惠》卷七十四“竹沥饮子”之异名。见该条。

34058 竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】竹沥（汤成下） 甘草（炙，锉） 秦艽（去苗土） 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 白术（炒） 桂（去粗皮） 防己 干姜（炮）各半两 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）三两 葛根 防风（去叉）各一两 附子（炮裂，去皮脐）半枚 升麻三分

【用法】上药除竹沥外，锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入竹沥一合，更煎一沸，空心温服，日晚各一次。

【主治】风腰脚痹弱，或脚胫转筋，或皮肉胀起如肿，而按之不陷，心中烦懊，不欲饮食，或夙患风气者。

34059 竹沥汤

《圣济总录》卷四十一。为《千金》卷七“第一竹沥汤”之异名。见该条。

34060 竹沥汤

《圣济总录》卷六十七。为《千金》卷十“竹沥泄热汤”之异名。见该条。

34061 竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】防风（去叉） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心） 升麻 石膏（碎） 梔子仁各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，竹沥半合，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】妊娠心下烦懊热躁。

34062 竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】竹沥半两 防风（去叉）一两半 升麻一两一分 羌活（去芦头） 桂（去粗皮） 芎藭 羚羊角屑各一两 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）一两半 杏仁（去皮尖双仁，炒）八十枚

【用法】上药除竹沥外，为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，入竹沥半合，再煎至七分，不拘时候温服。

【主治】产后中风，口喎，言语不利，手足不随。

34063 竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】秦艽（去苗土） 甘草（炙） 防风（去叉） 当归（切，焙）各一两 茵芋（去粗茎） 乌头（炮裂，去皮脐） 干姜（炮） 细辛（去苗叶） 人参 黄芩（去黑心） 桂（去粗皮） 天雄（炮裂，去皮

脐） 防己 白茯苓（去黑皮） 白术各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以竹沥并水合一盞，煎取六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，角弓反张；及贼风入腹，腹中拘痛，烦乱惚恍，忘误迷惑，不知人事，口噤不开，手足缓纵；产后余病，体虚受风，烦懊欲死。

34064 竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】竹沥一合 黄芩（去黑心）一两一分 防己 茵芋（去粗茎） 桑寄生 羚羊角（镑）各一分 大黄（锉，炒）二两 甘草（炙） 白薇 麻黄（去节） 白鲜皮各半两

【用法】上药除竹沥外，为粗末。每服一钱匕，水一小盞，煎至五分，去滓，入竹沥半合，分三次温服，至夜服尽。

【主治】小儿诸病。

34065 竹沥汤

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】升麻 防风各一两半 附子 白术各一两 甘草 秦艽 葛根 黄芩 麻黄 防己 细辛 干姜 桂各一两 茯苓三两 杏仁半两

【用法】上为粗末。每服三大钱匕，竹沥一合，水一盞，同煎至八分，去滓，空心服。

【主治】两脚痹弱，脉浮大而紧，或转筋，皮肉不仁，腹胀起如肿，按之不陷指，必中恶或患冷。

34066 竹沥汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】威灵仙（去苗，洗） 附子（炮裂，去皮脐） 桔梗（炒） 防风（去叉股） 蔓荆子（拣） 枳壳（去瓢，细切，麸炒黄） 川芎（洗） 当归（洗，去芦，薄切，焙）各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞，竹

沥半盏，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服，一日三四次。

【主治】中风入脾肝，经年四肢不遂，舌强语蹇。

【宜忌】忌茗。

【方论选录】《本事方释义》：威灵仙气味苦平微辛咸，去风利水，通十二经脉；附子气味辛咸大热，入手足少阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴及足少阴，能利咽喉；防风气味苦辛甘温，入手足太阳；蔓荆子气味苦微温，入足太阳，上行而散；枳壳气味苦寒，入足太阴；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴，能行头目；当归气味苦辛甘温，入心脾。此治风邪入肝脾，久不能愈者，诸药之升降搜逐，藉竹沥之甘寒滑润，兼能利窍，生姜之辛温达表，邪不能容留经络，其疾自当去矣。

34067 竹沥汤

【方源】《普济方》卷三六〇引《傅氏活婴方》。

【组成】朱砂 麝香

【用法】上为细末，收之。如用，先将苦竹一束，除去两头节，火烧取油一二合，入淡竹叶汤点服。

【主治】小儿口噤体热。

34068 竹沥汤

《普济方》卷九十八。即《千金》卷七“第三竹沥汤”。见该条。

34069 竹沥汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】钩藤 茯神 黄芩 升麻 白鲜皮 沙参各二两 龙齿二两 蚱蝉七枚（去翅，炙，研，汤成纳之） 石膏八两 寒水石六两（研） 甘竹沥二升（汤热纳之）

【用法】以水九升，煮取三升，分三次温服，相去六七里久。

【主治】小儿暴得惊痫。

【宜忌】忌酸物。

34070 竹沥汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】竹沥一升 麻黄八分 附子一钱半（炒） 防己三钱 干姜一钱半（炒） 白术一钱半（炒） 葛根一钱半 甘草五分 防风一钱半 桂心一钱半

【用法】水九升，合竹沥煮三升，分三次温服。

【主治】脚气痹弱，脉浮细数者。

【方论选录】阳虚津气不足，风寒湿得以袭入经中，故足胫痹弱，脚气疼痛，不能行焉，然邪盛则实，既用附子补火扶阳以御寒，即用麻黄发表逐邪以开痹，桂心温经暖血，葛根解肌生津，防风疏腠理以散风，干姜暖中和气以逐温，甘草缓中和药，白术燥湿健脾，防己走血分热泻湿气以防温药，竹沥滋津液养筋脉以起痹弱也。水煎温服，使外邪解散，则经气清和而津液内充，痹弱可健，何脚气疼软之不痊哉。此温散生津之剂，为阳虚邪袭脚气疼软之专方。

34071 竹沥汤

《医部全录》卷四二一。为《圣济总录》卷一三九“竹沥饮”之异名。见该条。

34072 竹沥汤

《金匱翼》卷一。为《千金》卷八“荆沥方”之异名。见该条。

34073 竹沥饮

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】淡竹沥一合 粳米一合（炒，以水二盏同研，去滓取汁）

【用法】上药都和匀，顿服之。

【主治】霍乱狂闷，烦渴，吐泻无度，气欲绝者。

34074 竹沥饮

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【异名】竹沥汤（《医部全录》卷四二一）、竹沥水（《全国中药成药处方集》天津方）。

【组成】竹沥三升

【用法】上药先温暖，分作五六服。发口灌之。

【功用】《全国中药成药处方集》（天津方）：

清肺热，化痰。

【主治】中风不语，颈项强直，身体拘急，痰热咳嗽，瘟疫烦躁，小儿惊痫。

①《圣济总录》：伤折不能慎避，令人中风，发痉口噤，若已觉中风颈项强直，身中拘急者。②《卫生总微》：小儿惊热如火，温壮。③《松峰说疫》：瘟疫烦躁。④《全国中药成药处方集》（天津方）：痰热咳嗽，湿热头眩。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（天津方）：虚寒性咳嗽忌服。

34075 竹沥饮

《普济方》卷三八四。为《圣惠》卷八十三“竹沥磨犀角饮子”之异名。见该条。

34076 竹沥饮

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】防己汤。

【组成】防己 防风 桑寄生 人参 当归 川芎 独活 竹沥 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子痫。

34077 竹沥饮

《医略六书》卷十八。为方出《圣惠》卷三，名见《普济方》卷八十九“竹沥汤”之异名。见该条。

34078 竹沥粥

【方源】《医方类聚》卷二二七引《食医心鉴》。

【组成】粟米三合。

【用法】上煮粥，临熟下淡竹沥三合，搅令匀，空心食之。

【功用】《长寿药粥谱》：清热、化痰、开窍。

【主治】①《医方类聚》引《食医心鉴》：子烦，妊娠恒苦烦闷。②《长寿药粥谱》：中风昏迷，喉间痰鸣，高热烦渴，肺热咳嗽，气喘胸闷。

34079 竹沥膏

【方源】《幼幼新书》卷十三引张涣方。

【组成】竹沥（依法旋取） 生地黄（取汁） 蜜各半合（以上搅匀） 桂心（为

末） 石菖蒲（一寸九节者，取末）各一两

【用法】上药都拌匀，慢火熬成膏，硬软得所，如皂子大。每服一粒，取梨汁化下。

【主治】小儿中风，失音不语，牙关紧急。

34080 竹沥膏

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《家宝》。

【组成】白术一分（蜜炒） 大附子（去皮脐，炮）一钱 全蝎七个（每个用七叶薄荷裹，汤泡麻黄，令软缠定，慢火炙黄色） 犀角（镑末）一钱 厚朴（用甘草水煮，焙干）一分

【用法】上为末，竹沥为膏，旋丸。婴孩每服一黑豆大，二三岁一皂子大，四五岁龙眼核大，以意加减，薄荷汤化下。

【主治】①《幼幼新书》引《家宝》：婴孩久泻，久患脾虚，发搐变作慢惊风，或作慢脾风等。②《袖珍》引汤氏方：小儿诸病。

34081 竹沥膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】竹沥

【用法】用水白竹截长二尺许，每段劈作四片，以砖二块排定，将竹片仰架砖上，两头露一二寸，下以烈火迫之，两头以盆盛沥。每六分中加生姜汁一分服之。痰热甚者，只可加半分耳。

【功用】养血清热。

【主治】痰厥不省人事，几死者。

34082 竹沥膏

【方源】《全国中药成药处方集》（福州方）。

【组成】天竺黄三两 鲜瓜蒌十六两 朱砂五钱 枳壳 桔梗 胆星 川贝 川连各三两 九节菖蒲七钱 鲜竹沥八两

【用法】共煎成膏服。

【主治】痰火上炎，痰迷心窍，以及中风气喘，小儿惊风发痫。

34083 竹茹丸

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《婴童宝鉴》。

【组成】黄连一两(好者,锉作块子,一一相似,茱萸一两,二味相和,滴蜜炒,令黄赤色,去茱萸)

【用法】上为末,薄糊为丸,如萝卜子大。每服十丸,竹茹煎饭饮吞下。

【主治】①《幼幼新书》引《婴童宝鉴》:小儿渴泻。②《卫生总微》:小儿疳气泄泻,烦渴。

34084 竹茹丸

【方源】《妇人良方》卷一引邓元老方。

【组成】当归 白术 青木香 蚕蛻(煨) 黑棕刷(煨) 川山甲(煨) 各一两 地榆 竹茹 川芎 白茯苓 粉草 血余(煨) 牡蛎(煨) 绵子(煨) 各半两 熟地黄四两 赤石脂(煨) 三两

【用法】上七味煨药用绵子裹定,入瓶子内,用盐泥固济,用炭火半煨存性,却同前药碾为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心温酒送下。

【主治】妇人崩中,赤白带下。

34085 竹茹丸

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】竹茹一斤 羊脂八两 蜜三两

【用法】上为丸,如枣核大。每服三个。

【主治】心腹痛。

34086 竹茹丹

【方源】《普济方》卷三八七引《医方妙选》。

【组成】竹茹 枇杷叶 人参 半夏(汤浸七次) 紫菀 天南星(炮) 各半两

【用法】上为细末,生姜汁和,如黍米大。每服十粒,生姜汤送下。

【功用】通肺。

【主治】小儿喘。

34087 竹茹汤

【方源】《医心方》卷十三引《小品方》。

【组成】竹茹二升 甘草六分 当归六分 芍药六分 黄芩六分 桂心一两 术一两 人参一两 芍药一两

【用法】以水一斗,煮取三升,分四服。

【主治】吐血、汗血、大小便血。

【方论选录】《千金方衍义》:竹茹、黄芩上清虚热,桂心下导虚阳,芍、归、芍药引血归经,参、术、甘草资气于胃,上下失血无不宜之。

34088 竹茹汤

【方源】方出《外台》卷三十三引《集验方》,名见《医心方》卷二十二引《产经》。

【异名】青竹茹汤(《摄生众妙方》卷十一)。

【组成】青竹茹三两 生姜四两 半夏五两 茯苓四两 橘皮三两

【用法】上切。以水六升,煮取二升半,分三服。

【功用】《摄生众妙方》:清痰止呕。

【主治】①《医心方》引《集验方》:妊娠二三月,恶阻呕吐不下食。②《产科发蒙》引《产经》:痰热恶阻。

【宜忌】①《摄生众妙方》:忌羊肉、汤、鲋等物。②《医统》:忌鸡、鱼、面食。

【备考】《景岳全书》有梗米。

34089 竹茹汤

【方源】《医心方》卷三引《古今录验》。

【组成】生竹茹四两(去上青) 生姜四两 甘草二两 前胡二两 茯苓二两 橘皮一两

【用法】以水六升,煮取二升,分服,半日尽。

【主治】胸中客热,口生疮烂,不得食。

34090 竹茹汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】竹皮汤(《千金翼》卷七)。

【组成】竹茹二升 干地黄四两 人参 芍药 桔梗 芍药 当归 甘草 桂心各一两

【用法】上咬咀。以水一斗,煮取三升,分三服。

【主治】妇人汗血、吐血、尿血、下血。

【方论选录】《千金方衍义》:竹茹为亡血发

渴专药，芎藭、芍、地为滋血专药，人参、甘草为扶胃专药，桂心专行四物之滞，桔梗专助人参之力。

34091 竹茹汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【异名】竹茹饮子（《圣惠》卷十一）。

【组成】竹茹一升 橘皮 半夏（洗）各三两 生姜四两（切） 紫苏一两 甘草一两（炙）

【用法】上咬咀。以水六升，煮取二升半，分三服。

【主治】①《千金翼》：哕。②《圣惠》：伤寒干呕不止。

34092 竹茹汤

《外台》卷四。即方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷四“竹皮汤”。见该条。

34093 竹茹汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】青竹茹一两 黄芩一两 枳壳一两（麸炒微黄） 甘草半两（生用） 麦门冬一两（去心） 茅根半两 栝楼根一两 赤芍药半两 栀子仁半两

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，小麦半合，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，烦热，心胸痰逆，不纳饮食。

34094 竹茹汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《圣惠》。

【异名】竹茹麦冬汤（《盘珠集》卷下）。

【组成】青竹茹 麦冬各三钱 前胡二钱 橘皮一钱 芦根半握

【用法】上锉。水煎服。

【主治】①《东医宝鉴·杂病篇》引《圣惠》：恶阻。②《盘珠集》：妊娠肝火冲胃，心中烦愤热闷，呕逆不止。

34095 竹茹汤

【方源】《本事》卷四引《孙兆方》。

【异名】葛根竹茹汤（《医学入门》卷七）。

【组成】干葛三两 甘草三分（炙） 半夏三分（姜汁半盏、浆水一升煮耗半）

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，竹茹一弹子大，大枣一个，同煎至一盏，去滓温服。

【主治】胃热呕吐，饮酒过多而呕。

①《本事》：胃热呕吐。②《普济方》引《济生》：胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。③《医方考》：伤寒正汗后，余热留于阳明、少阳，必令作呕。④《医学六要》：因饮酒过度而呕。

【方论选录】①《医方考》：阳明，胃也；少阳，胆也。有辨焉，口渴者热在胃，口苦者热在胆也；兼而有之，则二经均有留热矣。是方也，干葛清胃，竹茹清胆，半夏破逆，甘草调阳。②《本事方释义》：干葛气味辛微温，能解酒毒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；半夏气味辛温，入足阳明；竹茹味甘寒，入足阳明；姜、枣以和荣卫。胃热呕吐不止，亦必因胃中酒气蕴热，故以微辛温之药令其入胃，引入甘寒之品，则酒热稍解，气得下降，胃气安而病自己也。

【临症举例】胃热呕吐 《本事》：政和中一宗人病伤寒，得汗身凉，数日忽呕吐，药与饮食俱不下，医者皆进丁香、藿香、滑石等药，下咽即吐。予曰，此正汗后余热留胃脘，孙兆竹茹汤正相当尔。治药与之，即时愈。

34096 竹茹汤

《圣济总录》卷二十三。为《圣惠》卷十“竹茹饮子”之异名。见该条。

34097 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】青竹茹 葛根各一两 半夏（汤洗七遍，焙干） 麦门冬（去心，焙）各三分 甘草 陈橘皮（汤浸去白，焙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分拍碎，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后，上气烦满，客热在脏，干

呕，口中生疮，不得饮食。

34098 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】淡竹茹半两 人参一两 前胡(去芦头)三分 甘草半两(炙) 芦根一两 葛根三分 半夏半两(汤洗七遍，切，焙干)

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分(拍碎)，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒胃气虚热，干呕不止。

34099 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】青竹茹 木通(锉)各一两 甘草(炙，锉)一分 连翘 芦根(锉) 蒲黄各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加灯心少许，生姜一枣大(拍碎)，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒小便出血。

34100 竹茹汤

《圣济总录》卷二十六。为《圣惠》卷十三“竹茹饮子”之异名。见该条。

34101 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】青竹茹 黄芩(去黑心)各一两 蒲黄 伏龙肝各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，下藕汁一合，搅匀，食后温服。

【主治】伤寒鼻衄不止。

34102 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】青竹茹鸡子大一块 生地黄半两(拍碎)

【用法】以水一盞半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒鼻衄不止。

34103 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】竹茹二合(新竹者) 甘草一分

(锉) 乌梅二枚(椎破)

【用法】用水一盞半，煎取八分，去滓，放温，时时细呷。

【主治】伤暑烦渴不止。

34104 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】青竹茹(锉)一升 芍药二两 芎藭 当归(切，焙) 桂(去粗皮) 甘草(炙，锉)各三两 黄芩(去黑心)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】吐血、溺血、衄血。

34105 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生竹茹 生地黄(切，焙) 黄芩(去黑心)各二两 蒲黄 芍药 麦门冬(去心皮)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】热盛所致衄血、汗血。

34106 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】竹茹 前胡(去芦头) 白茯苓(去黑皮) 人参各一两 甘草(炙，锉) 贝母(去心，炒)各三分 桑根白皮(锉) 赤小豆各一两半 柴胡(去苗) 麦门冬(去心，焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜、竹叶各五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心劳潮热，肌瘦，四肢烦疼。

34107 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】青竹茹 人参 续断 桔梗(炒) 五味子 紫菀(去土) 桑根白皮(锉) 前胡(去芦头) 麦门冬(去心，焙) 赤小豆 甘草(炙，锉) 熟干地黄(焙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

煎至七分，去滓温服。

【主治】虚劳盗汗，日晡潮热。

34108 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】竹茹 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一分 桔梗（锉，炒） 犀角（镑） 黄耆（锉） 栝楼根各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】喉中肿痛。

34109 竹茹汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】竹茹 橘皮 甘草 半夏 赤茯苓 麦冬 人参 枇杷叶

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】胃受邪热气浊，阴阳浑乱，心下烦，不喜热物，得热即呕，喜渴，其脉虚数，或细而疾。

【加减】胃寒，去竹茹、麦冬，加丁香；实火，去人参。

34110 竹茹汤

【方源】《产宝诸方》。

【组成】陈皮一两（不去白） 竹茹半两

【用法】上为粗末，分四服。每服水一盞半，煎八分，去滓，不拘时候服。

【功用】凉胎，退寒热。

【主治】妊娠疟疾。

34111 竹茹汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】人参橘皮汤（《妇人良方》卷十二）、参橘散（《医方类聚》卷二二四引《济生》）、八味竹茹汤（《普济方》卷三三七）、参补饮（《广嗣纪要》卷八）、人参橘皮散（《便览》卷四）、参橘汤（《叶氏女科》卷二）。

【组成】人参 橘皮 白术 麦门冬（去心）各一两 甘草（炙）一分 白茯苓 厚朴（姜制）各半两

【用法】上锉散。每服四大盞，水一盞半，

加生姜、竹茹一块如指大，同煎至七分，去滓，空心服。

【功用】《便览》：安胃和中化痰，止呕吐。

【主治】妊娠择食，呕吐，头疼，颠倒痰逆，四肢不和，烦闷。

34112 竹茹汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六引《济生》。

【组成】橘红 干葛 甘草 麦门冬 生姜

【用法】水煎服。

【主治】小儿热吐，口渴烦躁。

【加减】热甚者，加姜连。

34113 竹茹汤

【方源】《普济方》卷二十七。

【组成】竹茹 赤小豆 麦门冬各三两大枣十个 桔梗 北柴胡 川续断各二两 桑白皮二两 甘草一两二钱半 麻黄（去节） 五味子各一两五钱

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，煎至七分，不拘时候。

【主治】肺痿劳吐血。

34114 竹茹汤

《普济方》卷一一九。为《三因》卷九“淡竹茹汤”之异名。见该条。

34115 竹茹汤

【方源】《普济方》卷三四一。

【组成】生芦根一两 青竹茹 橘皮 前胡各四钱 生姜五片 大腹皮 槟榔各二两

【用法】每服四钱，水一盞，煎至六分，空心温服。

【主治】妊娠孕三四月，呕吐不食。

34116 竹茹汤

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】青竹茹弹子大 半夏三个（汤泡七次） 粳米四十粒 干葛

【用法】上吹咀。每服加生姜三片，水一盞，煎至半盞，去滓，量儿大小，以意加减与服。

【主治】小儿胃中热，呕苦汁。

【备考】方中干葛用量原缺。原书另一同名

方用青竹茹如指大，半夏七枚，粳米四十九粒，干葛三片。

34117 竹茹汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参 麦冬 茯苓 炙草各一钱 小麦一合 青竹茹鸡子大一团

【用法】加生姜三片，大枣五个，水煎，食后服。

【主治】孕妇心虚惊恐，脏躁悲泣。

34118 竹茹汤

《保婴撮要》卷十九。为原书同卷“七味竹茹汤”之异名。见该条。

34119 竹茹汤

《医学入门》卷七。为《金匱》卷中“橘皮竹茹汤”之异名。见该条。

34120 竹茹汤

【方源】《观聚方要补》卷三引《医经会解》。

【组成】桔梗 竹茹 枳实 萝卜子 苏子 白芥子 青皮 杏仁 竹沥 桑白皮

【用法】加生姜汁，水煎服。

【主治】支饮，咳逆涎涌，胸满膈痛。

34121 竹茹汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】橘皮 半夏各三钱 甘草 竹茹各一钱 山梔七分 枇杷叶二片

【用法】加生姜、大枣为引。

【主治】胃热火炎呕吐。

34122 竹茹汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】竹茹 干葛 陈皮 半夏 甘草 藿香

【主治】呕吐。

【加减】应辛散者，加生姜；应清火者，加梔、连、白豆蔻；若带表症，加各经表药；若和中气，加藿香、厚朴；若饱闷有食滞，加消导之药。

【方论选录】此方以干葛、竹茹清胃，广皮、甘草和胃，无涎不成呕，故加半夏化痰涎。

34123 竹茹汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】竹茹 陈皮 柿蒂 楂肉

【用法】水煎服。

【主治】麻症收后，余毒留于胃脘，呕吐不止。

34124 竹茹汤

《一盘珠》卷三。为《麻科活人》卷三“竹茹柿蒂汤”之异名。见该条。

34125 竹茹汤

【方源】《大生要旨》。

【组成】熟半夏（用姜汁炒透） 陈皮 苏梗 广藿香 子芩（焙） 枳壳（麸炒） 白芍（酒炒）各一钱 茯苓一钱五分 竹茹五分（重姜汁炒）

【用法】河水煎服。宜服此味五六剂。

【主治】恶阻。怀孕五十日，四肢软倦，恶寒，眩晕恶心，呕吐痰涎，思食酸食。

【加减】如火旺吐甚者，加酒炒川连五分、黑山梔一钱，麦冬二钱（去心）；胃虚者，加白术一钱（土炒），金石斛二钱；气滞者，加香附一钱（酒炒）。

34126 竹茹饮

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】竹茹二两 生姜三两 黄芩二两 梔子仁二两

【用法】上切。以水五升，煮取一升六合，去滓，分三次温服。

【主治】天行五日，头痛壮热，食则呕者。

【宜忌】忌蒜、热面等五日。

34127 竹茹饮

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】竹茹二两 橘皮二两 生姜四两 人参二两 芦根（切）一升 粳米一合

【用法】上切。以水六升，煮取二升五合，去滓，分五六次温服，中间任食。

【主治】痢后得天行病，头痛三四日，食即呕吐者。

【宜忌】忌热面、生冷。

34128 竹茹饮

【方源】《圣惠》卷十八。

【异名】竹茹散（《鸡峰》卷五）。

【组成】青竹茹一两 子芩一两 蒲黄二钱 伏龙肝二钱（末） 生藕汁二合

【用法】上药，先以水一大盏半，煎竹茹、子芩至一盏，去滓，下蒲黄等三味，搅令匀，分为三服，不拘时候。

【主治】热病吐血，兼鼻衄不止。

34129 竹茹饮

【方源】《幼幼新书》卷十九引《刘氏家传》。

【组成】人参 白术（微炒） 茯苓 干葛 麻黄（去根节，酒浸，熬）各等分 甘草减半（半生用，半熟用） 麦门冬（去心）减半

【用法】上为末。量大小每服半钱、一钱、二钱。竹茹多于药，水半盏，同煎至四分。如小儿未能饮，可与乳母吃，只作锉散佳。

【主治】小儿实热。

【加减】如不甚热，则不用麦门冬。

34130 竹茹酒

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】青竹茹二合 好酒一升

【用法】煮三五沸，分作三服即安。

【主治】妊娠误有失坠，损筑胎损疼痛。

34131 竹茹散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】竹茹半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 人参半两（去芦头） 麦门冬半两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 芦根半两（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，烦热干呕。

34132 竹茹散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】竹茹一两 犀角屑三分 生干地黄二两 甘草半两（炙微赤，锉） 伏龙肝一两 川朴消一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温温频服，不拘时候。以愈为度。

【主治】伤寒后阴阳易，头痛，鼻衄不止。

34133 竹茹散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】竹茹一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 葛根一两（锉） 人参一两（去芦头） 芦根一两（锉） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加梗米一百粒，生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病四日，头痛胸满，食即呕逆。

34134 竹茹散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】竹茹一团如鸡子大 白芍药半两 当归半两 茜根二两 羚羊角屑一两半 甘草一两（炙微赤，锉） 生干地黄半两 麦门冬一两半（去心，焙） 鹿角胶一两半

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】呕血久不愈，心神烦闷，脏腑劳伤。

34135 竹茹散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】青竹茹一两 白芍药一两 芍药一两 桂心一两 生干地黄三两 当归一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】内损或劳伤所致吐血、衄血。

【备考】《普济方》引本方有川芎、桂心，无白术、人参。

34136 竹茹散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】苦竹茹一两 生干地黄一两 茜

根半两 百合半合 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 黄耆一两半 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺病烦闷,咳嗽脓血。

34137 竹茹散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】甜竹茹一两 当归一两(锉,微炒) 芎藭一两 黄芩一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上锉细和匀。以水一大盏,煎至七分,去滓,分二次食前温服。

【主治】妊娠胎动不安,手足烦疼。

34138 竹茹散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】竹茹一两 麦门冬一两(去心) 白茯苓一两 梔子仁一两 黄芩一两 甘草半两(炙微赤,锉) 石膏二两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妊娠三四月,胎动不安,手足烦热,面色萎黄。

34139 竹茹散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】苦竹茹半两 伏龙肝一两 石膏一两 甘草半两(炙微赤,锉) 麦门冬一两(去心,焙) 黄芩半两

【用法】上为散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤寒鼻衄,烦热头痛。

34140 竹茹散

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】竹茹 人参 白茯苓(去黑皮) 黄耆(锉) 当归(切,焙) 生干地黄(焙) 各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下,不拘时候。

【主治】产后烦闷气短。

34141 竹茹散

【方源】《幼幼新书》卷二十六。

【组成】菊花三钱 黄芩 人参各一钱 大黄半两 甘草一钱

【用法】上为末。竹叶汤下。

【主治】小儿痘后天柱倒。

【备考】本方名竹茹散,但方中无竹茹,用法中竹叶汤下,疑为“竹茹汤下”。

34142 竹茹散

《鸡峰》卷五。为《圣惠》卷十八“竹茹饮”之异名。见该条。

34143 竹茹散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】羚羊角三分 青竹茹一两 黄芩 山梔子仁 紫苏叶 黑参 杏仁(汤浸,去皮尖,麸炒微黄色) 木通 赤茯苓(去皮) 各三分 朴消一两(别研) 甘草半两(炙赤) 大黄一两(锉,炒)

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏,煎至六分,去滓,入生地黄汁一合,再煎一两沸,不拘时候温服。

【主治】大肠实热,心神烦躁,口内生疮。

34144 竹茹膏

【方源】《济生》卷八。

【组成】真麻油二两 青木香二两 青竹茹一小团 杏仁二七粒(去皮尖)

【用法】上药入麻油内,慢火煎令杏仁黄色,去滓,入松脂(研)半两,熬成膏。每用少许擦疮上。

【主治】黄泡热疮。

34145 竹茹醋

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】生竹茹五钱(无生用干须加倍)

【用法】用醋浸一宿,不时含之。

【主治】牙龈出血。

34146 竹根汤

【方源】《医心方》卷九引《深师方》。

【组成】竹根一斤 麦门冬一升 甘草二两 大枣十个 粳米一升 小麦一升

【用法】以水一斗，煮麦、米熟，去之，纳药，煮取二升七合，服八合，每日三次。

【功用】益气止烦。

【主治】短气欲绝，不足以息，烦挠。

34147 竹根汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】甘竹根（细切）一斗五升

【用法】以水二斗，煮取七升，去滓，加小麦二升，大枣二十个，复煮麦熟三四沸，加甘草一两 麦门冬一升，汤成去滓，服五合，不愈更服。

【主治】产后虚烦，短气。

【方论选录】《千金方衍义》：产后虚烦不胜汤药，但以甘竹清胃火，小麦敛肝气，大枣益脾津，门冬滋肺热，使火无上炎之势，胸无烦扰之患矣。用根不用叶者，取其降泄直达下焦也。

34148 竹根汤

【方源】《济阳纲目》卷三十三。

【组成】竹根（砸碎）

【用法】以水煮，饮之。

【主治】消渴。

34149 竹蛭散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】竹蛭粪一两 白矾（熬令枯）半两 雄黄二钱 麝香一字

【用法】上为细末。先用绵裹杖子拭干耳中，次以药少许掺之。

【主治】小儿聤耳出脓汗，疼痛不可忍者。

34150 竹屑散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【异名】竹蛭散（《普济方》卷三六四）。

【组成】蛭竹屑 坯子 麝香 白矾（煨）一钱

【用法】上为末。吹入耳内。未用药时，先将绵子缴了脓汁方用。

【主治】小儿聤耳出脓汁。

【备考】方中蛭竹屑、坯子、麝香用量原缺。《普济方》本方用苦竹蛭末二钱，枯白矾二钱，

干胭脂半钱，麝香一字。

34151 竹黄汤

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】黄耆 生黄芩 归 芎 草 芍 石膏 人参 麦门冬 半夏 笛竹 淡竹叶

【主治】诸般发毒烦渴者。

34152 竹蛭散

《普济方》卷三六四。为《朱氏集验方》卷十一“竹屑散”之异名。见该条。

34153 竹筴散

《保命集》卷下。为《圣济总录》卷五十八“竹龙散”之异名。见该条。

34154 竹叶饮子

【方源】《外台》卷二十一引《近效方》。

【组成】竹叶一握 干葛三两 地骨白皮 莽苳各五两 甘草三两（炙）

【用法】上切。以水二大升，煎取半升，去滓，纳车前子三两，分三次食后服，一日令尽。

【主治】肝膈实热，肾藏已虚而致热风暴赤，险烂生疮，或疹或疹，或痒或痛，久患虚热，远视不明，喻若隔绢看花，或服石乳发动，冷热泪出，白睛赤红肿胀，泪裹眼珠。

【备考】不过三剂，眼中疼痛歇，次得点药，亦须敷药，抽热毒风，不然恐寻经脉入眼，热深入亦难愈也。又取羊肝一具，或猪肝亦得，猪肉精处亦堪取三斤，皆须破作手许大片，厚薄亦如手掌，候其疼处，或从眼后连耳上头，或有从眉向上入头掣痛者，火急新汲水中渍，令极冷，贴其疼痛脉上及所患部分，候肝或肉稍暖彻，则易之，须臾间，其肝、肉等并熟如煮来者，岂不是热毒之候出也，此即损眼之祸，又恐三辰齐忌之月无肉，以大豆还作四五替如肝、肉法，更互熨之，其疼痛忽连鼻中酸辛者，并是难愈之候，亦急觅吴蓝茎叶，捣如泥敷痛处，亦有愈者，十得三四。凡是此患，不宜久忍，痛若深入于眼中，渐成痼疾。

34155 竹叶饮子

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】竹叶五十片 麦门冬半两（去心）小麦半合 生地黄半两 地骨皮半两 黄耆一两（锉） 麻黄半两（去根节） 甘草二分（炙微赤，锉） 石膏一两（捣碎）

【用法】上锉细和匀。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣二个，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】气极。伤热则气喘，急甚则唾血，乏力，不欲饮食，口燥咽干。

34156 竹叶饮子

《千金方衍义》卷十七。为《千金》卷十七“竹叶饮”之异名。见该条。

34157 竹皮大丸

【方源】《金匱》卷下。

【组成】生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

【用法】上为末，枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，以饮送下，日三次夜二次。

【功用】安中益气。

【主治】妇人乳中虚，烦乱呕逆。

【加减】有热者，倍白薇；烦喘者，加柏实一分。

【方论选录】①《济阴纲目》：中虚症不可用石膏，烦乱症不可用桂枝，而此方以甘草七分，配众药六分，又以枣肉为丸，仍以一丸饮下，可想见其立方之微，用药之难，审虚实之不易也。仍饮服者，尤虑夫虚虚之祸耳。用是方者，亦当深省。②《金匱要略论注》：病本全由中虚然，而药只用竹茹、桂、甘、石膏、白薇者，盖中虚而至为呕为烦，则胆腑受邪，烦呕为主病，故以竹茹之除烦止呕者为君；胸中阳气不用，故以桂、甘扶阳而化其逆气者为臣；以石膏凉上焦气分之虚热为佐；以白薇去表间之浮热为使。要知烦乱呕逆而无腹痛、下利等证，虽虚无寒可疑也，妙在加桂于凉剂中，尤妙在生甘草独多，意谓散蕴蓄之邪，复清阳之气，中即自安，气即自益，故无一补剂而反注其立汤之本意曰安中益气，竹皮大丸神哉。③《金匱要略心

典》：妇人乳中虚，烦乱呕逆者，乳子之时，气虚火旺，内乱而上逆也。竹茹、石膏甘寒清里，桂枝、甘草辛甘化气，白薇性寒入阳明，治狂惑邪气，故曰安中益气。④《金匱歌括》：血者，中之所生也；乳者，血之所变也，血虽生于中焦，尤藉厥、少之气传变而为乳。乳中虚者，谓乳子去汁过多而致虚也。中虚无血奉心则烦，心神不安则乱，阳气上升则呕，逆者，呕之甚也。以竹茹降逆止呕，白薇除热退烦，石膏通乳定乱，重用甘草、大枣定安中焦以生津液，血无阳气不运，妙以桂枝一味，运气血奉心通乳。⑤《金匱发微》：竹茹、石膏以清胆胃之逆，三倍甘草以和中气，减半桂枝、白薇以略扶中阳而清里热，更用枣和丸以扶脾而建中，但令胃热除而谷食增，则生血之源既富，胆胃之上逆自平矣。

【临证举例】①瘧病 孙某某，女，40岁。1972年2月23日诊。患者于前年因惊恐、受气，出现精神恍惚，时悲时喜，悲时哭泣不止，喜时大笑不已。同时伴有默默不欲饮食，心烦喜呕，喜居暗处，夜里失眠、多梦，面色青，舌质略红、苔薄白，脉弦数。此属肝火灼阴，神明被扰。治予清热舒肝，调和胃气，用竹皮大丸3剂则病愈。②失眠 李某某，女，24岁。1973年5月10日诊。近一月来夜不能寐，精神欠佳，面色少华，自觉心跳、心慌、心中懊恼、头晕，腰腿疼痛，舌淡苔白，脉沉数无力。患者素体血虚，病前又受精神刺激，良由阴虚火旺，肝横气滞，从而神不守舍，经络郁滞。用竹皮大丸5剂病即减半，再服3剂则病愈。③阳痿 吴某某，男，28岁。1981年6月20日诊。3~4年之前即患阳痿，逐渐加重。前妻因此离婚，续妻也因此要求离婚。先后曾服三肾丸、参茸丸等，毫无起色。现自觉头晕，身热，小溲黄赤，大便燥结，梦多，舌红苔黄，脉弦数有力。此由过用峻补，郁热内蕴，宗筋弛缓，不能作强，用竹皮大丸连服120余剂，1982

年春病愈，其爱人已怀孕。④男性不育 郭某某，男，26岁。1977年8月10日诊。婚后二年无子，经某医院检查精子成活率为30~40%，身体健壮，性生活正常，惟自觉有时发热、头晕，舌淡红、苔略黄，脉滑数。此为过服温燥峻补之品，造成精室蕴热，精子被灼，致使精子成活率大降。治用竹皮大丸，连服9剂而获麟。(以上四案均出自《中医杂志》1986，6：43)

34158 竹沥饮子

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】竹沥三合 羚羊角屑半两 石膏二两 茯神一两 麦门冬三分(去心) 独活三分

【用法】上锉细。以水三大盏，煎至一盏半，去滓，加竹沥，分为四服，不拘时候，温服。

【主治】中风，偏枯不遂，言语蹇涩，膈上热，心神恍惚，惛惛如醉。

34159 竹沥饮子

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】竹沥汤(《圣济总录》卷七)。

【组成】竹沥五合 人乳二合 陈酱油半两

【用法】上药相和，分二次温服，拗开口灌之。

【主治】①《圣惠》：妊娠中风痉，口噤烦闷。②《圣济总录》：中风，舌强不得语，心神烦闷。

34160 竹沥饮子

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】竹沥汤(《圣济总录》卷七)。

【组成】竹沥 荆沥 消梨汁各二合 陈酱汁半合

【用法】上药相和，微温服，量儿大小增减。

【主治】小儿中风，失音不语，昏沉不识人。

34161 竹沥饮子

《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。为《千金》卷八“竹沥汤”之异名。见该条。

34162 竹沥饮子

《张氏医通》卷十三。即《千金》卷八

“竹沥汤”。见该条。

34163 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷十。

【异名】竹茹汤(《圣济总录》卷二十三)、青竹茹汤(《圣济总录》卷三十九)。

【组成】青竹茹一鸡子大 人参半两(去芦头) 乌梅肉二两

【用法】上锉细。以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候频频温服。

【主治】①《圣惠》：伤寒吐利后，烦渴不止。②《圣济总录》：霍乱，津液少，渴甚。

34164 竹茹饮子

《圣惠》卷十一。为《千金翼》卷十八“竹茹汤”之异名。见该条。

34165 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷十三。

【异名】竹茹汤(《圣济总录》卷二十六)。

【组成】竹茹 子芩 川升麻 木通(锉) 赤芍药各半两 黑木耳一两(微炒)

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓，加生地黄汁半合，搅令匀，不拘时候，温服。

【主治】伤寒痢下脓血。

34166 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】竹茹 人参(去芦头) 芦根 黄芩 梔子仁各半两

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气五日，头痛壮热，食则呕逆。

34167 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】竹茹一两 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 黄芩一两(锉) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后内虚，烦闷短气。

34168 竹根饮子

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【组成】箠竹根(切) 生茅根(切) 芦根(切) 各五升 菰蔹(切) 二升 石膏一斤(杵碎) 乌梅三十枚 生姜(切) 一升 小麦三升 竹沥二升 白蜜一升

【用法】以水五斗,煮取一斗,去滓,加竹沥及蜜,著不津瓶贮之,送下黄耆十四味丸,纵不下丸,但觉口干及渴,即饮之。如热月,即逐日斟酌煎之,多则恐坏也。

【主治】消渴,小便数多。

34169 竹叶玉女煎

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】生石膏六钱 干地黄四钱 麦冬四钱 知母二钱 牛膝二钱 竹叶三钱

【用法】用水八杯,先煮石膏、地黄得五杯,再入余四味,煮成二杯,先服一杯,候六时复之,病解停后服,不解再服。

【功用】两清表里之热。

【主治】妇女温病,经水适来,脉数耳聋,干呕烦渴,甚至十数日不解,邪陷发痉者。

34170 竹叶石膏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】人参竹叶汤(《三因》卷五)、石膏竹叶汤(《易简》)。

【组成】竹叶二把 石膏一升 半夏半斤(洗) 麦门冬一升(去心) 人参二两 甘草二两(炙) 梗米半升

【用法】以水一斗,煮取六升,去滓,纳梗米,煮米熟,汤成去米,温服,每服一升,一日三次。

【功用】清热生津,益气和胃。

①《古方选注》:补胃泻肺。②《伤寒论类方》:滋养肺胃之阴气,以复津液。③《伤寒论章句》:滋养肺胃,清火降逆。④《古本伤寒心解》:滋阴养液,补虚清热。⑤《成方便读》:清热,养阴,益气。

【主治】伤寒、温病、暑病之后,余热未清,气津两伤,虚羸少气,身热多汗,呕逆烦渴,

唇干口燥,或虚烦不寐,舌红少苔,脉虚数。现用于中暑、糖尿病、小儿夏季热等出现气阴两伤证候者。

①《伤寒论》:伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐。②《外台》引《张文仲方》:天行表里虚烦。③《局方》:伤寒时气,表里俱虚,遍身发热,心胸烦满;诸虚烦热,与伤寒相似,但不恶寒,身不疼痛,头亦不痛,脉不紧数。④《直指》:伏暑内外热炽,烦躁大渴。⑤《普济方》:中暑,渴烦吐逆,脉数者。⑥《奇效良方》:小儿虚羸少气,气逆欲吐,四体烦热。⑦《医统》:阳明汗多而渴,蛆而渴欲饮水,水入即吐,病愈后渴。⑧《医方集解》:肺胃虚热;伤暑发渴脉虚。⑨《西塘感症》:烦躁,起卧不安,睡不稳。⑩《叶氏女科》:妊娠燥渴,胃经实火。⑪《杂病源流犀烛》:暑风;夏热病并小便不利;唇病大渴。⑫《奇正方》引《经验方》:小儿伤寒久不除,愈后复剧,瘦瘠骨立者;骨蒸唇干,口燥欲得饮水者。⑬《中医皮肤病学简编》:痒子。

【宜忌】《外台》引《张文仲方》:忌海藻、羊肉、菰菜、饴。

【方论选录】①《注解伤寒论》:辛甘发散而除热,竹叶、石膏、甘草之甘辛以发散余热;甘缓脾而益气,麦门冬、人参、梗米之甘以补不足;辛者,散也,气逆者,欲其散,半夏之辛,以散逆气。②《医方集解》:此手太阴、足阳明药也。竹叶、石膏之辛寒,以散余热;人参、甘草、麦冬、梗米之甘平,以益肺安胃,补虚生津;半夏之辛温,以豁痰止呕。故去热而不损其真,导逆而能益其气也。③《伤寒溯源集》:竹叶性寒而止烦热,石膏入阳明而清胃热,半夏蠲饮而止呕吐,人参补病后之虚,同麦冬而大添胃中之津液,又恐寒凉损胃,故用甘草和之,而又以梗米助其胃气也。④《古方选注》:竹叶石膏汤分走手足二经,而不悖于理者,以胃居中焦,分行津液于各脏,补胃泻肺,有补母泻子之义也。竹叶、石膏、麦冬泻肺之热,人参、半

夏、炙草平胃之逆，复以梗米缓于中，使诸药得成清化之功，是亦白虎、越婢、麦冬三汤变方也。⑤《金鉴》：是方也，即白虎汤去知母，加入参、麦冬、半夏、竹叶也。以大寒之剂，易为清补之方，此仲景白虎变方也。《经》曰：形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。故用人参、梗米，补形气也；佐竹叶、石膏、清胃热也；加麦冬生津，半夏降逆，更逐痰饮，甘草补中，且以调和诸药也。⑥《血证论》：方取竹叶、石膏、麦冬以清热，人参、甘草、梗米以生津。妙在半夏之降逆，俾热气随之而伏；妙在生姜之升散，俾津液随之而布，此二药在口渴者，本属忌药，而在此方中，则能止渴，非二药之功，乃善用二药之功也。⑦《成方便读》：方中以竹叶、石膏清肺胃之热，然热则生痰，恐留恋于中，痰不去热终不除，故以半夏辛温体滑之品，化痰逐湿，而通阴阳，且其性善散逆气，故又为止呕之圣药，况生姜之辛散，以助半夏之不及，一散一清，邪自不能留恋。人参、甘草、梗米以养胃，麦冬以保肺，此方虽云清热，而却不用苦寒，虽养阴又仍能益气，不伤中和之意耳。

【临症举例】①阳明暑症 《王氏医案》：己亥夏，予舅母患症，服柴胡药二三帖后，汗出昏厥，妄语遗溺，或谓其体质素虚，患有脱变，劝服独参汤，幸表弟寿者，不敢遽进，乃邀孟英商焉，切其脉洪大滑数，曰阳明暑症也，与伤寒三阳合病同符，处竹叶石膏汤，清热兼益气，两剂而瘳。②消渴 《经方应用》：一女性患者，56岁，农民。患糖尿病多年，近来自觉神疲乏力，口渴引饮，溲多，诊得脉细数，舌红少津，身形消瘦。凭症参脉，系胃热内盛，气津俱损，宜清胃热，益气阴，方用竹叶石膏汤加味，竹叶12克，生石膏30克、麦冬12克、法半夏6克、甘草3克、北沙参12克、天花粉12克、淮山药18克、梗米一撮。三剂后，口渴显著减轻，续服原方三剂，后未再复诊。③余热未净，气阴两伤

《古方新用》：王某，女，6岁，1978年12月初诊。患儿三天前发烧38.5℃，伴有咳嗽，少痰、头痛、纳差、X线胸透未见异常。先用四环素、甘草片、克感敏等药物治疗，因无效而改用静脉点滴红霉素两天，体温仍在38℃以上，故邀中医诊治，乏力懒动，舌尖红苔薄黄、中心略厚，脉弦细。辨证为余热未净、气阴两伤，用本方治疗，党参3克、半夏9克、梗米12克、麦冬24克、竹叶9克、生石膏48克、甘草6克，水煎，分三次服。服上药二剂后，热退症消，体温降至36℃。停药观察三日，再未见发热，饮食渐增，开始下地玩耍。④流行性出血热 《河南中医》(1983；3：33)：竹叶石膏汤加减治疗流行性出血热32例，男28例，女4例，年龄20~40岁，病程1~2天者25例，3天以上者7例。根据病程分为发热期、低血压期、少尿期、多尿期、恢复期等，以本方适当加减，疗程7~18天，全部治愈，其中18例随访3~12个月，未见复发。

【备考】本方方名，《张文仲方》引作“竹叶汤”（见《外台》）。《活人书》有生姜，《医学入门》有生姜汁。本方加生姜，名“竹叶加生姜汤”（见《圣济总录》）。

34171 竹叶石膏汤

《玉机微义》卷十一。为《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》“竹叶汤”之异名。见该条。

34172 竹叶石膏汤

【方源】《正体类要》卷下。

【异名】六味竹叶石膏汤（《景岳全书》卷五十七）。

【组成】淡竹叶 石膏（煨） 桔梗 木通 薄荷 甘草各一钱

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】胃实火盛，口渴唇干，口舌生疮，小便赤。

①《正体类要》：胃火盛而作渴者。②《症因脉治》：燥火身肿，喘促气急，两胁刺痛，

身面浮肿，烦躁不得卧，唇口干燥，小便赤涩。③《杂病源流犀烛》：一切痈疽兼烦渴；伤（跌扑闪挫）家作渴，或因胃火上炽。④《会约》：胃火口舌生疮，口渴便结；感冒暑热火盛，烦躁恶心。

【方论选录】《医方集解》：李士才曰，阳明外实则用柴葛以解肌，阳明内实则用承气以攻下，此云胃实，非有停滞，但阳焰胜耳。火旺则金困，故以竹叶泻火，以桔梗救金，薄荷升火于上，木通泄火于下，甘草、石膏直入戊土面清其中。三焦火平则炎蒸退，而津液生矣。

34173 竹叶石膏汤

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】竹叶 石膏（煨）各三钱 甘草 人参各二钱 麦门冬五钱

【用法】每服二钱，加生姜，水煎服，婴儿母同服。

【主治】小儿胃经气虚内热，患疮作渴。

34174 竹叶石膏汤

《赤水玄珠》卷二十八。为《幼幼新书》卷十八引《全生指迷方》“竹叶汤”之异名。见该条。

34175 竹叶石膏汤

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】石膏 知母 麦冬 木通

【用法】加竹叶一握，水煎服。

【主治】痘家烦躁咳逆者；热泻，小便赤涩，口燥咽干，壮热不恶寒。

【加减】痘后虚烦不眠，疮出狂叫，喘呼者，乃肠腑热甚而少津液也，无阴气以敛之，致阳独盛，去木通，加甘草。

【方论选录】痘家烦躁咳逆者，此方主之。盖烦者肺也，燥者肾也，子母相生，其胃必热。故以石膏为君，佐以知母之苦寒，以清肾之源；麦冬之苦甘以泻肺之实，竹叶苦寒可以除烦蠲嘔，木通甘淡可以导热利窍，此白虎汤之变通也。

【备考】本方加人参，名“人参竹叶石膏

汤”（见原书）。

34176 竹叶石膏汤

【方源】方出《广笔记》卷三，名见《古方选注》卷下。

【组成】蝉蜕一钱 鼠粘子（炒，研）一钱五分 荆芥穗一钱 玄参二钱 甘草一钱 麦门冬（去心）三钱 干葛一钱五分 薄荷叶一钱 知母（蜜炙）一钱 西河柳五钱 竹叶三十片（甚者，加石膏五钱，冬米一撮）

【功用】《中医方剂学讲义》：透疹解毒，清泄肺胃。

【主治】痧疹发不出，喘嗽，烦闷，躁乱。

【方论选录】《古方选注》：痧疹热邪壅于肺，逆传于心胞络，喘咳烦闷，躁乱狂越者，非西河柳不能解。仲淳另出心裁，立一汤方，表里施治，盖以客邪犯心肺二经，营卫并伤，非独主于里也。大凡灼热固表无汗，而见诸证者，则有竹叶、石膏之辛凉，解肌发汗；热毒蕴里而见诸证者，则有西河柳之咸温润燥，开结和营，以解天行时热。至于十味佐使之药，不外乎润肺解肌，清营透毒，毋容议也。

【备考】本方方名，《中医方剂学讲义》引作“竹叶柳莠汤”。《古方选注》本方用法：水一钟五分，煎八分，不拘时候服。

34177 竹叶石膏汤

【方源】《痘科辨要》卷九。

【组成】石膏自一两至五两 知母自一钱至二钱 竹叶三十片或百片 梗米 麦门冬自二钱至五钱 玄参 薄荷各二钱 西河柳一两许（一方加当归五钱）

【用法】水煎服。

【主治】麻疹火郁毒深，邪热壅于胃，乘于肺。疹视色紫赤而如烟火，肌肤干枯暗晦，喘满气急者。

34178 竹叶石膏汤

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】石膏（研）一两六钱 法半夏二钱五分 人参二钱 甘草（炙）二钱 麦门冬（去心）五钱五分 淡豆豉二钱 糯米一合

【用法】上咬咀。每服五钱，用水一钟，加青竹叶、生姜各五片，煎服。

【主治】伏暑，内外发热，烦躁大渴。

34179 竹叶石膏汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】石膏五分 人参二钱 甘草七分 麦门冬一钱半 淡竹叶十四片 糯米一撮

【用法】水煎，加姜汁二匙服。

【主治】温病表症已解，邪毒未除，热结在内，心胸烦满，渴甚饮水无度。

34180 竹叶石膏汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】石膏 知母 麦冬 甘草 竹叶 人参

【主治】①《症因脉治》：中热症，阳明燥热，发热昏沉，闷乱口噤，烦躁大渴，神识不清，遗尿便赤，外无表症。②《金鉴》：麻疹没后烦渴。

【备考】《金鉴》本方用法，水煎服。

34181 竹叶石膏汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】石膏 揀冬 竹叶 人参 半夏 知母 甘草

【功用】清热润燥，降火化痰。

【主治】外感燥痰之症，发热唇焦，烦渴引饮，喘咳短息，时作时止，吐咯难出。

34182 竹叶石膏汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】知母 石膏 揀冬 竹叶

【主治】火冲眩暈，暴发倒仆，昏不知人，甚则遗尿不觉，少顷汗出面醒，仍如平人。

【加减】三焦热甚，右尺实数者，加山梔、黄芩。

34183 竹叶石膏汤

【方源】《诚书》卷六。

【组成】淡竹叶七片 软石膏三钱 大黄(煨)一钱半 陈皮一钱 藿香叶二钱

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】茧唇。

34184 竹叶石膏汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】石膏一两 知母三钱 麦冬一两 甘草一钱 茯苓二钱 人参五钱 竹叶一百片 粘米一撮

【用法】水煎服。一剂火泻，二剂便通，改用清肃汤。

【主治】胃火沸腾，大便闭结，烦躁不宁，口渴舌裂，两目赤突，汗出不止。

34185 竹叶石膏汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】麦冬 知母 石膏 人参 梗米 灯心 生姜 竹叶

【主治】瘧症，大热引饮，汗多，脉来洪大。

34186 竹叶石膏汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】石膏 生地 桔梗 红花 薄荷 竹叶 黄芩 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮见苗，以至起长，一切火盛热症。

【加减】若大便秘结，加大黄、紫草。

34187 竹叶石膏汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】竹叶五片 石膏三钱(煨)

【用法】水煎服。兼服六一散或抱龙丸。

【主治】胃热呕吐，或三焦受热，或伤热物，或受热药，夏月受暑气，呕吐黄痰，或干嘔，或烦躁，唇红面赤作渴，大便不利。

34188 竹叶石膏汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】煨石膏 连翘 黄芩 花粉 甘草梢 薄荷 柴胡

【用法】竹叶五片为引。

【主治】肺热鼻流紫血者。

34189 竹叶石膏汤

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】竹叶一钱半 石膏三钱 人参六分 麦冬三钱(去心) 半夏一钱半(制) 甘草三分

【用法】水煎，去滓热服。

【功用】清热扶元化湿。

【主治】中喝，暑伤三焦，热炽阳明，大热烦渴，脉洪虚数者。

【方论选录】竹叶疗膈上炎威，石膏汤清阳明暑热，人参扶元气以通脉，甘草和中州以泻热，半夏化湿除痰，麦冬清心润燥，俾暑热解而大烦可解，大渴可除，何中喝之足虑哉。此清热扶元化湿之剂，为中喝热伤元气之专方。

34190 竹叶石膏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】竹叶 石膏 人参 麦冬 甘草 生梗米

【主治】阳明症。阳明症，头痛鼻干，渴欲引饮，不得眠，先寒洒析，寒甚久乃热，甚则烦躁，畏日月火，先热去汗出。

【加减】宜大剂竹叶石膏汤加减，无汗或汗少不呕者，加葛根；虚而作劳，加人参；汗多，加白术；痰多，加橘红、贝母，得汗即解；寒热俱盛，渴甚汗多，寒时指甲紫黯者，加桂枝。

34191 竹叶石膏汤

【方源】《痧证汇要》卷四。

【组成】石膏五钱（煨熟） 知母三钱 甘草一钱 梗米一撮

【用法】加竹叶，水煎服。

【主治】温病身热，自汗口干，脉来洪大，及霍乱伤暑发痧。

34192 竹叶石膏汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】沙参 麦门冬 半夏 石膏 甘草 竹叶 梗米 生姜

【主治】胃火郁积口臭。

【加减】重者，加香薷。

34193 竹叶石膏汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】竹叶 石膏 知母 花粉 麦冬 甘草

【用法】加米，水煎服。

【功用】泻心清肺。

【主治】麻发于心肺，肺虚胃热，口干咳嗽，心烦。

34194 竹叶石膏汤

【方源】《痧疹辑要》卷二。

【组成】竹叶三片 红花三分 生地二钱 煅石膏三钱 花粉八分 陈皮五分 甘草五分 黄连五分（微炒） 僵蚕五条 连翘六分 玄参一钱 牛蒡子六分 桑皮一钱

【主治】痧疹见形二三日，肉色红，出不透快。

【加减】如大便不解，加生大黄二钱；再不通，即加玄明粉二钱，惟热毒重盛者方可。如泻红水，或作烦渴，亦加大黄。

34195 竹叶石膏汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】竹叶 洋参 麦冬 梨皮 绿豆 花粉 生草 石膏 风斛 知母 蔗汁 黑豆 玉竹 灯心

【主治】痧后烦渴。

34196 竹叶归耆汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十一。

【异名】竹叶黄耆汤（《医钞类编》卷十七）。

【组成】竹叶一钱半 当归一钱 黄耆二钱 白术 人参各一钱 甘草（炒）五分 麦门冬（去心）七分

【用法】水煎服。

【主治】产后胃气虚热，口干作渴，恶冷饮食者。

34197 竹叶芍药汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】竹叶六合 赤芍药 甘草（炙，锉）各一两 阿胶（炙燥）三两 当归（切，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，煎至八分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】吐血衄血，大小便出血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“竹叶

芍药散”。

34198 竹叶芍药汤

《普济方》卷一八八。即《圣济总录》卷六十八“竹叶芍药汤”。见该条。

34199 竹叶灯心汤

【方源】《痘疹仁端录》卷八。

【组成】竹叶三十片 灯心五分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮干呕。

34200 竹叶安胎饮

【方源】《胎产指南》卷一。

【组成】当归二钱 白术二钱 人参一钱 川芎七分 甘草四分 陈皮三分 黄芩八分 枣仁一钱 远志八分 麦冬一钱 竹叶十片 怀生地一钱五分

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】①《胎产指南》：子悬，孕妇心惊胆怯，烦闷不安。②《胎产秘书》：子烦。

【加减】若其人烦渴，加竹茹一九；有痰，加竹沥七分酒杯、姜汁一杯；如虚人，加人参二三钱；如脾胃常泻，减生地、枣仁。

34201 竹叶安胎饮

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】生地 当归 黄芩 麦冬（去心） 枣仁（炒） 甘草（炙） 人参 陈皮 竹叶 竹茹

【用法】生姜、大枣为引，有痰，竹沥冲服。

【主治】子烦。妇人受胎后血气壅郁，热气上冲心肺，而烦闷不安，心胆俱怯。

34202 竹叶导赤散

【方源】《松峰说疫》卷三。

【组成】生地二钱 木通一钱 连翘一钱（去膈） 大黄一钱 梔子一钱 黄芩一钱 黄连八分 薄荷八分

【用法】水煎，研化五瘟丹服。

【主治】君火郁为疫，乃心与小肠受病，以致斑淋，吐衄血，错语不眠，狂躁烦呕，一切火邪等症。

34203 竹叶防风汤

《活人书》卷十九。为《金贵》卷下“竹叶

汤”之异名。见该条。

34204 竹叶防风汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】淡竹叶二十四片 防风 人参 桂枝 桔梗 前胡 陈皮 茯苓各一钱

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】产后伤风，发热头痛，面赤气喘。

34205 竹叶麦冬汤

【方源】《医学启蒙汇编》卷三。

【组成】竹叶二十片 麦门冬二钱 知母二钱 甘草一钱 山梔仁一钱

【用法】水一钟半，梗米一撮，煎七分，温服。

【主治】病后虚烦懊恼，口干舌燥，坐卧不宁，小水不利。

【加减】烦渴，加石膏；心虚不宁，加茯神；虚弱甚，加人参；血虚，加当归；有汗，加酸枣仁、五味子；有痰，加陈皮、半夏；咳嗽，加桔梗、桑白皮；不思食，加白术、茯苓；腹胀，加淡豆豉；腹痛，加炒芍药；头痛，加川芎、荆芥穗；恶寒，加黄耆、桂枝；潮热，加柴胡、黄芩；口干，加天花粉；五心烦热，加地骨皮；小水不利，加木通。

34206 竹叶麦冬汤

《顾氏医径》卷四。为《三因》卷十七“竹叶汤”之异名。见该条。

34207 竹叶泻肝汤

《医统》卷六十一。为《原机启微》卷下“竹叶泻经汤”之异名。见该条。

34208 竹叶泻肝散

《眼科全书》卷五。为《原机启微》卷下“竹叶泻经汤”之异名。见该条。

34209 竹叶泻经汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】竹叶泻肝汤（《医统》卷六十一）、竹叶泻肝散（《眼科全书》卷五）。

【组成】柴胡 梔子 羌活 升麻 炙草各五分 赤芍药 草决明 茯苓 车前子各四分 黄芩六分 黄连 大黄各五分 青竹叶十片 泽泻四分

【用法】上作一服。水二盏，煎至一盏，食后稍热服。

【主治】眼目隐涩，稍觉眵膜，视物微昏，内眦开窍如针，目痛，按之浸淫脓出。

【方论选录】上方，逆攻者也。先以行足厥阴肝、足太阳膀胱之药为君，柴胡、羌活是也；二经生意，皆总于脾胃，以调足太阴、足阳明之药为臣，升麻、甘草是也；肝经多血，以通顺血脉，除肝邪之药，膀胱经多湿，以利小便，除膀胱湿之药为佐，赤芍药、草决明、泽泻、茯苓、车前子是也；总破其积热者，必攻必开、必利必除之药为使，梔子、黄芩、黄连、大黄、竹叶是也。

34210 竹叶柳芽汤

《中医方剂学讲义》。即方出《广笔记》卷三，名见《古方选注》卷下“竹叶石膏汤”。见该条。

34211 竹叶茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】淡竹叶一升 赤茯苓（去黑皮）二两 生地黄一升 丹参 玄参各三两 干蓝车前草各一升 石膏四两

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服六钱匕，水二盏，加生姜五片，煎至一盏半，去滓，更入蜜半合，煎三沸，温服，一日二次，不拘时候。

【主治】阳厥气逆，胸膈烦闷，忿忿饶怒，如发狂状。

34212 竹叶茯苓汤

【方源】《灵验良方汇编》卷上。

【组成】茯苓 条芩 麦冬 防风 人参 竹叶

【主治】心肺虚热，心惊胆怯之子烦。

34213 竹叶恒山汤

《普济方》卷一九八。即《外台》卷五引《小品方》“竹叶常山汤”。见该条。

34214 竹叶黄芩汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】竹叶（切）三升 黄芩 茯苓各三两 生姜六两 麦门冬（去心） 甘草

（炙） 大黄各二两 芍药四两 生地黄（切）一升

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】精极实热，眼视无明，齿焦发落，形衰体痛，通身虚热。

【宜忌】忌鲊物、海藻、菰菜、茺莢。

【方论选录】《千金方衍义》：此治精极而热淫于内，以其人真阴素亏，热邪流于阴分，虽用地黄、芍药、竹叶、麦冬、黄芩、茯苓之属，不得大黄推陈致新之力，不能立铲热根以救耗极之阴，又以生姜行大黄之性，甘草缓脾胃之义，故调胃承气汤用之。

34215 竹叶黄耆汤

【方源】《外台》卷三十七引《古今录验》。

【组成】竹叶（切）三升 黄耆四两 小麦一升 芍药三两 甘草二两（炙） 石膏二两（研） 人参三两 升麻一两 茯苓二两（一法七分） 桂心六分（一法二分） 当归三两 干枣十四枚 五味子三两 生姜三两 干地黄一两 麦门冬三两（去心） 知母一两

【用法】上切。以水一斗二升，煮竹叶、小麦，取九升，去滓，纳药，煮取三升，分四次温服。

【主治】动散背肿，已自利，虚热不除。

34216 竹叶黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】淡竹叶 黄芩 前胡 生姜各四两（切） 芍药三两 小麦三升 黄耆 茯苓 枳实（炙） 麦门冬（去心） 梔子各三两（擘） 大枣十四个（擘） 芎藭 知母 干地黄 人参 石膏（碎） 升麻 甘草（炙）各二两

【用法】上咬咀。以水一斗六升，先煮竹叶、小麦，取一斗二升，去竹叶、麦，纳诸药，煮取四升，每服一升，日三次，夜一次。

【主治】发背。

34217 竹叶黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】淡竹叶 小麦各三升 黄耆 升麻 干地黄 芍药 当归 通草 知母各三两 大枣十八个(擘) 黄芩一两半 生姜五两(切) 茯苓 芎藭 前胡 枳实(炙) 麦门冬(去心) 甘草(炙)各二两

【用法】上咬咀。以水一斗七升,先煮竹叶、小麦,取一斗二升,去滓,纳诸药,煮取四升,分五次温服,日三次,夜二次。

【主治】男子痢,始欲发背不甚,往来寒热。
34218 竹叶黄耆汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】竹叶(切)四升 黄耆 芍药各三两 当归一两 大黄一两半 升麻 黄芩 前胡 知母 麦门冬(去心) 甘草(炙)各二两

【用法】上咬咀。以水一斗七升,煮竹叶取九升,去滓,下诸药,煮取二升八合,分三服。利两三行佳。

【主治】痢发背及在诸处。

34219 竹叶黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】淡竹叶一握 黄耆(锉,炒) 甘草(炙,锉) 黄芩(去黑心) 麦门冬(去心,焙) 芍药各三两 当归(切,焙) 人参 石膏(椎碎) 芎藭 半夏(汤洗七遍去滑,焙)各二两 生地黄(切,焙)八两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜一分(拍碎)、大枣五个(擘破)、竹叶七片,煎取八分,去滓温服,日三夜一。

【主治】①《圣济总录》:痢疽、发背兼渴。②《外科精义》:一切恶疮发大渴者。

【方论选录】①《古今名医方论》:柯韵伯曰,气血皆虚,胃火独盛,善治者补泻兼施,寒之而不致亡阳,温之而不至于助火,扶正而邪却矣。四君子气药也,加黄耆而去苓、术,恐火就燥也。四物汤血药也,地黄止用生者,正取其寒也。人参、黄耆、甘草治烦热之圣

药,是补中有泻矣。且地黄之甘寒,泻心肾之火,竹叶助芍药清肝胆之火,石膏佐芍药清脾胃之火,麦冬同黄芩清肺肠之火,则胃火不得独盛,而气血之得补可知。惟半夏一味,温中辛散,用之大寒剂中,欲其能阴阳之路也。岐伯治阴虚而目不瞑者,饮以半夏汤,覆杯则卧。今人以为燥而渴者禁用,是不明阴阳之理耳!②《古方选注》:四方互复,独以竹叶、黄耆标而出之者,明其方专治肺经热消,非概治二阳结之消渴者也。竹叶石膏汤为轻清之剂,复以生地、黄芩浊阴之品,清肺与大肠之火;四物汤为浊阴之剂,复以竹叶、石膏清燥之品,清肝胆之火;补中益气汤人参、黄耆、甘草除烦热之圣药,复以石膏、白芍清脾胃之火;黄芩汤治后天太阴之剂,复以生地、麦冬壮水之品,清肾中之火。竹叶石膏汤不去半夏,藉以通气分之窍;四物汤不去川芎,藉以通血分之窍。统论全方,补泻兼施,寒之不致亡阳,补之不致助火,养正却邪,诚为良剂。

34220 竹叶黄耆汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】淡竹叶二两 生地黄八两 黄耆 麦门冬(去心) 当归 川芎 人参 甘草 黄芩 芍药 石膏各三两

【用法】上为粗末。每服五钱,水一盞半,加竹叶五七片,煎至一盞,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《卫生宝鉴》:发背发渴,诸疮大渴。②《内科摘要》:胃虚火盛而作渴。

34221 竹叶黄耆汤

【方源】《痈疽神秘验方》。

【组成】生地黄 黄耆各二钱 当归(酒拌) 淡竹叶 川芎 甘草(炙) 黄芩(炒) 白芍药(炒) 人参 半夏 石膏(煨)各一钱

【用法】上作一剂。水二钟,加生姜三片,煎八分,食远服。

【主治】①《痈疽神秘验方》:痈疽大渴发

热，或泻，或小便如淋。②《杂病源流犀烛》：伤（跌扑闪挫）家作渴，或因胃热伤津液。

【备考】《准绳·疡医》引《痢疽神秘验方》有栝楼根一钱、麦门冬（去心）二钱。

34222 竹叶黄耆汤

【方源】《回春》卷八。

【组成】淡竹叶一钱 芍药 麦门冬 半夏 川芎 黄耆（炒） 人参 当归 甘草 石膏 生地黄各二钱

【用法】上锉作二剂。水煎服。

【主治】痢疽气血虚、胃火盛而作渴。

34223 竹叶黄耆汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】黄耆 甘草 黄芩 川芎 当归 白芍 人参 半夏 石膏 麦冬各八分 生地一钱 淡竹叶十片

【用法】水二钟，加生姜三片，灯心二十根，煎八分，食远温服。

【功用】《金鉴》：清热生津止渴。

【主治】痢疽发背，诸般疗肿，表里热甚，口干大渴者。

34224 竹叶黄耆汤

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】竹叶 黄耆 当归 麦冬 人参 甘草

【用法】水煎服。

【主治】产后烦渴。

34225 竹叶黄耆汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】淡竹叶二钱 人参 黄耆 生地黄 当归 麦冬（去心） 白芍 甘草 石膏（煨） 黄芩（炒）各一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《叶氏女科》：妊娠胃经虚热燥渴。②《文堂集验方》：诸疮溃后，烦热作渴，饮食如常，胃火也。

34226 竹叶黄耆汤

《医钞类编》卷十七。为《校注妇人良方》卷二十一“竹叶归耆汤”之异名。见该条。

34227 竹叶常山汤

【方源】《外台》卷五引《小品方》。

【异名】竹叶恒山汤（《普济方》卷一九八）、备急竹叶常山汤（《金匱翼》卷三）。

【组成】常山三两（切） 淡竹叶一握 小麦一升

【用法】以水五升，渍一宿，明旦煮取二升，分三次温服。

【主治】温疟，壮热微寒，或瘧疟依时手足冷，少时便壮热，或手足烦热干呕者；瘧疟先大寒后大热者。

【宜忌】忌生菜、生葱。

34228 竹叶清心汤

【方源】《准绳·伤寒》卷五。

【组成】淡竹叶二十片 黄芩一钱 梔子一钱半 甘草五分 川黄连五分（姜炒） 薄荷一钱 连翘一钱半 石菖八分

【用法】水二钟，煎服。

【主治】伤寒火热入心，躁烦振慄。

34229 竹叶橘皮汤

《普济方》卷一六三。为方出《肘后方》卷三，名见《鸡峰》卷十七“竹叶汤”之异名。见该条。

34230 竹皮逍遥散

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】青竹皮（卵缩腹痛倍之） 人参 知母 黄连 甘草 滑石 生地黄 韭白 柴胡 犀角

【用法】加生姜三片，大枣二个，水煎，临服入烧焜裆末一钱半调服。微汗，未汗再服，得小便利，阴头肿即愈。

【主治】劳复及易病。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》引本方用量为各一钱。

34231 竹衣麦冬汤

【方源】《医统》卷四十六。

【异名】竹衣麦门冬汤（《景岳全书》卷六十）。

【组成】竹衣一钱（用金竹鲜者，劈开揭取竹内衣膜。竹取沥） 竹茹一丸（弹子大，即

将取衣竹割取青皮是也) 竹沥(即将取衣、茹金竹依制法取之) 麦门冬(去心)二钱 甘草五分 陈皮(去白)五分 白茯苓 桔梗各一钱 杏仁七粒(去皮尖,研)

【用法】上吹咀。水一盞半,加竹叶七个,煎七分,入竹沥一杯,和匀温服。

【主治】一切痰嗽癆瘵声哑。

34232 竹沥二陈汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 白术 人参 竹沥 姜汁

【用法】水二钟,加生姜三片,煎八分,通口服。

【主治】半身不遂,在右属气虚挟痰者。

【加减】若气实能食者,用荆沥。

34233 竹沥二陈汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】熟半夏 白茯苓 广皮 甘草 竹沥

【主治】中风,中脘停痰。

【加减】寒,加生姜;热,加山梔、黄连;痰涎壅盛者,合胆星汤、牛黄清心丸。

34234 竹沥化痰丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】大半夏二两 白矾一两五分 皂角一两 生姜一两二分(水煮四味,半夏肉无白星,晒干,去皂角,同后为末)牛胆南星一两 青皮 陈皮(去白) 黄芩 神曲 山楂 麦芽(炒) 莱子(炒) 真苏子 杏仁(炒) 茯苓各一两 香附一两

【用法】上为末,加竹沥一碗,入姜汁为丸,如梧桐子大。每服七十丸,食远淡姜汤或茶任下。

【主治】久郁痰火诸症。

34235 竹沥化痰丸

《回春》卷二。为《古今医鉴》卷四“导痰小胃丹”之异名。见该条。

34236 竹沥化痰丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】海浮石(煨)十六两 白术(炒)

三十二两 橘皮九十六两 瓜蒌子三十二两 南星(炙)四十八两 茯苓三十二两 黄连十六两 法半夏六十四两 百部草三十二两 南楂六十四两 香附(炙)六十四两 玄参(去芦)十六两 熟军四十八两 莱菔子(炒)三十二两 枳实(炒)六十四两 苏子(炒)九十六两 黄芩九十六两 杏仁(去皮,炒)十六两 贝母十六两

【用法】上为细末,每十六两加竹沥水一两,用冷开水泛为小丸。每服二钱,温开水送下,一日二次。

【功用】清热化痰,快膈止嗽。

【主治】痰火上攻,胸膈不畅,咳嗽喘满,咽喉堵塞。

34237 竹沥化痰丸

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】天冬 枳实 麦冬 云苓 沙参 各三两 瓜蒌子(霜) 川贝母 桔梗 橘皮 苏叶各二两 竹茹四两 薄荷 甘草 桂枝各二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每重三钱,蜡壳封固。每服一丸,临卧时开水送下。

【功用】化痰平喘,止嗽理肺。

34238 竹沥石膏汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】竹沥(旋入) 石膏一两半 赤茯苓(去黑皮) 梔子仁 升麻 玄参 生地黄 知母(焙)各三分

【用法】上除竹沥外,锉如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,同煎至一盞,去滓,入竹沥半合,再煎三沸,食后、临卧温服,一日三次。

【主治】阳厥多怒,狂躁不安,上攻头颈。

34239 竹沥四物汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】川芎 当归 芍药 熟地(俱用姜汁炒) 竹沥

【用法】水二钟,煎八分,通口服。

【主治】半身不遂,在左属血虚者。

34240 竹沥达痰丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【异名】竹沥运痰丸(《杂病源流犀烛》卷十四)、竹沥丸(《医学金针》卷三)。

【组成】半夏二两(汤泡洗七次,再用生姜汁浸透,晒干切片,瓦上微火炒熟用之) 人参一两(去芦) 白茯苓二两(去皮) 陈皮二两(去白) 甘草一两(炙) 白术三两(微火炒过) 大黄三两(酒浸透熟,晒干后用) 黄芩三两(酒炒) 沉香五钱(用最高者) 礞石一两(捣碎,用焰消一两和匀,放入销银锅内,上用瓦片盖之,用盐泥固济晒干,以炭煅过,如金黄色者可用)。

【用法】上为细末,用竹沥一大碗半,又生姜自然汁二钟和匀,入锅内火熬一刻许令热,却将前药末和捣如稀酱,以瓷器盛之,晒干,仍以竹沥、姜汁如前法捣匀,再晒干,如此三次,仍将竹沥为丸,如小豆大。每服百丸,食远白米汤送下。

【功用】①《摄生众妙方》:能运痰于大肠从大便出,不损元气,又能达痰。②《玉案》:清气化痰。

【主治】痰饮积聚,发为痰积、痰核、咳嗽、目眩,惊风痰多而体弱者。

①《摄生众妙方》:痰嗽。②《医学入门》:肠胃痰积,及小儿食积、痰惊风而体弱者。③《杂病源流犀烛》:痰积、痰涎凝聚成积,结在胸膈,吐咯不出,咽门至胃脘窄狭如线疼痛,目眩头旋,腹中累累有块;颈项痰核。④《成方便读》:顽痰胶固经络,不得解化,正气又虚,不能胜滚痰丸之峻剂者。⑤《丸散膏丹集成》:痰火喘急,昏迷不省,厥逆惊痫。

【方论选录】①《成方便读》:夫痰者,皆津液所化,而胶固之痰,又为火灼所致。故治痰者必先降火,而降火者又必先理气。方中黄芩清上,大黄导下,沉香升降诸气,而后礞石得成其消痰散结之功,半夏、陈皮以匡礞石之不逮,人参、甘草以助正气之运行,竹沥行经入络,用其化皮里膜外之痰,姜汁

豁痰和胃,又解竹沥之寒,互相为用耳。②《辽宁中医杂志》(1980; 2: 12):方中以王隐君之礞石滚痰丸为基础,加陈橘红、陈半夏、茯苓、人参、甘草、竹沥、姜汁诸药,其意在橘红、半夏两味皆用其陈者,盖因其药贵在陈久;则无过燥之弊,使其专达消痞散结、顺气化痰之功;茯苓、甘草健脾和中,以消除成痰之途;竹沥清化热痰,姜汁豁痰开胃,两药性味相制,其驱痰之功效更胜;更以人参扶正养津,兼制礞石滚痰丸峻厉之性。其主以清热逐痰,佐以扶正养津,功专理正气虚衰、顽痰热结之证。此攻中有补,泻不损正,实先入制方用药之妙。

34241 竹沥达痰丸

【方源】《医方集解》。

【组成】青礞石一两 沉香五钱 大黄(酒蒸) 黄芩 橘红 半夏各二两 甘草一两

【用法】先将礞石打碎,用朴消一两,同入瓦罐,盐泥固济,晒干火煅,石色如金为度,研末,和诸药,竹沥、姜汁为丸,姜汤送下。

【功用】①《重订通俗伤寒论》:苦辛咸降,荡涤痰涎。②《古今名方》:清热逐痰。

【主治】实热老痰,咳嗽痰稠,或癫狂,或惊痫,或神昏,大便秘结,舌苔黄厚而腻。

①《医方集解》:实热老痰,怪证百病。②《饲鹤亭集方》:痰火上逆,喘急昏迷,如痴如狂,惊痫厥逆,无论老幼,痰多怪病,变幻百出之症。③《重订通俗伤寒论》:痰火蕴结胃肠,恶心呕吐,胸膈壅塞,嘈杂脘满,便溏腹泄,或肠中辘辘有声之重者。④《全国中药成药处方集》(上海方):痰多喘急。⑤《古今名方》:咳喘痰稠,大便秘结,舌苔黄厚而腻;以及痰热蕴结,神志昏迷,癫狂惊痫。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(上海方):孕妇忌服。

34242 竹沥导痰丸

【方源】《墨宝斋集验方》。

【组成】橘红一斤(去白) 白茯苓四两

半夏曲八两(炒) 枳壳八两(麸炒) 黄芩八两(酒洗) 生甘草四两 萝卜子四两(炒) 天花粉五两 桔梗四两 当归四两(酒洗) 竹沥汁一碗 神曲四两(炒) 贝母四两

【用法】上为末，竹叶汤和竹沥同滴为丸，如绿豆大。每服百丸，食远白汤送下。

【主治】①《墨宝斋集验方》：痰火。②《医学启蒙汇编》：一切痰饮，胸膈壅滞，脾虚不运，咳嗽吐痰，咽喉不利。

【备考】《医学启蒙》有白芥子，无萝卜子。
34243 竹沥导痰丸

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】橘红一斤 枳壳(炒)八两 黄芩(炒)八两 半夏曲(姜炒)四两 生甘草四两 白茯苓四两 白芥子(炒)四两 神曲(炒)四两 川贝母四两 花粉五两

【用法】上为末，以竹沥一大碗为丸，如梧桐子大。每服百丸，食远白汤送下。

【主治】一切痰饱，胸膈痞塞，脾虚不运，咳嗽吐痰，咽喉不利。

34244 竹沥导痰汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】导痰汤加竹沥

【用法】导痰汤冲竹沥服。

【功用】清火化痰。

【主治】痰结不语，有火者。

34245 竹沥运痰丸

《杂病源流犀烛》卷十四。为《摄生众妙方》卷六“竹沥达痰丸”之异名。见该条。

34246 竹沥泄热汤

【方源】《外台》卷二十一引《鹏繁方》。

【组成】竹沥一升 麻黄 大青 梔子 人参 玄参 升麻 茯苓 知母各三两 石膏八两(碎) 生姜四两 芍药四两 生葛八两

【用法】上切。以水九升，煮取二升，去滓，下竹沥，更煎三五沸，分三服。

【主治】肝阳气伏邪热，喘逆闷恐，眼视无

明，狂悖非意而言。

34247 竹沥泄热汤

【方源】《千金》卷十一。

【异名】竹沥汤(《圣济总录》卷六十七) 竹沥泻热汤(《普济方》卷十四)。

【组成】竹沥一升 麻黄三分 石膏八分 生姜 芍药各四分 大青 梔子仁 升麻 茯苓 玄参 知母各三分 生葛八分

【用法】上咬咀。以水九升，煮取二升半，去滓，下竹沥煮两三沸，分三服。

【主治】①《千金》：肝实热，阳气伏邪热，喘逆闷恐，目视物无明，狂悖非意而言。②《圣济总录》：气逆怒狂，阳气暴厥。

【加减】须利，去芍药，加芒消三分，生地黄五分。

【方论选录】《千金方衍义》：喘逆狂闷，明是木邪无畏反侮肺金之象。方用竹沥润火清痰为主，兼以麻黄、升麻开泄肺满于上，大青引领知母、石膏等味降泄肝实于下，可谓峻矣。设亢极不应即应，须加芒消以润下之，芍药益气不若地黄之滋血，故易之。

34248 竹沥泻热汤

《普济方》卷十四。为《千金》卷十一“竹沥泄热汤”之异名。见该条。

34249 竹沥枳术丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】半夏 南星(用白矾、皂角、生姜煮半日) 枳实 条芩 陈皮 苍术 山楂 芥子 白茯苓各一两 黄连 当归各五钱

【用法】上为末，加神曲六两，用姜汁、竹沥各一盏煮糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，白汤送下；有痰，姜汤送下。

【功用】化痰清火，健脾理气，消食止呕。

①《医学入门》：化痰清火，健脾消食。却瘴。②《古今医鉴》：理胃调脾。肥白气虚之人服此药，预防倒仆之患。③《北京市中药成方选集》：顺气除湿，化痰止呕。

【主治】《北京市中药成方选集》：脾胃虚弱，饮食不化，呕吐痰涎，胸膈闷。

【备考】《古今医鉴》有白术。

34250 竹沥枳术丸

【方源】《回春》卷二。

【异名】竹沥枳实丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】白术(去芦,土炒) 苍术(泔制盐水炒)各二两 枳实(麸炒) 陈皮(去白) 白茯苓(去皮) 半夏(白矾、皂角、生姜水煮干) 南星(制同上) 黄连(姜炒) 条芩(酒炒) 当归(酒洗) 山楂(去核) 白芥子(炒) 白芍(酒炒)各二两 人参五钱 木香一钱

【用法】上为细末,以神曲六两,姜汁一盞,竹沥一碗,煮糊为丸,如梧桐子大。每服百丸,食远淡姜汤送下。

【功用】①《回春》:化痰清火,顺气除湿祛晕眩,疗麻木,养血,健脾胃。②《寿世保元》:消酒食,开郁结,养气血。

【主治】中风。

34251 竹沥枳实丸

《中国医学大辞典》。为《回春》卷二“竹沥枳术丸”之异名。见该条。

34252 竹沥涤痰汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】川贝二钱 天竺黄六分 羚羊角一钱五分 桑皮二钱 瓜蒌仁四钱 石决明八钱 杏仁三钱 旋覆花一钱(绢包)

【用法】加淡竹沥半杯,生姜汁两滴,同冲服。

【主治】痰气结胸,当分燥湿,痰随火升,壅于中脘。

34253 竹沥涤痰汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】栝楼仁四钱 生桑皮 川贝 光杏仁各三钱 旋覆花二钱(拌包) 飞滑石六钱 石决明八钱 天竺黄一钱半

【用法】加淡竹沥半杯,生姜汁两滴,同冲服。

【主治】痰随火升,上壅胸膈之冷哮。

【加减】挟肝火者,加羚羊一钱。

【备考】初用竹沥涤痰汤送下节斋化痰丸,以蠲痰而降火,继用费氏鹅梨汤缓通肺窍,除其积痰以芟根。

34254 竹沥葛根汤

《幼幼新书》卷十四引《婴童方》。为《外台》卷三十六引《广济方》“竹沥汤”之异名。见该条。

34255 竹沥解疫煎

【方源】《松峰说疫》卷三。

【组成】黄连 黄芩 梔子 胆草 僵蚕(泡,焙) 胆星 蒺仁(去油,研) 川贝(去心,研) 橘红 半夏(制)

【用法】流水煎熟,用竹沥、姜汁兑服,总以竹沥为君,多则一钟,少亦半钟。

【主治】痰疫,感疫疠之气,风火痰三者合而成病。初得之不过头微痛,身微觉拘急寒热,心腹微觉疼痛胀满,三两日内抖然妄见鬼神,狂言直视,口吐涎沫,鼻中流涕,手足躁扰,奔走狂叫,脉沉紧而数,身体不热,亦有热者。

【备考】宜先针少商穴并十指。

34256 竹茹二陈汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】竹茹二钱 陈皮 半夏 白茯苓各一钱 甘草(炙)五分

【用法】水二盞,加生姜七片,煎八分服。

【主治】胃中有热,膈上有痰,呕吐不已。

34257 竹茹石膏汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】陈皮 半夏 石膏 茯苓 竹茹

【用法】水煎服。

【主治】麻痞,吐。

34258 竹茹石膏汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】橘红 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻痘呕吐。

34259 竹茹石膏汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】半夏(姜制) 赤苓 陈皮 竹茹 生甘草 石膏(煨)

【用法】生姜为引，水煎服。

【功用】和中清热。

【主治】麻疹火邪内迫，胃气冲逆，呕吐。

34260 竹茹石膏汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】竹茹 石膏 黄芩 陈皮 半夏

【用法】水煎服。

【主治】麻疹发热之时，吐利并作。

【加减】吐多者，去半夏，加柿蒂。

34261 竹茹石膏汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】陈皮 石膏 竹茹 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻症吐利兼作，或滞下，火邪内迫多吐。

34262 竹茹石膏汤

【方源】《疫喉浅论·新补会厌论》。

【异名】青龙白虎汤。

【组成】鲜竹茹三钱 软石膏五钱

【用法】用井、河水各半煎，温服。

【主治】疫喉白腐，壮热如烙，烦渴引饮。

34263 竹茹龙胆汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍一两 龙胆草 半夏各一钱 茯苓五钱 茵陈 竹茹各二钱 白术三钱

【用法】水煎服。

【主治】胆怯而湿乘，心惊胆颤，面目俱黄，小水不利，皮肤瘦削。

34264 竹茹地黄汤

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】青竹茹半两 生地黄一两(细切) 蒲黄半两

【用法】以水一大盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】九窍、四肢指歧间出血。

34265 竹茹麦冬汤

《赤水玄珠》卷十四。为《医统》卷四十七

“竹茹麦门冬汤”之异名。见该条。

34266 竹茹麦冬汤

《盘珠集》卷下。为《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《圣惠》“竹茹汤”之异名。见该条。

34267 竹茹阿胶汤

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】青竹茹二钱(姜汁浸) 阿胶二钱(蛤粉炒) 炒当归三钱 黑山栀八分 大生地四钱 白芍药二钱 川芎一钱 明天麻一钱(煨) 石决明三钱(煨) 陈皮八分 焦术二钱

【功用】滋木清热以息风。

【主治】子痫。冬月妊娠已七八月之间，外感风寒，壅于肺络，内风煽炽，痰气升逆，昏迷不醒，手足筋脉拘挛，右手脉闭，左手脉数而涩，服钩藤生地竹沥饮后，拘挛发搐减轻，痰去人稍明白者。

34268 竹茹柿蒂汤

【方源】《麻疹全书》卷三。

【组成】竹茹一钱 柿蒂二钱 人参一钱 橘红 生姜五片 丁香二钱

【主治】久病呃逆因于寒者。

【备考】方中橘红用量原缺。

34269 竹茹柿蒂汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【异名】竹茹汤(《一盘珠》卷三)。

【组成】竹茹 柿蒂 陈皮 半夏 甘草

【用法】水煎服。

【功用】清火安胃

【主治】麻症实火呃逆。

【加减】因恼怒发呃者，加柴胡、青皮、黄芩；实热痰火发呃逆者，去半夏、甘草，加贝母、石膏。

34270 竹茹浸膏片

【方源】《中药制剂汇编》。

【组成】竹茹外皮1kg

【制法】取竹茹加入12倍量水中，以100℃温浸3小时，滤取药液另存；残渣再加10倍量水，同法提取2小时，滤取液与前液

合并；浓缩至生药量 2:1 时，加 95% 乙醇 1.5 倍量沉淀杂质，静置 4~8 小时，取上清液过滤，沉淀用 60% 醇洗 2~3 次，将可溶性成分洗出，洗液与滤液合并，回收乙醇，放冷，再过滤一次，浓缩成浓膏，测定其含量，按规定的浸膏量，加辅料适量，压制成片，每片内含总抽出物 100 毫克，即得。

【用法】每服 1~3 片。

【功用】凉血除热。

【主治】血热引起之吐血，衄血及崩中，还可用于胃热呕吐及呃逆。

34271 竹茹寄生汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】竹茹 桑寄生 阿胶（炙燥） 艾叶 芍药 白术各等分

【用法】上锉，如麻豆大，拌匀。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠漏胎，心腹疼痛，或时下血。

34272 竹茹紫菀汤

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】紫菀 天冬各一两 桔梗五钱 甘草 杏仁 桑皮各二钱半

【用法】每服五钱，加竹茹一块，水煎，去滓，加蜜半匙，再煎二沸，温服。

【主治】咳嗽不止，胎不安。

34273 竹茹温胆汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】柴胡二钱 枳实（麸炒）一钱 半夏一钱 竹茹一钱 陈皮一钱 茯苓一钱 桔梗一钱 香附八分 甘草三分 人参五分 麦门冬（去心）三分 黄连一钱五分

【用法】上咬咀。加生姜三片，大枣一个，煎八分，不拘时候服。

【主治】伤寒日数过多，其热不退，梦寐不宁，心惊恍惚，烦躁多痰。

34274 竹茹橘皮汤

《中国医学大辞典》。为《金匱》卷中“橘皮竹茹汤”之异名。见该条。

34275 竹箴下气汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】生甘竹箴 一虎口 石膏一两 生姜 橘皮各三两 甘草三两（炙）

【用法】上切。以水七升，煮竹箴，取四升半，去滓，纳诸药，煮取二升，分二服。

【主治】卒急上气，胸心满。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

34276 竹叶加生姜汤

《圣济总录》卷二十五。即《伤寒论》“竹叶石膏汤”加生姜。见该条。

34277 竹衣麦门冬汤

《景岳全书》卷六十。为《医统》卷四十六“竹衣麦冬汤”之异名。见该条。

34278 竹茹麦门冬汤

【方源】《医统》卷四十七。

【异名】竹茹麦冬汤（《赤水玄珠》卷十四）。

【组成】淡竹茹 麦门冬各等分

【用法】上咬咀。每服七钱，水二钟，煎八分，不拘时候。

【主治】大病后，表里俱虚，内无津液，烦渴心躁，及诸虚烦热，不恶寒，身不痛。

34279 竹沥磨犀角饮子

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】竹沥饮（《普济方》卷三八四）。

【组成】竹沥二合 犀角

【用法】上药，捣犀角，于竹沥内磨令浓。量儿大小，分减服之，每日三四次。

【主治】①《圣惠》：小儿心热惊悸。②《普济方》：小儿心热惊悸，精神恍惚，眠卧不安；疮痘烦热多躁。

舌

34280 舌化丹

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】辰砂 血竭 硼砂 乳香（去油） 没药（去油） 雄黄 蟾酥（人乳浸化） 轻粉 冰片 麝香各等分

【用法】上为细末，用头生乳捣和为丸，如小麦大。每用三丸，含舌下噙化，咽下；出汗自消；如无汗，以热酒催之。

【主治】疔疮，无名肿毒。

34281 舌活散

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】真玄明粉一钱二分 贝母二钱(先用糯米洗湿，入贝母同炒干，后去米不用) 陈皮(去白)五钱(用海粉一钱五分化水，煮干为末) 海粉(仍用)二钱五分

【用法】上为末。每饭后以舌活少许，咽下。少睡片时取效。

【主治】梅核气，因积热生痰，痰结如核，在喉中吞之则下，不吞则在喉，但可以进水，不可以进饮食。

先

34282 先期丸

【方源】方出《广笔记》卷二，名见《医学正印》。

【组成】枇杷叶一斤(蜜炙) 白芍药半斤(酒浸，切片，半生半炒) 怀地黄六两(酒洗) 熟怀地黄四两 青蒿子五两(童便浸) 五味子四两(蜜蒸) 生甘草(去皮)一两 山茱萸肉四两 黄柏四两(去皮，切片，蜜拌炒) 川续断(酒洗，炒)四两 阿胶五两(蛤粉炒，无真者，鹿角胶代之，重汤酒化) 杜仲(去皮，酥炙)三两

【用法】上为细末，怀山药粉四两打糊，同炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，空心淡醋汤吞，饥时更进一服。

【主治】妇人血热，经行先期。

【宜忌】忌白萝卜。

34283 先期汤

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】生地黄 川当归 白芍药各二钱 黄柏 知母各一钱 条芩 黄连 川芎 阿胶(炒)各八分 艾叶 香附 炙甘草各七分

【用法】水二钟，煎一钟，食前温服。

【功用】凉血固经。

【主治】经水先期而来。

34284 先锋散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】硼砂一钱 瓜蒂五分 片脑一分 大戟七分

【用法】上为末。搐鼻。热泪如溅者奏效。

【主治】痘疮攻眼。

34285 先解汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】羌活五分 炒梔子三钱 柴胡二钱 白芍三钱 半夏一钱 茯苓三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】散火。

【主治】火初起之时，尚未现于头目口舌之际。

34286 先天一气丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】水中金一钱 滑石(研细，丹皮汤煮过)六两 粉甘草二钱 益智仁六钱 人参一两 木香(不见火)二钱 砂仁三钱 香附(童便制)一两 甘松四钱 莪术(煨)三钱 桔梗二钱 黄耆(蜜炙)二钱 山药二钱 茯神二钱五分 茯苓二钱五分 远志肉(净)一钱五分 牛黄五分 天竺黄三钱 麝香三分 朱砂(飞)二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱，金箔七十张为衣。淡姜汤送下；小儿吐泻，惊疳，积滞，米汤调下；急慢惊风，肚腹痛，姜汤调下；危急痘症，灯心汤送下。

【主治】远年痰火，中风喘逆，癫痫谵语，惊悸怔忡，胃脘痛，噎膈，腹胀，气满，癰，疔，诸无名怪症。

34287 先天一气汤

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】皂角树皮(根身枝皮俱用；锉片，每斤用食盐二两半，木柴灰二两半，米醋六两，无灰好酒六两，拌匀炒干)一两二钱 豮猪肉四两 好土茯苓四两

【用法】水四碗，煎肉熟为度，取肉切碎，

酒下药汁，多作二次，少作一次服，上部食后服，中部食远服，下部空心服；滓再煎，中时服；滓三煎，临睡服；多煎亦可代茶。一日一贴，切莫间断。服三四贴后，或手足酸软，遍身反疼，是药迫毒出之验，不必惊疑，至十贴自效，肌肉渐生；服至疮好，精神倍常。

【主治】多年杨梅结毒、轻粉毒，不收口，筋骨疼痛，昼夜呻吟；并手足拘挛，角弓反张，梅瘕等症。

【加减】上部加桔梗、川芎、升麻，顶上再加藁本，面上再加蔓荆子；下部玉茎阴囊加猪苓、泽泻；腿足加牛膝、木瓜、防己、薏苡仁。

【宜忌】忌烧酒、牛肉、茶、房事。

34288 先天一气酒

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】铅七斤（打成片，剪碎）

【用法】将铅片浸上好堆花烧酒十五斤内，泥封坛口，隔汤文武火煮一昼夜，埋土中一七，退火气。早、晚任服一二杯。待筋骨不痛，然后服八宝丹收功。

【主治】杨梅疮，筋骨疼痛。

34289 先天大造丸

【方源】《胎产指南》卷一。

【组成】紫河车一具（壮盛头胎者佳。如新鲜者，挑去血筋，和酒浆煮烂，入药搅匀）山药一两 人参一两五钱 归身二两五钱 麦冬一两 五味子五钱 黄柏八分（久患泻入不可用）天冬一两 怀生地二两

【用法】先将地黄、麦冬蒸捣如泥，次下诸药末，又捣千余下为丸，如绿豆大。每服一百丸，空心清汤送下。

【功用】安胎，补母，寿子。

【加减】脾胃虚弱常泻人，减地黄，用白术一两。

【宜忌】忌食萝卜。

34290 先天大造丸

【方源】《胎产指南》卷八。

【组成】紫河车一具 人参一两 当归八钱 麦冬八钱 银柴胡六钱 生地二两 黄连五钱 山药一两 石斛八两（酒蒸）杞子一两 黄柏七钱（酒蒸）

【用法】将门冬、地黄先捣如泥，河车蒸熟亦捣，后入诸药末，均为丸。若焙河车末，炼蜜为丸。

【主治】骨蒸劳热。

34291 先天大造丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】棉花子十二两（青盐酒拌浸一宿，去壳，炒黄色）杜仲八两（青盐酒拌浸一宿，炒断丝）芡实（蒸）茯苓 薏苡仁（微炒）各四两 破故纸五两（青盐酒浸，炒）山药四两（炒）枸杞子（炒）五两 虎骨（酥炙）二两 金钗石斛八两（熬膏）

【用法】上为细末，炼蜜同膏为丸，如梧桐子大。每服四钱，空心盐汤送下，渐加至五钱。

【功用】补虚。

【备考】一七十老人传云：服后须白再黑，齿落重生，七旬之外，并不畏冷，筋骨强健。

34292 先天大造丸

【方源】《徐评外科正宗》卷七。

【组成】紫河车一具（酒煮，捣膏）熟地黄四两（酒煮，捣膏）归身 茯苓 人参 枸杞 菟丝子 肉苁蓉（酒洗，捣膏）黄精 白术 何首乌（去皮，用黑豆同煮，捣膏）川牛膝 骨碎补（去毛，微炒）仙茅（浸去赤汁，蒸熟，去皮，捣膏）各二两 川巴戟（去骨）破故纸（炒）远志（去心，炒）各一两 木香 青盐各五钱 丁香三钱 黑枣肉二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。

【主治】风寒湿毒袭于经络，初起皮色不变，漫肿无头；或阴虚外寒侵入，初起筋骨疼痛，日久遂肿，溃后脓水清稀，久而不愈，渐成漏症；一切气血虚羸，劳伤内损，及男

妇久无嗣息。

34293 先天归一汤

【方源】《古今医鉴》卷十一引王兵宪方。

【组成】人参八钱 白术一两(麸炒) 白茯苓(去皮)一两 甘草四钱 川芎一两 当归一两二钱 生地(酒洗)一两 白芍八钱 砂仁七钱(炒) 香附七钱 陈皮六钱 牛膝八钱(酒炒) 半夏七钱(汤泡) 丹皮七钱(去骨)

【用法】均作十剂。加生姜三片,水二钟煎,空心服;滓再煎,临卧时服。经未行,先服五剂,后服五剂,此药尽即效。如无他病,只照本方服之;如有他病,宜照后加减服之,经脉调和,即当怀孕。

【功用】求嗣。

【加减】妇人子宫久冷不孕,加干姜、肉桂各五钱,如冷甚,炙丹田七壮;子宫太热,加黄柏、知母、柴胡各六钱;白带、白淫、白浊时下,加白芷一两,升麻五钱,或倍半夏;气不流通者,加木香三钱;平素虚劳盗汗,或恶寒发热,加黄耆、肉桂;咳嗽,加阿胶、贝母各四钱;劳热、血枯,加柴胡、鳖甲;劳甚,腰背疼痛者,炙膏肓七壮;饮食减少,倍白术、陈皮,加厚朴、神曲(炒)各五钱;肥人痰盛,迷塞子宫,加南星、三棱各六钱;经水将行,小腹作痛者,加桃仁、红花各四钱,未效去人参,加五灵脂六钱(半炒、半生用),乳香三钱;腰腿痛者,加杜仲一两二钱,羌活三钱,桃仁四钱;经行后作疼者,加熟地黄六钱,当归八钱,五味子三钱;腹下有痞者,去牛膝,加三棱、莪术各六钱,桃仁、枳实各五钱,前五剂加槟榔五钱;腹有鬼胎者,状如怀孕,非真胎,宜用桃仁、干漆、肉桂、麝香、水银之类丸药以去之,再服本汤,以候经调;经水前期而至者,加黄芩五钱,炒蒲黄五钱;经水过期而至,加干姜、牡丹皮各五钱;经水崩漏不止,加莲蓬壳灰五钱,白芷八钱,猪骨头灰六钱,熟艾三钱,黄芩五钱;平日有风寒湿气疼痛,加秦艽三钱,羌

活七钱,乳香、没药各五钱,或加苍术;有热疼痛,加黄柏;心腹疼痛者,加大腹皮、木香各三钱,槟榔五钱;小便涩少不通,加猪苓、泽泻,亦不宜多服,恐泄肾气;室女经脉涩滞不通者,加刘寄奴六钱,不应,加卫矛三钱(即鬼箭羽)。

34294 先天补胎丸

【方源】《全国中药成药处方集》。(天津方)

【组成】人参(去芦) 生黄耆各三钱 当归二两 白芍七钱 川芎四钱 熟地一两 砂仁四钱 焦白术一两 黄芩七钱 杜仲炭(盐炒)七钱 续断七钱 生山药八钱 艾炭三钱 丹皮七钱 菟丝子五钱 甘草三钱 广皮五钱 香附(醋制)一两 枣肉一两 丝绵炭一钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,二钱重,蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸,白开水送下。

【功用】补气,养血,安胎。

【主治】妊娠腹痛,脾胃虚弱,四肢浮肿,腰腿痠痛,胸胁胀满。

34295 先天青龙散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】灯草炭 粉儿茶各五钱 梅片 紫雪丹各一钱 薄荷 蒲黄各五钱 风化消五钱 硼砂二钱 青黛 人中白各三钱

【用法】上为极细末。吹于患处,一日三次。

【主治】咽喉初起,肿红焮痛,并不腐烂。

34296 先天真一丹

【方源】《济阳纲目》卷六十八。

【组成】白虎首经粉九鼎 阴炼秋石 乳粉 干山药 石菖蒲(九节者) 茅山苍术(米泔浸)各四两 旱莲草二两 甘州枸杞子三两 珍珠 菊花蕊 甘草各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服六七十丸,加至百丸,空心白滚汤送下。

【功用】却老返童,转周身气,延年。

34297 先锋开路散

《眼科秘诀》卷一。为原书同卷“十大将

军冲翳散”之异名，见该条。

乔

34298 乔氏阴阳攻积丸

《张氏医通》卷十三。即《医宗必读》卷七“新制阴阳攻积丸”去橘红、槟榔、厚朴、枳实、菖蒲、桔梗。见该条。

年

34299 年分散

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】雄黄 南星 半夏 川乌 草乌 朱砂 白天麻

【用法】上药并生为末。每服半分，生姜、葱酒调送下。

【主治】伤寒，头疼身痛，发热恶寒，无汗。

34300 年大将军洗痛方

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】威灵仙五钱 荆芥二钱半 防风二钱半 木香一钱 全当归三钱 乌药二钱 木瓜三钱 桂枝五钱 红花三钱半 川续断二钱半

【用法】用黄酒五大碗煎滚，先熏后洗。

【功用】止痛。

【主治】跌打损伤。

朱

34301 朱子丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《肘后方》。

【组成】生地黄汁五小合 羊肾脂一小合

【用法】先温肾脂令暖，分三四服。

【主治】小儿三岁即患痢，初患脓少血多，四日脓多血少，日夜四十余行。

【宜忌】乳母须禁食。

34302 朱连散

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】雄黄 朱砂 黄连 乳香各半分 冰片 麝香各一厘

【用法】取金眼虾蟆胆汁调和，塞口内。或

痰或粪，略出少许即苏。

【主治】小儿惊风退后，声哑不能言。

34303 朱沉丹

《医学纲目》卷三十八。即《保婴集》“朱沉煎”。见该条。

34304 朱沉煎

【方源】《保婴集》。

【组成】朱砂二钱（水飞） 沉香二钱 藿香叶三钱 滑石半两 丁香十四个

【用法】上为细末。每服半钱，用新汲水一盞，芝麻油点成花子，抄药在上，须臾坠，滤去水，却用别水空心送下。

【主治】小儿呕吐不止。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“朱沉丹”。

34305 朱碧散

【方源】《婴童百问》卷七。

【组成】人参（去芦）一两 白术（炒）一两 白茯苓一两 甘草（炙）一两 辰砂（水飞）半两 灯心三钱 钩藤半两 麝香半钱

【用法】上为细末。每服一钱，用白汤送下，不拘时服。

【主治】小儿吐泻后，有惊症，并粪清者。

34306 朱附丸

《杨氏家藏方》卷一。为《圣惠》卷二十一“天麻丸”之异名。见该条。

34307 朱附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子一个（七钱重者） 朱砂三钱 巴豆七粒

【用法】附子去脐，下剝一窍，入朱砂在内，再将取出附子屑填满，外用饼面裹厚两小钱许，可用巴豆去壳，分作十四片贴在面上，再用白面裹，仍用湿纸裹三五重，以文武火煨令面香，取出放冷，去面、巴豆，将附子去皮脐切片焙干为末，朱砂别研，二味和调，滴水为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前浓煎桂花汤送下，每日一次，病重再服。

【主治】十膈五噎。

34308 朱附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子二两(炮,去皮脐,蒸) 酸枣仁半两(去皮炒,别研) 朱砂(好者,酒浸一伏时,别研) 茯神(去木)各一两

【用法】上为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒或盐汤送下。

【主治】心虚,睡而汗出。

【备考】本方加钟乳粉名“朱附钟乳丸”。

34309 朱附丹

【方源】《普济方》卷十八引《余居士选奇方》。

【组成】附子一两(炮,去皮脐) 朱砂半两(研) 茯神一两

【用法】上为末,白而糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心盐汤送下。

【主治】心肾不足,气不升降,惊悸,用心过度。

34310 朱鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】朱砂一钱 鸡蛋清三个

【用法】搅匀,生服。死胎即出,未死立安。

【主治】胎动不安。

34311 朱矾散

《局方》卷十(吴直阁增诸家名方)。为《圣惠》卷八十二“白矾散”之异名。见该条。

34312 朱矾散

《片玉心书》卷五。为《幼幼新书》卷五引《医方妙选》“保命散”之异名。见该条。

34313 朱明丸

【方源】《产论》卷一。

【组成】乔麦一两 大黄三两

【用法】上为末,面糊为丸。每服一钱。

【主治】妊娠大便燥结而腹满者。

34314 朱金汤

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】代赭石(火煨,醋淬十次)

【用法】上为细末,水飞过,晒干。每服半钱或一钱,煎真金汤调下,连进三服,不拘时候。儿脚胫上有赤斑点出者,不可治也。

【主治】小儿急慢惊风,吊眼撮口,搐搦不定,壮热困重。

34315 朱珀散

【方源】《幼科证治大全》。

【组成】滑石 朱砂 琥珀 甘草

【用法】上为末。每服一钱,灯心汤调下。

【主治】小儿尿血。

34316 朱珀膏

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】真西珀(研)一两 上桂心五钱或加用八钱(研) 辰砂(水飞净)五钱 香白芷一两(生,研) 防风(生,晒脆,研,取净末)一两 当归(生,晒脆,研,净末)一两 广木香(生,晒)五钱 丁香五钱(二味同研,丁香之油渗入木香,则易研易细,俱生用) 木通一两(生,晒脆,研净末;此味质最坚,须加重分两研细,筛取极细者,如数用。防风亦如此)

【用法】上药各为极细末,调和一处贮瓶听用。

【主治】颈项瘰癧;及腋下初结小核,渐如连珠,不消不溃,或溃而经久不愈,或成漏症,寒痰冷症。

34317 朱砂丸

【方源】《外台》卷五引《古今录验》。

【异名】丹砂丸(《圣济总录》卷三十五)。

【组成】朱砂一两 蜀常山三两

【用法】上为细末;别取朱砂,瓷器中细研,可一日研如而,白蜜和童便捣为丸,如梧桐子大。每服三丸,用清酒送下,行五十余步,随意坐卧;无酒,汤送下亦得,唯须暖将息。病人气力强,仍不废行动者,则须于当发日服之。如似日西发者,临发之日勿食,平旦服三丸,巳时服三丸,午后更服三丸则愈;若不愈,必定轻微,更服则愈。余时发者准此,日西一时,任意消息。其病人气力微弱者,不得临发日服,应予先一日服之。如似明日发者,今日平旦空腹服三丸,至斋时食一碗粥,至日西更服三丸,至日暮后食一碗淡粥,并

不得饱食；至一更尽，更服三丸，至平明食粥一碗，至斋前更进三丸，不得食，至午时更进三丸，必愈。愈后三日以来，唯得食甜粥饮浆。病人十五以上者，一服三丸；十五以下，七岁以上者，一服二丸；七岁以下者，一服一丸；如小者，分此一丸作二小丸服之。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】忌生冷，酢，滑膩，面及饱食，生血物，生葱，生菜。

34318 朱砂丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《仙人水鉴》。

【组成】朱砂三钱（研） 青黛一两（研） 黄连 郁金（为末） 夜明砂（炒焦黑）各半两 麝香 熊胆（用冷水一鸡子多，浸一宿）各一钱

【用法】上为细末，次入浸熊胆水为丸，如绿豆大。每服三丸至五丸，空心、临卧金银薄荷汤送下。

【主治】小儿惊疳。

【宜忌】忌生冷、油腻。

34319 朱砂丸

【方源】《外台》卷五引《救急方》。

【异名】丹砂丸（《普济方》卷一九九）。

【组成】朱砂（光明者） 牛膝 常山各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。候疟发日，平明服七丸，饮送下；欲觉发时，更服七丸，当日不断，更作一服。

【主治】疟、瘴，经百日或一年以上诸药不能愈者。

【宜忌】忌生葱、生菜、生血物、油腻、牛肉等。

34320 朱砂丸

【方源】《外台》卷十三引《广济方》

【异名】丹砂丸（《圣惠》卷三十一）。

【组成】光明朱砂一大两 桃仁十枚（去皮尖双仁，熬） 麝香三分（研）

【用法】研朱砂、麝香令细末，别捣桃仁如

脂，合和为丸，如梧桐子大，其和不合，以蜜少许合成讫。每服一七丸，清饮送下，一日二次。

【功用】辟诸鬼气恶症。

【主治】①《外台》引《广济方》：瘦病伏连。②《普济方》：伤寒心中硬痛，不可忍，或腹胀满，欲成结胸。

【宜忌】忌生血物。

34321 朱砂丸

【方源】《颅凶经》卷上。

【组成】朱砂半石莲大 阿魏如朱砂大 蝙蝠血三两滴 蟾酥少许

【用法】上为细末，和少许口脂调，先以桃、柳枝煎汤浴儿，后看儿大小，以绿豆大填儿脐中，后用纸片可脐中贴之，用青衣盖儿，看虫出来。

【主治】孩子疳痢。

34322 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 龙齿一两 犀角屑一两 天麻一两（去芦头） 秦艽三分（去苗） 川升麻三分 羚羊角屑一两 防风半两（去芦头） 茯神一两 黄芩半两 铁粉一两半（细研） 麦门冬一两半（去心，焙） 远志半两（去心） 汉防己三分 铅霜三分（细研）

【用法】上为末，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以梗米粥饮送下，不拘时候。

【主治】心脏中风，手足惊掣，心神狂乱，恍惚烦闷，言语謇涩。

【备考】《普济方》引本方有人参。

34323 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 龙脑一分（细研） 牛黄一分（细研） 龙齿一两（细研） 天竺黄一两（细研） 金银箔各一百片（细研） 虎睛三对（酒浸一宿，微炙） 马牙消一两 麝香一分（细研） 犀

角屑 人参(去芦头) 茯神 川升麻 羚羊角屑 天麻 麦门冬(去心, 焙) 独活 甘菊花 子芩各一两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,以荆芥汤送下。不拘时候。

【主治】心脏风热,多惊恍惚,烦躁语涩。

34324 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】朱砂(细研,水飞过) 羚羊角屑 人参(去芦头) 白茯苓各一两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为末,入朱砂同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以温酒送下。

【主治】伤寒后虚损,心气不安,梦寐失精。

34325 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】朱砂二两(细研,水飞过) 人参一两(去芦头) 鬼箭羽二两 雄黄二两(细研,水飞过) 赤小豆二两(炒熟)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服五丸,空心以温水送下。

【主治】时气转相染着,延及外人,人不敢视者。

34326 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】朱砂一两(细研) 太阴玄精半两 牛黄半两 紫石英一两(细研,水飞过) 白石英一两(细研,水飞过) 天南星半两(末,生用) 金箔五十片 龙脑一分 麝香半两 不灰木一两(以牛粪火烧一炊时)

【用法】上为细末,用牛胆汁为丸,如樱桃大。每服一丸,以新汲水嚼下,不拘时候。

【主治】热病,毒热在脏,心神狂乱,壮热烦躁,不得睡卧。

34327 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】朱砂一两(细研,水飞过) 铁粉一两(细研) 远志半两(去心) 人参一两(去芦头) 茯神一两 牛黄一分(细研) 龙脑半分(细研) 虎睛一对(酒浸一宿,微炙) 琥珀半两(细研) 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研)

【用法】上为末,入研了药,同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,煎金银汤送下,不拘时候。

【主治】脉极。惊悸不安、神心烦满,恐畏。

【宜忌】忌羊血。

34328 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】朱砂半两(细研) 青羊胆一枚

【用法】上以朱砂末入胆中,悬屋角,阴干,百日取出,为丸,如小豆大。每服十丸,食后,以粥饮送下。

【功用】能令彻视见远。

【主治】眼昏暗。

34329 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】朱砂一两(细研,水飞过) 川升麻一两 雄黄一两(细研) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 鬼白二两 甘草一两(炙微赤, 锉) 射干一两 麝香半两(细研)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸至七丸,以粥饮送下。不拘时候。

【主治】尸咽喉,痒痛不利。

34330 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】朱砂半两(细研) 桂心半两 附子一两(炮裂,去皮脐) 麝香半钱(细研) 桃仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 巴豆二十一枚(去皮心,研,纸裹,压去油)

【用法】上为末,以面糊为丸,如梧桐子大。每服二丸,以醋汤送下。

【主治】心疝。心腹中疝刺，疼痛不可忍。

34331 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 肉桂一两（去粗皮，为末） 巴豆二十粒（去皮心，研，纸裹压去油） 禹余粮一两（烧，醋淬三遍，细研） 紫石英一两（细研，水飞过）

【用法】上为末，以汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五丸，食前以温酒送下。

【主治】痼病。腹中硬痛，不欲饮食，经久不愈，羸弱无力。

34332 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】朱砂半两 礞砂半两 巴豆一分 硫黄半两 芫花一分（醋拌炒令干，为末） 礞石一两

【用法】先以巴豆去皮心，瓷瓶子内盛之，于堂屋北阴下，正于地掘坑，埋瓶子，以盆子合，受阴气，七日七夜取出，细研，纸裹压去油；其余诸药相和，细研如面，然后入巴豆，更研令匀，用醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服三丸至五丸，以温酒送下。以下宿食为度。

【主治】厌食留滞在脏腑，久不消化。

34333 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】朱砂二分（细研） 木香一分 槟榔一分 丁香一分 乳香一分（细研） 阿魏半分 皂荚一钱（炙） 麝香一钱（细研） 肉豆蔻一分（去壳） 巴豆二十粒（去皮心，以醋煮半日，取出研令细）

【用法】上为细末，以糯米饭为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，以生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】消宿食。

【主治】一切气。

34334 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】朱砂一分（细研） 麝香半两（细研） 砒霜一分（细研） 恒山一分（锉） 虎头骨一分（涂酥炙，令黄） 猢猻头骨一分（炙黄） 虎睛一对（酒浸，微炙） 乳香一分 安息香一分 阿魏一分 巴豆三枚（去皮心及油） 雄黄半两（细研）

【用法】上为末，端午午修合，用醋煮面糊为丸，如豌豆大。用绯帛裹，男左女右，手把一丸；如痰疟，即以醋汤送下一丸。每把者药一丸可疗三人；若女人用者，即可疗二人。

【主治】寒疟，但寒不热，四肢鼓颤不止。

34335 朱砂丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九九。

【组成】朱砂一分 砒霜一分 马牙消一分 猢猻头骨一分（末） 麝香一钱

【用法】上为细末，以醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服二丸，于发时前以冷生姜茶送下。

【主治】瘧疟，发作不定，但热不寒。

【宜忌】忌食热物。

34336 朱砂丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】砒霜半两 朱砂一分 雄黄一分 阿魏一分 麝香三分（以上并细研） 虎头骨一分（涂酥，炙黄） 蛇骨一分（酒浸，炙微黄） 恒山一分（锉） 猢猻头骨一分（炙黄） 天灵盖一枚（烧令白色，上用朱砂点作七星，取五月一日夜作）

【用法】上为末，用醋煮面糊为丸，如小豆大。患者以一丸，男左女右，把之愈，带之亦愈，以醋汤发前服一丸亦愈，插在耳内鼻里亦愈。

【主治】劳疟，发歇寒热，体瘦，四肢疼痛，或时烦渴。

【宜忌】服药即忌食热物。

34337 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】朱砂一分(细研) 麝香一分(细研) 恒山(锉) 川升麻 苦参(锉) 猢猻脑盖(炙微黄) 鳖甲(涂醋炙黄,去裙襕) 乌梅肉(微炒) 柴胡(去苗) 虎头骨(涂酥炙黄) 乌猫粪(烧灰) 驴轴垢 木香 白术 川大黄(锉碎,微炒) 地骨皮各半两 巴豆三分(去皮心,熬令黄,别研如膏,纸裹,压去油)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。空心服四丸,以温水送下。渐吃冷茶半茶碗,良久,吐出痰涎,后更煎热茶下二丸,得吐利便效。

【主治】疟,寒热发作不定,体瘦不能食。

34338 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【异名】丹砂丸(《普济方》卷一九九)。

【组成】朱砂半两 阿魏半两 乳香半两 砒霜半两 麝香一两 豉一两(别研如膏)

【用法】上为细末,以豉并软饭为丸,如绿豆大。每服四丸,煎桃枝汤送下,未发前并吃二服。以吐为效。

【主治】一切疟疾,久疗不愈。

34339 朱砂丸

《圣惠》卷五十六。为《外台》卷十三引《删繁方》“丹砂丸”之异名。见该条。

34340 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】朱砂一两(细研,水飞过) 雄黄一两(细研,水飞过) 鬼臼半两(去须) 莽草半两(微炙) 巴豆十四枚(去皮心,研,纸裹,压去油) 蜈蚣一枚(微炙,去足)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如小豆大。每服三丸,以暖酒送下,不拘时候。

【主治】尸疟。鬼邪毒气,流注身体,令人寒热淋漓,腹痛胀满,精神错乱。

34341 朱砂丸

【方源】《圣惠》五十六。

【组成】朱砂半两(细研) 白矾半两(烧

为灰) 藜芦半两(去芦头,炙) 附子半两(炮裂,去皮脐) 雄黄半两(细研) 蜈蚣一枚(微炙,去足) 巴豆一分(去皮心,研,纸裹,压去油入)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如小豆大。每服二丸,以暖酒送下,不拘时候。

【主治】诸疟,鬼击客忤,心痛上气,魔梦蛊毒。

34342 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】朱砂一两(细研,水飞过) 雄黄一两(细研,水飞过) 麝香一分(细研入) 附子一两(炮裂,去皮脐,为末) 巴豆二十枚(去皮心,研,纸裹,压去油)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如麻子大。每服三丸,以粥饮送下,不拘时候。不利更服三丸,渐加至五丸七丸,以利为度。

【主治】中恶客忤垂死。

34343 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】朱砂三分(细研) 雄黄三分(细研) 附子三分(炮裂,去皮脐) 桂心一两半 巴豆二枚(去皮心、研、纸裹,压去油)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如麻子大。每服五丸,以粥饮送下,不拘时候。不利、更下二丸、若利多即止之。

【主治】尸厥。

34344 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】朱砂一分(研) 蛤粉半两(研) 巴豆一分(去皮心,炒令黄) 硫黄一分(研) 乌头末半两(炒令黄) 麝香半钱(研) 砒霜半分(研)

【用法】上为细末,用煮枣肉为丸,如黍米大。每服三丸,以冷粥饮送下,不拘时候。

【主治】一切痢,久不愈。

【宜忌】忌食热物。

34345 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】朱砂三分(细研) 砒霜半分 巴豆一两(去皮心,研,纸裹,压去油) 麝香一分(细研) 乳香一分(细研) 阿魏一分(面裹煨,面熟为度) 安息香一分

【用法】上为末,以汤浸蒸饼为丸,如绿豆大。每日一丸,空心以枳壳汤送下。

【主治】久痔有头,疼痛,化为疮口,脓水不绝。

34346 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】朱砂一分(细研) 膩粉一分 粉霜一分(细研)

【用法】上为末。用鸡子白为丸,如梧桐子大。每服三丸,于五更初煎葱汤送下。良久当利,如未利再服之。

【功用】内消。

【主治】瘰癧结核肿痛。

34347 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】朱砂二两(细研,水飞过) 礞砂二两(细研) 半夏一两(汤洗七遍,去滑) 木香一两 当归一两(锉,微炒) 巴豆一分(去皮心,用纸裹,压去油)

【用法】上为末,都研令匀,先以酢一升,和狗胆一枚汁,煎如稀汤,为丸如绿豆大。每服二丸,食前以醋汤送下。

【主治】妇人血海风冷,月水每来,攻刺脐腹疼痛,面色萎黄,四肢无力。

34348 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】朱砂一两(细研,水飞过) 乳香半两 白附子半两(炮裂) 铅霜一分(细研) 赤箭一两 独活一两 桑螵蛸半两(微炒) 阿胶三分(捣碎,炒令黄) 附子三分(炮裂,去皮脐) 琥珀半两 桂心半两 麝香一分(细研)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,

如梧桐子大。每服十五丸,以竹沥酒送下,不拘时候。

【主治】产后中风,恍惚,语涩,口角涎出。

34349 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】朱砂一分(细研) 丁香一分 麝香一分(细研) 人参一分(去芦头) 犀角屑半两 黄耆半两(锉) 石膏半两(细研,水飞过) 五灵脂半两 牛黄一分(细研) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三丸,以熟水送下,一日四五次。

【主治】小儿三岁以下,胃口闭,不吃乳。

34350 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂半两(细研,水飞过) 牛黄(细研) 麝香(细研) 干蝎(微炒) 天麻 白附子 白僵蚕(微炒) 干姜(炮裂,锉) 各一分

【用法】上为散,用软粳米饭为丸,如黍米大。每服三丸,以乳汁化下,一日三次。

【主治】小儿中风,口眼偏斜,筋脉拘急及胎中疾病。

34351 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂半两(细研,水飞过) 蛴螬半两(去足,微炒) 白僵蚕半两(微炒) 天南星半两(炮裂)

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。每岁一丸,以薄荷汤送下。

【主治】小儿中风,口眼牵急。

34352 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂半两(细研,水飞过) 牛黄(细研) 麝香(细研) 蚕蛾(微炒) 干蝎(微炒) 天麻 白附子(炮裂) 龙脑(细研) 羌活各一分

【用法】上为散,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三丸,以薄荷汤送下,一日三四次。

【主治】小儿中风，四肢挛急，心中烦热。
34353 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂半两（细研，水飞过） 天竹黄一分（细研） 牛黄一分（细研） 人参一分（去芦头） 茯神半两 柴胡半两（去苗） 膩粉半两（细研） 黄耆一分（锉） 麝香一钱（细研） 黄芩一分 麦门冬半两（去心，焙） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，煎竹叶汤研下。

【主治】小儿风热多惊。

34354 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂三分（细研，水飞过） 人参半两（去芦头） 龙脑一钱（细研） 马牙消半两 麝香一钱（细研） 牛黄（细研） 天竹黄（细研） 麦门冬（去心，焙） 犀角屑 茯神 升麻 子芩 甘草（炙微赤，锉）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以温水研下，不拘时候。

【主治】小儿心肺烦热，黄瘦毛焦，睡卧多惊，狂语。

34355 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂半分 膩粉半分 麝香半分 雄黄半两 巴豆七粒（去皮心，研，纸裹，压去油）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍粒大。每服一丸，以温荆芥汤送下。三岁以上，加丸数服之。

【主治】小儿惊热，乳食积聚不消。

34356 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂半两（细研，水飞过） 牛黄一分（细研） 麝香半两（细研） 天麻半两 天南星半两（炮裂） 干蝎半两（微炒） 白附子半两（炮裂） 干姜半两（炮

裂，锉） 巴豆半两（去心皮，研，压去油）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。每服一丸，以奶汁送下；荆芥汤送下亦得。

【主治】小儿慢惊风，四肢拘急，心胸痰滞，身体壮热。

34357 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂半两（细研，水飞过） 雄黄半两（细研） 牛黄一分（细研） 龙脑一分（细研） 干蝎半两（微炒） 膩粉一分 水银半两（以铅一分，结为砂子） 硃砂一分（细研）

【用法】先研水银砂子令细，即与诸药同研，入枣肉为丸，如绿豆大。每服百日以上小儿一丸，一岁儿两丸，二三岁儿三丸，以薄荷汤送下。取下粘涎恶物为效。

【主治】小儿慢惊风，抽搐，发歇不定，喉中涎聚，时作声，渐觉虚羸，不下乳食，眼涩多睡。

34358 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分（细研） 犀角屑一分 铅霜一分（研入） 天南星一分（炮裂） 半夏一分（汤洗七遍，去滑） 白附子一分（炮裂） 细辛一分 桂心一分 白僵蚕一分（微炒） 干蝎一分（微炒） 乌蛇三分（酒浸，去皮骨，炙令黄） 巴豆七枚（去皮心，研，纸裹，压去油）

【用法】上为末，一半用无灰酒一中盏熬为膏，入其余药同为丸，如绿豆大。每服二丸，用生姜自然汁少许，入竹沥一合，暖令温送下。

【主治】小儿急惊风，痰涎口噤，手足抽掣。

34359 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分 豉三百粒 皂荚一寸（炙黄焦） 砒霜一分 巴豆十五粒（去皮心，研，纸裹，压去油）

【用法】先研朱砂、砒霜为粉，次入豉、巴豆都令细，以枣肉为丸，如黍米大。一二岁儿，每服一丸，以温水送下。服后得吐泻为效。

【主治】小儿急惊风，兼去心间涎。

34360 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分（细研） 麝香半分（细研） 干蝎二七枚（微炒） 白僵蚕一分（微炒） 胡黄连一分 熊胆一分 牛黄半分（细研）

【用法】上为末，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以金银汤送下，不拘时候。

【主治】小儿天钓，心神烦乱，抽掇不定。

34361 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分（细研） 牛黄一分（细研） 干蝎一分（微炒） 腻粉一钱 蚕蛾一分（微炒） 铅霜一分（细研） 麝香半钱（细研） 龙脑半钱（细研） 天浆子二七枚（内有物者；微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。每服五丸，以薄荷汤化下。

【主治】小儿心肺积热，发惊痫，烦闷吐逆，心神昏迷，痰涎壅滞。

34362 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 川大黄半两（锉碎，微炒） 桂心一分 牛黄一分（细研） 云母粉一分 半夏一分（汤浸七遍，去滑） 黄连一两（去须） 雄黄一分（细研） 雷丸二分 代赭一分 真珠末一分 干姜一分（炮裂，锉） 矾石半两（细研） 巴豆一分（去皮心膜，炒黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。百日內小儿，以乳汁送下两丸；一岁至三岁，以粥饮送下五丸。

【主治】小儿食痢。

34363 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 铅霜一两 铁粉一两 马牙消一两

【用法】上为细末，以枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，食后以熟水送下。

【主治】小儿癫痫，发歇不定。

34364 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】朱砂（细研） 麝香（细研） 熊胆（细研） 芦荟（细研） 蜗牛（炒令微黄） 使君子 五灵脂 胡黄连各一分

【用法】上为末，以烧饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下。

【功用】益颜色，长肌肉，消积滞，杀疳虫。

【主治】小儿气疳。

34365 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】朱砂一分（细研） 雄黄一分（细研） 干蟾一枚（涂酥，炙令黄） 菖蒲一两 漏芦一两 麝香一两（细研）

【用法】上为末，用粟米饭为丸，如麻子大。每服二丸，以粥饮送下，空心、午后各一服。

【主治】小儿一切无辜疳，黄瘦，腹痛或痢，有虫，冷之与热悉主之。

34366 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】朱砂一分（细研） 雄黄一分（细研） 夜明砂半两（细研） 黄连半两（去须） 鳖甲半两（涂酥，炙焦黄，去裙襖） 干虾蟆半两（涂酥，炙令焦黄） 槟榔一分

【用法】上为末，以糯米饭为丸，如黍米大。每服七丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿奶疳，腹胀，四肢瘦弱，不欲乳食。

34367 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】朱砂半两（细研，水飞过） 龙脑一钱（细研） 雄黄一钱半（细研） 寒水石一钱（细研） 腻粉一钱 槟榔一钱

(末)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。二三岁儿每服三丸，以生姜汤送下，一日二次。

【主治】小儿乳癖，壮热体瘦。

34368 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】朱砂一分 硫黄一分 巴豆七枚(去皮心，研，纸裹，压去油) 蟾头灰三钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如黄米大。每服三丸，以甘豆汤送下。

【主治】小儿疳痢，四肢干瘦，腹肋胀满，食不能消。

34369 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】朱砂半两(细研，水飞过) 青黛半两 麝香一分 粉霜一分 芦荟一分 雄黄一分 田父灰半两 蛇蛻皮三尺(烧灰) 胡黄连三分(为末) 虎睛一对(酒浸一宿，炙微黄) 牛黄半两 蟾酥一钱

【用法】上为末，用软饭为丸，如麻子大。每服五丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿疳痢久不愈，体瘦羸弱，皮毛干燥，发无润泽。

34370 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】朱砂半两 巴豆七枚(去皮心，研，纸裹，压去油) 麝香一钱 雄黄一钱 硫黄一钱

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服二丸，以新汲水送下，一日三次。

【主治】小儿久赤白痢，肌体羸瘦，四肢烦热。

34371 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】朱砂丹(《鸡峰》卷二十八)。

【组成】辰锦砂十两

【用法】用白砂糖十斤，炼令去尽白沫，用长项瓷甕子一枚，贮上件蜜，其朱砂用夹生绢袋子盛，以线系悬于甕子内，去底二寸

以来，用三五重油单子封系甕子口，后于静室内，泥灶一所，灶上安一深大釜，又用新砖一口，安在釜内，以衬甕子底，更用新砖一口，压甕子口，须用东流河水，以文火昼夜不停煮七复时，旁边别泥一口小锅子，别煎水，亦不住火，常令水热，候药釜内水耗，则旋添此热水，长令甕子水及七分以来，前之煮七复时讫，候灶自冷，将此朱砂净洗令干，研三复时，用糯米饭为丸，如黄米大。每日空心以温酒送下五丸，或三丸，不论老小，并宜服之。

【功用】利五脏，安魂定魄，养心益气，悦泽颜色。久服轻身不老延年，长肌肉，补丹田，聪明耳目。

34372 朱砂丸

《袖珍方》卷二引《圣惠》。为原书同卷“保命丹”之异名。见该条。

34373 朱砂丹

【方源】《幼幼新书》卷十九引《万全方》。

【组成】通明朱砂 龙胆(去苗) 黄连各半两 铅霜(研入) 铁粉(细研)各一分 牛黄(细研)一钱

【用法】上为细末，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以薄荷蜜水送下。

【主治】小儿胎热，心脏气壅，烦热惊悸。

34374 朱砂丸

【方源】《局方》卷十。

【组成】硼砂(研)一分 朱砂(研，飞)五十两 麝香(研) 梅花脑(研)各半两 脑子(研) 牙消(枯)各一两 甘草(浸汁熬膏)五斤 寒水石(烧通红，研)四两

【用法】上为末，用甘草膏为丸，每两作一百丸。每服一丸，含化；小儿夜多惊啼，薄荷水化下。

【功用】镇心神，化痰涎，利咽膈，止烦渴。

34375 朱砂丸

《永乐大典》卷九七五。即《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》“朱砂膏”。见该条。

34376 朱砂丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《庄氏家传》。

【组成】朱砂 雄黄各二字 麝香一字 槟榔一分 大南星末 白附子各一字 蝎梢七个 巴豆霜五个(水浸,研出油、瓦上泣尽)

【用法】上为末,煮面糊为丸,如粟米大。一岁二丸,常服、荆芥汤送下;浑身热亦可服三五丸。

【主治】小儿五惊积。

34377 朱砂丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《张氏家传》。

【组成】朱砂(细研,急水飞过,熟灰池渗干尤佳) 白僵蚕(择去丝,取直者,洗过,焙干) 新罗白附子(以湿纸煨裹,候令纸干,取出油,切成片子,焙干) 天南星(炮裂,去皮脐,切成片子) 各半两 麝香半钱(研入,和匀) 干蝎一两(铤子内慢火炒,令极热,不可太过)

【用法】上药各为末,面糊为丸,如粟米大。每服十丸,用煎金银薄荷汤吞下,如遇惊取下后,且以此药服一二服,无不效;或有虚汗,用麻黄根煎汤下。

【功用】镇心,压惊,坠涎。

34378 朱砂丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引洪州张道人方。

【组成】天灵盖(炙)一个 柴胡(烧) 白术 麝香各一钱 槟榔一个

【用法】上为末,蒸枣肉为丸,如麻子大。每服三丸,米饮枣汤送服。

【主治】脊痞,十指甲痒痛,头发焦干,腹肚虚鸣,脊骨如锯,时时下利,状如青淀或脓或血。

【备考】本方名“朱砂丸”,但方中无朱砂,疑脱。

34379 朱砂丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】朱砂 硃砂 麝香各一分 雄黄 黄丹各半两 膩粉三筒子 巴豆三十个(去皮,出油后烂研,又用醋半盏熬成膏为度)

【用法】上为细末,入巴豆膏内,用面尘和,水为丸,如绿豆大。每服五七丸,用水半盏,煮一沸,取出,临卧温酒送下。至晚但微泻二三行是效。

【主治】厚食气,遍身黄肿,多年不愈;及一切积块。

34380 朱砂丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】砒霜一两六钱(研,入坩盒子,以赤石脂固缝,盐泥固济,烧令赤,候冷取出) 杏仁 巴豆各七十个 木鳖子(炒焦)十个 黄蜡一两三钱 黄丹二两半 朱砂半两 乳香六钱半

【用法】上为末,熔蜡为丸,如黄米大,作一百二十丸。每服一丸,小儿半丸,水泻新汲水,赤痢甘草汤,白痢干姜汤,赤白痢甘草、干姜汤,并放冷临卧服。

【主治】大人、小儿一切泻痢,无问冷热,赤白连绵不愈,愈而复发,腹中疼痛者。

【宜忌】忌热物一二时。

34381 朱砂丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】朱砂一分 粉霜 膩粉 硃砂 白丁香 巴豆霜各半分 干漆末二分 青橘皮末五分

【用法】上为细末,枣肉为丸,如梧桐子大;小儿麻子大,更用朱砂末滚过。每先服了金箔丸,更后用面汤送下一二丸投之,看虚实加减服。

【主治】疰。

34382 朱砂丸

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】半夏(制) 辰砂各五钱 杏仁三十粒(去皮)

【用法】上为末,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服十丸,或五七丸,食后薄荷汤送下。

【功用】消痰。

【主治】小儿隔热。

34383 朱砂丸

【方源】《宣明论》卷十四。

【异名】朱砂定惊丸（《摄生众妙方》卷十）。

【组成】朱砂 天南星 巴豆霜各一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如黍粒大。看病虚实大小，每服二丸；或天钩戴上眼，每服四五丸，薄荷水送下。

【功用】取惊积。

【主治】小儿急慢惊风，及风热生涎，咽喉不利。

34384 朱砂丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】杏仁二十粒（汤浸去皮尖） 巴豆二十粒（去心核，油令尽）

【用法】上为细末，蒸枣肉为丸，如芥子大，朱砂为衣。每服一丸，食前倒流水送下。

【主治】大人、小儿暴下水泻及积痢。

34385 朱砂丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】硫黄一两 白矾半两 雄黄半两
以上三味入瓷合子内，水调蚌粉固四缝，外用盐泥固济，候干，炭火烧通赤，取出放地上去火毒，后入下项药：

麝香一钱（别研） 穿山甲一两（新瓦上炙令黄赤色） 甘草半两（炙） 肥皂一枚（去子，焙） 蜗牛七枚（炙，去壳，焙干）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服一丸，食前酒送下。

【主治】久痔生疮，出血不止。

34386 朱砂丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】丁香 白术 天南星（生姜汁制一宿，炒焙） 白茯苓（去皮） 人参（去芦头）各一钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服二十丸，乳食前煎生姜汤送下。

【主治】小儿干啰，恶心，呕吐不定。

34387 朱砂丸

【方源】《普济方》卷一六三引《杨氏家藏方》。

【组成】轻粉 雄黄（另研）各二钱 桑白皮 半夏（姜制） 郁金 甜葶苈（隔纸炒）各三钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服六七丸，食后睡时生姜汤送下；病大者三十丸。

【主治】老人小儿、喘嗽咯痰等证，昼夜不得眠。

34388 朱砂丸

【方源】《普济方》卷三九六引《杨氏家藏方》。

【组成】朱砂半钱 人言半钱 黄丹三钱

【用法】上为细末，水为丸，如粟米大。每服五七丸，干姜、甘草汤送下。

【主治】一切小儿泄泻，痢疾。

34389 朱砂丸

【方源】《医方类聚》卷二五八引《保童秘要》。

【组成】朱砂一钱 麝香一钱 干蝎四个（全者） 豆豉四十九粒 巴豆七个

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服一丸，金银薄荷汤送下；伤冷、葱汤送下；吐逆，丁香汤送下。

【主治】惊。

34390 朱砂丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】朱砂 乳香各一钱 半夏二十一个（洗净七次，姜汁浸一宿，切，焙）

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如黄米大。每服五七丸，乳香汤送下，不拘时候。

【主治】惊吐不止。

34391 朱砂丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】黄牛胆一枚 天南星 朱砂三钱 麝香一钱

【用法】将天南星研末，入牛胆内，悬透风处四十九日，取合时再用朱砂、麝香同南星

末研细，以牛胆汁子煎汤为丸，如鸡头子大。每服五丸，用新汲水嚼下；薄荷汤亦得。

【功效】镇心压惊。

【主治】伤寒及小儿惊热。

34392 朱砂丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】朱砂一分（细研）巴豆十粒（去皮膜，出油尽）杏仁五个（于热汤内泡过，去皮尖）半夏二钱（汤泡七次）

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。荆芥、薄荷汤送下，二岁只一丸，三岁加一丸，五岁服三丸。

【功用】镇心脏，化痰涎。

【主治】小儿惊积，实热。

34393 朱砂丸

【方源】《妇人良方》卷十八。

【组成】黑附子 桂心 白姜各半两 巴豆一钱（醋浸，煮去皮，研）

【用法】上为末，入巴豆研停，醋煮，面糊为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，冷茶送下。取泻为度。

【主治】产后虚中有积，结成诸疾。

34394 朱砂丸

《普济方》卷八十八引《简易方》。为《本事》卷一“胜金丸”之异名。见该条。

34395 朱砂丸

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】朱砂（为细末）

【用法】以雄猪心生血为丸，如麻子大，晒干。每服七丸，菖蒲汤煎汤送下；枣汤亦可。

【主治】打扑惊忤，血入心窍，不能语言。

34396 朱砂丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】朱砂 马牙消各二钱 川灵脂 芦荟各一钱半 麝半钱 脑一字

【用法】上为细末，甘草膏为丸，如绿豆大，金薄为衣。每服一丸，薄荷汤调下。

【主治】惊风痰盛。

【备考】本方原名朱砂膏，与剂型不符，据《永乐大典》改。

34397 朱砂丸

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】朱砂半两（研）乳香一两（研）

【用法】上为末，须用端午日取猪心血为丸，如梧桐子大。每服一丸，乳香汤送下。

【功用】催生，救危急。

34398 朱砂丸

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】朱砂一钱匕（称重一钱）当门子一枚（如皂子大，重一分五厘）石燕子（烧，醋淬五遍）一钱 木香三字 使君子（末）一钱 诃子（炮，去核，末）一钱

【用法】上为细末，用米饮为丸，如黍米大。每服一丸至七丸，薄荷汤送下，一日二次，早晚乳食前各一服。

【主治】小儿疝气。

34399 朱砂丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《烟霞圣效方》。

【组成】好信不以多少

【用法】上为末，烧干饭为丸，如米大，朱砂为衣。每服大人二三丸。

【主治】一切痢。

34400 朱砂丸

【方源】《得效》卷八。

【组成】铁粉 天竺黄各一两 金银箔各二十片 人参二钱 脑子半钱 生麝香一钱 轻粉二钱 真犀角二钱 海金沙一两 朱砂五钱

【用法】上为末，水为丸，朱砂为衣，共丸作六百丸。每服一丸至五丸，痰盛潮热，薄荷、砂糖、生葛自然汁并水送下；狂言谵语，涎壅膈上，地龙三两 薄荷及砂糖水研下；心神不宁，金银箔薄荷汤化下。

【功用】镇心神，化痰涎，退潮热，利咽膈，止烦渴。

【主治】心恙热证。

34401 朱砂丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《准绳·幼科》卷二。

【组成】朱砂 归身 白芍 侧柏叶(炒) 各五钱 川芎 陈皮 甘草各二钱 黄连(炒)一钱半

【用法】上为末，猪心血为丸服。

【主治】劳役心跳，大虚证。

【备考】《准绳·幼科》本方用法：猪心血为丸，如粟米大。每服一百丸，龙眼汤送下。

34402 朱砂丸

【方源】《永乐大典》卷九七六引袁当时《大方》。

【组成】腊月牛胆南星末二两 朱砂二钱(水飞) 麝香一钱 甘草(炒)半两

【用法】上为细末，水为丸，如粟米大。一岁小兒一丸，热汤磨化下。

【主治】惊风搐搦，目睛上视，涎盛不省人事。

34403 朱砂丸

《普济方》卷十六。为《内外伤辨》卷中“朱砂安神丸”之异名。见该条。

34404 朱砂丸

【方源】《普济方》卷一七二。

【组成】黄丹一两 白面四两 巴豆五十粒(去壳，去油，研细)

【用法】上三味，合和一处，用砂锅炒黄色，倾出，煮数沸，去水，冷定入木香三钱，朱砂二钱，前后五味，共捣为丸，如黍米大。每服大人三十丸，小儿十五丸，二岁三丸，生姜汤送下。

【主治】大人小儿，百物所伤。

34405 朱砂丸

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】朱砂半两(颗块者为上，乳钵内研，飞过) 人参 茯苓各一两 阿魏一分(米醋浸令半日，以软为度) 吴白术(米泔浸一宿，以竹刀切，焙干，捣罗为末) 蜀当归各半两(切，焙干，杵末，以阿魏并醋同研入。上并须好者)

【用法】同阿魏及蒸饼和研得所，为丸如梧桐子大。每服七丸，空心温酒送下，先嚼碎；

如有患者，令早晨空心桃仁汤送下五丸，嚼下，不过三度效。

【功用】辟山岚气，安心脏。

34406 朱砂丸

【方源】《普济方》卷二〇六。

【组成】朱砂 巴豆霜各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每粒以针刺一窍子，以针穿定，灯上度过，卧以热熟水吞之。

【主治】食积吐逆。

34407 朱砂丸

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】枯白矾 黄丹各等分

【用法】上为细末，枣肉为丸，如大豆大，朱砂为衣。每服三四丸，以针扎药丸，灯上烧熟，研烂，凉米泔水调下；泻者食前，吐者不拘时候。

【主治】大人、小儿或上格吐逆，下注泄泻。

34408 朱砂丸

《普济方》卷二三七。为方出《肘后》卷一，名见《圣济总录》卷一〇〇“丹砂丸”之异名。见该条。

34409 朱砂丸

【方源】《普济方》卷三六七。

【组成】南星 白矾(生用) 巴豆(去油) 杏仁(炒，别研) 赭石 朱砂 半夏各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如栗壳大，朱砂为衣。每服二十丸，葱白薄荷汤送下。

【主治】中风痰涎壅盛。

34410 朱砂丸

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】寒水石二两 甘草一两 马牙消四两 朱砂一分

【用法】上为极细末，次人脑、麝香各三分，炼蜜为丸，如龙眼大，用瓷罐盛之。每服一丸或半丸，薄荷汤候冷调下。

【主治】小儿惊热。

34411 朱砂丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】朱砂一钱（好者，水飞过）

【用法】枣肉为丸，如龙眼核大。临发之日五更酒送下。有痰吐痰，有积祛积。

【主治】疟疾。

34412 朱砂丸

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】朱砂二钱 雄黄一钱五分 苦参 荆芥穗 天麻 麻黄 牛蒡子 面粉 槐角子各三钱

【用法】上为细末，用糖心鸡蛋为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用鸡汤或牛肉汤送下，一日一服。表出毒气，再不服。

【主治】杨梅疮肿发甚不可言者。

【宜忌】忌房事劳碌。

34413 朱砂丸

【方源】方出《寿世保元》卷五，名见《一盘珠》卷三。

【组成】朱砂五钱（水飞，用猪心一个割开，入砂末，湿纸包，慢火炙熟，取朱净，入后药；猪心病人空心食）南星二两（沸汤浸三次，锉，姜制）巴豆仁五钱（石灰一碗，炒红入仁在内，灰冷取仁，将灰又炒，又以仁在内再炒，揀出用草纸捶去油，灰不用）全蝎二钱（去头足尾，炙）龙胆草二两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜汤送下。

【主治】五癩。

34414 朱砂丸

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】朱砂一钱 白茯苓一两

【用法】水为丸。生姜汤送下。

【主治】经来未止，兼牛膜色一般，昏迷倒地。

34415 朱砂丸

【方源】《胎产新书》卷四。

【组成】益母草 沉香 小茴 白芍 香附 防风 五味子各等分 白术倍用

【用法】枣肉为丸，朱砂为衣服。

【主治】产后虚弱，败血走五脏，转注四肢，

停留不行，以致四肢浮肿而冷。

34416 朱砂丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】朱砂三两 马牙消三两 消石二两

【用法】上为末，入瓷瓶中，以重抄细纸三重，密固瓶口，重汤煮之，常如鱼眼沸，水耗，即以热水添之，不歇火，三七日夜满，开瓶子，其消并在瓶四面，收之细研，任服；其朱砂即在中心，取出细研，以小瓷盒子中盛，固济，微火养一日，加火一斤，煨令通赤，放冷，开取细研，以枣肉和，每一两砂，可丸得三百六十丸。每日早晨，含化一丸。如要多合，但依分两，酌度修炼为丸。妇人服之亦佳。

【功用】祛热毒风，镇心神，返老驻颜。

【宜忌】忌羊血。

34417 朱砂丹

【方源】《幼幼新书》卷八引《灵苑方》。

【组成】巴豆霜 干蝎 天南星 朱砂（别研）各一钱 木鳖子一个（炮，去壳，研为末）

【用法】上为末，用蒸饼心研合为丸，如绿豆大。每一岁二丸，用桃白皮煎汤令温吞下。

【主治】小儿急慢惊风，夜啼，虚积痰毒。

34418 朱砂丹

《永乐大典》卷一〇三三引《医方妙选》。为《圣惠》卷九十二“丹砂丸”之异名。见该条。

34419 朱砂丹

【方源】《幼幼新书》卷八引丁时发方。

【组成】朱砂 铁粉 干蝎 天麻（酒浸）半夏（汤浸十遍，炮，焙干） 白姜 白附子各一分 金箔十四片

【用法】上为细末，蒸枣肉为丹。每服一饼或半饼，荆芥、薄荷汤送下。

【功用】定抽搐。

【主治】小儿惊风；上喘咳嗽。

34420 朱砂丹

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】辰砂（水飞极细） 石膏（烧赤，

地内出火毒，取末）白附子各一两 生脑子半钱（一方无石膏）

【用法】上为细末，粟米饭为丸，如梧桐子大，日中晒，朱砂内养。每服五丸，薄荷汤送下。

【主治】一切头痛。

34421 朱砂丹

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】朱砂一两 麝香二两 山豆根一钱（生，杵） 巴豆三分 雄黄 黄丹 斑蝥（一半生，一半熟，以糯米炒） 苦药子（炒一半） 续随子 没药各一分 蜈蚣二个（炒一个）

【用法】上以糯米糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，用无粉茶送下。凡中毒者，便下药，少时觉心头拽断皮条声，即是毒下，或从口中出，或从下部出，嫩即成血，老即成蛸螂、鳖子带命之物，因凝血裹出，即知当初下者毒物；其药泻出，便以洗过香汤再度仍以朱砂收之。每一丸可治男子五入，妇女三入，服药后转泻不止，白粥止之。

【功用】解蛊毒。

【宜忌】忌一切秽恶。

【备考】内中毒即服之，外中毒则醋磨涂之。如才觉中毒，先吃黑豆，觉其味香甜者，是中毒也。

34422 朱砂丹

《鸡峰》卷二十八。为《圣惠》卷九十八“朱砂丸”之异名。见该条。

34423 朱砂丹

【方源】《证治要诀类方》卷四引《本事》。

【组成】消石（研） 砒（同消石入罐内煨，出火毒） 膩粉（研） 粉霜（研）各五钱 矾（枯） 黄丹 朱砂各一两 乳香 桂府滑石各三钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，粟米饮送下。未愈加丸数。

【主治】寒泻，手足厥逆者。

34424 朱砂丹

【方源】《普济方》卷二三一引《十便良方》。

【组成】天门冬四两

【用法】上药碎锉，取一白垆小盒子，将天门冬入在一香炉内，三块两块烧之，上以物阁住盒子，令烟熏盒子内，十分光黑，仍以物遮烟，只就一处令出，令烟厚了，取砂二两，入在盒子内，上以川椒盖头令满，以盖子合定，蜜调茶土固封，土内仍着少盐，外以铁线系缠定，放地上，仍以一瓦子衬底上，以醋为灰冢，下三斤火，候消得一半来，更下二斤，火冷取出，埋在湿地一宿，出火毒了，拣砂令净，研细，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三五粒，以人参汤送下，不拘时候。

【主治】劳嗽。

34425 朱砂丹

《此事难知》。为原书“姜附赤石脂朱砂丹”之异名。见该条。

34426 朱砂丹

【方源】《简明医彙》卷六。

【组成】朱砂（大块如墙壁，鲜红光明似云母色者，细研，水飞，澄去水，晒，研万下）五钱 牛黄（陕西、千层者）二分（匀）

【用法】每服五分，蜜调服。痘将发时，用猪粪调水，滤清汁调朱砂服。

【功效】大解痘毒。

34427 朱砂丹

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】朱砂 磁石

【用法】朱砂为末，用磁石同炒三次，炒至朱砂黑色，去磁石。用朱砂末些少，蜜水调服。

【功用】稀痘

34428 朱砂汤

【方源】《胎产新书》。

【组成】猪心一个

【用法】水一碗，煎半碗，调朱砂一钱服。

【主治】胎前怔忡。有孕常心中恍惚，偏身烦热，此血衰受孕不适而致。

34429 朱砂顶

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】白信三钱（用豆腐一大方块，中挖一池，放信于池内，以原豆腐盖好，煮一柱香，去腐用信）朱砂五钱 绿豆粉三钱

【用法】上为末。每服二分，冷茶汤送下。口吐黄水立愈。

【主治】四日两头发疮。

34430 朱砂顶

【方源】《串雅补》卷一。

【异名】白玉顶。

【组成】南星 半夏 滑石各等分 巴霜三厘一服

【用法】上为细末。每服三分，白汤下。

【主治】一切痰症。

34431 朱砂散

【方源】《外台》卷二十一引《必效方》。

【组成】光明砂六分（研）地骨白皮五分 车前子三分 龙脑香六分 决明子五分

【用法】上药治下疳，细研如粉。少少敷之。

【主治】人眼中有黑白花逐眼上下。

34432 朱砂散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】朱砂一两（细研如粉）牛黄一分（细研）龙脑一分（细研）麝香一分（细研）茯神一两 人参一两（去芦头）犀角屑一两 防风一两（去芦头）铅霜一分（细研）麦门冬一两（去心，焙）真珠末一两 羚羊角屑一两 子芩一两 玄参一两 天竺黄一两（细研）甘菊花一两 川升麻一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散，入研了药，都研令匀。每服一钱，煎金银汤调下，不拘时候。

【主治】心风。烦躁狂言，胸膈壅滞，神思不安。

34433 朱砂散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】朱砂半两（细研）太阴玄精半两

（细锉）犀角屑一两 铅霜半两（细研）紫石英三分（细研，水飞过）人参一两（去芦头）赤茯苓一两 防风一两（去芦头）诃黎勒皮三分

【用法】上为细散，入上件四味，同研令匀。每服二钱，以葱白汤调下，不拘时候。

【主治】伤寒伏热在心脾，谵语，其状如痴人。

34434 朱砂散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】朱砂二两（细研）川乌头二两（炮裂，去皮脐）细辛一两 踯躅花半两（酒拌炒令干）干姜半两（炮裂，锉）白术半两 瓜蒌根半两

【用法】上为细散。每服二钱，不拘时候，以温酒调下。厚覆，汗出愈。

【功用】辟毒。

【主治】时气瘴疫。

34435 朱砂散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】朱砂一两（细研）麝香半两（细研）雄黄一两（细研）天南星一两（炮裂）白附子一两（炮裂）母丁香一两 藿香一两 白花蛇二两（酒浸，去皮骨，炙令微黄）桂心一两 防风一两（去芦头）蝉壳一两 芎藭一两 蔓荆子一两 天麻一两 白僵蚕一两（微炒）麻黄一两（去根节）川乌头一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】一切破伤风急，口噤，四肢抽掣。

34436 朱砂散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】朱砂二两（光明者，逐块以金箔裹）磁石三两（捣为末）黑铅二两（以水银一两炒作沙子，细研）

【用法】先固济一瓷瓶子，候干，先入磁石末，次安朱砂，后以黑铅末覆之，以文火养七日，后以火五斤，煅令通赤，便住，候冷

取出，都细研为散。每服半钱，以马牙消半分煎汤调下，不拘时候。

【主治】风痫。心神狂乱，时吐涎沫，叫呼不识人。

34437 朱砂散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 紫檀一两（锉） 漏芦一两 雄黄一两（细研） 雌黄半两（细研） 白藜一两 石胆半两（细研） 紫石英一两（细研，水飞过） 牛黄三分（细研） 阿魏半两（面裹煨，令面熟为度） 犀角屑一两 龙骨一两 石膏一两（细研，水飞过） 消石一两半

【用法】上为细散，入石药末，更同研令匀。每服一钱，食前以温酒调下。如饥，即宜吃小豆饭及枣汤，食勿令过饱，饱即其虫难出。服药后似淋，即以盆子盛著，当有虫出，或当日出，或三两日出者，或至七日虫出，见虫即且服药，候虫尽便愈。

【主治】大风。肌肤不仁，头面身体生疮，颜色肿黑，腹内生虫，鼻柱崩倒。

34438 朱砂散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】朱砂半两 贝齿五枚（烧灰） 衣中白鱼二七枚 干姜半分 膩粉半分

【用法】上为末。每以铜箸头取如小豆许，点目中。

【主治】眼生肤翳，目赤时痛，风泪。

34439 朱砂散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】朱砂半两（细研） 雄黄半两（细研） 干姜一分（炮裂，锉） 晚蚕子纸一张 苣荬子一两（炮令黑黄色） 甘草半两 蜘蛛七枚（干者） 麝香半两 猪脂如鸡子大（炼了者） 麻仁脂七分 犁铧上铁皮（为末）半两

【用法】上药除脂油外，捣罗为末。后用猪脂油等和匀，旋取涂于疮上。一宿即愈。又有内疳者，夜含半枣大，细咽之。

【主治】牙齿风疳，及一切疳虫。

【宜忌】一月不得食醋。

34440 朱砂散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】朱砂（细研） 丁香皮 藿香（锉） 茴香（锉） 香附子 甘松 白芷 川升麻 黄丹各一两 白檀香半两（锉） 猪牙皂荚二两 石膏四两 寒水石半两 零陵香半两

【用法】上为散，都研令匀。每日常用揩齿。甚佳。

【功用】令齿白净。

34441 朱砂散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【异名】三黄散（《圣济总录》卷一〇〇）。

【组成】朱砂一两（细研，水飞过） 黄连一两（去须） 黄柏一两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为细散，入朱砂，更研令匀。每服二钱，以热酒调下。不拘时候。

【主治】飞尸。疾肿光如油色，走无定处。

34442 朱砂散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】朱砂一两（细研水飞过） 铁粉一两 牛黄一分 虎睛一对（炙微黄） 雄黄半两 龙骨半两（为末） 蛇蛻皮一尺（烧灰） 麝香一分

【用法】上为极细末。每服一钱，以桃符煎汤调下，不拘时候。

【主治】妇人风虚，与鬼交通，悲笑无恒，言语错乱，心神恍惚，睡卧不安。

34443 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】朱砂一分 龙齿一分 消石一分

【用法】上为细散。每服一字，煎竹叶汤放温调下；如二岁以上儿，每服半钱。

【主治】小儿不吃乳，眼目不开，手足牵挽，此是惊风。

34444 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】朱砂三分 雀儿饭瓮五枚 蝎尾二七枚 白附子三枚(炮裂,为末) 晚蚕蛾十枚

【用法】上为细末。每服一字,以薄荷酒调下,不拘时候。

【主治】小儿中风痉,项强,腰背硬,四肢拘急,牙关紧,神思昏闷。

34445 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂半两(细研,水飞过) 远志一分(去心,为末) 马牙消一分 膩粉一分 牛黄一分 龙脑半分 麝香半分 铁粉半两

【用法】上为细末。每服半钱,以冷水调下,不拘时候。

【主治】小儿惊热,心神烦闷。

34446 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分(细研) 牛黄一分(细研) 麝香一分(细研) 干蝎十四枚(微炒) 雀儿饭瓮二七枚(麸炒令黄,去壳)

【用法】上为细散。每服半钱,以乳汁调下,薄荷汤调下亦得,不拘时候。

【主治】小儿一腊后月内,忽中慢惊风,及无辜之候。

34447 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分 牛黄一分 天竺黄一分 膩粉一分 麝香半分

【主治】上为细末。每服半钱,竹沥调下,不拘时候。

【主治】小儿胎风,心热惊痫。

34448 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂一分(细研) 白薇一分 杏仁一分(汤浸,去皮心双仁,麸炒微黄) 露蜂房一分 桂心半两 牛黄一分(细研)

【用法】上为细散,入研了药令匀。每服一字,以乳汁调下,一日五次。

【主治】小儿五种痫,手足动摇,眼目反视,口吐涎沫,心神喜惊,身体壮热。

34449 朱砂散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】朱砂半两(细研,水飞过) 雄黄半两(细研) 川大黄一两(锉碎,微炒) 石决明二两 胡黄连一分 神曲一两(微炒)

【用法】上为细散。每服半钱,以蜜水调下,一日二次。

【主治】小儿眼疳,夹风生障翳,不开。

34450 朱砂散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】朱砂(细研) 铅霜(细研) 犀角屑 黄芩 车前子 甘草(炙微赤,锉)各一分 滑石半两 川朴消半两

【用法】上为细散,入研了药令匀。每服半钱,煎苦竹叶汤调下,不拘时候。

【主治】小儿心脏热,或烦躁不安,小便赤涩不通。

34451 朱砂散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】朱砂一分(细研) 白马夜眼一分(微炙) 丁香一分 地榆一分(微炙,锉)

【用法】上为细散。每服半钱,以粥饮调下,一日三次。服讫,即吃雄肝粟米粥饮。

【主治】小儿无辜疳痢,久不愈,渐至羸弱。

34452 朱砂散

【方源】方出《证类本草》卷三引《简要济众方》,名见《医方类聚》卷十。

【组成】白石英一两 朱砂一两

【用法】上为散。每服半钱,食后、夜卧金银汤调下。

【功用】《医方类聚》:化痰安神。

【主治】心脏不安,惊悸善忘,上膈风热。

【备考】《医方类聚》引《神巧万全方》有马牙消三分。

34453 朱砂散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】朱砂一两(研) 乌贼鱼骨二两

(研) 白膩滑石一两半(研)

【用法】上为散。每服一钱，温酒调下，不拘时候，煎人参汤下亦得。

【主治】心气不足，惊气人腹，狂言恍惚，神志不定。

34454 朱砂散

【方源】《永乐大典》卷九七五引《灵苑方》。

【异名】丹砂散(《圣济总录》卷一七一)。

【组成】朱砂(拣去石，研) 白附子各二钱 附子一个(去皮脐) 天南星(去脐) 天麻 干蝎(全者) 半夏(汤洗七遍，去滑为度) 各一钱

【用法】上各细锉，晒干，为极细散；次入朱砂末，再研合令匀，以瓷罐收之。二岁以下每服半字，四五岁以下每服一字强，六七岁半钱，十三五岁加至一钱。如是退一切惊热、风热、咳嗽，喉中壅隘，并宜食后用蜜和熟水调下；一切风不问急慢，咬齿拗项，翻眼气粗，手足搐搦，并用冷茶清调下。服良久，膈上有风涎则吐之，不尔汗出立愈；亦有寻时并定也。有猛发一上者，良久再进一服。疾定后更加牛黄少许，和前药用薄荷蜜水调下，一日三次。若要为丸子，用薄荷、生姜汁、蜜、酒煮面糊为丸，如绿豆大，每服五丸，用薄荷汤送下。

【功用】压惊，安魂定魄，镇心脏，退风热。

【主治】一切惊风，不问急慢，咬齿拗项，翻眼气粗，手足搐搦。

【宜忌】忌动风毒物。

34455 朱砂散

【方源】《普济方》卷三八八引《医方妙选》。

【组成】朱砂一两 滑石 犀角各半两 黄芩 车前子各一分 甘草一分

【用法】上为散，入朱砂同拌。每服半钱，煎竹叶汤调下。

【主治】心神烦躁，小便赤涩不通。

34456 朱砂散

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】朱砂 天麻各一钱 僵蚕七个 天南星一个 白花蛇(项下肉皂子大一块) 麝少许 蜈蚣一条

【用法】上为细末。每服一字，薄荷汤送下。

【主治】慢脾风。

34457 朱砂散

【方源】《幼幼新书》卷八引郑愈方。

【组成】白僵蚕七个 脑 麝各一字 天南星一个 朱砂二钱 轻粉一钱匕。

【用法】上为末。每服半钱或一字，以金银薄荷汤调下。

【功用】小儿常服理惊毒。

【主治】小儿惊搐。

34458 朱砂散

【方源】《幼幼新书》卷十引《刘氏家传》。

【组成】朱砂 白茯苓 人参 山药各等分 甘草减半(半生半熟)

【用法】上为末。每服量大小下一字，或半钱或三字，惊，金银薄荷汤调下；和气，米饮调下；热，竹茹煎汤调下。

【功用】和气。

【主治】小儿惊热。

34459 朱砂散

【方源】《卫生总微》卷五。

【异名】阳痫散(《直指小儿》卷二)、阳痫防风散(《普济方》卷三七六)。

【组成】朱砂一分(研，水飞) 膩粉半钱 麝香半钱(研) 芦荟二钱(别研) 胡黄连一钱 蝎梢七个 白附子二钱 金箔七片 僵蚕十个(去丝嘴，炒) 赤足蜈蚣一条(炙) 甘草二钱(炙)

【用法】上为细末。二岁以上儿半钱，以下者一字，三岁以上者一钱，金银薄荷汤调下，不拘时候。如口噤不开，灌入鼻中。

【主治】①《卫生总微》：急惊、发搐。②《三因》：小儿发痫阳证，身热面赤，而发搐搦，上视，牙关紧硬。

34460 朱砂散

【方源】《普济方》卷三六一引《傅氏活婴方》。

【组成】朱砂 天竺黄 牛黄 铅霜 麝香 甘草铁 孕粉各等分

【用法】上为末。薄荷汤调下。

【主治】胎风惊搐，心神惊悸，眼目直视。

34461 朱砂散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】朱砂 海蛤 石膏 细辛 川升麻 防风各二两 寒水石 芎藭 槟榔 生地黄各三两

【用法】上为散，都令匀。每日早晨、夜临卧时先以暖水漱口三五度，用药揩牙齿，以白纸贴药于龈上便睡，不用漱口，甚效。

【功用】揩齿令白净。

【主治】齿黄黑。

34462 朱砂散

《普济方》卷一七六。为《普济方》卷一七六引《卫生家宝》“殊胜散”之异名。见该条。

34463 朱砂散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】朴消 寒水石 朱砂 甘草各等分

【用法】上为细末。贴少许。

【主治】口疮。

34464 朱砂散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】朱砂一钱 石膏一钱 寒水石一钱 滑石一钱 甘草一钱 代赭石一分

【用法】上为末。每服一字，灯心、薄荷汤调下。

【主治】小儿夜啼。

34465 朱砂散

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】朱砂半两 牛黄一分

【用法】上为细末。每服一字，以水研犀角调下。

【主治】心肺积热。

34466 朱砂散

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】朱砂（大颗者佳，磨五七千下）

【用法】用蜜汤调服三五十次。乡邻若有痘疹流行，预与儿食，可免不出，如出亦轻。

【功用】预防痘疹。

34467 朱砂散

《疮疡经验全书》卷六。为《得效》卷十“朱犀散”之异名。见该条。

34468 朱砂散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】辰砂一钱 丝瓜近蒂三寸（连子烧灰存性）

【用法】上为末。蜜水调服；或以紫草、甘草汤调服尤佳。

【功用】发痘疮，多者可少，少者可无。

【主治】痘疮。

34469 朱砂散

《诚书》卷六。为《圣济总录》卷一七二“丹砂散”之异名。见该条。

34470 朱砂散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】朱砂 硼砂各一钱 玄明粉五分 冰片少许

【用法】上为末。吹之。

【主治】小儿初生，忽不吮乳，口中上腭形如粟米，或珠子黄色，或生牙龈上，或遍口相连，如悬珠之形，名曰思惊。

34471 朱砂散

《中医皮肤病学简编》。为《圣惠》卷八十二“白矾散”之异名。见该条。

34472 朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】朱砂一两（细研） 白蜜半斤 黄丹一两

【用法】上药相和令匀，入有油瓷瓶内，用柳木楔子紧塞瓶口，又以生布一片，油单两重，密裹瓶口，勿令透气，便安瓶于大鼎内，座用一杖子横着鼎口，以绳子系瓶口悬之，用水常令至瓶项，以文火煮，如鼎内水耗，旋旋添汤，勿入冷水，从寅时煮至酉时，住火

候冷，取出，以新绵滤过，用白龙脑一钱研入，以一新瓷瓶盛之，常令封闭，候三日外用之。以铜箸头粘药如绿豆大点之，每一复时只得一度。

【主治】胎赤，兼生翳膜疼痛等。

34473 朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】丹砂膏（《普济方》卷七十五）。

【组成】朱砂半两 蕤仁三分（去皮，细研） 胡粉如棋子大二枚 龙脑半钱（细研）

【用法】上为末，取真酥，调如膏令匀，用油帛裹，以铜盒子盛之，勿令泄气。每用如黍米大点服，一日二三次。

【主治】风毒攻冲，两眼赤痛。

34474 朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】朱砂一分（细研） 琥珀一分（细研） 黄丹一钱 黄柏（生）一分 黄连末一分 蕤仁一分（汤浸，去赤皮，细研） 马牙消半两（细研）

【用法】上为末，用白蜜三两，并滤去滓，入诸药更研令匀，入一竹筒盛内，重汤煮之半日，箸柳枝子，时时搅之，候色如紫，以绵再滤过。以铜箸取少许点之，每日三四次。

【主治】内障。针开后，眼经年热涩痛，及一切眼障晕。

34475 朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】朱砂一分（细研） 马牙消半两（细研） 黄连末半两 杏仁一两（汤浸去皮） 青盐一分

【用法】上为末，以绵裹，用雪水三合，浸之一宿，更以绵滤过，于瓷盒中。每以铜箸取少许点之。

【主治】眼白睛肿起，赤涩疼痛。

34476 朱砂煎

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】明朱砂（研细，水飞） 硼砂 蕤

仁（去内外心壳膜油） 海螵蛸（去壳） 脑子

【用法】上为极细末，入少麝香同研。干点。

【主治】外障，顽翳，赤脉。

【加减】障白厚重，加马牙消少许同研。

34477 朱砂煎

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】龙脑一分 乳香二分 朱砂半两 细辛 白芷 黄连 秦皮各一两

【用法】上为末，以水浸一复时，去滓用汁，以蜜五两煎之。点眼。

【主治】肝虚积热外障。

34478 朱砂煎

【方源】《中医眼科学讲义》。

【组成】黄连 黄柏 秦皮 细辛 白芷各五钱 乳香一钱 朱砂（飞过）一分 冰片一分 蜂蜜二两

【用法】先将前五味加水 500 毫升煎，煎至 250 毫升，过滤，然后加乳香、蜂蜜、朱砂，再加热微煎，最后入冰片，略煎后过滤，净得药水 250 毫升。每隔 2 小时，滴眼一次。

【功用】清热退翳。

【主治】白膜侵睛。

34479 朱砂膏

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】朱砂一两 乳香半两

【用法】上为末，以葱白四两细切，合研成膏。每用生绢上涂贴。候干再上，以愈为度。

【主治】发脑及乳瘤初结疼痛。

34480 朱砂膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】朱砂半两 胡粉二两 水银半两

【用法】上件药，点少水，都研令水银星尽，以腊月猪脂三两，入桃子内，慢火上熔化，去滓，入朱砂等搅成膏，以瓷盒盛，候冷。涂之愈。

【主治】小儿头上爆浆起，如针盖，一二日后，面上及胸背生疮。

34481 朱砂膏

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】朱砂一两（别研细） 金末一分（用箔子研） 牛黄 麝香 生脑子 硼砂各半两 生犀 玳瑁 真珠末各一两（蚌末不可用） 琥珀（别研） 羚羊角各半两 苏合香（用油和药亦可） 铁液粉各一分 安息香半两（酒蒸，去砂石，别研入药） 人参一两 远志（去心） 茯苓各半两 甘草一两（微炙）

【用法】上为细末，拌和炼蜜，破苏合油，剂诸药为小锭子，更以金箔裹，瓷器内密封。每用一皂子大，食后含化。

【功用】镇心安神，解热。

【主治】虚损嗽血等疾。

34482 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷八引张涣方。

【组成】朱砂 粉霜 轻粉 水银砂子各一钱 乳香 牙消各半钱

【用法】上为末，入麝香少许，枣内为膏。每服如皂角子大，前胡汤送下。

【主治】胎惊。

34483 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷八引《惠眼观证》。

【组成】朱砂（好者，别研） 硼砂（通飞者，研）各半两 甘草（炙）一分 牙消一两半（煨过，少分生，别研） 麝香（研） 龙脑（研）各一字

【用法】上先研朱砂四五百转，又别研硼砂同前数，入诸药再研，出，方研脑子，再入诸药末，滚合滴水，研成膏，摊一宿以油纸单内。每服皂子大，更加减吃。若更滚涎，用鸡子清化下；常服甘草汤。

【主治】襁褓内牙儿等，因惊风后，余涎响。及初生下，患鹅口重舌腭，心热夜啼，发病搐搦，项背强直，痰涎壅并目带上翻，进退无时。

34484 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷八引茅先生方。

【组成】朱砂半两 硼砂 马牙消各三钱 真珠末一钱 玄明粉二钱（以上并别研） 脑

麝各一字

【用法】上药各为末，于一处拌和合，用好单角起，不久其药自成膏。如小儿诸般惊，用药一黄豆大，常用金银薄荷汤少许化开下；如遍身潮热，用甘草煎汤下；狂躁恶叫，用生地龙汁化下；一腊及一月日内小儿不通下药，可用药使乳调涂在奶上，令牙儿吮乳吮下。

【主治】小儿惊积，惊热。

34485 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷七引《吉氏家传》。

【组成】朱砂 人参 白茯苓 甘草各一钱 脑 麝各少许

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服一块如皂子大，金银薄荷汤下。

【主治】诸惊啼，夜啼。

34486 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】朱砂 马牙消 甜消 甘草（炙）各一钱 硼砂半钱 脑 麝各少许

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。看大小，薄荷汤送下一丸或半丸。

【主治】惊。

【备考】本方方名，《永乐大典》引作“朱砂丸”。

34487 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】附子一个（重五钱半，平正紧实者，生，去皮脐，取半两，不须用太大者） 天南星一个（去皮脐，不得用小者） 半夏（取中形圆正好者，汤洗七次，去滑，焙干，生用） 天麻（明净好者，去两头，取中心，切） 琥珀（研）各二钱半 全蝎一分（生） 赤足蜈蚣（去头尾足，炙，取二寸） 白僵蚕 朱砂（光明者，研如粉）各半两 麝香一分（净，研）

【用法】上为细末，入研者朱砂、琥珀、麝香同研匀，炼蜜放冷为膏，密器收。每患用少许生姜自然汁化药一皂大，次用温酒调下；小儿生姜、薄荷汤化下豆大。

【主治】一切惊风，诸痫，暗风，破伤，惊涎，心气不足，或久伏惊气，尸厥发即昏昧，涎壅；及因惊亡魂失魄，举动惊怕，梦魇，或歌哭不避亲疏，狂走不宁，中风缓弱顽痹，小儿慢惊风。

34488 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷十九引《庄氏家传》。

【组成】朱砂 甘草各半钱 龙脑半分 人参一分

【用法】上为末，水为丸，如此绿豆大。每服一丸，用薄荷汤或竹叶汤送下。

【功用】镇心凉膈。

【主治】膈热。

34489 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷八引郑愈方。

【组成】朱砂 人参 茯苓各二钱 蝎梢七个 硼砂一钱 牛黄 脑 麝各少许 金箔各七片

【用法】上为末，人乳钵研，炼蜜为膏，如梧桐子大。每服一饼，食后温薄荷汤送下。

【功用】压惊镇心，化风涎，除温壮，益小儿，利荣卫，散膈热。

34490 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷九引《刘氏家传》。

【组成】桃仁（汤浸二遍，去皮尖，麸炒干）一两（研烂） 真红花头半两（焙，末之） 朱砂（研） 滴乳（研）各三钱

【用法】上为细末，人麝香一钱，又研，炼蜜为丸。每服一丸，如鸡头子大，煎薄荷汤半盏，化破和滓服；人参汤或茶调，或含化。

【主治】小儿急慢惊风，大人风狂，躁热风痫，伤寒中风，舌强风涎。

34491 朱砂膏

【方源】《幼幼新书》卷十九引《赵氏家传》。

【组成】朱砂 人参各二钱 蝎梢二十一个 白僵蚕（酒浸，焙干） 天仙子（好酒少许炒熟）各一分 大天南星一个（先用酸

醋汁洗去滑，火炮裂，先为细末，生姜汁和作饼子，火炙令黄色，凡如此三次）

【用法】上为末，炼蜜为膏。每服皂儿大，薄荷汤送下。

【主治】小儿惊风潮热，神志不宁，惊惕忪悸，夜卧不安，狂语惊啼；久服凉药过多，脾胃虚寒，阴极似阳，颊赤神昏，引饮烦躁，不进乳食。

34492 朱砂膏

【方源】《永乐大典》卷九八一引《小儿保生要方》。

【组成】人参 茯神 防风 山药 甘草（炙） 黄耆（蜜炙） 麦门冬（去心）各半两 朱砂六钱（研） 麝香半字

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如櫻珠大。金箔为衣，每服半粒或一粒，薄荷汤送下，不拘时候。

【功用】安神镇心，去痰热。

34493 朱砂膏

【方源】《普济方》卷三七五引《卫生家宝》。

【组成】朱砂一钱 蜗牛五个 轻粉一钱

【用法】上为末，炼蜜为膏。每服，周岁一黑豆大，薄荷汁调下，一日三次，与鼈半散相间，或间惺惺散亦得，不退，服羌活膏与鼈半散，蜗牛连壳用，先用瓦掺黄丹，将蜗牛在上，连瓦将在火上焙干。

【主治】急慢惊风形候，一般皆治。

34494 朱砂膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】朱砂（水飞）五钱 牙消 硼砂 玄明粉各二钱半 麝香一字 金箔 银箔各十五贴 白附子 枳壳各三钱 川芎 粉草各四钱 人参（去芦） 黄芩 薄荷叶各二钱

【用法】上前七味入乳钵杵匀，后七味锉焙为末，仍入钵中同前药和，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸至二丸，用麦门冬熟水化服，不拘时候。

【主治】小儿五心烦热，喉痰壅盛，惊风搐搦，渴饮无时，睡中不宁，见人烦躁，口疮糜烂。

34495 朱砂膏

【方源】《得效》卷十五。

【组成】朱砂 硼砂 焰消各一钱半 金、银箔各五片 寒水石五钱 脑子一字 石膏五钱 粉草三钱

【用法】上为末。每服二钱，麦门冬二十粒去心煎汤送下。

【主治】心脏惊热至甚，不省人事。

34496 朱砂膏

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】腊月猪脂五两 黄蜡半斤（以上洗，煎） 铅丹四两 自然铜四两（研） 密陀僧四两（研） 朱砂（研）

【用法】上用新铛鼎先溶脂，次下蜡停冷，再下密陀僧、铅丹、朱砂、自然铜，缓火仍煎，入水中不散，取出鼎于冷处，用柳篦搅匀，泻入瓷器内，不住手搅至凝，为丸如弹子大，且用笋皮之类衬之，极冷方收。凡伤碎骨者，大石压碎骨者，先用此药化开，然后夹定，用此药服之；须作小丸，如梧桐子大，每服十丸，葱酒送下；或伤损深者，捻成条子入孔中，浅者用油单纸贴之，甚者灯心草夹之；如药力散，再觉病痛，更一服痛即止；又痛甚者，贴之即止。

【功用】接骨。

【主治】搦扑刀伤。

34497 朱砂膏

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】朱砂 硼砂 粉霜 牙消 脑子 麝香各一钱

【用法】上研成膏，候干。每服三匙，薄荷汤下，麝香亦得；如喉中涎鸣，生姜汤下。

【主治】惊热焦啼，烦躁口干。

34498 朱砂膏

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】朱砂（另研） 白僵蚕（炒去丝

嘴） 白附子（湿纸裹，煨，焙干） 天南星（炮）各半两 干蝎一两（铤内炒令熟，不可太过）

【用法】上件入麝香半钱，共为细末，面糊为丸，如粟米大，朱砂为衣。每服十丸，煎金银薄荷汤送下；如盗汗，煎麻黄根汤送下，不拘时候。

【功用】镇心脏，压惊化痰，坠涎除风。

34499 朱砂膏

《婴童百问》卷六。即原书同卷“牛黄膏”加粉霜二钱。见该条。

34500 朱砂膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】麻油一斤 飞丹六两 水银五钱 朱砂（佳者）一两半（飞） 好黄蜡四两

【用法】先下油熬数沸，下鸡子二枚，敲开连壳投之，熬焦，捞去子，退火俟油定，下水银五钱，再加微火搅，熬饭顷，即入丹渐收成膏，后下黄占，再搅，候大温，下极细好朱砂一两五钱，搅匀，瓷罐收贮。

【主治】一切顽疮、破疮、杖疮、痈疽、发背、破伤者。

34501 朱砂膏

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】葱五六十斤（捣极烂，绞汁放锅内，投入嫩松香五斤，微火熬至葱汁滚，松香化，取下俟稍冷，即以手在汁中揉松香几百揉，然后再放火上再烊再揉，如此五六次，揉至松香色白无油为度，配入后药） 当门子五钱（即顶高麝香） 樟脑十二两 梅花冰片一两 蓖麻子一斤（去壳，研如泥，另贮） 乳香没药各三两五钱（俱用灯心草炒去油） 朱砂六两（水飞）

【用法】上除蓖麻子，余皆为极细末，将制好松香放于瓷钵内，隔水烊化，取出，即以前药末并蓖麻子泥一并投入，搅和摊贴；如干，可酌加蓖麻子油，以好摊为度；摊用柿漆单张桑皮纸，不可着火。

【主治】一切无名肿毒，横痃，乳疔，恶疽

疗毒。未成者即消，已成者即溃。

34502 朱砂膏

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】枣仁 人参 赤苓各一两 西珀二钱半 朱砂 乳香各五钱

【用法】上为末。每服一钱，灯心、大枣汤送下；或炼蜜为丸，薄荷汤送下亦可。

【主治】癫痫。

34503 朱砂膏

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】银朱五两 朱砂一两 官粉四斤

【用法】上为细末，用香油六斤，熬至滴水成珠后，再入官粉四斤，如法收膏，搅匀备用。油纸摊膏，贴患处。

【主治】疮疡肿痛，溃久不敛。

34504 朱砂膏

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】朱砂 银朱各四两 章丹八两 官粉六斤 松香一斤 黄蜡四两 香油八斤

【用法】共熬成膏。贴患处。

【功效】解毒去湿。

【主治】疮疖溃破，流脓流水，湿气糜烂。

34505 朱峰散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】墙丁（即墙上细螺蛳，又名石壁峰）三钱 大贝 银朱 朱砂各一钱五分

【用法】上为末，和匀。

【功效】拔疗脚。

34506 朱粉丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】巴豆一钱 粉霜 硃砂各半钱

【用法】上为末，黄蜡二钱熔成汁，下药搅匀，为丸如绿豆大，每服一丸，米饮送下，未知再进。

【主治】积痢。下痢纯脓，或赤或白，脐腹撮痛，痛即痢下，已即痛，其脉紧大而疾，此由饮食失宜，留而不去，与冷气相搏所致。

34507 朱粉丹

《卫生总微》卷五。为《圣惠》卷八十五“红丸子”之异名。见该条。

34508 朱粉丹

【方源】《续易简》卷四。

【组成】巴豆（去皮心膜，出油） 粉草 硃砂 朱砂各一钱（研） 砒（研）半钱

【用法】上为末，黄蜡二钱熔成汁，下药搅匀，为丸如绿豆大。每服一丸，饮送下，未知再进。

【主治】疟痢及积痢。

34509 朱粉散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】丹砂（研飞） 蛤粉各等分

【用法】上为细末，合和令匀。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】诸般吐血。

34510 朱粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【异名】鲇鱼丸（《普济方》卷一〇〇）。

【组成】朱砂半两（别研）

【用法】上件用大鲇鱼一尾，将轻粉涂在鲇鱼身上，少时刮去鲇鱼身上涎，用朱砂末为丸，如绿豆大。每服二丸，食后温熟水送下；冷水亦得。

【主治】五种痢疾。

34511 朱粉散

【方源】《济生》卷五。

【组成】枯白矾一两 干胭脂一钱半 轻粉半钱 麝香少许

【用法】上为末。油调，扫口疮；或干贴。

【主治】白口疮恶及牙疳蚀。

34512 朱粉散

【方源】《施圆端效方》引《范师方》（见《医方类聚》卷一九二）。

【组成】诃子核一两 枯白矾半两 黄丹二钱（炒）

【用法】上为极细末。先用温浆水澡了，上之。效。

【主治】诸瘡恶疮，多时不效。

34513 朱粉散

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十一。

【组成】朱砂一粒 轻粉一片 僵蚕七个

蝎三个

【用法】上先将蚕、蝎微炒燥，取出待冷，同砂、粉研为细末。却以母乳汁调抹于儿口内。

【主治】急慢惊风。

34514 朱黄丹

【方源】《颅囟经》卷下。

【组成】慎火草（捣汁）

【用法】和酒调涂之。

【主治】小儿火丹。赤豆色，遍身上起。

34515 朱黄丹

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】朱砂一分（研，水飞） 天竺黄半两（研） 干全蝎二十一个（微炒，去毒） 天浆子十四个（去壳，微炒） 人参（去芦）一两 胡黄连一两 青黛一分（研） 龙脑一钱（研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，人参汤化下，不拘时候。

【主治】小儿心疳挟惊，发热烦渴，盗汗羸瘦。

34516 朱黄散

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】明朱砂一钱 京牛黄一分（合一处研极细而） 真犀牛角二钱 真羚羊角二钱

【用法】水一钟，煎至半钟，冲朱、黄而服。

【主治】年老或虚弱之人伤寒发狂者。

34517 朱雀丸

【方源】《百一》卷一引苏稻光方。

【组成】茯神二两（去皮） 沉香半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，食后人参汤送下。

【功用】①《百一》：消阴火，全心气。②《本草纲目》：养心安神。

【主治】心肾不交，心悸怔忡，健忘。

①《百一》：心神不定，恍惚不乐，火不下降，时有振跳。②《丹溪心法》：心病，怔忡不止。③《医灯续焰》：心肾不交，心神不定，事多健忘。

【方论选录】《医方考》：因惊而得者，名曰惊气怔忡。《内经》曰：惊则气乱。宜其怔忡忡忡，如物之扑也。是方也，伏神之甘平，可以宁心；沉香之坚实，可使下气，气下则怔忡瘳矣。

【备考】《证治宝鉴》引本方有朱砂。

34518 朱雀丹

【方源】《红炉点雪》卷二。

【组成】沙参（童便浸，晒干） 梔子仁（童便蒸） 知母（乳蒸） 天门冬（去心） 黄柏（童便蒸） 何首乌（乳蒸）各一钱 甘草三分 生姜一片

【用法】水煎，空心服。

【主治】男妇腰背痛，午后发热，自汗，脉洪浮。

34519 朱雀汤

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】甘遂 芫花各一分 大戟三分

【用法】上为散，以大枣十二枚（擘破），水六升，先煎枣，取二升；纳药三方寸匕，更煎取一升一合，分再服，以吐下为知，未知重服，甚良无比。

【主治】久病癖饮，停痰不消，在胸膈上液液，时头眩痛，苦挛，眼睛、身体、手足、十指甲尽黄，亦疗胁下支满饮，辄引胁下痛。

34520 朱雀汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】雄雀一只（取肉炙） 赤小豆一合 赤茯苓（去黑皮） 人参 大枣（去核） 紫石英各一两 远志（去心） 紫苑（去苗土） 丹参各半两 小麦一两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上锉细，拌匀。每服三钱匕，用水一盞，煎取六分，去滓温服。

【主治】心气劳伤。

34521 朱银丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】水银丸（《普济方》卷三六一）。

【组成】水银一钱（蒸枣肉研如泥） 白附

子一钱半 蝎一钱 南星 朱砂一分 天浆子 牛黄 芦荟各半分 铅霜半钱(和水银研) 脑一字 麝半钱 直僵蚕(炒)七个

【用法】上为末,粟米糊丸,如芥子大。每服一丸,薄荷汤送下;如未通利,加重二丸。

【功效】下胎中蕴受之毒。

【主治】胎风,壮热痰盛,翻眼口噤;惊积。

34522 朱雄丸

【方源】《普济方》卷三五七。

【异名】万金不传遇仙方、遇仙雄黄丹、金弹丸。

【组成】雄黄 朱砂各一钱 蓖麻子十四粒(去皮) 蛇蛻一尺

【用法】上为细末,浆水饭为丸,如弹子大。临产时,先以椒汤淋洗脐下,次以药安于脐中,用油纸数重敷药上,以帛系之。须臾即生,急取下。一方用蜡纸亦可。

【功效】催生。

【主治】难产,横生倒生,或胎死不出。

34523 朱雄丸

【方源】《医统》卷四十九。

【组成】辰砂 明雄黄各二钱半(研) 白附子一钱

【用法】上为末,猪心血为丸,金箔为衣。每服三丸,人参、菖蒲煎汤送下。

【功用】安魂定魄。

【主治】男女惊忧,失志思虑过多,痰迷心窍,以致叫呼奔走。

34524 朱雄丸

【方源】《胎产新书》。

【组成】朱砂 雄黄各一钱 白茯苓二两

【用法】上为末,水为丸。每服五十丸,生姜汤送下。

【主治】经来不止,兼下牛膜一样,昏迷倒地,乃血气结聚,变成此证。

34525 朱犀散

【方源】《得效》卷十。

【异名】朱砂散(《疮疡经验全书》卷六)。

【组成】犀角半两(镑屑,研末) 生麝香

大朱砂各一分

【用法】上为细末。每服二钱,新汲井水调灌之。

【主治】中恶,中忤,鬼气,其证暮夜或登厕,或出效野,或游空冷屋室,或人所不至之地,忽然眼见鬼物,鼻口吸着恶气,晕倒地,四肢厥冷,两手握拳,鼻口出清血,性命逡巡须臾不救。

【备考】此证与尸厥同,但腹不鸣,心胁俱暖。凡此切勿移动。即令亲眷多人围绕,打鼓烧火,或烧麝香、安息香、苏木、樟木之类,且候记醒,方可移归。

34526 朱竭膏

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】血竭 银朱 轻粉 乳香 没药各二钱

【用法】上药各为细末,和匀,以万灵膏四两,以手蘸水,将诸末拌扯红色。外贴。

【主治】诸疮。

34527 朱蜜丸

【方源】方出《千金》卷九,名见《外台》卷四。

【组成】白蜜 上等朱砂粉一两

【用法】上为丸,如麻子大。日平旦,吞服三七丸,勿令齿近之;并吞赤小豆七枚。

【主治】疫病。

34528 朱墨丸

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】朱砂 京墨各等分

【用法】上为末,以蟾酥汁为丸,如梧桐子大。每服二丸,以葱白煎汤送下,日服一二次。

【主治】疔疮瘰毒。

34529 朱魏丹

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】辰砂(光明者) 阿魏(真者)各一两

【用法】上为末,面糊为丸,如皂角子大。每服一丸,空心人参汤送下。

【主治】疟疾。

34530 朱黛散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】青黛 土朱各一分 软滑石 荆芥穗各半分

【用法】上为末。每服一钱半，蜜水调下。兼与扑身。

【功用】解丹热诸毒。

【主治】丹毒。

34531 朱麝丹

【方源】《永乐大典》卷九七八引《卫生家宝》。

【组成】朱砂一钱 全蝎一钱 蜈蚣一条(全者) 麝香当门子半钱

【用法】上为末，枣肉为丸，捏如钱眼大。每服半饼或一饼，麝香酒化下。

【主治】小儿急慢惊风。

34532 朱麝散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】人参 朱砂各半分 牛胆南星 天竺黄 牙消 铁粉各半分 麝少许

【用法】上为末。每服一字，生姜、薄荷汤调下。

【主治】胎风，心热痰壅。

34533 朱麝散

《普济方》卷一〇一。为《普济方》卷一〇一引《十便良方》“香砂散”之异名。见该条。

34534 朱麝散

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】青黛一分 干地龙七条(微炒，为末) 麝香半分 朱砂一分

【用法】上为散。每服半钱，以饮调下。

【主治】小儿烦热，昏闷多睡。

34535 朱衣使者

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】砒半两(细研) 绿豆末一分 黑豆末一分

【用法】上为末，滴水为丸，如黍米大，辰砂为衣。间日发者，于好日夜临卧时，冷醋

水送下二丸。频日发者，只于当日夜服如上法。儿极小者与一丸。

【主治】小儿发疟不止。

34536 朱砂饼子

【方源】《幼幼新书》卷九引《张氏家传》。

【组成】天南星(炮) 白附子 白僵蚕(洗) 各一钱 白花蛇三钱(去皮骨)

【用法】上为末，用天麻末、白面少许，煮糊为丸，如梧桐子大。每服一饼子，朱砂为衣，用金银薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风。

34537 朱砂饼子

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】朱砂(辰州尤佳) 巴豆七个 水银一皂大

【用法】上同用水熬一宿，去巴豆，水银，浆砂细研，蜜和成膏，置心上。

【主治】大便秘结。

34538 朱砂消丸

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】新蟾蜍不拘多少 朱砂(为细末) 寒食面少许 巴豆(去皮，不出油) 不拘多少

【用法】上为丸，如黄米大，朱砂为衣。每服一丸，温酒送下。

【主治】一切恶疮。

34539 朱赭妙丸

《普济方》卷二一九。即《朱氏集验方》卷八“秘传肉丹”。见该条。

34540 朱千户膏药

【方源】《袖珍方》卷三。

【组成】赤芍药 白芍药各一两 白芷二两 川当归五钱 杜当归二两 紫荆皮两半 桐油半斤

【用法】先煎油，下白芷等六味，熬至黄色，滤去滓，再熬，下白胶二斤熬，下乳香五钱再熬，下没药五钱，再熬数次，下黄蜡一两，不住搅，滴水不散为度。

【主治】痈疽疮疖。

34541 朱子读书丸

《摄生众妙方》卷七。为原书同卷“益智丸”之异名。见该条。

34542 朱氏洗心散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】生地黄 枯黄芩 麦冬 归尾 知母 薄荷叶 甘草

【用法】鲜藕节、侧柏叶为引，水煎服。

【主治】心经有热，口舌生疮，白珠等症。

【加减】甚者，加黄连。

34543 朱衣滚痰丸

《金鉴》卷五十一。为《济阳纲目》卷四十六“朱砂滚痰丸”之异名。见该条。

34544 朱附钟乳丸

《魏氏家藏方》卷二。即原书同卷“朱附丸”加钟乳粉。见该条。

34545 朱珀镇神丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】胆南星三钱 朱砂五钱 琥珀四钱 黄连 竺黄 远志 节蒲各三钱 茯神五钱 枣仁三钱 甘草二钱 金箔一钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，七分重。每服一丸，饭后一时白开水送下。

【功用】镇静，强心，除烦。

【主治】心悸亢进，夜卧不宁，精神恍惚，惊惧多梦，伤脑过度，心跳失眠，怔忡健忘，躁烦急惊。

34546 朱珀镇惊散

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】僵蚕三钱 天麻 全蝎 木通 犀角 薄荷 大黄 蝉蜕 柴胡 粉草 枳实 槟榔 赤芍 川连 天竺黄 菖蒲 川贝 羌活 钩藤 橘红 前胡各一钱 胆星 生地各一钱五分 灯心 梅片各五分 辰砂五钱 麝香 牛黄各一分 琥珀二钱

【用法】上为细末，瓶装，重量三分。每服一瓶，未周岁者减半。

【主治】小儿急惊痰厥，口眼歪斜，痰喘咳嗽，口舌生疮，五心潮热等症。

34547 朱黄琥珀散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】琥珀煮散（《圣济总录》卷一五〇）。

【组成】琥珀 没药 木香 当归 芍药 白芷 羌活 干地黄 延胡索 川芎各半两 土瓜根 牡丹皮 白术 桂各一两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，益酒三分，复煎少时，并滓热服。重疾，数服则知效。

【主治】妇人血风劳。

34548 朱砂人牙散

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】人牙（煨）三钱 山甲（土炒）三钱 朱砂三钱 桑虫（炙干）三钱 麝香二分

【用法】上为末。每服三分，酒浆调下。

【主治】痘疮红紫黑陷，咬牙寒战，痘不起发。

34549 朱砂三棱丸

【方源】《普济方》卷一七四。

【组成】石三棱（酒浸） 荆三棱（酒浸） 鸡爪三棱（酒浸） 蓬术（醋浸） 枳壳（去瓢，麸炒） 川楝子（去皮、子） 茴香（微炒） 青皮（去白） 当归（去芦）各半两 槟榔七钱半 丁香二钱 木香三钱 巴豆（去壳，麸炒至深黄色为度）十八粒（巴豆斟酌量用或只用巴豆炒三棱、枳壳、蓬术三味亦得，炒至黄色，去巴豆） 肉豆蔻七钱半 朱砂五钱（水飞，一半入药，一半为衣）

【用法】上为细末。除朱砂外，生姜研汁，用面打糊为丸，如小豆大。每服十五丸，生姜汤送下；温水亦得。

【主治】痼癖，气块留滞，一切内伤。

34550 朱砂万亿丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】野大黄 干姜 寒食面各二两 巴豆霜一两

【用法】上为极细末，面糊为小丸，每丸一分五厘重。每服三丸，开水送下；若中恶口

噤者，则用黄酒送下。

【功用】通调脾胃，消坚化滞。

【主治】饮食停滞，腹胀痛满，大便燥结，食滞胃肠。

【宜忌】禁生冷油腻，孕妇忌服。

34551 朱砂万应丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】朱砂末一钱 硃砂末一钱 巴豆七个（去皮、膜） 蜡二枣大许

【用法】于铤子内先熔蜡化，入巴豆熬至黑焦，去巴豆不用，却入上二味，搅极匀，放凝为剂。如用，旋丸如绿豆大，每服二丸，白痢艾汤送下；赤痢，黄连汤送下；赤白痢，黄连艾汤送下；水谷痢，新水送下。乳食前服。

【主治】小儿积痢、久痢、滞痢、一切诸痢，多日不愈。

34552 朱砂万应丸

《全国中药成药处方集》（吉林方）。为原书“万应丸”之异名。见该条。

34553 朱砂五苓散

《永类铃方》卷二十。即《局方》卷二（宝庆新增方）“辰砂五苓散”。见该条。

34554 朱砂水银煎

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】朱砂 水银 巴豆 粉霜各一分 代赭各五钱 蒺藜五钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如弹子大。患者安脐中，以软纸一张，折盖之后，用裹肚系定，令病入卧，只一两食饭间，其疾自小便出水约二三斗，便住，取出药，恐过度。却用生姜汁调黄连末半两，作一枚安脐中，依前用纸盖裹肚系定。煎桑白皮汤煮大麦面饅饅吃之。愈后三日用药补之。

【主治】水气。

【宜忌】忌腌藏、生冷、盐、醋等物。

【备考】补药：海蛤、破故纸、白甘遂、木香各等分。上为细末，每服半钱，空心米饮调下。

34555 朱砂甘遂丸

《万氏家抄方》卷二。为《本草纲目》卷

十七引《济生》“遂心丹”之异名。见该条。

34556 朱砂守病丸

【方源】《普济方》卷一六八。

【异名】太上老君守病丸。

【组成】朱砂三钱 硼砂一钱 橘红三钱 粉霜一钱 轻粉一钱 龙骨一钱 白胶香一两半 琥珀一钱 硃砂一钱 雄黄一钱 石脑油二钱 千口土（不入药，水中浸用。一方无龙骨、白胶香、粉霜，用赤石脂）

【用法】上将硼砂、硃砂、雄黄各乳研，却用石脑油消银大砂锅内，将上三味乳细末和匀，用铜匙子不住手搅，砂锅外用一大锅滚汤，将砂锅顿放汤锅中煮，仍不住手搅，直至油炒雄黄干黑色成膏为度；却取出砂锅，候冷定干硬，再入乳钵细研，却入余药末，同研匀，用大铜匙将药末入热汤内荡，自然成剂，用手捏成块，就于汤火边旋捏下为丸，如樱桃大，随丸即放入千口土水碗内浸之，候冷定硬，出底干，收贮。服时用新水送下，未时前后服。次日服五积丸。

【主治】积聚。

34557 朱砂守病丸

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】人言一两 巴豆（去皮，烧熟）一两 芫花一两（醋炙）

【用法】上为细末，为丸如皂角子大。每服三丸，空心温酒一盏送下。

【主治】积聚；一切蛊气，返食证。

34558 朱砂守病丸

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】朱砂 硼砂 血竭 黄蜡各三钱 巴豆（去油） 轻粉 硃砂各一钱

【用法】上为末，将黄蜡化开，入药为丸，如绿豆大。每服十五丸，烧酒送下。

【主治】远年近日肠内积块。

34559 朱砂安神丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】安神丸（《兰室秘藏》卷下）、朱砂丸（《普济方》卷十六）、黄连安神丸

(《保婴撮要》卷十三)、安寝丸(《胎产指南》卷八)。

【组成】朱砂五钱(另研,水飞为衣) 甘草五钱五分 黄连(去须净,酒洗)六钱 当归(去芦)二钱五分 生地黄一钱五分

【用法】上药除朱砂外,四味共为细末,汤浸蒸饼为丸,如黍米大,以朱砂为衣。每服十五丸或二十丸,食后津唾咽下;或温水、凉水少许送下亦得。

【功用】镇心安神,清热养血。

①《兰室秘藏》:镇阴火之浮行,以养上焦之原气。②《玉机微义》:宁心清神,凉血。③《明医指掌》:安胎孕,除烦热。④《景岳全书》:清心火,养血安神。⑤《全国中药成药处方集》(南京方):镇静安眠。⑥《全国中药成药处方集》(西安方):强壮、补血、镇静中枢神经。

【主治】心火上炎,灼伤阴血,心神烦乱,怔忡,失眠多梦。

①《内外伤辨》:气浮心乱。②《兰室秘藏》:心神烦乱,怔忡,兀兀欲吐,胸中气乱而有热,有似懊恼之状,皆膈上血中伏火,蒸蒸然不安。③《丹溪心法》:血虚惊悸。④《医统》:夜卧不安。⑤《准绳·女科》:心经血虚头晕,惊悸。⑥《明医指掌》:痰痛。⑦《胎产指南》:忧愁思虑,伤心不食。⑧《医学心悟》:惊、悸、恐。⑨《叶氏女科》:妊娠五六月,平素火盛,或值天时炎热,内外之火相亢而心惊胆怯,烦躁不安,左寸微弱者。⑩《全国中药成药处方集》(杭州方):血虚肝旺,心神烦乱,惊悸健忘,夜不安床,懊恼时作,怪梦频多。⑪《全国中药成药处方集》(西安方):轻性贫血,脑贫血,神经过敏,精神不安,心悸亢进,心神烦乱不安,苦闷不眠。

【宜忌】①《全国中药成药处方集》(南昌方):忌食辛辣、烟、酒。②《全国中药成药处方集》(西安方):因消化不良,胃部嘈杂,有似烦闷而怔忡不安,或不眠等症忌服。③

《全国中药成药处方集》(沈阳方):忌油腻。

④《医方发挥》:不宜多服或久服,以防造成汞中毒。

【方论选录】①《内外伤辨》:《内经》曰:热淫所胜,治以甘寒,以苦泻之。以黄连之苦寒去心烦,除湿热为君;以甘草、生地黄之甘寒泻火补气,滋生阴血为臣;以当归补其血不足;朱砂纳浮溜之火,而安神明也。②《医方考》:梦中惊悸,心神不安者,此方主之。梦中惊悸者,心血虚而火袭之也。是方也,朱砂之重,可使安神;黄连之苦,可使泻火;生地黄之凉,可使清热;当归之辛,可使养血;乃甘草者,一可缓其炎炎之焰,一可以养气而生神也。③《杏苑》:以黄连、生甘草泻火热,川归、生地益心血,佐朱砂以安心神。④《张氏医通》:凡言心经药,都属心胞,惟朱砂外禀离明,内含真汞,故能交合水火,直入心脏。但其性徐缓,无迅扫阳焰之速效,是以更需黄连之苦寒以直折其势,甘草之甘缓以款启其微,俾膈上实火虚火,悉从小肠而降泄之。允为劳心伤神,动作伤气,扰乱虚阳之的方。岂特治热伤心包而已哉!然其奥又在当归之辛温走血,地黄之濡润滋阴,以杜火气复炽之路。其动静之机,多寡之制,各有至理,良工调剂之苦心,其可忽诸。⑤《古今名医方论》:叶仲坚:经云:神气舍心,精神毕具。又曰:心者,生之本,神之舍也。且心为君主之官,主不明则精气乱,神太劳则魂魄散,所以寤寐不安,淫邪发梦,轻则惊悸怔忡,重则痴妄癫狂也。朱砂具光明之体,色赤通心,重能镇怯,寒能胜热,甘以生津,抑阴火之浮游,以养上焦之元气,为安神之第一品;心若热,配黄连之苦寒,泻心热也;更佐甘草之甘以泻之;心主血,用当归之甘温,归心血也;更佐地黄之寒以补之。心血足则肝得所藏,而魂自安,心热解则肺得其职,而魄自宁也。⑥《时方歌括》:东垣之方多杂乱无纪,惟此方用朱砂之重以镇怯,黄连之苦以清热,当归之辛以嘘血,更

取甘草之甘以制黄连之太过，地黄之润以助当归所不及。方意颇纯，亦堪节取。

【临证举例】夜游症《中医杂志》(1981: 11; 62): 龙某某，男，14岁，学生。每于睡梦中惊起，启门而出，跌仆于田野荒丘，仍然沉睡。诊时见患儿神态如常，自觉心烦耳鸣，夜卧而出并不知觉，唯多梦易惊而已。舌红苔黄，脉弦数。今火扰心而心烦；火升木亢而耳鸣；火热扰于心肝，则神失守而魂飘荡，于是梦寐恍惚，变幻游行。治当清心泻火安神，镇肝定魂。予朱砂安神丸合磁朱丸。处方生地 60 克，黄连 18 克，当归 30 克，甘草 15 克，煅磁石 30 克，建曲 18 克。研末和蜜为丸，如黄豆大，外以朱砂 9 克为衣。早晚各服一次，每服 30 丸。服完二料丸剂，其病竟瘳。

34560 朱砂安神丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】黄连安神丸（《东垣试效方》卷一）。

【组成】朱砂四钱 黄连五钱 生甘草二钱五分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服十丸，食后津唾咽下。

【主治】心烦懊恼，心乱怔忡，上热胸中气乱，心下痞闷，食入反出。

34561 朱砂安神丸

【方源】《保婴撮要》卷八。

【组成】朱砂四钱 黄连 生地黄各半两 生甘草二钱半 兰香叶二钱（烧灰） 铜青轻粉各五分

【用法】上为末，干敷上。

【主治】小儿心痞怔忡，心中痞闷。

34562 朱砂安神丸

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】黄连 朱砂各二钱 当归身三钱 白茯苓二钱 甘草一钱 远志 石菖蒲各二钱 酸枣仁一钱

【用法】上为末，猪心血为丸，如芡实大，

朱砂为衣。灯心汤送下。

【功用】安神。

34563 朱砂安神丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】朱砂 黄连 甘草 生地 麦冬 当归 远志 白茯苓

【主治】心经咳嗽，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则舌肿咽痛，左寸脉洪数者。

34564 朱砂安神丸

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】黄连 白茯苓 麦门冬 生地 枣仁

【主治】心火旺，心血虚，不得卧者。

34565 朱砂安神丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】当归一两 麦冬一两 天冬一两 元参五钱 丹参五钱 远志五钱 茯苓五钱 柏子仁一两 人参二钱五分 生地二两 枣仁一两（炒） 五味子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱。

【主治】心血虚，怔忡惊悸，睡眠不实。

34566 朱砂安神丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连一钱 甘草二钱五分 熟地三钱 生地二钱 当归五钱 生石膏一两 枣仁（炒）一两 龙齿（生）六钱 茯苓五钱 柏子仁一两 远志（炙）五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，朱砂为衣，重三钱。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】补气益血，宁心安神。

【主治】气血衰弱，心跳不安，精神恍惚，夜寐难眠。

34567 朱砂安神丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】当归 生白芍 川贝 炒枣仁各二两 生地三两 陈皮 麦冬各一两五钱 黄连四钱 茯苓（去皮）一两五钱 甘草五钱 川芎一两五钱 远志肉（甘草水制）五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，每斤丸药用朱砂面三钱为衣，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，白开水送下。

【功用】镇静安神。

【主治】神经衰弱，失眠心跳，思虑过度，记忆不强。

34568 朱砂红丸子

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】朱砂(细研) 白术 白藜 白附子 吴白芷 白僵蚕 木香各半两 白及 白茯苓 密陀僧各一钱半 钟乳粉二两

【用法】上为细末，用阿胶半两熬成膏子，入上项药末为丸，如梧桐子大。用温水、蜜少许，磨化开，调涂面上，次日早晨用温水洗之。

【主治】面色不整净，及黧黥面黑皱。

34569 朱砂芦荟丸

《证治汇补》卷一。为方出《广笔记》卷一，名见《古今名医方论》卷四“更衣丸”之异名。见该条。

34570 朱砂沉香丸

【方源】《医方类聚》卷一六〇引《医林方》。

【组成】丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三棱 广茂 牵牛 黄连 雷丸 鹤虱 黄芩 大黄 陈皮 青皮 雄黄 甘草 熊胆各二钱半 赤小豆三百粒(六十粒煮烂) 白丁香三百六十个(直立者好) 轻粉四钱 巴豆七个(取霜)

【用法】上为细末，用赤小豆煮烂，和汤打荞面糊为丸，如弹子大，朱砂为衣，阴干。每服一丸，用新汲水浸一宿化开，食后服之。大便出。多年不过二丸。

【主治】风痼。

34571 朱砂备急膏

《玉机微义》卷十五引郭氏方。为原书同卷“万灵夺命丹”之异名。见该条。

34572 朱砂定惊丸

《摄生众妙方》卷十。为《宣明论》卷十四“朱砂丸”之异名。见该条。

34573 朱砂指甲散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】人手指甲(烧存性)六钱 朱砂 南星 独活各二钱

【用法】上为末，分作三服。热酒调下。

【主治】破伤风，手足颤掉不已。

34574 朱砂莲心散

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】莲子心二钱(研细末)十包 朱砂一分(细面)十包

【功用】清心安神。

【主治】心经病。

【宜忌】朱砂少量服用为宜，因其含硫化汞等无机物，故不宜过量多服或久服。

【方论选录】方中莲子心苦寒入心经，可清心火，《本草纲目》谓：清心去热；朱砂亦入心经，可清心定惊安神，《本经》载谓：安魂魄。近人研究，朱砂有镇静之作用。

34575 朱砂柴胡丸

【方源】《幼幼新书》卷二十引《庄氏家传》。

【组成】好朱砂一两(细研，水飞过，晒过) 柴胡(去苗土，净洗，为末)二两

【用法】上为末，用猪胆汁拌和匀湿，入一瓷盒子内，盖；于炊饮甑上蒸之至饭熟为度，取出，急和丸，如小豆大。每服十丸，空心、临卧煎桃仁、乌梅汤放冷送下。

【主治】小儿骨蒸发热，遍身如火，黄瘦虚汗，咳嗽心忪，日久不已。

34576 朱砂铁粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】朱砂一钱(别研) 铁粉二钱(别研) 腻粉半钱(别研)

【用法】上为末。半岁儿每服一字，一岁儿服半钱，煎薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿身体壮热，急惊搐搦，涎潮壅塞，闷乱不醒。

34577 朱砂透红丸

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】蜈蚣一对 血竭一钱 麝香一钱

轻粉一钱 蟾酥一钱 粉霜一钱 朱砂半钱

【用法】上为末，将蟾酥为丸。每服三丸至五丸，冷酒送下。

【主治】疮。

34578 朱砂凉肺丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】黄芩 黄连 山梔子 连翘 桔梗 甘草 人参各等分 薄荷叶减半 朱砂(水飞为衣)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。麦冬汤送下。

【功用】泄心肺之火。

【主治】肺热症瘡，鼻衄不止。

34579 朱砂凉膈丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】黄连 山梔子各一两 人参 茯苓各五钱 朱砂三钱(别研) 脑子五分(别研)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五七丸，食后熟水送下，一日三次。

【主治】上焦虚热，肺脘咽膈有气，如烟抢上。

34580 朱砂凉膈丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】川黄连 黄柏 黄芩 大黄 天花粉 滑石 薄荷各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸。

【主治】三焦积热，肠胃燥结，热应睛红。

34581 朱砂消痰饮

【方源】《医统》卷五十。

【组成】牛胆南星半两 朱砂减半(另研) 麝香二分(另研)

【用法】上为末。临卧姜汁汤调服一钱。

【主治】心气痰迷心窍，惊悸。

34582 朱砂益元散

《景岳全书》卷五十七。为《奇效良方》卷五“辰砂益原散”之异名。见该条。

34583 朱砂黄连丸

【方源】《普济方》卷一七六引《医方集成》。

【组成】朱砂一两(另研) 宣连二两 生地黄三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，灯心枣汤送下。

【主治】心虚蕴热，或因饮酒过多，发为消渴。

34584 朱砂鹿茸丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】龙齿七钱 鹿茸一两半(酒浸，炙) 鹿角胶一两(螺粉炒)

【用法】上为细末。用石菖蒲、远志锉碎，酒浸，煮山药糊为丸，以朱砂为衣，如梧桐子大。每服三十丸，用木香匀气散送下；如无白浊，平补只用盐汤、温酒空心服。

【主治】小便白浊。

34585 朱砂琥珀丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】猪心一枚 当归(去芦，酒浸) 麦门冬(去心)各一两(三味一处，用水一碗半，慢火同煮候猪心烂，去二药，只取猪心，慢火熬干烂，研入后药) 朱砂(别研) 龙齿(别研) 琥珀各半两(别研) 人参(去芦)一两 熟地黄(洗) 白茯苓(去皮)各二两 酸枣仁三钱(研，炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】心气不足。

34586 朱砂斑螫丸

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】皂角末二钱 巴豆四个(去油) 朱砂一钱 硃砂一皂子大块 干蝎一个 全斑螫十个 红娘子五个 水蛭三个

【用法】上为细末，炼蜜为丸。分作十五丸，每服一丸至二三丸，温酒送下。初更吃，平明取下血化水。

【主治】妇人产后，吃硬食，变作血气食块，无问久新。

34587 朱砂解毒丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】朱砂一两 龙骨五钱 雄黄少许

【用法】蟾酥为丸，如绿豆大。轻者五七丸，重者九丸或十一丸，冷水送下。若人不能服药，心中霍乱，不省人事，拨开牙关，舌尖贴一丸，汗出为度。

【主治】一切恶疮，走胤无形。

34588 朱砂滚涎丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】朱砂滚痰丸（《松崖医径》卷上）。

【组成】朱砂（水飞） 白矾（生用） 赤石脂 硝石各等分

【用法】上为细末，研蒜膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】五疳。

【备考】本方原名朱砂滚涎散，与剂型不符，据《增补内经拾遗方论》改。

34589 朱砂滚痰丸

《松崖医径》卷上。为《儒门事亲》卷十五“朱砂滚涎丸”之异名。见该条。

34590 朱砂滚痰丸

【方源】《济阳纲目》卷四十六。

【异名】朱衣滚痰丸（《金鉴》卷五十一）。

【组成】大黄（酒蒸） 片黄芩各八两 沉香半两 礞石（煨）一两 朱砂二两（另研为衣）

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧、食后茶清、温水任下。

【主治】痰热攻心，癫狂唱哭。

34591 朱砂鹤顶丹

【方源】《普济方》卷二五五。

【异名】鹤顶丹。

【组成】半夏（姜炮制） 杏仁（去皮尖） 山豆（去皮油）各四十九 宿蒸饼四两（去皮） 干胭脂二钱（为衣）

【用法】同捣为泥，滴醋为丸，如小豆大。每服十丸，加至十五丸。此药治二十一等证，心腹膨胀，陈皮汤或米汤送下；伤寒，陈皮汤送下；白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤

送下；血痢，当归汤送下；大小便不通，磨刀水送下；心气疼，菖蒲根汤送下；心疼痛，醋汤送下；冷病，艾汤送下；劳气，米汤送下；小肠气，茴香汤送下；肾脏风，木瓜汤送下；肠风，痔漏，泻痢，槐花汤送下；吐血，丁香汤送下；阴毒伤寒，葱白汤送下；疟疾，桃心汤送下；噎食，木香汤送下；小儿瘫痪，皂荚子汤送下；小儿惊风，薄荷汤送下；小儿五疳八痢，米汤送下；五咳，人参、马兜铃汤送下；脐腹疼痛，盐汤送下；腰疼、脚气，牵牛汤送下；水泻，车前子汤送下；妇人月水不调，红花、芍药汤送下。

【主治】伤寒，白赤痢，血痢，大小便不通，心气疼痛，小肠气，肾脏风，肠风，痔漏，阴毒伤寒，疟疾，噎食；小儿瘫痪，惊风；妇人月水不调。

34592 朱雀交泰丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】茯神四两 沉香（无真沉香，用香附） 黄连各一两 肉桂一钱

【用法】炼蜜为丸。人参汤送下。

【主治】心肾不交。

34593 朱僧热翳方

【方源】《直指》卷二十。

【组成】蝉壳（洗，晒）半两 蒺藜（炒，捣去刺）半两 防风 羌活 木贼（去芦，童便浸一宿，晒） 川芎 细辛 秦皮 枳实 荆芥 藁本 干菊 甘草各二钱半

【用法】上为末。每服一钱，薄茶调下。

【主治】眼热生翳。

34594 朱橘元青露

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】陈皮二钱 元青汁三十个（即斑蝥） 烧酒半斤

【用法】上入瓶内，浸二七日。取汁搽癣上，频涂勿令干。以患处觉热痛为则，随起白泡，破流清水，水净结薄皮，三二日脱愈，其者三二次，除根不发。

【主治】一切癣。

34595 朱氏神效吹药

【方源】《喉科紫珍集·补遗》。

【组成】青皮 知母 白瓣皮 陈皮 云茯苓 葵藜 川槿皮 地骨皮 白术 甘菊 角刺 厚朴 麦门冬 麻黄 干葛 三奈各等分

上药共浸水内，春浸五日，夏浸三日，秋浸七日，冬浸十日，去滓煎干，后入以下诸药：

儿茶一钱五分 血竭二钱五分 螺蛳五钱（煨） 没药二钱（炙） 硼砂一两 石蟹五分 石燕一钱六分 玄明粉三钱五分 金精石二钱五分（醋煨） 银精石二钱五分（醋煨） 铜青五钱 青礞石一钱五分 桑皮灰三钱 朱砂三钱 磁石一两（醋煨） 龙骨三钱（煨） 轻粉三钱 熊胆三钱（炙） 明雄黄五钱（水飞） 胆矾一两 飞丹五钱 制甘石六钱 乳香一钱五分（炙）

【用法】上为细末，入前膏内搅匀候干，贮瓷瓶中应用。

【主治】咽喉七十二种，一切表里等证。

34596 朱翰林白术煎

【方源】《妇人良方》卷二引《明理方》。

【异名】白术煎（《普济方》卷三二七）。

【组成】木香半分（炮） 三棱 莪术 白术各一两 枳壳（去瓢，麸炒黄） 白茯苓 当归 延胡索 人参 熟地黄（洗） 丹皮 粉草各半两

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，温酒吞下常服。汤使于后：胎前浑身并脚手痛，炒姜酒送下；胎前腹内疼，并安胎，紫草煎酒送下；胎前呕逆吐食，糯米饮送下；胎前饮食不得，浑身倦怠，豆淋酒送下；胎前浑身发热，甘草汤送下；胎前咳嗽，煨姜、盐汤送下；胎前头痛，煨葱、茶送下；胎前、产后泻，紫苏、姜、酒送下；催生胎衣不下，嚼葱白三寸，暖酒送下；产后赤白痢，干姜、甘草汤送下；产后下血不止，烧纱帽灰一钱调酒送下，无烧

灰亦可；产后浑身虚肿，陈皮（去白，焙干）浸酒送下；头疼，薄荷茶送下；常服，饭饮送下；赤白带下，烧棕榈灰三钱调酒下；久年血气成块，筑心痛，温酒送下，或炒姜酒送下，及良姜浸酒送下皆可；妇人、室女红脉不通，煎红花苏木酒送下；经脉不调，或前或后，或多或少，煎当归酒送下；大小便秘结，灯心煎汤送下；乳汁不行，苦蕒煮猪蹄羹送下；产后腰疼，煎芍药酒送下。

【主治】妇人胎前、产后血气诸疾。

34597 朱砂金银饰物汤

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】党参6克 当归6克 枣仁9克 柏子仁6克 茯神6克 远志6克 石菖蒲6克 半夏6克 龙齿6克 牡蛎6克 朱砂6克 金银饰物各一件（同煎）

【用法】水煎，日服一剂。

【功用】安神镇惊。

【主治】偶尔受凉，扰及心神。

【临证举例】患者某某，童孩，一日自楼梯处倒仆墙隅。虽无直落地面，饱受惊恐。自是神气痴呆，不言不动，家人初以为偶然。次日视之，一仍前状，早餐已备，意不思食，强饲之则咽。与水亦饮，百计逗其言笑，惟张目呆视而已。其姑始惧，急来就诊。面色皓白，唇舌如常，身无寒热，脉无异征。嘱服用朱砂金银饰物汤3剂。服后，嬉戏如常。

34598 朱砂酸枣仁乳香散

《医方考》。为《苏沈良方》卷二“辰砂散”之异名。见该条。

传

34599 传尸丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【异名】鳗鱼丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】鳗鲡鱼（半斤外者）七条

【用法】甑中先铺薄荷叶四两，入鳗在内，掺干山药粗末斤余，锅内入去心百部一斤，煮三炷香，候鳗烂极去薄荷，取鳗与山药连骨

捣烂，焙，为末，炼蜜为丸。侵晨临卧沸汤各服五钱。

【功用】《医略六书》：补虚劳、杀劳虫，滋津液，生肌肉。

【主治】传尸劳瘵，初起元气未败者。

【方论选录】《医略六书》：传尸劳瘵，日久不痊，必肌肉消瘦，腹内生虫，无药可疗者，力主此方。鳊鱼一味，力能补虚退热，专治虚劳困乏，兼杀诸虫。

34600 传春散

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】梅花蕊 桃花蕊（各取阴干） 经霜丝瓜 朱砂各二钱 甘草一钱

【用法】上为末。每服五分或三分，煎紫苏饮送下。

【主治】痘疮之出未出，陷伏不起，或隐在皮肤之间。

34601 传信散

【方源】《传信适用方》。

【组成】旋覆花头子 白茯苓 橘皮（去瓢） 桑白皮（锉，炒黄色）各三两 犀角屑一两 紫苏茎二两 豉三合 生姜四两（切） 大枣十二枚（去核）

【用法】上除姜、枣外，锉细。都以水八升，煎至三升，搅，去滓，分三服。每服如人行十里。

【主治】毒风腰脚无力肿痛，腹胀心烦，气上冲咽喉，头面浮肿，呕逆。

【方论选录】《传信方集释》：旋覆花头子祛风湿；用紫苏、橘皮下气而治心腹胀满，气冲胸中；用犀角解热，散风毒；用茯苓利小便，使湿有出路；尤妙在用桑白皮止气逆，以消头面浮肿；面腰以上肿，当发汗乃愈，故用豉以取微汗；但又恐下气、破气的药太多，一味蛮攻，致伤元气，所以又加入姜、枣，以和中健胃，保护根本。制方是刚柔相济，无可非议的。

34602 传尸将军丸

【方源】《医编》卷六。

【组成】锦纹大黄（九蒸，晒，焙） 麝香一钱 管仲 牙皂（去皮，醋炙） 桃仁三钱（炒） 槟榔 雷丸 鳖甲（醋炙黄）各一两 茺萸五钱

【用法】上为末，先将藁叶二两，东边桃、柳、李、桑叶各七片，水一碗，煎熟去滓，入蜜一盞，再熬成膏，入前药及安息香捣丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前枣汤送下。

【主治】虚损癆瘵。

34603 传尸神授丸

【方源】方出《百一》卷四，名见《不居集》上集卷十一。

【组成】天灵盖三钱（酥炙黄色，为末） 虎粪内骨一钱（人骨为上，兽骨次之；杀虎，大肠内者亦可用；同青蛇脑小豆许或绿豆许，同酥炙，色转为度，无蛇脑，只醋炙亦得） 鳖甲（极大者，九肋者尤妙；酥炙黄色，为末）一两 安息香半两 桃仁一分（去皮尖，研）

以上为末，绢筛过。

青蒿（取近梢三四寸，细锉）六两 豉三百粒 葱白二十一个（打破） 东引桃、柳、李、桑枝各七茎（如箸头大，各长七寸，细锉） 麝香一钱（别研） 枫叶二十一片（如无亦得，初不曾用） 童子小便半升 槟榔一分（别为细末）

【用法】先将青蒿、桃、柳、李、桑枝、枫叶、葱、豉，以官省升量水三升，煎至半升许，去滓，安息香、天灵盖、虎粪内骨、鳖甲、桃仁与童子小便同煎取汁，去滓，有四五合；将槟榔、麝香同研匀，调作一服。早晨温服，以被盖覆出汗；恐汗内有细虫，以帛子拭之，即焚此帛；相次须泻，必有虫下，如未死，以大火焚之，并弃长流水内。所用药切不得令病人知，日后亦然。十来日后气体复原，再进一服，依前焚弃，至无虫面止。

【主治】传尸劳。

【临证举例】传尸劳 袁州寄居武节郎李应，本相州法司，尝以吏役事韩似天枢密。兵

火后，忽于宜春见之，云从岳侯军得官，今闲居于此。从容问其家事，潸然泪下，曰：应先有儿女三人，长子因议买宅，入空无人所居之室，忽觉心动，背寒凜凜，遂感劳瘵之疾，垂殆传于其次，次，室女也。长子既死，女病寻亟继又传于第三子，证候一同。开元寺前有一人曰：闻宅上苦传尸劳，贫道有一药方奉传。又言：此药以天灵盖、虎粪内骨为主，切须仔细寻觅；青蛇脑如无亦可。敬如其言，治药既成，于病榻之前服药。食顷，脏腑大下，得虫七枚，色如红煨肉而腹白，长约一寸。试以火焚之，以铁火箸刮刺不能入。病顿减，后又服一剂，得小虫四枚，自此遂安。今已十年，肌体悦泽，不复有疾。

休

34604 休症饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 白术(炒) 当归各三四钱 何首乌(制)五钱 炙甘草八分

【用法】水一钟半，煎七分，食远服，滓再煎；或用阴阳水各一钟，煎一钟，滓亦如之，俱露一宿，次早温服一钟，饭后食远再服一钟。如气血多滞者，或用酒、水各一钟煎服；或服药后饮酒数杯亦可。

【功用】止疟。

【主治】疟疾。

【加减】如阳虚多寒，宜温中散寒者，加干姜、肉桂之类，甚者或加制附子；如阴虚多热，烦渴喜冷，宜滋阴清火者，加麦冬、生地、芍药；甚者加知母，或加黄芩；如肾阴不足，水不制火，虚烦虚痿，腰痠脚软，或脾虚痞闷者，加熟地、枸杞、山药、杜仲之类，以滋脾肾之真阴；如邪有未尽而留连难愈者，于此方加柴胡、麻黄、细辛、紫苏之属，自无不可。

伏

34605 伏水散

《外科十三方考》。为原书“枳马二仙丹”之异名。见该条。

34606 伏龙汤

【方源】《医方类聚》卷二一六引《仙传济阴方》。

【组成】杏仁七个 诃子五个 陈皮 枳壳各三钱 阿胶七片 麻黄二钱 青黛一钱

【用法】上为末，紫苏汤调服。食后再用调经散。

【功用】安胎，调胃气。

【主治】妇人妊娠，肺脏受风寒，咳嗽痰涎，喘不安；及寒嗽传脾，吐痰涎，治疗之迟，成血块血劳，经血不通，失音。

34607 伏龙浆

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】伏龙肝(即灶心红土)三钱

【用法】上为末。水澄清，去滓，冷酒调服。

【主治】暴热心痛。

34608 伏龙散

《博济》卷四。为《普济方》卷三三一引《圣惠》“伏龙肝散”之异名。见该条。

34609 伏龙散

《外科大成》卷三。为方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一〇一“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34610 伏龙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】伏龙肝(即灶心红土；炭火烧红，水飞，晒干)

【用法】上为末。人乳调敷。

【主治】烫火疮。

34611 伏龙散

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】伏龙肝三钱 炒黄柏三钱 上冰片二分

【用法】上为末。用鸡子清调搽。

【主治】鬼火丹。先面上赤肿，后渐渐由头而下，至身亦赤肿，是手足阳明经内风热。

34612 伏虎丹

【方源】《局方》卷一《续添诸局经验秘

方)。

【组成】生干地黄 蔓荆子(去白) 白僵蚕(炒去丝)各一分 五灵脂(去皮)半两 踯躅花(炒) 天南星 白胶香 草乌头(炮)各一两

【用法】上为细末。酒煮半夏末糊为丸，如龙眼大。每一丸分作四服，酒送下，一日二次。

【主治】左瘫右痪。

【临证举例】风疾 昔建康府乌衣巷，有一老人姓钟，平生好道，朝夕瞻仰茅山，缘多酒，偶患风疾，百治无效。一日忽有一道人至，言其困酒太过，教服此药，道人遂不见，服之果验。

34613 伏虎散

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】黄耆三两 当归二两 生地黄二两 麦门冬二两 地榆一两 三七一两 防风五钱

【用法】分四剂服。

【功用】补气血，解风热之毒。

【主治】虎咬伤。

【备考】虎为阳中之阴，其毒浅面耗血多，故治此主补血，加以去热祛风。虎伤牙孔深，或二或四，去血必多，虎口挟风挟热，人必大渴，不可饮水。若牙孔变黑，急塞以生猪脂，掘粪土中蛭蟥捣塞尤妙。其处每随塞随化，更敷地榆末，则血可止，内服本方。

34614 伏铁饮

【方源】《医方类聚》卷一二三引《吴氏集验方》。

【组成】常山一两 生铁二两

【用法】用酒二碗，煎取一碗，去铁，用常山，又以甘草二寸，枣子七个，同煎取一盞，去滓，放一夜，来日早晨吃。

【主治】瘰疬。

34615 伏疽散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】生南星五钱 土贝二钱 朴消一

两 块石灰一两 冰片五钱

【用法】上药各为末。用盐卤调杵，涂患处。

【主治】一切皮色不易，坚硬漫肿，白疽。

34616 伏梁丸

【方源】《普济方》卷一七〇引《指南方》。

【组成】青皮(白马尿浸三日，令软透，切)三两 巴豆十五个(去皮，与青皮同炒干，去巴豆不用) 羌活半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，米饮送下。未知，加至二十丸。

【主治】伏梁，脉大而散，时一结。

34617 伏梁丸

【方源】《外科精义》卷下引《养生必用》。

【组成】厚朴(生姜汁制) 茯苓 枳壳(麸炒，去瓢) 白术 荆三棱(炮) 半夏(汤洗七次) 人参各一两

【主治】①《外科精义》引《养生必用》：环脐肿痛，肠胃疮疽。②《三因》：心之积，起于脐下，上至心，大如臂，久久不已，病烦心，身体髀股皆肿，环脐而痛，其脉沉而芤。

【备考】《三因》本方用法：上为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，一日二次；或作散，酒调服。

34618 伏梁丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】黄连(去须)一两半 厚朴(去皮、姜制)半两 人参(去芦)五钱 黄芩(刮黄色)三钱 桂(去皮)一钱 干姜(炮)半钱 巴豆霜五分 川乌头(炮制，去皮)半钱 红豆三分 菖蒲半钱 茯神(去皮木)一钱 丹参(炒)一钱

【用法】上药除巴豆霜外，为细末，另研巴豆霜旋旋入末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二丸，每日加一丸，二日加二丸，渐加至大便溏，再从两丸加服，食远淡黄连汤送下，周而复始。积减大半勿服。

【主治】心之积，起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令之烦心。

【加减】秋、冬加厚朴半两，通前称一两；

减黄连半两，即一两；黄芩全不用。

34619 伏梁丸

【方源】《清代名医医案精华·赵海仙医案》。

【组成】洋参 于术 枳壳 制半夏

【用法】醋泛为丸服。

【主治】心之积在脐上，大如臂，上至心下。

34620 伏暑汤

【方源】《医统》卷七十二引《集成》。

【组成】人参 白术 赤茯苓 香薷 泽泻 猪苓 莲肉（去心） 麦门冬（去心）各等分

【用法】上吹咀。每服半两，水煎服。

【主治】心经伏暑，小便赤浊。

34621 伏翼丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《医部全录》卷二九〇。

【组成】蜘蛛五枚（大者，去脚，研如膏）蛇蛻皮一条（全者，烧灰） 蝙蝠一枚（炙令微焦） 麝香半两（细研） 鳖甲一枚（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】上为末，入研了药令匀。以蜘蛛膏入炼蜜为丸，如麻子大。每服空心以温酒送下五丸，小儿以茶送下二丸。

【主治】疟久不愈。

34622 伏翼散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】伏翼（烧为灰）

【用法】上为细末。每服半钱，以粥饮调下，一日四至五次。若炙令香熟，嚼之哺儿亦效。

【主治】小儿生十余月后，母又有娠，令儿精神不爽，身体萎痺，名为鬼病。

34623 伏牛花丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】伏牛花五两 女娄三两 细辛（去苗叶） 卷柏 威灵仙（去土）各一两 附子（炮裂，去皮脐） 羖羊角（镑，炒） 木虻（炒焦，去翅足） 硃砂（醇酒研令稀）各一两

【用法】上九味，先捣罗八味为细末，煮硃

砂酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，于平旦时及初更后各用温酒送下，稍增至三十丸。以知为度。

【主治】虚劳脱营，痿蹙为挛。

34624 伏牛花散

【方源】《本草纲目》卷三十六引《护命》。

【组成】伏牛花 山茵陈 桑寄生 白牵牛 川芎劳 白僵蚕 蝎梢各二钱 荆芥穗四钱

【用法】上为末。每服二钱，水煎一沸，连滓服。

【主治】男女一切头风，发作有时，甚则大腑热秘。

34625 伏龙肝丸

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】伏龙肝一分 朱砂一分 麝香半分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。候啼，即以温水调一丸与服。必效。

【主治】小儿惊啼，为夜啼不止。

34626 伏龙肝丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】伏龙肝半两 豉一两半

【用法】同炒，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。

【主治】暴嗽。

34627 伏龙肝丸

《圣济总录》卷七十五。为《圣惠》卷五十九“艾叶丸”之异名。见该条。

34628 伏龙肝丸

《普济方》卷三六一。为《圣济总录》卷一七〇“真珠丸”之异名。见该条。

34629 伏龙肝汤

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一〇一。

【异名】伏龙肝散（《普济方》卷二五四）、伏龙肝饮（《济阳纲目》卷六十）、伏龙散（《外科大成》卷三）。

【组成】釜下土五升。

【用法】上药治下筛。以冷水八升和之，取

汁尽服之。口已噤者，强开以竹筒灌之，使得下入便愈。

【主治】中风，中恶，中蛊毒，衄血，血崩。

①《肘后方》：中风，心烦恍惚，腹中痛满，或时绝而复苏者。②《千金》：中毒，蛊毒。③《圣惠》：风痺，卒不能语，手足不能自收。④《济阳纲目》：衄血。⑤《外科大成》：血崩。

34630 伏龙肝汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】伏龙肝五合 甘草二两(炙) 干姜二两 黄柏五两 黄芩二两 牛膝根二两 樗二两(炙) 烧头发屑二合 阿胶二两

【用法】上切。以水七升，煮取三升，去滓，下阿胶更煎，取胶烊，下发屑，分三服。

【主治】下焦虚寒损，或先见血后便转，此为近血，或利不利。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

34631 伏龙肝汤

【方源】《千金》卷四。

【异名】伏龙肝散(《普济方》卷三三〇)。

【组成】伏龙肝(如弹丸)七枚 生地黄四升(一方五两) 生姜五两 甘草 艾叶 赤石脂 桂心各二两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】崩中，去赤白，或如豆汁。

【方论选录】《千金方衍义》：此以伏龙肝、赤石脂固脱，而兼桂、艾温经，地黄滋血，甘草、生姜开提胃气，以和寒热之性也。

34632 伏龙肝汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷七十。

【异名】伏龙肝散(《鸡峰》卷十)。

【组成】伏龙肝 细辛(去苗叶)各半两 芎藭一分 桂(去粗皮) 白芷 干姜(炮) 芍药 甘草(炙，锉) 吴茱萸(汤浸一宿，与大豆同炒，去豆)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，酒一盏，

煎至七分，入生地黄汁一合，更煎一二沸，去滓温服，一日三次。

【主治】鼻衄。

34633 伏龙肝汤

【方源】方出《千金》卷十二，名见《千金翼》卷十八。

【异名】伏龙肝散(《大全良方》卷七)。

【组成】伏龙肝(如鸡子)一枚 生竹茹一升 芍药 当归 黄芩 芎藭 甘草各二两 生地黄一斤

【用法】上咬咀。以水一斗三升，先煮竹茹，减三升，下药，取三升，分三服。

【主治】五脏热结，吐血、衄血。

【备考】《千金翼》有桂心。

34634 伏龙肝汤

【方源】《千金》卷二十。

【异名】伏龙肝散(《圣惠》卷四十七)。

【组成】伏龙肝五合(末) 干地黄五两(一方用黄柏) 阿胶三两 发灰二合 甘草 干姜 黄芩 地榆 牛膝各三两(一作牛蒡根)

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升，去滓下胶煮消，下发灰，分为三服。

【主治】下焦虚寒损，或先见血后便转，此为近血，或利不利。

【宜忌】《普济方》：忌海藻、菘菜、茺莢。

【方论选录】《千金方衍义》：黄土汤于中除术、附，加干姜、牛膝、地榆、发灰以散血中之滞；缘其人荣血既伤，下焦虽有虚寒，但需干姜之温散，不胜术附之燥烈也。可见治血但取归经，不必究其先后远近耳。

【备考】《外台》引《崔氏方》有生糯米，无地榆。

34635 伏龙肝汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】伏龙肝半升 干地黄 干姜 牛膝各二两 阿胶(炙) 甘草(炙)各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，去滓，纳胶，分三服。

【主治】吐血，衄血。

34636 伏龙肝汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】伏龙肝（净拣，筛）二两 甘草（炙）一两 干姜（炮裂）生干地黄（焙）各二两半 黄芩（去黑心）一两半 牛膝（酒浸，切，焙干）一两 乱发（烧灰）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，生姜一分（拍碎），水一盞，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】霍乱下焦虚寒，或先血后便，此为远血成利。

34637 伏龙肝汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】伏龙肝 禹余粮（烧通赤，湿土内培一复时） 赤芍药 生干地黄（焙） 地榆 白茅根各一两 龙骨 当归（切，焙）各一两半 甘草（炙） 麒麟竭（细研）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、食前温服，一日二次。

【主治】妇人经血不止，脐腹撮痛，或时烦渴。

34638 伏龙肝汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】伏龙肝 桑寄生 续断 芎藭各一两 龙骨三分 当归（切，焙） 阿胶（炙燥）各一两 干姜（炮） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，大枣二枚（擘破）。同煎至八分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠胎动不安，腹内疼痛，下血不止。

34639 伏龙肝汤

《三因》卷九。为《金匱》卷中“黄土汤”之异名。见该条。

34640 伏龙肝饮

【方源】《普济方》卷二一五引《十便良

方》。

【组成】甘草 川芎 伏龙肝 黄芩各一两 赤芍药一两

【用法】上为粗末。用水一升，药半两，煎至七分，去滓，分作三服，温服之。

【主治】血淋。

34641 伏龙肝饮

《济阳纲目》卷六十。为方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一〇一“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34642 伏龙肝饮

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】伏龙肝一两（即灶心土，紫色者佳）

【用法】用滚水浸之，俟澄清，另用一碗将清者倾在此碗，少加白糖，趁温饮之。

【主治】伤寒呕逆。

【方论选录】此药善能谓和胃气，即不伤寒呕逆者，亦宜以此法治之。

34643 伏龙肝散

《鸡峰》卷十。为方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷七十“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34644 伏龙肝散

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷二五四。

【组成】伏龙肝

【用法】上为末。吹鼻中。

【主治】鬼魔不寤。

34645 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】伏龙肝一两 生干地黄一两 柏叶一两 茜根一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 黄芩一两 黄连一两（去须） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒吐血，心烦不食。

34646 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】伏龙肝二两 生干地黄二两 鹿角胶二两（捣碎，炒令黄燥） 芎藭 当归 桂心 白芍药 白芷 麦门冬（去心，焙） 细辛 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳吐血，心烦头闷。

【备考】方中阿胶，《普济方》作鹿角胶。

34647 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】伏龙肝三两 当归二两 赤芍药二两 黄芩二两 犀角屑一两 生干地黄三两 刺藭一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入青竹茹一鸡子大，煎至五分，去滓，温温服之。

【主治】五脏热结，鼻衄，心胸烦闷。

34648 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】伏龙肝二两 生干地黄二两 芎藭半两 赤芍药半两 当归半两 桂心半两 白芷半两 细辛三分 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入竹茹一鸡子大，煎至五分，去滓放温，频服。

【主治】吐血，心胸气逆，疼痛。

34649 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】伏龙肝一两 桂心一两 当归一两 赤芍药一两 白芷一两 芎藭一两 甘草一两（炙微赤，锉） 细辛半两 生干地黄四两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥，别研为末）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓放温，入阿胶末一钱，搅匀，每于食后服之。

【主治】呕血不止，胸膈烦痛。

34650 伏龙肝散

《圣惠》卷四十七。为《千金》卷二十“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34651 伏龙肝散

【方源】方出《圣惠》卷七十，名见《普济方》卷三一九。

【组成】生地黄汁六合 刺藭汁六合 生麦门冬汁六合 伏龙肝（末）

【用法】上件药，暖三味汁，调下伏龙肝末一钱。

【主治】妇人鼻衄。

34652 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】伏龙肝一两 赤石脂一两 龙骨一两 牡蛎一两（烧为粉） 乌贼鱼骨一两（烧灰） 禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 桂心一两 白术一两 黄牛角觔一两（烧灰）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人漏下，或愈或剧，身体羸瘦，饮食减少，四肢无力。

34653 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】伏龙肝一两（细研） 麒麟竭半两 棕榈二两（烧灰） 地榆一两（锉） 龙骨一两 当归一两（锉，微炒） 白芍药一两 熟干地黄一两 禹余粮二两（烧，醋淬七遍）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人崩中，下血不止，腹脐撮痛，或时心烦。

34654 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】伏龙肝一两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤石脂一两 芎藭三分 桂心半两 当归三分（锉，微炒） 熟干地黄二两 艾叶二两（微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 干姜三分（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，

加大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：妇人崩中下五色，或赤白不定，或如豆汁，久不止，令人黄瘦，口干虚烦不食。②《普济方》：气血劳伤，冲任脉虚，经血不时，脐腹冷痛，四肢无力，虚烦惊悸。

34655 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】伏龙肝一两 当归一两（锉，微炒） 龙骨三分 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 蒲黄三分 艾叶半两（微炒） 熟干地黄一两 牛角觔半两（炙黄焦） 芎藭半两

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】妊娠胎动，腹痛，下血不止。

34656 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】黄土酒（《圣济总录》卷一六一）。

【组成】伏龙肝一两半 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以酒调下，不拘时候。

【主治】产后中风，口噤不能语，腰背着床不得。

34657 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷三三一引《圣惠》。

【异名】伏龙散（《博济》卷四）。

【组成】棕榈不以多少（烧灰，火燃急以盆盖，阴令火住） 伏龙肝（于锅灶直下去取赤土，炒令烟尽） 屋梁上尘（悬长者，如无，以灶头虚空中者，炒令烟尽，于净地出大毒）各等分

【用法】上为末，碾和令停，入龙脑、麝香各少许。每服二钱，温酒调下；淡醋汤亦可。患十年者，半月可安。

【主治】妇人赤白带下，久患不愈，肌瘦黄瘁，多困乏力。

【方论选录】《济阴纲目》：火土之性而生

燥，燥则足以培土；梁上尘得土气之飞扬而上升，升则土气不陷而湿不生；棕榈为止湿之用；脑、麝少入，取其能散。然于久病羸悴之人，恐非补剂不可。

【临证举例】崩漏 一亲戚妇人年四十五，经年病崩漏不止，面黄肌瘦，发黄枯槁，语言无力，服诸药不效。延仆诊之，六脉微和。问服何药，当归、川芎涩血诸品、丹药，服之皆不效。仆遂合博济方伏龙肝散，兼白矾丸服之，愈。

34658 伏龙肝散

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】伏龙肝

【用法】上为末。水调涂脐下，干时易之，疾愈乃止。

【主治】妊娠时气，令子不落。

34659 伏龙肝散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】伏龙肝半两 白矾（煨过） 白僵蚕（直者，炒） 甘草（生）各一分

【用法】上为散。每服一钱匕，如茶点服。吐出涎立效。未吐更进一服。

【主治】喉痹。

34660 伏龙肝散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】伏龙肝 蒲黄（炒，研）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。以下为度。

【主治】胞衣不出。

34661 伏龙肝散

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】芎藭一两 生地黄一分 阿胶八钱（炙） 当归一两 续断一分 地榆 刺蓢根一两 伏龙肝七钱 青竹茹八钱

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，温服，一日五次，不拘时候。后服补药。

【主治】妇人血崩不止，或结作片者。

34662 伏龙肝散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】伏龙肝不拘多少

【用法】上为末。以鸡子白和敷之，一日三次。

【主治】少小诸种丹毒。

34663 伏龙肝散

《三因》卷十八。为《圣惠》卷七十三“禹余粮散”之异名。见该条。

34664 伏龙肝散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】鲫鱼一枚（如大者，腹下开少许，去肠，不去鳞用） 头发（约实）一弹子大 伏龙肝一钱 巴豆一枚（去壳）

【用法】上将头发等三味入在鱼腹中，用甘草一寸塞鱼口内，盛在瓦器中固济，炭火烧红，无烟取出，研细。油调涂之。

【主治】小儿头疮不愈者。

34665 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷三三四引《十便良方》。

【组成】附子 续断 人参 干姜 桂心 甘草各一两 伏龙肝 赤石脂 生干地黄各二两

【用法】上为散，都研令匀。每服四钱，以水一盞，煎取六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妇人月水不断，胞内积有虚冷，或多或少，乍赤乍白。

34666 伏龙肝散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】伏龙肝一两 鳖头骨五钱 百药煎二钱半

【用法】上药焙，研为末。每用二钱至三钱，浓煎紫苏汤，候温和清油调涂患处。并如前法浴洗拭干方上药。

【主治】阴证脱肛。

【备考】方中百药煎，《幼科指掌》作“白芍药”。

34667 伏龙肝散

《妇人良方》卷七。为方出《千金》卷十二，名见《千金翼》卷十八“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34668 伏龙肝散

《脉因证治》。为《金匱》卷中“黄土汤”之异名。见该条。

34669 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷一八八。

【组成】多年堊壁土 地炉中土 伏龙肝各等分

【用法】每服一块如拳大，水二碗，煎一碗，澄清服。白粥补之。

【主治】吐血，泻血，心腹痛。

34670 伏龙肝散

《普济方》卷一八八。为方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷七十“通神散”之异名。见该条。

34671 伏龙肝散

《普济方》卷一九〇。为方出《圣惠》卷六，名见《普济方》卷一八九“明胶散”之异名。见该条。

34672 伏龙肝散

《普济方》卷二五四。为方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一〇一“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34673 伏龙肝散

《普济方》卷三三〇。为《千金》卷四“伏龙肝汤”之异名。见该条。

34674 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】伏龙肝五升 人参一两 麝香二两 生姜四两

【用法】上切。以水一大斗煮土，取二升，下药，煎取一升半；更别研伏龙肝一鸡子许，并麝香纳汤中，搅令匀，分服。

【主治】崩中下血数升，气欲绝。

34675 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】伏龙肝 石燕各等分

【用法】上为细末，研令极细。每服二钱，煎当归汤调下。加鸡子清一个尤妙。

【功用】催生，下死胎。

34676 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】伏龙肝 交道中土各一把

【用法】上药治下筛。水和少许，饮之。

【主治】小儿夜啼不止。

34677 伏龙肝散

【方源】《普济方》卷四〇一。

【组成】伏龙肝 朱砂 山药 麝香

【用法】上为末。薄荷汤调服。或炼蜜为丸，如绿豆大，灯心汤送下。

【主治】客忤惊啼不止。

34678 伏龙肝散

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】伏龙肝（即灶心红土） 百草霜（即锅底灰） 白芷各等分

【用法】上为细末。每服二钱，酒、童便各半调服。不下再服。

【主治】产妇横逆，子死腹中。

34679 伏龙肝散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】灶心黄土二两（研） 鸡子一枚

【用法】和水少许，调匀。涂五心及顶门。

【主治】客忤，惊啼壮热。

34680 伏龙肝散

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】灶心黄土一钱 雄黄五分 麝少许

【用法】上为末，枣肉为丸，捏作饼子，如钱样，四围出凹二分，安在囟门上，取艾作小炷，灸三壮。

【主治】客忤白虎证。

34681 伏龙肝散

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】赤伏龙肝

【用法】上为细末。每服三五钱，温酒调下。泻出恶物立止。

【主治】产后恶物不出，上攻心痛。

34682 伏龙肝散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】伏龙肝末三钱 炒黄柏三钱

【用法】上为末。鸡子清调搽。

【主治】鬼火丹。

34683 伏龙肝散

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】伏龙肝

【用法】上为末。和井底泥调，敷脐上。

【功用】保胎。

34684 伏龙肝散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】伏龙肝 赤石脂 余粮 当归 熟地 川断 附子 艾炭 侧柏叶

【主治】崩中。因气血劳伤，冲任脉虚，脐腹疼痛，遂成五色杂下之候者。

34685 伏龙肝膏

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《医方类聚》卷八十五引《济生续方》。

【组成】生地黄汁半升 刺蓟汁半升 白蜜三合 麦门冬汁半升 伏龙肝二两（细研如粉）

【用法】上件药，相和，以慢火熬如稀饧。不拘时候，含半匙咽津。

【主治】吐血口鼻俱出，至一斗不止。

34686 伏龙肝膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】伏龙肝一两（细研） 楮木白汁一合 猪脂二两 小蒜半两（去皮，细研）

【用法】上药和调令匀。取涂摩疮上，一日三五次。

【主治】痼疮。

34687 伏龙肝膏

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】伏龙肝（研）二两 鸡子（去壳）一枚 地龙粪（研）一两

【用法】上药相和研匀，或干，更入少水，调如膏。先用桃柳汤浴儿，后将药涂儿五心及顶门上。

【主治】小儿卒中客忤，惊啼大叫。

34688 伏翼粪丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】伏翼粪四两（微炒） 斑蝥三分（去头足翅，以糯米拌炒令米黄） 皂荚子一

两(炒黄)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心以皂荚白皮(涂醋炙微黄)捣末煎汤送下。服至三丸，病根并于小便中出。

【主治】一切痿疮。

34689 伏火二气丹

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)。

【组成】硫黄四两 黑锡 水银 丁香(不见火) 干姜各半两

【用法】上先熔黑锡，后下水银，结砂子，与硫黄一处，再研成黑灰色，次入余药研匀，用生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食前、空心浓煎生姜汤送下。

【功用】济心肾交养，大补诸虚。

【主治】真元虚损，精髓耗伤，肾气不足，面黑耳焦，下虚上盛，头目眩晕，心腹刺痛，翻胃吐逆，虚劳盗汗，水气喘满，全不入食；妇人血气久冷，崩中漏下，癥瘕块癖。

34690 伏火太阳丹

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】硫黄十两 丹砂五两

【用法】上为极细末，飞过，针砂二十五两淘净，都入三斗铁锅内，用水常及七分以来，煮七复时，汤耗旋添热汤，频以连皮东南柳条子搅转。如药着条子上，逐旋以桑白皮刮下，却入锅中。候日数足，取少许于火上烧，无鬼焰为度；若有鬼焰即更煮，直候无鬼焰住火，再用水飞；澄去针砂不用。将丹砂、硫黄锅内慢火涖尽水脉，团成块，安生铁锅中，用炭一称以上围簇煨成汁，候火尽停冷，取药，以纸五七重裹，掘地坑埋一宿，取出细研；用灯心煮枣，剥取肉为丸，如梧桐子大。每服二丸至三丸，空心温水或温酒送下。

【主治】一切冷气。

34691 伏火四神丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】辰砂 雄黄 雌黄 硫黄各二两

【用法】上四物槌碎，用楮皮大纸一张有体

骨者，两面浓研好松烟墨涂三两遍，令黑光色，晒干，号曰昆仑纸，用裹前药；干净室中掘地坑子一枚，深四寸许，阔狭上下四面皆比药角宽二寸以来；用新瓦细末(新瓦不经雨者，相摩取细末)置坑子中，约二寸许，安药角在内，又盖瓦末二寸许，比地面微高，如龟背状；用炭七八斤在炉面上煨之，徐徐添炭，约用百斤，不令减火，候药声作，渐次减炭，直候药声断，光芒归体，方始住火，取出余炭；用新黄土一大担覆两伏时，取出药角，剥去纸；用棕刷子盆中净水洗刷令净霜雾，三夜早晚不令见日，为极细末、糯米糊丸，如小鸡头子大，风干。每服一二丸或三丸，温酒送下。

【主治】阳虚阴盛，一切痼冷，脏腑滑泻。

【宜忌】忌羊肉，葵菜并茶一日。

34692 伏火雄黄丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】雄黄 锦纹大黄 不蛀皂角各等分

【用法】上以坩锅子一个，揩令干净，入雄黄末，实捺约五分已来，然后入大黄、皂角末，盖头亦捺令实，于文武火中安放坩锅子上，用瓦子一片盖，微歇口一分已来；候烟色渐青，雄黄成汁，急取出倾入厚埧器中放冷，研为细末，以生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心米饮送下。

【主治】心腹痼冷百疾。

34693 伏龙肝汤丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】炮黑楂肉一两 熬枯黑糖二两

【用法】上二味，一半为丸，一半为末。用伏龙肝二两煎汤代水，煎末二钱，送前丸二钱。日三夜二服，一昼夜令尽。

【主治】胎前下痢，产后不止，及元气大虚，瘀积小腹结痛，不胜攻击者。

【加减】气虚，加人参二三钱，以驾馭之；虚热，加炮姜、肉桂、茯苓、甘草；兼感风寒，加葱白、香豉；膈气不舒，磨沉香汁数

匙调服。

34694 伏火四神玉粉丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】白金丹。

【组成】握雪礞石 寒水石 阳起石各二两 砒霜一分

【用法】上药各为末。先取一通油瓶子，以六一泥固济，可厚三分以来，待干；乃先下矾石充底，次下砒霜，次下阳起石，上以寒水石盖之，其瓶子口，磨一砖子盖之，以六一泥固缝，于灰池内坐一砖子，安药瓶子，初以文火，后渐渐令通赤，住火候冷，取出研令极细。于润地铺熟绢，上摊药，可厚半寸，以盆合定，周遭用湿土拥盆，不令透气，一伏时取出，却少时，出阴气了，细研，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，空心以盐汤送下；如患疟痢，以新汲水送下。

【功用】补益下元。

【主治】一切冷疾，诸疟痢。

34695 伏火玄石柜灵砂丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】朱砂三两（细研，纸裹） 磁石一斤半（捣碎，细研，淘去赤汁尽）

【用法】上以石脑油十二两，拌磁石令泣泣相入。先固碎一瓷瓶子令干，入磁石一半于瓶子内，筑令实，中心制作一坑子，可容得朱砂用纸裹了入柜子止，以余药盖之，筑令实，瓶口以瓦子盖，勿固之；以小火逼阴气尽，候瓶子通热，即聚火一称已来，断之，令上下通赤，任火自消，待冷开取，砂已伏矣；去纸灰，取砂细研如面，以生姜汁稀调之，安子茶碗中，饭上蒸三炊久，晒干，研如粉，以枣肉为丸，如小豆大。每服三丸，空心以温酒送下。

【功用】补益筋骨，驻颜色，暖子宫，延年。

【主治】女入风冷。

【宜忌】忌羊血。

34696 伏火水银硫黄紫粉丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硫黄六两 水银二两半 针砂二两（淘洗令净） 太阴玄精二两（研入）

【用法】上药先细研硫黄，次下水银，点少热水，研如泥，候水银星断，即入鼎中，并玄精、针砂，以水煮七日七夜，常如鱼目沸，水耗，即以暖水添之，时时以铁匙搅，七日满，即泣干，仍以微火焙阴气尽，即入盒子中，固之泥，法用：砂盆末、白垩土、盐花，捣为泥，固济干了，入灰池内，埋盒子，两边以五两火养六十日，日夜长令不绝；日满，以大火十斤断一日，任火自消，冷了，以甘草汤浸一日，出火毒，已鲜紫色，候干，细研为末，以粳米饭为丸，如黍米大。每服七丸，空心以温酒送下；渐加至十丸。经旬日见效。

【主治】一切冷气，反胃吐食，冷热血气，冷劳伤风。一切冷病。

伐

34697 伐木丸

【方源】《本草纲目》卷十一引《张三丰仙传方》。

【异名】阴鹭丸（《医学入门》卷七引周益公方）、三丰伐木丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】苍术二斤（米泔水浸二宿，同黄酒面曲四两炒赤色） 皂矾一斤（醋拌晒干，入瓶，火煨）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，好酒、米汤任下，一日二三次。

【功用】助土益元。

【主治】①《本草纲目》引《张三丰仙传方》：脾土衰弱，肝本气盛，木来克土，病心腹中满，或黄肿如土色。②《医学入门》引周益公方：黄肿，水肿腹胀，溏泻。

34698 伐木汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】炒栀子三钱 白芍一两 当归五钱 甘菊花五钱 女贞子五钱 地骨皮三钱

丹皮三钱 青黛三钱 金钗石斛三钱

【用法】水煎服。

【功用】平肝泻火。

【主治】痿症。大怒之后，两胁胀满，肋间两旁时作痛，遂至饮食不思，口渴索饮，久则两腿痠痛，或痛在两臂之间，或痛在十指之节，痛来时可卧而不可行，足软筋麻，不可行动。

34699 伐毛丹

【方源】《串雅内编》卷四。

【组成】乳香（灯草拌炒） 硃砂各一两

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、临卧滚水送下。自然退落。

【主治】鼻毛粗长异常，痛不可忍。

34700 伐邪汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】石膏 人参各三钱 半夏 柴胡各二钱 麦冬五钱 茯苓一两 甘草 厚朴 枳壳各一钱

【用法】水煎服。

【主治】疟疾发热，头痛鼻干、渴欲饮水，日胸胸不得眠，甚则烦躁，畏火光，厌听人声喧嘩。

34701 伐阴汤

【方源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】缩砂一分 桂一分 生姜半两 甘草三钱

【用法】上咬咀，作一服。水二盏，煎一盏服。

【主治】解菌草毒。

34702 伐铁散

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】川芎 香白芷 当归各半两 虻青一钱（去头足） 乳香 没药各半两（令乳细）

【用法】上为细末。每服一捻，点淡茶清少许，掺药在茶上服之。其痛即止。一服进一钱。

【主治】妇人脐腹疼痛，诸药不效，名曰经痛。

34703 伐肝补脾汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】黄连一钱二分 芍药 柴胡各一钱 青皮八分 白术一钱半 人参八分 白茯苓一钱 甘草（炙）五分

【用法】水煎，食前服。

【主治】脾胃气弱，木乘土位而口酸者。

仲

34704 仲吕丸

【方源】《家塾方》。

【异名】如神丸。

【组成】大黄六两 甘遂 牵牛子各三两

【用法】上为末，糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，白汤送下。

【主治】水毒，大小便不通者。

34705 仲景百劳丸

《慎柔五书》卷四。为陈大夫引张仲景方（见《医学纲目》卷五）“百劳丸”之异名，见该条。

任

34706 任督两滋汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术一两 人参五钱 肉桂一钱 茯苓三钱 白果十个 黑豆一大把 杜仲五钱 巴戟天五钱

【用法】水煎服。

【功用】摄精受孕。

【主治】妇人无子。腰痠背楚，胸中胀闷，腹内生瘕，日日思寝，朝朝欲卧，百计求子，不能如愿。

伤

34707 伤丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】淮牛膝一两 参三七三钱 当归一两 落得打一两 杜仲一两 骨碎补一两

血竭五钱 山羊血二钱 自然铜二钱 儿茶三钱 甜瓜子二两 厚朴三钱 乳香三钱 木瓜五钱 肉桂三钱 川断一两 红花五钱 朱砂三钱 原寸香六分

【用法】上为末，稀粥糊为丸，如弹子大，朱砂为衣。每服一丸，陈酒送下。

【主治】跌打损伤。

34708 伤膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】野三七 细生地各一两 钻地风五钱 肉桂一钱 独活五钱 郁金五钱 千年健五钱 牛膝五钱 木香三钱 秦艽三钱 虎骨五钱 姜黄二钱 金毛脊三钱 透骨草一两 红花四钱 丁香二钱 地骨皮一两 自然铜五钱 刘寄奴五钱 延胡五钱 当归一两 川乌五钱 桃仁三钱 桑白皮一两 五加皮一两 寻骨风五钱 松节五钱 草乌五钱 桔梗三钱 乳香二钱 没药二钱 砂仁三钱

【用法】用麻油五斤，净丹二斤，诸药末浸至半月而煎，去滓，如法成膏。摊大膏药用。

【主治】一切筋骨疼痛，损伤腰脊，及远年内伤，寒热痹阻。

34709 伤中汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】生地黄半斤(切) 桑根白皮三升(切) 生姜五累 白胶五挺 麻子仁 芎藭各一升 紫菀三两 麦种 饴糖各一升 桂心二尺 人参 甘草(炙)各一两

【用法】上咬咀。以水二斗，煮桑根白皮，取七升，去滓；纳药煮取五升，澄去滓；纳饴糖，煎取三升，分为三服。

【主治】伤中，肺气不足，胁下痛，上气，咳唾脓血，不欲食，恶风，目视眈眈，足胫肿。

34710 伤中汤

【方源】《医学从众录》卷一引李士材。

【组成】白术 当归 茯苓 陈皮 甘草 芍药 香附 菖蒲 生姜各等分 红枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】思虑伤脾，腹痛食不化。

34711 伤心汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】茯神 黄芩 远志 干地黄各三两 甘草 阿胶 糖各一两 半夏 附子 桂心 生姜各二两 石膏 麦门冬各四两大枣三十枚

【用法】上咬咀。以水一斗，取煮三升，去滓，纳糖、阿胶更煎，取二升二合，分三服。

【主治】心气不足，腹背相引痛，不能俛仰。

【方论选录】《千金方衍义》：地黄、阿胶滋培阴血，桂心、附子、茯神、远志开通经窍，黄芩、石膏、麦门冬清理肌表旺气，半夏、姜、枣涤除隔上顽痰，甘草、饴糖和脾缓急，以和腹背相引之痛。

34712 伤油膏

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】血竭二两 红花二钱 乳香二钱 没药二钱 儿茶二钱 琥珀一钱 冰片二钱(后入)香油三斤

【用法】上为细末，后入冰片再研，将其溶化于炼过的油内，再入黄蜡收膏。以指蘸药，在患处揉擦。

【功用】止痛，活血，消肿。

34713 伤药方

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】当归四两 方八七两 三七四两 灵脂 党参 辰砂 乳香各二两 草乌 僵蚕各一两五钱 地龙七两 甲片四两 白胶香二两

【用法】将地龙和酒打为丸服。

【主治】跌打损伤。

34714 伤药膏

【方源】《中医伤科学》。

【组成】乳香 10 份 没药 10 份 血竭 10 份 羌活 10 份 独活 10 份 续断 10 份 甲珠 10 份 香附 10 份 木瓜 10 份 川芎

10份 自然铜10份 川乌6份 草乌6份
南星6份 荆芥皮8份 白芷8份 泽兰8份
小茴8份 上桂8份 麝香1份

【用法】上为细末。蜜或水、酒各半调敷。

【功用】活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】各类骨折，脱位，伤筋。

34715 伤寒汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】桂枝一钱 甘草一钱 陈皮一钱
干葛一钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒初起，鼻塞目痛，项强头痛，脉浮紧。

34716 伤煎散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】地骨皮 黄耆 白芍 黄芩 白术 茯苓 人参 当归 肉桂 甘草 防己各一两 防风二两

【用法】上以苍术一升，水五升，煎至半，去滓，入药煎服。

【主治】疮疡肿嫩于外，根盘不深，脉浮，邪气盛，则必侵于内。

【加减】便秘加大黄，热加黄连。

34717 伤筋药水

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】生草乌 生川乌 羌活 独活 生半夏 生栀子 生大黄 生木瓜 路路通各四两 生蒲黄 樟脑 苏木各三两 赤芍 红花 生南星各二两 白酒二十斤 米醋五斤

【用法】上药在酒、醋中浸泡七天，严密盖闭，装入瓶中备用。患处热敷或熏洗后，用棉花蘸本品在患处轻擦三五次。

【主治】筋络挛缩，筋骨痠痛，风湿麻木。

34718 伤痛宁片

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】乳香(制)2千克 没药2千克 延胡索(醋炒)4千克 细辛4千克 香附(制)20千克 山奈20千克 白芷32千克

【用法】上为细末，过100目筛，和匀；每100克药粉加淀粉10克，饴糖18克，制成颗粒，干燥；每100克干颗粒加润滑剂2克，压制成片，即得1片重0.36克。口服，每次5片，一日二次。

【功用】散瘀止痛。

【主治】跌打损伤，闪腰挫气。

【宜忌】孕妇忌服。

34719 伤湿涂膜

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】白芷360克 薄荷脑200克 徐长卿360克 金果榄240克 莪术240克 桂枝160克 颠茄流浸膏172克 邻苯二甲酸二丁酯120克 聚乙烯醇缩甲乙醛520克 丙酮适量 雪上一枝蒿240克 乙醇(75%)适量 樟脑200克

【用法】将雪上一枝蒿加90%乙醇浸渍48小时后进行渗漉，将白芷、徐长卿、金果榄、莪术、桂枝研成粗粉，加90%乙醇回流数次，至回流液接近无色，浓缩；将上述二液与其余药料及辅料基质等混溶，过滤，即得。本品为粘稠的液体，易挥发，气特异。涂于患处，每日一二次。

【功用】活血止痛，祛风湿。

【主治】扭伤，挫伤，风湿骨痛，腰痠背痛。

34720 伤后清脑汤

【方源】《千家妙方》上册引关幼波方。

【组成】何首乌15克 钩藤15克 滁菊花12克 生石膏15克 全蝎15克 旋覆花10克(包煎) 赭石10克(包煎) 生地15克 白芍15克 当归12克 川芎4.5克 川石斛15克 磁石15克 香附15克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】养血和血，平肝潜阳，熄风化痰。

【主治】脑震荡后遗症。

【临证举例】脑震荡后遗症 方某某，男，38岁。于1968年7月1日来诊。患者于1967

年12月28日被汽车撞倒,昏迷达3小时多,经某医院抢救脱险。此后感觉严重头晕,不敢翻身,时时恶心欲吐,一直卧床约20余天。住院达二月余,出院时头晕虽有减轻,能够起床活动,但头部仍不能左右旋转,也不敢前倾后仰,稍稍振动,则感头晕加重。记忆力明显减退,睡眠不宁,胃脘不舒,大便溏薄。舌苔白,脉弦滑。投以“伤后清脑汤”,连服10剂后,头晕明显减轻,转动头部已无明显不适之感,临床症状得以改善。

34721 伤科十宝丹

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】大梅片一钱二分 麝香一钱二分 乳香三钱(去油) 没药三钱(去油) 结子红花五钱 血竭二钱五分 辰砂三钱 雄黄五钱 儿茶二钱五分 归尾二两

【用法】上为细末,瓷瓶收藏,口用黄蜡封固,勿令泄气,如泄气则发霉无效。每服五分,好黄酒随量下,重者两服。

【主治】一切金刀跌打损伤,木石折伤。

34722 伤科紫金丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】炙没药 木香 丁香 枳壳 延胡 青皮 血竭 血余炭 儿茶 当归各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,陈酒化服。

【主治】跌打损伤,筋损骨断,瘀血凝结,下部重伤;及腰脚肋肋腿诸痛,属气滞血阻者。

34723 伤原活血汤

《奇效良方》卷五十六。为《医学发明》“复元活血汤”之异名。见该条。

34724 伤损神效散

【方源】《急救应验良方》。

【组成】马钱子(即木别子,去皮)一斤 枳壳一斤

【用法】浸尿缸内四十九日取起,焙干研末,用瓶装贮听用。如伤未破皮,用酒调敷患处,若破口出血,将药末掺上。即时止血

定痛,消肿散红。如伤重及内损者,除敷掺外,再加药引:伤在头胸,用川芎二钱;在四肢,用桂枝二钱;在腰腹,用杜仲二钱;在腿股,用牛膝二钱,煎浓汁和无灰黄酒约共一盞,将药末一钱冲服;伤轻并体弱及童稚者冲服六七分。

【功用】止血定痛,消肿散红。

【主治】手足金刃木石一切跌打损伤。

34725 伤湿止痛膏

【方源】《中药制剂手册》引上海中药制药三厂方。

【组成】骨碎补六十四两 生川乌三十二两 生草乌三十二两 山柰九十六两 老鹳草六十四两 马钱子三十二两 白芷九十六两 干姜九十六两 肉桂六十四两 荆芥六十四两 五加皮六十四两 乳香三十二两 没药三十二两 落得打三十四两 防风六十四两 颠茄浸膏四十八两 冬青油四十八两 樟脑六十四两 薄荷脑三十二两 芸香膏四十两 冰片三十二两

辅料:橡胶五一二两 汽油一四四〇两 羊毛脂一二八两 氧化锌六四〇两 松香五一二两 椰子油三十二两 凡士林六十四两

【用法】按处方将上药炮制合格,称量配齐。颠茄浸膏至冰片和辅料单放;取骨碎补至防风等十六味,共轧为3号粗末,橡胶轧为薄片,松香轧为细粉;取骨碎补等十六味粗末,用五倍量95%乙醇按渗漉法提取;收集滤液,回收乙醇,浓缩为稠膏药二五〇两;将橡胶薄片置汽油内浸泡,随时搅拌,至橡胶全部膨胀,软化;密闭24小时,取上项胶浆置打胶桶内搅拌3小时,加入凡士林,羊毛脂,冬青油,搅拌1小时,加入氧化锌,继续搅拌,1小时后,加入松香,再搅拌2小时,加入薄荷脑、樟脑、冰片、颠茄浸膏、芸香膏和骨碎补等浓缩膏,将所有药料加完后,继续搅拌2小时,至全部溶解均匀为止,用60~80目筛网过筛,装入桶内密闭,静置五至六天;取混合胶浆置涂胶机上涂胶,在涂胶前

1 小时, 开放送热设备, 待烘道全部热透, 再开始涂胶; 每涂 20 公尺落机(剪下)一次。将落机的整卷胶布切段, 每段 7 公分, 并将两段胶面相对, 夹一层硬质纱布(或塑料薄膜), 再切成 5 公分长的小段。将患处洗净揩干, 撕去纱布, 贴于患处。浴后贴用更好。

【功用】祛风除湿, 化瘀止痛。

【主治】风湿痛、腰腿、筋骨、关节痛及跌打损伤等症。

【宜忌】孕妇忌用。

34726 伤湿止痛膏

【方源】《中国药典》。

【组成】伤湿止痛流浸膏(生草乌、生川乌、乳香、没药、生马钱子、丁香各 1 份, 肉桂、荆芥、防风、老鹳草、香加皮、积雪草、骨碎补各 2 份, 白芷、山柰、干姜各三份, 粉碎成粗份, 用 90% 乙醇制成相对密度约为 1.05 的流浸膏) 50 克 水杨酸甲酯 15 克 薄荷脑 10 克 冰片 10 克 樟脑 20 克 芸香浸膏 12.5 克 颠茄流浸膏 30 克

【用法】按处方量称取各药, 另加 3.7~4.0 倍重量由橡胶、松香等制成的基质, 制成涂料。进行涂膏, 切段, 盖衬, 切成小块即得。密闭, 避热。贴患处。

【功用】祛风湿, 活血止痛。

【主治】风湿关节、肌肉痛, 扭伤。

【宜忌】孕妇慎用。

34727 伤寒应验方

【方源】《便览》卷一。

【组成】生绿豆粉二两 麻黄末一两八钱

【用法】每服三钱, 冷水调服。不用被盖, 出汗愈。

【主治】伤寒, 脉浮紧面无汗。

34728 伤寒通用膏

【方源】《理渝》。

【组成】麻黄(去节)四两 柴胡一两 升麻 党参 当归各一两 赤芍 甘草各四两 朱砂 雄黄各一两半

【用法】麻油熬, 黄丹收。贴臍中处。

【功用】发汗。

【主治】四时伤寒, 伤寒汗后变为杂症及干霍乱亦可用。

【加减】春、夏, 加石膏、枳实; 秋、冬, 加细辛、桂枝各五钱。石膏重用亦可。

34729 伤风咳嗽吞剂

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】橘皮 9.6 千克 苦杏仁霜 3.6 千克 黄芩 9.6 千克 枳壳 9.6 千克 桔梗 9.6 千克 茯苓 9.6 千克 前胡 9.6 千克 麻黄 9.6 千克 甘草 7.2 千克 半夏(制) 7.2 千克 紫苏 14.4 千克

【用法】上药除橘皮研粉过 100 目筛, 苦杏仁霜研粉过 80 目筛, 紫苏提油外, 先将其余八味水煎 2 次, 每次二至三小时, 药汁滤过, 浓缩至比重 1.38~1.40(热测), 成清膏; 再将橘皮粉、苦杏仁霜粉先与紫苏油拌匀, 加入清膏重量 200% 的砂糖粉, 然后与清膏搅匀, 制成颗粒, 干燥, 过筛, 分装, 即得。每袋装量 9 克。每服半袋, 一日二次。嚼咽或吞服。

【功用】解表, 宣肺, 化痰。

【主治】风寒咳嗽, 痰多气促, 鼻塞头痛。

【宜忌】宜多饮水。

34730 伤水张南川消癖膏

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】香油一斤 桃一两 榆二两 椿一两 槐一两 柳一两 柏枝一两 楮一两 猪鬃四两 血余一两 水红花穗一斤

以上俱入油内熬焦, 去滓, 又入后药: 黄连一两 黄芩一两 黄柏一两 梔子一两 大黄一两 连翘一两 川乌一两 两头尖一两 川芎一两 防风一两 荆芥一两 木鳖子一两 薄荷一两 苍术一两 苦参一两 穿山甲一两 当归尾一两 蓖麻仁一两

入油内熬焦捞出, 称煎油, 如油一两, 入黄丹五钱, 熬至滴水成珠, 离火待温, 入后细药:

阿魏一钱 血竭一钱 芦荟一钱 硼砂一钱

硝砂一钱 乳香一钱 没药一钱 胡黄连一钱 儿茶一钱 轻粉一钱 雄黄一钱 天竺黄一钱 蜈蚣三条(为末) 潮脑一两 麝香三分

【用法】为膏。临摊贴药，入麝，贴患处。

【主治】瘰疾。

34731 伤科回生第一仙丹

【方源】《集成良方三百种》卷下引彭竹楼方。

【组成】大土鳖虫(活大而公者。去足，放瓦上，木炭微火焙黄，研细)五钱 自然铜(研细)三钱(放瓦上，木炭火烧红，入好醋内淬半刻，取出，再烧再淬，连制九次) 真乳香(研细)二钱(每一钱，用灯草一分五厘，在砂锅内同炒枯，与灯草灰同研，吹去灯草灰，再另研细) 真陈血竭(研细，飞净)二钱 真辰砂(研细，飞净)二钱 全当归(研细)一两(用陈醋泡透，砂锅炒干，研细) 真正当门麝(研细)一钱

【用法】如法泡制，称准分两，为极细末，用小瓶盛入，每瓶一分五厘为一服，用蜡封口，切勿泄气。遇受伤人，即用一瓶，以好黄酒冲服；能饮酒者，多饮尤好，使瘀血下行，小儿减半。伤重者，三五服，伤轻者一二服。立效。倘致命重伤，酌以数瓶敷之，其效尤速，伤非致命，即不用敷。

【主治】跌伤、压伤、打伤、刀伤、割喉，吊死，冻死，溺死，雷震死；火器伤，木器伤遍体鳞伤，骨折筋断，肠出脑漏。

【宜忌】冻死者放暖室中，不可近火，多垫稻草，棉被褥；溺水死者，须令将水吐出；割喉者，将头扶正，合住刀口，用生松香、生半夏等分，共研极细末，在伤口周围厚厚敷紧，外用膏药，周围连好肉一并裹住；再用布条围裹，用线缝好，一月平复如故；肠出者，用好醋一盆煎热，不可太热，尤不可凉，托肠入盆洗之，随洗随收，用寻常膏药，加此丹贴伤口；溺水死，及吊死者，不可令泄气。以上均即速服药一瓶，活后以及伤愈，切

宜避风，尤宜避房事、气恼。

【加减】如伤后心腹疼痛，乃瘀血未净，用上白砂糖一二两，水冲时时代茶饮之；如受伤牙关紧闭，须用生乌梅擦牙即开，用生半夏擦两腮亦开；倘气已绝，必须打落一齿灌之。

华

34732 华佗散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】炙乳没各一钱 生南星一钱 刘寄奴一钱 肉桂二钱 细辛一钱五分 牙皂一钱 丁香一钱 急性子二钱 大茴香一钱 三奈一钱 羌独活各一钱 归尾二钱 川续一钱 广皮一钱 落得打一钱

【用法】上为细末。掺膏药上贴之，五日一换。

【功用】定痛，接骨舒筋。

【主治】骨断筋缩，骨节脱臼，不得转动。

34733 华盖丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】黑铅五斤

【用法】铸如方响片子，以铁筋穿作窍，以绳子穿之；用净瓷甕子盛米醋一斗，将铅片子悬排于甕子口，可去醋一寸已来，以纸密封甕口；每一七日一度，开取铅片子出，于净纸上以篦子轻手掠取霜；但七日一度，取经五七度后，即力小不堪，即别取新铅为之。每一两霜，入龙脑半分，同研如粉，以露水为丸，如梧桐子大。每夜含一丸，便卧勿语，任丸自消。

【功用】变鬣发，能延驻；遍去热毒风。

【宜忌】忌蒜。

34734 华盖汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】麻黄(去根节，汤煮，掠去沫，焙干) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 甘草(炙，锉) 鹿角胶(炙燥) 半夏各一两(将半夏汤洗十遍，入生姜一两烂杵，焙

干)

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜二片，同煎至七分，去滓温服。日晚、临卧并三两服。汗出即愈。

【主治】伤寒后咳嗽，脉沉滞，寒热。

34735 华盖汤

《圣济总录》卷四十八。为《博济》卷二“华盖散”之异名。见该条。

34736 华盖汤

《圣济总录》卷六十五。为《博济》卷三“华盖散”之异名。见该条。

34737 华盖饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】赤茯苓 桑白皮 橘红 苏子各一钱五分 干葛 桔梗 杏仁各一钱 麻黄五分

【用法】加生姜三片，水煎，食远服。

【主治】肺感寒邪咳嗽声重，胸膈胀满，头目昏眩。

34738 华盖散

【方源】《博济》卷二。

【异名】华盖汤（《圣济总录》卷四十八）。

【组成】紫苏子（炒） 麻黄（去根节） 杏仁（去皮尖） 陈皮（去白） 甘草半两（炙） 桑白皮 赤茯苓（去皮）各一两

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，煎至六分，食后温服。

【功用】《方剂学》：宣肺解表，祛痰止咳。

【主治】①《博济》：肺感寒气，有痰咳嗽，久疗不愈。②《局方》：肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。

【备考】方中杏仁，《校注妇人良方》作生姜。

34739 华盖散

【方源】《博济》卷三。

【组成】麻黄三两（不去节） 甘草一两 杏仁二两（汤浸，去皮尖）

【用法】上三味，先以前二味为粗末，后入杏仁，研细，同拌令匀。每服三钱，水一盞，

煎至七分，去滓服，一日三次。

【功用】解表，滋润皮肤。

【主治】咳嗽。

34740 华盖散

【方源】《博济》卷三。

【异名】华盖汤（《圣济总录》卷六十五）。

【组成】桑白皮 神曲（炒） 桔梗各一两 人参三分 百合三分 甘草（炙） 杏仁（去皮尖）各半两

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，煎至六分，食后温服。

【主治】上喘咳嗽；兼治膈热。

34741 华盖散

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】黄耆（锉） 人参 桑根白皮（炙，锉） 防风（去叉） 白茯苓（去黑皮）各一两 甘草（炙）三分

【用法】上为散。每服三钱匕，生姜蜜汤调下；常服入生姜二片，如茶点，不拘时候。

【主治】肺气壅热，胸膈痞闷，痰唾咳嗽。

34742 华盖散

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 甜葶苈（隔纸炒） 桑根白皮（锉）各一两 大黄半两（湿纸裹，煨熟）

【用法】上为散。每服二钱匕，生姜汤调下，食后临卧服。

【主治】肺痈。上喘咳嗽，胸膈满闷，口干烦热及吐血。

34743 华盖散

【方源】《扁鹊心书》。

【组成】麻黄四两（浸，去沫） 苍术八两（米泔浸） 陈皮 官桂 杏仁（去皮尖） 甘草各二两

【用法】上为末。每服四钱，水一盞半，煎八分，食前热服。取汗。

【主治】伤寒，头痛发热，拘急；感冒，鼻多清涕，声音不清；四时伤寒，瘟疫瘴气。

34744 华盖散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】甜葶苈半两 苦葶苈半两(并用纸隔炒) 茯苓 人参 细辛 干姜(炮) 桔梗(锉,炒) 杏仁(去皮尖,麸炒) 紫菀 款冬花 甘草(炙) 陈皮各一分

【用法】上为细末,用羊肺一个心血不透者,切细研烂,旋旋入药掺肺内,再研匀,药尽为度,泥土墙上,以湿纸七重盖覆,每日去纸一重,七日药就,候干刮下,再研,罗为细末。每服二钱,空心温酒盐汤调下,米饮亦得,一日二次。

【主治】肺虚,或感风寒暑湿,及劳逸、抑郁、忧思、喜怒、饮食饥饱,致脏气不平,咳嗽脓血,渐成肺痿,憎寒发热,羸瘦困顿,皮肤甲错,将成劳瘵。

34745 华盖散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】阿胶半两(蛤粉炒如珠子,去蛤粉) 黄芩一分 人参(去芦)一分

【用法】上为细末。每服半钱,陈米饮调下,不拘时候。

【主治】唾血,吐血。

34746 华盖散

【方源】《普济方》卷一四九引《医学切问》。

【组成】苍术二两 桔梗一两 厚朴一两 杏仁五钱 陈皮五钱 乌梅五钱 麻黄二钱 甘草一两

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盞,加生姜三片,煎至七分,去滓温服。

【主治】伤风冒湿,头目昏重,憎寒壮热,四肢疼痛,咳嗽失音,涕唾稠粘。

【加减】如发汗,加葱头。

34747 华盖散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】知母 人参 茯苓 紫苏 乌梅 杏仁 白桑皮 麻黄 甜葶苈 甘草 五味子各等分

【用法】上咬咀。每服一钱,同葱白煎服。

【主治】伤寒。

34748 华盖散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】赤茯苓 桑白皮 橘红 苏子各一钱五分 干葛 桔梗 杏仁各一钱 麻黄五分 生姜三片

【用法】水煎,食远服。

【主治】肺感寒邪,咳嗽声重,胸膈胀满,头目昏眩。

34749 华盖散

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】紫苏子(炒) 赤茯苓 陈皮 桑白皮 杏仁(去皮尖) 麻黄各一两 枳壳 生姜 半夏各五钱

【用法】上为末。每服二钱,水一钟,煎七分,食后温服。

【主治】肺受风寒,咳嗽声重,胸膈烦滞,头目昏眩。

34750 华盖散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】糯米

【用法】用糯米煮烂饭,捣如膏,随将秃疮剃净,将米膏厚罨之。其虫尽入米膏中,俟膏自脱,发自生矣。

【主治】秃疮。

34751 华盖散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】杏仁 僵蚕 力子 防风 甘草 苏子 瓜蒌 川贝 连翘 荆芥 前胡 炙麻黄

【主治】肺受风痰,表实喘促标闭。

34752 华盖散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】麻黄 杏仁 茯苓 陈皮 桑皮 前胡 苏子 桔梗 甘草 生姜

【主治】伤寒咳嗽。

34753 华佗赤散

【方源】《千金》卷九。

【组成】丹砂十二铢 蜀椒 蜀漆 干姜 细辛 黄芩 防己 桂心 茯苓 人参 沙参 桔梗 女萎 乌头各十八铢 雄黄二十

四铢 吴茱萸三十铢 麻黄 代赭各二两半(细辛、姜、桂、丹砂、雄黄不熬，余皆熬之)

【用法】上药治下筛。酒服方寸匕，一日三次，耐药者二匕。覆令汗出。欲治疟，先发一时所服药二匕半，以意消息之。

【主治】伤寒头痛身热，腰背强引颈；及风口噤，疟不绝；妇人产后中风寒，经气腹大。

【方论选录】《千金方衍义》：麻、乌、辛、桂、椒、姜、茱萸，一派辛温散表药中，而兼黄芩、女萎、砂、桔、防己清解麻、乌等热毒；参、苓守五脏真气；丹砂、雄黄性虽重着，得麻、乌、姜、辛鼓舞之力，当无郁遏邪气之虞；代赭镇摄逆气，《本经》有治贼风、蛊毒、腹中毒邪、女子赤沃漏下之功；蜀漆专主寒热痰积，故可兼治疟证之寒热不绝。

【备考】按：《伤寒总病论》有常山。

34754 华盖煮散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】款冬花(去梗) 知母(焙) 贝母(去心，炒)各一两 紫菀(去苗土) 桔梗(炒)各三分 木香 甜葶苈(微炒)各半两 杏仁(去皮尖双仁，炒)三分 防己半两 蝉壳一两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盞，入酥少许，煎至七分，食后温服。

【主治】咳嗽上气。

34755 华山五子丹

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】当归 川芎 生地黄 熟地黄 川乌(煨，去皮) 白术 苍术(酒浸三日，焙干) 甘松 益智仁 五灵脂 桔梗 人参 白茯苓 白豆蔻各二两 天麻 陈皮 麻黄 滑石 川椒 甘草 白芷各一两 木香 丁香 沉香 乳香 没药 牛黄各二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，细嚼，茶酒米汤任下。

【功用】生精补髓，安五脏，定魂魄，补下

元，治虚损，壮精神，补血气，和容颜。

【主治】左瘫右痪，遍身疼痛，三十六种风，二十四般气，胎前产后，腹胀咳嗽。气急伤风，痔漏，手足顽麻，遍身疮痒疹癩，五般痢疾，并血气风血晕血崩积聚，赤白带下。

34756 华山石刻散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】鸡肠草 旱莲草 茜草根 晚蚕砂 白矾 青盐 不蛀皂荚 诃子各等分

【用法】上咬咀，如麻豆大。入瓶子内，外用盐泥固济，口上留一窍，如皂子大，用木炭五斤煨之，烟尽为度，杵为细末。每日三二次揩牙，少时用浆水漱口内。

【功用】乌髭鬓。

【主治】髭发黑白及牙齿诸疾。

34757 华山碑记丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【处方】杏仁(去皮，炒)四两 葶苈子四两 大黄四两 牙皂四两 石榴皮二两 灵脂(醋炙)二两 芫花(炙)二两 甘遂(炙)二两 大戟(炙)二两 江子霜二两 淡豆豉二两 三棱(炒)三两

【用法】上为细末，用醋泛为小丸。每服五分，温开水送下。

【功能】宽胸化滞，利水消肿。

【主治】积滞痞块，结胸腹胀，水臌痰饮，虫蛊胃痛。

【宜忌】孕妇忌服。

34758 华山碑记丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】三棱 灵脂 甘遂 葶苈 牙皂 青皮 神曲 乌梅 陈皮 枳壳 木香 豆豉 大黄 芫花 巴豆霜 红芽大戟 千石榴各一两

【用法】上为细末，醋糊为小丸。每服十五丸或十二丸，开水送下。

【功用】利尿消肿，化积消食。

【主治】胸胁水气痛满，气臌水胀，癥瘕肠覃，停饮作喘，湿毒脚气。

【宜忌】药性剧烈，用之宜慎。孕妇忌服。

34759 华佗顺生丹

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】朱砂五钱（水飞） 制乳香一两

【用法】上为末，以端午午时，用猪心血为丸，如芡实大。每服一丸，以当归三钱，川芎二钱，煎汤送下。

【主治】难产。

34760 华佗累效散

【方源】《金鉴》卷七十一。

【组成】乳香 硃砂各一钱 轻粉五分 橄榄核（烧，存性）三枚 黄丹三分

【用法】上为细末。香油调敷患处。

【主治】甲疽。

34761 华佗愈风散

《准绳·女科》卷五。为《妇人良方》卷十九引华佗方“愈风散”之异名。见该条。

34762 华佗接骨神方

《华佗神医秘传》卷三。为《石室秘录》卷四“接骨至神丹”之异名。见该条。

34763 华佗救脱阳方

【方源】《景岳全书》卷五十八。

【组成】葱白一握 附子一个（重一两，切八片） 白术 干姜各五钱 木香二钱

【用法】先用葱白一握微捣碎，炒热用布包，熨脐下，以二包更替熨之，甚者仍炙气海、关元二三十壮，脉渐出，手足渐温，乃可生也；次用附子一个（重一两），切八片，白术、干姜、木香，同用水二钟煎一钟。候冷灌服，须臾又进一服，或煎服回阳等汤。

【主治】寒中三阳，口噤失音，四肢强直，挛急疼痛，似乎中风及厥逆，唇青囊缩，无脉或卒倒，尸厥脱阳等证。

延

34764 延仁汤

【方源】《青囊秘诀》卷上。

【组成】人参一两 当归一两 白术一两 熟地一两 麦冬一两 山茱萸五钱 甘草一钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】乳痈乳岩。

34765 延生丹

《圣惠》卷八十五。为原书同卷“七圣丹”之异名。见该条。

34766 延生丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】辰砂（别研）三两 木香 没药 硃砂（别研） 白术 人参 沉香各半两 附子（炮裂，去皮） 胡芦巴各一两半

【用法】上为极细末，同研匀；用大萝卜去顶，用银匙剉作罐子，将已剉出萝卜绞取汁积在碗内，入药末一层，旋以银匙擦萝卜汁在上；再一层如上法；若汁不透，用银箸匙投之令人药及八分，萝卜顶盖之，用竹签签定；如一个萝卜盛药不了，即用三两个分盛之，先用纸封闭，次用盐泥固济，周回约一指许；用木炭火煅令通赤；闻药有香方出火；药罐子不动，只于烧处存放，至次日去泥开罐子，以银匙取药，在瓷器内揉和，令匀为丸；如药干，再入萝卜汁，和令得所，为丸如小豆大。每服十丸，细嚼三丸，吞七丸，空心，温酒送下；或米饮亦得，一日二次。

【主治】丈夫妇人虚损，五劳七伤，腹内一切痛，大便滑，小便数，或小便不通；男子小肠膀胱气病；妇人经脉闭，赤白带下，酒食多伤，大人小儿吐逆不定，诸块积聚，寒疝气疝，中恶鬼疰，传尸劳疾，久嗽水肿，疟痢，脚气病。

34767 延生方

【方源】《医学入门》卷六。

【异名】延生第一方（《古今医鉴》卷十四）。

【组成】初生脐带 辰砂 生地 当归

【用法】初生脐带落后，取置新瓦上，用炭火四围，烧灰存性。若脐带有五分，人飞过辰砂二分半（为末），用生地、当归煎浓汁调匀抹儿上腭间及乳母乳头上，一日至晚服尽为度。次日遗下秽浊之物，终身永无痘疹诸

疾。

【功用】《古今医鉴》：预解胎毒，免痘。

34768 延生膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【异名】回生膏（《经验广集》卷三）。

【组成】脐带（焙焦烟尽为度，放地上出火气，研末） 朱砂（水飞）五厘 甘草一钱

【用法】先将甘草熬膏一蚬壳，然后将前二味和匀，搽儿上腭及乳上，须一时服完。解下红黑粪则胎毒尽而痘稀。

【功用】下胎毒，稀痘。

34769 延年丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】枸杞子丸（《圣济总录》卷一八六）。

【组成】菟丝子（酒浸七日，炒黄）三两 枸杞子（去梗） 覆盆子（去萼） 车前子（酒浸） 巴戟天（去心） 远志（去心） 生干地黄 细辛（去苗叶） 白术（炒） 菖蒲（锉） 何首乌（去黑皮） 地骨皮 牛膝（酒浸一宿） 续断 菊花（去梗萼）各一两半

【用法】上药除菊花外，以温水和酒少许洗过，焙干，杵罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心常服；丈夫盐汤、妇人醋汤送下，午食前更一服。服至十服，其人病却有发时，是药动病本，功应也。

【功用】平补五脏，治百病；育神气，强力益志，美颜色，变髭发。

34770 延年丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】白术 白茯苓（去黑皮） 甘菊花各三两 耐冬叶（一名忍冬）二两

【用法】上为末。用生地黄捣取汁，银石器内熬如膏，以药末和匀，如干、更别入炼酥蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心清酒送下。

【功用】去风邪，补不足，明耳目，耐寒暑。

34771 延年草

【方源】《养老奉亲》。

【异名】延年散（《遵生八笺》卷三）。

【组成】青橘皮四两（浸洗，去瓤） 甘草二两（为细末） 盐二两半（炒）

【用法】先洗浸橘皮，去苦水，微焙，入甘草同焙干，后入盐，每早晨嚼三两叶子。

【功用】通滞气，进食顺气。

【方论选录】《寿亲养老评释》：延年草以橘皮、甘草、食盐三味制成。青橘皮辛苦而温，功能理气健脾，燥湿化痰，开胃消食，善治食、气停滞胃脘引起的心腹气痛，胀满，食欲不振，呕吐泄泻，以及咳嗽痰多等症，以其理气消食而不伤正，老人服用堪称良药；甘草补脾胃，润心肺，清火解毒，调和诸药；食盐调和脏腑，消宿食，滋五味，长肉，通利大小便，主肠胃结热，喘逆，胸中满，令人壮健。三药相合，为顺气进食强壮之佳品，不仅宜于老人春时服用，在一年四季用之，对腹胀少食者，亦可收和胃却病延年之效。

34772 延年草

【方源】《奇效良方》卷十七引刑和璞真人方。

【组成】上等白盐花五两（再淋煎用，须要雪白） 新船上茴香四两 青皮一斤（汤浸三日，换水，候苦味出尽，然后去瓤，切作指面大，方去子） 甘草六两（炙，锉）

【用法】上用甜水一斗，同药入银锅内熬，不住手搅，勿令着衣，置密器中收，不得走气；候水尽取出，慢火炒令干，不得有炒焦气；选勤谨者一人，专一掌之。去甘草、茴香不用，只取贮青皮。如伤生冷及果实蔬菜之类，即嚼数片，气通即无恙；常服一两片极佳。老人小儿皆可服，尤宜老人，清晨食后嚼数片。

【功用】安神导气，消酒食，益脾胃，安神健体。

34773 延年散

《遵生八笺》卷三。为《养老奉亲》“延年草”之异名。见该条。

34774 延寿丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【异名】平补干地黄丸（《普济方》卷二二一）。

【组成】牛膝（酒浸，切焙） 熟地黄（焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 地骨皮各一两 菟丝子二两（酒浸一复时，研烂入诸药）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，食前空心温酒送下。

【功用】乌髭发。

【主治】诸虚及虚风。

34775 延寿丸

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】干蜗牛 干蚯蚓各半两 蛇蜕皮 麝香各一分 干蟾头三个 使君子 没石子各五个

【用法】上将蜗牛、蚯蚓、蛇蜕皮、蟾头四味，入罐子内封闭口，炭火烧通赤，取出同余三味并为细末，用粟米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，米饮送下，一日二次。

【主治】小儿疳气，羸瘦，腹大颈小，头发稀疏，脏腑不调，或泻或秘。

34776 延寿丸

【御药院方】卷十。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

34777 延寿丸

【方源】《袖珍方》卷二。

【组成】鹿茸三两（切片，燎毛，酥炙） 沉香 苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒浸，蒸） 杜仲（炒） 当归（酒浸，焙） 胡芦巴（炒） 补骨脂（炒） 枳实（去瓤） 石莲（猪肉煮） 续断（炒） 枸杞子 五味子 川巴戟（去心）各二两 胡桃仁四十个

【用法】上为末，黄犬肉或羊肉二斤（切），用无灰酒并葱、椒、青盐、桂花、茴香同煮烂，入石臼杵成膏子，却入山药糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，空心盐酒送下。

【主治】元阳虚惫，诸虚不足，行履无力，

肢体痠痛。

34778 延寿丹

【方源】《医学正传》卷三引《千金》。

【组成】五味子 菟丝子（煮烂另研） 川牛膝 杜仲（姜汁拌，炒丝断） 川归（酒浸） 山药 天门冬 麦门冬（去心） 生地黄 熟地黄各一两 肉苁蓉二两 人参 白茯苓 大茴香 泽泻 地骨皮 鹿茸 菖蒲（九节者） 花椒 巴戟（去心） 远志（去心） 覆盆子（炒去汁） 枸杞子 柏子仁各五钱

【用法】上为细末。勿犯铁器，蒸捣，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒或生姜盐汤送下。

【功用】却疾延年。

【主治】诸虚百损，怯弱欲成癆瘵及大病后虚损不复。

【宜忌】忌萝卜菜。

【加减】如大便溏，小便不利，加车前子二两；如精滑或梦遗，加赤石脂、山茱萸肉各五钱。

34779 延寿丹

【方源】《博济》卷四。

【组成】辰锦砂 膩粉 铁焰粉 白附子各二两 蛇黄（用醋浸少时，以大火煨过） 大附子（炮）各九两 天南星（生，净洗） 羌活 巴豆（捶碎，用新水浸，逐日换水，七日后以纸裹压去油） 牛膝（酒浸，焙） 蝎梢各三两 生金 生银（各别研）一分 麝香 真牛黄（各另研）一两一分

【用法】上为细末。以蜜和粟米饮搜和为丸，如鸡豆大。每中恶风疹及五般痼疾，薄荷酒磨下一丸，老人半丸；小儿惊痫，十岁以上一丸分四服，四岁以下一丸分五服，新生孩儿一丸分七服，并用蜜水磨下；如患缠喉风，壅塞气息不通，将绝者，急化一丸，生姜薄荷酒送下。

【主治】小儿惊痫，及大人卒中恶风，涎潮昏重，口眼喎斜；缠喉风，壅塞气息不通，将

绝者。

【宜忌】如中风者，发直，面如桃花色，口眼俱闭，喉中作声，汗出如油及汗出不流，多要下泄或泻血者，并是恶候，更不用服；如口噤眼开者，药下立愈。

34780 延寿丹

【方源】《普济方》卷二二六引《伤寒直格》。

【组成】牛膝（去芦，酒浸一宿） 菟丝子（酒浸一宿） 远志（去心） 地骨皮 石菖蒲 甘菊花 熟干地黄各等分

【用法】上为细末。用浸药酒熬面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心临卧温酒送下，一日三次。

【功用】清心益智，和血驻颜，延年益寿。

【主治】元脏虚冷，筋骨缓弱，肝肾不足，精神困乏。

34781 延寿丹

【方源】《普济方》卷三七五引《兰室秘藏》。

【组成】天南星 白附子 蛇黄 辰锦生朱 当门子

【用法】上为细末，和匀，糯米粉糊为丸，如鸡头子大。周岁儿每服一丸，婴儿半丸，薄荷汤浸软磨化，乳后服。

【主治】小儿急慢惊风，胃受惊气，腹痛，盘肠内吊，鸦声邪叫，角弓反张，眼或视上，手足搐搦，痰涎潮壅塞不通，或一切心神烦闷，睡卧不安。

【备考】药性温平，伤寒疹痘俱不妨碍。

34782 延寿丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】松脂三十两（依法煮炼白者） 茯苓 甘菊花一十两 柏子仁十两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下；或盐汤亦可，一日三次。

【功用】补精髓，益气壮元阳，轻身耐老。

【主治】肾经不足。

34783 延寿丹

《卫生宝鉴》卷十二。为《儒门事亲》卷十五“化痰延寿丹”之异名。见该条。

34784 延寿丹

《普济方》卷二二四引《德生堂方》。为原书同卷“还童丹”之异名。见该条。

34785 延寿丹

《袖珍方》卷三。为《杂类名方》“夺命丹”之异名。见该条。

34786 延寿丹

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】天门冬（去心） 远志（去心） 山药 巴戟各二两 赤石脂 车前子 菖蒲 柏子仁 泽泻 川椒（去目，炒） 熟地 生地 枸杞 茯苓 覆盆子各一两 牛膝（酒浸） 杜仲（炒） 菟丝子（酒浸） 苁蓉各四两 当归（酒洗） 地骨 人参 五味子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸。

【功用】延寿。

34787 延寿丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】赤、白何首乌（鲜者，竹刀刮去皮，切片。如无鲜者，用干者，米泔浸一宿，以瓷片刮皮，春作弹子大）各一斤 牛膝（去芦）半斤（用黑豆三升，同二乌木甑一处，蒸一日，取牛膝去心，共捣成泥，晒干为末） 菟丝子半斤（酒浸蒸熟，春去皮，晒干，扬净，复春为米） 白茯苓（去皮，春作弹子大）一斤（用人乳五升浸透，蒸透熟） 破故纸半斤（炒香为末，外加） 生地黄二斤（一斤酒浸，九蒸九晒；一斤只酒浸透用） 赤茯苓（去皮）一斤（用牛乳同前制）

【用法】上为极细末。皆勿犯铁，炼蜜为丸（炼蜜滴水成珠，取俟三日火毒退方合用），每一丸重一钱二分。每服一丸，一日三次，空心酒送下；午间姜汤，临睡淡盐汤送下。必如此引，不可错乱。久服渐渐加大。初服三四日，小便多或杂色，是五脏中杂病出；二

七日唇红生津液，再不夜起；若微有腹痛，勿惧，是搜病；三七日，身体轻便，两乳红润；一月鼻觉辛酸，是诸风百病皆出。

【功用】补血生精，泻火益水，强筋骨，黑须发。

34788 延寿丹

《医统》卷九十三。为《万氏家抄方》卷四“打老儿丸”之异名。见该条。

34789 延寿丹

【方源】《遵生八笺》卷十七引罗真人方。

【组成】干山药一两（去皮） 人参一两（去芦） 白茯苓一两（去皮） 川牛膝一两（酒浸） 杜仲一两（姜制去丝） 龙骨一两 川续断一两（去芦） 鹿茸一两 当归一两（酒浸洗） 山药苗一两 北五味一两 熟地黄一两（酒浸） 石菖蒲一两 楮实子一两（去瓤） 破故纸一两（炒） 麦门冬一两（去心） 辽枸杞五钱

【用法】上为极细末，以酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸或六七十丸，淡盐汤送下，一日二次。服至五日，体自轻健；至十日，精神倍爽；半月之后，气力壮勇；二十四日后，眼目清朗，语言响亮；一月之余，饮食大进，颜色红润，步履轻健，冬月手足常暖。此药不热不燥，老幼皆可服。

【功用】常服此药，阴阳升降无偏，充实肌肤，填精补髓，精神倍长，强壮筋骨，悦颜色，固真气，和百脉，正三焦，乌须发，坚齿牙，聪耳明目，老能轻健。

【主治】男子五劳七伤，诸虚不足，阴痿气弱无力，心肾不交，精神欠爽，小便频数，腰膝疼痛。妇人赤白带下，起居倦怠，脚冷麻痺，不能久立，肾气不和，脐腹疼痛，经水愆期，无孕。

【加减】如下元虚冷，加鹿茸五钱，附子五钱。

34790 延寿丹

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】白茯苓十斤（净锅内煮一夜，晒一

日，去皮，切片） 真蜂蜜二斤

【用法】上药调蒸三炷香，晒干；再加蜂蜜，再蒸再晒，如是三次；为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三四十丸，温酒送下。

【功用】补益，延寿。

34791 延寿丹

《外科正宗》卷一。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

34792 延寿丹

【方源】《疡科心得集·补遗》。

【组成】贝母 白芷 苡仁 车前子 川连 赤芍 木通 山梔

【主治】小儿脐风及脐汁不干。儿生月内，肚胀腹硬，脐周浮肿，口撮眉攒，牙关不开，名曰脐风撮口证，舌强唇青，手足微搐，喉中痰响。

34793 延寿丹

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】人参（上好者）六两

【用法】用滴花烧酒二斤夜浸日晒，以酒尽为度；或整枝人参晒干，研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，飞净朱砂为衣。每服一钱，如益元气，暖丹田，空心淡盐或秋石汤送下一服；如补肾，每日早、午、晚各进一服，酒送下。

【功用】益元气，暖丹田，补肾；年过三十以外，服之固本延年。

34794 延寿丹

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】白术（土炒） 青皮 生地 厚朴（姜汁炒） 杜仲（姜汁炒） 故纸（微炒） 广皮（去净白） 川椒 青盐 黑豆二升 巴戟肉（去心） 白茯苓 小茴香 肉苁蓉（竹刀刮净鳞，黄酒洗，晒干）各一两

【用法】制好，入铜锅，或砂锅亦可，用水二十小碗，桑柴文武火，煎至十小碗，将水盛出；复煎药滓，用水十小碗，煎至五小碗，去滓不用，惟用二次药水十五碗，将黑豆放锅内，用火缓缓煎至水干，盛起候冷，入瓷

罐装贮。每早空心服三钱，开水送下，不可间断。

【功用】添精补髓，健脾养胃，乌须延寿，轻身健体，返老还童，中阳复兴，少阳复起，调妇人经水，暖下安胎。

【主治】痔漏疮毒，赤白带下。

【宜忌】妇人受胎之后，不可再服，恐受双胎。忌食牛、马肉。

34795 延寿丹

《世补斋医书·文集》卷八。为《良方合璧》卷上引薰玄宰“秘传延寿丹”之异名。见该条。

34796 延寿汤

《普济方》卷三五三。为《普济方》卷三五三引《便产须知》“黄耆汤”之异名。见该条。

34797 延寿酒

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】黄精四斤 天门冬三斤 松叶六斤 苍术四斤 枸杞子五升

【用法】上药以水三石，煮一日取汁，如醇法成，空心任意饮之。

【主治】百疾。

34798 延寿酒

【方源】《寿世保元》卷十。

【组成】好上等堆花烧酒一坛 龙眼（去壳）一斤 桂花四两 白糖八两

【用法】药入酒坛封固经年，愈久愈佳。其味清美香甜，每随量饮，不可过醉。

【功用】安神定志，宁心悅颜，香口却疾，延年。

34799 延寿散

【方源】《博济》卷一。

【组成】牡丹皮 附子（炮，去皮脐） 柴胡（去苗） 秦艽 鳖甲（酒浸，炙令赤色）各半两

【用法】上为细末，人人中白半两同研，以瓷器盛之。每服用猪石子一枚，葱白、椒末同一处，细锉如膏，入药末三钱匙，拌和，以童便一盞，水半盞，同煎令沸，温服。其患人贴体着皂纱衫一领，服后衣物盖覆，令恶汗出，粘腻尽出，乃脱皂衫，揩拭身干，避

风将息。每七一度，服后汗轻即住。皂衣遂以皂角汤泡洗，安息香烘干。

【主治】男子、女人、少童等传尸诸劳嗽，寒热百般变候，蒸汗劳虫。

34800 延寿散

【方源】《博济》卷四。

【异名】鸡舌香散（《普济方》卷三七四引《全要方》）。

【组成】鸡舌香（大者）三枚 朱砂半钱 五灵脂一钱半 黄耆一钱半

【用法】上为细末。每服半钱，用研糯米泔调下；若孩子小，只服一字。

【主治】小儿惊搐不定，或因惊风已经取下，此病再作，气粗喘促。

34801 延寿膏

【方源】《幼幼新书》卷十九引《庄氏家传》。

【组成】白羯羊胆一只（腊日者或腊月者皆可） 马牙消半两 朱砂一分

【用法】上为细末。盛于胆内当风悬之，候过清明可开，再研极细；入脑、麝香少许，生蜜和为膏子，以瓷器中盛。服如紫雪法。

【主治】小儿心脏积热；大人、小儿口疮。

34802 延灵丹

《普济方》卷二二三引《卫生家宝》。为原书同卷“何仙姑庆世丹”之异名。见该条。

34803 延附汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】延胡索（炒，去皮） 附子（炮去皮脐）各一两 木香（不见火）半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】七疝。心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大肠闭。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“玄附汤”。

34804 延命丹

《丹溪心法附余》卷十六。为《杂类名方》“夺命丹”之异名。见该条。

34805 延胡丸

【方源】《慎斋遗书》卷八。

【组成】延胡索 青皮(去白) 陈皮(去白) 木香 当归 雄黄 生姜 三棱各一两

【用法】酒曲糊为丸。生姜汤送下。或加槟榔、黄耆。

【主治】积聚。

34806 延胡散

【方源】《博济》卷四。

【异名】延胡索散(《云歧子保命集》卷下) 玄胡索散(《医学纲目》卷二十一)。

【组成】延胡索 郁金 干葛 官桂(去皮) 青皮(去白) 枳壳各等分

【用法】上药以好醋浸一宿,炙干,杵为细末。每服一钱,冷橘皮汤送下。不过三服愈。

【主治】产后失血,渴不止。

34807 延胡散

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】延胡索(炒) 当归(洗)各等分

【用法】上为细末。每服方寸匕,醋汤调下。

【主治】痛而游走,上下无常处,脉亦聚散,或促或涩,谓之游气。

34808 延胡散

《普济方》卷三四九。即《圣惠》卷八十一“延胡索散”。见该条。

34809 延胡散

《普济方》卷三五一。为《百一》卷三“三圣散”之异名。见该条。

34810 延胡散

《医统》卷十四。为《普济方》卷二一五引《活人书》“玄胡索散”之异名。见该条。

34811 延胡散

《济阴纲目》卷十一。为《妇人良方》卷二十引《经验妇人方》“延胡索散”之异名。见该条。

34812 延胡散

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】延胡索 胡椒各等分

【用法】上为末。每服二钱,食前温酒调服。

【主治】冷气心疼及疝气腹痛。

34813 延香散

《青囊秘传》。为原书“胃灵丹”之异名。见该条。

34814 延真膏

【方源】《李氏医鉴》卷四。

【组成】人参四两 白术 白茯苓 山药 枸杞 莲肉各二两 何首乌三两(用竹刀刮去皮) 山萸肉二两半 肉苁蓉五两 当归二两半(上药俱为末) 生地 熟地 天冬 麦冬各六两(俱用水浸一宿) 远志肉(去心)二两(甘草汁浸一夜。以上共捣如泥,取汁)

【用法】上药末、药汁,加白蜜一斤半,和匀入坛内,以箬皮封固,入锅内,水煮一宿成膏。每服半酒钟。

【功用】养胃宽中,补中生津。

【主治】噎膈,翻胃。

34815 延息汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参 熟地各一两 山茱萸五钱 牛膝 破故纸各三钱 胡桃一个 陈皮三分 炮姜一钱 百合一两

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒六七日,经传少阴而息高,气息缓慢而细小。

34816 延息汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 百合各五钱 甘草一钱 熟地一两 山茱萸四钱 牛膝二钱 北五味五分 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】终朝咳嗽,吐痰气喘,少若行动则气不足以息。

34817 延龄丹

【方源】《三因》卷十八。

【异名】妙应丹(《局方》卷九续添诸局经验秘方)。

【组成】熟地黄 川芎 防风 槟榔 茺莢(炒) 蝉蜕(洗) 柏子仁(别研) 马牙消(烧) 人参 黄耆 白薇 川椒各半

两 鲤鱼鳞(烧) 晚蚕砂(炒) 当归 木香 附子(炮, 去皮脐) 石膏(煨) 泽兰各一两 藁本 厚朴(姜制, 炒) 甘草(炙) 白姜(炮)各一两半 红花(炒) 吴茱萸(洗)各一分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。每服一丸, 血瘕块痛, 绵灰酒送下; 催生, 温酒细嚼下; 血劳血虚, 桔梗酒送下; 血崩, 棕榈灰酒送下; 血气痛, 炒白姜酒送下; 血风, 荆芥酒送下; 血晕闷绝, 胎死腹中, 胞衣不下, 并用生地黄汁、童便、酒各一盏, 煎二服调下; 常服, 醋汤温酒化下, 并空心食前服。

【主治】血瘕块痛, 血劳血虚, 血崩, 血气痛, 血风, 血晕闷绝, 胎死腹中, 胞衣不下。

34818 延龄丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】牛膝(酒浸二宿) 苁蓉(酒浸二宿) 金铃子(去皮) 补骨脂(炒) 川茴香(炒)各七钱半 鹿茸(去毛) 益智仁 檀香 晚蚕蛾(炒) 没药(研) 丁香 青盐 川山甲各半两(炙) 沉香 香附子(炒) 姜黄 薯蓣 木香 巴戟(去心) 甘草(炙)各一两 乳香(研) 白术 青皮 苍术三两

【用法】上为细末。酒煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服四十丸, 空心温酒送下; 或煎茴香汤送下。

【功用】补五脏, 养真阳, 和血脉, 壮筋骨。

【主治】脾肾不足, 真气伤惫, 肢节困倦, 举动乏力, 怠惰嗜卧, 面无润泽, 不思饮食, 气不宣畅, 少腹里急, 脐下疔痛, 及奔豚、盲肠气攻充脐腹, 发歇无时。

34819 延龄丹

《摄生众妙方》卷二。为原书同卷“神仙延寿丹”之异名。见该条。

34820 延龄丹

【方源】《年氏集验良方》卷二。

【异名】乌龙丸。

【组成】乌龙(即黑犬骨也, 自脑骨至尾一条, 全用好醋浸一宿, 煮醋干, 再用酥炙, 为末, 听用) 鹿茸(酥炙)八钱 巴戟(酒浸)一两 沉香一两 石莲子(去壳心)一两 远志肉(炒)五钱 大茴香五钱 石燕子(雌雄各三对, 烧红投姜汁内七次) 故纸(炒)五钱(以上为末听用) 何首乌(黑豆蒸九次)四两 熟地(酒洗)一两 床子(炒)二两 芡实肉二两 归身(酒洗)一两 川芎一两 白芍(酒炒)二两 生地一两(酒洗) 天冬 麦冬 马蔺花 冬青子各一两 楮实子(酒洗)一两 母丁香二十个 枸杞子四两 金樱子一斤(去瓢核)

【用法】上药除药末外, 共水一斗, 煎至一升, 去滓, 取起晾冷, 和入药内; 又用黄雀四十九个, 好酒煮烂, 捣匀, 同药末、乌龙骨为丸, 如梧桐子大。每服三钱。

【主治】阳痿。

34821 延龄汤

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】甘草一两(炙) 白术二两(炒) 荆芥三两

【用法】上为细末。每服二钱, 茶清点服, 不拘时候。

【主治】诸风。

34822 延龄酒

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】枸杞子八两 龙眼肉四两 当归二两 白术(炒)一两 大黑豆半升

【用法】以绢袋盛之, 浸无灰酒十五斤, 七日用之。

【功用】补益延龄。

34823 延龄散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤一两 消石半两 甘草一分(炙微赤, 锉)

【用法】上为细散。每服半钱, 以温水调下, 一日三四次。

【主治】小儿惊热。

34824 延龄散

【方源】《普济方》卷三四三引《妇人良方》。

【组成】桑寄生 当归 石斛 川芎 干地黄 续断 牛膝各半两 人参 泽兰 独活 防风 木香 五味子 细辛 官桂（不见火）各一两

【用法】上为细末。每服三钱，空心入盐煎服；或炼蜜为丸，如梧桐子大。空心盐汤任下五十丸。

【功用】补虚，生肌肉，平复正气。

【主治】妇人半产后。

34825 延龄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】泽乌头 皂角（去皮子） 生地黄 各一两

上为粗末，用生姜自然汁和成团子，用槐枝火烧令烟尽，取出子净地上，用碗盖一宿，出火毒，再捣为细末，入后件药：

细辛（取末） 青盐各三钱 石胆 白矾（灰） 麝香各二钱

【用法】上为细末。每用擦牙病处，或用刷牙蘸刷亦得，早晨、食后、临卧日用三次。有津却吐，误咽不妨。

【功用】牢牙齿，定疼痛，固龈肿，益气血，黑髭鬓。

34826 延龄膏

【方源】《博济》卷一。

【组成】虾蟆 鹤骨 丁香 枣叶 鳗鲡 木香 猪牙皂角各等分 麝香（另研细）少许

【用法】上为末，用羊肠（大者）盛之，缚定两头，于饭甑上蒸熟为度；取出候冷，以竹刀子割开，同肠研细，再入麝香，同研令匀为丸，如梧桐子大。每日到辰、巳间，用茅香熟水吞下一百丸；更看病人强弱，渐渐服之。须得一度吃尽一百丸后，以衣被盖之出汗，病甚者略露面，其虫逡巡后汗出，尸虫如麦麸大，余者皆微壮，出尽汗后，病人

其身轻快，十去三四也。候汗干后，即一时换却原着衣服并卧物等。初服药，见当时随药便尽吐出，并不住，即难疗；或一百丸存六七十丸，犹可医，别以新药补数，如药全住，疾无不退。病甚者，吃及两服至三服，即永除根本。治劳，煮散三五服为妙。初出汗，频换手帕揩之，约两炊饭久，肠劳随泻下一度，别用盆一个盛之，其虫皆微壮，浮在上面动。服药后如不吐甚妙也。

【主治】一切劳。

【宜忌】服药后忌一切动劳等物，一生永忌触犯药，苦参、人参、空青、麦冬、乌头切忌服之。

34827 延嗣酒

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】生地（酒洗） 熟地（九蒸九晒） 天冬（去心） 麦冬（去心）各四两 仙灵脾八两（饭上蒸） 当归二两（酒洗） 枸杞一两（酒浸）

【用法】上切碎，绢袋盛，入大坛酒内，重汤煮，自卯至酉为度，埋土内七日取起用。早晚男妇各随量饮三五杯。

【功用】补益，种子，延嗣。

【备考】妇人经不对者自正，经正者即受胎矣。

34828 延寿饮子

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】木香一两 黄耆四两 御米壳八两 甘草二两 当归二两 青皮二两 诃子四两

【用法】上各为粗末。每服三钱，水一盞半，煎至一盞，去滓服。

【主治】远年近日，赤白泻痢。

【宜忌】忌生冷、鸡鸭、油腻等物。

34829 延胡索丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【异名】炼阴丹（《普济方》卷二四九）。

【组成】延胡索 青橘皮（汤浸去白，焙） 葫芦巴 海藻（酒洗去咸，焙干） 昆布

(酒洗去咸,焙干) 马蔺花 茴香子(炒) 楝实肉(炒)各一两 木香半两 巴戟(酒浸,切,焙)一分

【用法】上为末,入硃砂,阿魏、安息香三味各一分,以醋二升化开,去泥土以重汤煮令成膏,为丸,如绿豆大。每服二十丸,烧绵灰酒送下,空心、食前服。

【主治】小肠受寒,控睾,少腹坚硬,疼痛不可忍。

34830 延胡索丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】延胡索 京三棱(炮,锉) 赤芍药 当归(切,焙) 旋覆花各一两 麒麟竭 乌贼鱼骨(去甲) 泽兰叶 滑石各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,一日三次。

【主治】妇人血风劳气,身体疼痛,面色萎黄,四肢无力,大便秘涩,口苦舌干,不思饮食。

34831 延胡索丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】延胡索(米醋炒黄)三分 当归(切焙) 沉香(锉)各半两 木香 白术 芎藭 青橘皮(汤浸去白,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 吴茱萸(汤洗,焙干,炒) 桂(去粗皮) 京三棱(湿纸裹煨,别捣为末) 各一两半 蓬莪术(锉炒)一两

【用法】上为末,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,煎生姜醋汤送下。日进三服,不拘时候。

【主治】妇人血脏久冷,血积气攻,心腹脐下疼痛,呕逆痰涎,不思饮食。

34832 延胡索汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】延胡索 桂(去粗皮) 芍药 白茯苓(去黑皮) 熟干地黄(焙) 鳖甲(去裙襕,醋炙) 续断 芎藭 羌活(去芦头) 附子(炮裂,去皮脐)各一两 人参

木香各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓,空心、日午、临卧温服。

【主治】妇人风虚劳冷,日渐羸瘦,血气攻刺,经脉不匀。

34833 延胡索汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】延胡索 当归(切,炒) 芍药 芎藭 桂(去粗皮) 甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】半产后气血不快,恶露断续。

34834 延胡索汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】延胡索 芎藭各一两 牛膝(去苗) 当归(切,焙) 人参各一两半 生干地黄二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓,入白蜜一匙,更煎令沸,温服,相次再服。

【主治】产后血运。

34835 延胡索汤

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归(去芦,酒浸,锉炒) 延胡索(炒去皮) 蒲黄(炒) 赤芍药 官桂(不见火)各半两 片子姜黄(洗) 乳香 没药 木香(不见火)各三两 甘草(炙)二钱半

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜七片,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】妇人室女,七情伤感,遂使血与气并,心腹作痛,或连腰胁,或引背脊,上下攻刺,甚至搐搦,经候不调,一切血气疼痛。

【加减】吐逆加半夏、橘红各半两。

【备考】本方方名,《得效》引作“玄胡索汤”;《东医宝鉴·外形篇》引作“玄胡索散”;方中片子姜黄,《妇科玉尺》作“姜汁炒黄连”。

34836 延胡索汤

【方源】《医学启蒙》卷五。

【组成】延胡索一钱 当归(酒洗)一钱 白芍(酒洗)一钱 厚朴(姜炒)一钱 莪术一钱 川楝子一钱 三棱一钱 木香一钱 川芎一钱二分 桔梗一钱二分 黄芩(炒)八分 甘草(炙)七分 槟榔一钱

【用法】水二钟,煎八分,空心热服。

【主治】产后瘀血心疼。

34837 延胡索汤

【方源】《名家方选》。

【组成】延胡索一钱 当归 桂枝各七分 干姜六分

【用法】水煎服,一日二次。长服益佳。

【主治】妇人经闭,时腹痛里急者。

34838 延胡索饮

《圣济总录》卷一四四。为《圣惠》卷六十七“延胡索散”之异名。见该条。

34839 延胡索散

【方源】《普济方》卷三四五引《产经》。

【异名】元胡索散(《济阴纲目》卷十一)。

【组成】当归(酒浸) 延胡索 赤芍药 蒲黄(纸隔炒) 桂(不见火,去皮) 乳香(水研) 没药各五钱

【用法】上为细末。每服三钱,空心酒调下。

【主治】①《普济方》引《产经》:产后血气攻刺,腹痛不止,及新旧虚实痛不止。②《医略六书》:月经不调,脉弦滞涩者。

【方论选录】《医略六书》:当归养血脉以荣经,蒲黄破瘀血以通经,赤芍化滞血,延胡调经脉,乳香和血于经,没药散血于络,桂皮温散以行经络也。为散酒煮,使血滞既化则经寒亦散,而经行如度,何有攻刺疼痛之患乎!

34840 延胡索散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】延胡索一两 橘子仁一两 蒲黄一两 虎胥骨一两(涂酥炙令黄) 芸苔子一两 桂心半两 牵牛子三分(一半微炒,一半生用) 当归一两(锉,微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】踉折,筋骨疼痛。

34841 延胡索散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】延胡索饮(《圣济总录》卷一四四)

【组成】延胡索一两半 桂心一两半 没药一两半 黄耆一两半(锉) 当归一两(锉,微炒) 白薇一两 桑寄生一两 熟干地黄一两半

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】伤折疼痛,筋骨未合,肌肉未生。

34842 延胡索散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】延胡索一两 白术一两 当归一两(锉碎,微炒) 桂心一两 赤芍药一两 芎藭一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 木香一两 琥珀一两 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妇人血虚气弱,风冷搏于脏腑,致成劳损,体瘦无力,食饮减少,脐腹多疼,肢节拘急。

34843 延胡索散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】延胡索三分 当归三分(锉,微炒) 芎藭三分 木香半两 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 赤芍药半两 桂心一分 熟干地黄一两 枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】妇人血气攻心腹疼痛。

34844 延胡索散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】延胡索一两 刘寄奴一两 当归一两(锉, 微炒) 红兰花子三分

【用法】上为细散。每服二钱, 以童便半盏, 酒半盏相和, 暖过调下, 不拘时候。

【主治】产后血运, 闷绝不识人。

34845 延胡索散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】延胡索 干漆(捣碎, 炒令烟出) 旱莲子 桂心 当归(锉, 微炒) 各一两

【用法】上为细散。每服二钱, 以温酒调下, 不拘时候。

【主治】产后恶露不尽, 腹中疼痛不可忍。

34846 延胡索散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】延胡索一两 当归一两(锉, 微炒) 桂心一两

【用法】上为粗散。每服三钱, 以童便、酒各半盏, 入生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后儿枕攻上下, 心腹疼痛。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“延胡散”。

34847 延胡索散

【方源】《博济》卷四。

【组成】延胡索(生用) 荆三棱(生用) 蓬莪术(酒浸少时) 当归(酒洗, 焙干) 各一两

【用法】上为细末。每服二钱, 空心温酒送下; 如血气发甚者, 及月水不匀, 并用童便、酒、红花同煎调下。只三服愈矣。

【主治】妇人血气走作, 疼痛不可忍者, 及月水不调, 面色萎黄, 吃食减少, 及生产后诸疾。

【备考】本方方名, 《医学入门》引作“玄胡索散”。

34848 延胡索散

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】延胡索 橘核(炒) 人参各半两 乳香(研) 地龙(去土炒) 各一分

【用法】上为散。每服一钱匕, 温酒调下, 一日二次。

【主治】风冷注气, 胸膈刺痛, 转动不得, 四肢厥冷, 面目青黄。

34849 延胡索散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】延胡索 当归(切, 焙) 蒲黄(炒) 芎蒭 生干地黄(焙) 赤芍药 泽兰 蓬莪术(煨, 锉) 天麻 桂(去粗皮) 滑石各一两 地榆(醋炒, 焙) 半两

【用法】上为散。每服二钱匕, 温酒或薄荷茶清调下。

【主治】室女月水不利, 骨节酸痛, 头面微浮, 筋脉拘急; 或生丹疹, 寒热不时, 饮食无味。

34850 延胡索散

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】延胡索半两 铅白霜(研) 一分

【用法】上为散, 和匀。每服一字匕, 涂乳上令儿吮之。

【主治】小儿涎嗽。

34851 延胡索散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】延胡 当归 川芎 赤芍 生地 丹参 红花 香附 乌药 熟艾 砂仁 生蒲黄

【主治】四十左右先期断绝, 血滞者。

34852 延胡索散

【方源】《妇人良方》卷二十引《经验妇人方》。

【异名】延胡散(《济阴纲目》卷十一)。

【组成】延胡索 当归各一两 真琥珀 蒲黄(炒) 各一分 赤芍药半两 桂心三分 红蓝花二钱

【用法】上为细末。每服三钱, 以童便合温酒调下, 食前服。

【主治】①《妇人良方》引《经验妇人方》: 产后儿枕腹痛。②《医中一得》: 产后房劳。

34853 延胡索散

【方源】《医方类聚》卷二四一引《管见大

全良方》。

【组成】延胡索一钱 乳香(研) 木香各半钱

【用法】上为细末。每服少许，水七分盏，煎至五分，不拘时候。

【主治】儿初生下，盘肠刺痛，面色青，啼哭不止。

34854 延胡索散

《云歧子保命集》卷下。为《博济》卷四“延胡散”之异名。见该条。

34855 延胡索散

【方源】《普济方》卷三三二引《仁存方》。

【组成】延胡索 当归(去芦头) 各一两 没药半两

【用法】上为末。每服三钱，用水一盏半，加生姜三片，同煎七分，食前服。

【主治】妇人血风冷，月水不调，攻刺脐腹、腰腿疼痛，面色萎黄，寒热麻木，四肢困弱，饮食减少。

【加减】憎寒，加川芎半两；卧不安，加干姜、桂各半两。

34856 延胡索散

【方源】《普济方》卷三三八引《仁存方》。

【组成】延胡索二两(肥者)

【用法】上为末。每服三钱，食前以温酒调下。又加地黄末一两，急服五钱。

【主治】双身心腹痛不可忍者，及腰腿痛。

34857 延胡索散

【方源】《普济方》卷三一。

【组成】延胡索 蒲黄各一两 肉桂半两(去粗皮)

【用法】上为细末。每服二钱，用沥油半盏调下，一日三四次。

【主治】车马坠损，瘀血不散，攻刺疼痛。

34858 延胡索散

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】釜底墨(醋炒令干透) 延胡索 刘寄奴 桂心 菴蒿子各等分

【用法】上为末。每服二钱，以热酒调下。

【主治】产后脐下痛。

34859 延胡索散

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】延胡索 茴香(炒) 甘草 蓬术各三钱

【用法】上咬咀。每服一钱，水五分，煎至三分，温服。

【主治】气积食积成块，及盘肠气痛，肠中一切冷痛。

34860 延胡索散

《校注妇人良方》卷二十。为《百一》卷三“三圣散”之异名。见该条。

34861 延胡索散

《景岳全书》卷六十一。为《圣惠》卷七十一“当归散”之异名。见该条。

34862 延胡索散

《郑氏家传女科万金方》卷一。即原书同卷“通经六合汤”加延胡索。见该条。

34863 延胡索散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】肉桂 延胡各等分

【用法】上为细末，听用。每服以生化汤加入延胡索散，再加入熟地二钱。

【主治】①《胎产心法》：产后小腹痛，可按面止者。②《产宝》：产后血晕，血块痛。

34864 延胡索散

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】归尾(一用当归) 延胡各一两 五灵脂 蒲黄(炒) 各一钱半 赤芍 桂心 各五钱 红花二钱

【用法】上为末。水、酒各一盏煎，入童便一盏，温服。

【主治】产后腹中有块，上下动，痛不可忍。此由恶露未尽，新血与旧血相搏，俗谓之儿枕痛。

34865 延龄煮散

【方源】《普济方》卷十七引《护命》。

【组成】茯神(去水) 益智(去皮) 防风(去叉) 人参 桑寄生 藿香叶 甘草(炙，锉) 沉香 熟干地黄各等分

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，煎至

七分，去滓，空心温服。

【功用】止健忘，安神养气。

【主治】心脏气虚。

34866 延乌二陈汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】延胡索 台乌药 香附 砂仁
法半夏 陈皮 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【功用】温中理气，健胃镇痛。

【主治】胃脘气滞作痛。

【方论选录】本方为温中理气之剂。用延胡、香附、乌药以理气滞，砂仁合二陈汤以温中和胃，故可用于气滞胃脘作痛之症。若用于神经性胃痛，有健胃镇痛之作用。

34867 延生第一方

《古今医鉴》卷十四。为《医学入门》卷六“延生方”之异名。见该条。

34868 延生护宝丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】菟丝子（水淘净，酒浸软，取末）三两 肉苁蓉（酒浸，切焙）二两（二味浸药酒各多著，要熬膏子） 家韭子四两（水淘净，用枣二两同煮，令枣熟，去枣，水淘净滓干，再用酒浸一宿，慢火炒干，称二两） 蛇床子二两（水淘净，枣三两同煎，令枣熟，去枣焙干，称一两） 晚蚕蛾（全者）二两（用酥少许，慢火微炒） 木香半两 白龙骨一两（用茅香一两同煮一日，去茅香用帛裹，悬在井中浸一宿，取出） 鹿茸 桑螵蛸（锉，炒香） 莲实（去皮，炒熟）一两 干莲花蕊 葫芦巴（微炒）一两 丁香半两 南乳香（别研）半两 麝香（别研）二钱

【用法】上药除乳香、麝香、菟丝子末外，同为细末；将前菟丝子末三两，用浸药酒二升，用文武火熬至一半，入莽麦面两匙（重一两），用酒调匀，下膏子内搅匀；次下乳香，麝香，不住手搅，轻沸熬如稠糊，放冷；此膏子都要用尽，恐硬，入酒少许，与前药末

和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，绝早日未出时，温酒入炒盐少许送下。静坐少时，想药至丹田，以意斟量渐加丸数。如阳道衰，精滑者，空心临卧各进一服。

【功用】补元气，壮筋骨，固精健阳，通和血脉，润肌泽肤，益寿延年。

34869 延年却病方

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】真菟丝子（洗净用好酒入砂锅内，愈煮愈佳，吐丝为度，放竹器内晒干，磨粉，再用炒米粉拌和）

【用法】加白砂糖调和，滚汤送服，大有补益；或用真怀山打糊为丸，如梧桐子大亦可。

【功用】补益、延年。

34870 延年护命丹

【方源】《医方类聚》卷一〇二引《经验秘方》。

【组成】没药（另研） 乳香（另研） 轻粉各二钱 蓬莪术 京三棱（炮）各一两 芫花 鳖甲（醋蘸，炙黄色，去尖，捶碎）一两半 黑牵牛四两（取头末二两） 陈皮半两（与芫花二味，好醋同浸一宿，漉去晒干，更焙） 川大黄（一半生，一半醋浸一宿，软切作片子，先作大块，更作小块，切作片子，微晒干，更焙，勿令焦）

【用法】后七味为细末，入前三味研匀，炼蜜和为块，入臼中杵三千下，每一两分作四丸。细嚼，温水送下。临卧服毕，不用枕头，仰卧至一更后，任便睡卧，来日取下积块或片子，或虫或脓血为效；如病大者，三日后再服一丸；病小者，五十日后进一服；如遍身走注疼痛，用乳香、没药煎汤化下；鼻血不止，冷水化下；有虫者，麻子油化下；十五岁以下，五十以上，一丸分作二服；十岁以下，六十以上，一丸分作三服；六岁以下，七十以上，一丸分作四服；三岁以下，八十以上，一丸分作五服。然临卧时更宜。

【功用】不损脏腑，通和百脉。

【主治】男子妇人脾胃不和，饮食减少，心

腹绞痛，反胃吐食，痰涎喘嗽，五般淋沥，伤寒结胸，大小便不通，泻血，肠风痔瘕；或伤寒后热甚发黄，久患疟疾，滑泻痢米谷不消，酒疸，食劳黄，十种水气遍身黄肿，一切蛊毒，五脏积热，衄血不止；及疔腮喉闭口疮，遍身疥癣，九种心痛，三十六般积，二十四般气，诸药不效，不问年深日近；并妇人所患产后恶血冲心，令人欲死，口燥舌干，四肢困倦，血山崩漏不止，面色萎黄，赤白带下，血经瘀闭不通；并小儿三十六种惊风。

【宜忌】忌生冷硬物，油腻等。三日宜食白粥。

34871 延年益寿丹

《饲鹤亭集方》。为《扶寿精方》“還元丹”之异名。见该条。

34872 延年益嗣丹

《摄生众妙方》卷十一。为《扶寿精方》“還元丹”之异名。见该条。

34873 延年益嗣丹

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】人参三两 天冬（酒浸，去心）三两 麦冬（酒浸，去心）三两 熟地黄（酒蒸，捣） 生地黄各二两 茯苓（酒浸，晒干）五两 地骨皮（酒浸）五两

【用法】上加何首乌半斤，米泔浸透，竹刀刮去皮，切片，置砂锅内，入黑羊肉一斤，黑豆三合，量著水，上用甌算，算上铺放何首乌，密盖，勿令泄气，蒸一二时，以肉烂为度，取出晒干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心温酒下。

【主治】男子阳极艰嗣，相火炽盛，灼伤真阴，以致阳极，阳则亢；或过于强固，强固则胜败不洽，是以无子。

34874 延年断汗汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】黄耆（蜜炙） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 芍药（白者） 肉桂（去粗皮，不见火） 甘草（炙） 牡蛎粉各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，

加生姜三片，枣子一枚，乌梅一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】自汗。

34875 延寿不老丹

《医学入门》卷七。为《扶寿精方》“還元丹”之异名。见该条。

34876 延寿内固丹

【方源】《鸡峰》卷十五引马子得道人传《南岳魏夫人方》。

【组成】辰砂三两半 黑附子（生） 白术各一两 没药半两 木香一两 胡芦巴一两半 硃砂半两 人参一两

【用法】上用冬月大萝卜作盒子一个，令厚一指以上，又深酌度盛药；或仓卒无大者，只用朱砂三分之一。硃砂、没药、朱砂细研，余药别捣细为末，同罗研匀，入萝卜盒内，先用赤石脂水调固盒子缝，外用六一泥六分，胶泥一分，纸筋固济，令厚一指，已上泥坐在砖上，日气中令五分干；用碳三斤煅，盒子上仍留一小窍子，以竹片子试割，候萝卜熟为度，候盒窍子中气出及泥干萝卜熟，抽火，半炊饭许时，再添一二斤火，专守火候，不得令萝卜焦，即恐药败，以泥稍黄熟是候；放令药气透，敲开泥，切开萝卜，取出，丹自软结而香，急丸如豌豆大。每服三丸或二丸，用盐汤温酒送下；若以酒化下尤佳。渐加至五丸止。

【功用】返老还童。

【主治】男子脾肾气衰，有积及腰背冷，面黄，瘫痪中风；妇人虚冷带下。

34877 延寿水仙丹

《普济方》卷二二三引《经效济世方》。为《百一》卷一引赵从简方“软朱砂”之异名。见该条。

34878 延寿水仙丹

【方源】《普济方》卷十六。

【异名】软朱砂。

【组成】人参 木通 白及各半两

【用法】上用真麻油二两，入三味药在油

内,用建盏盛之,火上煎,频将柳枝打匀,候三味药黑焦色,即去之,再煎油,滴水上如珠不散为度。用透明朱砂不拘多少,研细如粉,将炼油搜成二剂,用皂角水洗去油,入新水中浸之,逐日换水,就水旋丸,如绿豆大。每服三丸,日正午时浸朱砂水送下。

【功用】养精神魂魄,益气明目,通血脉,止烦满消渴。久服令人健,气力康强,心神安静,夜卧平稳。

【主治】五脏六腑百病,心热多躁,心虚不足,夜卧不稳,口苦舌干,小便白浊,日夜无度,色如凝脂,其味或甜,肢体羸瘦,不生肌肉,有潮热,久坐生劳,倦怠乏力。

34879 延寿补益汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 白术(炒) 杜仲(炒) 牛膝 白芍(炒) 各一钱 甘草六分 当归(酒焙) 陈皮各七分 柴胡五分 五味子十二粒 知母八分 熟地(酒焙) 二钱

【用法】水二钟,加生姜二片,大枣二枚,水煎服。夜有房事劳神,明早服此,大有补益。

【功用】延寿补益。

【主治】虚损。

34880 延寿固本丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】益智仁一两 远志 五味子 蛇床子各五钱 肉苁蓉一两(酒洗,去壳) 木香一两 莲蕊三钱 菟丝子一两(酒洗) 沉香一两

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,空心盐汤送下。

【功用】延寿固本。

34881 延寿固精丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】菟丝子 肉苁蓉 熟地 蛇床子 川牛膝(去心,俱酒浸一宿) 柏子仁 桂心(去骨) 北五味子 远志(去心) 青

盐各一两

【用法】上为细末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【功用】延寿固精。

34882 延寿瓮头春

【方源】《寿世保元》卷四。

【异名】神仙延寿酒。

【组成】天门冬(去心)一两 破故纸一两 肉苁蓉(麸炒)一两 粉草一两 牛膝(去芦)一两 杜仲(麸炒)一两 大附子(水煮)五钱 川椒(去目)一两(以上八味为末,入面内同和糜) 淫羊藿一斤(米泔水浸) 羯羊脂一斤(拌淫羊藿同炒黑色) 当归四两 头红花一斤(捣烂,晒干) 白芍一两 生地黄二两 苍术(米泔水浸,炒)四两 熟地黄二两 白茯苓四两 甘菊花一两 五加皮四两 地骨皮四两(以上十二味,锉咀片,绢袋盛贮铺缸内) 缩砂密五钱 白豆蔻五钱 木香五钱 丁香五钱(以上四味后用酒煮,为末用)

【用法】用糯米二斗,淘净浸一日夜;又淘一次,蒸作糜,取出候冷;用细面末四斤,同天门冬等八味调匀。却将淫羊藿等十二味,贮于粗绢袋,置缸底,将前糜拍实于其上,然后投上品烧酒四十斤,封固七日,榨出澄清,方入坛;加砂仁等四味固封,重汤煮三炷香,埋土中三日,能出火毒。每日量饮数杯。一七日,百窍通畅,浑身壮热,丹田微痒,痿阳立兴。

【功用】通百窍,兴痿阳,延寿。

【宜忌】切忌醉酒饱食行房。

34883 延寿济世膏

《玉机微义》卷十五引郭氏方。为原书同卷“万灵夺命丹”之异名。见该条。

34884 延寿获嗣酒

【方源】《惠直堂方》卷一引青诚霍氏家传方。

【组成】生地十二两(酒浸一宿,切片,用益智仁二两同蒸一炷香,去益智仁) 覆盆

子(酒浸一宿,炒) 山药(炒) 芡实(炒) 茯神(去木) 柏子仁(去油) 沙苑(酒浸) 黄肉(酒浸) 肉苁蓉(去甲) 麦冬(去心) 牛膝各四两 鹿茸一对(酥炙)

【用法】上药用烧酒五十斤,无灰酒二十斤,白酒十斤,龙眼肉半斤,核桃肉半斤,同入缸内,重汤煮七柱香,埋土七日,取起勿令泄气。每晚男女各饮四五杯,勿令醉。至百日后,健旺无比。

【功用】补真阴,添精益髓,乌须明目,聪耳延年。

【主治】素性弱,不耐风寒劳役,或思虑太过,致耗气血,或半身不遂,手足痿痹;或精元虚冷,久而不孕,及孕而多女,或频堕胎。

【宜忌】忌房事月余。

【加减】有力者,加人参四两更妙。

34885 延寿睡惊丸

《普济方》卷三七四。为《幼幼新书》卷九引《刘氏家传》“保生丹”之异名。见该条。

34886 延命牛黄丸

《普济方》卷三七九。为《圣惠》卷八十六“定命牛黄丸”之异名。见该条。

34887 延胡丁香丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】丁香疝气丸。

【组成】羌活三钱 当归 茴香各二钱 延胡索 麻黄根节 肉桂各一钱 丁香 本香 甘草 川乌头各五分 防己三分 蝎十三个

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如鸡头子大。每服五十丸,空心盐白汤服。

【主治】脐下撮急疼痛,并周身皆急痛,小便频数,及五脉急,独肾脉按之不急,皆虚无力,名曰肾疝。

34888 延胡止痛散

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】延胡(炒)

【用法】上为末。每服二钱,米饮调下。

【主治】血痢疼痛,饮食不进。

34889 延胡四物汤

《金鉴》卷四十六。为《济阴纲目》卷十一“玄胡四物汤”之异名。见该条。

34890 延胡生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱(酒洗) 桃仁十粒(去皮尖) 炮姜 炙草各四分 延胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后小腹儿枕块痛;寒气痛。

34891 延胡苦楝丸

《妇科大略》。即《普济方》卷三二八引《卫生家宝》“玄胡苦楝汤”改为丸剂。见该条。

34892 延胡苦楝汤

《兰室秘藏》卷中。为《普济方》卷三二八引《卫生家宝》“玄胡苦楝汤”之异名。见该条。

34893 延龄广嗣丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】杞子四两 线鱼胶四两 菟丝子六两 制首乌一两 茯苓一两 楮实子一两

【用法】水为丸。每服四钱,淡盐汤送下。

【功用】培养固本,益髓添精,兴阳种子,长春广嗣。

【主治】男子下元虚损,久无子嗣,阳痿不兴,兴而不固。肾寒精冷,先天禀受不足,少年斫丧过度。

34894 延龄广嗣丸

《中国医学大辞典》。为《纲目拾遗》卷八“延龄广嗣仙方”之异名。见该条。

34895 延龄广嗣丸

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】鹿角胶三两 巴戟肉二两 大熟地六两 海马一两 淡苁蓉 杜仲各二两 路党参四两 五味子一两 怀山药 白茯苓各三两 大茴香 金樱子各一两 胡芦巴四两 淫羊藿二两 贡沉香一两 枸杞子 蛇床子各二两 白檀香 肉桂各一两 菟丝子四两 川楝子二两 山萸肉三两 制附子

制乳香各一两 怀牛膝(盐水炒)二两 补骨脂二两 制没药一两

【用法】上为细末，将胶烔化，酌加炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】培元固本，补肾生精，健阳种子，延龄广嗣。

【主治】男子下元虚损，阳痿精冷，久无子嗣，腰背酸痛，一切先天禀受不足，少年斫伤过度之症。

34896 延龄广嗣酒

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】头红花半斤(入袋候用) 淫羊藿(去边茎，净洗)一斤(用羯羊油拌，入袋候用) 羯羊油(燥而肥者，用腰眼油一斤，切碎入锅内熬化候冷，拌淫羊藿) 厚杜仲二两(童便浸一日，用麸炒去丝) 天冬(去心)一两(酒浸软，晒干) 肉苁蓉一两(河水洗净，浸去鳞甲，晒干) 人参一两 砂仁五钱(姜汁拌炒) 破故纸一两(酒浸一宿，微火焙干) 川牛膝(去芦)一两(酒浸，晒干) 白豆蔻(去皮)五钱 真川附子一两(童便浸透，蜜水煮三炷香，晒干) 真川椒(有小卵者真，去子，焙干) 甘枸杞子四两 甘草(去皮)五钱(蜜炙) 地骨皮一两(蜜水浸一宿，晒干) 生地二两(乳浸，焙干) 熟地三两(九蒸九晒，焙干) 当归二两(酒洗，晒干) 白茯苓二两(牛乳浸透，晒干) 甘菊花一两(童便浸，晒干) 五加皮四两 白术四两(米泔水浸，土炒) 苍术四两(米泔水浸，晒干) 母丁香五钱(不见火) 广木香五钱(不见火) 沉香五钱(不见火) 白芍一两(酒炒) 麦冬(去心)一两(炒)

【用法】上药各为细末，入上好面曲内，拌匀，用元占米四斗，淘净，再浸一宿，如造酒法蒸透，取出候冷；用淘米第三次之极清米泔水二十斤，入锅内，加葱白一斤，切寸许长，入浆内滚三沸，去葱白，只用净浆，候冷和入蒸熟之米饭内，然后拌上好细曲米四

斤，粗曲米二斤，并药末一总和匀；将羊油所拌淫羊藿，同头红花二味，各入绢袋内，先置缸底，方将曲药拌匀米饭，拍实，上用干烧酒十斤盖之，春发三日、夏一日、秋二日、冬四日后，再加烧酒八十斤，将缸口封固，过二七日开看，木扒打转三四百下；如喜用甜者，加红枣三斤，同糯米三斤，煮成粥倾入，又从底打起，二三百下；再过二七日，即成功矣。将酒榨清，入坛内封固，重汤煮三炷香，埋土内三日。每日随量饮之。如做二酒，再用米二斗，面曲六斤，蒸法如前，下缸再入烧酒四十斤，封三七日榨出。如三次酒，只入烧酒四十斤，不用米曲矣。头酒系上好者，二酒三酒，可串和匀，入瓶封固，日常慢慢饮之，亦妙。

【功用】补气血，壮筋骨，和脾胃，宽胸膈，进饮食，去痰涎，行滞气，消宿食，避寒邪风湿，壮阳种子，延年益寿。

【主治】一切腰腿酸痛，半身不遂，肾精虚滑，小便急数，阳痿艰嗣，女人子宫寒冷，赤白带下，胎前产后诸疾。

34897 延龄至骨丹

《医统》卷九十三。为原书同卷“秘传神仙延寿丹”之异名。见该条。

34898 延龄护宝丸

【方源】《产乳备要》。

【组成】禹余粮石二两(烧，醋淬七遍) 龙骨 人参 桂 赤石脂 紫石英(研) 熟地黄 杜仲(去粗皮，锉碎) 桑寄生 续断 香白芷 芎藭 当归(锉，炒) 远志(去心) 金钗石斛(去根，锉，炒) 白茯苓(去皮) 阿胶(炒) 牡蛎 五味子 艾叶各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前温粥饮送下。

【主治】妇人血脏虚损，经候过多，每行时暴下不可禁止，因成崩中，连日不断，致五脏空虚，失色黄瘦，崩竭暂止，日少复发，不耐动摇，小劳辄极剧。

【备考】本方方名,《普济方》引作“延龄护宝丹”。

34899 延龄护宝丹

《普济方》卷三二九。即《产乳备要》“延龄护宝丸”。见该条。

34900 延龄固本丸

【方源】《良朋汇集》卷二引王世功集方。

【组成】人参 肉桂 当归 韭菜子(火酒煮) 枸杞 茯神 山药 菟丝饼 山萸肉 蛇床子 牛膝各二钱 熟地 何首乌(九蒸) 肉苁蓉(去甲,酒洗)各四两 大附子一个(童便浸煮) 鸽子蛋十个(去皮,炒成粉) 黄狗肾(内外一具,酥炙) 车前子一两 黑驴肾(连子一具,竹刀去筋,同肉苁蓉酒煮一日一夜) 鹿茸一对(酥炙)

【用法】上为细末,以驴肾、苁蓉捣膏为丸,如梧桐子大。每服百丸,黄酒或滚水送下。

【主治】五劳七伤,诸虚百损,颜色衰朽,形体羸瘦,中年阳事不举,精神短少,未至五旬,须发先白,并左瘫右痪,步履艰辛,腰膝疼痛,下元虚冷等症。

34901 延龄固本丸

《仙拈集》卷三。为《回春》卷四“延龄固本丹”之异名。见该条。

34902 延龄固本丹

【方源】《回春》卷四。

【异名】延龄固本丸(《仙拈集》卷三)。

【组成】天门冬(水泡,去心) 麦门冬(水泡,去心) 生地黄(酒洗) 熟地黄(酒蒸) 山药 牛膝(去芦,酒洗) 杜仲(去皮,姜酒炒) 巴戟(酒浸,去心) 五味子 枸杞子 山茱萸(酒蒸,去核) 白茯苓(去皮) 人参 木香 柏子仁各二两 老川椒 石菖蒲 远志(甘草水泡,去心) 泽泻各一两 肉苁蓉(酒洗)四两 覆盆子 车前子 菟丝子(酒炒烂,捣成饼,焙干) 地骨皮各一两半

【用法】上为细末,好酒打稀面糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心温酒送下。服

至半月,阳事雄壮;至一月颜如童子,目视十里,小便清滑;服至三月,白发返黑;久服神气不衰,身轻体健。

【功用】延龄固本,壮阳事,驻颜色,乌须发,强健身体。

【主治】五劳七伤,诸虚百损,颜色衰朽,形体羸瘦;中年阳事不举,精神短少;未至五旬,须发先白;并左瘫右痪,步履艰辛,脚膝疼痛,小肠疝气;妇人久无子息,下元虚冷。

【加减】妇人加当归(酒洗),赤石脂(煨)各一两。

34903 延龄育子丸

【方源】《医便》卷一。

【异名】延龄育子方(《医方考》卷六)。

【组成】天门冬(去心)五两 麦门冬(去心)五两 怀生地黄 怀熟地黄(肥大沉水者)各五两 人参(去芦)五两 甘州枸杞子(去梗) 菟丝子(洗净,酒蒸捣饼,晒干)五两 川巴戟(去心)五两 川牛膝(去芦,酒洗)五两 白术(陈土炒)五两 白茯苓(去皮,牛乳浸,晒)五两 白茯神(去皮心,人乳浸,晒)五两 鹿角胶(真者)五两 鹿角霜五两 柏子仁(炒,去壳)五两 山药(姜汁炒)五两 山茱萸(去核)五两 肉苁蓉(去内心膜)五两 莲蕊(开者不用)五两 沙苑蒺藜(炒)五两 酸枣仁(炒)二两 北五味子(去梗)二两 石斛(去根)二两 远志(去芦,甘草灯心汤泡,去心)二两

【用法】上各为末,将鹿胶以酒化开,和炼蜜为丸,如梧桐子大。每服男人九十丸,妇人八十丸,空心滚白汤送下。

【主治】少年斫丧,中年无子,妇人血虚,不能孕育。

【宜忌】忌煎、炙、葱、蒜、萝卜。此方南人服效。

【方论选录】《医方考》:男女媾精,乃能有孕。然精者,五脏之所生,而藏之肾者也。故

欲藏精于肾者，必调五脏，五脏盛而精生矣。是方也，人参、五味、天麦门冬补肺药也；获神、远志、柏仁、枣仁、生地补心药也；白术、茯苓、山药、石斛补脾胃也；熟地、枸杞、菟丝、巴戟、牛膝、茱萸、苁蓉、沙苑蒺藜补肝肾也；鹿角胶，血气之属，用之所以生精；角霜，莲须收涩之品，用之所以固脱。如是则五脏皆有养而精日生，乃能交媾而宜子矣。

【备考】上药二十四味，合二十四气；一百单八两，合一年气候之成数，为生生不息之妙。

34904 延龄育子丸

《何氏济生论》卷七。为《墨宝斋集验方》卷上“延龄育子方”之异名。见该条。

34905 延龄育子方

《医方考》卷六。为《医便》卷一“延龄育子丸”之异名。凡该条。

34906 延龄育子方

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】延龄育子丸、温胞脐真方（《何氏济生论》卷七）。

【组成】温胞脐（用桑白皮一两，褚实子一两、山楂、麦芽、神曲、补骨脂各一两 黑芝麻、黑豆各一合，以上八味用酒水各一半煎水；外用酒洗温胞脐，入煎酒水内，浸以软为度。后用竹刀切碎，去膜，用瓦一块，荷叶衬瓦上，上用瓦一块盖之，慢火烘干，碾细为末，听用） 巨胜子五两（酒洗净，分为四份：芝麻、萝卜子、糯米、白芥子各炒一份） 甘枸杞子（去梗蒂）四两 生地黄（肥大沉水者，酒洗净）五两 熟地黄（肥大沉水者，酒洗净）五两 麦门冬（去心）五两 白术五两（土炒一份，麸炒一份，神曲炒一份，枳壳炒一份） 白茯苓（去皮心膜，乳浸，晒干）五两 菟丝子（酒洗净，浸一昼夜，蒸，捣饼，晒干）四两 人参（去芦）五两 柏子仁（炒，去壳）五两 山药（姜汁浸，炒干）四两 山茱萸（去核）五两

肉苁蓉（去甲膜，酒浸，晒干）五两 远志（去芦，甘草灯心汤泡，去核）二两 何首乌（黑豆汁蒸一份，盐水蒸一份，米泔水浸一份，醋浸一份）八两 鹿角霜五分 川巴戟（酒洗，去心）四两 石菖蒲（去芦，微炒）二两 当归（酒洗，去芦梢）二两 五味子（去梗）二两 川牛膝（去芦梢，酒洗，晒干）四两 沙苑蒺藜（炒）五两 川黄连（去须，吴茱萸汤浸一份，木香汤泡一份，姜汁泡一份，酒浸一份，晒干）三两 酸枣仁（去壳皮，炒）二两

【用法】上药各为末。春加姜汁、竹沥；夏加香薷、木瓜、薏仁；秋加姜、茶、茱萸、木香；冬加紫苏、薄荷、苍术、厚朴煎汁，用蜜炼为丸。每服九十丸，滚白汤送下。

【功用】《何氏济生论》：轻身延年，润养平和，延龄育子。

【主治】《何氏济生论》：男子肾气虚弱，逢阴而痿，未媾先遗等症。

34907 延龄益寿丹

【方源】《摄生众妙方》卷二引季全真方。

【组成】何首乌四两（竹刀去皮，切片，用黑豆九蒸九晒，后用人乳拌一次） 当归一两（酒洗净） 知母二两（酒炒去毛） 川芎一两 杜仲（去粗皮，姜汁炒去丝）二两 白茯苓一两（去皮） 青盐一两 茯神一两（去皮心） 远志一两（去芦心，甘草煎水浸半日） 川椒一两（去目，出汗，留红皮，去白肉） 牛膝（酒洗） 朱砂一两（研碎，打零炒） 蜜一斤（炼过镜光止） 姜汁二两 黄柏二两（去皮，酒浸，日晒夜浸） 破故纸（酒洗） 小茴香（去土，盐水洗，炒黄） 天门冬（去心）一两 麦门冬（去心）一两 核桃肉四两（去油，炒黄） 旱莲四两（水煎五滚） 石菖蒲（盐洗将炒）一两 生地黄（酒洗）一两 熟地黄（酒洗）一两 石乳（去油）一两 川巴戟（酒洗净）一两 山精（用米泔水三两碗，浸半日，竹刀刮去粗皮四两，烂者不要，要选好的切碎，捣

烂放砂锅内，水三碗，煎至锅内汁干，取出，砂锅内浸要换米泔水一二次，然后酒煎成膏，同旱莲汁，姜汁拌诸药末。

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，早晚盐汤任下；不饮酒，白汤送下。一月见效。

【功用】存精固气，通达二十四经脉，三百六十骨节，满注一身毛窍，使肾水满而养精，精能养气，气能满而养神，神能满而养身。服之半月，精满气盈，元气壮胜，武火下降，相火自灭，阳消阴长，滋益肾水。能补丹田，滑泽皮肤，百战百胜，男人精冷绝阳而补兴，妇人胎寒绝阴而补孕。服之一月，白发返黑，面如童颜。

34908 延龄益寿丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯神五钱 远志肉三钱 杭白芍四钱（炒） 当归五钱 党参四钱（土炒焦） 黄耆三钱（炙焦） 野白术四钱（炒焦） 茯苓五钱 橘皮四钱 香附四钱（炙） 广木香三钱 广砂仁三钱 桂圆肉三钱 枣仁四钱（炒） 石菖蒲三钱 甘草二钱（炙）

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如绿豆大。朱砂为衣。每服二钱五分，白开水送下。

【功用】《古今名方》：甘温养神，养心安神，畅利气机，延年益寿。

【主治】思虑太过，伤及心脾两脏，食少体倦，大便不调，健忘怔忡，惊悸少寐，脾虚不能统血，妇女月经不调与带下。

【方论选录】本方参、耆、术、草、茯苓、茯神甘温益脾；当归、远志、枣仁、桂圆濡润养心；木香之外又加石菖蒲，香附，更可畅利气机，是妇人长寿好方。

34909 延龄聚宝丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】保命丹（《扶寿精方》）、延龄聚宝酒（《遵生八笺》卷十七）。

【组成】何首乌（去皮）赤白各一两 生地

黄（肥嫩者）八两 熟地黄（鲜嫩者，俱忌铁） 白茯苓（去皮） 莲蕊 桑椹子（紫黑者） 甘菊花（家园黄白二色） 槐角子（十一月十一日采，炒黄） 五加皮（真正者）各四两 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 茅山苍术（去皮，泔浸一宿，忌铁）二两五钱 石菖蒲（一寸九节者） 苍耳子（炒，捣去刺） 黄精（鲜肥者） 肉苁蓉（酒洗，去甲心膜） 甘枸杞（去蒂，捣碎） 人参 白术（极白无油者） 当归（鲜嫩者） 天麻（如牛角尖者） 防风（去芦） 牛膝（酒洗） 杜仲（姜汁浸一宿，炒断丝） 粉甘草（去皮，炙） 沙苑白蒺藜（炒，春去刺）

【用法】上锉，生绢袋盛，无灰醇酒九斗，瓷坛中春浸十日，夏浸七日，秋冬浸一十四日，取出药袋，控干，晒，碾为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，无灰酒送下，每五更服三小杯药酒，仍卧片时；年久亦然；但觉腹空，并夜坐服三杯，最益。

【功用】畅快百骸，潜消百病，强身壮体，聪耳明目，固齿坚牙。

【宜忌】服酒后，切忌生冷葱蒜，韭白，菜菔，鱼，脱落尘事，诚心修服无间。

【临证举例】养生 林以和，自三十九服本方至今六十四岁，宿病咸愈，身体强壮，须发不变，耳目聪明，齿牙坚固，精神胜常。

34910 延龄聚宝酒

《遵生八笺》卷十七。为《扶寿精方》“延龄聚宝丹”之异名。见该条。

34911 延寿酒药仙方

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【异名】养寿丹。

【组成】当归（去芦）、人参（去芦） 白茯苓（去皮） 草乌（去皮） 乌药 杏仁（去皮尖） 何首乌（去皮） 川椒（去目） 川乌（去皮尖） 五加皮 肉苁蓉（去皮尖） 枸杞子 砂仁各五钱（净） 木香 牛膝（去芦） 枳壳（去瓤） 干姜（火炮）虎

骨(酥炙黄色) 川芎 香附子(炒去毛) 香
白芷 厚朴(姜汁浸) 陈皮(去白) 白
术(炒) 独活 羌活 麻黄(去节) 官
桂(去皮) 白芍药 半夏(姜汁浸) 生
地 熟地 天麦门冬(去心) 五味子 防
风 细辛(拣净, 酥酒洗, 去芦) 沉香 苍
术(米泔浸, 去皮) 小茴香(盐炒黄) 各
三钱 破故纸(酒浸, 微炒) 核桃仁(汤
浸去皮) 甘草(火炙, 净) 各一两 红枣
肉 酥油各半斤 白沙糖一斤

【用法】上药用细绢袋盛之, 用烧酒一大坛, 浸药三日, 放在大锅内, 用汤浸坛, 煮两个时辰, 取起掘一坑, 埋三日, 出火毒取出。每日用酒一小钟, 病在上, 食后服; 病在下, 空心服。饮酒毕后, 将药滓晒干, 研为细末。用好花烧酒打糊为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心好酒送下。

【功用】补脾, 养丹田, 和气血, 壮筋骨, 益精髓, 身体轻健, 明眼目, 安五脏, 定魂魄, 润肌肤, 返老还童, 延年益寿。

【主治】男妇远年近日, 诸虚百损, 五劳七伤, 左癱右瘓, 偏正头风, 口眼歪斜, 半身不遂, 语言蹇涩, 筋脉拘挛, 手足麻木, 浑身疥疮, 肠风痔漏, 紫白癜风, 寒湿脚气, 膀胱疝气, 十膈五噎, 身体羸瘦, 腰腿疼痛, 四肢无力, 皮肤生疮, 耳聋眼昏, 下部虚冷, 诸般淋沥; 妇人经脉不调, 脐腹疼痛, 胁背酸胀, 黄瘦面肌, 口苦舌干, 呕逆恶心, 饮食无味, 四肢倦怠, 神鬼惊悸, 夜多盗汗, 时发潮热, 月事或多或少, 或前或后, 心中闷塞不通, 结成瘕块, 时作刺痛, 或子宫积冷, 气毒虚败, 赤白带下, 渐成虚瘵。

34912 延龄广嗣仙方

【方源】《纲目拾遗》卷八。

【异名】延龄广嗣丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】怀生地(酒制) 何首乌(酒煮) 旱莲草 鹿衔草(真者绝少, 用仙灵脾代之) 各三两 干山药(乳拌) 白茯苓(乳拌) 当归身(酒炒) 真青盐各一两 石

菖蒲 菟丝子 肉苁蓉(酒浸, 去膜) 补骨脂 五加皮 骨碎补 淮牛膝 白甘菊 原杜仲(酒炒断丝) 枸杞子 蛇床子 槐角子 金樱子 覆盆子 川黄连 建泽泻各五钱

【用法】上除去青盐, 锅内煎汁至半, 沥滓; 再将滓煎过半, 沥清, 冲和煎浓, 入马料豆三升七合, 女贞子一升七合, 煮数十滚; 将青盐研细, 倾入同煎, 以汁尽为度, 取豆晒干, 收贮瓷瓶。每服四钱, 清晨滚汤送下。

【功用】令人须发再黑, 齿落更生, 耳目聪明, 手足便利, 壮阳补肾, 固本還元, 多育子息, 多增年寿。

【主治】肾虚目暗, 上盛下虚者。

【备考】上二十四味, 俱合二十四气。

34913 延龄种子仙方

【方源】《济阳纲目》卷六十七。

【组成】当归身(酒浸) 川牛膝(酒浸) 生地黄(酒浸) 熟地黄(酒浸) 片苓(酒浸) 麦门冬(去心, 米泔水浸) 天门冬(去心, 米泔水浸) 山茱萸各四两 知母四两(盐酒各浸二两) 黄柏(去皮) 九两(蜜水、盐、酒各浸三两) 辽五味 川芎 山药 龟版(酥炙) 白芍药(酒浸) 各二两 人参六钱

【用法】上制如法, 晒干, 不犯铁器, 为极细末, 用白蜜三斤, 不见火炼, 将竹筒二节凿一窍孔, 去瓤, 入蜜在内, 并入清水一小盏和匀, 绵纸封固七层, 竖立重汤锅内, 柴火煮一昼夜, 和药为丸, 如梧桐子大。每服一百丸, 清晨盐汤, 晚酒送下。

【功用】延龄种子。

【宜忌】男妇皆然, 以服药之日为始, 忌房事一个月, 愈久愈妙。

34914 延年益寿不老丹

《摄生众妙方》卷二。为《扶寿精方》“還元丹”之异名。见该条。

34915 延年益寿不老丹

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】何首乌、赤白各一斤，(竹刀刮去粗皮，米泔水浸一宿，用黑豆三升，水泡涨，每豆一层，何首乌一层，重重铺毕，用砂锅竹甑蒸之，以豆熟，取首乌晒干；又如法蒸晒九次听用) 赤茯苓一斤(用竹刀刮去粗皮，为末，用盘盛水，将末倾入水内，其筋膜浮在水面者不用，沉水底者留用；湿团为块，用黑牛乳五碗，放砂锅内慢火煮之，候乳尽茯苓内为度，仍碾为末听用) 白茯苓一斤(制法同赤茯苓，亦湿团为块，用人乳五碗，放砂锅内照前赤茯苓，仍碾为末，听用) 怀山药(姜汁炒，为末)四两 川牛膝(去芦，酒浸一宿，晒干，为末)八两 甘枸杞子(去梗，晒干，为末)四两 杜仲(去皮，姜汁炒断丝，为末)八两 破故纸(用黑脂麻同炒熟，去麻不同，破故纸碾为末)四两 菟丝子(去砂土净，酒浸生芽，捣为饼，晒干，为末)八两

【用法】上药不犯铁器，称足和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤或酒送下。

【功用】乌须黑发，延年益寿，填精补髓。

【主治】阴虚阳弱无子者。

【宜忌】忌黄白萝卜、牛肉。

自

34916 自生饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归三钱 川芎二钱 枳壳(炒)二钱 益母草一钱 白芷六分 火麻仁(炒，去壳)一钱

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】临产生育艰难。

34917 自汗汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆二钱 白术一钱 山药八分 熟地二钱 枣仁一钱 五味五分 牡蛎一钱 玉竹二钱

【主治】自汗。

34918 自汗汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】黄耆 人参 白术 茯苓 当归 白芍 熟地各一钱 五味十粒 肉桂 甘草(炙)各五分 枣二枚

【用法】水煎，温服。

【主治】自汗属阳虚者。

34919 自沸汤

【方源】《秘传外科方》。

【组成】白矾五分 青黛三分 冢间贴背干 石灰三分

【用法】上为细末，研至无声为度，打和令匀。每服三钱，井花水半碗调，柳条搅千百下令匀，顿服之。厚衣盖覆良久，用葱豉汤入醋少许，极热服，少助药力，得汗面解。

【主治】疔疮。

34920 自适汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】黄耆 白芍 当归 茯苓各五钱 陈皮五分 半夏 羌活 甘草各一钱 柴胡二钱 桔梗五分

【用法】水煎服。

【主治】痹痛，胸背、手足、腰脊牵连疼痛不定，或来或去，至头重不可举，痰唾粘稠，口角流涎，卧则喉中有声。

34921 自汗主方

【方源】《红炉点雪》卷一。

【组成】黄耆(蜜炙)一钱 人参五分 白术(土炒)一钱 麻黄根八分 知母(蜜炒，去毛)一钱 酸枣仁(微炒，研碎)一钱 白茯苓(去皮)一钱 柏子仁(微炒，研碎)一钱 牡蛎(煨，研末)一钱 龙骨(煨，研末)五分 熟地黄一钱

【主治】气虚自汗，脉微而缓，或大而虚微者，或兼梦遗。

【加减】若觉阴火盛者，加玄参一钱；若兼伤风，卫气不与营气而自汗者，加桂枝三分，外以雌鸡猪肝羊胃作羹，牛羊脂酒服。

34922 自制坤方

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】大生地八钱 湖丹皮二钱 大麦冬六钱(去心) 香犀角六分 大白芍三钱(酒炒) 苏薄荷八分 鲜石斛六钱(铁皮者佳) 煨中黄三钱 京元参六钱 净银花三钱 川贝母三钱(去心) 陈海蜃一两(漂淡)

【用法】用鲜梨汁为引。甚则日服两剂。

【主治】喉间各症，肿势渐消，起白如腐而干，或灰黑色。

【加减】如胸闷舌腻，去大生地，换鲜生地，加减悉同乾方。

34923 自制乾方

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】香犀角六分(磨冲，入煎则用一钱，绵包，先入煎) 淡海藻三钱 鲜生地五钱 西秦艽一钱五分 赤芍药二钱(酒炒) 嫩钩藤三钱(迟入) 京元参四钱 陈海蜃一两(漂淡) 净银花三钱 人中黄三钱(煨成性) 川贝母三钱(去心) 飞滑石四钱

【用法】用鲜梨汁三两，分冲为引。轻则日服一剂；重则日服二剂。毒邪渐解，接服坤方。

【主治】喉口各症，不论肿溃。

【加减】如怕风表症甚者，加羚羊角、苏薄荷；热甚者，加石膏、知母；胸膈不通，加炒枳壳、炒莱菔子；热痰壅盛，加炒僵蚕、鲜竹沥；便结，加瓜硝金汁，或清宁丸；小便不通，加车前草，或灯草；结毒加土茯苓；酒毒加枳椇子；孕妇减香犀角、飞滑石、赤芍换白芍，加鲜石斛；如痰热内蒙，犀角亦可用。

34924 自然铜散

【方源】《普济方》卷三〇九引《圣惠》。

【组成】乳香 没药 苏木 降真香 川乌(去皮尖) 松明节各一两 地龙(去土，清油炒)半两 真血竭三钱 龙骨(生用)半两 自然铜(火煨，米醋淬)一两 土狗十枚(油浸，焙为干) (一方加水蛭半两，油炒)

【用法】上为末。每服五钱，用无灰酒送下，如病在上，食后服；病在下，空心服。

【主治】扑打，折骨损断。

34925 自然铜散

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】自然铜 密陀僧各一两(并煨，研) 甘草 黄柏各二两(并为末)

【用法】上为细末，收密器中。水调涂或干敷。

【主治】一切恶疮，及火烧、汤烫。

34926 自然铜散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】黄柏半两(厚者) 自然铜半两 细辛(去叶土)一分 胡椒四十九粒

【用法】上药并生为细末。每遇头疼、头风发时，先含水一口，后用药一字搐鼻中，左疼左搐，右疼右搐。搐罢吐去水，口咬箸头，涎涎出为度。

【主治】头风疼痛至甚。

34927 自然铜散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】自然铜(煨通红，醋淬七次，放湿土上月余用) 乳香 没药 当归身 羌活各等分

【用法】上为散。每服二钱，醇酒调下，一日二次。骨伤，用骨碎补半两，酒浸，捣绞取汁冲服。

【主治】跌扑骨断。

34928 自然铜膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】自然铜(煨，末)31克 硼砂末15克 凡士林156克

【用法】调软膏。外用。

【主治】神经性皮炎。

34929 自拟降压汤

【方源】《古今名方》引《郑侨医案选》。

【组成】菊花12克 白芍 玄参 怀牛膝各15克 炒黄芩9克 石决明30克 甘草6克

【功用】平肝镇静，滋阴潜阳。

【主治】肝阳上扰之眩晕头痛，高血压病。

【加减】若血压过高，加代赭石、生地；头痛甚，加蔓荆子、白蒺藜；胃脘烦闷，加竹茹；目赤痛，加龙胆草、草决明；鼻衄，加藕节。

34930 自拟前胡汤

【方源】《古今名方》引《郑侨医案选》。

【组成】前胡 桑叶 知母各 12 克 麦冬 黄芩各 9 克 金银花 12 克 杏仁 甘草各 6 克

【功用】清热化痰，止咳平喘。

【主治】肺热喘咳证。咳嗽或哮喘，痰黄粘稠，舌苔黄或兼腻，脉数。

【加减】若痰中带血，加藕节；惊悸不安，手足颤动者，加钩藤、蝉蜕、僵蚕；小儿麻疹后喘咳，加板兰根；痰火犯肺，加枇杷叶、款冬花。

34931 自制三仙丹

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】水银 明白矾（研） 火消（研）各等分

【用法】先将消、矾末，研匀，入铁锅内，杵三小坛，再将水银分置坛中，上覆大碗，周围合缝处，以棉皮纸捻粗条，用浆水浸湿，紧搽周围缝口，上用沙泥盖好，总之不令泄气，碗底上再压小秤锤，然后用炭火烧三炷香，先文后武，不可太旺，恐绿烟腾起，即无用矣。

【功用】去腐生新。

【主治】咽喉腐烂，烂肉未清，脓水未净者。

34932 自制坚阴汤

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】小川连六分 北秦皮一钱五分 川柏炭一钱 炒白芍二钱（酒炒） 白头翁一钱五分（绵包） 车前子一钱五分（绵包）

【主治】喉症，大便如注，及各种痢疾。

【加减】如治水泻，不必加味；治痢症腹痛，加煨木香一钱（盐水炒）；胸闷加紫厚朴一

钱。

【备考】原书治上症，本方与自制芙蓉截流丸间服。

34933 自制离骨丹

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】刺猬皮（一张，连刺按新瓦上焙老黄色）

【用法】上为细末。每服三钱，用白糖炒米粉拌食；或用米浆泛丸亦可。

【主治】骨槽风；各种多骨疽，顽骨不出，老脓成管者。

34934 自制霹雳丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】桂枝三两 川椒二两五钱 良姜一两五钱 雄黄二钱五分 附子一两五钱 薤白头二两 槟榔一两 五灵脂一两 干姜一两五钱 苡仁二两五钱 小茴香二两 公丁香二两 防风 防己各一两五钱 乌药一两五钱 木香二两 草澄茄二两 草果一两 吴萸二两 菖蒲一两 细辛一两

【用法】上药并生为末，水为丸。每服三钱，开水送下。小儿一钱半。

【主治】一切吐泻，冷气麻痧。

【宜忌】孕妇忌服。

34935 自焚急救汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】炒梔子五钱 白芍五钱

【用法】煎汤服。

【主治】心痛暴亡属火者。

34936 自拟藕节地黄汤

【方源】《古今名方》引《郑侨医案选》。

【组成】生藕节 30 克 生地黄 玄参各 15 克 麦冬 12 克 甘草 3 克

【功用】养阴清热，凉血止血。

【主治】热伤阳络衄血证。

【加减】若属湿热病久，阴亏热邪盛者，加白芍、丹皮、炒黄芩、黑栀子；久病已阴亏，孤阳独炽者，加龙骨、牡蛎、大蓟、小蓟。

34937 自制四逆承气汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】淡附片二钱 干姜一钱 炙甘草五分 厚朴一钱五分 麸炒枳实二钱 玄明粉三钱 酒蒸大黄六钱 乌梅一枚 川连一钱(酒炒) 川椒三十粒(炒去汗)

【用法】水煎服。

【主治】干霍乱症。

34938 自制芙蓉截流丸

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】清膏烟三钱 陈米饭三两

【用法】上药共捣如泥,匀搓六十丸,晒干。每服一丸,用饭蒸荷叶煎汤送下;气痛用广玉金煎汤送下。

【主治】喉症,大便水泻,并各种气痛腹泻。

【宜忌】服药时,勿饮浓茶。

34939 自制吹鼻通关散

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】猪牙皂角一两(打碎) 丝瓜子一两二钱 北细辛三钱 干蟾酥五分

【用法】先将牙皂、丝瓜子用新瓦文火炙干存性。共为细末,再加上好大梅片六分,杵匀。瓷瓶收贮吹鼻用。

【功用】吹鼻连连得嚏,喉闭能开,喉蛾能消,牙紧亦松。

【主治】双单乳蛾,喉闭牙紧,各种气闭。

34940 自制经验大枣汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】麦冬一钱 石菖蒲六分 浮小麦六合 枣仁一钱半 茯神一钱半 天冬一钱 柏子仁三钱 大枣十枚 甘草六分 白芍一钱 玄参五钱 黄芩一钱 竹茹一钱 当归一钱

【主治】妊娠脏躁。

34941 自制保赤扶元散

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】人参须一钱五分(另炖冲) 熟枣仁一钱五分 益智仁一钱(煨,盐水炒) 炒白芍一钱五分(酒炒) 真手术一钱五分 白茯苓三钱

【用法】糯稻根须六钱,陈皮一钱为引。

【主治】幼孩腹中水泻不止,完谷不化,脾肾两虚,关闸滑脱,内风欲动,将成慢惊。

血

34942 血见宁

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】大蓟根膏 白及粉 槭木叶膏

【用法】粉剂。每服3克,一日三次。

【功用】止血。

【主治】消化道出血,肺出血。

34943 血气汤

《医学纲目》(世界书局本)卷十。即《保命集》卷下“血风汤”。见该条。

34944 血分丸

《病机沙篆》卷五。为《永类铃方》卷十五“血分椒仁丸”之异名。见该条。

34945 血风丸

《医学入门》卷七。即《保命集》卷下“血风汤”改为丸剂。见该条。

34946 血风汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】血风散(《万氏家抄方》卷五)。

【组成】秦艽 羌活 防风 白芷 川芎 芍药 当归 地黄 白术 茯苓各等分

【用法】上为细末。一半作散,温酒调下;一半炼蜜为丸,如梧桐子大,每服五七十丸。

【主治】产后诸风,痿挛无力。

【备考】本方方名,《医学纲目》(世界书局本)引作“血气汤”。制成丸剂,名“血风丸”(见《医学入门》)。《活法机要》有半夏、黄耆。

34947 血风散

《万氏家抄方》卷五。为《保命集》卷下“血风汤”之异名。见该条。

34948 血风散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】烟胶 红土各四两 水龙骨二两

【用法】上各为细末,和匀。桐油调敷,间日一换,葱水洗。

【主治】远年近日烂腿,血风等疮。

34949 血灰散

【方源】《济阴纲目》卷八十九。

【组成】石灰七升 新猪血一斗

【用法】上为丸，熟烧之，破，更丸，烧三遍止，为末。敷上。

【主治】杖疮。

34950 血极膏

《医学纲目》卷三十四。为方出《儒门事亲》卷十五，名见《卫生宝鉴》卷十八“血竭膏”之异名。见该条。

34951 血余丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】血余八两 阿胶一斤（面炒成珠）

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，清汤送下。

【主治】便血并一切血症。

34952 血余散

【方源】方出《圣惠》卷三十五，名见《圣济总录》卷一二四。

【组成】乱发（烧灰）

【用法】上为细末。每服一钱，粥饮调下。

【主治】吐血，衄血，妇人崩漏，产后尿血，头发鳃喉。

①《圣惠》：食中发咽不下。②《直指》：吐血、衄血。③《济阴纲目》：产后小便出血。④《青囊秘传》：崩漏下血不止。

【备考】《直指》：衄者，更以少许吹入鼻。

34953 血余散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】乱发一两

【用法】烧灰，细研。每服一钱，以温水调下。

【主治】①《圣惠》：吐血不止。②《普济方》：心衄，或内崩，或舌上出血如髻孔者，及小便出血，汗血。

34954 血余散

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】乱发灰二钱匕 大麻根（切）一两

【用法】上先将麻根以水一盞，煎至半盞，

去滓，下乱发灰，搅匀，食前温服。

【主治】伤寒，小肠不通，便如血淋。

34955 血余散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】乱发灰一钱 人中白半两 麝香半钱

【用法】上为细末。每用一小豆许，吹入鼻中。

【主治】鼻衄久不止。

34956 血余散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】乱发 猪脂

【用法】以乱发烧灰研细，和猪脂敷之。

【主治】燕口疮，生口吻两角。

34957 血余散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】头发（烧存性）

【用法】上为细末。每服二钱，白茅花、灯心各一握煎汤调下。

【主治】诸血下。

【加减】血淋者，妇人发更好，加海金沙佐之。

【宜忌】切不可用百草霜、莲蓬止涩之剂。

34958 血余散

【方源】《医学纲目》卷十四。

【组成】乱发（皂角水洗净，晒干，烧灰）

【用法】上为末。每服二钱，以茅根、车前叶煎汤送下。

【主治】血淋，内崩，吐血，舌上出血、便血。

34959 血余散

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】血余半两（烧灰） 鸡冠花根 柏叶各一两

【用法】上为末。临卧温酒调下二钱，来晨酒一杯投之。

【主治】泻血，脏毒。

34960 血余散

【方源】《保婴撮要》卷十。

【组成】男子乱发一握（烧存性）

【用法】上为细末。以绢袋盛置，干扑之。

【主治】小儿汗不止。

34961 血余散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】发灰二钱 生蒲黄 生地黄 赤茯苓 甘草各一钱

【用法】水煎，调发灰，空心服。

【主治】血淋。

34962 血余散

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】真血余炭一钱 真坎悉一条（漂净，焙炭，研） 血珀五分 腰黄二钱 花龙骨二钱 上梅片四分

【用法】上药各为细末，和匀。吹之。

【主治】阴虚喉痹。

34963 血余膏

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】壮人头发 猪毛 羊毛 鸡毛 鹅毛（各洗净，晒干，鸡毛、鹅毛须去中心硬梗）各净四两 猪板油（去膜，净）二两 桐油二两 麻油二十两 白川占二两 龙脑香 麝香各一钱

【用法】先以三种油，入龟版五两，燂二十分钟，再入诸毛灼焦枯，离火片刻，细绢滤净滓，文火再煮，入川占、脑、麝，以飞净黄丹六两调成膏，油纸摊贴。可再加三灵丹掺药。此油炼成，亦可少加锌养粉同调，用西法棉花棉纱摊贴。

【主治】恶疮久不收口，及臁疮多年不收，瘰癧久溃，疮口多水无脓者。

34964 血没散

《赤水玄珠》卷七。为《卫生家宝产科备要》卷五“血竭散”之异名。见该条。

34965 血郁汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】桃仁（去皮） 红花 青黛 川芎（抚芎亦可） 香附

【主治】①《丹溪心法》：血郁。②《赤水玄珠》：金疮出血。

【备考】本方为原书“六郁汤”之一。本方

方名，《玉机微义》引作“越鞠丸”。③方中青黛，《保命歌括》作“山梔”。

34966 血郁汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】香附（童便制）二钱 牡丹皮 赤曲 川通草 穿山甲 降真香 苏木 山楂肉 大麦芽（炒，研）各一钱 红花七分

【用法】水、酒各一半煎，去滓，入桃仁（去皮）泥七分，韭汁半盏和匀，通口服。

【主治】七情郁结，盛怒叫呼，或起居失宜，或挫闷致瘀，一应饥饱劳役，皆能致血郁，其脉沉涩而芤，其体胸胁常有痛如针刺者。

34967 血结膏

【方源】《理渝》。

【组成】槐枝 柳枝各二十七寸 香油十两 当归 白芷 细辛 知母 木鳖仁 五倍子各五钱 松香十两 乳香 没药各五钱 明雄四钱 真血竭三钱 轻粉二钱 麝一钱

【用法】搅匀，摊贴。臂痛贴臂，腿痛贴腿。如贴腿痛，贴后用热汤露脚指在外，从痛处淋洗至下，自用布蘸热汤罨于膏上蒸之令热，则其痛渐移下骨节间，然后如法贴之，逐节赶下至脚腕，再贴足心，发一泡，出黄水愈。

【主治】痛痹血结及痈疽等。

34968 血晕饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】归尾 川芎 山楂 益母 五灵脂各等分

【用法】水煎，加童便一杯服，或红花一撮，酒煎，入童便服。

【主治】产后血晕。

34969 血崩丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】煅龙骨一两 赤石脂一两 血余一两 蒲黄灰一两 棕灰一两 蒲节灰二两 艾叶灰一两 乌梅灰二两 柏叶灰二两 莲房灰一两 明矾三两 旧黄绢灰一两 木贼灰一两 当归三两 桃仁一两 乌贼骨

灰一两 白芍二两 党参三两 山药二两
新棉花灰一两 赤松皮灰一两

【用法】醋煮糯米饭，捣和药为丸服。

【主治】妇人血崩不止。

34970 血淋散

【方源】《续名家方选》。

【组成】无患子二钱 白沙糖一钱

【用法】上锉，水煎服。

【主治】血淋。

34971 血痢汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术 条芩各一钱 苍术 黄连
各一钱五分 干姜 黄柏 当归 滑石各八
分 乌梅二个

【用法】水煎，食前服。

【主治】血痢。

34972 血痹汤

【方源】《成方切用》卷五。

【组成】人参 黄耆 肉桂 当归 川芎
代赭石 羌活

【主治】血痹多惊，筋脉挛急。

【方论选录】厥阴肝脏，所主者血也，所藏者魂也；血痹不行，其魂自乱。今不通其血，而但治其惊，此不得之数也。故用人参以开血为君；黄耆、肉桂、当归、川芎为臣；以代赭石之专通肝血者，佐参、耆之不逮，少加羌活为使。盖气者，血之天也，气壮则血行；然必以肉桂、当归大温其血，预解其凝泣之势；乃以代赭之重坠，直入厥阴血分者，开通其瘀壅；而以羌活引入风痹之所，缘厥阴主风，风去则寒湿自不存尔。

34973 血瘀散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】乱发一斤（洗净，烧灰）

【用法】上为散。生地黄汁调下三钱。

【主治】产后溺血，脉涩者。

【方论选录】产后热伤冲任，血不归经，故血从前阴而出，全无疼痛，与溲溺自分，谓之溺血。发生头颅，乃血之余气，故血余，专

走血分，烧灰存性，方能去瘀生新，以治血溢妄行之溺血；为散，生地汁调下，足以壮水凉血而制湿，俾血无热扰，则血室清宁，而血无妄行之患，安有溺血之不痊乎？

34974 血溢汤

【方源】《普济方》卷一三四。

【组成】黄药二两 甘草（炙）一两

【用法】上以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【主治】少阴病，气厥发衄者。

34975 血竭丸

【方源】《医方类聚》卷九十五引《经验秘方》。

【组成】没药 当归 乳香 血竭各一两
甜瓜子四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十至九十丸，空心温酒送下。

【主治】男女风湿、酒湿，腰腿疼痛。

34976 血竭丸

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】鳖甲（去裙襕，醋炙）半两 人参
半两 当归（去毛）一两 木香半两 青皮
（去白）一分 枳壳（炒）三棱各半两 没
药 血竭（研） 槟榔各一分 半夏二钱
（生用）

【用法】上为末，醋煮而糊为丸，如绿豆大。每服十丸，白汤送下，不拘时候。大腑利时则止，若未利，加至五十丸，以利为度。但服此药，令气块消去，不可骤然多服，是积久消磨，每日只一二服。

【主治】一切气块刺痛，暮夜即作，不可忍。

34977 血竭丹

《医林绳墨大全》卷七。为原书同卷“大红丸”之异名。见该条。

34978 血竭汤

《伤科方书》。为《伤科补要》卷四“血竭散”之异名。见该条。

34979 血竭散

【方源】方出《经效产宝》卷中，名见《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归八分 桂心 芍药 蒲黄 麒麟竭各六分 延胡索四分

【用法】上为散。每服两钱匕，空心温酒调下。

【主治】产后血瘀痛，脐下胀，不下食。

34980 血竭散

【方源】《博济》卷五。

【组成】青州枣二十个(烧为灰) 干地黄半两(别杵为末) 血竭(炒)二钱半

【用法】上为细末。以津唾调贴疮上。

【主治】瘰癧已破，脓水不止者。

34981 血竭散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】血竭一两 铅丹半两(炒紫色)

【用法】上为散。先以盐汤洗疮后，贴之。

【主治】一切不测恶疮，年深不愈。

34982 血竭散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】硃砂 血竭 没药 桂 木香 朱砂各一分 海马一对 干漆一两 虻虫二十个 龙脑一钱 水蛭十四个 当归 硼砂 阿魏各一大钱

【用法】上为细末。每服一钱，冷水调下。如产后血上冲，口鼻出血，用童便调服三钱。

【主治】妇人血气，产后渴燥，一切血邪乱语，眼如血袋，及血上冲，口鼻血出。

34983 血竭散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】血竭(须真好者)

【用法】上为细末。用自津唾调涂。频用为妙。

【主治】痔漏疼痛不可忍者。

34984 血竭散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【异名】没药散(《朱氏集验方》卷十引《梁氏总要方》)、夺命散(《云岐子保命集》卷下)、夺命丹(《校注妇人良方》卷十八)、血没散(《赤水玄珠》卷七)。

【组成】血竭 没药(剪碎)各等分

【用法】上为细末。每服二钱，用小便合和

细酒大半盏，煎一二沸，温调下。才产下一服，上床良久再服。其恶血自循下行，更不冲上。

【主治】产后败血上冲，健忘，气喘，及胎衣不下。

①《卫生家宝产科备要》：产后百疾。②《云岐子保命集》：产后血晕入心经，语言颠倒，健忘失志。③《准绳·类方》：产后败血冲心，胸满上喘。④《医林改错》：胎衣不下。

34985 血竭散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】血竭 牡蛎灰 发灰各等分

【用法】上为细末。入麝香少许，自以津唾调敷；如更痛，研杏仁膏调药敷之。

【主治】痔漏痛不可忍。

34986 血竭散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】真血竭(研)

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调服。病势危笃者，尽二两可活一人。宜久蓄之，以备急用。

【主治】产后败血冲心，胸满气喘，命在须臾。

34987 血竭散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】血竭 石胆 乳香 五灵脂 密陀僧各等分

【用法】上药各为极细末，再同研匀。每用一字，指蘸涂贴牙病处，候少时，用温荆芥汤微漱，有津吐去，误咽不妨。

【功用】牢牙定痛。

【主治】牙根疔闷，连槽骨疼痛，久而不愈。

34988 血竭散

《瑞竹堂方》卷四。为《御药院方》卷一“麒麟竭散”之异名。见该条。

34989 血竭散

【方源】《普济方》卷一九〇。

【组成】人参 血竭 款冬花 鹅管石 甘草各等分

【用法】上为极细末。先取生姜汁，另以盏

盛之，以芦管微微吹药末，入喉中，次吸生姜汁少许送下。

【主治】一切伤力咯血。

【宜忌】忌湿面、鱼腥、生冷之物。

34990 血竭散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【异名】五味血竭散（《便览》卷一）。

【组成】寒水石（烧熟，细研）四两 龙骨一两 蒲黄二两 血竭五钱 枯矾一两

【用法】上为末。每用少许，贴在疮口上，纸封。

【主治】①《丹溪心法附余》：牙疳并恶疮。②《便览》：满口生疮，牙肿，两夹腮内肿，及腭疳疮。

34991 血竭散

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】蛤蚧一对（蜜炙） 诃子三钱 血竭一钱

【用法】上为末。以生姜汁与蜜等分熬膏，入前末，调三五分服。

【主治】劳嗽见血，诸治不效。

34992 血竭散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】血竭四两 大黄一两二钱 自然铜（醋煅七次）二钱

【用法】上为细末。以生姜汁调涂。

【主治】杖疮夹伤。

34993 血竭散

【方源】《伤科补要》卷四。

【异名】血竭汤（《伤科方书》）。

【组成】血竭 发灰 茅根 韭根各等分

【用法】童便、酒煎服。

【主治】跌打血从口出。

34994 血竭散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】血竭二钱 熊胆五分 麝香二厘

【用法】上为末。甘草汤送下。

【主治】小儿乳蛾，将成脓，欲溃不溃，阻塞气隧。

34995 血竭膏

【方源】方出《儒门事亲》卷十五，名见《卫生宝鉴》卷十八。

【异名】血极膏（《医学纲目》卷三十四）、大黄膏（《医学入门》卷八）、将军丸（《济阴纲目》卷二）、醋大黄丸（《胎产心法》卷中）。

【组成】川大黄

【用法】上为末，醋熬成膏。就成如鸡头子大，作饼子，酒磨化之。

【主治】①《儒门事亲》：妇人血枯。②《胎产心法》：胞衣不下，恶血冲心，并腹中血块冲逆作痛；及女人干血有热，脉弦数者；亦治经闭。

34996 血竭膏

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】当归（酒洗） 白芷 大黄（生用） 黄连 黄柏 木鳖子（去壳） 皂角 汉椒 苦参 杏仁 露蜂房各一两 乳香 没药 血竭各三两 乱发（男子者）一两 黄丹（水飞细者，炒，晒）六两 麻油八两

【用法】上除乳、没、血竭，余入油煎焦，去滓入发溶化，下丹，将柳枝不住手搅，候软硬得中，入乳香等搅匀，即成膏。

【主治】痈疽。

【备考】方中汉椒、苦参二味，及黄丹麻油用量原脱，据《医方类聚》补。

34997 血竭膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】真虢丹二两 滴乳香一分（细研） 没药一分（细研）

【用法】上用麻油四两熬令沸，先下虢丹，用柳枝不住手搅，直至色变，滴水中成膏为度；然后下没药、乳香，再令沸，放冷处。每用时以白纸摊药，大如疮根贴之。本方用血竭恐难得，可以没药代之。如得血竭，虢丹四两可对血竭一分，滴乳一分，麻油五两。

【主治】痈疽发背。

34998 血竭膏

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】血竭 轻粉 干胭脂 密陀僧 乳香 没药各等分

【用法】上为细末。以冷水洗净拭干，以猪脂溶调，搽在红纸上贴之。

【主治】杖疮。

34999 血醒散

【方源】《朱氏集验方》卷十三引《世验方》。

【组成】生地黄 苈根（去皮，或苈烧灰）各等分

【用法】上为末。半酒、半男童便，急滤药汁，调童便、酒灌之。仍用生鸡、鸭血调同服尤佳。

【主治】打扑伤损。

35000 血鳖串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】沉香二钱五分 木香六钱 红花五钱 大茴五钱 小茴一两 尖槟榔一两 扁蓄五钱 瞿麦五钱 巴霜五钱

【用法】上为末。每服三钱，酒送下。

【主治】胃气腹痛，经水闭。

35001 血瘕丸

《类证治裁》卷三。为《杂病源流犀烛》卷十四“沈氏血瘕丸”之异名。见该条。

35002 血瘕丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】血竭一两 干漆一两 没药一两 琥珀屑一两 三棱一两 莪术一两 水红子一两 鸡内金一两 阿魏一两 归尾二两 蜚虫二两 槟榔一两 泽兰一两五钱 礞砂六钱 桃仁二两 生卷柏一两

【用法】上为末。以大黄一两五钱，醋煮汁为丸。温酒送下。

【主治】男妇血瘕块。

【备考】贫者去琥珀、礞砂。

35003 血分椒仁丸

【方源】《永类铃方》卷十五。

【异名】血分丸（《病机沙篆》卷五）。

【组成】椒仁 甘遂 续随子（去皮，研）附子 郁李仁 黑牵牛 五灵脂（碎，炒）

当归 吴茱萸 延胡索各半两 芫花（醋浸一宿，炒黄） 石膏各一分 信砒 胆矾各一钱 斑蝥（糯米炒黄，去米） 芫青各三十枚（去头足翅，糯米炒黄）

【用法】上为细末，糊为丸，如豌豆大。每服一丸，橘皮汤送下。

【主治】妇人肿满，小便不通。由经血不通，遂化为水。

35004 血分葶苈丸

《妇科撮要》卷上。为《全生指迷方》卷四“葶苈丸”之异名。见该条。

35005 血府逐瘀丸

《全国中药成药处方集》（沈阳方）。即《医林改错》卷上“血府逐瘀汤”改为丸剂。见该条。

35006 血府逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】当归 生地各三钱 桃仁四钱 红花三钱 枳壳 赤芍各二钱 柴胡一钱 甘草二钱 桔梗一钱半 川芎一钱半 牛膝三钱

【用法】水煎服。

【功用】《方剂学》：活血祛瘀，行气止痛。

【主治】①《医林改错》：头痛，无表症，无里症，无气虚、痰饮等症，忽犯忽好，百方不愈者；忽然胸疼，诸方皆不应者；胸不任物；胸任重物；天亮出汗，用补气、固表、滋阴、降火，服之不效，而反加重者；血府有瘀血，将胃管挤靠于右，食入咽从胸右边咽下者；身外凉，心里热，名灯笼病者；昏闷，即小事不能开展者；平素和平，有病急躁者；夜睡梦多；呃逆；饮水即呛；不眠，夜不能睡，用安神养血药治之不效者；小儿夜啼，心跳心慌，用归脾、安神等方不效者；夜不安，将卧则起，坐未稳又欲睡，一夜无宁刻，重者满床乱滚者；无故爱生气，俗言肝气病者；干呕，无他症者；每晚内热，兼皮肤热一时者。②《方剂学》：胸中血瘀，血行不畅。胸痛、头痛日久不愈，痛时如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或饮水即呛，干呕，或内热

昏闷,或心悸怔忡,或夜不能睡,或夜寐不安,或急躁善怒,或入暮潮热,或舌质黯红,舌边有瘀斑;或舌面有瘀点,唇暗或两目黯黑,脉涩或弦紧。现用于冠状动脉硬化性心脏病的心绞痛,风湿性心脏病、胸部挫伤与肋软骨炎之胸痛,以及脑震荡后遗症之头痛头晕,精神抑郁等证,确有瘀血在内者。

【方论选录】①《医林改错注释》:血府逐瘀汤用桃仁、红花、川芎、赤芍活血祛瘀,配合当归、生地活血养血,使瘀血去而又不伤血。柴胡、枳壳疏肝理气,使气行则血行;牛膝破瘀通经,引瘀血下行。桔梗入肺经,载药上行,使药力发挥于胸(血府),又能开胸膈滞气,宣通气血,有助于血府瘀血的化与行,与枳壳、柴胡同用,尤善开胸散结,牛膝引瘀血下行,一升一降,使气血更易运行;甘草缓急,通百脉以调和诸药。②《方剂学》:本方是王清任用以治疗“胸中血府血瘀”所致诸证,由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。胸肋为肝经循行之处,瘀血在胸中,气机阻滞,则肝郁不舒,故胸肋刺痛,日久不愈,急躁易怒。瘀久化热,气郁化火,故内热昏闷,或心悸失眠,或入暮潮热;上扰清窍,则为头痛;横犯胃府,胃失和降,则干呕呃逆,甚则饮水则呛。至于唇、目、舌、脉所见,皆为瘀血之征。故治当活血化瘀,兼以行气解郁。方中桃红四物汤活血化瘀而养血,四逆散行气和血而舒肝,桔梗开肺气,载药上行,合枳壳则升降上焦之气而宽胸,尤以牛膝通利血脉,引血下行,互相配合,使血活气行,瘀化热消而肝郁亦解,诸症自愈。

【临证举例】①胸不任物《医林改错》:江西巡抚阿霖公,年七十四,夜卧露胸可睡,盖一层布压则不能睡,已经七年,召余诊之,此方五付痊愈。②胸任重物《医林改错》:一女二十二岁,夜卧令仆妇坐于胸方睡,已经二年,余亦用此方,三付而愈。③脑动脉硬化性头痛眩晕《湖北中医杂志》(1983;5:

17);自1976年至1982年间,收治32例患者,均经脑血流图、眼底检查、血脂测定,并结合病史,排除其他病因的头痛眩晕。本组男25例,女7例。年龄35~39者4例,40以上者28例。症状以头痛眩晕为主,伴有失眠健忘,四肢麻木。其中显效12例(头痛眩晕消失,其他症状骤减或消失,脑血流图检查有明显改善或正常);有效17例(头痛基本控制,眩晕偶发且微,其他症状减轻,脑血流图亦有改善);无效3例。④顽固性失眠《新医药学杂志》(1977;11:32):患者男性,42岁,顽固失眠2年余,伴头晕且痛,下肢常麻木。曾用氯丙嗪、异丙嗪、巴氏合剂等多种镇静安神剂治疗,初虽有效,久则无效。中药已用过归脾、交泰、温胆之类亦无效。患者面色黧黑无华,神疲,皮肤甲错,胸背有汗斑,舌质略紫,舌苔黄腻,脉弦细有力。治用本方加磁石。服1剂后患者精神反而兴奋,难以入眠,第2剂始见效,7剂后头晕头痛明显好转,原方去磁石续服14剂。每日能安眠,其他症状亦渐消失。后以补心丹调理。⑤呃逆《浙江医学》(1963;2:3):女,24岁,农民。1962年2月15日门诊。当时呃逆阵作,频频不绝,声响可达户外。自诉四月前因劳动时,突然胸闷气逆刺痛,翌日即发此病,曾经当地中西医诊治无效。患者呃逆虽久,体力尚未衰惫,脉弦面有力,二便通调,惟呃逆时,气逆上冲,胸肋刺痛痞闷,难以抑制而已。予断为:血瘀气滞。即处血府逐瘀汤全方加旋覆花、代赭石,连服三剂。至2月20日复诊,据述服该方一剂后,即觉胸部舒畅,无刺痛气冲之苦,呃逆亦顿减十之七八;二剂后,呃逆停止,三剂痊愈。后以他药善后。⑥原发性痛经《浙江中医杂志》(1984;6:270):于1981年4~8日,应用本方治疗原发性痛经70例。年龄17~37岁,以21~30岁为最多。病程6个月至14年。已婚18例,均未孕;未婚52例。经治后,34例痊愈(腹痛消失,伴有症状亦随之消失;未孕者已

孕); 31 例好转(腹痛减轻, 时间缩短, 伴有症状缓解); 五例无效。⑦乳腺增生病《天津中医》(1986; 5: 18): 用本方治疗乳腺增生病 104 例, 年龄 17~51 岁。其中 20~40 岁 85 例, 占 81.7%; 病程 1 个月~7 年, 其中一年之内者 59 例, 占 56.7%, 1~5 年 31 例占 29.8%, 5 年以上 14 例, 占 13.5%。双侧发病者 43 例, 单侧 61 例。经前乳胀痛者, 59 例; 与月经无关者 45 例。本组服药为 12~45 剂, 多为 20~30 剂。治愈(乳块消失) 68 例, 占 65.4%; 好转(乳块缩小 $\frac{1}{2}$ 以上) 27 例, 占 26%; 无效 9 例, 占 8.6%, 总有效率为 91.4%。⑧小儿瘀血发热《新中医》(1976; 5: 55): 例一, 作者之子 2 岁时不慎碰伤头部, 两天后突然发热, 微咳, 体温 38.6℃, 有时升至 39.1℃, 苔薄白, 夜间惊悸不安, 指纹隐隐不显, 服用西药无效。即予本方, 晚上果然热退, 睡眠正常。原方再服一剂, 痊愈。例二: 高某某, 女, 12 岁。因玩秋千碰伤额部, 两天后发热不退, 夜间加重, 用退热药无效。体温 38.7℃。拟用本方, 一剂后热退病愈。

【现代研究】①抗凝血作用《中华内科杂志》(1977; 2: 79): 本方因具有理气活血功效, 故用于各种病因的感染、休克、创伤、大面积烧伤、外科大手术后、输血反应、子瘤、死胎、胎盘滞留等并发的急性血管内弥漫性凝血(DIC)。实验证明, 本方不能延长血液复钙时间, 也不能延长凝血酶原时间和凝血酶凝固时间, 但能抑制 ADP 所致血小板聚集, 并能促进血小板解聚, 因此有助于血瘀患者血液学异常的改善。此外, 对于由门静脉注入二氧化钛封闭肝脏网状内皮系统的家兔, 其吞噬廓清凝血酶的能力, 本方(静脉注入)有显著的保护作用。经测定肝静脉上方的腔静脉血中的纤维蛋白原含量, 实验动物无明显变化, 而对照动物则锐减。表明本方可能使被封闭的肝脏巨噬细胞复苏而显示

对肝脏网状内皮系统的激活, 提示本方能加速 DIC 时血液中的促凝血物质及被激发的凝血因子等的清除, 全部或部分消除了形成急性 DIC 的触发因子, 从而抑制 DIC。②对免疫功能的影响《中药药理与临床》(1985; 创刊号: 14): 实验证明, 本方有显著增强小鼠巨噬细胞吞噬功能的效果, 能提高实验动物对鸡红细胞的吞噬清除。但水煎剂与醇提剂在作用时间上有所不同, 水煎剂的促进作用可保持 8 小时以上, 醇提剂至 8 小时时已无效, 但 20 及 24 小时后重又呈显著促进作用, 而此时水煎剂已无效。

【备考】本方改为丸剂, 名“血府逐瘀丸”(见《全国中药成药处方集》沈阳方)。

35007 血实柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 甘草 当归 白芍药 丹皮 大黄

【主治】内伤血实发热。

35008 血虚柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 甘草 人参 黄耆 当归 白芍药

【主治】内伤血虚发热。

35009 血崩神效方

【方源】《便览》卷四。

【组成】地榆 甘草 川芎 茯苓 地黄 白术 当归 白芍 黄芩 阿胶 麦冬各等分

【用法】水煎, 露一夜, 空心服。

【主治】崩漏。

【宜忌】忌煎炒、酒、面。

35010 血滞刀环汤

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】玄参三钱 红柴二钱 黄芩二钱 白术二钱(炒黑) 茺萸一钱 白芍二钱 川芎一钱半 青皮一钱 桔梗一钱半 艾叶一钱 生地三钱 全当归二钱(酒洗) 甘草一钱 香附一钱(姜汁炒, 酒和醋加炒)

【主治】经水不调，证无表里，喉痛。

35011 血竭大紅膏

【方源】《普济方》卷三三三。

【组成】当归(锉) 木鳖子(锉) 赤芍药 天台乌药(锉) 各一两 小油四两 琥珀(碎，研)一两 乳香(研)二两 黄丹(罗过)十两 沥青六两 没药二两 血竭(别研)半两

【用法】上将小油浸前四味七日七夜，滤去滓，却将乳香、沥青入铁锅内，以慢火熬令消尽为度，时月看硬软，旋入前浸药油，加减用之，候软硬停当，以绵滤在水中盆内，持拔白色，旋入黄丹，再持拔颜色匀，于瓷盆内存放。每用铁钎摊在厚纸上贴。

【主治】从高下坠，落马堕车，骨节疼痛。

35012 血竭内消丸

《外科大成》。为原书同卷“内消退管丸”之异名。见该条。

35013 血竭冰硼散

【方源】《喉症指南》卷四。

【组成】净硼砂一两 真血竭(磨指甲上，经透指甲者为真，有腥气者，是海母血，勿用) 真儿茶 甘草各三钱(去皮) 明雄黄二钱(鲜红大块者良，有臭气者勿用) 玄胡粉钱半 直僵蚕 大梅片各一钱 上磨香四分

【用法】上药各为极细末。称准，入乳钵内合研，再入血竭末拌匀。

【主治】时疫白喉，及紧喉、缠喉、蛾风、火喉等证。

【宜忌】孕妇慎之。

【加减】孕妇，去麝香，加冰片。

35014 血竭香附散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】血竭五分 没药五分(去油) 归身一钱半 石决明一钱半(煅) 香附米一钱半(醋炒) 夏枯草一钱半 熟军五分 青箱子一钱(炒) 木贼一钱 生草一钱

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【功用】调气和血，除翳止痛。

【主治】眼目红痛，内中生翳，属气血凝滞者。

35015 血竭活血散

《痘疹仁端录》卷十四。为《医学入门》卷八“活血散”之异名。见该条。

35016 血竭破经丹

【方源】《普济方》卷三三三。

【组成】锦纹大黄一两(去皮，醋浸一宿) 硼砂一钱

【用法】上为末。醋和为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前好酒、红花汤送下。

【主治】妇人血闭不通。

【备考】本方名“血竭破经丹”，但方中无血竭，疑脱。

35017 血竭破瘡丹

【方源】《袖珍》卷四。

【组成】乳香 血竭 箭头砂各一钱

【用法】上为末。巴豆仁研泥为膏，瓷器盛之。如用，丸如鸡头子大，妇人，狗胆冷酒送下，男子冷酒送下。

【主治】妇人产后血闭，血迷、血晕、血劳、嗽血；男子伤力，劳嗽吐血。

35018 血翳泻心汤

【方源】《眼科菁华录》卷上。

【组成】大黄 薄荷 车前子 黄连 黄芩 赤芍 连翘 荆芥 菊花

【用法】水煎服。

【主治】两眼赤肿，涩痛，热泪羞明，渐有赤脉贯睛，时发不清。

35019 血余固本九阳丹

【方源】《广嗣纪要》卷四。

【组成】血余(选黑者，不拘男女，用皂荚煎汤洗净，清水漂过，入口无油垢气为度，晒干，置大锅内，用红川椒去梗目，与发层铺上，用小锅盖定，盐泥秘塞上，锅底上用重石压之，先用武火煅炼一柱香，后用文火半柱香，以青烟去尽，无气息为度。冷定取出，研末，双绢筛过)一斤 何首乌(先用米泔水浸，竹刀刮去皮)赤者、白者各八两 淮

山药(共何首乌去皮,竹刀切成片,用黑豆二升,上下铺盖,煮熟晒干)八两 赤茯苓(去皮,牛乳浸一日夜)八两 白茯苓(人乳浸一日夜)四两 破故纸(酒拌,沙锅炒以香为度)四两 菟丝子(人乳一碗,酒半碗,浸一夕,饭锅上隔布蒸熟,晒干,微炒,研为末)四两 枸杞子(去蒂梗,酒拌蒸熟)四两 生地黄(酒蒸)半斤 苍术(去皮,为末)半斤 熟地黄(酒蒸)半斤 龟版(酥油炙)半斤 当归(去尾,酒浸)四两 牛膝(酒浸,黑豆蒸)四两

【用法】上药各为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,药酒送下(药酒方:当归、生地黄、五加皮、川芎、芍药、枸杞子各二两,核桃肉一斤,砂仁五钱 黄柏一两 小红枣二百个,用无灰白酒三十六斤,内分五斤,入药装坛内密封,隔汤煮之,冷定去滓,入前酒密封用)。

【功用】调元固本,种子。

【备考】本方方名,《景岳全书》引作“铁笛丸”。

向

35020 向荣汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】当归 白芍 生地各一两 麦冬五钱 白芥子 茯苓各三钱 贝母一钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【主治】目病后,眼前常见禽鸟昆虫等物。

35021 向骨膏

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】生地黄 骨碎补 蒲黄 当归 白面 赤小豆 白及 败姜各等分

【用法】上除面、蒲黄外,同为细末,银器内醋调稀,慢火煨热。用铜匙抄药,敷于患处,近火炙之;药力行却起去,敷七次,起七次。用纸封了,热醋酒湿,第三日再换。

【主治】伤寒湿气,打扑伤损,筋骨疼痛。

35022 向胜破笛丸

【方源】《医统》卷四十六引《医林》。

【异名】响圣破笛丸(《直指附遗》卷八)、响声破笛丸(《回春》卷五)。

【组成】连翘 桔梗 甘草各二两半 薄荷叶四两 诃子(煨) 砂仁 大黄(酒蒸)各一两 川芎一两半 百药煎二两

【用法】上为细末,鸡子清为丸,如弹子大。每服一丸,临卧嚙化。

【主治】讴歌动火,失音不语。

【备考】本方方名,《景岳全书》引作“铁笛丸”。

行

35023 行气丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】木香 槟榔 丁香 枳壳 甘松 使君子 神曲 麦芽各二钱半 三棱 莪术 青皮 陈皮 香附各五钱 胡黄连一钱

【用法】上为末,蒸饼为丸,如黍米大。每服二十丸,米饮送下。

【功用】行气消乳磨食。

【主治】小儿气积。

【加减】如有汗者,去青皮。

35024 行气散

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】紫苏 香附各二两 陈皮(制)一两 甘草(炙)半两 木瓜 乌药 槟榔 苏木 羌活 苍术各半两

【用法】上咬咀。加生姜、葱白,水煎,热服。

【功用】疏通。

【主治】血气不和,脚气频发。

35025 行气散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】行气香苏饮(《喉科紫珍集》卷上)。

【组成】紫苏 陈皮 香附 乌药 枳壳 桔梗 厚朴 半夏 大黄(酒炒) 甘草

【用法】上锉。加灯心十根，水煎服。

【主治】梅核气。咽喉气胀，上攻胸膈痛。

【备考】《喉科紫珍集》本方用香附、陈皮、厚朴各五分，紫苏、桔梗各七分，乌药三分，枳梗、半夏各一钱，大黄一钱五分，甘草六分。

35026 行水丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】胡芦巴（炒） 故纸（炒） 缩砂仁 萆澄茄 真川椒（去目，纸上炒，出汗） 乌梅肉（焙干）各二钱半 木香 牵牛（炒，取末）各半两 巴豆肉（略去油）一钱半

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，食后生姜汤送下。

【主治】水肿，气肿。

35027 行水汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地二两 巴戟天 茯神 芡实各一两 肉桂二钱

【用法】水煎服。

【主治】小便闭结，点滴不通，小腹作胀，然而而不痛，无烦躁闷乱之形，口舌不干渴者。

35028 行水膏

【方源】《理渝》。

【组成】苍术五两 生半夏 防己 黄芩 黄柏 苦葶苈 甘遂 红芽大戟 芫花 木通各三两 生白术 龙胆草 羌活 大黄 黑丑头 芒消 黑山梔 桑白皮 泽泻各二两 川芎 当归 赤芍 黄连 川郁金 苦参 知母 商陆 枳实 连翘 槟榔 郁李仁 大腹皮 防风 细辛 杏仁 胆南星 茵陈 白丑头 花粉 苏子 独活 青皮 广陈皮 藁木 瓜蒌仁 柴胡 地骨皮 白鲜皮 丹皮 灵仙 旋覆花 生蒲黄 猪苓 牛蒡子 马兜铃 白芷 升麻 川楝子 地肤子 车前子 杜牛膝 香附子 莱菔子 土茯苓 川草薢 生甘草 海藻 昆布 瞿麦 扁蓄 木鳖仁 草麻仁 干地龙 土狗 山甲各一两 发团二两 浮萍三两 延胡

厚朴 附子 乌药各五钱 龟版三两 飞滑石四两 生姜 韭白 葱白 榆白 桃枝各四两 大蒜头 杨柳枝 槐枝 桑枝各八两 苍耳草 益母草 诸葛菜 车前草 马齿苋 黄花地丁（鲜者）各一斤 凤仙草（全株，干者）二两 九节菖蒲 花椒 白芥子各一两 皂角 赤小豆各二两

共用油四十斤，分熬丹收，再入：

铅粉（炒）一斤 提净松香八两 金陀僧 生石膏各四两 陈壁土 明矾 轻粉各二两 官桂 木香各一两 牛胶四两（酒蒸化）

【用法】上贴心口，中贴脐眼并脐两旁，下贴丹田及患处。

【功用】通利水道。

【主治】暑湿之邪与水停不散，或为怔忡，干呕而吐，痞满而痛，痰饮水气喘咳，水结胸，阴黄疸，阳水肿满，热胀，小便黄赤，或少腹满急，或尿涩不行，或热淋，大便溏泄，或便秘不通，或肠痔；又肩背沉重肢节疼痛，脚气肿痛，妇人带下，外症湿热凝结成毒，成湿热烂皮。

【加减】如外症拔毒收水，可加黄蜡和用；又龙骨、牡蛎收水，亦可酌用。

35029 行军散

《行军方便便方》卷中。为《良朋汇集》卷五“武侯行军散”之异名。见该条。

35030 行军散

【方源】《霍乱论》卷下。

【异名】武侯行军散（《感证辑要》卷四）、诸葛行军散（《方剂学》）。

【组成】西牛黄 当门子 真珠 梅片 硼砂各一钱 明雄黄（飞净）八钱 火消三分 飞金二十页

【用法】上药各为极细末，再合研匀，瓷瓶密收，以蜡封之。每服三五分，凉开水调下。

【功用】《方剂学》：开窍，辟秽，解毒。

【主治】①《霍乱论》：霍乱痧胀，山岚瘴疔，及暑热秽恶诸邪，直干包络，头目昏晕，不省人事，危急等证。并治口疮喉痛；点目，

去风热障翳；搐鼻，辟时疫之气。②《方剂学》：暑热痧胀，吐泻腹痛，烦闷欲绝，头目昏晕，不省人事。

【宜忌】《方剂学》：本方辛香走窜，孕妇慎服。

【方论选录】《方剂学》：暑月痧胀，是因感受秽浊之气所致。由于中焦气机逆乱，清浊相干，升降功能失常，故见吐泻腹痛，甚则烦闷欲绝；包络神明被蒙，则头目昏晕，不省人事。治宜开窍行气，辟秽解毒。方中麝香、冰片芳香开窍，行气辟秽，并善于止痛，针对吐泻腹痛，窍闭神昏而设，是为君药。牛黄清心解毒，用为臣药。消石泻热破结；硼砂清热解毒；雄黄用量独重，辟秽解毒；珍珠重镇安神，以上俱为佐药。从本方组成分析，亦属清热开窍为主，配伍辟秽、解毒、安神，以加强清热开窍的功效。方中牛黄、冰片、硼砂、珍珠等药具有清热解毒，防腐消翳之功，故能治口疮咽痛，风热障翳等证。

【备考】《方剂学》：本方原用飞金，取其重镇安神之效，上海、南京等成方配本均改用“姜粉”。《中国药典》1977年版亦去飞金加姜粉，如此则具有降逆和中作用，增加辟秽解毒之功。但姜粉性味辛热，因此对口疮咽痛，风热障翳者，不宜使用。又《北京市中药成方选集》有干姜粉一钱，薄荷冰一分。

35031 行军散

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】麻黄五两 干姜二两 白芷五两 甘草五两 细辛五两

【用法】上为细末，盛瓷器内收贮，不可泄气。临时取用，每服二钱，煎绿豆汤调下，即刻出汗。

【主治】瘟气缠身。

35032 行经丹

【方源】《普济方》卷三一九引《仁存方》。

【组成】斑蝥二十个（去头翅）杏仁二十个（去皮，炒）

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。每

服十丸，煎桃仁汤送下。日未出，小便内取下血片，觉脐下痛。

【主治】妇人干血气滞，腰脚脐下痛，寒热，血脉阻滞。

35033 行药方

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】大黄 白牵牛 槟榔各一两 甘草三两 轻粉五钱

【用法】上为细末。每服二钱，用白蜜三匙，生姜汁二匙，五更时调服。病势重者，七日行一次；稍轻者，半月一次；轻者，一月一次，或二十日一次；以三五遍为度。

【主治】疔毒。

【宜忌】《灵验良方汇编》：忌动风、油腻等物。

35034 行药方

【方源】《疯门全书》。

【组成】巴豆肉五钱（净油） 生大黄一钱 明雄黄一钱 广木香一钱

【用法】上将巴豆肉捣烂，取老米饭数合，醋煮捣烂成糊，入各药杵匀为丸，如梧桐子大。每服十丸，茶送下。

【主治】大麻风。

【宜忌】如大泻，即停勿服。

35035 行健汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】黄耆二钱 人参二钱 茯苓二钱 白术一钱 甘草五分 当归二钱 白芍一钱（酒洗） 青蒿梗一钱五分 广皮一钱 砂仁一钱 料豆三钱 木香五分 大枣二枚 姜三片

【主治】脾劳。或饮食不调，或行役劳倦，积久脾败，四肢倦怠，食少身热。

35036 行瘀煎

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】接骨木 红花 当归 芍药 桂枝 山楂子 梔仁 川芎 苏木 甘草

【用法】水煎，温服。

【主治】产后血晕，恶露不下，及儿枕痛。

35037 行气下乳汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】生地 当归 川芎各一钱 白术(土炒) 茯苓各六分 制香附 陈皮 红花各五分 穿山甲三片(炒) 木香二分

【用法】水、酒各半煎服。

【主治】产妇气血滞，无他证，但少乳。

35038 行气开痹饮

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】羌活 川芎 防风 苍术 秦艽 红花 肉桂 细辛 续断

【主治】风寒湿三气集成痹。

【加减】风胜，倍风药；寒湿偏胜，酌倍之；在上加片姜黄、桂枝、威灵仙；在下加牛膝、防己、萆薢、木通。又有五痹：筋屈不伸，为筋痹，加木瓜、柴胡；血凝不流，为脉痹，加菖蒲、茯神、当归；肌多不仁，为肉痹，加白茯苓、陈皮、木香、砂仁；遇寒皮急，遇热皮纵，为皮痹，加紫菀、杏仁、麻黄；重滞不举，为骨痹，加独活、泽泻。

35039 行气香苏饮

《古今医鉴》卷十。为原书卷四引三山陈氏方“行气香苏散”之异名。见该条。

35040 行气香苏饮

《喉科紫珍集》卷上。为《古今医鉴》卷九“行气散”之异名。见该条。

35041 行气香苏散

【方源】《古今医鉴》卷四引三山陈氏方。

【异名】行气香苏饮(原书卷十)。

【组成】紫苏一钱 柴胡八分 陈皮八分 香附(醋炒)一钱 乌药八分 川芎八分 羌活八分 枳壳八分 苍术八分 麻黄一钱 甘草三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】内伤生冷厚味坚硬之物，胸腹胀满疼痛，及外感风寒湿气，发热恶寒，遍身酸痛，七情气逆，呕吐泄泻，饮食不下。

【加减】外感风寒，加葱白三根；内伤饮食，加神曲、山楂各一钱；偏坠气初起疼痛，憎寒壮热，加小茴香、木香、三棱、莪术、木

通。

35042 行气香苏散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】香附(去毛，酒煮)六钱 紫苏四钱 台乌三钱 陈皮三钱 川芎三钱 当归三钱 制乳香三钱 制没药三钱 漂苍术二钱 枳壳(麸炒)二钱 甘草二钱

【主治】跌打损伤，闪挫腰腹手足，及一切郁结滞气，俱可行散，气行则瘀血不结聚为害。

【加减】伤在手，加白芷；在腰，加杜仲；在足，加怀膝；恶寒加羌活、龟版；大小便不通，加怀通、大黄；恶血冲心，加苏木、桃仁，或加黑姜。

35043 行气活血汤

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】青皮 羌活 归身 红花 苏木 生地 杜仲 木香 陈皮 丹皮 木通 川芎 甘草

【用法】水煎，酒冲服砂仁末一钱。

【主治】跌打损伤。

【加减】发热，加柴胡一钱。

35044 行气活血汤

【方源】《古今名方》引关幼波方。

【组成】葛根 草河车 白芷 郁金 枳壳 生甘草各9克 红花 泽兰各15克 赤芍 白芍 五味子各12克

【功用】舒肝理气，活血化痰。

【主治】慢性肝炎，早期肝硬化，长期肝功能不正常，证属气滞血瘀型者。症见两胁作痛，痛有定处，肝脾肿大，边缘锐利，面有色素沉着，脉弦滑，舌质紫绛，或有瘀斑，舌苔白或无苔。

【加减】若气短心悸，加生黄耆15克；纳少腹胀，加党参15克，白术9克，焦山楂、麦芽、神曲各12克；有瘀斑，舌质绛者，加石见穿、蒲公英各15克；肝脾肿大不消，加王不留行、生牡蛎、地龙各12克；肝痛不止，加没药、五灵脂各9克。

35045 行气逐痰汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】厚朴 苍术 陈皮 槟榔 腹皮 枳壳 苏叶 赤芍各一钱五分 官桂一钱 炭姜八分 甘草四分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】肚腹作痛，大便不通，小便自利。

35046 行血助浆汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄耆 防风 丹皮 当归 桔梗 僵蚕 川芎 连翘 陈皮 甘草 糯米一钱

【主治】痘见六七八九朝。

35047 行血定痛丸

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】玄胡两半 滑石 红花 官桂 红曲各五钱 桃仁三十粒

【用法】上为末，蒸饼面糊为丸，如绿豆大。每服四十丸，生姜汤送下。

【主治】素喜食热物，死血留于胃，痛。

35048 行血破瘀汤

【方源】《医编》卷一。

【异名】行血消瘀汤（《医钞类编》卷七）。

【组成】三七 当归 玄胡 乳香 没药 血竭 苏木 灵脂 赤芍 红花

【主治】跌扑损折蓄血，肿痛发热。

35049 行血消瘀汤

《医钞类编》卷七。为《医编》卷一“行血破瘀汤”之异名。见该条。

35050 行血救骨膏

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】当归六两 金银花六两 桃仁六两 杏仁 续断 天花粉 苏木 红花 刘寄奴各三两 白芷 大黄 荆芥 白术 败酱 沙参 黄连 黄柏 黄耆 丹参 木鳖仁 皂角 南星 三棱 蓬术 牡丹皮 露蜂房 生地黄 熟地黄 姜黄 连翘 泽兰 大风子仁 羌活 赤芍药 草麻子 白及 白蔹 五灵脂 两头尖 白芍药 苦参 紫金皮 地榆 射干 乌药 川芎 五加皮各二两 阿魏 乳香 没药 血竭 蒲黄（生

用）各五两 麝香一两

【用法】上用芝麻油五斤，煎当归等四十八味至焦黑，去滓，称净油，每斤入淘净炒过黄丹八两，如法成膏；俟温入阿魏等五味细末，膏冷方下麝香。

【功用】行血散毒，去腐肉。

【主治】初杖。

35051 行血解毒汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】人参 白术 黄耆 归尾 生地 熟地各一钱 羌活 独活 茯苓 川芎 陈皮 炙草各八分 苏木 红花各五分 金银花二钱 乳香 没药各一钱 杏仁泥 桃仁泥各六分

【用法】水煎，入童便、酒各一杯，以杏、桃泥、乳、没末用药调膏，以药送下；滓再煎；杏仁等四味或分二服，或另加一倍俱可。

【主治】初杖疮。

35052 行军万应膏

【方源】《中国医学大辞典》引徐邦道方。

【组成】生白附子三两 生川乌 生草乌各二两 木鳖子五十八个 金银花二两 茅苍术 赤芍药 连翘 条芩 生首乌各五钱 大风子肉五十八个 白芷一两 火麻仁二两 蓖麻仁二百粒 干姜八两 当归尾 川椒各一两 血余二两 骨碎补五钱 大蜈蚣四十条 白僵蚕一两 青防风 北细辛各五钱 蝉衣蛻 生南星 生半夏各二两 马前子二十八个 川黄柏二两 川独活一两 荆芥穗 红花 西茜 蛇床子 孩儿茶 姜黄各五钱 粉草一两 猪油 麻油 桐油各一斤

【用法】入油内浸三日后，熬去滓，再炼，滴水成珠，先以广丹十两收就。加入铅粉、扫粉、炉甘石（飞）各一两，乳香、没药（各去油）、血竭、水银各五钱，枯矾一两，研极细，再收为膏。隔水燉化，用红布摊膏贴之。

【主治】跌打损伤，及一切无名恶毒，瘰癧、痰核、痰核、积瘀、气痞、风寒湿困等证。

35053 行经红花汤

【方源】《济阴纲目》卷二。

【异名】红花汤（《叶氏女科》卷一）。

【组成】当归尾 赤芍药 紫葳 刘寄奴 牛膝 玄胡索 红花 苏木 桃仁（炒）各一钱 青皮 香附各八分 桂心五分

【用法】水煎，空心作一服。

【主治】妇人室女经候不行，时作胀痛。

35054 行经活血汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】羌活 独活 当归 牛膝 茯苓 秦艽各一钱 熟地二钱 杜仲一钱半（盐水炒） 红花五分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】肾痛。

【加减】用二剂后，减羌活，入酒炒续断一钱。

35055 行经腹痛方

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】真蕲艾 红花 当归 益母草各三钱

【用法】酒煎；另用鸡蛋一个，刺数孔，入药罐内同煮熟，即以药汁同蛋吃下。

【主治】经行腹痛，兼能种子。

35056 行湿补中汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参二钱 白术（麸炒）二钱 白茯苓三钱 苍术（米泔浸）一钱五分 陈皮一钱五分 厚朴（姜炒）一钱 黄芩二钱 麦冬（去心）二钱 泽泻二钱

【功用】补中行湿，利小便。

【主治】单腹蛊胀。

【加减】气不运，加木香八分，木通二钱；气下陷，加柴胡八分，升麻四分；朝宽暮急，血虚，加当归三钱，川芎一钱五分，白芍（炒）二钱，香附二钱，黄连（姜炒）六分，去人参；朝急暮宽，气虚，倍参、术；朝暮急者，气血俱虚，宜双补之。

35057 行湿流气散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】苍术（米泔浸，炒）一两 羌活一两 薏苡仁二两 防风一两 白茯苓一两五钱 川芎一两

【用法】上为末。每服二钱，酒或葱汤送下。

【主治】风寒湿气痹证，身如板夹，麻木不仁，或手足痿软。

35058 行气和血却风汤

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】二防 芩 薄 陈 归 枳 槟 膝 茵陈 瓜 荆芥 羌

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】痢后风，遍身疼痛，手足拘挛，不能举动下床者。

35059 行湿补气养血汤

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】人参 白术 白茯苓 当归 川芎 苏梗 白芍药 陈皮 厚朴 大腹皮 木通 莱菔子 木香 海金沙 甘草

【用法】上锉散。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】气血虚弱，单鼓腹胀浮肿。

【加减】气虚，倍参、术、茯苓；血虚，倍芎、归、白芍；小便短少，加猪苓、泽泻、滑石；服后肿胀俱退，惟面目不消，此阳明经气虚，倍用白术、茯苓。

35060 行湿滋筋养血汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归（酒洗）一两 川芎七分 白芍（酒洗）二两 生地黄一钱（姜汁炒） 人参六分 白术一钱二分 白茯苓（去皮）一钱 威灵仙（酒洗）六分 防己（酒洗）六分 红花七分 牛膝（酒洗）七分 黄连（酒炒）六分 黄柏（盐炒）一钱 知母（盐酒炒）一钱 甘草四分 苍术（米泔制）一钱

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣、水煎服。

【主治】遍身行痛，乃气血两虚，有火有湿。

后

35061 后辛汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】柴胡一钱 郁金二钱 广皮一钱 当归二钱 茯苓二钱 梔子皮一钱（姜汁炒） 蒺藜四钱 枳壳一钱 合欢花二钱 佛手五分

【功用】轻扬和解。

【主治】胆胀。胁下痛胀，口中苦，善太息。

35062 后调汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】阿胶三钱 荆芥三钱 巴戟天一钱 山药五钱 白芍三钱 当归三钱 甘草五钱 山茱萸三钱

【用法】水煎服。

【功用】舒肝补肾。

【主治】妇人经后小腹作痛。

35063 后喘汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】天冬 甘草各七分 槟榔 桔梗 山梔各分半 大黄六分 黄芩三分 桑皮三分半 知母四分

【用法】水煎，温服，不拘时候。

【主治】疹后喘急。

35064 后七宝丸

【方源】《家塾方》。

【组成】巴豆 丁子各二分五厘 大黄四分

【用法】上三味，先丁子、大黄为末，别巴豆研，纳中合治，面糊为丸，如绿豆大。凡服七宝丸六日、乃至七日，诘朝服此方，一服一钱，白汤下之。

【功用】日本·肥后村井杵注：下轻粉之毒。

【主治】日本·肥后村井杵注：粉毒所致口舌糜烂，饮食不下咽。

【备考】制丁子法：丁子一钱，纳梗米六七粒，别研之，悉为细末。不然粘不能末之。

35065 后天青龙散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】先天青龙散去薄荷、蒲黄，加珍珠、

西黄各二分。

【用法】上为极细末。吹于患处，一日三次。

【主治】一切红肿喉症，口疳腐烂。

35066 后天和症饮

【方源】《慈航集》卷三。

【组成】甜白术一钱（土炒） 云苓一钱 制半夏一钱 炒枳壳六分 甘草二分 青皮五分 柴胡三分 草豆蔻八分（研）

【用法】煨老姜二片，红枣二枚为引，河、井水各一茶钟，煎小半钟，露一宿。症前二时服。

【功用】培土和解。

【主治】小儿胎症。

【宜忌】服药后不可即吃乳食。

【加减】如恐有不止者，加入川贝母一钱，知母八分，黑豆四十九粒；痊愈，去柴胡、青皮，加炒五谷虫一钱，陈皮三分，炒神曲五分；发烧无汗，加葛根一钱五分；有汗热重，加青蒿三钱；口渴，加花粉一钱；心热发烦，加连翘八分；痰多，加姜汁炒白僵蚕二钱；恶心，加灶心土三钱；如作泻，加炒白芍二钱，车前子一钱；如大便结，加当归二钱，炒麦芽（研粉）一钱五分；如脉数洪大，实热，加炒黄芩五分；如面红赤，加酒炒川连一分。

舟

35067 舟车丸

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【异名】舟车神祐丸（《医学纲目》卷四引河间方）、净腑丸（《金鉴》卷三十）、神祐丸（《女科切要》卷二）。

【组成】大黄二两 甘遂（面裹，煮） 大戟（醋炒） 芫花（醋炒）各一两 青皮（去白） 槟榔 陈皮（去白） 木香各五钱 牵牛头末四两 轻粉一钱（张子和方无轻粉）

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，临卧温水送下。以利为度。

【功用】行气破滞，逐水消肿。

①《医学纲目》：泄水湿。②《东医宝鉴·杂病篇》：疏导二便。③《济阳纲目》：湿胜气实者，以此宣通之。

【主治】水湿痰饮热毒内郁、气血壅滞所致积聚肿胀，二便秘涩，潮热口渴，喘咳面赤，脉沉数有力。

①《袖珍》：积聚。②《丹溪心法》：湿胜气实。③《普济方》：潮热有时，胃气不和，遍身肿满，足肿腹胀，大便不通。④《景岳全书》：气血壅满，不得宣通，风热郁痹，走注疼痛及妇人血逆气滞等证。⑤《济阳纲目》：咳嗽淋闷。⑥《杂病源流犀烛》：痰毒。⑦《医钞类编》：水胀口渴，面赤气粗，腹坚。

【宜忌】①《济阳纲目》：气虚者慎之。②《古方新解》：甚者忌食盐酱百日。③《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）：勿与甘草同用，孕妇勿服。

【加减】一方取盐，加茺萸半两。

【方论选录】①《医方考》：通可以去塞，牵牛、大黄、甘遂、茺花、大戟，皆通剂之厉者也；辛可以行滞，陈皮、青皮、木香，皆行滞之要药也。此方能下十二经之水，下咽之后，上下左右，无所不至，故曰舟车。②《医方集解》：此足太阳药也。牵牛、大黄、大戟、茺花、甘遂，皆行水之厉剂也，能通行十二经之水。然肿属于脾，胀属于肝。水之不行，由于脾之不运；脾之不运，由于木盛而来侮之，是以不能防水而洋溢也。青皮、木香，疏肝泄肺而健脾，与陈皮均为导气燥湿之品，使气行则水行，脾运则肿消也。轻粉无窍不入，能去积痰，故少加之。然非实证，不可轻投。③《成方便读》：此方用牵牛泻气分，大黄泻血分，协同大戟、甘遂、茺花三味大剂攻水者，水陆并行；再以青皮、陈皮、木香，通理诸气，为之先导；而以轻粉之无窍不入者助之。故无坚不破，无水不行，宜乎有“舟车”之名。④《中医大辞典·方剂分册》：方中甘遂、茺花、大戟，攻逐脘腹经坠之水，为主药；大黄、牵牛子，荡涤泻下

为辅，主辅相配，使水热实邪从二便分消下泄；再以青皮破气散结，陈皮理气燥湿，木香调气导滞，使气畅水行，共为佐使。诸药合用，共成行气破滞、峻下逐水之方。

【临证举例】虫积经闭。《浙江中医杂志》（1964；11：17）：高某某，女，23岁，已婚，1962年5月23日入院。患者月经一向正常，结婚三年未育。1960年初，曾患浮肿，继则腹胀经闭，以为妊娠；但腹胀善饥，便溏尿少，喜食盐粒，时吐涎沫，四肢沉重，周身乏力。诊时经闭已两年，面容虚胖少华，舌淡胖而大，苔白腻，脉弦滑，唇色白，内见丘疹甚伙，周身浮肿，下肢按之可容枣大之深陷，腹大而满，按之坚无压痛，脐周围可触到条状、索状结块，肝、脾均肿大，无压痛；腹泻日二三次，多为未消化之软便。诊为虫积经闭。根据病情辨症，属大实有羸状，用舟车丸峻剂逐水，以治标急之实。5月28日晨八时，空腹服下舟车丸五分，二小时后呕恶，腹绞痛；三小时后排出水及虫体一大盆，数得活蛔虫334条，腹消大半。5月29日晨八时再服舟车丸五分，又大便三次，排出蛔虫269条，腹臌消失近常人。月经于入院第十八天来潮。

【备考】《丹溪心法》无轻粉。

35068 舟车丸

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】大黄二钱 甘遂 牵牛各八分 茺花八分 陈皮八分 木香二分 大戟七分

【用法】上锉一剂。水一钟半，煎八分，温服。

【主治】一切水湿肿满，腹大胀硬。

【方论选录】用大黄、甘遂、大戟、茺花以泻水湿；陈皮、木香、牵牛疏行郁气以治胀满。

【备考】本方方名，据剂型当作“舟车散。”

35069 舟车神祐丸

《医学纲目》卷四引河间方。为《袖珍》卷三引《圣惠》“舟车丸”之异名。见该条。

35070 舟制涌泉散

《医略六书》卷三十。为《回春》卷六“涌泉散”之异名。见该条。

创

35071 创丹

《鸡峰》卷二十五。为原书同卷“除邪丹”之异名。见该条。

35072 创灼膏

【方源】《中药知识手册》。

【组成】生茅术 黄柏 防己 木瓜 地榆 白及 石膏 炉甘石 冰片 虎杖 延胡索 郁金

【用法】制成膏剂。外搽患处。

【功用】提脓拔毒，祛腐生肌。

【主治】烧伤，老烂脚，挫裂伤口，褥疮，冻疮溃烂，慢性湿疹及疮疖。

全

35073 全功散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】天花粉 防风 黄芩 升麻 羌活 荆芥穗 川芎 牛蒡子(炒) 郁金 紫草 甘草 枳壳 木通 猪苓 赤茯苓 黄连(去须) 缩砂仁 陈皮 糯米(炒) 当归 麦门冬(去心)各等分

【用法】水煎服，不拘时候。

【功用】解利余毒。

【主治】痘疮收靥。

35074 全目饮

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】白蒺藜二钱 甘菊花一钱 梔子二钱 荆芥 防风各一钱 当归一钱 白芍三钱 半夏一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】目痛。

35075 全甲散

【方源】《仙拈集》卷四引《要览》。

【组成】川山甲一个(要头尾四足并耳目口鼻俱全者) 生漆一斤

【用法】每日将山甲漆数次，漆完用瓦器炙灰。如患人要头身先好，即服山甲头身起；要手足先好，即服山甲四足起；对陈酒服完即愈。

【主治】大麻风。

35076 全生丸

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】白芷四两 槐米四两 川山甲(陈壁土炒)二两 僵蚕四两(炒) 蜈蚣二条(炙) 全蝎(去足勾，炒净)二两

【用法】黄陈米煮饭，捣为丸。每日服三钱，滚水送下。

【主治】多年痔漏。

【宜忌】忌房欲、鹅肉。

35077 全生汤

【方源】《诚书》卷六。

【组成】天麻 蝉蜕 防风 羌活 远志(去心)各五分 川芎 桔梗各四分 甘草一分 牛蒡子(炒)三分

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】感热，凶门忽肿。

35078 全生饮

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】藕汁(磨墨)一寸 梨汁 茅根汁 韭汁 生地黄汁各一两 刺刺菜汁 萝卜汁 白蜜 竹沥 生姜汁 童便各半盏

【用法】上合一处，频频冷服。

【主治】吐血、衄血、嗽血、咯血、唾血。

35079 全生饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】麝香八分 蛇蜕 血余 蝉蜕(各煅灰存性)各二钱

【用法】上为末。每服二钱，滚酒调下。

【主治】横生。

35080 全生散

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】生黄耆四钱 当归一两 金银花一两 茯苓三钱 薏仁五钱 牛膝三钱 地榆一钱 白术三钱 草薢三钱 天南星一钱 生地黄五钱

【用法】水数碗，煎一碗，空腹服之。不论已溃未溃俱效。

【主治】内外膝痹。

【加减】倘是阴症，加肉桂一钱，去地榆，多加熟地。

35081 全生锭

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参 辰砂(飞) 白术 茯苓 茯神 五灵脂(水飞) 赤石脂(煅) 山药各二钱半 乳香五钱 麝香一钱 金箔二十五片

【用法】上为末，白米饭心印锭，金箔为衣。薄荷汤磨化下。

【主治】小儿胎惊风，热丹毒。

35082 全圣散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】地胆半两(去足翅，微炒) 滑石一两 朱砂半钱

【用法】上为末。每服二钱，用苦杖酒调下，食前服。

【主治】小肠膀胱气痛不忍者。

35083 全母汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】白术 人参 熟地各一钱 肉桂二钱 炮姜五分 丁香五分 山药五钱

【用法】水煎服。

【功用】止呕吐。

【主治】产后恶心欲呕，时而作吐。

35084 全虫方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】全虫(打)二钱 皂刺四钱 猪牙皂角二钱 刺蒺藜五钱至一两 炒槐花五钱至一两 威灵仙四钱至一两 苦参二钱 白鲜皮五钱 黄柏五钱

【功用】祛风止痒，除湿解毒。

【主治】慢性湿疹，慢性阴囊湿疹，神经性皮炎，结节性痒疹等慢性顽固痒疹性皮肤病。

【宜忌】本方对于慢性顽固的搔痒性皮肤病偏于实证者最为相宜，而对于血虚受风而

引起的隐疹(如皮肤瘙痒症)不宜用。服此方时，禁食荤腥海味、辛辣动风的食物。孕妇慎用。

【加减】如限局性或泛发的慢性湿疹、阴囊湿疹、神经性皮炎、结节性痒疹等，如用之不应，可加乌梢蛇；如搔痒甚烈，皮损增厚，明显色素沉着或伴有大便干燥者，可加川军三钱至五钱。

【方论选录】本方是以大败毒汤(五虎下西川)为借鉴而化裁的经验方。是以全虫、皂刺、猪牙皂角为主要药，其中全虫性辛平入肝经，走而不守，能熄内外表里之风；皂刺辛散温通，功能消肿托毒，治风杀虫；猪牙皂角能通肺及大肠气，涤清胃肠湿滞，消风止痒散毒。盖热性散，毒性聚，若欲祛其湿毒，非攻发内托辛扬不得消散，而全虫、皂刺、猪牙皂角三者同伍，既能熄风止痒，又能托毒攻伐，对于顽固蕴久深在之湿毒作痒，用之最为相宜。白鲜皮气寒善行，味苦性燥，清热散风，燥湿止痒，协同苦参以助全虫祛除表浅外风蕴湿而止痒；刺蒺藜辛苦温，祛风“治诸风病痒”、“身体风痒”，有较好的止痒作用；刺蒺藜协同驱风除湿通络的威灵仙，能够辅助全虫祛除深在之风毒蕴湿而治顽固性的搔痒。另外，脾胃气滞则蕴湿，湿蕴日久则生毒，顽湿聚毒客于皮肤则搔痒无度，故方中佐以炒枳壳、黄柏、炒槐花，旨在行气，清胃肠之结热，以期调理胃肠，清除湿热蕴积之根源。川军一般都惧其通下太过，岂不知川军能活血破瘀，少用则泻下，多用反而厚肠胃，与诸药相配合，不但止痒功效增强，而且可以促进肥厚皮损的消退。

【临证举例】泛发性神经性皮炎 侯某某，男，67岁。初诊日期：1972年8月14日。主诉周身散发片状肥厚粗糙之皮损，奇痒，已十几年。现病史：患者十几年前四肢、躯干、颜面、臀部均有粗糙、肥厚之皮损，奇痒，曾经某某医院诊断为“泛发性神经性皮炎”，多次治疗不效。今年四月外用西药水剂后，局

部皮损发生糜烂,痒感加重,曾注射“葡萄糖酸钙”、抗生素,外用西药膏,均不能控制。检查:患者颜面、耳廓有轻度糜烂皮损,渗出液不多,作痒,躯干及尾骶部皮损肥厚,上复少量血性痂皮,有明显抓痕,脉象弦,苔薄白。西医诊断:神经性皮炎。中医辨证:血虚风燥,肌肤失养。立法:疏风止痒,养血润肤。方药:全虫三钱 威灵仙六钱 白鲜皮一两 丹参五钱 地肤子一两 干生地五钱 黄柏三钱 刺蒺藜一两 生槐花五钱 猪苓三钱 金银花六钱。外用普连软膏、珍珠散。服上方七剂后,皮损糜烂平复,渗出液减少,痒感已减轻,可以入睡。继服前方,局部只存留原粗糙之皮损,较正常皮肤稍厚。

35085 全虫散

【方源】《外科真铨》卷上。

【组成】全虫(酒洗,焙) 元胡 杜仲(炒)各三钱

【用法】上为细末。每服三钱,空心用温酒调下,一日三次。外用益智壳一两煎水冲洗。

【主治】阴湿疮。

35086 全虫散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】全蝎 15 克 白矾 62 克 冰片 3 克

【用法】将白矾入锅内化开后,加入全蝎煨枯,待冷后,与冰片共为细末即成。用于小面积奇痒不止,撒播,外敷藤黄软膏。

【主治】慢性湿疹。

35087 全羊丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】羊羔一只(养带胎母羊一只,每日常食黑豆八两,拌小茴、羊藿、菟丝喂养,足月产羊一对,捡一雄羔听用;养小羊足月,以好酒饮之满腹,取血听用;滚水退去毛,五脏洗净,将故纸、肉苁蓉、青盐、小茴各四两装入腔内,用线缝固,荷叶包裹,蒸三炷香,取出炙干听用) 白茯苓八两(用羊乳浸蒸,晒干) 枸杞子六两(小羊血拌蒸,焙

干) 牛膝四两(酒浸,蒸) 大地黄八两(砂仁酒蒸五炷香) 山萸(去核,酒浸)四两 沙蒺藜四两(酒浸) 山药(炒)四两 归身四两(酒洗) 杜仲四两(去粗皮,姜汁盐水炒去丝) 巴戟四两(酒浸) 虎胫骨一对(酥炙) 故纸四两(羊乳汁蒸一次,黑芝麻油炒) 小茴四两(小羊血拌炒) 肉苁蓉四两(酒洗,去鳞甲) 青盐四两(净小羊血拌炒)

【用法】上为细末,入前全羊四味,再研极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二三钱,滚水送下。

【功用】壮筋骨,补气血。

【主治】一切虚损劳疾。

35088 全阳方

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【异名】全阳汤(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】金银花半斤 黄柏一两 肉桂二钱 当归三两 熟地二两 山茱萸三钱 北五味一钱 土茯苓四两

【用法】水五大碗,同浸干为末。每服一两,滚水调服。

【主治】①《洞天奥旨》:前阴烂落。②《中医皮肤病学简编》:女阴溃瘍。

35089 全阳汤

《中医皮肤病学简编》。为《洞天奥旨》卷十六“全阳方”之异名。见该条。

35090 全形散

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】番木鳖子一个(煨成灰) 冰片二厘

【用法】上为细末。搽。一二次即愈。

【主治】下疳疮。

35091 全身丹

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】红花 土鳖虫 制乳香 桃仁 沉香 姜黄 漆渣 自然铜各二钱 桂枝 肉桂 蓬莪术 骨碎补 醉仙桃 田三七 茜草根 当归尾各三钱 乌药 三棱 血竭

各四钱 广木香五钱 八棱麻一两 枳壳一两 制川乌六钱 制草乌六钱

【用法】上为极细末。每服一钱，热甜酒送下。年老及体弱酌减服用。

【主治】跌打损伤疼痛。

【宜忌】孕妇忌服用。

35092 全身汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参二两 白术二两 茯苓一两 半夏三钱 附子三分 神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】猝倒之后致半身不遂。

【方论选录】或疑偏枯之病，非急症可比，何必大用参、术？不知猝倒之后，非重用参、术，则元气不能骤复。与其日后而多用补剂，零星而期久，何若乘其将绝未绝之先，急为多用而救之也。

35093 全身汤

《医学集成》卷二。为《辨证录》卷二“全身饮”之异名。见该条。

35094 全身饮

【方源】《辨证录》卷二。

【异名】全身汤（《医学集成》卷二）。

【组成】人参 黄耆 巴戟天各一两 半夏三钱 附子一片

【用法】水煎服。

【主治】猝倒之后致半身不遂。

35095 全肺汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】元参三两 生甘草五钱 金银花五两 天花粉三钱 茯苓三钱 白芍三钱 麦冬二两

【用法】水煎服。一剂而痛减，二剂而内消矣。

【主治】肺热生痈，胸膈间作痛，咳嗽时更加痛极，手按痛处尤增，气急。

35096 全带汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】人参五钱 白术五钱 茯苓三钱 熟地九钱 当归五钱 杜仲二钱 炮姜五分

【用法】水煎服。

【功用】补气补血。

【主治】小产。

35097 全指散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】诃子（焙） 半夏 银朱

【用法】上为末。蜜调搽。

【主治】拶伤手指。

35098 全胃汤

【方源】方出《明医杂著》卷五，名见《医部全录》卷四四四。

【组成】白术一钱二分 白芍药（酒炒）白茯苓各八分 人参 陈皮 川芎各六分 炙草 黄耆（蜜炙） 当归（酒洗）各四分 半夏 山楂各六分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【功用】复全胃气。

【主治】小儿大病后面黄肌瘦，目时动，齿微咬，发稀少，未能大行，因误服解表泻利伤克诸药而致者。

35099 全活汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】白术三两 苍术二两 肉桂一钱 薏仁二两 车前子五钱 人参一两（如贫家用黄耆二两）

【用法】水煎服，一连服十日。不特两足之烂可除，而余生亦可全活。

【主治】伤寒愈后，两足生疮，流水流脓。

35100 全真丸

【方源】《施圆端效方》引银青它传燕山名效方（见《医方类聚》卷一一三）。

【组成】川大黄 商枳实（面炒） 槟榔 黑牵牛各等分（一半生，半炒）

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，米饮下，以大便和利为度。

【主治】三焦气壅，结痞心胸，大便不通，伤寒下证，已服承气不利。

35101 全真丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】保安丸。

【组成】大黄三两(米泔浸三日,逐日换水,焙干为末。一法以酒浸透,切片,焙干为末) 黑牵牛八两(净,轻炒四两,生用四两,同取头末四两)

【用法】上以皂角二两轻炒,去皮子,水一大碗,浸一宿,入萝卜一两切片,同皂角一处熬至半碗,去滓;再熬至二盏,投药末为丸,如梧桐子大。每服二三十丸至五十丸,诸般饮送下,不拘时候。

【功用】洗涤肠垢,润燥利涩。

【主治】五脏积热,风毒攻注,手足浮肿,或顽痹不仁,痰涎不利,涕唾稠粘,胸膈痞闷,腹胁胀满,减食嗜卧,困倦无力。

35102 全真丸

【方源】《普济方》卷二五三。

【组成】黑牵牛头末三两 大黄半两 南木香半两 陈皮半两 甘草半两 皂角一两(净,去皮弦,用文武火炙黄色)

【用法】上为细末,用米醋打糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,食后温汤送下,一日二次。

【主治】男妇酒食过伤,胸膈痞闷。

35103 全真丹

【方源】《扁鹊心书》。

【组成】高良姜(炒)四两 干姜(炒)四两 吴茱萸(炒)三两 大附子(制) 陈皮 青皮各二两

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,小儿三十丸,米饮送下。

【功用】补脾肾虚损,和胃,健下元,进饮食,行湿气。

【主治】心腹刺痛,胸满气逆,胁下痛,心腹胀痛,小便频数,四肢厥冷,时发潮热,吐逆泄泻,暑月食冷物不消,气逆痞闷,面目浮肿,小便赤涩淋漓,一切虚寒之证。

【宜忌】无病及壮实人不宜多服。

35104 全鸭丸

【方源】《不居集》下集卷一。

【组成】十大功劳十两 川地骨皮十两

六月雪根六两 白色百劳花六两(竹刀取碎,焙干为末) 老鸭一只(七八九十年者佳,一二三四年者无用。认法:掌厚,嘴多黑点,上腭层多,口边锯齿平,眼陷进)

【用法】不用铜铁器杀,干钳毛不见水,酒洗,挖去肚内等物,再以无油新砂锅,酒、水煨极烂,取骨打碎,同药肉炙干,捣为丸。

【主治】外邪不清,内伤积瘀,咳嗽,蒸热,失血。

35105 全消饮

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】当归三钱 生黄耆三钱 红花一钱 生地三钱 荆芥叶一钱五分 贝母一钱 茯苓二钱 黄柏二钱 地骨皮三钱 菊花根一把

【用法】水煎一碗,急服数剂。无不内消。若失治一至溃烂,肯服此方,亦不大溃。

【主治】手足丫毒疮。

35106 全趾饮

【方源】《外科医镜》。

【组成】淮牛膝三钱 鲜石斛三钱 金银花一两 元参五钱 甘菊花五钱 当归五钱 茯苓三钱 生甘草二钱

【用法】水煎服。

【主治】足趾疗毒。

35107 全鹿丸

【方源】《医统》卷四十八。

【异名】百补全鹿丸(《饲鹤亭集方》)、大补全鹿丸(《全国中药成药处方集》杭州方)。

【组成】中鹿一只(不拘牝牡,缚死,去毛,肚杂洗净;鹿肉煮熟,横切片,焙干为末;取皮同杂入原汤煮膏,和药末为丸;骨用酥炙,为末,和肉末、药末一处,和膏捣;不成丸,加炼蜜) 人参 黄耆 白术 茯苓 当归 川芎 生地黄 熟地黄 天门冬 麦门冬 陈皮 炙甘草 破故纸 川续断 杜仲 川牛膝 枸杞子 巴戟天 胡芦巴 干山药 芡实子 菟丝子 五味子 覆盆子 楮实子

锁阳 肉苁蓉 秋石各一斤 川椒 小茴香 青盐 沉香各半斤

【用法】上各精制为末，称分两和匀一处，候鹿制膏成，就和为丸，梧桐子大，焙干；用生黄绢作小袋五十条，每条约盛一斤，悬置透风处。用尽一袋，又取一袋。霉伏天须要火烘一二次为妙。每服八九十丸，空心临卧时，姜汤、盐汤、沸汤任下，冬月温酒送下。

【功用】①《鲁府禁方》：还精填髓，补益元阳，滋生血脉，壮健脾胃，安五脏，和六脉，添智慧，驻容颜。②《中国医学大辞典》：通脉和血，利节健步，壮阳种子，延年益寿。

【主治】诸虚、癆瘵、神疲面黄，头眩腰痠，形寒阳痿，瘰疬脱肛，蒸热盗汗，带下崩中。

①《医统》：诸虚百损，五劳七伤。②《鲁府禁方》：精血不足，元气虚弱，久无子嗣，并四肢无力，精神欠爽。③《中国医学大辞典》：头眩耳聋，脊背痠软，瘰疬腹痛，精寒阳痿，肌肤甲错，筋挛骨痠，步履艰难，妇女虚羸癆瘵，骨蒸发热，阴寒腹痛，崩漏经阻，赤白带下，大肠脱肛。④《全国中药成药处方集》：面色萎黄，形寒畏冷。遗精盗汗。官寒不孕。

【宜忌】①《时方歌括》：肥厚痰多之人，内蕴湿热者，若服此丸，即犯膏粱无厌，发痼疽之戒也。②《全国中药成药处方集》：体实而发炎者忌服。风寒感冒忌服。忌生冷食物。

【备考】《北京市中药成方选集》。本方用鹿角胶八两、青毛鹿茸（去毛）四两、鹿肾三两、鲜鹿肉（带骨）三百二十两、鹿尾一条（约二两）。以生地、芡实、枸杞子、补骨脂、山药、续断、川芎、於术、沉香九味研粗末铺晒槽；余者下罐，加黄酒四百八十两蒸三昼夜，同铺槽之群药拌匀晒干，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。

35108 全鹿丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】雄鹿（最小）一只 秋石二斤 五

味子三斤（酒洗，晒干，净末一斤） 车前子二斤（水淘，晒干，净末一斤） 金樱子三斤（酒洗，晒干，净末一斤） 菟丝子七斤（酒浸，晒干，如七次后取末五斤） 黄柏七斤（去粗皮，牛乳浸透，晒干，取净末五斤）

【用法】黄柏并四子各为细末，和合一处，却将雄鹿取血，拌药如弹子，晒干，复为末；将鹿去毛秽，其角煮膏，枯骨为霜，其骨煮粉，皮、肉、五脏俱熬膏，然后以秋石化开，和前药末为膏，少加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤送下；温酒亦可。

【功用】益血气，补劳伤，固精髓，壮筋骨。

【方论选录】《霞子曰》：鹿则全体大补是也。壶隐子曰：黄柏二制，米泔水浸，生姜汁炒，则治上焦；单制蜜炙则治中焦，不制则治下焦也。独此又用牛乳，亦走下焦。

35109 全鹿丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】当归身 知母（去尾净） 天门冬（去心、皮净） 怀熟地各四两 人参（去芦）四两 白茯苓（去皮）四两 金樱子（去粗皮、刺净）四两 芡实肉六两 牛膝（去芦）六两 莲肉（去心）四两 山药四两 黄柏（去皮）四两 怀生地四两 白芍二两（炒） 麦门冬（去心）四两 枸杞子（去蒂）八两 茯神（去皮心）四两 杜仲（酥炙，去丝）四两 白术（东壁土炒）四两 莲须四两 山茱萸（净肉）八两 女贞实八两 覆盆子四两 柏子仁六两 肉苁蓉四两（酒洗） 黄耆（蜜炙净）四两 骨碎补四两 五味子二两（净） 桑椹子四两（净） 陈皮四两 菟丝子（酒煮捣烂，晒干，净）二两

【用法】用雄鹿一只，取精肉一二斤，用血、髓、肾、肝、心、全角切作片，用无灰酒二十五斤煮熟，将前药再入酒肉内煮干为度，如未全熟，再加酒五斤，取出晒干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心温酒、淡盐汤或白滚汤送下。

【功用】补肾种子。

35110 全鹿丸

【方源】《济阳纲目》卷六十七。

【组成】黄柏七斤(去粗皮,用青盐煮酒浸,焙干,取净末五斤,又以鹿血拌,焙) 菟丝子七斤(水润净,酒浸,蒸,净末五斤) 枸杞子七斤(真甘州者,用牛乳浸,焙干,取净末五斤) 金樱子三斤(捣去刺,剖开去核,取净末一斤) 五味子三斤(去桔梗,酒洗净,晒干,净末一斤半) 车前子三斤(水淘净,晒干) 一斤 煮鹿时加桑白皮、楮实子各一斤半

【用法】上前六味各不见铁,务另研为细末;用鹿一只,须极肥壮,角有神气者为佳,先以红枣、茶叶喂养七日方用,只去毛,连肉、五脏,去其大肠秽物,熬膏滤出听用;其骨、角加桑皮、楮实子另煮连昼夜,以极研如粉为度,绞和前汁,同药末内拌匀,加秋石七八斤,愈多愈妙,捶化如膏,内加炼蜜共为丸,如梧桐子大。每空心临卧服七八十丸或二钱,空心用酒或秋石汤或盐汤送下,以干物压之。

【功用】大补元精,种子。

【备考】按:煮鹿时用砂锅二口,以鹿肉入于大坛内,以箬包紧,隔汤煮烂,然后滤出,内汁听用。如坛内汤干,另用一锅煮熟水;逐时添入,不用生水。其骨、角亦如上,隔汤煮数昼夜,连胶并前滤出肉汁和药,肉滓不用工夫,全在煮时,柴用桑柴为妙,须不断火,连日夜更番制成,不可歇息。药成丸后有秋石在内,恐发潮,切不可违火,时时焙着。合时以冬月为妙,恐肉浓汁味少变耳。

35111 全鹿丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】人参(去芦)五斤 故纸(盐炒)一斤 鹿角胶一斤四两 当归二斤 川牛膝一斤四两 黄柏二斤 锁阳一斤八两 杜仲炭(盐炒)二斤 小茴香(盐炒)十二两 菟丝子一斤 香附(醋制)三斤 鹿茸(去

毛)二斤八两 生黄耆四斤 青盐十两 桂圆肉十五斤 冬虫草五钱 秋石一斤 楮实子十两 鹿角(洗净)六斤 茯苓(去皮)五斤 芦巴子一斤 天冬 麦冬 甘草 怀牛膝 琥珀 制没药各一斤 枸杞子二斤 党参(去芦)十两 益母草膏一斤 花椒四两 覆盆子十两 老鹳草膏十两 鲜鹿肉二十斤 鹿尾一斤十四两 巴戟肉(甘草水制)一斤 鲜牛乳十斤 净鹿肾一斤四两 远志肉(甘草水制)八两 紫河车二两 苁蓉(酒蒸)一斤(以上用黄酒七十一斤八两装罐内,或装不生锈的桶内,将罐口封固,隔水蒸煮至酒尽为度) 川芎一斤 陈皮九斤 白术(麸炒)一斤十两 沉香二斤 广木香一斤 生地一斤十两 续断一斤 砂仁八斤 生枣仁六两五钱 炒枣仁六两五钱 黄芩二斤 桑枝十两 木瓜一斤 生山药一斤 五味子(酒蒸)十两 熟地二斤 红花十两

【用法】上为粗末,再和所蒸的药料共和一起拌匀,晒干研粉,炼蜜为丸,三钱重。蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一九,白开水送下。

【功用】滋补益气,填精补髓。

【主治】身体衰弱,头眩耳鸣,夜梦遗精,腰膝疼痛,四肢痿软,自汗盗汗,神志不安,妇女气血亏损,崩漏带下。

【宜忌】孕妇忌服。

35112 全鹿膏

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】鹿肉(全)一只(去油筋净) 杞子十斤

【用法】米泔水五十斤、井水五十斤、熬至半,滤出,再入泔、水各三十五斤;熬至半,滤出,再入泔、水各二十五斤,熬至半,去滓;合三次汁,共熬至一斗,余用绵子滤过,入真龟胶一斤收之。每日五钱,陈酒化下。

【功用】补虚。

35113 全痘汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参二钱 白术二钱 牛蒡子一

钱 茯神三钱 陈皮三分 当归三钱 通草一钱 甘草五分 荆芥一钱 金银花三钱

【用法】水煎服。一剂而浆厚膜高矣。

【主治】痘疮至九日十日之后，浆稀痂薄，气血之亏者。

【方论选录】此方用人参而不用黄耆者，以黄耆过于补气，且恐有胀满之虞，不若多人参既补气而复无增闷之嫌耳，尤妙在用牛蒡子、金银花于补中泻毒，得补之益而更获散之利，真善后之妙法也。

35114 全鼻散

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】玄参一两 生甘草三钱 金银花一两 当归一两 麦冬五钱 人参三钱 生丹砂末一钱

【用法】水煎服。先用护鼻散，连服四剂，鼻黑之色去，不必忧鼻梁之烂落矣，更用全鼻散。

【主治】杨梅疮因误服轻粉藏毒于内，毒发于鼻，自觉一股臭气冲鼻而出，第二日鼻色变黑，不闻香臭。

【方论选录】护鼻散过于勇猛，所以救其急；本方近子和平，所以补其虚。而丹砂前后皆用者，以轻粉之毒，非丹砂不能去。轻粉乃水银所烧，而丹砂乃水银之母，子见母自然相逢不肯相离，丹砂出而轻粉亦出。

35115 全蝎丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】全蝎四十九个（去毒，用生姜钱四十九片，于新瓦上先铺姜片，次铺全蝎，就姜钱上用文武火炙，翻转再炙燥） 胡椒四十九粒 木香二钱（不见火） 狼毒 当归各半两（去芦） 茴香（淘去沙）三钱（炒） 槟榔一个

【用法】上为细末，米醋糊为丸。每服七粒，温酒送下，不拘时候。

【主治】小肠疝气。

35116 全蝎丸

《医方类聚》卷九十八引《澹寮方》。为《本

事》卷三“麝香丸”之异名。见该条。

35117 全蝎丸

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】全蝎 川椒 巴豆（去皮） 菖蒲 松脂各等分

【用法】上为细末，熔蜡和丸。筒子塞耳中，一日一易。

【主治】肾气虚，耳中如风水鸣，或如钟磬声，卒暴聋。

35118 全蝎丸

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】全蝎三两（焙干，去勾足）

【用法】上为末，用油核桃肉捣为丸，如绿豆大。每日二服，清晨用六分，晚用七分，火酒送下，看人大小，加減服之。

【主治】多年瘰癧。

35119 全蝎丸

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】全蝎（用水洗净，晒干，火焙） 蜈蚣（去头足） 雄黄 白矾各三钱 象皮二两（用牛油炙焦） 乳香（炙去油） 没药（炙去油）

【用法】上为细末，用黄蜡二两熔化揉匀为丸，如梧桐子大。每服七粒，空心茶、酒任可。

【主治】里外痔疮。

【备考】方中乳香、没药用量原缺。

35120 全蝎汤

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】天麻 防风 白胶 甘草 全蝎 苏木 南星二三片（皆生用）

【用法】水煎服。

【主治】小儿疳腮痰多。

35121 全蝎饼

【方源】《普济方》卷三七三。

【组成】全蝎十四个（去毒，薄荷汁浸，炙） 白僵蚕五钱 酸枣仁（炒） 茯神 天花粉 苦梗（去芦） 天麻（炮） 远志肉 羌活 甘草各三钱

【用法】上为末，糊丸作饼子，朱砂为衣。

金钱薄荷汤送下。

【功用】镇心去惊，安神定志。

【主治】惊之轻者。

35122 全蝎散

【方源】《证类本草》卷二十二引《篋中方》。

【组成】蝎五枚 大石榴一个

【用法】将大石榴割头去子，作瓮子样，纳蝎其中，以头盖之，纸筋和黄泥封裹，以微火炙干，渐加火烧令通赤，良久去火，候冷去泥，取中焦黑者，细研。每服半钱匕，乳汁调，灌之；儿稍大，以防风汤调服。

【主治】小儿风痫。

35123 全蝎散

【方源】《医部全录》卷四二〇引初虞世方。

【组成】全蝎 天南星（取心为末）一钱 人参三钱 蛇蛻三钱

【用法】上为末。蜜汤调下；或薄荷加蜜汤调下。

【主治】小儿惊热。

【备考】方中全蝎用量原缺。

35124 全蝎散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】全蝎（去毒，炒） 僵蚕（直者，炒） 甘草 赤芍药 桂枝（不见火） 麻黄（去节） 川芎 黄芩（去心）各三钱 天麻六钱 大天南星（汤浸七次，去皮脐，切，焙）三钱

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，加生姜七片，煎七分，温服无时，量大小与之，一日三四次。

【主治】小儿惊风；中风口眼喎斜，语不正，手足偏废不举。

【宜忌】忌羊肉。

35125 全蝎散

【方源】《普济方》卷六十六引《卫生家宝》。

【组成】蜈蚣一条 全蝎三个 消半两 良姜 乳香一钱 麝香一字

【用法】上为末。每用少许搐鼻。

【主治】一切牙痛。

【备考】方中良姜用量原缺。

35126 全蝎散

【方源】《普济方》卷三七四引《卫生家宝》。

【组成】全蝎七个（生薄荷、麻黄不拘多少，外以线缠缚定，再用半夏末少许、生姜自然汁同浸少时，向火上炙；如干，又入姜汁内浸，再炙，以姜汁尽为度，焙干为末，却入后药） 附子尖三个 麝香一字 真脑子一字

【用法】上为细末，同前药拌匀。煎金银薄荷汤调下；小儿半钱，量岁数虚实，加减服之。

【主治】小儿惊风。

35127 全蝎散

【方源】《普济方》卷三七五引《全婴方》。

【组成】蝎尾一钱半（炒） 蜈蚣一条（炙） 麝香一字 脑子一字 川乌尖七个（生） 南星半钱（姜汁浸） 花蛇肉（酒浸，炙）一钱

【用法】上为细末。一岁一字，薄荷汤调下。

【主治】小儿急慢惊风，诸痫涎盛，头颈强直如弓。

35128 全蝎散

【方源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】蛇头一个（酒浸） 蜈蚣一条（酥炙） 蝎一钱 草乌一个（去皮尖） 麻黄（去节）一钱 朱砂一钱半 龙脑 麝香各一字

【用法】上为末。一岁一字，薄荷汤、酒调下。

【主治】小儿急慢惊风，潮作不定，心肺中风。

35129 全蝎散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】全蝎二枚（去毒，醋炙） 赤足蜈

蚣一条(醋炙) 麝香一字(别研) 辰砂一钱(别研)

【用法】上为细末,同研匀。每服一字,食后、临睡温酒调下。

【主治】头风攻注,口眼不正。

35130 全蝎散

【方源】《普济方》卷三六一引《汤氏宝书》。

【组成】全蝎(头尾全者,用生薄荷叶裹,外以麻线缠,火上炙燥为度)

【用法】上为末。另研生朱砂、麝香各少许,煎麦门冬汤调下。

【主治】胎惊风。

35131 全蝎散

【方源】《魏氏家藏方》卷九引惠斋方。

【组成】脑子 血蝎 南硼砂 乳香 全蝎各等分

【用法】上为细末。搽之。

【主治】牙疼。

【宜忌】壮盛人方可用之。

35132 全蝎散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】全蝎二十四个(炒) 川楝子(炮,去核) 茴香(淘去沙,炒) 桃仁(去皮尖)各半两 青橘皮(去瓢)二分(炒)

【用法】上为细末。每服二钱,水八分盏,人盐少许,葱白五寸,煎六分,食前热服。

【主治】小肠气痛极,不食,下泄。

35133 全蝎散

【方源】《普济方》卷三〇一引《直指》。

【组成】鸡心槟榔一大个(破开,以黄华丹一钱合在内,湿纸裹煨) 明硫黄(研)二钱 生虢丹二钱 全蝎三枚(焙)

【用法】上为细末,入膩粉半钱、麝香少许。于瓷器收。每用少许,麻油调抹两掌,先以鼻嗅,男以两掌掩外肾,女以两掌掩两乳,各睡至醒,次日又如此用药。

【主治】肾脏风,发疮疥。

35134 全蝎散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】全蝎七枚(各用紫苏叶包,涂蜜炙;重包,又涂蜜炙)

【用法】上为细末。每服一字,姜汁入蜜搜和含化。

【功用】通窍豁痰。

【主治】小儿惊风不语。

35135 全蝎散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】全蝎一个(焙) 琥珀 朱砂各少许

【用法】上为末。每服一字,麦门冬煎汤调下。

【主治】诸惊胎痫。

35136 全蝎散

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】全蝎十一个 朱砂(研) 干胭脂各一钱 薄荷四钱

【用法】上为细末。每服半钱,乳汁调下。

【主治】小儿急慢惊风,搐掣瘈瘲,痰实壅塞,胸膈不利。

35137 全蝎散

【方源】《医方类聚》卷二十三引《王氏集验方》。

【组成】川乌(炮) 草乌(炮)各半两 麻黄一两半 川芎 防风 羌活各一两 地龙(去土) 雄黄各三钱 全蝎十个(一方加苍术、细辛尤妙)

【用法】上为极细末。每服半钱重,食后、睡时茶清调下;仍以少许贴太阳穴。

【主治】偏正头疼,一切头风,两太阳穴疼不可忍者。

35138 全蝎散

《永乐大典》卷九八一引《如宜方》。为《活幼口议》卷十四引东汉王氏方“观音全蝎散”之异名。见该条。

35139 全蝎散

【方源】《永类铃方》卷二十引《保婴方》。

【组成】全蝎二十四个(新薄荷叶包,以竹夹住,于慢火上炙数次;或干薄荷,酒浸升,包炙亦可) 僵蚕半两(炒,去丝嘴,用薄

荷依法炙) 南星一两(取末,以生姜一两,切片,新薄荷叶二两,同捣和,捏作饼,晒干。如急惊,不用南星,加大黄) 大黄一两(煨。若慢惊,不用大黄,加制南星) 白附子(炮)三钱 防风(去芦,叉) 天麻 甘草(炙) 朱砂(水飞) 川芎各半两

【用法】上为末。一岁儿服一字;二岁儿服半钱,薄荷汤调下,量大小岁数加减。身热发搐,煎后火府散调下;慢惊吐泻后发搐,生姜汤调下;急惊搐,煎火府散加大黄汤调下。

【主治】急慢惊风,发搐。

35140 全蝎散

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】全蝎一个 白僵蚕一个(去丝) 蝉蜕三个

【用法】上为末。搗生姜自然汁调,涂之。

【主治】外风入疮口。肿痛。

35141 全蝎散

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】全蝎 麝香少许 砂糖 朱砂

【用法】上为末。用颈白地龙捣如泥,以井花水调前药服之。

【主治】产后中风,诸风。

35142 全蝎散

《普济方》卷三七三。为《直指小儿》卷二“星香全蝎散”之异名。见该条。

35143 全蝎散

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】全蝎半两 白附子 朱砂(别研)三钱 白僵蚕二钱 麝香一钱(别研)

【用法】上为细末。每服半钱,荆芥汤入酒少许,用调服。

【主治】小儿胎风诸痛,手足痲痺,目睛上视,颈项紧急强直,或摇头弄舌,牙关紧急,口吐痰沫,反拗多时,精神不宁,睡眠多惊,吐衄生风,昏塞如醉。

【备考】方中白附子用量原缺。

35144 全蝎散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】全蝎(炒) 川芎 黄芩 僵蚕

(炒,去丝嘴) 赤芍药 甘草 朱砂 南星(汤泡,去皮脐,焙) 天麻各三钱

【用法】上为细末。每服一钱,用生姜汤调服,不拘时候。

【主治】小儿口眼喎斜,语言不清。

35145 全蝎散

《婴童百问》卷三。为《直指小儿》卷二“蝉蝎散”之异名。见该条。

35146 全蝎散

【方源】《婴童百问》卷三。

【组成】全蝎(大者)七个(薄荷叶包,炙黄色为度) 僵蚕三个(炒) 辰砂 麝香各少许

【用法】上为末。石榴皮煎汤调下。

【功用】大能定搐。

【主治】急慢风。

35147 全蝎散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】全蝎 川椒 防风 荆芥 细辛 独活各等分(一方有白芷,无独活)

【用法】上咬咀。每服二钱,水钟半,煎一钟,乘热漱之。一方为末,擦。

【主治】风牙、虫牙疼痛。

35148 全蝎散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】蝎梢七个

【用法】上为末,热酒调服。

【功用】开关定搐。

【主治】破伤风。

35149 全蝎散

【方源】《简明医彙》卷六。

【组成】全蝎二十个(洗,炒) 朱砂(水飞)五分 硼砂 冰片 麝香各二分半

【用法】上为末。用乳母唾调,涂儿口唇内及牙上。或猪乳调。入口内。

【主治】小儿口噤。

35150 全蝎散

【方源】《诚书》卷八。

【组成】全蝎十二个(用新薄荷叶夹缚,慢火炙五次,酒浸开) 僵蚕二钱半(炒,用

新薄荷叶缚，慢火炙五次，酒浸开）南星（去脐，炮七次，切片，加姜一两、薄荷五叶捣成饼）防风 天麻（煨）琥珀 甘草（炙）辰砂（飞）川芎 附子（炮）各二钱半

【用法】上为末。一岁一字，二岁半钱，薄荷汤调下。

【功用】化痰截惊。

35151 全蝎散

【方源】《医部全录》卷四〇九。

【组成】全蝎二十四个 僵蚕二十四个 白附子一钱 南星一两 甘草 天麻 朱砂各二钱半 川芎一钱半

【用法】上为末。姜汤调下；热甚，加薄荷汤调下。

【功用】下儿之痰。

35152 全蝎散

【方源】《医部全录》卷四三〇。

【组成】钩藤 人参各半分 全蝎 天麻各一分 犀 甘草（炙）各半分

【用法】上为末。每服一钱半，水半钟，煎五分，温服。

【主治】小儿天钩，潮热。

35153 全蝎散

【方源】《医部全录》卷四九四。

【组成】全蝎五个（蜜焙干） 蝉蜕五个（酒浆洗，和炒）

【用法】上为细末。再加酒、芍药、砂糖调服。

【主治】小孩百日里出痘。

35154 全蝎散

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】瓜蒂散加全蝎

【功用】吐之。

【主治】痰涎壅盛，有汗里实。

35155 全蝎散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】活蝎一个（麻油一盞浸三日，取起晒干）

【用法】上为末。以鹅毛蘸油搽疮上。

【主治】瘰癧。

35156 全蝎散

《杂病源流犀烛》卷二十五。为《普济方》卷四十六引《德生堂方》“全蝎膏”之异名。见该条。

35157 全蝎散

《外科真铨》卷下。为《洞天奥旨》卷十“全蝎生皮散”之异名。见该条。

35158 全蝎散

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】朱砂 半夏各七分 天麻 巴豆霜各二钱七分 南星 全蝎 川军各七分 黄连二钱七分

【用法】上为细末，用绢罗筛至极细。每服一分，用白水送下。

【功用】镇惊解抽，通便泻下。

【主治】小儿急热惊风，中风。

【宜忌】小儿久病，虚弱已极者，切不可用。否则恐有耗元气，兼伤胃肠之弊。

35159 全蝎膏

【方源】《普济方》卷四十六引《德生堂方》。

【异名】全蝎散（《杂病源流犀烛》卷二十五）。

【组成】全蝎二十一个 土狗三个 五倍子五钱 地龙六条（去土）

【用法】上为细末，好酒调成膏子。摊在纸上，贴放太阳穴上。

【主治】偏正头风，气上攻不可忍。

35160 全鳖丸

【方源】《直指》卷九。

【组成】知母 贝母 杏仁（浸去皮）各三分 柴胡二两 川芎一两 当归 明阿胶（炒酥）各半两

【用法】上粗截，入厚瓷器中，用中等活鳖一个生宰，于头上去鳖病，以鳖肉并血并药，用醇酒五升同浸一宿，密纸封，次早慢火同煮，俟熟取鳖，令病者随意食之。只留鳖甲并骨，并药焙干，为末，以浸药酒汁调米粉糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮送

下，不拘时候。

【主治】劳瘵虚热嗽喘。

35161 全鳖丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】当归 生地 熟地 丹皮 杜仲 益母草 地骨皮各三两 天冬（去心） 白芍 麦门冬（去心） 贝母（去心） 牛膝 白茯苓 续断 陈皮各二两 甘草一两五钱 五味子一两

【用法】上药都拌匀，分为两处，以一半置大砂锅内，用水八碗，煎至四五碗，将滓滤出，再入水五碗，煎二三碗滤出，将滓晒干，同未煎一半药，共研为末听用；再用甲鱼一个重一斤者，如多少俱不可用，将甲鱼后足吊起，过一日候渴极，放入药汁内一时许，用砂锅煮之，陆续添药汁，须剩一碗许听用；其鳖煮烂，剔出骨甲，醋炙黄脆为末，入前药末内和匀，以鳖肉捣烂，并汁和药为丸，如梧桐子大，阴干，瓷器收贮。每服三钱，空心清汤送下。

【主治】一切骨蒸，虚损劳热。

35162 全鳖丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】生地 熟地 知母 贝母 杏仁 款冬 沙参 丹皮 紫菀各一两 青蒿 前胡 柴胡各五钱

【用法】用团鱼一个，斤外者佳，清水漾七日，将麻扎其头足，和药纳坛内，用水三碗，将箬扎坛，隔水煮一日，取起鱼，剔去甲骨，炙燥；鱼肉捣烂如泥；所存之药，另置砂锅煮干，炒和骨甲为末，外用米仁、莲肉粉各四两，以糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，黄耆麦冬汤送下。

【主治】肝肾阴虚，骨蒸劳嗽。

35163 全体神膏

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】当归二两 生地二两 续断一两 牛膝一两 甘草五钱 地榆一两 茜草一两 小蓟一两 木瓜一两 杏仁三钱 人参一两

皂角二钱 川芎一两 刘寄奴一两 桑木枝四两 红花二两 白术一两 黄耆一两 柴胡三钱 荆芥三钱

【用法】用麻油三斤，熬数沸，用麻布沥去滓，再煎滴水成珠，加入黄丹末（水漂过）一斤四两，收为膏，不可太老；再用乳香三钱、没药三钱、自然铜（醋浸，烧七次）三钱、花蕊石三钱、麒麟竭五钱、白蜡一两 海螵蛸三钱，为细末，乘膏药未冷时，投入膏中，用桑木棍搅匀取起，以瓦器盛之。临时以煨摊膏，大约膏须重一两。

【主治】跌伤骨折。

35164 全元百补丸

【方源】《简明医骈》卷七。

【组成】香附一斤（四两醋浸，四两酒浸，四两重便浸，四两人乳浸，如无人乳，盐酒浸；夏一日，春秋二日，冬三日，晒干） 当归六两 川芎 熟地各四两 茯苓 玄胡索各二两 白术四两 甘草（炙）一两 益母草叶八两（端午日采佳）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每七十丸，空心砂仁汤送下；醋汤、酒、滚水任送下。

【主治】妇女劳伤气血，阴阳不和，乍寒乍热，心腹疼痛，少食乏力。

35165 全生止逆汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】麦冬 焦栀 茯神 枣仁 黄芩 百合 茯苓 石菖蒲 香附 广皮 白芍 生地 天冬 辰砂 竹叶

【功用】安神养血。

【主治】妊娠忽遇死丧大故，悲哀太盛，以致胎气逆上，内热口干，梦寐不宁，烦躁不卧。

【方论选录】是方二神、苓、二冬、枣仁，安神定志；芩、芍、地、栀，清热凉血；附、广，和氣止逆；竹叶清肺金；百合润肺燥；辰砂镇怯；菖蒲开窍。立方之意深矣。

35166 全生白术散

《女科撮要》卷下。为《全生指迷方》卷四“白术散”之异名。见该条。

35167 全生白术散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参一钱 白术二钱 茯苓皮八分 甘草三分 当归二钱 川芎六分 紫苏陈皮各四分 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】妊娠脾胃虚弱所致子肿，面目虚浮，四肢有水气。

【加减】或加蒲种壳二钱，或干浮萍一钱，生姜用皮，并加冬瓜子三钱。

35168 全生至宝丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】芡实一斤 山药二斤 黑芝麻八两 小黄米(炒)三斤 薏仁一斤 白糖一斤 肉桂五钱

【用法】上药各为末。白滚水每日调服五钱或一两。

【功用】开胃健脾，补肾益精。

【主治】劳瘵。

【方论选录】或疑入肉桂恐动火，不知人非命门之火，不能生长，于七斤有余之药，加桂只五钱，不过百分之一，何热之有？正取其温气以生长脾胃耳。

35169 全生至宝丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】人参(去芦)五两 黄毛鹿茸(去毛)一两 白术(炒)二两 当归四两 白芍一两五钱 橘皮七钱 首乌(炙)六两 黄耆一两二钱 茯苓二两 麦冬三两 山药二两 远志肉(炙)一两 杜仲炭一两五钱 巴戟肉(炙)二两 木瓜七钱 补骨脂(炒)一两五钱 牛膝一两五钱 五味子(炙)一两 熟地十两 山萸肉(炙)二两 杞子二两 川芎一两五钱 甘草三钱 二仙胶二两

【用法】上为细粉，过罗，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一九，一日二次，温开水送下。

【功用】补气养血，滋阴益肾。

【主治】男子肾亏遗精，腰痠腿痛，妇女产后血气不足，精神衰弱。

35170 全生虎骨散

【方源】《袖珍》卷一引《简易方》。

【组成】当归二两 赤芍药 川续断 白术 藁本 虎骨各一两 乌蛇肉半两

【用法】上为末。每服二钱，食后温酒调下。

【功用】润筋养血去风。

【主治】半身不遂，肌肉干瘦。

【宜忌】忌用麻黄发汗，恐津液枯竭。

【加减】骨中疼痛，加生地黄一两；脏寒白痢者，加天雄半两。

35171 全生茯苓散

《医方大成》引《简易方》。为《金匱》卷下“葵子茯苓散”之异名。见该条。

35172 全生茯苓散

【方源】《便览》卷四。

【组成】车前子 赤茯苓 葵子(研) 条芩各等分 发灰少许

【用法】水煎，空心服。

【主治】妊娠小便不通或赤涩。

35173 全生保安散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】麻黄 羌活 防风 升麻 生地黄 黄柏(酒浸)各五分 川芎 藁本 干葛 苍术 黄芩(酒浸) 茯苓 柴胡各三分 红花 细辛 苏木 白术 陈皮各二分 甘草 归身 黄连各三分 连翘 吴茱萸各五分

【用法】上锉一剂。立春、立夏、立秋、立冬之日水煎，露一宿，次早温服。如一年之内依时服此四服，永不出痘。

【功用】预解胎毒，免疫。

35174 全生活血汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】红花三分 蔓荆子 细辛各五分 生地黄(夏月多加之) 熟地黄各一钱 藁本 川芎各一钱五分 防风 羌活 独活 炙甘草 柴胡(去苗) 当归身(酒洗) 葛

根各二钱 白芍药 升麻各三钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【功用】补血养血，生血益阳。

【主治】①《兰室秘藏》：妇人分娩及半产漏下，昏冒不省，瞑目无所知觉。②《校注妇人良方》：妇人产后发热，自汗盗汗，目眈眈，四肢无力，口干头晕，行步欹侧。

【方论选录】《济阴纲目》汪洪笺释：东垣主此汤者，益阳焉。《素问》曰：阴者，从阳而起亟也。阴不从阳，则阳外散，故多汗也。而升麻、葛根升阳明之气；柴胡、防风升厥阴之气；羌活、藁本升太阳之气于背；细辛、独活升少阴之气于前；蔓荆子凉诸经之血；甘草和诸阳之气；四物养血于诸阴之经；红花活血于诸阳之络。然则升而不敛，非所以藏阴，故用白芍为君；升而太过，非所以益气，故用甘草为佐。以此方和之，则外者得入，内者得出，使经络通，邪气散，阴阳和，筋骨用矣。

35175 全生活血汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 熟地五钱 独活一钱半（盐水炒） 炙草一钱 防风一钱半（盐水炒黑） 人参一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后中风盗汗，脉浮虚。

【方论选录】产后血气两虚，风乘虚袭，而邪不受制，营气暗泄，故睡中汗出为盗汗焉。熟地补阴滋血，以资血海；人参补气扶元，以雄气海；白芍敛阴和血脉；当归养血荣经脉；生地凉血室滋血；川芎入血海行气；独活开经气；防风泄风邪，并盐水炒黑引领参、地以分解虚邪；炙草缓中益胃。水煎温服，使血气内充，则风邪外解，而经脉清和，津液完固，安有盗汗不止之患乎。

35176 全生活血汤

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】黄耆（炙） 熟地 生地 川柏（炒炭） 升麻

【功用】补血。

【主治】产后血亡火炽，致昏冒瞑目。

【加减】不应，加人参。

35177 全生救难汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙黄）各一两 附子（炮）一钱 炙甘草五分

【用法】水二钟，煎七分，待微冷服。

【主治】妊娠临月，感少阴风邪，恶寒踡卧，手足厥冷。

【加减】不应，加肉桂、干姜（炮）各一钱。

35178 全阴救胃汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】玄参五钱 茯苓五钱 桃仁一钱 葛根一钱 人参一钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】阳明之痉。感湿热之气，复感风邪，手足牵引，肉膈胸胀，低头视下，肘膝相拘。

【方论选录】方中滋胃中之阴，而不损其胃中之气，玄参去热，葛根去风，茯苓去湿，三邪皆去，而又得人参以生胃，麦冬以生肺，则桃仁不亦可以已乎？不知桃仁最动之味，三邪并入于胃中而补药多于攻药，则邪得补而反流连不去，加入桃仁性急之物，既不滞而攻亦不缓，始能相济以有成也。

35179 全宝赴蓬膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】大黄 黄耆 地龙（去土） 当归 龙骨 海藻各半两 乳香 没药各二钱 脑子一钱 江子十一枚（去皮） 麝香少许 粉霜 硃砂 川山甲 轻粉各三钱

【用法】上用荞麦灰一斗，煎淋灰，三复淋之，汁煎三分之下，用云里雁粪五钱煎十来沸，提起放冷澄清，再熬入大黄末煎三沸，次入朴消、花碱各三两，每药一两加入石灰三两 黄丹半两，逐旋搅之，待煎滴水中直到底不散，方可提起，用瓶盛。如用，入麝香、

脑子。

【主治】诸恶毒疮并一切疔疮。

35180 全真一气汤

【方源】《冯氏锦囊·药按》卷二十。

【组成】熟地八钱（如大便不实，焙干用；如阴虚甚者，加倍用）制麦门冬（去心，恐寒胃气，拌炒米炒黄色，去米用）三钱（肺虚脾弱者少减之）鸡腿白术（炒深黄色，置地上一宿，出火气，不用土炒。如阴虚而脾不甚虚者，人乳拌透，晒干，炒黄）三钱（如脾虚甚者，用至四五钱）牛膝（去芦）由二钱加至三钱 五味子由八分至一钱五分 制附子由一钱加至二钱余

【用法】水煎，冲参汤服。人参由二三钱加至四五钱，虚极者一二两，随症任用，另煎冲入前药。如肺脉洪大，元气未虚，竟用前药，不必冲参。

【功用】滋阴救火。

【主治】阴虚火旺，上热下寒之斑疹、痘麻疹，躁热吐血，喘泻昏沉及中风、虚劳。

①《冯氏锦囊》：阴分焦燥，上实下虚，上热下寒，阴竭于内，阳越于外，斑疹热极烦躁，上喘下泻。中风大病阴虚发热，吐血喘咳，一切虚劳重症。②《会约》：麻疹头面不起，壮热不食，喘促昏沉。③《时方歌括》：痘科之逆症。

【宜忌】①《冯氏锦囊》：以上六味必先煎好，另煎人参浓汁冲服，则参药虽和，而参力自倍，方能驾驱药力，克成大功。若人剂内同煎，则渗入群药，反增他药之长，而减人参自己之力。②《中医杂志》（1963；4：40）：腹痛不大便，即使见高热、神气困倦、唇舌焦燥，亦不宜本方。脾气衰虚，熟地、麦冬少用或不用。治疗麻疹，一般用于麻疹收没期，或麻疹早回者。

【加减】燥渴，则熟地倍之；肺热，则麦冬多用；脾虚，则白术重投；阳虚，则附子多加；元气大虚，则人参大进；气浮气散，则牛膝、五味略多；倘有假阳在上者，去参用

之。

【方论选录】①《冯氏锦囊》：或疑五味子酸敛，有碍麻疹，是尚泥于麻疹为有迹之毒，而未达乎气血无形之所化也；况有附子之大力通经达络，何虑五味子酸收小技哉？若不借此少敛，则五脏浮散之残阳，何因藏纳而为发生之根本乎？况附用阴药为君，则唯有回阴制火之力，尚何存辛热强阳之性哉？此方阴阳具备，燥润合宜，驱邪扶正，达络通经，药虽七味，五脏均滋，滋阴而不滞，补脾而不燥，清肺而不寒，壮火而不热，火降而心宁，荣养而肝润。或疑其地黄多而泥膈，殊不知重可坠下，浊可补阴，正取其重浊濡润下趋；况兼白术，其剂则燥者不能为燥，滞者不能为滞矣。或嫌其杂，奈小病、暴病，或在一经；大病、久病，必兼五脏，五脏既已互虚，若不合众脏所欲以调之，难免又增偏胜、偏害之祸；况土金水，一气化源，独不观古方中五脏兼调者乎？或嫌其白术多用而滞，殊不知犹参力多则宣通，少则壅滞，岂不闻塞因塞用，而有白术膏者乎？或嫌其热而燥，殊不知附子随引异功，可阴可阳，可散可补，用补气药可追失散之元阳；同养血药可扶不足之真阴；有发散药则逐在表之风邪；引温暖药则祛在里之寒湿，况独不念附子理中汤，更为纯阳之剂耶？故用此以便火降水土健运如常，精气一复，百邪外御，俾火生土，土生金，一气化源，全此一点真阴真阳，镇纳丹田，以为保生之计而已，即名之曰全真一气汤。熟地、白术，专补脾肾，乃先天、后天，首以重之。但一润一燥，何能逐坠？水土忌克，难成一家，用炒麦冬和之，俾土生金，金生水，水生沫化，源有自，既相克所以相成，复相生所以相继，再入牛膝、五味，则更得纳气藏源，澄清降浊，但诸药和缓，大功难建，虽调营卫，经络难通，更入乌附，既助药力，复可行经，且使真阳能复交于下，真阴自布于上，既济之象一得，燥润偏枯之势自和，复入人参以驾驱药力，补

助真元，火与元气，势不两立，元气生而火自息矣。②《时方歌括》：方以熟地滋肾水之干；麦冬、五味润肺金之燥；人参、白术补中宫土气，俾上能散津于肺，下能输精于肾；附子性温以补火，牛膝引火气下行，不为食气之壮火，而为生气之少火，从桂附地黄丸套来，与景岳镇阴煎同意。

【临证举例】①麻疹 余治洪姓郎，未及一周，时当暑月，壮热多日，神气困倦，唇舌焦燥，饮乳作呕，五心身热如烙，脉洪数而弦。问其前服之药，乃发散消导数剂，复疑麻疹，更为托表。余曰：久热伤阴，阴已竭矣，复加托表，阳外越矣，若不急为敛纳，何以续阴阳于垂绝哉？乃用熟地四钱 炒燥麦冬一钱五分 牛膝一钱二分 五味子二分 制附子四分 煎服一剂而热退，次日更加炒黄白术一钱六分，另煎人参冲服而愈。②小儿手足瘫软 齐化门外张宅令郎未及一周，卧于低炕，睡中坠下，幸炕低而毫无伤损，嘻笑如故，似无痛苦也。但自后右手足瘫软不举，手不能握，足不能立，脉则洪大，久按无力，乃知先天不足，复为睡中惊触，气血不周行之故也。乃以熟地四钱 炒麦冬一钱五分 炒白术二钱四分 牛膝二钱 五味子四分 制附子五分 煎小半钟；另用人参二钱煎浓汁二三分冲药，每早空心服之。六剂而手足轻强，精神更倍。

【备考】本方方名，《时方歌括》引作“全真益气汤”。

35181 全真益气汤

《时方歌括》。即《冯氏锦囊·药按》卷二十“全真一气汤”。见该条。

35182 全瘰散火汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】元参三钱 黄芩一钱 生甘草一钱 梔子一钱 桔梗二钱 生地二钱 荆芥三钱（炒黑） 当归一钱

【用法】水煎服。一剂而热毒、火毒尽行解散矣。

【主治】小儿出痘，其痘疮之色红盛，烦渴，大便干燥，小便短涩而黄赤，脉洪大不伦，舌上生疮。

【方论选录】此方用芩、梔以清火；又得元参以退其浮游之火；更妙在用荆芥、桔梗引火外出；而生地、当归滋其腑脏之燥，则雨润风吹，有不变火宅而清凉者乎？所以获解散之功而无背违之失也。

35183 全蝎五痢丸

《直指小儿》卷二。为《东医宝鉴·杂病篇》卷十一引钱乙方“三痢丹”之异名。见该条。

35184 全蝎生皮散

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【异名】全蝎散（《外科真诠》卷下）。

【组成】全蝎一两 生黄耆四两 金银花八两 生甘草一两 麦冬四两

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每日服五钱，子服三丸。

【主治】父母生疮，因产胎漏皮疮之子者。

【备考】本方方名，据剂型当作“全蝎生皮丸”。《外科真诠》本方用法：每日母服一两，子服一钱。其病重者，母子必须同服。外用白及散敷之。

35185 全蝎地龙丸

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】僵蚕（炒，去丝）半两 地龙（去土）二两（净） 全蝎十四个（去尾尖） 穿山甲（火炙过）半两 黑小豆二十二粒 赤足蜈蚣（金头者）一条 草乌（生用，去尖、皮）半两

【用法】上为末，糯米醋煮糊为丸，如绿豆大。当发日间，每服十五丸，麝香酒送下。临卧时，以壁土及香白芷为末，冷水调敷患处，米醋尤妙。吃罢，如人行四五里后，以荆芥煎茶吃药一钱，即行无忌。

【主治】脚气。

35186 全蝎延胡散

《直指》卷十八。为《百一》卷十五“夺命散”之异名。见该条。

35187 全蝎观音散

【方源】《局方》卷十(续添诸局经验秘方)。

【组成】石莲肉(炒,去心) 白扁豆(炒) 人参各二两半 神曲(炒)二两 全蝎 羌活 天麻(去苗) 防风(去苗) 木香(炮) 白芷 甘草(炙) 黄耆(捶扁,蜜刷炙)各一两 茯苓(去皮)一两半

【用法】上为细末。婴儿一字,二三岁半钱,四五岁一钱,用水一盏或半盏,枣子半个或一个,同煎至七分,去滓服,不拘时候。

【功用】温养脾胃,进美饮食。

【主治】①《局方》:小儿外感风冷,内伤脾胃,呕逆吐泻,不进乳食,久则渐渐羸弱。②《幼科折衷》:小儿脾虚自汗,多出额上,沾粘人手。

35188 全蝎观音散

【方源】《普济方》卷三七一。

【组成】全蝎二十一个 天麻 防风(去芦) 羌活各五钱 川白芷 黄耆(蜜炙) 甘草(炙)各二钱 赤茯苓(去皮)五钱 人参(去芦)二分 缩砂仁五钱 扁豆(姜制)二钱

【用法】上为末。冬瓜仁、枣汤调下。急宜服,以防慢候。

【主治】外感风邪,内伤脾胃,以致脾虚,吐泻俱下。

35189 全蝎观音散

《医统》卷八十九。为《活幼口议》卷十四引东汉王氏方“观音全蝎散”之异名。见该条。

35190 全蝎乳香散

【方源】《普济方》卷一八五引《德生堂方》。

【组成】川乌头(生,去皮、脐) 马蔺子各一两 全蝎 川山甲(炮) 乳香各五钱 苍术一两

【用法】上为细末。用白芥子三两研烂如膏,和前药末,以纸摊药膏,敷贴痛处;热甚,即去药,再贴上。

【功用】住痛。

【主治】诸风湿,遍身骨节疼痛不可忍。

35191 全蝎星香散

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】南星八钱 木香一钱 全蝎三个

【用法】作二服。水一钟,加生姜十片,煎服。

【主治】五痫。马痫,张口摇头,马鸣;牛痫,目正直视,腹胀;鸡痫,摇头反折,喜惊;羊痫,喜扬目吐舌;猪痫,喜吐沫。

会**35192 会毒散**

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】贝母 大黄 角刺各五钱 山甲(炙) 槐角各三钱 连翘二钱

【用法】水煎服。

【主治】鱼口便毒。

35193 会脓散

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】穿山甲(炙) 白僵蚕(炒,去丝嘴) 白芷各五钱 大黄二两 乳香 没药 五灵脂各五钱

【用法】上为末。每服五钱,酒调下。幼者用三钱。

【主治】腹中肿毒。

35194 会脓散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】白芷 僵蚕(炒) 川山甲(煨)各二钱 大黄四钱 乳香 没药各一钱

【用法】上为末。量人强弱,或全用,或一半,以当归四钱,用酒、水各一钟,煎一钟,去滓调服之。此药若嫌太多,则咬咀为饮,加生大黄煎服之,尤妙。

【主治】恶毒便毒初起。

35195 会脓散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆 归尾 川山甲(炒) 大黄各一两 白芷六钱 蜂房一个(重六七钱者,酒浸、瓦焙六次) 连翘二钱 蜈蚣(大

者) 七条(酒浸、瓦焙二次)

【用法】上为末。每服三五钱,无灰酒调服;再多饮,以助药力。

【主治】肚痛,内痢。

【加减】如背疽,加羌活;胁痛,加柴胡;乳症,加升麻。各随经络加引经药五七分,酒煎服药尤佳。

35196 会仙救苦丹

【方源】《普济方》卷六十二引《圣惠》。

【组成】拣甘草 寒水石(烧) 乌鱼骨 白僵蚕各一两 缩砂仁(炒) 白茯苓 贯众各半两 麝香少许 南硼砂 象牙(末)各一钱

【用法】上为细末,重罗,面糊为丸,如鸡头子大,用朱砂为衣。每服一丸,噙化咽津。

【主治】咽喉闭塞不通,有妨咽物。骨鲠。

35197 会厌逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】桃仁五钱(炒) 红花五钱 甘草三钱 桔梗三钱 生地四钱 当归二钱 玄参一钱 柴胡一钱 枳壳二钱 赤芍二钱

【用法】水煎服。

【主治】①《医林改错》:痘五六天后,饮水即呛。②《医学集成》:瘀血凝滞之呃逆。

【方论选录】《江苏中医杂志》(1984; 6: 28):本方由《伤寒论》四逆散以枳壳易枳实,合桃红四物汤去川芎加玄参、桔梗而成。四逆散能调气血,利升降;桃红四物汤为养血活血方。去川芎者,因其辛温性燥,恐伤阴津;增入玄参,意在助生地以滋养柔润;桔梗乃利咽圣药,能升降肺气,并佐柴胡、枳壳升降气机,引活血祛瘀药上达病所。

【临证举例】①声带小结 《江西中医药》(1983; 6: 20):王某某,男性,35岁,1982年9月11日初诊。诉咽部干燥不适,声音嘶哑已二个月,被宜春地区人民医院耳鼻喉科诊断为“声带小结”。经用四环素、喉片、北豆根片及清热利咽中药治疗近月,效果不佳。证见形体壮实,口干咽燥,声音嘶哑,大便

干结,脉缓,舌苔薄黄,舌质稍红,辨证为阴虚喉痹,瘀血内阻。治以养阴清热,活血化瘀之会厌逐瘀汤加味:桃仁10克,红花10克,当归10克,生地10克,赤芍12克,桔梗12克,甘草5克,玄参21克,麦冬15克,柴胡10克,枳壳10克。每日一剂,水煎两次分服。十五剂后,咽干声嘶明显好转,经耳鼻喉科检查声带小结已见缩小。方已中病,嘱续服十五剂,经间接喉镜检查:声带小结已消失,回校任教。②慢性咽炎《江苏中医杂志》(1984; 6: 28):杨某某,男,53岁。有慢性咽炎史二年。近一月余,咽喉干痛较甚,有梗塞感,咽部慢性充血,苔薄,舌下筋脉色紫。此属气滞瘀阻,津液耗伤。拟会厌逐瘀汤主之。药用:生地 桃仁各12克 红花 玄参 赤芍 胖大海各9克 柴胡 枳壳各4.5克 当归6克 桔梗5克 生甘草3克每日一剂,治疗三周而愈。

35198 会通灵应膏

【方源】《理渝》。

【组成】杏仁一两 玄参五钱 蛇蜕 蜂房各二钱半 木鳖仁一两 蓖麻仁 五倍子各二钱半

【用法】铅粉收膏。

【主治】痈毒,疔疮。

35199 会通灵应膏

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】玄参一两 马钱子二两 蓖麻子五钱(去壳) 五倍子五钱 杏仁二两 蛇蜕三钱 带子蜂房五钱 男子发一团 麻油一斤四两

【用法】熬膏用。

【主治】疮疡疔毒,瘰癧,大人疔疮,小儿蟾贡头。

35200 会稽赖公常山汤

【方源】《外台》卷五引《崔氏方》。

【异名】常山汤(《中藏经·附录》)。

【组成】常山三两 石膏八两(碎,绵裹) 甘竹叶一把(切) 糯米一百粒

【用法】上切。以水八升，明旦欲服，今晚渍于铜器中，露置星月下高净处，向明取药，于病人房门前，于铜器里缓火煎取三升，分三服；日欲出一服，临发又一服，若即定，不须后服。取药滓石膏裹置心上，余四分，置左右手足心。

【主治】疟疾。

①《外台》引崔氏方：疟疾。②《千金》：疟或间日发者，或夜发日。③《圣济总录》：疟疾发渴，饮水不止者。④《中藏经·附录》：妊娠患疟。

【宜忌】忌生葱、生菜。

合

35201 合膏

《普济方》卷五十六引《圣惠》。为《外台》卷二十二引《古今录验》“香膏”之异名。见该条。

35202 合口散

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】山鳅（黄泥包，煨热后去泥）

【用法】上为末。麻油调搽。

【功用】生肌敛口。

【主治】诸疮。

35203 合手香

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】大风子二三个 水银一钱 杏仁七个（去皮尖） 桐油一两 油核桃仁五钱 木鳖十个（去皮） 潮脑五钱 人言豆大一块（为末）

【用法】上捣为泥，为丸如核桃大。用一丸两手撮揉，令鼻搐其药气，再以两手上油揉痒处。

【主治】疥疮。

35204 合手香

《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。为原书“合掌丸”之异名。见该条。

35205 合光丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】辰砂五两（打如绿豆大，匀用） 乳香半两 天南星（末）一两 金箔五片

【用法】先将朱砂用蜜浴过，上用金箔五片度过，用天南星为底，乳香为粗末，在上面安一张好纸，上裹定，用面糊粘合；又上面用苦苣半干，又用一张纸角定糊粘实，使土作一方盒，上下用解盐壅实土盒，用盐泥固济，下火五秤烧；如火尽，于地下出火毒一日，研细，用生姜自然汁煮糊为丸，用银石出光。每服一丸至三丸，空心米饮送下。

【主治】真阳亏少，脏腑疼痛。

35206 合凶散

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣济总录》卷一六七。

【组成】防风一两半 柏子仁 白及各一两

【用法】上为末。以乳和敷凶上，一日一次。十日知，二十日愈。

【主治】小儿凶开不合。

35207 合阴汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】柴胡八分 茯苓五钱 甘草五分 天花粉一钱 枳壳三分 神曲五分 白芍三钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒至九日而泻利不已。

35208 合欢丸

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】当归 熟地黄各三两 茯苓 白芍各一两五钱 酸枣仁（炒） 远志肉（制）各一两 香附（酒炒） 炙甘草各八分

【用法】上为末，炼蜜为丸。白汤送下。

【主治】妇人气郁不孕。

【加减】气虚，加人参一两。

35209 合欢饮

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【异名】合欢皮散（《灵验良方汇编》卷二）。

【组成】合欢皮 白薇

【用法】同煎服。

【主治】肺痈久不敛口。

35210 合明散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】蛤粉 石决明 甘草各等分

【用法】上为末。每服半钱，煮猪肝汁调下。食后服。

【主治】小儿雀目，至夜不见物。

【备考】《医统》有夜明砂。

35211 合明散

【方源】《原机启微·附录》。

【组成】楮实子 覆盆子(酒浸) 车前子(酒蒸) 石斛各一两 沉香(另研) 青盐(别研)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】小儿雀目，至夜不见物。

【备考】本方方名，据剂型当作“合明丸”。

35212 合治汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】熟地三两 山茱萸二两 麦冬一两 车前子五钱 元参一两

【用法】水煎服，日日饮之。三消自愈。

【主治】消渴。

【加减】下寒，寒冷之甚者，加肉桂二钱。

35213 合香丸

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】鸡舌香 芎藭各一两 藿香 甘松 当归 桂花 桂心 白芷各半两 零陵香 木香各三分 肉豆蔻 白槟榔各五枚 丁香 麝香少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。常含一丸，津咽下。

【功用】去热毒气，调和脏腑。

【主治】口臭。

【备考】方中丁香用量原缺。

35214 合掌丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大风子肉六钱 油核桃肉六钱 水银四钱 天麻子肉二十粒 番打麻末一钱 樟脑六钱 枯矾一钱 细茶(末)二钱 麝香一分 苦实(生用)四个(研末)

【用法】上为丸，如弹子大。搽如常法。如疥多，取一二丸入滚水内化开，用绢帛蘸洗三二次。

【主治】疥疮。

35215 合掌丸

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷十九。

【组成】大风子四十九粒 水银二钱(制) 雄黄 海螵蛸各五分 枯矾 番木鳖 川椒各三钱

【用法】上为末，用油胡桃肉为丸。

【主治】沙疮，疥疮。

35216 合掌丸

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】大风子四十九粒(去壳) 樟冰 花椒 槟榔各三钱 枯矾二钱 雄黄二钱 水银一钱

【用法】先将枫子、水银同研至不见星，再研油核桃数枚令烂，入前药为丸，如龙眼大。日则手搓鼻闻，并擦患处，夜则合子掌中而睡。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：解毒杀菌。

【主治】疥癬。

35217 合掌丸

【方源】《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。

【异名】合手香、合掌散。

【组成】大风子(去皮)十四两 红矾五分 胡桃(去皮)三个 硫黄一钱 红枣(去皮核)七个 水银(制)一钱

【用法】共捣一处，兑猪油为丸，二钱重。瓷坛存贮。擦敷疥上，谷草微火烘烤之。

【功用】解毒止痒。

【主治】湿毒疥疮，遍体蔓延，痒痒流水，烦扰难寐。

【宜忌】切勿触摸肾囊及目内，否则必致肿胀。临睡时，两手应着手套为宜。此药有大毒，不可入口。

35218 合掌丹

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】蛇床子 藁本各一两 硫黄一分 石亭脂(老硫黄青色)一钱 麝香二分

【用法】上先用前二味为细末,却细杀后三味,并入前末和匀。生麻油调,于无风处爬发,用少许在掌心合定,候融暖化稀,遍身揩擦。服四物汤匀气血,祛风毒,四物汤用生地黄、赤芍药,加荆芥等分,为粗末,水煎服。

【主治】疮疥。

35219 合掌散

【方源】《普济方》卷二八〇引《简易方》。

【组成】槟榔四个 全蝎二个 白芷四块 草乌(大者)二个 地龙四钱 青箱子一合 海桐皮一钱 枯白矾 硫黄各指大二块 麝香一字

【用法】上为末,和匀,香油调开。临睡时,先于两手心上涂药搽热,用鼻嗅得心中觉有硫黄气,似此依前三次毕,第四次需时要多,然后以原涂药之两手心,合着捧外肾睡,不可放开,睡熟为度。重者不过三五度即愈,更不再发。

【主治】肾瘀气毒,两腿入骨痒痛,两膀内疥疮,两手脓疮下,指缝露白,每日疼痛不可忍。

35220 合掌散

【方源】《急救仙方》卷五。

【组成】马兜铃子一两(半生半熟,为末) 白矾二钱半 硫黄三钱(二味别研)

【用法】用清油调匀,涂掌上,搓热呵之,以鼻嗅其气。

【主治】诸般疥癬疮。

35221 合掌散

【方源】《普济方》卷二八〇引《仁存方》。

【组成】羌活 独活 硫黄 轻粉各二钱

【用法】上为末。用麻油脚敷涂手心中,搽热嗅了,却搽在疮上。

【主治】疥疮。

35222 合掌散

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】茴茹 蛇床子各二两 苦参二钱 生硫黄一钱 雄黄 轻粉各一钱

【用法】上为细末。香油调于手心,擦之知热,鼻嗅之;次将两手交互合于大腿上安眠。

【主治】疥疮。

35223 合掌散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】槟榔 硫黄

【用法】上为末。临睡,用香油调掌心上,鼻嗅之;却以药抱外肾睡。二三日用之效。

【主治】肾脏生疮。

35224 合掌散

《东医宝鉴·杂病篇》卷八。为《普济方》卷二七二引《澹寮方》“敷药合掌散”之异名。见该条。

35225 合掌散

【方源】《外科百效》卷五引如虚方。

【组成】樟脑二钱 水银 蛇床 白芷 花椒各一钱 白矾五分 大风子一钱

【用法】上为细末,油核桃肉为丸。置手掌磨擦嗅之。

【主治】干疥诸疮,黄泡、坐板等疮。

35226 合掌散

【方源】《外科全生集》。

【组成】硫黄一两 铁锈一钱 红砒六分

【用法】上为极细末,以葱汁调和,涂入大碗内,勿使厚薄,以碗覆于瓦上,取艾置碗下熏药;药得熏干,敲药碗声同空碗无异为度,取药再研极细。每遇满身癬疥及肾囊痒,用药一钱可敷数次痊愈。临用以右手中指罗纹粘满香油,再在包内粘药,涂入左手心,合掌数磨,止有药气,不见药形,将两掌擦疮,每日早、晚擦两次,三日扫光;再擦三四日不发。

【主治】满身癬疥及肾囊痒。

35227 合掌散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】吴萸二钱 升底三钱 朝脑一钱 西丁三钱 铜绿一钱五分 白胡椒二钱五分 扫盆一钱

【用法】上为细末,麻油调匀。每浴后,挑

药少许于手心,以两手对擦至热,再以手心摩擦患上,隔三日一次。约三四次全好。

【主治】疥疮,脓窠。

35228 合掌散

《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。为原书“合掌丸”之异名。见该条。

35229 合掌膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】川乌 草乌 斑蝥 巴豆 细辛 胡椒 明矾 干姜 麻黄各等分

【用法】上为细末。每一次用二钱,好醋一匙,打糊为丸,如核桃大,安在患人手心,两手合扎,紧夹在褪裆内,以被盖暖,汗出为度;如醒,去药,就用黄泥水洗手。

【主治】急症伤寒,不省人事。

【备考】不消服药。

35230 合魂丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参五钱 茯神三钱 炒枣仁一两 熟地二两 莲子心五钱 巴戟天一两

【用法】水煎服。

【主治】心肾不交,觉自己之身分而为两,他人不见而已独见之。

35231 合德丸

【方源】《普济方》卷八十一。

【组成】苍术(去皮,米泔浸二日,薄切,晒干)四两 地黄(熟者,细切,焙干)二两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,食前温酒或米泔送下,一日三次。

【功用】补虚活血,健骨轻身,聪耳明目,除昏。

35232 合欢皮散

《灵验良方汇编》卷二。为《景岳全书》卷六十四“合欢饮”之异名。见该条。

35233 合口收功散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】血竭一钱 乳香 没药 轻粉 龙骨各一钱五分 赤石脂二钱 朱砂 海螵蛸各五分

【用法】上为细末。散在疮口上。

【功用】生肌。

【主治】痈疽发背溃烂,不生肌肉。

【宜忌】此方用之不可太早。

35234 合欢保元膏

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷十四。

【组成】人参一两 当归身一两二钱 白术一两五钱 枸杞子一两 大附子半只 川椒三钱

【用法】水煎成膏,入麝二分,藏锡盒中。津化用之。

【主治】阳痿。

众

35235 众仙丸

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】贯众半两 仙茅一分 萆薢一分 附子(炮,去皮脐) 巴豆(去皮,出油) 干姜(炮)各半两 甘草(炙)一钱

【用法】上为细末,煮面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,生姜、大枣汤送下。结胸五七日者,服三丸,内嚼破一丸,不拘时候。利下恶物,心下便宽。

【主治】伤寒结胸,心下硬痛不可忍。

35236 众妙丸

【方源】《朱氏集验方》卷八引蜀医殷机何企颜方。

【组成】川吴茱萸 破故纸(炒) 人参 火砂 蜜砂各一两 北五味子 大附子(炮) 钟乳粉 肉豆蔻(面包焙)各二两 白茯苓一两二钱 鹿茸(炙)二两半 菟丝子(捣,去糠,不碎者真;酒浸,蒸,捣)二两

【用法】上为细末,大钵内滚一二日,令匀,糯米糊为丸,如梧桐子大,焙干,瓷瓶收,常存暖处。可与八味丸轮服。

【主治】虚损。

杀

35237 杀风散

《普济方》卷三六四。即《秘传眼科龙木论》

卷六“杀疳散”。见该条。

35238 杀虫丸

【方源】《古今医鉴》卷九引俞元河方。

【组成】好信不拘多少 黄丹少许

【用法】以黄蜡熔成一块，旋用旋丸，如黄豆大，用白薄丝绵包裹留尾。如右牙疼，则塞右耳；左牙疼，则塞左耳；两边俱痛，则两耳俱塞，必深入耳孔。一夜其虫即死。

【主治】虫牙。

35239 杀虫丸

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】槟榔一两二钱 牵牛一两二钱 锦纹大黄四钱 木香八分 雷丸 芫荇 锡灰 使君子肉各三钱

【用法】上为细末，用连须葱煎汤，露一宿为丸，如小豆大。每服四钱，连根葱汤送下。

【功用】杀虫，消痞块。

【主治】虫疾。

35240 杀虫丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】鹤虱 雷丸 芫荇 槟榔 乌梅 苦楝根 使君子肉

【主治】虫痛。不吐不泻，心腹懊恼，往来上下，痛有休止；或腹中块起，按之不见，五更心嘈，牙关强硬，恶心，吐涎沫或清水，腹热善渴，食厚味或饱则止，面色青白赤不定，蛔虫攻咬，面必黄。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(济南方)：孕妇忌服。

35241 杀虫丸

【方源】《经验良方》。

【组成】海人草六钱 大黄一钱 甘草半钱

【用法】上为丸。每服半钱，一日数次。

【主治】诸虫症。

35242 杀虫丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】川楝子一两五钱 官桂一两五钱 黄柏一两五钱 黄连八钱 鹤虱一两五钱 藜芦一两 贯众一两五钱 花椒一两 明矾

二两 干姜一两五钱 乌梅二两 槟榔一两 雷丸一两五钱 芫荇五钱 苦楝根二两 使君子二两

【用法】上为末，以神曲末四两打糊为丸。每服三钱，空心乌梅汤送下。

【主治】虫扰肚疼。

35243 杀虫丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【异名】杀虫化积丸。

【组成】使君肉 黑白牵牛 槟榔各五钱 芫荇 雷丸 乌梅肉 广木香各三钱

【用法】上为极细末，以白砂糖水泛为小丸。每服二钱，白开水送下。

【功用】杀虫消滞，健胃止痛。

【主治】虫积痞病，肚大腹痛，呕吐清水，唇口紫黑。

【宜忌】服药后二三小时内不食。

35244 杀虫丸

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】黑丑 雷丸 君子各一两 榔片 楝皮各二两 榧子一两 木香 雄黄 半夏各五钱 铅炭 川军各一两 鹤虱五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱大。

【功用】杀虫。

35245 杀虫丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】楝树根一两 黄连三钱 乌梅肉三钱 吴茱萸三钱 炒梔子三钱 白薇一两 白术二两 茯苓三钱 甘草三钱 鳖甲三钱

【用法】上药各为末，炼蜜为丸，如小米大。每服三钱。

【主治】虫痛。

【宜忌】此丸必须乘其饥饿思食时与之。此丸服下，必痛甚，不可即与之水。

【加减】腹下之痛，宜加大黄三钱。

35246 杀虫丹

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】生葱一把

【用法】炒食。虫即化为水。

【功用】杀虫。

35247 杀虫散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】白茺萸一两 藜芦一两(去芦头) 雌黄一两(细研) 麝香一分(细研) 青矾半两 雄黄半两(细研) 苦参一两(锉) 附子半两(炮裂, 去皮脐)

【用法】上为细末, 与麝香相和研匀。每用时, 先以吴蓝、甘草煎汤洗疮口, 去痂拭干, 敷之, 一日二次。

【主治】痈疽发背久不愈。

35248 杀虫散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】獭皮

【用法】烧灰细研。每服二钱匕, 空心米饮调下, 日晚再服。

【主治】脉痔, 肛边生疮痒痛。

35249 杀虫散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】雄黄(揀明净的)六钱

【用法】上为细末。用真芝麻油一钟调匀, 口含片时, 漱出, 再含再漱。数次即愈。

【主治】牙虫痛在一处, 无论有脓无脓。

35250 杀虫膏

【方源】《理渝》。

【组成】桃 李 梅 桑 石榴皮(并取东向者)各七茎 青蒿一小握 苦楝根七寸生蓝叶七片 葱白(连根洗)七个 黑丑头末(半生半炒)一两 大黄五钱 槟榔八钱 三棱(醋炒) 蓬术(煨) 雷丸 茺萸 使君子 木香 甘遂 皂角 灵脂 雄黄各三钱 明矾 轻粉 朱砂各一钱

【用法】麻油熬, 黄丹收, 麝香搅。贴肚脐上。

【主治】劳虫, 眼眶鼻下青黑, 面色萎黄, 脸上有几条血丝, 如蟹爪分明, 或面上白斑, 唇红, 能食, 心嘈, 时痛时止, 痛则咬心, 口吐涎沫清水, 梦中啮齿, 腹中或有块。

【加减】一加贯众、厚朴、干漆、炒白僵蚕

各三钱、紫金锭二钱尤佳。

35251 杀鬼丸

【方源】《外台》卷四引《古今录验》。

【组成】雄黄五两(研) 朱砂五两(研) 鬼白五两 鬼督邮五两 雌黄五两(研) 马兜铃五两 皂荚五两(炙) 虎骨五两(炙) 阿魏五两 甲香一两 羚羊角一枚(屑) 桃白皮五两 白胶香一两 菖蒲五两 羖羊角一枚(屑) 腊蜜八斤(炼) 石硫黄五两(研)

【用法】上十七味, 捣筛十六味, 腊蜜和为丸, 如杏子大。将往辟瘟处烧之。若大疫家可烧, 并带行。

【功用】去恶毒气。

【宜忌】《普济方》: 忌生血物、羊肉汤。

35252 杀鬼丸

《外台》卷十三引《古今录验》。为原书同卷“五疰丸”之异名。见该条。

35253 杀鬼丸

【方源】《千金翼》卷十引丁季方。

【组成】虎头骨(炙) 丹砂 真珠 雄黄 雌黄 鬼白 曾青 女青 皂荚(去皮子, 炙) 桔梗 茺萸 白芷 芎藭 白术 鬼箭(削取皮羽) 鬼督邮 藜芦 菖蒲各二两

【用法】上药治下筛, 炼蜜为丸, 如弹丸大。带之, 男左女右。

【功用】辟疫。

【主治】《圣惠》: 时气瘴疫。

35254 杀鬼丸

【方源】《圣惠》卷五十六。

【异名】杀鬼五邪丸(《普济方》卷二五四)。

【组成】朱砂一两(细研) 雄黄一两(细研) 白龙骨一两 犀角屑半两 鬼白一两(去须) 赤小豆半两 鬼箭羽一两 茺萸二十枚 桃仁五十枚

【用法】上为末, 更研令匀, 以蜡和丸, 如弹丸大。绛囊盛之, 系臂上, 男左女右。小儿系项颈下。

【主治】狂邪，妄语狂走，恍惚不识人。

35255 杀鬼丸

《圣惠》卷七十。为原书卷三十一“杀鬼麝香丸”之异名。见该条。

35256 杀鬼丸

《圣济总录》卷一〇〇。为《圣惠》卷五十六“大杀鬼丸”之异名。见该条。

35257 杀鬼丸

《普济方》卷二五四。为原书同卷“虎爪丸”之异名。见该条。

35258 杀鬼丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】雄、雌黄各二两 牯羊骨 虎头骨 各一两 龙骨 鳖甲 鲛鲤甲 刺猬皮各三两 樗鸡五枚(无，即以芫青五枚代之) 川芎 白蒺藜 鬼白 禹余粮 东门上雄鸡头一枚

【用法】用蜡三十两为丸，如梧桐子大。门口房内烧之，男左女右臂上常带一丸。

【功用】熏百鬼恶气。

【备考】方中川芎、白蒺藜、鬼白、禹余粮用量原缺。

35259 杀鬼丹

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】虎头骨(真者，酥炙) 桃杲(系桃之干在树上者) 斧头木(系斧柄入斧头中之木) 雄黄(明亮者，另研) 桃仁(去皮、尖，麸炒黄) 朱砂(光明者，另研) 各一钱五分 犀角屑 木香 白术 鬼箭羽各一钱 麝香七分五厘

【用法】上为粗末。带之。

【功用】避瘟疫。

35260 杀鬼杖

《卫生宝鉴》卷二十。为《古今录验》引《胡录》(见《外台》卷十三)“八毒赤丸”之异名。见该条。

35261 杀疥药

【方源】《三因》卷十五。

【异名】杀疥散(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】羊蹄根(生切)一两 姜一分 矾

半钱 硫黄一钱 草乌头一个

【用法】上以米泔淹一宿，研极细，入醋和匀。入浴时，抓破疮敷之；迟顷，入温汤洗去。

【主治】疮疡，疥疮。

【备考】本方方名，《普济方》引作“杀疮药”。

35262 杀疥散

《中医皮肤病学简编》。为《三因》卷十五“杀疥药”之异名。见该条。

35263 杀疮药

《普济方》卷二八〇。即《三因》卷十五“杀疥药”。见该条。

35264 杀痞丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】青黛二钱 蝉壳五枚(微炒) 朱砂一钱(细研) 雄黄一钱(细研) 胡黄连一分 瓜蒂二七枚 田父一枚(炙令黄) 蛇蛻皮灰一钱 膩粉一钱(研入) 熊胆一钱(细研) 芦荟一钱(细研) 麝香一钱(细研) 蟾酥两皂荚子许大(研入)

【用法】上为末，都研令匀，熬猪胆汁，浸蒸饼和丸，如黄米大。每服三丸，以薄荷汤化破服。

【主治】小儿五痞，寒热腹胀，四肢瘦弱。

【备考】《普济方》有龙胆，无芦荟。

35265 杀痞丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】蜗牛壳一分 麝香一分(细研) 芦荟一分(细研) 雄黄一分(细研) 肉豆蔻半两(去壳) 母丁香一分 黄连半两(去须，微炒) 鹤虱一分 定粉半两(微炒) 白矾一分 密陀僧一分(细研) 没药一分 艾叶半两(炒令黄) 地龙一分(微炒) 熊胆一分(研入) 蟾酥一钱(研入)

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服三丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿内痞，下痢不止，体瘦食少，腹痛羸弱。

【备考】《普济方》有地榆，无地龙。

35266 杀疳丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】没石子半两 麝香一分(细研)
芦荟半两(细研) 瓜蒂半两 蟾头半两
(炙令焦黄) 鹤虱半两 青黛半两(细研)
膩粉一分(研入)

【用法】上为末，以糯米饭为丸，如黍米大。
每服五丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】小儿脊疳，日渐羸瘦，腹中有虫。

35267 杀疳丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】雄黄一分(细研) 麝香一分(细研)
牛黄一分(细研) 芦荟一分(细研)
朱砂一分(细研) 胡黄连一分 密陀僧三分
(麸炒或烧令赤色，细研) 龙骨一分(烧令赤色)
青黛半两(细研) 金箔十片(细研) 肉豆蔻二枚(去壳) 蟾酥半分(热水化为泥)

【用法】上为末，入研了药及蟾酥，研令匀，
汤浸蒸饼为丸，如黄米大。每服三丸，以温
水送下；煎黄连苦参汤洗身，上用青衣盖，出
虫后便愈。

【主治】小儿疳痢久不止。

35268 杀疳散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】防风 龙脑 牡蛎各二两 五味子 白芷 细辛各一两

【用法】上为细末。每服一钱，空心米汤调下。

【主治】小儿疳眼外障。

【备考】本方方名，《普济方》引作“杀风散”。

35269 杀蛆药

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】皂矾

【用法】煅赤，掺于患处。即化为水。佐以
内服柴胡、栀子清肝火。

【主治】损伤溃烂生蛆者。

35270 杀九虫散

【方源】《千金翼》卷二十四。

【组成】藜芦 贯众 干漆各二两(熬) 狼牙一两

【用法】上为散。以羊脂和服之一合，每日
三次。二日下虫矣。

【主治】寒疝心痛，及虫啮心痛。

35271 杀虫神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】鬼箭羽三钱 鳖甲一两 地栗粉半斤
生何首乌半斤 熟地半斤 六曲二两 白薇三钱
人参五钱 柴胡五钱 鹿角胶六两 地骨皮五两 沙参五两

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸。每日服
前汤(和平散)后，送下五钱，一日二次。此
丸服半料后，当改用六味地黄丸，加麦冬三
两、五味一两；骨蒸有汗者宜用丹皮，无汗
者宜用沙参；若地骨皮则有汗无汗俱宜服之。

【功用】杀虫。

【主治】痲虫尸气。

35272 杀鬼杖子

《不居集》下集卷十六。为《古今录验》引
《胡录》(见《外台》卷十三)“八毒赤丸”之异
名。见该条。

35273 杀虫化积丸

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为原书
“杀虫丸”之异名。见该条。

35274 杀虫乌梅丸

《全国中药成药处方集》(兰州方)。为《伤寒
论》“乌梅丸”之异名。见该条。

35275 杀虫芫荽散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】芫荽三分(微炒) 葶苈子一两
(微炒) 白矾一两(烧令汁尽) 吴茱萸半
两(微炒)

【用法】上为细散。以生油调，涂疮上，每
日二次。

【主治】小儿头面及身体生疮，久不愈，瘙
痒。

35276 杀虫神妙丸

【方源】《普济方》卷三九九。

【组成】苦楝根皮握下二三寸(炒) 川楝子 石榴皮 使君子 茺萸仁(炒) 槟榔 铅锡灰 轻粉 莪术 巴豆(去心膜油) 三棱 青皮 榧子 蛤粉 鸡子黄一枚各等分

【用法】上为末,醋糊为丸,如麻子大。每服用二三十丸,空心炙桃柳条汤送下,或五更用茶清肉汤连进三两服。

【主治】诸虫。

35277 杀虫硫黄散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】硫黄

【用法】上为细末,取东南桃树枝五七枝,轻打头使散,以绵缠粘末,令少厚;又截一竹筒,先纳下部中,仍以所捻药,桃枝烧着熏之。

【主治】疳虫蚀下部五脏。

35278 杀虫雄黄散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】雄黄 金星石 银星石 紫石英 白石英 玄精石 马牙硝 白矾各一两

【用法】上为末,入瓷盒中,用土泥封固,候干,炭火煨通红即止,以土罨药盒,来日取出,于湿地上纸衬出火毒,研如粉。以枫树胶煮汁和调,每日涂之。

【主治】乌癫,皮肤变黑,生疮肿痛。

35279 杀鬼五邪丸

《普济方》卷二五四。为《圣惠》卷五十六“杀鬼丸”之异名。见该条。

35280 杀鬼虎头丸

《圣惠》卷十六。为《肘后方》卷二“虎头杀鬼方”之异名。见该条。

35281 杀鬼破胎汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】水蛭(炒黑,研为细末)三钱 丹皮五钱 当归尾五钱 大黄三钱 厚朴二钱 红花五钱 牛膝三钱 生地五钱 桃仁(去尖,研碎)

【用法】水与酒同煎一碗,空腹服。

【主治】经枯血闭。在室未嫁,月经不来,

腹大如娠,面色乍赤乍白,脉乍大乍小。

35282 杀鬼烧药方

【方源】《千金》卷九。

【异名】杀鬼雄黄丸(《圣惠》卷七十)。

【组成】雄黄 丹砂 雌黄各一斤 羚羊角(羖羊角亦得) 茺萸 虎骨 鬼白 鬼箭羽 野丈人 石长生 豕猪屎 马悬蹄各三两 青羊脂 菖蒲 白术各八两 蜜蜡八斤

【用法】上为末,以蜜蜡和为丸,如弹许大。朝暮及夜中,户前微火烧之。

【功用】辟瘟气。

【主治】《圣惠》:妇人与鬼交通。

【备考】《医钞类编》有桃奴,无石长生。

35283 杀鬼雄黄丸

《圣惠》卷七十。为《千金》卷九“杀鬼烧药方”之异名。见该条。

35284 杀鬼麝香丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【异名】杀鬼丸(原书卷七十)。

【组成】麝香一分(细研) 雄黄半两(细研) 光明砂三分(细研) 鬼箭羽三分 犀角屑一两 木香半两 白术半两 天灵盖一两(涂酥,炙令微黄) 虎头骨一两半(涂酥,炙令黄) 桃仁二分(汤浸,去皮尖双仁麸炒微黄)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以温清粥饮送下。

【主治】传尸骨蒸劳。

【备考】本方方名,《普济方》引作“麝香丸”。

35285 杀疳保童丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】青黛半两 熊胆一分 黑狗胆一枚 麝香半两 芦荟一分 鲤鱼胆五枚 蟾头灰一分 蜗牛一分(炙令黄,为末) 水银一分(以少枣肉研令星尽)

【用法】上件药以青黛等细研,次下诸胆。

研令匀，炼蜜为丸，如黄米大。每服五丸，以冷水送下。

【主治】小儿一切疳，体瘦皮干，毛发焦黄，心热烦躁。

35286 杀虫青箱子散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】青箱子 雄黄（细研） 硫黄（细研） 羌黄 雷丸各半两 苦参三分（锉） 狼牙三分 藜芦一分（去芦头）

【用法】上为末。以绵裹一钱，纳下部中，日再易之。

【主治】疳湿匿。

伤

35287 伤煎

【方源】《千金》卷十七。

【组成】伤任多少 干枣一升（去核）

【用法】熟捣，水五升和使相得，绞去滓，澄去上清，取浊，纳饴中搅，火上煎，勿令坚。连连服如鸡子，渐渐吞之，日三夜二。

【功用】《千金方衍义》：资胃气而助蒸化之力。

【主治】肺气不足，咽喉苦干。

各

35288 各半散

【方源】《朱氏集验方》卷三引《海上方》。

【异名】五斗安神各半散（《普济方》卷二四九引《十便良方》）。

【组成】室女发（烧灰） 茴香各等分

【用法】上为末。无灰酒调，热服，不拘时候。

【主治】小肠气撮痛。

35289 各神丸

《普济方》卷三十九。为《脚气治法总要》卷下“神功丸”之异名。见该条。

35290 各等倍奇汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】大黄 杜仲 当归 牛膝 地黄 白芷 黄连 槟榔 芍药 川芎 忍冬

甘草 木瓜 沉香 桑寄生各等分 土茯苓 倍用

【用法】以水七合，煮取三合半，去滓温服。

【主治】杨梅结毒，筋骨疼痛。

多

35291 多子酒

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】百子酒（《仙拈集》卷三）。

【组成】甘枸杞一斤 桂圆肉一斤 核桃肉一斤 白米糖一斤

【用法】共入绢袋内，扎口，入坛内，用好烧酒十五斤、糯米酒十斤，封口，窖三七日，取出。每日服三次。

【功用】补益。

35292 多子锭

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】党参（去芦）二两 杜仲（炭）二两 苁蓉（炙）二两 盐知母二两 黄柏二两 远志（炙，去心）二两 盐泽泻一两 黄耆一两 龟板（炙）一两 牛膝一两 蛇床子一两 甘草（炙）一两 首乌（炙）四两 山药四两（上为细末） 熟地四两 生地四两 天冬四两 山萸肉（炙）二两 朱寸冬二两 大茴香二两 五味子（炙）一两 枸杞子一两（共熬膏）

【用法】将前药粉和膏合成药饼，每盒装四十八粒。每服十二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】滋阴补气，壮阳种子。

【主治】肾虚气弱，久无子嗣，精神萎靡，腰膝痠痛。

35293 多皮饮

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】地骨皮三钱 五加皮三钱 桑白皮五钱 干姜皮二钱 大腹皮三钱 白鲜皮五钱 粉丹皮三钱 赤苓皮五钱 冬瓜皮五钱 扁豆皮五钱 川槿皮三钱

【功用】健脾除湿，疏风和血。

【主治】亚急性、慢性荨麻疹。

【宜忌】多皮饮主要是针对顽固性慢性荨麻疹，经常复发，而发作时以皮疹为主，而且湿重于热，用过麻黄方不效的患者为宜。

【加减】若患者遇冷而复发，则重用干姜皮；遇热而发作，则去干姜皮，另加干生地五钱至一两。

【方论选录】本方是根据《六科准绳》中五皮饮化裁而来。方中赤苓皮、冬瓜皮、扁豆皮、大腹皮健脾利湿，涤清胃肠的积滞；原方五皮饮中的生姜皮改为干姜皮，取其辛温和胃，固表守而不走；白鲜皮、川槿皮驱风止痒；丹皮凉血和血化斑；地骨皮、桑白皮泄肺而清皮毛。

【临证举例】慢性荨麻疹 李某敏，女，41岁。初诊：1971年2月10日。主诉十余年来全身不断发生红疙瘩，痒甚。现病史：患者十余年来，不断在四肢、躯干发生大片红色疙瘩，剧烈瘙痒，时起时落，每早晚发疹较重，无一定部位，特别是冬季晚上入寝后更重，夏日亦不间断，曾经多方面治疗不效。检查：四肢有散在指盖大或铜元大、不整形之大片扁平隆起，淡红色，脉象沉缓，舌苔白，舌质淡。西医诊断：慢性荨麻疹。中医辨证：先有蕴湿兼感风寒之邪化热，风寒湿热交杂，缠绵不去，发于皮肤。立法：调和阴阳气血，兼以清热散寒，疏风祛湿。方药：五加皮三钱，桑白皮三钱，地骨皮三钱，丹皮三钱，干姜皮三钱，陈皮三钱，扁豆皮三钱，茯苓皮三钱，白鲜皮三钱，大腹皮三钱，当归三钱，浮萍三钱。2月17日进服上方七剂，皮疹明显减少，只是早上外出后有少数皮疹，晚上也基本不发。2月26日复诊，又继服四剂后，皮疹即完全不发。又服三剂，临床治愈。

35294 多效散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】诃子肉 五倍子各等分

【用法】上为末。用少许干粘唇上。

【主治】唇紧疼及疮。

【备考】本方方名，《普济方》引作“立效散”。

35295 多黑散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】似锦（即将军）三两（小便浸三日，纸裹煨过） 倚松子（即巴豆）三两半（浆水浸七日，炒黄） 豫吞（即细炭）一握一茎（米醋五升淬尽用之） 半两铜钱七十文（铜线细用酒五升炼尽）

【用法】上为细末。随伤大小贴之。血出，疼痛便止，更无痕。逐妇人一切败血者，可服一字，温酒调服。

【功用】逐一切败血；止血。

争

35296 争功散

【方源】《得效》卷十一。

【异名】热症争攻散（《普济方》卷三九〇）。

【组成】知母 贝母 柴胡（去芦） 常山 甘草 山梔子 槟榔各五钱 蝉蜕十个 地骨皮（去骨）五钱

【用法】上锉散。每服三钱，用桃、柳枝各五寸煎；未效，用过路葛藤五寸煎服。

【主治】热症。

35297 争先汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】桂枝五分 麻黄五分 石膏一钱 麦冬五钱 茯苓五钱 半夏八分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒身热，一日即发谵语。

鬼

35298 鬼疳散

【方源】方出《本草纲目》卷三十三引李氏方，名见《女科切要》卷二。

【组成】鬼疳一岁一个

【用法】烧存性，研末。酒服之。

【主治】妇人血崩。

35299 鬼葵粥

【方源】《食医心鉴》。

【组成】鬼葵二斤 米半升

【用法】上于豉汁中煮作粥。空心食之。

【功用】利小便。

【主治】热淋。

旬

35300 旬效散

【方源】《普济方》卷八十四引《德生堂方》。

【组成】雀脑川芎 金钗石斛(净) 木贼(去节)各二钱 人蛔虫(略阴干)

【用法】上为细末。用苇管吹入左右鼻中。

【主治】眼倒睫拳毛。

旬

35301 旬奴露宿丸

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】甘草三分(炙) 大黄二分 甘遂二分 芫花二分(熬) 大戟二分(炙) 葶苈子二分(熬) 苦参一分 消石一分 巴豆半分(去心皮, 熬)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如小豆大。服三丸, 当吐下; 不吐下, 稍益至五六丸, 以知为度。

【主治】心腹积聚, 膈上下有宿食留饮。

【宜忌】忌海藻、芦笋、菘菜、野猪肉。

35302 旬奴露宿丸

【方源】《千金》卷十六。

【异名】露宿丸(《千金方衍义》卷十六)。

【组成】礞石 桂心 附子 干姜各二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。一服十丸, 日三服, 稍加之。

【主治】寒冷积聚。

【方论选录】《千金方衍义》: 露宿者, 形寒饮冷致病, 故用礞石之大辛大热, 以治腹中坚癖邪气; 兼取附子、桂心、干姜壮其雄烈, 以破癖冷沉寒, 能助阳气内充, 即使霜行露

宿, 亦可无虞。

35303 旬奴露宿丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】礞石(烧) 桔梗 皂荚(炙, 去皮、子) 干姜 附子(炮, 去皮) 吴茱萸等分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。饮服三丸, 一日二次; 稍加, 以知为度。

【主治】毒冷。

刘

35304 刘老丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】陈梗米一合(炒过, 去火毒用) 黄连一两(去须, 锉, 炒, 放冷出火毒) 陈橘皮半两(去白) 干漆一分(炒去烟, 出火毒, 存性)

【用法】上为末, 猪胆汁煮面糊为丸, 如小豆大。每服七丸, 米饮送下, 不拘时候。

【主治】小儿无事疳。

35305 刘刺史丸

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】肉苁蓉(酒洗)一两三钱 覆盆子(去蒂)一两二钱 蛇床子一两二钱 菟丝子(酒制)一两二钱 乌贼骨八钱 五味子六钱 当归(酒洗)一两二钱 川芎一两一钱 白芍一两 防风六钱 黄芩五钱 艾叶三钱 牡蛎八钱(盐泥固济煨透, 去泥, 研)

【用法】上为末, 炼蜜为丸。每服三十或四十丸, 早、晚青盐汤送下。

【主治】赤白带下。

35306 刘寄奴汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】刘寄奴二两半 赤芍药(锉, 炒)二两 白茯苓(去黑皮)一两 芎藭 当归(切, 焙)各一两半 艾叶(炒)四两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎七分, 去滓, 空心、食前温服, 一日二次。

【主治】妇人经血下不止。

35307 刘寄奴汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】刘寄奴饮子（《产宝诸方》）。

【组成】刘寄奴 甘草各等分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，先以水二盏，入药煎至一盏，再入酒一盏，再煎至一盏，去滓温服。

【主治】产后百病，血运。

35308 刘寄奴汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】刘寄奴二两 桔梗（炒）三两 当归（锉，焙）二两 生姜（切，焙）一两 桂（去粗皮）二两 陈橘皮（汤去白，焙）一两半 芍药三两 赤茯苓（去黑皮）三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，入延胡索末半钱匕，搅匀温服，一日三次。

【主治】产后恶露不尽，七八日腹痛，两胁妨满，兼儿枕痛。

35309 刘寄奴汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】刘寄奴 知母（焙）各一两 当归（切，焙） 鬼箭羽各二两 桃仁（去皮尖双仁，炒）一两半

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心、食前温服。

【主治】产后恶露不尽，脐腹疼痛，壮热憎寒，咽干烦渴。

35310 刘寄奴汤

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】刘寄奴 五倍子各等分

【用法】上为细末。空心酒调下，仍用其末敷痔上。

【主治】痔疾。

35311 刘寄奴饮

【方源】《卫生家宝产科备要》卷七。

【组成】刘寄奴二两（择去梗草） 当归一两（去芦头，切，焙） 甘草二钱（炙，锉）

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分盏，去滓热服。凡治

血晕，药须乘闲煎下，以备急用。

【主治】产后恶露不快，败血上攻，心胸烦躁，大渴闷乱，眼黑旋运，或见鬼神，脐腹疼痛，呕哕恶心，不进饮食。

35312 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】刘寄奴一两 当归一两（锉） 桂心一两 芎藭一两 牛膝一两 琥珀一两

【用法】上为散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血气，小腹疼痛。

35313 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】刘寄奴一两 当归二两（锉，微炒） 赤芍药一两 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 姜黄半两

【用法】上为散。每服三钱，以酒一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血运，闷绝不识人，颊赤，手足烦疼，腹胀喘息。

35314 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】刘寄奴一两 红蓝花半两 益母草子半两

【用法】上为散。每服三钱，以童便半盏，酒半盏相和，暖过调下，不拘时候。

【主治】产后血运闷绝。

35315 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】刘寄奴一两 麝香一分（细研） 当归（锉，微炒） 芎藭 桂心 牛膝（去苗） 益母草 羌活 生干地黄 延胡索各三分

【用法】上为散，研入麝香令匀。每服二钱，以温生姜汤、童便调下，不拘时候。

【主治】产后恶血冲心，闷绝不语。

35316 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】刘寄奴三分 当归三分（锉，微炒） 延胡索半两 蒲黄半两 肉桂三分

(去粗皮) 红蓝花半两 木香一分 生干地黄半两 桑寄生半两 赤芍药半两 川大黄一两(锉, 微炒) 苏枋木三分(锉)

【用法】上为散。每服以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓稍热服, 不拘时候。

【主治】产后恶露不下, 腹内疔刺疼痛, 日夜不止。

35317 刘寄奴散

【方源】《本事》卷六。

【组成】刘寄奴

【用法】上为末。掺金疮口, 裹。

【功用】①《本事》: 敛金疮口, 止疼痛。②《济阳纲目》: 止血生肌。

【主治】①《本事》: 金疮。②《医学纲目》: 汤火疮。

【方论选录】《本事方释义》: 刘寄奴气味苦温, 入足厥阴, 能行血止疼, 去癥瘕, 治金疮极有效验, 并治汤火疮尤妙。此虽一味草药, 性能行走, 使气血不致凝滞, 则所伤之处自然止痛生肌耳。

【备考】《本事》引《经验方》: 刘寄奴为末, 先以糯米浆用鸡翎扫伤着处, 后掺药末在上。并不痛, 亦无痕。大凡伤着, 急用盐末掺之, 护肉不坏, 然后药敷之。

35318 刘寄奴散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】赤石脂 无名异(烧红) 风化石灰 寒水石 磁石(烧红七遍) 各一两 王不留行 刘寄奴 地松 地榆 黄柏皮各半两

【用法】上为细末。干掺患处。如刀伤肉开者, 以药掺后更用软帛微缚敛, 即时肉合, 更不痛作, 亦无脓血, 甚妙。

【主治】刀箭所伤。

35319 刘寄奴散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】刘寄奴半两 甘草一指节许 地龙(炒) 一分

【用法】上咬咀。以水二盏, 煎至一盏, 去

滓, 时时与服。

【主治】小儿夜啼不止。

35320 刘寄奴散

【方源】方出《准绳·疡医》卷四引《得效》, 名见《洞天奥旨》卷十六。

【组成】刘寄奴 王不留行 大黄 金银花 木鳖子各等分

【用法】酒、水煎, 露一宿, 五更服。

【主治】便毒。

35321 刘氏毒锁膏

【方源】《膏药方集》引刘金安方。

【组成】乳香六钱 没药六钱 轻粉六钱 血竭六钱 甘草六钱 芙蓉草六钱 汗三七六钱 五倍子六钱 彰丹六两 朱砂二钱 台寸(麝香)一钱 红花三钱 小燕三个 咸鸭蛋七个 香油一斤

【用法】先将香油熬开, 将小燕、咸鸭蛋、芙蓉草放油内后, 取汁去滓; 再将五倍子、红花、汗三七放油内炸黄色取出, 共为细末, 合煎药内, 文火熬之, 见各药变成黄色, 再下彰丹, 见黑色时用水一盆, 滴水成珠为度, 再将台寸放入, 用铁铲搅三四合, 将药全部倾水盆内, 出去火毒, 火毒出净后, 膏药成灰白色, 取出即可用之。用时将膏药用凉水泡化, 再用手搅开, 看症用多少贴疮上。

【主治】骨节骨膜漏疮, 结核, 对口, 搭背, 腰痛, 硬伤, 伤口, 疔毒, 恶疮, 阴疮, 鼠疮, 臃疮, 乳疮, 筋膜瘰癧, 寒疮, 痔疮, 痔漏, 骨痹。

35322 刘寄奴饮子

《产宝诸方》。为《圣济总录》卷一六〇“刘寄奴汤”之异名, 见该条。

35323 刘庭瑞通圣散

《宣明论》卷三。即原书同卷“防风通圣散”去芒消, 加缩砂。见该条。

35324 刘氏跌打损伤膏

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】当归 三棱 莪术 独活 白芷 川芎 羌活 红花 川牛膝 防风 肉桂 杜仲 续断 防己 五加皮 骨碎补 赤芍

药 刘寄奴 秦艽 葱头 土鳖虫 头发一握 龙骨 乳香(去油) 没药(去油) 血竭各二两 麝香(另收,旋加)

【用法】上药入油熬化,瓷钵收贮;每药油四两,加制松香一斤,同熬成膏,倾水缸内扯拔出火毒,藏之。凡摊膏时,炖化摊好,放土地一个时辰,得土气则土鳖虫有力,易于接骨放也。

【主治】跌打损伤。

【宜忌】如皮骨损者,忌用麝香。

齐

35325 齐州荣姥方

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】白姜石一斤(软黄者) 牡蛎九两(烂者) 枸杞根皮二两 钟乳二两 白石英一两 桔梗一两半

【用法】上药各为细末,合和令调,先取伏龙肝九升末之,以清酒一斗二升搅令浑浑然,澄取清二升,和药捻作饼子,大六分,厚二分,其浊滓仍置盆中,布饼子于笼上,以一张纸藉盆上,以泥酒气蒸之,仍数搅令气散发,经半日,药饼子干,乃纳瓦坩中,一重纸一重药遍布,勿令相著,密以泥封三七日,干以纸袋贮之,干处举之。用法以针刺疮中心深至疮根,并刺四畔令血出,以刀刮取药如大豆许纳疮上。若病重困日夜三四度著,其轻者一二度著,重者二日根始烂出,轻者半日一日烂出,当看疮浮起,是根出之候,若根出已烂者,勿停药仍著之,药甚安稳,令生肌易。其病在口咽及胸腹中者,必外有肿异相也,寒热不快,疑是此病,即以饮或清水和药如杏仁许服之,日夜三四服,自然消烂,或以物剔吐,根出即愈;若根不出亦愈,当看精神自觉醒悟,合药以五月五日为上时,七月七日次,九月九日,腊月腊日并可合。若急须药他日亦得。

【主治】疗肿。

【宜忌】忌房室、猪、鸡、鱼、牛、生韭、

蒜、葱、芸苔、胡荽、酒、醋、面、葵等;若犯诸忌而发动者,取枸杞根汤和药服。

【方论选录】《千金方衍义》:牡蛎软坚,钟乳利窍,石英敛津,姜石消肿,枸杞泻火,桔梗散气,灶土、清酒温助诸石以拔毒根于中;英、乳甘温,生肌亦易,惟姜石咸寒,为疗肿去腐生新之专药。初起未著形时服之,可散。二石虽温,然非悍烈之品,不虑助邪为虐;若至毒邪熾发,则又未可尝试。

35326 齐峰川椒散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】齐峰花椒散(《医统》卷六十四)。

【组成】红川椒四钱 樟脑 赤小豆 缩仁各二钱 明矾(煨)一钱

【用法】上为末。少许塞敷,咽不妨。

【主治】齿痛。

35327 齐峰花椒散

《医统》卷六十四。为《直指》卷二十一“齐峰川椒散”之异名,见该条。

充

35328 充脊汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】山茱萸 熟地 山药 芡实各一两 北五味三钱 金樱子 白术各三钱

【用法】水煎服。

【主治】至夜脊心自觉如火之热,因面梦遗。

35329 充德丸

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】艾(去梗,炒)二两半 藿菌一两半 丁香 诃黎勒(煨,去核) 桑根白皮(炙)各一两 肉豆蔻(去壳,炮) 益智子(去皮) 熏陆香(别研) 麝香(别研)各半两

【用法】上药除别研外,捣罗为末,同拌匀,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,早晚食前温酒送下。

【主治】因寒药内攻,大肠急痛,或胸藏冷

气，或为血蛊，或霍乱，或心胀短气，或羸瘦，或腹痛不解，或虚满遗精，或水肿，或中恶。

35330 充髓丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 金钗石斛五钱 地骨皮三钱 沙参五钱 牛膝三钱 五味子一钱 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【功用】补真阴。

【主治】久立腿痠无力，久则面黄肌瘦，口臭肢热，盗汗骨蒸。

35331 充髓汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地三两 玄参二两 金钗石斛牛膝各五钱 女贞子五钱

【用法】水煎服。

【主治】素常贪色，加之行疫劳瘁，伤骨动火，复又行房鼓勇大战，遂至两足痿弱，立则腿颤，行则膝痛，卧床不起，然颇能健饭易消。

交

35332 交加丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】生地黄一斤（研烂取汁，滓别置器中） 生姜一斤（同上法。以上将生地黄汁炒生姜滓，生姜汁炒地黄滓，令干，入药如后） 白芍药 人参 当归 麦门冬 琥珀 阿胶 蒲黄各一两（一方用白术、石斛各一两，无蒲黄，用麦门冬，治虚劳百疾）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。每服药后，以故旧纱帛一片，包龙脑薄荷二两，以鼻闻其气。

【功用】滋益荣卫，补益冲任。

【主治】妇人诸血妄行。

35333 交加丸

【方源】《本草纲目》卷十二引《卫生杂

兴》。

【组成】苍术一斤（刮净，分作四份，一份米泔浸炒，一份盐水浸炒，一份川椒炒，一份破故纸炒） 黄柏皮一斤（刮净，分作四份，一份酒炒，一份童尿浸炒，一份小茴香炒，一份生用）

【用法】拣去各药，只取术、柏为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心盐汤送下。

【功用】升水降火，除百病。

35334 交加丸

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】生地一斤 川芎一两 延胡一两 当归二两 芍药一两 木香五钱 没药一两 香附四两（醋煮） 老姜一斤

【用法】生地、老姜各捣汁，以姜汁浸生地，以生地汁浸姜滓，汁尽为度；同诸药为末，米醋糊为丸，空心姜汤送下。

【主治】经水不调，血块气痞，肚腹肿痛。

35335 交加散

【方源】方出《本草纲目》卷十四引《圣惠》，名见《准绳·类方》卷五。

【异名】定风散（《医级》卷九）。

【组成】当归 荆芥穗各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，酒少许，童便少许，煎七分，灌之。

【主治】产后中风，不省人事，口吐涎沫，手足痠痲。

35336 交加散

《鸡峰》卷十二。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

35337 交加散

【方源】《本事》卷十。

【组成】生地黄五两（研取汁） 生姜五两（研取汁）

【用法】上交互用汁浸一夕，各炒黄，渍，汁尽为度，末之。寻常腹痛酒调下三钱，产后尤不可缺。

【主治】妇人荣卫不通，经脉不调，腹中

痛,气多血少,结聚为瘕,产后中风。

【方论选录】《本事方释义》:生地黄味甘苦微寒,入手足少阴厥阴;生姜气味辛温,入手足太阴。各捣汁,互相浸渍、炒黄,欲其气味之和也。此妇人产后中风,荣卫不通,经脉不调,欲结瘕瘕者宜服之。用此二味,只取乎调气血耳。

35338 交加散

【方源】《妇人良方》卷二。

【组成】生姜十二两 生地黄一斤(二味研取自然汁,将地黄汁炒生姜滓,姜汁炒地黄滓,各稍干) 白芍药 延胡索(醋纸裹煨令熟,用布揉去皮) 当归 桂心各一两 红花(炒,无恶血不用) 没药(别研) 各半两 蒲黄一两(隔纸炒)

【用法】上为细末。每服二钱,温酒调下;如月经不依常,苏木煎酒调下;若腰疼,用糖菟子煎酒调下;不拘时候。

【功用】滋养血络,逐散恶血。

【主治】荣卫不和,月经湛浊,脐腹撮痛,腰腿重坠,血经诸疾。

35339 交加散

【方源】《女科万金方》。

【组成】青皮 陈皮 川芎 白芍 枳壳 当归 干姜 官桂 茯苓 苍术 半夏 厚朴 人参 羌活 独活 柴胡 甘草 薄荷

【用法】加生姜三片,酒少许,水二钟,煎服,不拘时候。

【主治】生产一个月,败血入经络,小腹痛,两腿痠痛,亦有满身紫块,乃瘀血流经。

35340 交加散

《普济方》卷一四七引《如宜方》。为《岭南卫生方》卷中“五积交加散”之异名,见该条。

35341 交加散

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】当归 川芎 白芍药 生地黄 苍术 厚朴 陈皮 白茯苓 羌活 独活 桔梗 枳壳 前胡 柴胡 干姜 肉桂 甘草

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】凡跌扑等伤,恶寒体弱者。

【加减】有热,去姜、桂。

35342 交加散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】即五积散倍用桔梗,加羌活、独活及防风、木通、米仁。

【主治】产后单腿痛。

35343 交加散

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】附子七分 石膏五钱 羌活一钱 防风一钱 广皮一钱 连翘一钱五分 葛根二钱 豆豉三钱 薄荷一钱 藿香一钱 姜皮八分 荷叶一角

【主治】痲症,寒热俱重,体盛脉实者。

【禁忌】虚人禁用。

35344 交合汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 熟地二两 黄连三分 肉桂五分

【用法】水煎服。

【主治】怔忡。

35345 交肾汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地 枣皮 山药 茯神 黄连 肉桂

【主治】心肾不交,心跳。

35346 交和散

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】嘉和散 五膈宽中散

【用法】二药合二为一,和匀。每服三钱,加生姜、大枣,煎汤,空心热服。

【主治】远年近日翻胃呕吐,全不进食。

35347 交济汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】排风汤 小续命汤

【用法】二药夹和,加鸡心槟榔,加生姜,水煎服。次以乌药顺气散加全蝎继之。

【主治】中风,肢体缓弱,筋节疼痛。

35348 交济汤

【方源】《普济方》卷三六七。

【组成】小续命汤 排风汤 人参顺气汤
乌药顺气散

【用法】上四药合和，加槟榔、石菖蒲、生姜，水煎服。

【主治】中风，肢体缓弱，筋节疼痛。

35349 交济汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术 苍术各五钱 肉桂 破故纸 菟丝子各三钱 广木香 甘草各一钱 熟地一两

【用法】水煎服。

【主治】心肾不交，心痛不能忍，气息奄奄，服姜汤而少安，手按之而能忍，日轻夜重，痛阵至时，几不欲生。

35350 交济汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参五钱 熟地一两 山茱萸五钱 麦门一两 柏子仁三钱 龙骨(醋淬)二钱 黄连五分 肉桂五分 当归五钱 黄耆五钱

【用法】水煎服。

【功用】心肾两补。

【主治】闻妇女之声而淫精自出，亦脱症之渐也。

35351 交济散

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】生地黄半斤 生姜四两

【用法】上药各洗净，同杵，治留一夕，焙干为末。每服二钱，温酒调下；男女血热心烦，或产后伤风，则以荆芥煎汤调下。

【主治】血结作痛。

35352 交泰丸

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】消石 硫黄(研细，于铫子内炒，令得所，研细入) 五灵脂 青皮 陈皮各一两

【用法】上为细末，而糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。不拘时候。

【主治】阴阳痞隔，营卫差错，水火不交，冷热乖适，邪热炎上，烦躁闷乱，昏塞不省人事，冷气上冲，胸膈痞塞，霍乱吐泻，手足逆冷，唇青气喘，及疗伤寒下早，冷热痞痞，心下胀满，呕啰咳逆，阴阳不辨。

35353 交泰丸

【方源】《普济方》卷二一七引《卫生家宝》。

【组成】石菖蒲一斤(去须，切，无灰好酒浸，冬三宿，夏二宿) 乳香一两(另研) 远志半斤(酒浸，去心，浸作如上法)

【用法】上为细末，用浸药酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【功用】宁心养气，定魄安魂，疗诸虚不足，生元真气，补精枯髓竭，去夜梦鬼邪；正丹田，久服明目。

【主治】男子下元虚，妇人血海冷。

35354 交泰丸

【方源】《普济方》卷四〇〇引《卫生家宝》。

【组成】水银 生硫黄各等分

【用法】上为末，不见水 银为度，蒸肉为丸，如粟米大。每服一岁儿七丸，温米汤饮送下。

【主治】小儿因惊，饮食失节，致阴阳不和，脏腑生病，中满气急，噎塞不通，饮食下咽即成呕吐。

35355 交泰丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】干姜(炮制)三分 巴豆霜五分 人参(去芦) 肉桂(去皮)各一钱 柴胡(去苗) 小椒(炒，去汗并闭目，去子) 白术各一钱五分 厚朴(去皮，锉，炒；秋冬加七钱) 酒煮苦楝 白茯苓 砂仁各三钱 川乌头(炮，去皮脐)四钱五分 知母四钱(一半炒，一半酒洗。此一味春夏所宜，秋冬去之) 吴茱萸(汤洗七次)五钱 黄连(去须)六钱(秋冬减一钱半) 皂角(水洗，锉，去皮弦) 紫菀(去苗)各六钱

【用法】上除巴豆霜另入外，同为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，温水送下。虚实加减。

【功用】升阳气，泻阴火，调营气，进饮食，助精神，宽腹中。

【主治】怠惰嗜卧，四肢不收，沉困懒倦。
35356 交泰丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】沉香半两 木香一两 青皮（去白） 陈皮（去白） 京三棱（煨） 蓬莪术（煨） 枳壳（麸炒，去瓢）各二两 神曲（炒） 大麦蘖（炒） 槟榔各一两 麝香二钱半 阿魏半两（细研，白面一钱和作饼子，炙令香熟，用水和）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食后生姜汤送下。

【功用】温中降气，进美饮食。

35357 交泰丸

【方源】方出《韩氏医通》卷下，名见《四科简效方》甲集。

【组成】川黄连五钱 肉桂心五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，空心淡盐汤送下。

【主治】心肾不交，怔忡无寐。

【临证举例】失眠 《北京医学院学报》(1975; 3: 162): 应用本方治疗神经官能症失眠 50 例，显效 17 例，有效 21 例，总有效率为 76%，无一例恶化。其方法是将黄连、肉桂各等分，或黄连三份、肉桂二份研末和匀装胶囊，每囊重 0.3 克，每服四粒，睡前半小时服用。一般热象不著者用黄连、肉桂各等量所做成的胶囊；热象较著心火亢盛用 3: 2 所构成的胶囊。典型病例：陈某某，男，35 岁，技术员。五、六年来早醒不眠，夜寐不实，一夜之间醒达十余次，仅能睡眠四小时左右，脉弦细尺弱，苔根黄。服本丸后当晚夜眠即较酣，一夜仅醒 3~4 次，继续服药，睡眠时数延长至 7~9 小时。

35358 交泰丸

【方源】《回春》卷三。

【组成】黄连一两（姜汁浸，黄土炒） 枳实一两（麸炒） 白术（去芦，土炒）一两 吴茱萸（汤泡，微炒）二两 归尾（酒洗）一两三钱 大黄（用当归、红花、吴茱萸、干漆各一两煎水，洗大黄一昼夜，切碎晒干，仍以酒拌晒之，九蒸九晒）四两

【用法】上为细末，姜汁打神曲糊为丸，如绿豆大。每服七八十丸，白滚汤送下，不拘时候。

【主治】胸中痞闷嘈杂，大便稀则胸中颇快，大便坚则胸中痞闷难当，不思饮食。

35359 交泰丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】文蛤八两（饭上蒸） 熟地（九蒸晒） 五味子 远志肉（甘草煮） 牛膝（酒洗，去头尾） 蛇床子（去土，酒浸，炒） 茯神 柏子仁（炒去油） 菟丝子（酒煮） 肉苁蓉（酒洗，去鳞甲） 青盐各四两 狗脑骨一个（煨存性）

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五七十丸，淡盐汤或酒送下，随吃干物压之。

【功用】保神守中，降心火，益肾水。

【主治】五脏真气不足，下元冷惫，二气不调，荣卫不和，男子绝阳无嗣，女子绝阴不育，及面色黧黑，神志昏愤，寤寐恍惚，自汗盗汗，烦劳多倦，遗精梦泄，淋浊如膏，大便滑泄，膀胱邪热，下寒上热。

35360 交泰丸

【方源】《活人方》卷五。

【组成】白蔻仁 角沉香 郁金 白芥子 降香 朱砂 没食子各等分

【用法】上为细末，烧酒为丸，如粟米大。午前百沸汤吞服。

【功用】通利清道。

【主治】气郁肺窍不利，失其清肃施化之功，痰凝则胃脘阻塞，难展容纳转输之力，初则反胃，继则关格，精血尚壮，寒多火少者。

35361 交泰丹

《局方》卷五。为《吴直阁增诸家名方》引宝林真人谷伯阳《伤寒论》(见《局方》卷五)“养正丹”之异名。见该条。

35362 交泰丹

《杨氏家藏方》卷三。为《洪氏集验方》卷一“大交泰丹”之异名,见该条。

35363 交泰丹

【方源】《普济方》卷三七一引《全婴方》。

【组成】黑铅一两 硫黄 水银各三钱 天浆子二十一个 蜈蚣一条 朱砂 附子(炮,去皮脐) 铁液粉各二钱 全蝎 蛇肉(酒浸,去骨)各一钱 麝香半钱 槐柳枝各二寸(细细锉,同铅入铤子炭灰上煨,别将槐柳枝各一茎不住手打,旋入硫黄,冷,次入水银煎为沙子为度,地上出火气)

【用法】上为末,姜汁煮糊为丸,如绿豆大。每服三丸,食前米饮汤送下。如病热速,炼蜜和丸,如鸡头子大一丸,薄荷汤化下。

【功用】镇坠。

【主治】小儿因吐泻之后,变成慢惊,累服热药,上热下冷,涎鸣气粗,服药虽多,止在膈上,不入中,此药治虚阳潮上,发搐来去。

35364 交泰丹

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】干地黄二两 山茱萸(去核,酒炒) 淮山药各一两 牡丹皮(酒洗) 远志肉(甘草汤泡) 泽泻(酒浸一宿,晒干) 石菖蒲(桑枝拌蒸) 茯神(蒸)各七钱五分 龙骨(煨,酒淬,水飞) 龟版(酒浸,炙)各五钱

【用法】上为细末,月内小儿服一分,逐月加一分,周岁服一钱二分,二岁服一钱五分,三岁服二钱,五岁以后服三钱,俱以开水调下,与神机丹间服。

【功用】《医方易简》:培后天之基址,滋先天之化元;补而能通,泻而寓益。

【主治】尪病。妇人先有小儿未能行走,而

母腹有胎妊,使儿饮此乳,则黄瘦骨立,精神不爽,身体痿痺。

35365 交泰散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】藿香叶 陈皮 肉豆蔻(生) 半夏(制) 青皮 酸木瓜 甘草(微炙)各半两 石菖蒲二钱

【用法】上细锉。每服一钱,加生姜三片,紫苏三叶,水煎服。

【主治】霍乱吐泻。

【加减】暑月,加香薷。

35366 交泰散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】大南星

【用法】以酃醪磨涂涌泉穴。

【主治】咽喉肿痛。

35367 交感丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】香附一两(炙) 茯苓四两 琥珀五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重三钱。每服一九,细嚼,早晚二服,白滚水送下。

【功用】宁心解郁安神。

【主治】一切诸气为病,公私拂情,名利失志,抑郁烦恼,七情所伤,不思饮食,面黄形瘦,胸膈不宽,气闷不舒;妇女百病。

【宜忌】忌气恼、厚味等物。

35368 交感丹

【方源】《洪氏集验方》卷一引铁瓮申先生方。

【异名】七情交感丹(《不居集》上集卷十八)。

【组成】茯神四两 香附子一斤(去毛,用新水浸一夕,炒令黄色)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一九,侵晨以降气汤嚼下。

【主治】①《洪氏集验方》引铁瓮申先生方:中年精耗神衰,中焦隔绝,荣卫不和,上则心多惊悸,中则寒痞饮食减少,下则虚冷遗

泄，甚至于阴痿不与，脏气滑泄。②《鲁府禁方》：一切公私拂情，名利失志，抑郁烦恼，七情所伤，不思饮食，面黄形羸，胸膈痞闷，疼痛。

35369 交感丹

【方源】《本草纲目》卷十二引申先生方。

【组成】茅山苍术一斤（刮净，分作四份，用酒、醋、米泔、盐汤各浸七日，晒，研）川椒红 小茴香各四两

【用法】上为末，陈米糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心温酒送下。

【功用】补虚损，固精气，乌髭发；久服令人有子。

35370 交感丹

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】菟丝子四两 茯神四两（苓亦可用）

【用法】上为末。以好酒煮面作稀糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以酒或汤下，不拘时候。

【功用】升降水火，令气血不偏胜。

35371 交感丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】香附子（童便浸透，炒）三钱 茯神 黄连各二钱 桂心一钱 甘菊花一钱

【用法】上为末。每服一钱五分，灯心汤调下。

【主治】耳中疳臭；或怒气上逆，上下不得宣通，遂成聋聩。

35372 交感汤

【方源】《医编》卷七。

【组成】茯神四两 香附一斤 甘草少许

【用法】上为末。热汤调服。

【功用】益气清神，降火升水。

【主治】心肾不交，遗泄。

35373 交解饮

《三因》卷六。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

35374 交藤丸

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】交藤根一斤（紫色者，河水浸七日，竹刀刮去皮，晒干） 茯苓五两 牛膝二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，纸袋盛之。每服三十丸，空心酒送服。

【功用】驻颜长算，祛百疾，久服延寿。

【宜忌】忌猪羊肉。

35375 交藤丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】血竭半两（别研） 马蔺根一斤 川乌头（炮，去皮脐） 人参（去芦头）各二两 黄丹二两（水飞） 何首乌四两 甘草二两（炙）

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤或酒送下。候服药了，用茵陈汤洗之，如疮干无脓血后，用三黄散贴之。

【主治】漏疮。

35376 交加饮子

《普济方》卷二〇〇。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

35377 交解饮子

《御药院方》卷二。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

35378 交加双解饮

《中国医学大辞典》。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名，见该条。

35379 交加地黄丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】生地一斤 老生姜一斤 玄胡索 当归 川芎 白芍各二两 没药 木香各一两 桃仁（去皮尖） 人参各一两半 香附子半斤

【用法】上先将地黄、生姜各捣汁，以生姜汁浸地黄滓，地黄汁浸生姜滓，皆以汁尽为度，次将余药为末，共作一处，晒干，同为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心姜汤下。

【主治】经水不调，血块气痞，肚腹疼痛。

【方论选录】《医略六书》：月经不调，盖由血瘀结块而成痞胀疼痛，乃旧血不去，则新

血不生，故经候愆期焉。生地滓收入老姜汁，以生新散瘀；老姜滓收入生地汁，以散瘀生新；当归养血脉，白芍敛阴血，延胡化血滞以归经，川芎行血海以荣经，桃仁破瘀血以通经，人参扶元气以通脉，木香调气和中，善开痞结，香附调气解郁能除疼痛，乳香活血脉以通经也。醋糊以丸之，姜汤以下之，使瘀血消化，则新血自生，而月经无不调，血块无不退，何疼胀之不除哉！

【备考】方中没药，《济阴纲目》作“明乳香”。

35380 交感地黄丸

《女科百问》卷下。为《局方》卷九《续添诸局经验秘方》“交感地黄煎丸”之异名。见该条。

35381 交加双解饮子

《卫生宝鉴》卷十六。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

35382 交感地黄煎丸

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】交感地黄丸（《女科百问》卷下）。

【组成】生地黄（洗净，研，以布裂汁留滓，以生姜汁炒地黄滓，以地黄汁炒生姜滓，各至干，堪为末为度） 生姜（净洗，研烂，以布裂汁留滓）各二斤 延胡索（拌糯米，炒赤，去米） 当归（去苗） 琥珀（别研）各一两 蒲黄（炒香）四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食前当归汤化下。

【主治】妇人产前产后，眼见黑花；或即发狂，如见鬼状；胞衣不下；失音不语，心腹胀满，水谷不化，口干烦渴，寒热往来，口内生疮，咽中肿痛，心虚忪悸，夜不得眠；产后中风，角弓反张，面赤，牙关紧急；崩中下血，如豚肝状，脐腹疼痛，血多血少，结为癥瘕，恍惚昏迷，四肢肿满；产前胎不安；产后血刺痛。

【备考】《女科百问》有小茴香四两。

衣

35383 衣鱼散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】衣鱼

【用法】烧作灰。敷舌上。

【主治】重舌。

35384 衣中白鱼摩方

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】衣中白鱼

【用法】上一味，摩偏缓一边。才正便止，恐太过。凡患，急边缓边皆有病，先摩缓边，次摩急边，急边少用。

【主治】中风，口面喎斜。

产

35385 产后丸

【方源】《全国中药成药处方集》（南京方）。

【异名】人参回生丹。

【组成】人参三钱 蒲黄一两 甘草五钱 白术三钱 赤茯苓一两 川羌活五钱 青皮三钱 桃仁一两 陈皮五钱 木瓜三钱 熟地一两 白芍五钱 当归一两 怀牛膝五钱 良姜四钱 川芎一两 京三棱五钱 乌药二两五钱 元胡索一两 山萸肉五钱 广木香一钱 焦苍术一两 五灵脂五钱 制乳香一钱 制香附一两 地榆五钱 制没药一钱

【用法】上为细末，用大黄膏擦丸，每粒潮重二钱，蜡壳封护。每服一粒，开水化服。

【主治】妇人产后恶露未净，小腹胀痛，癥瘕。

【备考】大黄膏制法：西绵纹大黄一斤（用米醋三斤熬成稠汁），苏木（水煎汁），红花（黄酒煮汁炒）各三两，黑大豆四斤（水浸，取皮约五两，豆煮汁）。将苏木汁、红花酒、黑豆汁加入大黄汁内，共熬成膏。（如黑豆不易购买，可用鲁豆衣四斤代替）。

35386 产灵丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归五钱 首乌(炙)五钱 竹节香附五钱 白术(炒)五钱 木香五钱 细辛五钱 川乌(炙)三两 草乌(炙)三两 大茴香三两 川芎三两 防风三两 白芷三两 芥穗三两 桔梗三两 麻黄三两 苍术(炒)八两 甘草(炙)二两

【用法】上为细末，过罗，每四十两细粉兑血竭粉五钱，人参粉三两，混合均匀，炼蜜为丸，重二钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一九，一日二次，温黄酒送下；白开水亦可。

【功用】化瘀生新，散寒止痛。

【主治】妇人产后恶露不下，胸腹胀满，两胁刺痛。

35387 产宝丸

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】川芎 当归 茯苓 厚朴(制)各一钱

【用法】用水六升，煎取二升，分二服。

【主治】妊娠卒心痛，气欲绝。

【备考】本方方名，据剂型当作“产宝汤”。

35388 产宝丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】大黄一斤(晒干，为末) 苏木三两(劈细，河水五碗，煎汁三碗，去滓存汁) 红花三两(略炒黄色，用好短水白酒五碗，煎汁三碗，去滓存汁) 黑豆三升(煮熟取汁三碗，并取豆皮晒干存用)

将大黄末入醋五宫碗，搅匀，文武火熬成膏，次下豆汁、苏木汁、红花汁，渐渐加下，时时搅动，勿令生焦，候成膏取起听用。

当归(酒洗，蒸，晒干) 川芎(蒸，晒) 香附(醋炒) 熟地(晒干) 玄胡(生用) 苍术(米泔水浸，炒) 蒲黄(微炒) 赤茯苓(蒸，晒) 白茯苓(蒸，晒) 桃仁(去皮尖油，晒干)各一两 三棱(醋炒) 牛膝(酒浸，蒸，晒干) 地榆(去梢，蒸，晒干) 甘草(生用) 五灵脂(醋炒) 羌活(蒸，晒干) 陈皮(生用) 广木香 赤芍(炒) 山茱萸(去核，炒)

人参(炒)各五钱 木瓜(酒浸，晒干) 青皮(生用) 白术(土炒)各三钱 乳香(炙) 没药(炙)各二钱 良姜(生用)四钱 乌药二钱五分(蒸，晒干) 饭锅粃九两(焦黄者佳，取锅底下手掌大一块)

【用法】上药同黑豆皮俱为末，投入大黄膏内捣千余下，为丸，如龙眼大，带湿重二钱四分；如干难为丸，加酒少许，再捣，以成丸为度；晒干，如阴天以火烘干，新瓷器收贮，忌铁器。每服一九，照症用引。

临产艰难，服之易产，调和经络，诸症不生，产后恶露不尽，再服一九，以上俱温酒送下，如不善酒，以滚水对酒加童便少许尤妙；或变生异症，或胎死腹中单所不载者，俱以童便、黄酒各半，连服二丸，立效；产后胞衣不下，及逆生难产，甚至经日不下，腹中胀满，心胸闷痛者，炒盐汤送下；临产前后，脐腹作痛，寒热往来如疟疾者，温米汤送下。产后大小便不通，烦燥口苦者，浓煎薄荷汤送下；产后泻血，大枣汤送下；产后崩疾，糯米汤送下；产后赤白带下，煎阿胶、艾叶汤送下；产后咳嗽不止，五味子五粒、苏叶三片，煎酒送下。产后头疼身热、有汗为伤风，桂枝三分，姜、葱煎汤送下；产后头疼、身热、无汗为伤寒，麻黄二分，姜、葱煎汤送下；如症轻者，每丸作二服。

【主治】逆生难产，胎死腹中，产后诸疾。

【宜忌】忌铁器、生冷、面食。

35389 产宝汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】桂心 姜黄各等分

【用法】上为细末。每服方寸匕，酒调下。

【主治】产后血余作痛，兼块者。

35390 产宝散

【方源】方出《儒门事亲》卷十五，名见《回生集》卷下。

【组成】赤伏龙肝

【用法】上为细末，每服三五钱，酒调下，泻出恶物立止。

【主治】①《儒门事亲》：妇人产后恶物不出，上攻心痛。②《回生集》：子死腹中，母亦将绝。

35391 产后理血丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】附子半两 丹皮 干漆各一两

【用法】上为极细末，好醋五两，大黄末一两，同熬成膏，和药为小丸。每服五分至一钱，温酒冲服。

【功用】逐瘀血，生新血，消积止痛。

【主治】妇女产后恶露不行，胞衣不下，少腹胀痛，恶血上冲，昏迷不醒等症。

【宜忌】孕妇忌服，血虚无瘀者禁用。

35392 产后救生丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】百草霜四两 川芎五钱 丹参一两 炮姜二两 明天麻一两 飞罗面 茯神各二两 柴胡五钱 熟地一两 当归二两 阿胶珠 麦冬 广木香 风眼草各一两 京墨五钱 远志二两 红花饼五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重，蜡皮封固。每服一丸，空心姜汤送下。

【功用】化滞生新，行瘀止痛。

【主治】产后恶露不尽，败血上冲，神昏谵语，不省人事，暴脱下血，脐腹疼痛。

【宜忌】孕妇忌服。

35393 产难如圣散

【方源】《医方类聚》卷二二九引《徐氏胎产方》。

【组成】紫苏叶 当归各等分

【用法】每服三五钱，长流水煎服。如无流水，以水顺搅动，煎服。

【主治】难产诸疾。

35394 产难土龙汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】紫苏 陈皮 川芎 荆芥 厚朴 茯苓 甘草

【主治】胎前产后诸疾。

【加减】如有热，可加黄芩。

亥

35395 亥药

【方源】《咽喉秘集》。

【异名】回生丹。

【组成】巴豆二十一粒 生矾一两(入银罐内焙之，看矾枯，去巴豆)

【用法】每一两矾，加小姜黄末一钱，面糊为丸，如梧桐子大，用雄黄末二钱为衣。每服七粒，生姜水送下。

【功用】开关窍，降痰。

【备考】用辰药后可服此丸，重者用之，轻者不用。

35396 亥骨饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】猪脊骨五寸 大枣二十枚(劈碎) 甘草(微炙，锉) 干姜(炮)各半分

【用法】上咬咀。以水三升，同煎至二升，发时量意加熟水服。

【主治】消渴。

庆

35397 庆云散

【方源】《千金》卷二。

【组成】覆盆子 五味子各一升 天雄一两 石斛 白术各三两 桑寄生四两 天门冬九两 菟丝子一升 紫石英二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，先食，酒调下，一日三次。

【主治】丈夫阳气不足，不能施化，施化无成。

【加减】素不耐冷者，去寄生，加细辛四两，阳气不少而无子者，去石斛，加槟榔十五枚。

【方论选录】《千金方衍义》：庆云者，庆云龙之征兆。紫石英专温荣血，天雄峻暖精气，佐以覆盆、五味、菟丝温补下元，寄生主治腰痛，天冬能强肾气，石斛强阴益精，白术固津气而利腰脐间血；恐英、雄二味之性过烈，乃以天冬、石斛、寄生濡之，覆盆、五

味、菟丝辅之，白术培土以发育万物；扶阳施化之功尽矣。若素不耐寒，则去寄生而加细辛，以鼓生阳之气；阳本不衰，当退石解而进槟榔，以祛浊湿之垢。其法之可重端在乎此。

【备考】方中天门冬，《妇人良方》作“麦门冬”。

35398 庆世丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】何首乌（用赤白者）四两 生熟地黄各二两 菊花（园中甘者）二两 车前子二两 地骨皮二两（去粗皮，用近骨者） 茯神（白者）二两 远志二两（用柑子水煮，去心） 石菖蒲二两（九节者，米泔水浸一宿） 川牛膝二两（酒浸） 肉苁蓉二两（酒洗，去鳞） 山药二两 巴戟天二两（酒炒，去心） 甘州枸杞子二两（酒浸） 或加柏子仁、酸枣仁各二两

【用法】上为末，春、夏用酒糊为丸，秋、冬炼蜜为丸。每服百丸，清晨滚白汤送下，淡盐酒任下。

【功用】补养。

闭

35399 闭白丸

【方源】《经验女科方》。

【组成】龙骨（煨） 螵蛸 牡蛎（煨） 赤石脂（煨）

【用法】上为末，米糊为丸。每服一百丸，以酒送下。

【主治】妇女胎前白带。

35400 闭血汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参 白术各一两 三七根末三钱 北五味子二钱

【用法】水煎服。一剂后减人参五钱，加熟地一两，山茱萸五钱，麦冬五钱，再服四剂。

【功用】补气生血，止血同冲。

【主治】老妇因虚，不慎房帟，以致血崩，

目暗晕地，愈止愈多。

35401 闭毒散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】川大黄 玄参 川芒消 白藜 射干 木香 黄芩各半两

【用法】上为细散，用鸡子白和如泥，作饼子。搭在眼睑上，干即易之。

【主治】眼赤肿痛。

35402 闭真丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】龙骨（另研）一两 诃子五枚 缩砂仁半两 朱砂一两（另研，一半为衣）

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服一丸，空心以温酒送下。

【主治】白淫不止，及有余沥。兼治梦遗。

35403 闭管丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】胡连一两 槐花（微炒） 穿山甲（麻油内煮黄色） 石决明（煨）各五钱

【用法】炼蜜为丸，如麻子大。每服一钱，空心以清米汤送下，早晚日进二服。

【主治】痔漏。

【加减】如漏四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个炒研，和入药中。

35404 闭管丸

《外科方外奇方》卷四。为《验方新编》卷四“完善丸”之异名。见该条。

35405 闭精丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】牡蛎 菟丝子 龙骨（生） 五味子 白茯苓 韭子 白石脂 桑螵蛸各等分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐酒送下。

【主治】下虚，白浊如米泔或若凝脂。

35406 闭精散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】黄耆 远志 人参 当归各一钱 泽泻 白芍药 甘草（炙） 龙骨各七分

【用法】上咬咀。水煎，空心温服。

【主治】小腹急痛，便溺失精，洩出白液。

35407 闭关止渴汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】石膏五钱 玄参二两 麦冬二两 熟地二两 青蒿五钱

【用法】水煎服。

【主治】消渴，大渴恣饮，一饮数十碗，始觉胃中少快，否则胸中嘈杂如虫上钻，易于饥饿，得食渴减，不食渴尤甚，属胃消者。

【方论选录】此方少用石膏、青蒿以止胃火，多用玄参、熟地以填肾水，重用麦冬以益肺气，未尝闭胃之关门也。然而胃火之开，由于肾水之开；肾水之开，由于肾火之动也；而肾火之动，又由于肾水之乏也。今补其肾水，则水旺而肾火无飞动之机，火静而肾水无沸腾之患。肾水既安于肾宅，而胃火何能独开于胃关哉。此不闭之闭，真神于闭也。

问

35408 问命丸

《颅凶经》卷上。为原书同卷“保童丸”之异名。见该条。

35409 问命丹

【方源】《普济方》卷三十五引《全婴方》。

【组成】踟躅花半两 蝎尾一分 麝香半字（加龙脑半字尤佳）

【用法】上为末。少许，吹入鼻中。

【主治】小儿急慢惊风，诸药无效，神昏恶候。及脑痛头疼。

35410 问命散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】瓜蒂半两 细辛（去苗）一分 干地龙（去土）一分（炒） 白矾灰一分 藜芦（去芦）一分

【用法】上为细末。每用少许吹鼻中，得嚏即吉，若有虫出即愈。

【主治】诸疳。

35411 问命散

【方源】《普济方》卷三七五引《保生集》。

【组成】蜈蚣一条 僵蚕一条（比如蜈蚣长）

【用法】上为细末。男左女右，搐一字。

【主治】小儿急慢惊风，发搐。

35412 问命散

【方源】《普济方》卷三六八。

【异名】定命散。

【组成】藜芦一两（炒干为末） 麝香半钱

【用法】上为末。吹鼻中。

【功用】发表通气。

【主治】小儿伤寒，壮热头疼，手足饶寒，睡中忽跳受惊。

灯

35413 灯心汤

【方源】《朱氏集验方》卷七。

【组成】灯心 干柿各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】热淋疼痛。

35414 灯心汤

《奇效良方》卷六十五。为《普济方》卷四〇四“灯心散”之异名。见该条。

35415 灯心散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】灯心（焙）一两

【用法】上为散，入丹砂一钱研。每服二钱匕，以米饮调下。

【主治】鼻衄不止。

35416 灯心散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【异名】灯心汤（《奇效良方》卷六十五）。

【组成】灯心一把 鳖甲二两（醋炙黄）

【用法】上咬咀。水煎服，量儿大小为剂。

【主治】疮疹出后烦喘，小便不利。

35417 灯心散

《东医宝鉴·杂病篇》卷十一。为《小儿药证直诀》卷下“花火膏”之异名。见该条。

35418 灯花丸

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】灯花二十个 乳香（皂子大）两块

【用法】上为末，粟米饮为丸，如芥子大。每服七丸，以桃心汤送下，不拘时候。

【主治】小儿惊啼，夜啼。

35419 灯花散

《三因》卷十八。为《小儿药证直诀》卷下“花火膏”之异名。见该条。

35420 灯花散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】灯花七枚 辰砂一分

【用法】上为末。灯草汤吞下。

【主治】小儿夜啼。

35421 灯花膏

【方源】《百一》卷十九。

【异名】火花膏（《赤水玄珠》卷二十五）、花火膏（《婴童百问》卷三）。

【组成】灯花七个 硼砂一字 朱砂少许

【用法】上为极细末，以蜜调成膏。俟儿睡时，以少许抹口唇上。

【主治】①《百一》：小儿夜啼。②《普济方》：热燥，小便赤，口暖有汗，仰身而啼。

35422 灯苍丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】半夏二两（姜制） 硫黄一两 白善土一两

【用法】上为末，滴水为丸，如大豆大。每用一二丸，儿小者服一丸，以针穿于灯上燎过，吐逆者，盐艾汤送下；烦躁者，生姜汤送下；四胶冷者，热酒送下；头痛者，腊茶送下。

【主治】伏暑吐逆，头目痛，四肢厥冷，烦躁不解。

35423 灯心竹叶汤

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】竹叶三十片 灯心三十根

【用法】水煎服。

【主治】①《准绳·幼科》：干呕。②《治痘全书》：夏月手足心热，面赤饮冷，吐出浑浊。

冲

35424 冲元汤

《顾氏医径》卷六。为《外科枢要》卷四“冲

和汤”之异名。见该条。

35425 冲关散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】赤茯苓（去皮） 人参 陈皮（去白） 木通 槟榔各一两 青皮一分 甘草（炙）半两

【用法】上为粗散。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。以小便通利为度。

【主治】关格不利，上焦有热，胸中痞闷，小便涩少或不通。

35426 冲和丸

《准绳·类方》卷五。为《赤水玄珠》卷十三“家传三因冲和丸”之异名。见该条。

35427 冲和丸

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】陈皮 半夏 枳壳 厚朴 神曲 杏仁各一两 黄芩 桔梗各五钱

【功用】消积滞。

【主治】饮食所伤，脾失运化。

【加减】痰滞胶固者，加莪术。

35428 冲和丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】羌活四十两 川芎四十两 苍术（炒）四十两 防风四十两 白芷四十两 芥穗十两 薄荷十两 细辛十两 甘草六两 黄芩十六两 生地三十二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，朱砂为衣。每服二丸，临睡前以温开水送下。

【功用】散风解热。

【主治】感冒风寒，头疼身热，骨节痠痛。

35429 冲和汤

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】生姜四两（切、焙） 草果仁（去皮）七钱半 甘草七钱半（炙） 半夏曲二钱半（炙） 白盐一两（炒）

【用法】上为细末，入盐和匀。每服二钱，沸汤点服。

【功用】醒酒快膈，消痰助胃。

35430 冲和汤

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】甘草二钱半(炙) 黄芩一钱半 柴胡(去梗) 人参(去芦) 半夏(汤泡七次) 各半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盏半，生姜五片，大枣二枚，煎至七分，去滓温服。

【主治】暑疟，寒热多痰。

【加减】寒多，加桂；热多，增人参；渴，加干葛。

35431 冲和汤

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【异名】加减防风通圣散。

【组成】通圣散一料(内除去芒消、黄芩不用，滑石减半)加防风半两 荆芥七钱半 薄荷半两 甘草三两(炒一两七钱半，生用一两二钱半) 苍术(去皮)二两半

【用法】加生姜、葱白煎服。

【主治】感冒三四日不解，微生烦渴口干。

【加减】风热上壅，微觉半身不遂，口眼喎斜者，加羌活、独活、天麻各一两，细辛半两，全蝎三钱；如大便闭，另加大黄。

35432 冲和汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】中和汤(《准绳·疡医》卷一)、冲元汤(《顾氏医径》卷六)。

【组成】人参二钱 黄耆 白术 当归 白芷各一钱半 茯苓 川芎 皂角刺(炒) 乳香 没药各一钱 金银花一钱 陈皮二钱 甘草节一钱

【用法】水、酒各半煎服。

【主治】元气虚弱，失于补托，疮属半阴半阳，似溃非溃，似肿非肿。

35433 冲和汤

《医统》卷十四。为《此事难知》卷上引张元素方“九味羌活汤”之异名。见该条。

35434 冲和汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】柴胡 黄耆 当归(酒洗) 半夏

(煮) 人参各一钱 升麻 橘皮各八分 甘草(炙)七分 黄柏(酒洗) 芍药各五分 黄芩(酒洗)四分

【用法】上锉散。水煎，热服。

【主治】半身不遂，语言謇涩，心神昏愤，烦躁自汗，表虚恶风，如洒冰雪，口不知味，鼻不闻香臭，闻木音则惊怖，小便频多，大便结燥，痰嗽啞干，疼痛不利。

35435 冲和汤

《济阳纲目》卷十一。为《三因》卷十三“参苏饮”之异名。见该条。

35436 冲和汤

【方源】《眼科秘诀》卷一。

【组成】羌活 苍术(制) 防风各一钱 黄连 川芎 白芷各八分 细辛六分 甘草五分

【用法】加生姜三片、葱头一个(长五寸)，煎热服。次一剂不用葱。外以二至散洗之。如重，用玄灵圣药点之。

【功用】解表。

【主治】因于失调，内郁五脏，外发眼目，暴赤之发，如天地疾风暴雨之状。

35437 冲和汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】山萸肉二钱 枣仁二钱(炒，研) 当归二钱 白芍一钱五分(酒炒) 人参二钱 茯神二钱 甘草五分 沙苑蒺藜三钱 红枣五枚 橘饼四钱

【主治】怒甚则胁痛，郁极则火生，心烦意躁，筋节不利，入夜不寐。

35438 冲和饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】苍术(米泔水浸一宿，去粗皮，锉片，炒微黄色)一两二钱 人参(去芦) 前胡(去芦) 桔梗(锉，炒)各五钱 枳壳(去瓢，麸炒微黄色) 麻黄(去节) 陈皮(去白)各三钱 川芎 白芷 半夏(汤洗七次，姜汁浸，晒干，炒) 当归(酒洗) 薄桂(去粗皮) 白芍药 赤茯苓(去皮)各

一钱半 干姜 厚朴(去粗皮,姜汁浸一宿,慢火炒干)各二钱 甘草(炙)七钱半

【用法】上咬咀。每服二钱,水一盞,加生姜二片,葱一根,煎七分温服,不拘时候。

【主治】感冒风寒,头疼发热,肩背拘急,恶心呕吐,腹痛膨胀,兼寒湿相搏,四肢拘急,冷气侵袭,腰足疼痛。

【加减】伤冷恶心呕吐,加煨姜同煎;开胃进食,加枣子煎,空心温投;寒疝痛,入盐炒茺萸、茴香同煎。

35439 冲和散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【异名】败毒散(《普济方》卷四〇三)。

【组成】白药子 甘草(炙)各一分 雄黄一钱(醋淬)

【用法】上为散。每服半钱匕,蜜汤调下。

【功用】退热解躁。

【主治】小儿斑痘疮。

35440 冲和散

【方源】《百一》卷七。

【异名】苍荆散(《医学入门》卷八)。

【组成】苍术六十两 荆芥穗三十两 甘草十二两半

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞半,煎至八分,去滓热服,不拘时候。并滓再煎。

【主治】寒温不节,将摄失宜,或乍暖脱衣,盛热饮冷,或坐卧当风,居处暴露,风雨行路,冲冒霜冷,凌晨早出,呼吸冷气,或久晴暴暖,忽变阴寒,久雨积寒,致生阴湿。使入身体沉重,肢节酸疼,项背拘急,头目不清,鼻塞声重,伸欠泪出,气壅上盛,咽渴不利,胸膈凝滞,饮食不入。伤风、觉劳倦。

【备考】《医学入门》本方用苍术、荆芥各等分,甘草减半。

35441 冲和散

《永类铃方》卷二十引《集验》。为原书同卷“荆术散”之异名。见该条。

35442 冲和散

《古方汇精》卷二。为《仙传外科集验方》“冲

和仙膏”之异名。见该条。

35443 冲和散

【方源】《喉舌备要》。

【组成】荆皮一两 独活五钱 赤芍五钱 白芷三钱 南星一钱半 半夏一钱半 南木香二钱 菖蒲二钱

【用法】上为细末。调白酒敷。

【主治】咽喉病属阴证者。

35444 冲和散

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】紫荆皮五两(炒) 独活三两(炒) 赤豆二两(炒) 白芷一两(生研) 石菖蒲一两(生研)

【用法】上为细末。以葱头煎浓汤,或用温酒,调敷患处。

【功用】活血消肿。

【主治】痈疽初起,红肿疼痛。

35445 冲和膏

《外科理例》。为《仙传外科集验方》“冲和仙膏”之异名。见该条。

35446 冲和膏

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】赤芍二两 白芷 防风各一两 独活三两 龙脑三钱 石菖蒲一两五钱

【用法】各取净末,以瓷瓶收贮,不可泄气。临用时姜汁、酒醋调敷,一日一换。

【主治】外症初起,坚肿色淡。

35447 冲和膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】紫荆皮 乳香 甘草 杭白芷 没药各等分

【用法】上为极细末。外涂。

【功用】清热除湿,活血化瘀。

【主治】痈疡之症,似溃非溃,介于半阴半阳者。

【方论选录】此方与《外科正宗》冲和膏不同,无独活、赤芍、菖蒲,而用乳香、没药、甘草,除湿之力轻,而活血通络之力重,是其特点。

35448 冲寒散

《东医宝鉴·杂病篇》卷三。即《医学入门》卷七“常用冲寒散”。见该条。

35449 冲和仙膏

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】黄云膏、仙膏（原书）、冲和膏（《外科理例》）、阴阳散（《外科枢要》卷四）、冲和赶毒散（《大生要旨》）、冲和散（《古方汇精》卷二）、赶毒散（《验方新编》卷十一）。

【组成】川紫荆皮五两（炒） 独活三两（炒，不用节） 赤芍药二两（炒） 白芷一两（不见火） 木蜡（又名望见消、阳春雪，即石菖蒲）随证加減

【用法】上为细末。热酒或葱汤调敷。凡敷药皆须热敷，干则又以元汤湿透之。

【功用】①《金鉴》：行气疏风，活血定痛，散瘀消肿，祛冷软坚。②《古方汇精》：祛寒逐湿。

【主治】痈疽、发背、疮疖、流注、发颐等诸肿毒初起，红肿硬痛，或漫肿无头，积日不消，冷热不明；以及偏正头痛，眼痛。

①《仙传外科集验方》：流注属半阴半阳者。②《外科理例》：一切疮肿不甚热，积日不消。③《本草纲目》：一切痈疽、发背、流注、诸肿毒，冷热不明者。④《赤水玄珠》：偏正头风肿痛，眼痛。⑤《青囊秘传》：一切外症之凝滞皮肤间者。

【宜忌】①《仙传外科集验方》：如病热势大盛，切不可用酒调，但可用葱泡汤调此药热敷上，如病稍减，又须用酒调。疮面有血泡成小疮，不可用木蜡，恐性粘，起药时生受，宜用四味先敷，后用木蜡盖在上面，覆过四周。②《北京市中药成方选集》：不可内服。

【加減】如病极热，倍加紫荆皮、木蜡，少用三品；如病极冷，微加赤芍药、独活；如用本方四面黑晕不退，疮口皆无血色者，加肉桂、当归；如用本方痛不住，可取酒化乳香、没药于火上使溶，然后将此酒调药热涂；

流注筋不伸者，加乳香；如疮口有赤肉突出者，少加南星，用姜汁酒调；若病势热盛者，加对停洪宝丹，用葱汤调涂贴之；小儿软疖，加军姜酒调服。

【方论选录】夫痈疽流注杂病，莫非气血凝滞所成，遇温即生，遇凉即死，生则散，死则凝。此药是温平，紫荆皮木之精，能破气逐血消肿；独活土之精，能止风动血引气，拔骨中毒，去痹湿气，更能与木蜡破石肿坚硬；赤芍药火之精，微能生血，住痛去风；木蜡水之精，能生血，住痛消肿，破风散血；白芷金之精，能去风生肌止痛。盖血生则不死，血动则流通，肌生则不烂，痛止则不熈作，风去则血自散，气破则硬可消，毒自散。五者交攻，病安有不愈者乎。

35450 冲和饮子

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】人参 黄耆 麦门冬 芍药 柴胡 防风 荆芥 白茯苓 白术 桔梗 连翘 当归 天花粉

【用法】水煎服。

【主治】痘至七八日而发瘰者。

35451 冲脉饮子

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】黄耆（每一两用桂一钱煎汤，将碗盛饭上蒸熟）一钱 人参一钱五分 白术一钱 生地黄（酒浸）一钱 茯苓一钱 当归身二钱 白芍（酒炒）一钱 川芎一钱 柴胡五分 青皮五分 宣木瓜四分 皂角子二钱 甘草二分

【用法】上锉一剂。水煎，频服。

【主治】妇人年五十外，乳痈初已，面又致穿破，不得收功者。

【加減】大便不通润，加火麻仁（炒）二钱、黄连（酒炒）二钱。

35452 冲和补气汤

《东垣试效方》卷九。为《兰室秘藏》卷中“温经除湿汤”之异名。见该条。

35453 冲和灵宝饮

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】羌活 防风 川芎 生地黄 细辛 黄芩 柴胡 甘草 干葛 白芷 石膏

【用法】水二钟，加煨生姜三片，大枣二枚，入黑豆一撮煎之，温服取微汗。

【主治】两感伤寒，头痛恶寒发热，口燥咽干。

【备考】《医方简义》本方用生甘草一钱，防风一钱五分，生地四钱，柴胡一钱五分，细辛四分，白芷八分，川芎、葛根各一钱，石膏三钱，黄芩一钱。

35454 冲和灵宝饮

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】羌活 防风 川芎 生地黄 细辛 黄芩 柴胡 知母 干葛 石膏

【用法】加生姜、大枣，水煎，临服加薄荷十片，煎一沸热服，中病即止。

【主治】两感伤寒，头疼身热恶寒，舌干口燥。

【加减】冬月，去黄芩、石膏，加麻黄。

35455 冲和顺气汤

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】升麻白芷汤（《古今医鉴》卷九）。

【组成】葛根一钱半 升麻 防风 白芷各一钱 黄耆八分 人参七分 甘草四分 芍药 苍术各三分

【用法】上咬咀，作一服。水二盏，加生姜三片，大枣两个，煎至一盏，去滓，早饭后、午前温服。

【主治】①《卫生宝鉴》：忧思不已，饮食失节，脾胃有伤，面色黧黑不泽，环唇尤甚，心悬如饥状，饥不欲食，气短而促。②《张氏医通》：内伤脾气，恶寒发热，食少便溏。

【方论选录】《上古天真论》云：阳明脉衰于上，面始焦。始知阳明之气不足，故用本方助阳明生发之剂，以复其色。《内经》曰：上气不足，推而扬之。以升麻苦平，葛根甘温，自地升天，通行阳明之气为君；人之气以天地之疾风名之，气留而不行者，以辛取

之，防风辛温，白芷甘辛温，以散滞气，用以为臣；苍术苦辛，蠲除阳明经之寒湿，白芍药之酸，安太阴经之怯弱。《十剂》云：补可去弱。人参、黄耆、甘草，甘温益正气以为佐；《至真要大论》云：辛甘发散为阳。生姜辛热，大枣甘温，和营卫，开腠理，致津液，以复其阳气，故以为使也。

35456 冲和脾胃汤

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“圆明内障升麻汤”之异名。见该条。

35457 冲和神功丸

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】大黄（煨） 诃子 麻子仁 人参

【用法】上为末，人麻仁研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温水送下。

【主治】燥咳。

35458 冲和赶毒散

《大生要旨》。为《仙传外科集验方》“冲和仙膏”之异名。见该条。

35459 冲和健脾丸

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】白术（炒）四两 白豆蔻一两（拌白术末匀，饭上蒸） 人参三两 陈皮三两（同参饭上蒸） 白茯苓二两 山楂肉二两 石斛（盐水洗，同茯苓、山楂饭上蒸熟） 甘草（绵纸上炒焦黄色）七钱

【用法】上药各为末，麦芽粉打糊为丸。每服五十丸，白汤送下。

【功用】益心开胃健脾，宽胸顺气，进食和中，资扶三焦，培植五内。

【主治】体欠强盛，及膈气、膈食、翻胃、噎食、中满。

35460 冲和资生丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】白术四两 茯神二两五钱 枣仁二两五钱 当归二两五钱 莲肉二两五钱 人参二两 黄耆一两五钱 陈皮一两五钱 砂仁一两五钱 楂肉一两五钱 神曲一两五钱 麦芽粉一两五钱 白蔻仁一两 远志一两 益智一两 木香五钱

【用法】炼蜜为丸。每服二钱，早晚空心米汤或参汤吞服。

【功用】补脾胃营气，补肺统气，疏肝达气，滋心育气，益肾生气。

【主治】胃强脾弱，既食而运化不及，气逆膈中，不食而犹然痞满，日久五脏无所禀受，三焦清气虚陷，精血日亏，形神销烁，大便滑泄，溲便短浊，浊气僭上，渐成中满，土虚水泛，周身肿胀。

35461 冲虚至宝丹

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】阿芙蓉二钱（另研） 麝二分（另研） 射干（即扁竹根）七分（另研） 朱砂三分（另研） 狗宝一钱三分（火煨七次，入烧酒内，另研）

【用法】上为极细末，烧酒糊为丸，如绿豆大，金箔为衣。每一料为四十六丸，不可多少。劳嗽每用一丸搗细，用好梨七钱去皮，将药撒在梨上，一更时令患者嚼下。服毕即睡，勿言语。次日巳时，方饮清米汤，三日戒食厚味。噤口痢用白砂糖三钱用药一丸搗细，不拘时咽下，不忌厚味。

【主治】男妇日久劳嗽，并噤口痢二证诸药不效者。

35462 冲虚至宝丹

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】广木香 沉香 狗宝三钱 白礞砂三钱 雄黄（透明） 朱砂一钱五分 鸦片一钱 冰片五分 麝香五分 牛黄一钱 金箔四十张

【用法】上为细末，用射干四两煎浓汁为丸，如稀，加蒲黄末同和，每丸重五分，金箔为衣。服时用雪梨一块，挖一孔，入丸一粒，临卧连丸嚼化。

【主治】膈气痰火。

决

35463 决水汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】车前子一两 茯苓二两 王不留行五钱 肉桂三分 赤小豆三钱

【用法】水煎服。

【功用】利水。

【主治】水肿既久，遍身手足俱胀，面目亦浮，口不渴而皮毛出水，手按其肤如泥。

【宜忌】禁用食盐一月。

【方论选录】此方利水从小便而出，利其膀胱也。凡水必从膀胱之气化，而后由阴器以出，土气不宣，则膀胱之口闭，用王不留行之迅药以开其口，加入肉桂，引车前、茯苓、赤小豆直入膀胱而利导之。茯苓、车前虽利水而不耗气，而茯苓且是健土之药，水决而土又不崩，此夺法之善也。

35464 决阴煎

《叶氏女科》卷三。为《景岳全书》卷五十一“决津煎”之异名。见该条。

35465 决明丸

【方源】《千金翼》卷十一。

【组成】石决明（烧） 石胆 光明砂 芒消（蒸） 空青 黄连（不用渍） 青箱子 决明子（以苦酒渍，经三日晒干） 蕤仁 防风 鲤鱼胆 细辛各等分

【用法】上为极细末，鱼胆和丸，如梧桐子大，晒干研碎，铜器贮之，勿泄。每取黄米粒大纳眦中，日一夜一。稍稍加，以知为度。

【主治】眼风虚劳热，暗运内起。

35466 决明丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】决明子一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 柏子仁一两 熟干地黄一两 菟丝子一两（酒浸三日，焙干，别搗为末） 枸杞子一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前服以温酒送下。

【主治】胆虚冷，神思昏沉，头眩目暗。

【备考】按：本方方名，《普济方》引作“决明子丸”。《医方类聚》卷十引《神巧万全方》无熟干地黄，有细辛、芎藭。

35467 决明丸

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】石决明 黄连(去须) 车前子 细辛(去苗叶) 枳壳(去瓢, 麸炒) 各一两 梔子仁 大黄(锉, 炒) 黄芩(去黑心) 羚羊角各半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食后煎竹叶汤送下。

【主治】伤寒后眼目昏暗, 赤痛生疮。

35468 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】决明子 青箱子 茺蔚子 车前子 地肤子 五味子(炒) 枸杞子(去茎蒂) 细辛(去苗叶) 麦门冬(去心, 焙) 生干地黄(焙) 赤茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 泽泻 甜葶苈(纸上炒紫色) 防风(去叉) 芎藭各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食后良久米饮送下, 一日三次。

【主治】肝虚隔热, 眼目昏暗, 渐成障蔽, 或见黑花, 不能远视。

35469 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】石决明一两(研, 水飞) 甘菊花一两 细辛半两 熟干地黄二两 人参一两(去芦头) 地肤子一两 五味子一两半 兔肝一具(炙干) 防风二两(去芦头)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心及晚后食前煎盐汤送下; 或竹叶白汤亦可。渐加至三十丸。

【主治】风毒赤眼久不愈。

35470 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】石决明 车前子 黄连(去须) 各二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 食后以米饮送下, 一日二次。

【主治】目暴肿疼痛。

35471 决明丸

【方源】《圣济总录》(文瑞楼本)卷一〇七。

【组成】决明子(微炒) 蕤仁(去皮, 研) 茯神(去木) 桔梗(炒) 麦门冬(去心, 焙) 黄连(去须) 各一两 青箱子 枳壳(去瓢, 麸炒) 防风(去叉) 玄参 犀角(镑) 槟榔(煨, 锉) 升麻 生干地黄(焙) 龙胆 沙参 紫菀(去苗土) 各三分 百合半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后以米饮送下。

【主治】肝肺热, 毒风目昏。

【备考】本方方名, 原书人卫本作“决明子丸”。

35472 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】草决明(汤洗三遍, 晒干) 蕤仁子 甘草(炙) 细辛 京芎 甘菊花 荆芥穗 木贼 旋覆花 苍术(河水浸, 切作片子, 晒干) 各等分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如樱桃大。每服一丸, 不拘时候, 细嚼茶酒送下。

【主治】眼目风毒昏暗。

35473 决明丸

《圣济总录》卷一〇九。为《圣惠》卷三十三“决明子丸”之异名。见该条。

35474 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【异名】退膜丸(《普济方》卷八十)。

【组成】决明子(微炒) 车前子 山梔子仁 枸杞子 熊胆汁(干者亦得) 各半两 黄连(去须) 牵牛子(炒熟) 甘草(炙, 锉) 各三分 牛胆汁半合 猪胆汁五枚

【用法】上为末, 三味胆汁和丸, 如梧桐子大。随胆汁多少, 以丸得为度, 如硬, 入炼蜜少许。每服三十丸, 食后温热水下。

【主治】①《圣济总录》: 倒睫拳挛, 隐磨瞳仁。②《普济方》: 阳气炎上, 血脉贯冲, 目赤肿痛, 眦生疮, 暴生钉翳, 渐染睛轮, 视物羞涩, 紧急难开。

35475 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明(洗) 茺蔚子 车前子 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 桔梗(锉,炒) 人参 白茯苓(去黑皮) 山萸各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心以盐汤送下。

【主治】①《圣济总录》:眼昏暗浮花,恐成乌风内障。②《济阳纲目》:乌风内障,无翳,但瞳仁小,三五年内结成翳,青白色,不宜针,视物有花。

35476 决明丸

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】决明子 牛黄(别研) 蕤仁等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服二丸,临卧时以乳汁送下。如热痛不可忍者,用猪胆汁为丸。

【主治】小儿赤眼。

35477 决明丸

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】决明子 青箱子 苍术 木贼 川芎 羌活 防风 甘草 楮实 菊花 蝉壳 石膏各一分 蛇皮一条 仙灵脾 谷精草各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服二丸,食后细嚼米饮送下。

【主治】脾虚隔热,眼目昏暗,翳膜遮障,隐涩羞明。

35478 决明丸

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《家宝》。

【组成】决明子 车前子 菊花 川芎 宣连 当归各一分 大黄 子芩各半分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小绿豆大及麻子大。每服五岁七丸,七岁十丸,十岁十五丸,以意加减,并煎桑枝汤送下;麦门冬熟水亦可。

【主治】肝脏壅热,眼生翳障。

【备考】《普济方》无子芩,有紫参。

35479 决明丸

【方源】《得效》卷十一。

【组成】石决明(煨) 川芎 黄柏各一两 苍术半两(米泔浸)

【用法】上为末,用兔肝(或无,以白羯羊肝代之)研烂为丸,如绿豆大。每服三五十丸,食后临卧以米泔送下。

【主治】豆疮入眼,虽赤白障翳膜遮漫黑睛,但瞳子不陷者。

35480 决明丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】青箱子(炒) 防风 枳壳各一两 茺蔚子 细辛各半两 枸杞子 泽泻 生干地黄 石决明(烧)各半两 土当归(酒浸)二两 宣连半两(去须) 车前子(炒) 麦门冬(去心)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后麦门冬煎汤送下。

【主治】诸般眼患,因热病后毒气攻目,生翳膜遮障。

【备考】本方方名,《普济方》引作“决明子丸”。

35481 决明丸

《普济方》卷七十二。即《圣济总录》卷一〇二“决明子丸”。见该条。

35482 决明丸

《医统》卷六十一。为《圣济总录》卷一〇七“决明子丸”之异名。见该条。

35483 决明丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】石决明一两 车前子一两 五味子半两 细辛半两 大黄一两 茯苓一两 知母一两 茺蔚子一两 黑参一两 防风一两 黄芩一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,食前茶清送下。

【功用】下行实热。

【主治】滑翳内障。瞳心内一点如水银珠子之状,微含黄色,不痒不疼,无泪而遮蔽瞳神,渐渐失明,后则左右相牵俱损。

35484 决明丹

【方源】《幼幼新书》卷十八引张涣方。

【异名】决明散（《良朋汇集》卷五）。

【组成】决明子 密蒙花各一两 青箱子 车前子 川黄连 羚羊角（屑者）各半两

【用法】上为细末，煮羊肝一具，切破同诸药为丸，如黍米大。每服十粒，乳食后以荆芥汤送下。

【主治】小儿疹豆疮后毒气入眼。

35485 决明汤

【方源】《外台》卷二十一引《广济方》。

【异名】决明子汤（《圣济总录》卷一〇八）。

【组成】决明子 升麻 枳实（炙） 柴胡 黄芩 芍药各一两 梔子十四枚 竹叶一升 车前草四升 甘草一两（炙）

【用法】上切。以水九升，煮取二升五合，去滓，纳芒消，分三次温服。

【主治】客热冲眼，赤痛泪出。

【宜忌】忌海藻，菘菜。

35486 决明汤

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《婴童方》。

【组成】决明子 大黄 梔子仁 子芩各七分 升麻 芍药 柴胡各六分 枳壳（炙）三分 竹叶八合 石膏十分（碎，绵裹） 杏仁 甘草（炙）各二分

【用法】水四升，煮取一升二合，分为四服。二岁内减。

【主治】小儿肝热冲眼。

【加减】生翳，加地肤子五分。

35487 决明汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】石决明（洗净，焙） 细辛（去苗叶） 防风（去叉） 车前子 人参 白茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒令香熟） 桔梗（炒）各一两 茺蔚子二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，煎至一盞，去滓，食后临卧温服，一日

三次。

【主治】眼燥涩痛，状如眯瞤。

35488 决明汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】石决明 人参 芎藭 细辛（去苗叶） 五味子各一两 赤茯苓（去黑皮）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】血灌瞳仁。

35489 决明汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】决明子 钩藤各一两 牡丹皮 升麻各三分 羚羊角（镑） 芍药 大黄（锉，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎取八分，去滓，食后临卧时温服。

【主治】时气病后，眼生翳赤痛。

35490 决明汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】决明子（微炒） 地骨皮 玄参 黄连（去须） 桔梗（炒） 柴胡（去苗） 茯神（去木）各三分 山梔子仁半两 羚羊角屑一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，入净洗淡竹叶十片，煎至七分，去滓放温，食后服，临卧再服。

【主治】眼生肤翳，遮覆瞳仁。

【备考】本方方名，《普济方》引作“决明散”。

35491 决明汤

《圣济总录》卷一八一。为《圣惠》卷八十九“决明散”之异名。见该条。

35492 决明饮

《济阳纲目》卷一〇一。为《古今医鉴》卷九“决明散”之异名。见该条。

35493 决明散

【方源】《外台》卷二十一引《深师方》。

【组成】马蹄决明二升

【用法】上为末，每服方寸匕，以粥饮送下。

【主治】失明，一岁二岁三岁四岁拭目中无他病，无所见，如绢中视物。

【宜忌】忌鱼、蒜、猪肉、辛菜。

35494 决明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明（捣细，研，水飞过） 车前子 人参（去芦头） 甘菊花 槐子 熟干地黄各一两 羌藟子二两 防风二两（去芦头）

【用法】上为散。每服二钱，食后以粥饮调下，夜临卧再服。

【主治】眼内障翳。

35495 决明散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】决明汤（《圣济总录》卷一八一）。

【组成】决明子子芩 柴胡（去苗） 川大黄（锉，微炒） 川升麻 梔子仁 羚羊角屑 甘草（炙微赤，锉）各半两 石膏一两

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，入竹叶七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】膈中有热，赤眼涩痛不开。

35496 决明散

【方源】《博济》卷三。

【组成】石决明 草决明 青箱子 蛇蛻 细辛 并泉石 甘草以上各等分

【用法】上为细末，然后用猿猪肝一具，去胆膜，净洗沥干后，用竹刀子随肝竖切，作缝子，将药末平称一两，逐缝子掺入药末，毕后，将麻线扎缚，却入生绢袋内，牢缚定，用锅子或瓦石锅，入淘米浓泔煮之；更入青竹叶一握，枸杞根一握，黑豆三合，同煮肝熟为度，取出候冷，仍先饱吃，食后方用竹刀子，逐片切吃，旋呷原汁送下，吃尽后，更吃豆。

【主治】青盲眼，脏虚有风邪痰饮乘之，有热则赤痛，无热则生障，外状不异，面只不见物。或加有痰热，则生翳如蝇翅状，覆在睛上。

【宜忌】不得犯铁器。

35497 决明散

【方源】《博济》卷三。

【组成】石决明 草决明 丹丞明（又名丹丞石） 青箱子 白芷 甘草 黄柏 黄连 谷精草 龙骨 蔓菁草 枳实 牡蛎 枸杞子 蛇皮（雄者五分，雌者五分，在草木屋上者雄者，沾土在地并谓之雌者）各一两 羌活 白蒺藜 蝉蛻 白附子 黄耆各半两 鱼子（活水中生下者）半两（其子滑，硫黄水温洗过） 虎睛一个（切作七片子，每一度，杵罗一片，用文武火炙干入，候杵罗时一七遍了尽，筛罗为度）

【用法】上药每服七分，五更时披衣，以陈茶清调下，日午、临卧服之。

【主治】①《博济》：眼一切疾，胥肉翳障，赤肿疼痛。②《普济方》：内障浮翳，或如枣花，或若银钉，浮浅透外。

【宜忌】忌毒、鱼、面、猪肉、酒色等。

35498 决明散

【方源】《活人书》卷二十一。

【异名】瓜蒌散（《普济方》卷四〇四）。

【组成】决明子一分 瓜蒌根半分 赤芍药一分 甘草一分（炙）

【用法】上为末。每服半钱，蜜水调下，一日三次。

【主治】①《活人书》：疹痘疮入眼。②《治痘全书》：痘疮入目成翳。

35499 决明散

《圣济总录》卷一〇七。为《圣惠》卷三十二“决明子散”之异名。见该条。

35500 决明散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】决明子（炒） 车前子 青箱子各半两 蒺藜 黄连（去须） 芎藭 甘草（炙，锉） 羚羊角（镑） 枳壳（去瓢，麸炒）各一两

【用法】上为细散。每服三钱匕，食后温浆水调下，临卧再服。

【主治】①《圣济总录》：眼生胬肉侵睛，及胬肉生疮，晕膜赤。②《丸散膏丹集成》：心经虚火，目小眦红丝胬肉，色淡红。

35501 决明散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】石决明（刮洗净）二两（研） 麦门冬（去心，焙） 菊花各一两 白附子（炮）半两 枸杞子 沉香（锉） 秦皮（去粗皮，锉） 巴戟天（去心） 桂（去粗皮） 牛膝（酒浸，切，焙） 梔子仁 羌活（去芦头）各三分

【用法】上为散。每服三钱匕，空心菊花汤调下，临卧再服。

【主治】眼内生疮，烂赤，痒，畏风。

35502 决明散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】决明子（微炒）一两半 秦皮（锉） 甘菊花各一两 细辛（去苗叶）三分 羚羊角（镑）一两 赤芍药一两半 麦门冬（去心，焙） 升麻 黄芩（去黑心） 黄连（去须）各一两 朴消（研）一两半 甘草（炙）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后以温米泔调服，临卧再服。

【主治】斑疮入眼。

【备考】本方方名，《普济方》引作“决明子散”。

35503 决明散

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明（刮洗） 细辛（去苗叶） 防风（去皮） 车前子 人参 白茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒） 羌藟子各一两 桔梗（炒）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧服。

【主治】内障浮翳，或如枣花，或若银钉浮浅透外。

35504 决明散

【方源】方出《幼幼新书》卷二十四引《庄

氏家传》，名见《医部全录》卷四四六。

【组成】石决明 乳香各一分 龙胆二分 大黄半两（煨）

【用法】上为末。每服二钱，用薄荷温水调下。

【主治】小儿热疳，非时生疮，爱吃冷水；肝脏风热，眼中不见物及有汗。

35505 决明散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】寒水石（火煨通红，取出，地上去火毒） 甘草（生用）各一两 坯子胭脂一钱

【用法】上为细末。每服半钱，乳食后用生米泔水调下。

【主治】小儿斑疮，热毒攻肝，上冲眼目，遂生障翳。

35506 决明散

【方源】《普济方》卷七十三引《卫生家宝》。

【组成】玄参 黄芩 防风 川芎各二两 蝉蜕半两 地骨皮一两 前胡 甘草各一两 苍术一两（泔浸） 木贼半两 草决明一两

【用法】上为细末。每服二钱，各换汤使，时气赤眼，米泔水送下；多泪，麦门冬熟水送下；翳膜，淡竹叶汤送下；血贯瞳仁不退，熟水或茶送下。

【主治】赤眼生翳障，多泪睛疼。

35507 决明散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】川芎 井泉石 仙灵脾 槐花各一两 川椒二钱半 蛤粉（水飞） 石决明（水飞） 防风 荆芥 羌活 苍术（米泔浸） 甘菊花 黄芩 杜蒺藜（炒） 木贼（去节） 地骨皮 薄荷 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，热茶清调，食后温服，一日进一二次。

【主治】眼目昏花，远视不明。

35508 决明散

【方源】《直指附遗》卷二十。

【组成】桔梗 羚羊角 大黄 紫决明 当归 川芎 瞿麦(用花) 生地黄 木贼 羌活 防风 赤芍药 石决明(火煨) 青箱子 车前子 蝉退 白芷 细辛 蔓荆子 蒺藜(炒) 香附子 玄参各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一钟半，煎至一钟，通口服。

【主治】眼青盲内障。

35509 决明散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】草决明 青箱子 干葛 槐花 败荷叶(水上者) 一皮

【用法】上为细末。食后米泔水调下。如四五十日只服此药，若日子久则眼老睛悬，却再合后药：香白芷、香附子、连翘、甘草、蝉蜕，上为细末，每服二钱，水一盞，煎七分，用此汁调前药。

【主治】斑疮入眼。

35510 决明散

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】大黄 黄芩 木贼(去节) 赤芍 山梔仁 菊花 粉草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，生地黄水煎，食后服。

【主治】五脏积热，目肿塞不开，热泪如汤，羞明。

【加减】睛疼，加没药、当归、川芎。

35511 决明散

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】石决明(煨) 枸杞子(酒浸一宿) 木贼(去节) 荆芥穗 晚桑叶 羌活 谷精草(去根) 粉草(炙) 旋覆花 蛇退(蜜炙) 制苍术 菊花各等分

【用法】上为细末。每服二钱，茶清调，食后服。

【主治】障膜。

35512 决明散

【方源】《得效》卷十六。

【异名】决明子散(《济阳纲目》卷一〇

一)。

【组成】黄芩 甘菊花(去枝梗) 木贼 草决明子 石膏 赤芍药 川芎 川羌活 甘草 蔓荆子 石决明

【用法】上锉散，每服三钱，水一盞半，生姜五片煎，食后服。

【主治】风热毒气上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤脉胥肉，或涩痒羞明多泪，或始则昏花，渐成内障。一切暴风客热，并宜服之。

35513 决明散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】石决明 人参 茯苓 大黄 车前子 细辛各一两 防风二两 羌藟子二两 桔梗一两半

【用法】上为末。每服一钱，食后米饮汤调下。

【主治】浮翳内障。因脑中热风冲入眼内，脑脂流下，凝结作翳，如银针之色，虽不见入物，尤见三光。初患之时无痒痛，从一眼先患，后乃相牵俱损。

35514 决明散

《普济方》卷八十。即《圣济总录》卷一——“决明汤”。见该条。

35515 决明散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】决明子 甘菊花各一两 防风(去芦) 车前子 芎藭 细辛 梔子仁 玄参 蔓荆子 白茯苓 山茱萸各一两半 生地黄三两

【用法】上为末。每服二钱，食后以盐汤调下。

【主治】眼见黑花不散。

35516 决明散

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】决明子

【用法】上为末。水调贴太阳穴。

【主治】头痛。

35517 决明散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】决明饮（《济阳纲目》卷一〇一）。

【组成】石决明 葛花 泽泻 木贼 大黄

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】①《古今医鉴》：翳障眼。②《济阳纲目》：一切眼目肿痛。

35518 决明散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】石决明 草决明 羌活 荆芥 梔子 木通 赤芍 麦门冬 地黄根

【用法】水煎，食后服。

【主治】伤寒热病后外障。

35519 决明散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】石决明 草决明 防风 赤芍 柴胡 白芷各八分 菊花一钱二分 川芎 羌活 蒺藜 红花各五分 当归一钱 梔子六分

【用法】加姜皮些须，灯心二十寸，水二钟，煎八分，食远温服。

【主治】目珠被物撞打，疼痛，眼眶停留瘀血。

35520 决明散

《良朋汇集》卷五。为《幼幼新书》卷十八引张涣方“决明丹”之异名。见该条。

35521 决明散

【方源】《医级》卷八。

【组成】石决明（取九孔者，煨，研，水飞净）一钱 冰片一分

【用法】上为细末。点眼角中。

【主治】赤翳攀睛。

35522 决明散

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】石决明（煨） 谷精草各二钱

【用法】上为细末。每用一钱，以蒸熟猪肝蘸食。

【主治】痘后眼生翳障。

35523 决明煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】决明膏（《圣济总录》卷一〇五）。

【组成】马蹄决明一两 蕤仁（汤浸，去赤皮）一两半 芦荟 秦皮（捣碎） 黄柏（去粗皮） 马珂（研） 乌贼鱼骨（研） 紫贝（烧熟，碎）各一两 波斯盐绿三分（细研） 鲤鱼胆四枚

【用法】先将前决明等五味，以水三大盏，煎至一盏，净滤，去滓，次下盐绿等五味，更煎至一小盏，于光铜器中盛，勿令泄气。每取一大豆许，以人乳调点之，闭目良久，令泪出，每日二三度。

【主治】①《圣惠》：远年翳障。②《圣济总录》：风热目赤翳，积年疼痛。

35524 决明膏

《圣济总录》卷一〇五。为《圣惠》卷三十三“决明煎”之异名。见该条。

35525 决经汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】陈皮 白茯苓 枳壳（麸炒） 川芎 赤芍 苏叶 槟榔 桔梗 白术（蜜炙） 半夏（制）各五分 当归 香附（制） 厚朴（姜制）各七分 甘草三分 红花 黄连（酒炒） 柴胡各六分 砂仁四分 姜三片

【用法】水煎，空心服。

【主治】妇人二十三、四岁，因经后潮热，误食生冷，聚成痰饮，心腹胀满，气升上膈，饮食不思，腹中结块成膜。

【加减】咳嗽，加五味子、杏仁（去皮尖）各五分；口干潮热，加竹沥、陈酒各半杯，姜汁少许。

35526 决津煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】决阴煎（《叶氏女科》卷三）。

【组成】当归三五钱或一两 泽泻一钱半 牛膝二钱 肉桂一二三钱 熟地二三钱或五七钱（或不用亦可） 乌药一钱（气虚者不用亦可）

【用法】水二钟，煎七八分，食前服。

【主治】①《景岳全书》：妇人血虚经滞，不

能流畅而痛极。②《叶氏女科》：妇人虚弱或邪思蓄注，邪随气结而不散，或冲任滞逆，脉道壅瘀而不行，致成鬼胎；或产后败血不散，流入阴中，而作寒热。

【加减】呕恶者，加焦姜一二钱；阴滞不行者，非加附子不可；气滞而痛胀者，加香附一二钱或木香七八分；血滞血涩者，加酒炒红花一二钱；小腹不暖而痛极者，加吴茱萸七八分；大便结涩者，加肉苁蓉一二三钱，微者以山楂代之。

【备考】《会约》无熟地，有香附。

35527 决效方

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】巴豆一枚（去皮）。

【用法】上一味，以鸡子开一小窍，纳巴豆一枚入鸡子窍中，以纸塞定，别以湿纸裹，用火煨熟透，去壳并巴豆，只一味吃尽鸡子，其病即止。虚人分作二服。

【主治】泻血不止。

【宜忌】不得稍生气。

35528 决效散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】贯众三两 白芷一两

【用法】上为细末。油调涂。

【主治】风痒头疮。

35529 决流汤

【方源】《傅青主男女科》。

【组成】黑丑二钱 甘遂二钱 肉桂一两 车前子一两

【用法】水煎服。一剂而水流斗余，二剂而痊愈，断不可与三剂。二剂之后，须用五苓散调理二剂，再以六君子汤补脾。

【主治】水臌，满身皆肿，按之如泥。

【宜忌】忌食盐三月，犯之则不救。

【方论选录】牵牛、甘遂，最善利水，又加之肉桂、车前子，引水以入膀胱，利水而不走气，不使牛、遂之过猛也。

35530 决明子丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】决明丸（《圣济总录》卷一〇九）。

【组成】决明子一两 甘菊花一两 生干地黄三分 车前子 防风（去芦头） 蔓荆子 芎藭 梔子仁 细辛 白茯苓 玄参 薯蓣各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎桑枝汤送下。

【主治】肝肾风虚攻上，眼见黑花不散。

【备考】本方原名“决明子散”，与剂型不符，据《医方类聚》卷六十六改。

35531 决明子丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子 槐子 覆盆子 青箱子 地肤子 车前子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下，晚食前再服。

【功用】明目，祛风除暗。

35532 决明子丸

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】决明子 天雄（炮） 犀角屑 天南星（炮裂） 白花蛇肉（酥拌，微炙） 独活 川芎 白附子（炮） 川升麻 白术 白僵蚕（微炒） 防风 蔓荆子 当归（微炒） 细辛 酸枣仁（微炒） 萆薢各半两 牛黄 朱砂 麝香各一分

【用法】上为末，人牛黄等匀分，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以豆淋酒送下。

【主治】肝脏中风，攻手足，缓弱无力，口眼喎斜，精神不定，行走艰难。

35533 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】决明子 车前子 苦参 黄连（去须） 黄芩（去黑心） 大黄各一两半 蕤荑子 人参各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以淡姜水送下，临卧再服。

【主治】肝实，目生赤脉息肉，疼痛。

35534 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】决明子 蕤仁 地肤子 白茯苓(去黑皮) 黄芩(去黑心) 防风(去叉) 麦门冬(去心,焙) 泽泻 茺蔚子 杏仁(去皮尖双仁,炒黄)各一两半 枸杞子 五味子 青箱子 桂(去粗皮) 细辛(去苗叶)各一两 车前子 菟丝子(酒浸,别捣) 熟干地黄(焙)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温浆水送下,一日二次。

【主治】肝肾虚目黑暗,或见黑花飞蝇;及久患肤翳,遮覆瞳子。

35535 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】决明子一两 地肤子三分 车前子一两半 黄连(去须) 人参 玄参 槐子各一两 青箱子三分 地骨皮二两 升麻 白茯苓(去黑皮) 沙参各一两 苦参三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心以盐酒送下。加至三十丸。

【主治】肝肾气虚,风热上攻,目赤肿痛。

【备考】本方方名,《普济方》引作“决明丸”。

35536 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】决明子一两半 防风(去叉) 黄连(去须)各半两 车前子 升麻 黄芩(去黑心) 大黄(锉,炒) 玄参 萎蕤各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后温浆水送下,临卧再服。

【主治】风毒冲目,虚热赤痛。

35537 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】决明子(微炒)一两 地肤子 麦门冬(去心,焙) 玄参 车前子各半两 赤茯苓(去黑皮) 远志(去心,焙) 青箱子 茺蔚子 蔓荆实 地骨皮 柏子仁 山芋 人参 黄芩(去黑心) 防风(去叉) 大黄

(细锉,炒令香)各一两 细辛(去苗叶)半两 甘草(炙、锉)一两 黄连(去须)一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以米饮送下。加至三十丸。

【主治】风毒眼赤痛久患,及虚热眼暗。

35538 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】决明子(炒)一两半 秦皮(去粗皮,锉)一两 甘菊花一两 升麻一两半 黄芩(去黑心)一两 车前子一两半 白茯苓(去黑皮)一两半 秦艽(去苗土)一两 赤芍药 地骨皮 山梔子仁 黄连(去须) 青箱子 萎蕤 牵牛子(炒) 蕤仁(去皮)各一两半 大黄(锉,炒)一两 甘草(炙,锉)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温水送下,临卧再服。

【主治】目赤昏暗涩痛,心躁恍惚。

35539 决明子丸

《圣济总录》(人卫本)卷一〇七。即原书文瑞楼本“决明丸”。见该条。

35540 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】决明丸(《医统》卷六十一)。

【组成】决明子(炒) 细辛(去苗叶) 青箱子 蒺藜子(炒,去角) 茺蔚子 芎藭 升麻 独活(去芦头) 羚羊角(镑) 防风(去叉)各半两 菊花一两 黄连(去须) 玄参 枸杞子各三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以淡竹叶熟水送下。加至三十丸。

【功用】《全国中药成药处方集》:补肾养肝,清头明目。

【主治】①《圣济总录》:风热上冲眼目,或外受风邪,眼痛视物不明。②《全国中药成药处方集》:眼胞红肿,目昏赤痛,瞳仁昏暗,翳障遮睛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》:忌食辛

辣、发物。

35541 决明子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇。

【组成】决明子(微炒) 菊花 秦皮(去粗皮, 锉) 黄连(去须) 各一两 车前子 地骨皮各一两半 羚羊角屑 黄芩(去黑心) 萎蕤 山梔子(去皮) 生干地黄(焙) 秦艽(去苗土) 各一两 青葙子 白茯苓(去黑皮) 各一两半 升麻一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后以温水送下, 临卧再服。

【主治】肝肺热毒, 气攻两眼, 生疮赤痛。

35542 决明子丸

《普济方》卷三十四。即《圣惠》卷三“决明丸”。见该条。

35543 决明子丸

《普济方》卷七十六。即《得效》卷十六“决明丸”。见该条。

35544 决明子丸

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】马蹄决明子二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。每服三丸, 食后以熟水送下。

【主治】小儿冷热无辜疳, 或时惊热, 或时夜啼, 大便青黄, 自汗头痛, 头发作穗, 四肢黄瘦, 不多食物。

35545 决明子方

【方源】《奇效良方》卷五十七。

【组成】决明子

【用法】朝朝取一匙授令净, 空心水吞下。一方取决明子作菜食之。

【功用】止泪明目。

【主治】肝经热, 风赤眼。

35546 决明子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】决明子(炒) 柴胡(去苗) 黄连(去须) 防风(去叉) 升麻 苦竹叶各三分 甘草(炙, 锉) 菊花各半两 细辛(去苗叶) 一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半,

煎至八分, 去滓, 食后温服。

【主治】肝脏实热, 目眦生赤肉涩痛。

35547 决明子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】决明子一升 石膏(研) 四两 升麻四两 山梔子仁(肥者)一升 地肤子 羌藟子各一升 苦竹叶(切)二升 干蓝叶(切)一升 芒消二两 车前草汁一升二合 冬瓜子(为末)三升

【用法】以水三斗, 煎竹叶取七升二合, 去滓, 纳诸药, 煮取四升, 分为四服, 每服相去可两食间, 再服为度。

【主治】目暴赤, 毒痛欲生翳。

35548 决明子汤

《圣济总录》卷一〇八。为《外台》卷二十一引《广济方》“决明汤”之异名。见该条。

35549 决明子散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】决明子 川升麻 黄柏(锉) 秦皮 川芒消各一两 蕤仁半两 黄连一两半(去须) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一中盞, 煎至五分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】伤寒热毒气攻眼, 生赤脉白翳, 涩痛不可忍。

35550 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】决明子 梔子仁 地肤子 羌藟子 蓝叶 川朴消各一两 川升麻一两 石膏二两

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盞, 入苦竹叶二七片, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】眼赤肿, 痛不可忍, 欲生翳者。

35551 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】决明散(《圣济总录》卷一〇七)。

【组成】决明子(微炒) 车前子 羌藟子 黄连(去须) 防风(去芦头) 赤茯苓 人参(去芦头) 蒺藜子 远志(去心) 蔓

荆子 甘菊花 白芷 秦皮 玄参 枳壳
(麸炒微黄, 去瓤) 蕤仁 (汤浸, 去赤皮)
细辛各一两

【用法】上为散。每服一钱, 食后以温酒调下。

【主治】眼目赤痛, 或生翳膜, 头面多风, 泪出不止。

35552 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】决明子 川升麻 枳壳 (麸炒微黄, 去瓤) 柴胡 (去苗) 梔子仁 车前子各一两 细辛 防风 (去芦头) 黄连 (去须) 各三分 甘草半两 (炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】客热冲眼, 赤多泪出, 生疮。

【宜忌】忌炙煨热酒面。

35553 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子一两 黄连一两 (去须) 川升麻一两 枳壳一两 (麸炒微黄, 去瓤) 玄参一两 黄芩一两 车前子半两 梔子仁半两 地肤子半两 人参半两 (去芦头)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】①《圣惠》: 眼中卒生翳膜, 视物昏暗, 及翳覆裹瞳仁。②《医钞类编》: 鸡冠蚬肉 (内外障)。

35554 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子 甘菊花 青箱子 羚羊角屑 芎藭 犀角屑 玄参 黄芩 茯神 梔子仁各一两 甘草半两 (炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 水一中盏, 入竹叶七片, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】肝脏风热, 眼目昏暗, 并涩痛。

35555 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子 地肤子 细辛 白芷

桂心 车前子各三两 柏子仁二两 防风二两 (去芦头) 川椒四两 (去目及闭口者, 微炒去汗)

【用法】上为散。每服二钱, 空心及晚食前以温酒调下。

【功用】祛风止泪。

【主治】眼昏暗。

35556 决明子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子一升 蔓荆子一升 (用好酒五升煮酒尽, 晒干)

【用法】上为细散。每服二钱, 食后及临卧以温水调下。

【功用】补肝明目。

35557 决明子散

【方源】《普济方》卷八十引《圣惠》。

【组成】决明子 川升麻 地骨皮 柴胡 (去苗) 各一两 葳蕤 玄参 犀角屑 甘草 (炙微赤, 锉) 各半两

【用法】上为粗散。每服四钱, 水一钟, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】肝膈热毒, 眼生钉翳。

35558 决明子散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】决明子 车前子 梔子仁 防风 (去叉) 黄连 (去须) 各一两半

【用法】上为散。每服一字至半钱匕, 捣生猪肝投热汤取汁调下, 早晨日晚各一服。

【主治】小儿眼赤, 或生翳膜, 或眼常合不开。

35559 决明子散

【方源】《济生》卷五。

【组成】黄芩 甘菊花 (去枝梗) 木贼 决明子 石膏 赤芍药 川芎 川羌活 (去芦) 石决明各一两 甘草 蔓荆子各一两

【用法】上为细末。每服三钱, 水一中盏, 生姜五片, 煎至六分, 食后服。

【主治】风热毒气上攻, 眼目肿痛, 或卒生翳膜, 或毗出胬肉, 或痒成涩, 羞明多泪, 或

始则昏花，渐成内障，及一切暴风客热。

35560 决明子散

《普济方》卷八十四。即《圣济总录》卷一一〇“决明散”。见该条。

35561 决明子散

《济阳纲目》卷一〇一。为《得效》卷十六“决明散”之异名。见该条。

35562 决明子粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】炒决明子 10~15 克 粳米 60 克 冰糖少许 或加白菊花 10 克

【用法】先把决明子放入锅内炒，至微有香气取出，待冷后煎汁，或与白菊花同煎取汁，去滓，放入粳米煮粥。

【功用】清肝，明目，通便。

【主治】目赤肿痛，怕光多泪，头痛头晕，高血压病，高血脂症，肝炎，习惯性大便秘结。

35563 决明子点方

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】决明子（为末） 蕤仁（研）各六分 象胆（研） 秦皮（为末） 黄柏（去粗皮，为末）各四分 盐绿（研）三分 鲤鱼胆（去皮）四枚 马珂（研） 乌贼骨（去甲，研） 贝齿（烧，研）各四分

【用法】上药各为细末，先以水三大升煎后五味至一升，滤去滓，重煎至半升许，即下前五味，再以微火煎，只取三合，用密器盛。每用一大豆许，以人乳和，少少点眼中，良久闭目，日二夜一，卧即止，以温浆水洗之。

【主治】目赤翳膜疼痛，热泪不止。

35564 决明车前散

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明（刮洗） 茺蔚子 防风（去叉）各二两 甘菊花 车前子 人参各一两

【用法】上为散，再同和匀。针拨后服，每服二钱匕，食后、临卧以粥饮调下。

【主治】内障白翳，病久毒气不散，中心变黄色。

35565 决明甘草汤

【方源】方出《本事》卷六，名见《本事方释义》卷六。

【组成】草决明（生用）一升（捣碎） 生甘草一两（锉碎）

【用法】水三升，煮取一升，温分二服。

【主治】发背。

【方论选录】①《本事》：大抵血滞则生疮，肝为宿血之脏，而决明和肝气不损元气也。②《本事方释义》：草决明气味咸，苦平，入足厥阴。生甘草气味甘平，生用则凉，入手足太阴。背疮之发，由乎热毒壅滞，致气血不能流行。今治以和肝凉血之品，则正气不致受伤，而壅遏之毒亦自稍衰其势耳。

35566 决明鸡肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】决明子（晒燥，为极细末，勿见火） 骗鸡肝（生者，不落水）

【用法】将鸡肝捣烂，和决明末。小儿一钱，大者二钱，研匀，同酒酿一杯，饭上蒸服。

【主治】小儿疳积害眼，及一切童稚翳障。

【加减】目昏无翳，腹胀如鼓，加茺蔚末一钱，同鸡肝酒酿顿服；翳障腹胀，用鸡内金、茺蔚、决明末同鸡肝酒酿顿服；风热翳障，加白蒺藜一钱。

35567 决明夜光散

《明医杂著》。为《原机启微》卷下“决明夜灵散”之异名。见该条。

35568 决明夜灵散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】决明夜光散（《明医杂著》）。

【组成】石决明（另研） 夜明砂（另研）各二钱 猪肝一两（生用，不食猪者以白羯羊肝代）

【用法】二药末和匀，以竹刀切肝作两片，以药铺子一片肝上，以一片合之，用麻皮缠定，勿令药得泄出。淘米泔水一大碗，贮砂罐内，不犯铁器，入肝药于中，煮至小半碗，临卧连肝药汁服之。

【主治】①《原机启微》：雀盲，目至夜则昏，虽有灯月，亦不能视。②《张氏医通》：高风内障，至夜则昏。

【方论选录】上方以决明镇肾经益精为君，夜明砂升阳主夜明为臣，米泔水主脾胃为佐，肝与肝合，引入肝经为使。

35569 决明洗眼方

【方源】方出《千金》卷六，名见《千金翼》卷十一。

【组成】蕤仁 秦皮 黄连各十八铢 萤火虫七枚 决明子一合

【用法】上咬咀，以水八合，微火煎取三合，冷以绵注洗目，每日三次。

【主治】眼漠漠无所见。

【方论选录】《千金方衍义》：方中蕤仁、川连、决明、萤火虫四味，皆出前治五脏客热上冲眼内外受风冷目痛不明方中，但参入秦皮一味以治目中青翳白膜，专取苦降达肝之意。

35570 决明消翳散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】荆芥 蝉衣 桑叶 蕤仁 木贼草 石决明 谷精草 白菊花 青箱子

【主治】目生翳。

35571 决明益阴丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】羌活 独活各五钱 黄连（酒制）一两 防风五钱 黄芩一两 归尾（酒制）五味子各五钱 石决明（煅）三钱 草决明一两 甘草（炙）五钱 黄柏 知母各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，茶汤送下。

【主治】眼目畏日恶火，沙涩难开，眵泪俱多，久病不痊。

【方论选录】上方以羌活、独活升清阳为君；黄连去热毒，当归尾行血，五味收敛为臣；石决明明目磨障，草决明益肾疗盲，防风散滞祛风，黄芩去目中赤肿为佐；甘草协和诸药，黄柏助肾水，知母泻相火为使。此盖益水抑火之药也，内急外弛之病并皆服之。

35572 决壅顺流汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】大黄三钱 木通三钱 瓜蒌实一个 厚朴一钱 青皮一钱 枳实一钱 瞿麦二钱 车前子二钱

【用法】水煎服。

【主治】水结胸，心下至少腹硬痛满，不可近，或潮热，或无大热，但头微汗出，脉沉。

35573 决壅破饮丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】半夏（汤泡七次） 桔梗（炒） 枳实（去瓢，麸炒） 天南星（汤泡七次） 青皮（去瓢） 麦蘖（炒）各等分

【用法】上为细末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大，焙干。每服三四十丸，食后温米饮送下，或生姜紫苏汤送下。

【功用】赶逐痰饮，快气利膈。

【主治】脾胃冷，膈隘生痰，饮食迟化，涎沫壅塞，咽喉不利，酒后尤盛。

冰

35574 冰王散

《杂病源流犀烛》卷二十四。为《尤氏喉科秘书》“冰黄散”之异名。见该条。

35575 冰片散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】冰片一钱 硼砂五钱 雄黄二钱 蜜炙柏（细末）二钱 砂三张（煅灰） 鹿角霜一两 枯矾一钱 甘草末一钱 靛花二钱 黄连末二钱 玄明粉二钱 鸡内金（烧存性）一钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】弄舌喉风。

【加减】口中气臭，加人中白（煅）三钱、铜青（煅）不宜过五分。

35576 冰片散

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】牛脑二分 孩儿茶一钱二分

【用法】上为细末。掺于患处。

【主治】伤手疮。

35577 冰片散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】冰片一钱 硼砂五钱 明雄黄二钱 黄柏(蜜炙)三钱 靛花二钱 甘草(炙)三钱 鸡内金(烧存性)一钱 人中白(煨)五钱 川黄连二钱 元明粉二钱 铜青(煨)五分 蒲黄(炒)三钱 (一方加牛黄、熊胆、珍珠各一钱,儿茶八分,麝香三分)

【用法】上为极细末。吹患处。

【主治】缠喉风,走马喉风,缠舌喉风,双单乳蛾,喉疔,木舌、重舌、莲花舌,悬痈,兜腮痈,喉疮,牙疳。

35578 冰片散

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】石膏二两 冰片三分

【用法】上为细末。

【主治】口齿咽喉痛。

35579 冰片散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】冰片1.5克 煨明矾6克 黄柏6克 小麦面(烧灰)10克

【用法】上为细末。吹入小儿口腔。

【主治】口炎。

35580 冰六散

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】六一散一钱 橄榄核(煨炭)五钱 冰片一分

【用法】上药研匀。麻油调涂。

【主治】下疳。

35581 冰心散

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】冰片三分 黄柏五分 白矾七分 灯草一钱(烧存性)

【用法】上为末。吹。

【主治】少阴水亏,不能上济君火,致阴火沸腾,咽喉生疮,声音不出。

35582 冰玉散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生石膏一两 月石七钱 冰片三

分 僵蚕一钱

【用法】上为极细末,小瓷瓶盛贮。敷之,吹之。

【主治】牙疳,牙痛,口疮,齿衄,喉痹。

35583 冰石散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煨石膏31克 冰片1克

【用法】上为细末。外敷。

【主治】疮疡糜烂。

35584 冰石散

《中医皮肤病学简编》。即原书“甘石散”加煨石膏、冰片。见该条。

35585 冰白散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人中白倍用之 冰片少许 铜绿(用醋制者) 杏仁各等分

【用法】上为细末。敷患处。

【主治】口舌糜烂,及走马牙疳等证。

35586 冰白散

【方源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】梅花冰片五分 人中白五钱 粉儿茶五钱 粉甘草一钱 玄明粉五分 鸡内金(要不落水者,瓦上焙干)五钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】疫喉腐烂甚。

35587 冰白散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】人中白 冰片 铜绿 杏仁 黄柏 枯矾各等分

【主治】口糜及走马疳。

35588 冰瓜散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】八月半后西瓜青皮(不见日色,阴干为末)

【用法】每用一钱,加冰片少许,吹入喉中。

【主治】喉症。

35589 冰台散

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】冰片三分 何树皮五钱

【用法】上为细末。湿者干掺,干者油调刷。

【主治】汤火伤。

35590 冰灰散

【方源】《何氏济生论》卷二。

【异名】冰炭散（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】山梔仁 香白芷等分

【用法】上为细末。吹少许于鼻中。

【主治】鼻衄不止。

35591 冰肌散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】柴胡 前胡 黄芩 山梔 连翘 泽泻 黄连 黄柏 犀角 地骨皮 丹皮

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，第三四日一齐拥出，色枯干红紫者。

【宜忌】《简明医彙》：热极者用，热轻者戒之。

【备考】《简明医彙》本方用法：为粗末，每服三钱，水煎服。

35592 冰池散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黑豆（去皮，生，捣为末）一两 马牙消（研）一两 脑子（研）一钱 青黛（研）一两

【用法】上为细末。每用半钱，凉蜜水调如面糊，摊于圆绢帛上，贴两太阳穴，凉水时时频润。

【主治】眼目赤。

35593 冰豆膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】巴豆一粒（去净油） 冰片三厘

【用法】用饭粘以手捏烂为丸。雄黄少许为衣。将丸捏扁贴眉心处，用清凉膏如钱大盖之，夏贴三个时辰，春、秋冬贴一日，去之。

【主治】乳痈。

35594 冰苋散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】冰片 苋菜根（煨灰） 薄荷 黄柏各一钱 月石 儿茶各一钱五分 人中白 山豆根 胡黄连各二钱 枯矾 青黛 龙骨 乌梅肉各五分

【用法】上药各为末，和匀。吹用。

【主治】喉痹。

【加减】杨梅喉痹，加轻粉一钱，柿霜一钱，白砒五厘（枣肉去核煨熟用）。

35595 冰芦散

【方源】《医级》卷八。

【组成】鹅管芦甘石（敲碎，浸童便七日，取起洗净，入倾银罐，煅，浸，煅三五次） 冰片

【用法】每甘石粉一两，入冰片一钱，为极细末，以无声为度，入人乳粉三钱，研匀收贮，勿令泄气。日用茶清调些少点眼角内，少瞑即爽。

【主治】目赤肿痛，及一切星障。

35596 冰芦膏

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】炉甘石（火煅）二两（为末） 冰片二分

【用法】上药以猪棕油捣成膏。先以茶汁加盐少许洗净疮口，敷药，以膏盖之。

【主治】疔疮，及诸疮久远不收口者。

35597 冰膏散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【异名】碧丹。

【组成】川连 儿茶 青黛 灯心灰各三分 西黄二分 冰片三分 人中白（煨）五分

【用法】吹患处。

【主治】口糜疳腐，及烂头喉蛾、喉痹、喉疳、喉癰。

【加减】证重者，加珍珠；如痧痘后牙龈出血，或成走马疳毒，加糠青（当作铜青）、五倍子、白芷末。

35598 冰膏散

【方源】《外科集腋》卷三。

【组成】儿茶（煨）三钱 甘草一分 青黛 灯草灰 滴乳石 珍珠 牛黄 朱砂 黄柏（用荆芥、甘草煎浓汁浸，炙，不可过焦） 人中白（煨）各二分 冰片三分 川连四分

【用法】上为末。吹之。

【功用】去腐肉。

【主治】口疳口糜及烂喉蛾。

【加减】痧痘后口疳，加白芷、铜青、五倍。

35599 冰炉散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】制炉甘石九钱 龙衣（炙，研）三钱 冰片三分

【用法】上为末。外用干掺，或麻油调搽；目疾蜜调点。

【主治】一切下疳及目疾。

【加减】如治目疾，去龙衣。

35600 冰柏丸

【方源】《医方大成》卷八引《澹寮方》。

【组成】硼砂（研） 黄柏（晒干） 薄荷叶各等分

【用法】上为末，生蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，津液噙化。

【主治】①《医方大成》引《澹寮方》：口疮。②《灵验良方汇编》：舌疮。

【加减】疮甚者，加脑子（研）。

35601 冰砂丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】硼砂一分 冰片一分

【用法】上为末。以人乳调之，轻轻点在红线中间。

【主治】鼻中生红线一条，少动之则痛如死。

35602 冰炭散

《嵩崖尊生》卷六。为《何氏济生论》卷二“冰炭散”之异名。见该条。

35603 冰香散

【方源】《医部全录》卷二〇八。

【组成】炉甘石（火煨）二钱（黄连膏淬之，待干，乳末听用） 乳香（另研） 没药（另研）各一钱 冰片二分 麝香一分

【用法】上为细末。田螺捣烂取汁，调涂患处；偶无田螺，煎黄连汁亦可。

【主治】脏毒初起微肿。

35604 冰香散

【方源】《古今名方》引易玉泉家传方。

【组成】苦瓜霜 硼砂各20克 朱砂（水下） 冰片 胆矾 雄黄精 人中黄各5克 麝香 制僵蚕各3克

【用法】上为极细末。以喉枪或三用吹粉器吹布患处。

【功用】泄热消肿，祛腐止痛。

【主治】风热乳蛾（急性扁桃体炎）。

35605 冰壶丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】牛黄（别研） 真珠（别研） 人参 白茯苓（去黑皮） 安息香（酒化） 黄连 龙胆 麦门冬（去心，焙） 远志（去心）各半两 丹砂（别研） 琥珀（镑） 犀角（镑）各一两 龙脑（别研） 龙齿 铁粉（别研） 甜消（别研）各一分 金箔（别研） 银箔（别研）各十五片

【用法】上为细末，炼蜜同安息香膏为丸，如鸡头子大。每服一丸，煎人参、茯苓汤化下。

【功用】化风痰，解积热。

【主治】心实生热，惊悸。

35606 冰壶汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】高良姜（生锉）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，大枣一枚（去核），煎至五分，去滓用水沉冷，顿服。

【主治】霍乱呕吐不止。

35607 冰壶散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】不灰木（烧） 玄精石（生研） 金星石 银星石 马牙消（生）各半两 甘草（炙，锉）一两 消石一分

【用法】上各为散，先将甘草铺在铫内，次入诸药，炒良久，移放地上，以铫冷为度，重研过。每服一钱匕，新汲水调下，或生姜汁水调下。

【功用】解暑毒。

【主治】中喝烦躁。

35608 冰壶散

【方源】《普济方》卷二〇一引《十便良方》。

【组成】良姜（火炙令焦香）三两

【用法】打破，以酒一升，煮三四沸顿服。一方加粳米煮良姜粥食之。一方用水煎服。

【主治】霍乱吐利不止；亦治腹痛气恶。

35609 冰消散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】皮消一两（炒） 冰片一钱

【用法】上为细末。麻油调涂。

【主治】男妇烂腿。

35610 冰梅丸

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】大南星二十五个（鲜者，切片） 大半夏五十个（切片，鲜者最佳） 皂角四两（去弦净数） 白矾四两 盐四两 桔梗二两 防风四两 朴消四两

【用法】拣七分熟大梅子一百个，先将消、盐水浸一周时，然后将各药碾碎入水拌匀，方将梅子置于水中，其水过梅子三指为度，浸七日取出晒干，又入水中，浸透晒干，俟药水干为度，方将梅子入瓷器密封之，如霜衣起愈妙。要用时，薄棉裹之，噙在口内，令津液徐徐咽下，痰出即愈。

【主治】①《摄生众妙方》：十八种喉痹。②《全国中药成药处方集》：风热上攻，咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风喉痹，喉痹乳蛾，咽喉百病。

【方论选录】《串雅内编选注》：多种喉痹，症见痰涎壅盛，咽喉气急不通，应先开关窍，使痰涎吐出，喉松气通之后，可以继进相应方药。方中南星、半夏辛烈开窍，散风除痰，皆可鲜用，取其峻而行速，以开关通塞；皂角、白矾二药配伍名稀涎散，功能涌吐风痰；防风祛风止痉，桔梗开音利咽，并有载药上行之力。消和盐水浸梅子以增强生津液，润喉咙，消肿痛的作用。用时棉裹口含徐徐咽

津，使药力集中发挥于咽喉，以收消肿止痛、化痰开音的功效。

【备考】《喉科紫珍集》无大半夏，有山豆根四两。

35611 冰梅丸

【方源】《本草纲目》卷二十九。

【组成】青梅二十枚（盐十二两醃五日，取梅汁） 明矾三两 桔梗 白芷 防风各二两 猪牙皂角三十条

【用法】上为细末，拌汁，和梅入瓶收之。每用一枚，噙咽津液。

【主治】喉痹乳蛾；及中风痰厥，牙关不开，用此擦之。

35612 冰梅丸

【方源】《观聚方》卷七引《医经会解方》。

【组成】冰片三分（别研） 薄荷叶四两 孩儿茶二两 乌梅肉四两 硼砂二钱 诃子十个（取肉） 白沙糖半斤

【用法】上为末，用白沙糖化开为丸，如芡实大，外用葛粉为衣，不用亦可。噙化。

【主治】痰结咽喉，咯之不出，咽之不下。

35613 冰梅丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】干葛五钱 苏叶一钱五分 白豆蔻一钱 甘草一钱 薄荷二钱 藿香一钱五分 桔梗一钱 人参二钱 乌梅肉（炙干）一钱 白硼砂一钱 麦冬三钱 花粉三钱 广橘红一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼核大，不拘时候噙化。

【主治】停痰积热，使肺胃之气不和而烦渴，恶心干呕，及酒毒郁于三脘而作呕啰，既久而脾胃不醒，饮食不思，及霍乱吐泻之症。

35614 冰梅丸

【方源】《外科传薪集》。

【组成】大青时梅二十个 大梅片一钱 川雅连一钱 西瓜霜二钱 硼砂一钱半 水飞青黛一钱 细薄荷一钱半 苦甘草一钱 荆芥穗二钱 象贝（去心）四钱 制僵蚕四

钱 淡黄芩(盐水炒)一钱半 上雄精三钱 制半夏三钱

【用法】上药各为细末，将大青梅去核，纳以明矾，放瓦上煨至矾枯，去矾，将梅肉捣烂，和上药末为丸，如龙眼核大，以瓷瓶收贮。临证用一丸，放舌上化下。

【主治】咽喉风痰紧闭，不能言语，红肿疼痛。

35615 冰梅散

【方源】《外科集腋》卷三。

【组成】青盐 朴消 小猪牙皂(去弦) 白矾 甘草各四两 桔梗二两 青梅一百个 鲜南星(切) 鲜半夏各三十五枚

【用法】先用青盐、朴消浸梅三日，去核，将余药研入，晒干。噙化。

【主治】咽喉肿痛。

35616 冰黄散

《局方》卷二(吴直阁增诸家名方)。为《三因》卷五“却暑散”之异名。见该条。

35617 冰黄散

【方源】《小儿病源》卷一。

【组成】土消一两 大黄(细末)一钱

【用法】二味相合，新汲水调搅匀，用鸡羽蘸药时时涂扫，勿令干。可用一小篦刀子疏去流头赤晕恶血毒汁，次以冰黄散涂之。

【主治】赤流丹毒。

35618 冰黄散

【方源】《走马疳急方》。

【组成】炉甘石 冰片 轻粉 乳香 孩儿茶 血竭 没药各等分

【用法】上为极细末。以香油调敷。

【主治】下疳。

【宜忌】忌诸般发毒、动风、辛热之物。

35619 冰黄散

《奇效良方》卷五十四。为《普济方》卷二七八“水黄散”之异名。见该条。

35620 冰黄散

【方源】《尤氏喉科秘书》。

【异名】冰王散(《杂病源流犀烛》卷二十四)。

【组成】冰片三分 人中白一钱 蒲黄二钱 黄柏二钱 甘草五分 青黛五分 川连二分 薄荷二钱 月石五分 朴消五分 枯矾少许

【用法】上为末。吹之。

【主治】口疳，小儿丹毒。

35621 冰黄散

【方源】《医学心悟》卷四。

【异名】止痛散(《疡医大全》卷十六)。

【组成】牙消三钱 硼砂三钱 明雄黄二钱 冰片一分五厘 麝香五厘

【用法】上为末。每用少许擦牙。

【主治】牙痛。

35622 冰黄膏

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】黄连二两 冰片三分 麝香二分 轻粉五分 硫黄末一钱

【用法】水二碗，文武火煎黄连至一碗，滤去渣，再重汤慢火煎至一酒杯；将后四味俱研末，调和。用鹅毛润阴内。

【主治】妇入阴蚀疮。

35623 冰硫散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】硫黄一两 樟冰 川椒 生矾各二钱

【用法】上为末，先用白萝卜一个，抠空其内，将药填满，复将原皮盖之，湿纸包三四层，灰火内煨半时许，待冷取开，用药同熟猪油调稠，搽患上。

【主治】风湿凝聚而生钮扣风，久则搔痒如癣。

35624 冰螺散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】冰螺散(《嵩崖尊生》卷六)、冰螺捻(《金鉴》卷六十六)。

【组成】大田螺五枚(去壳，日中线穿晒干) 白砒一钱二分(面裹煨熟) 冰片一分 硃砂二分

【用法】用晒干螺肉切片，同煨熟；白砒为

细末，加硃砂、冰片再碾，小罐密收。凡用时先用艾炷灸核上七壮，次后灸疮起泡，以小针挑破，将前药一二厘津唾调成饼，贴灸顶上；用绵纸以厚糊封贴核上，勿动泄气，七日后四边裂缝，再七日其核自落，换搽玉红膏，内服补药兼助完口。

【主治】①《外科正宗》：瘰癧日久，坚核不消，及服消药不效，瘰癧患大带小及诸般高突，异形难状者。②《医钞类编》：乳岩。

【宜忌】马刀根大面小及失荣等症忌用。

35625 冰蛤散

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】龙骨一两 蛤粉一两 梅片五分

【用法】将龙骨、蛤粉先研为细面，然后再入梅片研均。干敷或用香油调敷于患处。

【功用】燥湿解毒。

【主治】湿热流窜，皮肤糜烂。及鼻生粟米疮，儿童鼻疮，黄水疮，秃疮，脚气。

【宜忌】忌食辛辣、酒等物。

35626 冰硼散

【方源】《咽喉脉证通论》。

【组成】冰片一钱 硼砂一钱 山豆根二钱

【用法】吹患处。

【主治】喉症。

35627 冰硼散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】冰片五分 朱砂六分 玄明粉 硼砂各五钱

【用法】上为极细末。吹搽患上，甚者日搽五六次。

【功用】《中国药典》：清热解毒，消肿止痛。

【主治】咽喉疼痛，牙龈肿痛，口舌生疮，舌肿木硬，重舌，小儿鹅口白斑。

①《外科正宗》：咽喉口齿新久肿痛，及久嗽痰火咽哑作痛。②《外科大成》：舌胀痰包，重舌木舌。③《金鉴》：口疮，白点满口。④《药奁启秘》：小儿鹅口白斑，肿连咽喉，及一切喉痛，乳蛾。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食辛辣、荤、面等物。

35628 冰硼散

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】二十五号震象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）、竹一（《痧症全书》卷下）。

【组成】硼砂 天竺黄各二钱 朱砂二分 玄明粉八厘

【用法】上为末。吹入喉中。

【主治】痧证咽喉肿痛。

35629 冰硼散

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】冰片五分 硼砂五分

【用法】上为细末，瓷瓶密贮。每用少许，搽擦患处；或用衣针点破擦之。

【主治】舌上生核，强硬作痛；及咽喉肿痛。

35630 冰硼散

《玉钥》卷上。为原书同卷“回生丹”之异名。见该条。

35631 冰硼散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【异名】金丹。

【组成】硼砂二钱 风化霜二钱 僵蚕（炙）三钱 薄荷叶一钱 生矾一钱 冰片五分 滴乳石三钱 人中白（煨）三钱

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。吹患处。

【主治】喉间肿痛，或蛾疳。

35632 冰硼散

【方源】《囊秘喉书》。

【组成】冰片一分五厘 硼砂三钱五分 制僵蚕三分 牙消二钱五分 蒲黄七分 制胆矾五分

【用法】上为细末。吹之。

【主治】急喉风，双单乳蛾，喉痛，牙关紧闭。

35633 冰硼散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】月石三钱 梅片一分 西黄一分 僵蚕一钱 青黛三分

【用法】上为末。吹之。

【主治】一切喉症，及口内诸症。

35634 冰硼散

《外科方外奇方》卷三。为《梅氏验方新编》卷一“咽喉冰硼散”之异名。见该条。

35635 冰硼散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】冰片三分 硼砂一钱 胆矾五分 灯心灰一钱五分

【用法】上为细末。每用少许吹入喉中。

【功用】吐痰涎，出毒气。

【主治】白喉。

35636 冰硼散

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】生硼砂 玄明粉各一两 冰片一钱五分

【用法】上为细末，和匀，一钱重瓶装。将散少许，擦在痛处；咽喉肿吹于患处，待口涎徐徐流出，一日数次。

【功用】消炎止痛。

【主治】牙齿肿痛，牙缝出血，口舌生疮，咽喉肿痛。

【宜忌】忌烟、酒、辛辣食物。

35637 冰硼散

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】薄荷三钱 黄芩五钱 川连五钱 甘草五钱四分 元明粉五分 青黛三钱 洋儿茶三钱 西豆根二根 黄柏五钱 硼砂五钱 上梅片一钱

【用法】上为细末。将药粉少许吹敷患处，每日三至四次。

【主治】咽喉肿痛，口舌生疮。

【宜忌】忌食辛辣食物。白喉忌用。

35638 冰硼散

【方源】《全国中药成药处方集》(昆明方)。

【组成】硼砂三两 冰片五钱 僵蚕五钱

【用法】上为末，每包五分，分三次搽用。敷搽患处，或泡水漱口。

【主治】口腔破溃。

35639 冰硼散

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】冰片七钱五分 硼砂七钱五分 生石膏二两 元明粉二两

【用法】上为极细末。每次三五分，吹患处。

【主治】咽喉肿痛，口舌生疮等症。

【宜忌】忌辛辣之物。

35640 冰硼散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】生石膏一两 硼砂七钱 白僵蚕一钱 梅片三分

【用法】上为极细末。每用少许，吹擦皆效，先用冷茶漱口，漱净擦药，每日用五、六次。

【功用】消毒化腐。

【主治】口疮舌肿，咽喉糜烂，牙痛齿衄，舌干唇裂。

35641 冰熊散

【方源】《玉案》卷二。

【组成】辰砂一两 冰片二钱 熊胆二钱

【用法】上为细末。鸡子白调搽，每日洗三次搽三次。

【主治】脚底心烂。

35642 冰霜散

【方源】《活法机要》。

【组成】寒水石(生) 牡蛎(烧) 朴消 青黛各一两 轻粉一钱

【用法】上为细末。新水或油调涂。

【主治】①《活法机要》：火烧皮烂大痛。②《普济方》：漆热毒伤皮烂，肉大痛。

35643 冰螺捻

《金鉴》卷六十六。为《外科正宗》卷二“冰蛭散”之异名。见该条。

35644 冰螺散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】田螺一个(去壳晒干) 白矾二分(用面裹煨熟) 冰片二厘 硼砂四厘

【用法】上为末。将痣挑损点之，糊纸盖之，三日自脱。

【主治】面上黑痣。

35645 冰螺散

《嵩崖尊生》卷六。为《外科正宗》卷二“冰蛭散”之异名。见该条。

35646 冰麝散

【方源】《中医喉科学讲义》。

【组成】黄柏 黄连 玄明粉各一钱 鹿角霜五钱 甘草 明矾各五分 炒硼砂二钱五分 冰片四分 麝香一分。

【用法】上为细末。每次少许，吹入患处。

【功用】《古今名方》：清热凉血，消肿止痛。

【主治】①《中医喉科学讲义》：风热喉痹，红肿痛甚者。②《古今名方》：鹅口疮，咽喉、牙龈、口腔粘膜溃疡肿痛等症。

35647 冰雪饮子

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】糯米不计多少

【用法】立冬日净淘，水浸，置北墙阴下，至立春日取以为粉。每服二钱，新汲水调下。

【功用】解暴暑。

35648 冰膏似雪

【方源】《普济方》卷七十四引《德生堂方》。

【组成】黄连 黄柏 黄药子 苦参 朴消各二两

【用法】上为末。用茶芽水调，贴太阳穴上，干则再润之，每日二三次。

【主治】恶眼暴发，眼赤肿，内生翳膜。

35649 冰片鸡蛋油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】蛋黄油。

【组成】鸡蛋黄油 冰片

【用法】取鸡蛋十个(或更多)煮熟去蛋白，用蛋黄干炸炼油，每鸡蛋油一两加入冰片五分至一钱，密闭储存备用。外搽皮损疮面，或滴入瘰管内。

【功用】消肿止痛，固皮生肌。

【主治】慢性溃疡，烫伤疮面，各部位之瘰管。

【宜忌】化脓性疮面及有腐败组织之疮面勿用。

35650 冰片破毒散

【方源】《会约》卷七。

【组成】朴消四钱 僵蚕(微炒，去嘴)八

钱 甘草八钱 青黛六钱 马屁勃三钱 蒲黄五钱 麝香一钱 冰片二钱

【用法】上为细末，瓷坛密收。每服一钱，清水调咽。

【主治】急慢喉痹，肿塞切痛。

35651 冰瓜雄朱散

《疫喉浅论》卷下。即《时疫白喉捷要》“瓜霜散”。见该条。

35652 冰梅上清丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】冰片一钱 白药煎八两 玄明粉 西砂仁 薄荷 生草粉 白桔梗各一两 诃子肉 月石 柿霜各二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每重五分，阴干。每服一丸，临卧时噙化。

【主治】心肝蕴热，口舌生疮，咽喉肿痛，声音不清。

35653 冰硼利喉散

【方源】《瘟疫条辨摘要》。

【组成】人中白五钱(煨) 王瓜消五钱 枯白矾三钱 青黛六钱(炒) 元明粉三钱 薄荷叶四钱 白僵蚕五钱 川黄连五钱 硼砂三钱 大冰片二钱

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮，不可泄气。临用以三五厘吹之，一日三五次。

【主治】咽喉肿痛。

35654 冰糖乌梅汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】冰糖一钱 乌梅肉一分

【用法】用水一茶钟，浓煎半钟服。

【功用】甘酸养胃。

【主治】幼小及壮年初次患疟者，为胎疟，先用葱豉荷米煎以和之，继以平胃散截之，再以本方以善其后。

35655 冰霜梅苏丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】乌梅肉四十八两 苏叶十六两 葛根八两 薄荷五十六两

【用法】上为细末，过罗和匀，用白糖一千二百八十两，热开水打丸，每三十粒重一两。

口内噙化。

【功用】清暑解热，生津止渴。

【主治】感受暑热，口渴咽干，胸中满闷，胃口不开，头目眩晕。

35656 冰霜梅苏丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】乌梅肉五两 新柿霜四两 桂圆二两 薄荷叶六两 紫苏叶一两 白糖十斤

【用法】上为极细末，以冰糖滓为母，用白开水泛为小丸，五分重。口内噙化，随意服用。

【功用】生津止渴，清热消暑。

【主治】三焦积热，口燥咽干，津液短少，饮酒过度，头昏目眩。

35657 冰霜梅苏丸

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】花粉 葛根 苏叶各一两 柿霜薄荷 山楂各二两 乌梅肉五两

【用法】上为细末，冰糖滓起母子，滚此药面，如黄豆大，再包白糖打如钮扣。

【主治】暑湿。

35658 冰麝还睛丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】人参一两 五味子半两 防风二两 知母二两 细辛半两 黄芩一两 桔梗一两 车前子二两 黑参一两 生地黄二两 茺蔚子二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心以茶清送下。

【主治】肝热肺风合邪，上攻入目，面致冰翳内障，瞳色坚实，白亮如冰之状。无论阴处及日中视之，皆一般无二。其睛内有白色隐隐透出于外。

35659 冰麝上清丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】儿茶四两 正梅片五分 麝香五厘(此三味研细末) 山豆根五钱 桔梗二钱 诃子二钱 黄连五钱 薄荷三钱 玄参

三钱 粉甘草三钱 风化消五钱

【用法】后八味煮去滓，熬成膏，和前三味药末为丸，如芡实大。每用一丸或二丸，含化。

【主治】口舌热毒，目赤肿痛，火牙疼痛，心胃烦热。

【宜忌】体虚非实火者忌服。

35660 冰麝无价散

【方源】《中药成方配本》。

【组成】公猪粪(漂净十天，晒露，以无臭气为度，炙灰研末)一两 冰片 麝香各五厘

【用法】每服三钱，绢包煎服。

【主治】痘症透发不足，或冒风隐缩。

35661 冰麝痧药丸

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】冰片六两 麝香三两二钱 蟾酥七两五钱(另用酒化开研细) 公丁香八两 飞朱砂四两(留一半为衣) 明雄黄 煅西月石各二两

【用法】上药各为极细末，用高粱酒泛为小丸，每分约计二十粒，朱砂为衣。每服七粒至十四粒，凉开水吞服。

【主治】受寒受暑，痧胀肚痛吐泻，卒倒昏迷。

【宜忌】孕妇忌服。

35662 冰硼散金钥匙方

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】火消一钱五分 白月石五分 冰片三厘

【用法】上为细末。吹之。

【主治】咽喉诸症，双单乳蛾。

汗

35663 汗斑粉

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】密陀僧五钱 雄黄 硫黄 蛇床子各一两 轻粉二钱

【用法】上为极细末，玻璃瓶收贮。醋调搽

或用黄瓜蒂蘸搽。

【功用】清血，化斑痣。

【主治】①《全国中药成药处方集》：汗斑面痣，紫白癜风，面部粉刺。②《中药制剂手册》：黑白斑痕，雀斑。

【宜忌】按摩时勿入目内。

【备考】本方方名，《中药制剂手册》引作“汗斑散”。

35664 汗斑散

【方源】《仙拈集》卷四引《顾体集》。

【组成】密陀僧五钱 硫黄一两

【用法】上为末。醋调姜擦。

【主治】汗斑。

35665 汗斑散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】扫盆五分 蛇床子二钱 密陀僧一钱 雄黄二钱

【用法】上为末。外搽。

【主治】汗斑。

35666 汗斑散

《中药制剂手册》。即《全国中药成药处方集》(沈阳方)“汗斑粉”。见该条。

35667 汗斑肥皂

【方源】《疡医大全》卷二十九。

【组成】硫黄 雄黄 白砒 明矾 密陀僧各一两 肥皂(去筋弦膜净)六两

【用法】为大丸。擦汗斑上，停一顿饭时，洗去，将手巾另用清水搓过。

【主治】汗斑。

【宜忌】切不可擦脸，恐有气息攻目。

【备考】《中医皮肤病学简编》本方白砒用3克。

35668 汗斑搽剂

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】密陀僧30克 硫黄30克 白附子15克

【用法】上为细末，用醋调如糊。每日用黄瓜蒂(无时可改用纱布，中填棉花扎成帚)蘸药磨擦一遍，一日一次。

【功用】灭菌除癣。

【主治】花斑癣(汗斑)。

江

35669 江鲮丸

【方源】《保命集》卷中。。

【异名】左龙丸(《金鉴》卷三十九)。

【组成】江鲮半两(銕，炒) 野鸽粪半两(炒) 雄黄一钱 白僵蚕半两 蜈蚣一对 天麻一两

【用法】上为细末，又将药末作二份用，一份烧饼为丸，如梧桐子大，朱砂为衣；后一份入巴豆霜一钱同和，亦以烧饼为丸，如梧桐子大，不用朱砂为衣。每服朱砂为衣者二十丸，入巴豆霜者一丸，第二服二丸，加至利为度，再服朱砂为衣药，病愈止。

【主治】破伤风，病在里，惊面发搐，脏腑秘涩。

【备考】本方改为散剂，名“江鲮散”(见《中国医学大辞典》)。

35670 江鲮散

《中国医学大辞典》。即《保命集》卷中“江鲮丸”改为散剂。见该条。

35671 江蛔围药

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】大黄 半夏 黄药各等分 江蛔二十四个 白梅四个(去核捣烂)

【用法】以江蛔、白梅入前药杵和成剂，为丸如指头大，用好陈醋磨化，围敷患处四边。

【主治】诸疮肿毒初生。

35672 江南度世丸

【方源】《千金》卷十七。

【组成】蜀椒三两 人参 细辛 甘草各二两 茯苓 真珠 大黄 干姜 丹砂 野葛 桂心 雄黄 鬼白 麝香各一两 乌头 牛黄各二分 附子 紫菀各六分 巴豆六十枚 蜈蚣二枚

【用法】上为末，炼蜜为丸。饮服小豆大二丸，加至四丸，每日一次。加獾肝一具尤良。

【主治】癥结积聚，伏尸，长病寒热，瘰气

流行皮中，久病著床，肌肉消尽，四肢烦热，呕逆不食，伤寒时气，恶疮汗出，口噤不开，心痛。

35673 江侯秘传药酒

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】五加皮八两 川牛膝（去芦） 杜仲（酒炒）各三两 当归 生地黄各三两 地骨皮二两

【用法】上锉散。好酒一坛，入药，重汤煮二炷香，土埋三日，出火毒，随量饮之。

【主治】脚气，脚膝肿痛，手足痛。

35674 江南三十六症丸

【方源】《外台》卷十三引《崔氏方》。

【组成】雄黄（研）二分 麦门冬（去心）三分 皂荚（去皮子，炙） 莽草（炙）各二分 鬼白三分 巴豆（去心皮，熬）二分（一方不用麦门冬，用天门冬）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二丸，每日一次。

【主治】转症灭门绝族，族尽转逐，中外灭尽，复易亲友。

【宜忌】忌鲤鱼、野猪肉、芦笋。

汤

35675 汤粥

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子（卸成事件）

【用法】上件熬成汤滤净，次下粟米二升作粥，熟，下米、葱、盐，或下圆米、渴米、折米皆可。

【功用】补脾胃，益肾气。

35676 汤泡饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】栗壳（蜜水炒）三钱 乌梅一个（去核） 甘草三分 蜜三匙

【用法】上锉。用滚水一钟，泡浸一时，去滓，分三次服之。

【主治】①《回春》：久痢不愈，无分赤白。②《良朋汇集》：大人小儿红白痢疾，里急后

重，疼痛难忍，日夜无度已久者。

【宜忌】《良朋汇集》：初起者不可服。

35677 汤泡散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】金莲子散（《普济方》卷八十六引《医方集成》）。

【组成】赤芍药 当归（洗，焙） 黄连（去须）各等分

【用法】上为细末。每用二钱，极滚汤泡，乘热熏洗，冷即再温洗，每日洗三五次，以愈为度。

【主治】肝经不足，受客热风壅上攻，眼目赤涩，睛疼睑烂，怕日羞明，夜卧多泪，时行暴赤，两太阳穴疼，头旋昏眩，视物不明，渐生翳膜。

【宜忌】忌腌藏、毒物。

35678 汤泡散

《普济方》卷七十一。为《得效》卷十六“洗方汤泡散”之异名。见该条。

35679 汤泡散

【方源】《异授眼科》。

【组成】当归 赤芍 黄连 蝉蜕

【用法】上为末。滚水泡，每服二钱，乘热熏眼，温服。

【主治】肝经不足，肺气太过，目中障如偃月而疼痛。

35680 汤脚散

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】地椒 蒺藜子 莽草 荆芥穗各等分

【用法】上为末。煎汤淋浸。

【主治】脚气。

35681 汤火止痛散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】大黄末（微炒） 当归末各等分

【用法】上用麻油调搽或干掺亦可。

【功用】止痛生肌。

【主治】汤火伤。

35682 汤火至圣膏

《景岳全书》卷六十四。为《外科精要》卷下“至圣膏”之异名。见该条。

35683 汤火神验方

【方源】《广笔记》卷三。

【异名】毛粉散（《洞天奥旨》卷十二）。

【组成】猪毛（煨存性，研细末）

【用法】加轻粉、白硼砂少许，麻油调和敷之。无斑痕。

【主治】汤火烫伤。

汝

35684 汝言化痰丸

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】瓜蒌 杏仁 海粉 桔梗 连翘 五倍子 香附 蛤粉 瓦楞子 风化消

【用法】以姜汁少许，和竹沥捣入药，加蜜为丸，噙化；或作小丸，清茶送下。

【功用】《医略六书》：泻热软坚。

【主治】肺家老痰在于喉中，咯之不出，咽之不下。

【方论选录】《医略六书》：瓜蒌泻热润燥以涤痰，桔梗清咽利膈以开结，瓦楞子消痰积、血积，风化硝化积热、结痰，五倍软坚豁痰，海粉泻热豁痰，连翘清热结，香附调血气，杏仁降气豁痰涎，蛤粉益阴利湿热，姜汁散痰，竹沥润液。和蜜捣丸，清茶化下，使湿化热降，则肺清润而老痰软，咯咽如常，安有咽喉窒塞之患？此泻热软坚之剂，为痰热固结之专方。

壮

35685 壮元丸

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《修月鲁般经》。

【组成】巴豆五十个（取霜） 神曲半斤（末） 半夏一两（洗） 雄黄 白曲（炒）十钱

【用法】上为末，水为丸，如小豆大，细米糠炒，变赤色。食后温水送下，童子二丸，三

四岁一丸，岁半半丸。止嗽，温醋汁送下；止呕吐，生姜汤送下。

【主治】膈气，酒膈酒积，涎嗽腹疼，吐逆痞满。

35686 壮元丸

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】山茱萸肉 杜仲（盐水炒）各四两 破故纸（盐水炒） 龟版（酒炙）各三两 鹿茸（酒炙） 菟丝子（酒浸透，研，炒） 远志（去芦，甘草煮） 头二蚕沙（炒） 人参各二两 茯苓一两半 大附子（童便煮，面煨）七钱

【用法】俱制净药，以干山药粉四两，打糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心以淡盐汤或酒送下，下午再服。

【主治】下元阳气大虚，及脾有寒湿，足膝痿弱，大便不实，湿动生痰，面色黄白，恶风懒语，一切倦弱及阳痿不起，饮食不思，虚弱等症。

【宜忌】上方服后须痛断房事，以培其根。勿恃此药壮阳，而助其春兴，自取其急也，叮之，戒之。

【临证举例】痿证 昔在吴下，治行人公孙质庵老先生，患痿不出户者三年，用此收功。

【备考】此方得遂州仙茅或汉中仙茅为君，妙不可言。

35687 壮元丸

《东医宝鉴·内景篇》卷一。为《回春》卷四“状元丸”之异名。见该条。

35688 壮元丹

【方源】《普济方》卷二二四。

【组成】牛膝（酒浸三日） 苁蓉（酒浸一日） 熟地黄 川芎 覆盆子各二两 石斛一两半（去根） 菟丝子一两（酒浸三日） 当归 续断 巴戟 白茯苓 山茱萸肉 枸杞子 肉桂 五味子 防风 杜仲（炒）各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前以盐汤酒送下。

【功用】耐寒暑，进饮食，黑髭发，润肌肤，壮筋骨。

【主治】肝肾虚，精血不足，眼昏黑花，迎风有泪，头晕耳鸣；或肾风下痉，腰脚沉重，筋骨痠疼，步履无力，阴汗盗汗，湿痒生疮。

35689 壮元汤

《风劳腋膈》。为《赤水玄珠》卷五“壮原汤”之异名。见该条。

35690 壮元酒

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】天雄（生，去皮脐） 白菰各三两 茵芋（去粗茎）一两 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗） 羊躑躅各半升 乌头（生，去皮脐） 附子（生，去皮脐） 干姜各二两

【用法】上锉细，以酒三斗渍之，春、夏五日，秋、冬七日，去滓。初服半合，稍加至三合，晒滓为散。每服方寸匕，一日三次。以知为度。夏日恐酒酸，以油单覆，下悬井中。

【功用】益精气，通血脉，除风湿，明耳目，悦颜色。

【主治】虚劳，疾在腰膝者。

35691 壮气丸

【方源】《百一》卷四。

【组成】茴香（炒） 巴戟 破故纸（炒） 葫芦巴 玄胡索 仙茅 附子（炮） 金铃子 桂各三两 木香一两半

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服五十丸，以温酒送下；盐汤亦得。

【功用】补虚。

35692 壮气丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】白术 干姜 半夏 当归 桂心 豆仁 丁香各五分 甘草二钱五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六七丸，以酩汤送下。

【主治】产后恶心。

35693 壮气汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参三钱 麦冬一两 甘草三分 百合一两 贝母三分

【用法】水煎服。

【主治】虚损。多言伤气，咳嗽吐痰，久则气怯，肺中生热，短气嗜卧，不进饮食，骨脊拘急，疼痛发痠，梦遗精滑，潮热出汗，脚膝无力。

35694 壮火丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参五两 巴戟天八两 白术（炒） 熟地各一斤 山茱萸八两 肉苁蓉 枸杞各八两 附子一个（用甘草三钱煎汁泡过，切片，炒熟） 肉桂三两 破故纸（炒） 茯苓各四两 北五味一两 炒枣仁三两 柏子仁二两 山药 芡实各五两 龙骨（醋淬，为末）一两

【用法】上各为末，炼蜜为丸。服二月，坚而且久。

【主治】命门火微，无风而寒，未秋而冷，遇严冬冰雪，虽披重裘，其身不温，一遇交感，数合之后，即望门而流。

35695 壮水汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】熟地九钱 山茱萸七钱 车前子五钱 甘草六钱 茯苓九钱 白芍五钱 肉桂三分

【用法】水煎服。

【功用】补肾水。

【主治】阳症火泻。乃肾中之水衰，不能制火，使胃土关门，不守于上下，所以直进直出，完谷不化，饮食下喉即出，一日或泻十余次，或泻数十次，或昼夜泻数百次。

35696 壮水汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地二两 生地一两 荆芥（炒黑）二钱 三七根末三钱

【用法】水煎，调服。

【主治】血犯浊道，久吐血，百计止之而不效者。

【方论选录】熟地与生地同用，补精之中，即寓止血之妙，荆芥引血而归于经络，三七

根即随之而断其路径,使其入而不再出也。火得水而消,气得水而降,此中自有至理也。

35697 壮本丹

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】杜仲(酒炒)一两 肉苁蓉(酒洗)五钱 巴戟(酒浸去骨)五钱 破故纸(盐水炒)一两 茴香一两 青盐五钱

【用法】上为末,将猪腰子分开,入药在内,缝在纸包煨熟。每次服一个,用黄酒送下。

【功用】壮筋骨,补元气,利大小便,养丹田。

【主治】肾虚腰痛,久则寒冷。

35698 壮阳丸

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】肉苁蓉 仙茅 蛇床子 山药 五味子 补骨脂 茯神 紫梢花 杜仲 韭菜子 雄鸡肝 鳖肝 海狗肾(如无,以黄狗肾代之)

【用法】上为末,先将鸡肝、鳖肝用盐、酒、椒蒸熟,捣烂,和前药晒干;再将前末药磨细,用酒拌山药末醋调糊为丸。每服一百丸,空心淡盐汤送下。

【主治】阳萎,气馁不振,及老年无子。

【加减】如阳萎精冷,加肉桂、附子、石燕各一两。

35699 壮阳丹

《伤寒标本》卷下。为原书同卷“无价宝”之异名。见该条。

35700 壮阳丹

【方源】《广嗣纪要》卷四。

【组成】熟地黄四两 巴戟(去心) 破故纸(炒)各二两 仙灵脾一两 桑螵蛸(真者,盐焙) 阳起石(煅,别研,水飞)各半两

【用法】上六味,合阴之数,研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【主治】男子阴萎无子。

【宜忌】不可恃此自恣也。

35701 壮阳丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】仙茅 蛇床子 五味子 白茯苓 苁蓉 山药 杜仲各一两 韭子 故纸 巴戟 熟地 山茱萸 菟丝子各二两 海狗肾一枚 紫梢花一两

【用法】用雄鸡肝二副,捣成一块,阴干,为末;用雄鸡肝肾、雄鳖肝肾各一副,以盐、酒、花椒末蒸熟捣烂,和入前药,再用酒煮山药糊为丸,如梧桐子大。每服百丸,空心以盐汤送下。

【功用】壮阳补肾。

【加减】阳痿精冷者,加桂、附、石燕。

35702 壮阳丹

【方源】《赤水玄珠》卷十。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿) 五味子 蛇床子 远志 莲蕊 菟丝子(酒浸一宿,蒸半日,捣烂晒,另研为末) 益智仁各一两 山药二两 沉香五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心以温酒送下。宜二三日用一服;或与固精丸间服。

【功用】强壮阳道,固暖精血。

35703 壮阳丹

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】肉苁蓉一两(酒浸一宿) 五味子一两 蛇床子一两 菟丝子(酒浸煮烂,晒干) 杜仲(姜汁炒去丝) 牛膝(去芦,酒洗净) 黄柏(蜜炙)各四两 知母(蜜炒)三两 胡桃肉(汤洗去皮)八两(一方无知母)

【用法】上为细末,春、夏用粥,秋、冬用炼蜜,其粥用糯米一碗煮之,将胡桃肉捣烂为膏,和匀,石臼内杵千余下,为丸如梧桐子大。每服五十丸至八十丸,空心以盐汤或酒送下,以干物压之。宜二三日一服或与固精丸间用。

【功用】强壮阳道,固暖精血。

35704 壮阳汤

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】蛇床子 地骨皮各等分

【用法】煎汤熏洗，并用手擦，但洗时必令其举。一日熏洗数次。若手重擦破，不必惊骇，过一二日即可复旧。

【主治】鸡精。男子玉茎包皮柔嫩，少一挨即痒不可当，每次交合，阳精已泄，阴精未流。

35705 壮阳膏

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】甘遂一钱 甘草二钱五分 大附子三钱（烧酒泡透，晒干） 阿芙蓉（乳汁泡开） 母丁香 蟾酥各三钱 麝香三分

【用法】上为末，用多年姜葱汁二碗煎成膏，将药入膏内搅匀，装瓷罐内。用时摊贴脐上。

【主治】阳萎。

35706 壮体丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】熟地 元参 麦冬（其量均须稍大） 北五味三钱 山茱萸四钱 牛膝七钱

【用法】水六碗，煎二碗，早晨一碗，晚服一碗。

【功用】大滋肺肾之水。

【主治】阳明火烧尽肾水而致之痿证。

35707 壮肾散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】仙灵脾（酒浸）五两 远志（去心）四两 巴戟（去心）六两 杜仲（酒炒）五两 破故纸（酒炒）五两 肉苁蓉（酒浸）六两 青盐八两 大茴香五两 小茴香（炒）五两

【用法】上为末。每服二钱，用猪腰切开，掺药末在内，纸裹火煨熟，细嚼，以酒送下。

【主治】肾经虚损，腰腿遍身疼痛。

35708 壮肾散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】当归 故纸 杜仲 牛膝 小茴

【用法】上为末。每服三钱，以酒调下。

【主治】五种腰痛。

35709 壮金丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】人参 黄耆 茯苓 山药 百合 二冬 紫菀 五味

【主治】肺虚。

35710 壮骨丹

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】赤曲 芸香各二两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，用酒送下。

【主治】闪肭，筋脉无力，不能卒事者。

35711 壮骨散

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】杜仲二两（去粗皮，锉碎，生姜自然汁浸一宿，慢火炒） 苡苳一两（微炒）

【用法】上为末。每服二钱，温酒调服；闪挫气痛，以陈皮汤送下；心气脾痛，以煨姜汤送下；妇人血气，以艾醋汤送下；小肠气，以茴香汤送下。

【主治】一切诸气闪肭，腰脚不能转侧。

35712 壮原汤

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【异名】壮元汤（《风劳腋膈》）。

【组成】人参 白术各二钱 茯苓 破故纸各一钱 桂心 大附子 干姜 砂仁各五分 陈皮七分

【用法】水煎，食远服。

【主治】下焦虚寒，中满肿胀，小水不利，上气喘急，阴囊两腿皆肿，或面有浮气。

【加减】有痰，加半夏一钱；喉中痰声，加桑白皮一钱，咳嗽亦加；脚跌面肿，加薏苡仁二钱；中气不转运，不知饿，加厚朴、木香；气郁不舒，加沉香、乌药，临服磨入；气虚甚者，人参加作五钱，大附子加作一钱半；汗多者，再加桂枝五分、白芍药（酒炒）过八分；若夏月喘乏无力，或汗多者，加麦门冬一钱、五味子十一粒；夜梦不安者，加远志一钱；两胁气硬，加白芥子八分；若面浮

肿，胁下气硬，加白芥子、紫苏子五分；若身重不能转动，加苍术一钱、泽泻七分；湿盛，加桑白皮、赤小豆。

35713 壮脑散

【方源】《眼科锦囊》。

【组成】胡椒 丁子各五分 肉豆蔻一钱 干姜五分 胡荽子 小茴香各五钱

【用法】上为末。白汤送下。

【主治】头痛眩晕，眼常带赤色，视物濛濛，时吐黄水者。

35714 壮脾丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】丁香 附子（重六钱以上者，炮，去皮脐） 诃子肉 草茛 白术 白茯苓（去皮） 肉豆蔻（面裹煨）各一两 人参（去芦头） 干姜（炮） 草澄茄 乌药 陈橘皮（去白，焙） 沉香 厚朴（去粗皮，细切，以生姜一两研烂，淹半日，炒干用） 神曲（炒）各七钱 熟艾六钱（研，糯米稀糊拌匀，炒干，乘热入碾末之） 缩砂仁半两 甘草六钱（炙）

【用法】上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米饮吞下。

【主治】脾胃久弱，中焦停饮，腹内虚鸣，或多泄利，心腹胀满，饮食不入，精神怠惰，睡卧不安。

35715 壮脾丸

【方源】《医方类聚》卷十引《济生》。

【组成】猪猪肚一枚（洗净，用造酒大曲四两，同锉厚朴二两、茴香一两，入在肚内，以线缝定，外用葱椒酒煮烂，取大曲、茴香、厚朴焙干和后药） 肉豆蔻（面裹煨） 禹余粮（煨，研极细） 缩砂仁 麦蘖（炒） 神曲（铤，炒） 橘红 附子（炮，去皮脐） 白术各一两 木香（不见火） 丁香各半两

【用法】上为细末，用猪肚杵和千百下，为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以米饮送下，不拘时候。

【主治】脾胃虚寒，饮食不进，心腹胀满，

四肢无力，吐逆食不消，或手足浮肿，脏腑溏泻。

35716 壮脾丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】砂仁 陈皮 神曲（炒） 茯苓 苍术 白术 山楂 麦芽（炒） 香附 青皮 三棱 莪术（煨） 厚朴各一两 白豆仁六钱 人参一钱

【用法】上为末，仓米为丸，如梧桐子大。每服七十丸，以米汤送下。

【主治】脾胃寒湿凝滞。

35717 壮脾汤

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】附子一两（炮，去皮脐） 白术半两（炒） 人参二钱半 干姜半两 缩砂仁二钱 肉豆蔻（面裹煨）二钱 丁香二钱 厚朴（生姜汁制一宿，炒）半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，加生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】脾胃虚弱，脏腑泄泻，胸膈停寒，不喜饮食。

35718 壮土固金丸

【方源】《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。

【组成】党参 砂仁 白芍各二两 茯苓 桔梗 广皮各四两 炙黄耆三两 莲肉 五味子 薏米 玄参各二两 山药（炒）八两 川贝 紫菀各一两半 兜铃 百合各二两 寸冬三两 清夏二两 当归 款冬各四两 炙草三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，瓷坛存贮。每服二钱，开水送下，一日二三次。

【功用】滋补脾肺。

【主治】脾肺虚劳，胸膈满闷，宿食不消，四肢虚软，胃痛泄泻，咳嗽气促，动则喘急，痰涎壅盛，嗜热畏寒，自汗盗汗。

【宜忌】忌食辛辣。

35719 壮气四物汤

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】四物汤加木香 青皮 陈皮 枳壳 甘草

【主治】妊娠临期腹胁胀满，心胸刺痛。

35720 壮气收肠方

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】黄耆 白芷 防风 厚朴 当归 各二两 川芎一两 蔓荆子一两 桔梗一两 木香一两 人参三钱 肉桂五钱

【用法】上为细末。每服三钱，空心以大枣汤调下，每日三次。力壮其肠自收矣。

【主治】翻花内痔，痔头落，肠不收。

【宜忌】外痔不用。

35721 壮气收肠汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄耆 人参 当归 川芎 广木香 金银花 川连各一钱 升麻七分

【用法】加黑枣二枚，水煎服。

【主治】翻花痔，肠落不收。

35722 壮气益母汤

《胎产辑萃》卷三。为《圣济总录》卷一五九“壮气益血汤”之异名。见该条。

35723 壮气益血汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】壮气益母汤（《胎产辑萃》卷三）。

【组成】生干地黄（焙） 人参（切） 当归（切，焙）各一两 代赭（别研）半两 木香一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，加生姜三片，大枣一枚（擘破），同煎七分，去滓，不拘时候温服。以胞下为度。

【主治】产后胎衣不下，或被风寒所侵，血气凝涩，或气力疲乏，不能运动，胞衣停息。

35724 壮火益土汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】淡附子一钱五分 淡干姜八分 倭硫黄一钱（制） 制茅术二钱 带皮苓五钱 炒苡仁八钱 煨肉果一钱五分 小茴香

一钱 菟丝子三钱

【功用】壮火扶脾。

【主治】久泻脾肾阳衰，土虚不能胜湿，湿阻则肿，面色黯黄，脉细而弱。

35725 壮火温脾汤

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】白术三钱（土炒） 炙甘草一钱 山药二钱 陈皮八分 芡实二钱 制附子八分 茯苓一钱

【用法】水煎服。

【主治】肾火衰微，中土虚寒，脾元不运而胀。

【方论选录】《证因方论集要》：少阴火衰，则太阴脾土未有不虚者，以苓、术、山药、芡实温补脾阳，附子以温肾阳，陈皮、炙草和中调气。

35726 壮水明目丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】熟地黄一两二钱 泽泻八钱 山茱萸（酒蒸取肉）一两三钱 茯苓（去皮）一两 川芎二钱 牡丹皮八钱 当归（酒洗）一两 山药一两二钱 生地黄五钱 蔓荆子一两 甘菊花五钱 黄连五钱 柴胡三钱 五味子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，用好酒调服。

【功用】壮水之主，以制阳光。

【主治】肾水枯竭，神光不足，眼目皆暗。

35727 壮水制阳汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】白麻骨二钱 沙参 麦冬各一钱 当归八分 牛膝五分 元参五分 山梔五分 丹皮五分 绿豆皮五分 莲心七枚 枯芩三分 条芩三分 黄柏五分 泽泻三分 白芍六分 仙茅八分 秦艽五分

【用法】若痰盛，清水三杯，竹沥三杯浸；若火盛，水三杯，童便三杯浸；若胃弱不能食，莲子煎水冷浸；若头晕，水三杯，乳三杯浸。

【功用】养阴退热。

【主治】阴虚。

【加减】有痰，去当归。

35728 壮阳固齿散

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】旱莲草一两 花椒三钱(炒) 石膏二两(煨) 青盐二两(煨) 小茴香一两 白芷五钱 升麻五钱

【用法】上为末。早、晚擦牙，少顷漱之，或咽下。

【功用】乌须。

35729 壮阳种子丸

《回生集》卷上。为《医学正印》卷上“壮阳种子丹”之异名。见该条。

35730 壮阳种子丹

【方源】《医学正印》卷上。

【异名】壮阳种子丸(《回生集》卷上)。

【组成】熟地 枸杞子各一两半 牛膝(俱酒洗) 远志肉(甘草汤煮) 怀山药(炒) 山茱萸肉 巴戟(去骨，酒蒸) 白茯苓 五味子 石菖蒲 楮实子 肉苁蓉(酒洗，去鳞甲，去心中白膜) 杜仲(盐酒炒) 茴香(盐水炒)

【用法】上为末，炼蜜和枣肉为丸，空心温酒、淡盐汤任下。

【主治】尺脉微弱，阳萎不举，虚寒无火者。

【加减】冬，加肉桂五钱(童便拌晒三次)。

35731 壮阳种子方

《墨宝斋集验方》卷上。为《寿亲养老》卷四“参归腰子”之异名。见该条。

35732 壮骨去湿丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】薏仁一两 芡实半两 茯苓三钱 肉桂一钱 牛膝二钱 草薢一钱

【用法】水煎服。

【主治】湿气入于骨中，两腿酸痛。

【方论选录】此方妙在薏仁能入骨而去水，加芡实健脾以去湿，不使湿以增湿；而牛膝、草薢又是最利双足之品；又加肉桂，引经直入于骨中，湿有不去，酸疼有不止者乎？但

脚中之病，乃人身之下游，一有病，不易去之。况湿气在骨，如陆地低洼之处，久已成潭，如何能即干，必多用人功，而后可以告竭。故此方必须多服久服，正是此意。

35733 壮胆星朱丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】朱砂一两(水飞) 胆星二两 石菖蒲二两 牛黄五钱 麝香五分 猪心七具(用血)

【用法】上为细末，竹沥猪心血为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心以白汤送下。

【主治】痫症。

35734 壮胆镇惊丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】橘红(水润，去白) 枳实(水浸，去瓢) 当归(酒洗)各五钱 熟地黄(水洗，姜汁浸蒸) 天门冬(泔水润，去心) 白茯苓(去皮木) 远志(甘草水煮软，去木)各一两 甘草(生用)五钱 白石英(火煨，醋淬七次)三钱(如无真者，银箔代之)

【用法】上为末，粳米糊为丸。每服五十丸，饥时以沸汤送下，每日二次。

【主治】诸虚，精神恍惚，心思昏愤，气不足，健忘怔忡。

35735 壮真五和丸

【方源】《易氏医案》。

【组成】香附(醋炒)二两 乌药一两 汉防己五钱 归身二两 白芍(酒炒)二两 熟地(煮烂)四两 续断四两 甘草五钱 秦艽一两 藿香一两 白茯苓一两 山药二两 砂仁五钱

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】气郁崩漏，昼夜十数次，用止血药血愈甚，羸瘦食少，面青爪黑，气促痰喘，服四神散后，诸病减半，指甲变桃红色，并下紫黑血块者。

35736 壮筋补骨丹

【方源】《实用正骨学》。

【组成】当归二两 川芎一两 白芍一两 炒熟地四两 无名异一两 杜仲一两 川续断一两五钱 五加皮一两五钱 骨碎补三两 桂枝一两 田三七一两 龙骨一两 刘寄奴二两 土元三两 自然铜一两 黄耆三两 虎骨一两 破故纸二两 菟丝饼二两 党参二两 木瓜一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸重二钱。成人每日早、晚各服一丸，小儿酌量，以黄酒为引。

【功用】能使伤骨新生，并能使陈旧性骨折愈合。

35737 壮筋养血汤

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】白芍 当归 川芎 川断 红花 生地 牛膝 丹皮 杜仲

【用法】河水煎服。

【功用】舒筋活血。

【主治】伤筋络。

35738 壮筋续骨丹

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】羌活 独活 防风 当归 红花 香附 枳壳 青皮 花粉 土鳖虫 白术各一两 荆芥四两 桂枝 木瓜 甘草各五钱 续断 五加皮各二两 杜仲 川芎 神曲 麦芽各五钱 柴胡三钱 黄芩二钱

【用法】上为末，砂糖热酒调服，大人五钱，小儿三钱。

【功用】壮筋续骨。

35739 壮筋续骨丹

【方源】《接骨入骱》。

【组成】川芎 羌活 独活 防风 玄胡 当归 红花 香附 陈皮 丹皮 生地 牛膝 乌药 青皮 枳壳 麦芽 白术 桂枝 桃仁 神曲 杜仲（盐水炒）各一两 柴胡四两 木瓜（盐水炒）一两 黄芩 荆芥各四两 加皮二两 续断二两 苏木一两 甘草（盐水炒）一两 木通（盐水炒）一两

【用法】上为末。每服五钱，小儿三钱，糖

酒调服，此方亦可浸酒。

【主治】损伤肋骨。

【宜忌】久病不用木通。

35740 壮筋续骨丹

【方源】《伤科大成》。

【组成】当归二两 川芎一两 白芍一两 炒熟地四两 杜仲一两 川断一两五钱 五加皮一两五钱 骨碎补三两 桂枝一两 三七一两 黄耆三两 虎骨一两 破故纸二两 菟丝饼二两 党参二两 木瓜一两 刘寄奴二两 地鳖虫三两

【用法】晒脆，为末，砂糖泡水泛丸。每服四钱，以温花酒送下。

【主治】腿骨折两段，大小腿皮破骨折，或膝骱处油盖骨脱出。

35741 壮腰健肾汤

【方源】《中医伤科学》。

【组成】熟地 杜仲 山芋 枸杞子 补骨脂 红花 羌活 独活 肉苁蓉 菟丝子 当归

【用法】水煎服。

【功用】调肝肾，壮筋骨。

【主治】骨折及软组织损伤。

35742 壮精固本丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】枸杞子二两 地黄四两 砂仁五钱（酒蒸九次） 锁阳 人参各二两 白茯苓一两半 菟丝子二两 沙苑蒺藜二两 归身一两 鹿角胶一两半 天门冬 麦门冬各一两 山药二两 五味子一两半 山茱萸二两 泽泻一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以白汤送下。

【功用】《医部全录》：填精起萎。

【主治】阳萎。

35743 壮阳暖下药饼

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】附子一两（炮，去皮脐） 神曲三两 干姜三两（炮） 大枣三十枚（去皮

核) 桂心 五味子 菟丝子(酒浸一宿,晒干,为末) 肉苁蓉各一两(酒浸一宿,刮去粗皮,炙干) 蜀椒半两(去目及合口者,微炒黄色) 羊髓三两 酥二两 蜜四两 黄牛乳一升半 白面一升(一方入醇醋)

【用法】上为细末,入面,用酥、髓、蜜、乳相和,入大枣,熟,搜于盆中盖覆,勿令通风,半日顷即取出,再搜令熟,擗作胡饼,面上以箸琢,入炉镬中,上下以火焙熟。每日空腹食一枚。

【主治】五劳七伤,遗精数溺。

35744 壮阳无价至宝丹

《遵生八笺》卷十七(巴蜀本)。即原书(弦雪居本)卷十七“回阳无价至宝丹”。见该条。

35745 壮阳固本地黄丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】熟地黄二斤(酒煮,去滓,熬浓膏十二两) 山茱萸(去核)六两(酒拌蒸,晒干,炒) 山药六两(炒黄) 白茯苓四两(人乳拌透,晒干,焙) 泽泻三两(淡盐酒拌炒) 鹿茸(去毛骨,酥酒炙黄)三两 补骨脂四两(盐酒浸一宿,炒香) 五味子二两(蜜酒拌蒸,炒) 枸杞八两(另熬膏四两) 紫河车一具(用银针挑破血筋,用长流水洗净,可酒浸、酒煨,捣烂) 鹿角胶四两(用酒溶化) 肉桂(临磨刮去粗皮)一两五钱(不见火) 制附子一两五钱(切片,焙)

【用法】上为末,用熟地、河车、枸杞、鹿角四膏八药杵好为丸。每早服四五钱,空心以参汤送下;临晚食前服三四钱,以温酒送下。

【主治】元阳衰惫已极。

35746 壮神益志保孕汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十一。

【组成】茯神 当归 酸枣仁 人参 远志 山药 黄耆 鹿角胶各一钱 白术二钱 砂仁三分 甘草四分 龙眼肉五枚 大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】畸形胎。

【临证举例】畸胎 昔在西吴,有张氏妇年二十三,孕适三月,迎予诊之,其脉两尺皆涩,左手短弱,右关不充。据脉涩不当有妊,而其夫云:向已受胎者二,俱弥月而产,体皆不完,始无舌,次无水火门尺,产下随死而无生气。今第三孕矣,心忧之。以翁治法多奇思,幸投剂而保全之也。予以脉参之,多为神志不足。因处一方,曰壮神益志保孕汤。即语之曰:是方每月可服十帖,过八月则不必服矣。彼欣然从而服之,足月产一女,形全而气壮。及再有妊,未服药,虽生一女,完矣而头面为白膜遮蔽,隐隐仅见耳目口鼻,而亦随死也。后又孕,适予归省,其妇心忧失措,夫谕之曰:无恐,前保孕方在,向以未服,乃致乖舛,今可急服也。照方服如前,至期生一子而无恙。举方以此方为神,录面置之香火堂中尸祝之。此亦愚见之偶中者,人以旋服旋效而遂神之也。

35747 壮胃清湿热调滞气汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】鸡腿白术一钱二分 茯苓(连皮)一钱五分 陈皮(去白)五分 香附子(童便浸)七分 山楂一钱 木香二分 紫苏梗五分 黄连(酒浸,炒)六分 当归(酒洗)一钱 木通四分

【用法】上咬咀。用水二钟,加生姜三片,煎至七分,食远温服。

【功用】壮胃,清湿热,调滞气。

【主治】脾胃病。

守

35748 守中丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】五芝地仙金髓丸。

【组成】白茯苓(去黑皮)十两 麦门冬(去心,焙)三两 白术 人参 甘菊花(择去梗) 山芋 枸杞子各二两 生地黄二十

斤(绞取汁)

【用法】前七味为末,先用生地黄汁于银器内入酥三两、白蜜三两同煎,逐旋掠取汁上金花令尽,得五升许,于银石器内拌炒前七味药,渐渐令尽,候干入白蜜同捣为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心或食后以清酒送下。

【主治】风头眩,脑转目系急,忽然倒仆。

35749 守中丸

【方源】《解围元数》卷三引张守中方。

【组成】防风 荆芥 苦参 连翘各二两 当归 胡麻 牙皂 蔓荆子 蒺藜 牛蒡子各三两 白芷 甘草 朱砂各五钱 羌活 独活各一两五钱 陈皮 黄芩 胡黄连 山梔 升麻 天麻各一两 乳香 没药各三钱 牛黄一钱 麝香三分 冰片三分

【用法】上为末,米糊为丸。每服三钱,以盐汤送下。

【主治】大麻风之雁来风、鼓椎风、核桃风、紫云风及水风。

35750 守中汤

《活幼心书》卷下。即《局方》卷三(吴直阁增诸家名方)“守中金丸”改为汤剂。见该条。

35751 守田膏

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】半夏

【用法】上为末。调敷伤处。

【主治】打扑有伤,瘀血流注。

35752 守灵散

【方源】《鸡峰》卷十一引《真君脉诀》。

【组成】茯苓(白者) 丁香 诃子各半两 桔梗 芍药(白者) 羌活 甘草各一分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,用银耳环一只,葱白一寸,煎至八分,通口服,不拘时候。

【功用】补心脏劳极。

35753 守胃散

【方源】《百一》卷十九。

【组成】人参 白术 白茯苓(去黑皮) 山药 白扁豆(炒) 干葛 天南星(炮) 甘

草(微炙) 藿香叶 防风 天麻各等分

【用法】上为细末。每服一钱,水一盞,冬瓜子二十粒,生姜一小片,同煎至四分,温服。

【功用】调理脾胃,进乳食。

【主治】小儿阴阳不和,吐泻不止。

【加减】如大泻不止,危急,每服入沉香、肉豆蔻各少许。

35754 守胃散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】南星 防风 白术 人参 茯苓 山药 木香 沉香 瓜仁 白豆蔻(一方加白扁豆、干姜)

【主治】妇人吐泻。

35755 守宫丸

【方源】方出《圣惠》卷二十一,名见《普济方》卷一三。

【组成】辟宫子七枚(微炙) 天南星一两(炮裂) 膩粉一两 白附子一两(炮裂)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服七丸,以温酒研下,不拘时候。以汗出为效,未汗再服。

【主治】破伤风,身如角弓反张,筋脉拘急,口噤。

35756 守宫丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】守宫(炙干,去足)七枚 天南星一两(酒浸三日,晒干,以上二味捣为末)膩粉半分

【用法】上为末,细薄面糊为丸,如绿豆大。每服七丸,斡口开,以酒灌下。有顷汗出得解,更与一服,再汗即愈。

【主治】破伤风,身如角弓反张。

35757 守宫膏

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【组成】守宫一个(即蝎虎也) 珍珠 麝香 脑子

【用法】上用守宫一个,以铁铃定剪子取去四足爪,连血细研,入珍珠、麝香、脑子各

一字许，研细，薄荷汤作一服。

【主治】久年惊痫，心血不足。

【备考】先须用夺命散逐下痰涎，或用吐法，次服本方。

35758 守神丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】金箔一百片 膩粉半两 人参(为末)三分

【用法】上药于银石器内，先将金箔逐重用膩粉渗隔布尽，入黄牛乳五合，于金箔上淋溉，用物密盖定，煮尽乳，取研如膏，以人参末渐渐入同研为丸，如赤小豆大。每服三丸，空心、日午、临卧以新汲水送下。渐加至五丸。

【主治】中风邪发狂及肝心风热，气虚不足，惊悸掣疔。

35759 守效丸

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】苍术 南星 白芷(散水) 山楂各一两 川芎 枳核(又云枳实炒) 半夏

【用法】上为末，神曲糊为丸服

【功用】《会约》：治湿理气。

【主治】癰疽不痛者。

【加减】秋、冬，加吴茱萸；有热，加山梔一两；坚硬，加朴消半两，又或加青皮、荔枝核。

【备考】《医统》本方用法：姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，以盐汤送下。

35760 守效散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】砒(生) 白丁香 松香 轻粉 川乌 生矾各一钱 蜈蚣一条(焙干)

【用法】上为极细末，钅针刺破疮口，令血出，唾津调药，贴之疮上，其根自溃。

【主治】疔疮恶肉。

35761 守病丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】巴豆二个(去皮) 皂角末二钱 小枣二个(去皮核)

【用法】捣为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服一丸，以酒送下。

【主治】积聚。

35762 守病丸

【方源】《景岳全书》卷五十五。

【组成】朱砂 雄黄 礞砂 轻粉 去皮巴霜各半两 硃砂 乳香各五钱

【用法】炼蜜为丸。每服一粒。

【主治】多年积胀。

35763 守病丸

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】朱砂二钱 礞砂(豆腐煎) 雷丸(去黑皮) 血竭 礞砂 磁石 轻粉各一钱 雄黄三钱五分 白砒二钱五分 巴豆(去油)六钱 木鳖子(去皮)五个

【用法】上为细末，黄蜡七钱五分化开为丸，如黄豆大，朱砂为衣。每服一丸，以温水送下。

【主治】痞疾。

35764 守病丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】磁石(煨)三两 礞砂(炒)二两 生礞砂二两

上为极细末，每细粉七两兑：

麝香三钱 朱砂二两 巴豆霜五两

【用法】上为细末，混合均匀，用黄蜡二十两溶化为丸，重三分，朱砂为衣。每服一丸，以温开水送下。

【功用】解郁和肝，破癥化积。

【主治】积聚坚硬，闷郁痞块，血凝癥瘕，胸满腹胀。

【宜忌】孕妇忌服。

35765 守瘕丸

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】通草二两 杏仁一大合(去皮尖，研) 牛蒡子一合(出油) 吴射干 昆布(去咸) 河黎勒 海藻各四两(去咸)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。含化，咽津下，每日三次。

【主治】瘰癧结硬。

35766 守中金丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】干姜（炮） 甘草（燼） 苍术（米泔浸） 桔梗（去芦）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一九，食前嚼服，以沸汤送下。

【功用】温脾暖胃，消痰逐饮，顺三焦，进美饮食，辟风寒湿冷。

【主治】中焦不和，脾胃积冷，心下虚痞，腹中疼痛，或饮酒过多，胸胁逆满，噎塞不通，咳嗽无时，呕吐冷痰，饮食不下，噎醋吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，不思饮食；及伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞痛，手足不和，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化；及脾胃留湿，体重节痛，面色萎黄，肌肉消瘦。

【备考】本方改为汤剂，名“守中汤”（见《活幼心书》）。

35767 守仙五子丸

《遵生八笺》卷十八。为《普济方》卷二二三引《博济》“五子丸”之异名。见该条。

35768 守阳碧云膏

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】铅粉 铜绿各一两 乳香 没药各一钱 冰片一分

【用法】上为细末，大黄熬膏作锭子，晒干，以井水磨下，新笔涂眼四围。

【主治】倒睫及肿烂弦风。

【宜忌】不得入目。

35769 守病编疾丹

【方源】《医方类聚》卷八十九引《王氏集验方》。

【异名】十三丸（《普济方》卷一六九引《医学切问》）。

【组成】巴豆三两（去皮心） 雄黄三钱 金脚信一钱半 黄蜡三钱 轻粉一钱半 粉霜一钱半

【用法】上用雄黄等四味为细末，次入巴豆和研如面糊，另将黄蜡碗内熬出，将新水秘出三遍，匿药，将油纸裹，看病紧慢，加减为丸，如梧桐子大。每服三丸或二丸，以新水送下。

【主治】一切积气。

宅

35770 宅中汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬二钱 紫河车二钱（切） 人参二钱 茯神二钱 黄耆二钱 当归二钱 白芍一钱 丹参二钱 柏仁二钱 远志五分（甘草水炒） 莲子二十粒（去心）

【功用】调补营卫，安养心神。

【主治】心劳。营血日亏，心烦神倦，口燥咽干。

安

35771 安土汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白芍一两 白术一两 柴胡一钱 茯苓三钱 甘草一钱 苍术二钱 神曲二钱 炮姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝气旺盛，肝本克脾土，土气不能伸，而肠中自鸣，终日不已，噎气吞酸，无有休歇。

【方论选录】此方脾肝同治之法。肝平而脾气得养矣，脾安而肠气得通矣。不必止鸣面鸣自止者，妙在行肝气之郁居多，所以奏功特神耳。

35772 安土散

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术一两 茯苓五钱 车前子三钱 薏仁五钱 赤小豆一钱 通草一钱 柴胡五分 石斛三钱

【用法】水煎服。

【主治】太阴痞症，由感湿热之气，复感风

邪所致，发热腹痛，肌肉颤动，四肢紧急。

35773 安中丸

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】人参 白术各半两 木香 藿香 甘草 枇杷叶 半夏 陈皮 丁香各一分 槟榔一个 肉豆蔻二个

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服十丸，食后米饮送下。

【主治】脾胃不和，乳食减少。

35774 安中丸

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】甘松叶二两 益智 丁香皮 香附各三两 莪术一两 南木香五钱 麝一钱

【用法】上为末，生蜜为细丸。以生姜汤送下。

【主治】伤食作呕。

35775 安中汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】黄芩一两 当归 芍药 人参 干地黄各二两 甘草 芍药各三两 生姜六两 麦门冬一升 五味子五合 大枣三十五枚 大麻仁五合

【用法】上咬咀。以水七升，清酒五升，煮取三升半，分四服，每日白天三次夜间一次，七日复服一剂。

【主治】妇人曾伤五月胎者。

【宜忌】《外台》：忌菘菜、海藻、茺莢。

【方论选录】《千金方衍义》：前调中汤预调曾伤四月之胎，此安中汤预安曾伤五月之胎。夫调之与安，大费斟酌，调则有平治之权，安则无克削之理。彼以脾有蕴积，故宜枳实、厚朴以清之，此以素亏津液，又须生脉四物以濡之；用麻仁者，必妊娠素有脾约之故，然麻仁在此方与麻仁丸中不同，设非脾约，似可勿用。若中有宿滞，虽当五月，调中何妨，倘素禀亏弱，纵在四月，安中竟与勿疑，规矩不出方圆之外也。

35776 安中汤

【方源】《百一》卷二。

【组成】草果仁 陈皮（去白） 川姜（炮） 良姜 益智仁 蓬莪术（炮） 京三棱（炮） 甘草（炙）各一两一分 神曲（炒） 麦蘖（炒）各三分

【用法】上为细末。每服二钱，食后入盐汤点服。

【主治】脾胃一切疾。

35777 安中汤

《奇效良方》卷三十四。为《三因》卷八“安中散”之异名。见该条。

35778 安中汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】白术三钱 当归 党参各二钱 炙甘草 陈皮 砂仁 麦芽各一钱 生姜七片 大枣五枚

【主治】产后泄泻。

35779 安中汤

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】白茯苓三钱 广陈皮一钱（米炒） 猪苓二钱 飞滑石三钱 香豉二钱（炒） 干石斛三钱 川连六分（吴茱萸二分炒） 黑梔皮二钱（姜汁炒） 西瓜翠衣五钱 淡竹叶五钱 枇杷叶五片（去毛）

【用法】地浆水煎服。

【主治】霍乱转关后，手足冷，恶热渴饮，呕泻不止者。

35780 安中散

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】小麦（炒黄）四两 干姜（锉，炒）一两 甘草（炙） 陈曲（炒）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，以大枣煎汤调下。

【功用】除邪热，和胃进食。

【主治】干呕。

35781 安中散

【方源】《三因》卷八。

【异名】安中汤（《奇效良方》卷三十四）。

【组成】熟地黄 巴戟天（去心） 龙骨各二两半 远志（去心，炒） 茯苓各三两 天雄（炮，去皮脐） 五味子 山药各三两半

苁蓉(酒浸) 续断各四两 蛇床子(略炒) 菟丝子(酒浸) 各四两半

【用法】上为细末。每服二钱匕,以温酒调下。

【主治】醉饱心虚而合阴阳,累于心脾肾三经,而致三焦虚寒,短气不续,腹不安食,随即洞下,小便赤浊,精泄不禁,脚胫酸疼,小腹胀满。

35782 安中散

【方源】《局方》卷三(宝庆新增方)。

【组成】玄胡索(去皮) 良姜(炒) 干姜(炮) 茴香(炒) 肉桂各五两 牡蛎(煅)四两 甘草(炒)十两

【用法】上为细末。每服二钱,热酒调下;妇人淡醋汤调服;如不饮酒,用盐汤点下;并不拘时候。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方):散寒止痛。

【主治】远年近日脾疼翻胃,口吐酸水,寒邪之气留滞于内,停积不消,胸膈胀满,攻刺腹胁,恶心呕逆,面黄肌瘦,四肢倦怠;及妇人血气刺痛,小腹连腰攻疰重痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(沈阳方):实热者忌服。

35783 安中散

《普济方》卷二十三引《保生回生论》。为原书同卷“半夏平胃散”之异名。见该条。

35784 安气汤

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】人参五分 五味子九分 麦冬酸枣仁(炒,研) 山药 茯苓 阿魏各一钱

【用法】煎成,冲化阿魏胶。

【主治】弱人肾虚不能纳气,气不归元而喘。

35785 安心丸

【方源】《幼幼新书》卷九引郑愈方。

【组成】附子一两(炮裂,去皮脐) 全蝎半两(炒)

【用法】上为末,面糊为丸,如黄米大,朱

砂为衣。每服二十丸,米饮送下。

【主治】小儿慢惊。

35786 安心汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】远志 甘草各二两 人参 茯神 当归 芍药各三两 麦门冬一升 大枣三十枚

【用法】上咬咀。以水一斗,煮取三升,去滓,分三服,每日三次。

【主治】产后心虚,心冲悸不定,恍恍惚惚,不自知觉,言语错误,虚烦短气,志意不定。

【加减】若苦虚烦短气者,加淡竹叶二升;若胸中少气者,益甘草为三两。

35787 安心汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】麦门冬 山药各八分 芎 茯苓 犀角 桔梗 柴胡 紫菀 黄芩 白术 白芍药 防风 阿胶 当归 茯神 大豆卷各二分 神曲 生地黄各三分 人参 甘草各六分 干姜一分 朱砂二钱

【用法】上除研药外,为细末,与研药和匀。每服半钱,食后、临卧以大枣煎汤调下。

【主治】心虚惊悸。

【备考】本方用法中有“研药”二字,而组成中无一味药研末,朱砂下疑脱“研”字。

35788 安心汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】干荷叶一片 生地黄五钱 丹皮五钱 当归二两 川芎一两 生蒲黄二钱

【用法】水煎调服。

【功用】大补心血。

【主治】妇人血虚而心无以养,产后三日,发热恶露不行,败血攻心,狂言呼叫,甚欲奔走,掣掣不定。

【方论选录】此方用归、芎以补血,何又用生地、丹皮之凉血,似非产后所宜。不知恶血奔心,未免因虚热而相犯,吾于补中凉之,则凉不为害。况益之干荷叶,则七窍相通,能引邪外出,不内害子心,转生蒲黄以分解恶

露也。但此方止可暂用一剂以定狂，不可多用数剂以取胜，不可不慎也。

35789 安心散

《普济方》卷十六。即《千金》卷十三“安心煮散”。见该条。

35790 安平饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】桃仁 红花 山楂 归尾 益母草各二钱

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】产后一二日，肚腹绞痛，瘀血凝滞。

35791 安东散

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】苏罗子（炒） 瓦楞子（醋炙）各四两 陈香椽 陈木瓜各两只（炒） 生蛤壳二斤（生杵）

【用法】上为细末。每服三钱，赤砂糖调服，体弱减半。

【主治】肝胃气。

【宜忌】孕妇忌服。

35792 安乐散

【方源】《大生要旨》卷二。

【组成】人参四分（党参用一钱五分） 麦冬一钱五分 归身一钱五分 甘草三分 通草八分 滑石一钱 细辛三分 灯心五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人子淋，属肾虚热不能司化者。

35793 安宁饮

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】玄参 生地 麦冬各五钱 白薇一钱 骨碎补五钱 天门冬三钱

【用法】水煎服。配合五灵至圣散含漱。

【主治】因过食肥甘，热气在胃，胃火日冲于口齿之间，而湿气乘之，湿热相搏而不散，虫生于牙而致齿牙破损而作痛，如行来行去者。

35794 安幼汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】当归三钱 荆芥一钱 元参三钱 陈皮三钱 熟地三钱 麦冬三钱 生甘草五

分 生地一钱 黄连一分 丹皮一钱 贝母三分

【用法】水煎服。

【功用】助正气。

【主治】小儿已出痘，遍身上下尽是鲜血点，粒粒可数，此至佳之痘。

35795 安老丹

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上“安老汤”之异名。见该条。

35796 安老汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】安老丹（《辨证录》卷十一）。

【组成】人参一两 黄耆一两（生用） 大熟地一两（九蒸） 白术五钱（土炒） 当归五钱（酒洗） 山萸五钱（蒸） 阿胶一钱（蛤粉炒） 黑芥穗一钱 甘草一钱 香附五分（酒炒） 木耳炭一钱

【用法】水煎服。

【功用】大补肝脾气血。

【主治】妇人肝不藏、脾不统而血崩，年五十外或六七十岁忽然行经，或下紫血块，或如红血淋。

35797 安贞汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】党参四钱 炮姜六分 当归二钱 半夏一钱 茯苓三钱 白术一钱 厚朴一钱 砂仁一钱 桑皮二钱 杏仁三钱 苏子一钱 五分 陈香椽皮六分

【主治】脾痹。脾病而兼肺胃病，四肢懈惰，发咳呕汁，上为大塞。

35798 安虫丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】苦楝丸。

【组成】干漆三分（杵碎，炒烟尽） 雄黄巴豆霜一钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。量儿大小与服，取东行石榴根煎汤下；痛者，煎苦楝根汤或茺莢汤下五七丸至三二十丸，发时服。

【主治】上中二焦虚，或胃寒虫动及痛。

35799 安虫丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】莪术(醋煨) 木香 黄连 青皮 槟榔 使君子 白芜荑仁 白雷丸 苦楝根皮(白者可用，赤者有毒)各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如麻子大。以白汤送下。

【主治】小儿体弱而虫痛发作无时，随痛随止，发则面色㿠白，口吐涎沫，腹中痛作疙瘩，脉洪大，目直视似痫。

35800 安虫丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】木香 鸡心槟榔 使君子肉 白芜荑仁 绿色贯众 苦楝根白皮 虾蟆(烧存性) 夜明砂

【用法】上为末，粳米为丸，如黍米大。每服二三十丸，以蜜水送下。

【主治】蛔虫、寸白虫、蛭虫，一切诸虫。

35801 安虫丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】黄柏五两 苦参三两 槟榔一两半 杨梅皮一两 黄连三两 黄芩一两 莪术一两

【用法】上为细末，为丸如梧桐子大。以白汤送下。

【主治】大人小儿虫积腹痛。

35802 安虫饮

【方源】《观聚方要补》卷三引《幼科百效》。

【组成】黄连 乌梅 炮姜 山楂 厚朴 芍药 使君子肉 枳实 陈皮 川楝子

【用法】水煎服。

【主治】蛔虫动，口吐清涎。

35803 安虫散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胡粉(炒黄) 槟榔 川楝子(去皮核) 鹤虱(炒)各二两 白矾(铁器熬)一分 干漆(炒烟尽)二分 雄黄一分 巴豆霜一分

【用法】上为细末。每服一字，大者半钱，以温米饮调下，痛时服。

【主治】小儿虫痛。

【备考】原书周学海按：聚珍本无干漆、雄黄、巴豆霜。

35804 安虫散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】干漆(炒至烟尽)五钱 鹤虱(炒，净) 雷丸(切，炒)各一两

【用法】上为末。每服二钱，小儿一钱，以米汤送下。

【主治】虫攻心痛，吐清水，如蛲虫发则腹胀，寸白虫则心痛。

35805 安虫散

【方源】《田氏保婴集》。

【异名】鹤虱散(《普济方》卷三九九)。

【组成】胡粉(炒黄) 鹤虱(炒黄) 川楝子(去皮核) 槟榔各二钱 白矾(枯)二钱半

【用法】上为细末。每服一字，大者半钱，痛时温米饮调下。

【主治】①《田氏保婴集》：小儿虫痛。②《普济方》：小儿吃物粗，肌肤消瘦，虫生腹内，极痛不可忍，终日啼哭，或因脏腑虚弱而动，或因食甘肥而动，其动则腹中疼痛发作，肿聚往来，上下痛无休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身扑手，心神闷乱，呕啰涎沫，吐清水，四肢羸困，面色青黄，饮食虽进，不生肌肤，或寒或热，沉沉默，不知病之去处，其虫不疗，则子母相生，无有休止，长一尺则能害人，及虫咬心痛，来去不定，不思饮食。

35806 安全散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】人参(去芦)一钱(焙) 白术(炒) 白附子(炮) 南星(姜汁一碗煮干切片，炒) 天麻(炮) 辰砂(别研) 当归(焙，去芦) 乳香(别研) 没药(别研) 吊藤(勾子者，焙) 白僵蚕(直者，

炒去丝) 全蝎(去毒) 白茯苓(去皮, 焙) 羌活(焙) 防风(去芦, 焙) 川芎(焙) 甘草(炙) 各一两 麝香半钱

【用法】上为细末。每服一钱, 水一小盏, 加薄荷、生姜、大枣, 煎至六分, 或只用薄荷汤调下。

【主治】慢惊后, 余未退, 精神不爽。

35807 安冲汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】白术六钱(炒) 生黄耆六钱 生龙骨六钱(捣细) 生牡蛎六钱(捣细) 大生地六钱 生杭芍三钱 海螵蛸四钱(捣细) 茜草三钱 川续断四钱

【主治】妇女经水行时多而且久, 过期不止, 或不时漏下。

【临证举例】①经漏 友人刘某某其长子妇, 经水行时, 多而且久, 淋漓八九日始断, 数日又复如故。医治月余, 初稍见轻, 继又不愈。延愚诊视, 观所服方, 即此安冲汤, 去茜草、螵蛸。遂仍将二药加入, 一剂即愈。又服一剂, 永不反复。刘某某疑而问曰: 茜草、螵蛸, 治此证如此效验, 前医何为去之? 答曰: 彼但知茜草、螵蛸能通经血, 而未见《内经》用此二药雀卵为丸, 鲍鱼汤送下, 治伤肝之病, 时时前后血也。故于经血过多之证, 即不敢用。不知二药大能固涩下焦, 为治崩之主药也。②崩漏 一妇人, 年三十余。夫妻反目, 恼怒之余, 经行不止, 且又甚多。医者用十灰散加减, 连服四剂不效。后愚诊视, 其右脉弱而且濡。询其饮食多寡, 言分毫不敢多食, 多即泄泻。遂投以此汤, 去黄耆, 将白术改用一两。一剂血止, 而泻亦愈。又服一剂, 以善其后。

35808 安志丸

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】人参 白茯苓 白茯神 酸枣仁(酒浸, 隔纸炒) 当归 远志 柏子仁 琥珀各半两 乳香 石菖蒲 朱砂各二钱半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。

每次三十丸, 食后以白汤送下。

【主治】气血虚, 梦中多惊。

35809 安志膏

【方源】《济阳纲目》卷四十六。

【组成】辰砂(研) 酸枣仁(炒) 人参 茯神(去木) 琥珀各七钱半 滴乳香(研) 一钱

【用法】上为末, 和匀。每服一钱, 空心浓煎灯心、大枣汤调下。

【主治】妇人因去血过多, 心神不安, 言语不常, 不得睡卧。

35810 安志膏

《济阳纲目》卷五十四。为《医学入门》卷七“参枣丸”之异名。见该条。

35811 安志膏

【方源】《济阳纲目》卷五十五。

【组成】人参 酸枣仁(炒) 各一钱 辰砂(研细, 水飞) 乳香(另研) 各半两

【用法】上为末, 和匀, 炼蜜为丸, 如弹子大。每服一丸, 空心以温酒或大枣汤送下。

【主治】心神恍惚, 一时健忘。

35812 安体散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】茯苓三钱 苍术二钱 荆芥二钱 防风一钱 黄芩一钱 当归五钱 蒲公英二钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】黄水疮。

35813 安肾丸

【方源】《局方》卷五(绍兴续添方)。

【组成】肉桂(去粗皮, 不见火) 川乌(炮, 去皮脐) 各十六两 桃仁(麸炒) 白蒺藜(炒去刺) 巴戟(去心) 山药 茯苓(去皮) 肉苁蓉(酒浸, 炙) 石斛(去根, 炙) 草薢 白术 破故纸各四十八两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心、食前以温酒或盐汤送下; 小肠气, 炒茴香盐酒下。

【功用】补元阳, 益肾气。

【主治】肾阳不足，下元衰惫，精神不爽，面无光泽，皮肤干燥，腰腹疼痛，梦遗，虚喘，咳逆，水疝，脚气，大便溏泄，小便滑数。

①《局方》(绍兴续添方)：肾经久积阴寒，膀胱虚冷，下元衰惫，耳重唇焦，腰腿肿疼，脐腹撮痛，两胁刺胀，小腹坚疼，下部湿痒，夜梦遗精，恍惚多惊，皮肤干燥，面无光泽，口淡无味，不思饮食，大便溏泄，小便滑数，精神不爽，事多健忘。②《证治要诀类方》：牙宣。③《保命歌括》：肾虚寒湿脚气，及肾虚不足，膀胱虚冷，致成水疝。④《医宗必读》：肾虚咳逆烦冤。⑤《证治汇补》：肾虚水涸，气孤阳浮致喘者。

35814 安肾丸

【方源】《洪氏集验方》卷三。

【组成】熟干地黄(洗净，焙干)一两 牡丹皮半两 附子(炮，去皮尖)半两 金钗石斛半两 破故纸(炒)半两 山药半两 肉桂半两(去皮秤) 白蒺藜(炒，去刺)半两 巴戟天(去心称)一两 肉苁蓉(酒浸一宿)一两(切，焙) 白茯苓半两(去皮秤) 泽泻(微炒)半两 草薢半两 白术半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，食前、空心以温酒或盐汤送下。

【主治】本气怯弱，筋骨无力，或时疼痛。

35815 安肾丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】补骨脂(炒) 葫芦巴(炒) 茴香(炒) 川楝(炒) 续断(炒)各三两 桃仁(麸炒，去皮尖，别研) 杏仁(如上法) 山药(炒，切) 茯苓各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以盐汤送下。

【主治】肾虚牙痛，耳鸣口干，面色黧黑，耳轮焦枯，腰痛，膝骨痛，囊汗，阳事不举。

①《三因》：肾虚，腰痛，阳事不举，膝骨

痛，耳鸣，口干，面色黧黑，耳轮焦枯。②《口齿类要》：肾虚牙疼。③《杂病源流犀烛》：囊汗。

35816 安肾丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】肉苁蓉(酒浸，焙) 石斛(去根) 桃仁(麸炒) 破故纸(炒) 白术 干山药(锉，炒) 白蒺藜(炒去刺) 川乌(炮，去皮脐) 川草薢 川巴戟(去心)各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐汤送下。

【主治】虚热，牙齿浮肿疼痛。

【方论选录】《古方选注》：肉苁蓉、巴戟、川乌安肾之阳，草薢坚肾之阴，石斛清肾中浮游之火，桃仁、蒺藜补肝以安相火，白术、山药健脾以镇浊阴。

35817 安肾丸

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】大安肾丸半斤 磁石一两(醋煨) 石菖蒲 羌活各一两

【用法】上为末，为丸如梧桐子大。每服四五十丸，以盐汤、温酒任下。

【主治】虚弱耳聋。

【备考】组成中大安肾丸，原作“安肾丸”，据《普济方》改。

35818 安肾丸

【方源】《普济方》卷二二七。

【组成】川乌(面炒，去皮) 川草薢 茴香(炒) 杜仲(醋浸，炒) 蜀椒(去目，炒) 当归 木瓜 柏子仁 菟丝子(酒浸) 熟地黄(酒浸)各三两 川楝子三两半(去核) 泽泻 远志(甘草煮，去核) 川巴戟(紫者，去心，酒浸) 牛膝(酒浸) 肉苁蓉(酒浸，炒) 葫芦巴(酒浸，炒) 山茱萸(去核，炒) 白茯苓(去皮) 蛇床子各二两 破故纸四两(炒) 苍术五两(米泔浸，去皮，茅山者佳)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、食前以盐汤送下，温

酒亦得，每日二次。

【功用】补肾填精，壮阳，补虚损，暖腰膝，缩小便，涩精温中，去痰止呕吐，暖下元，定心气，消食止渴，长肌肉，除茎中寒及热疼，逐寒湿及诸冷痹，去一切风，添精益髓，去腰膝冷，益颜色，破癥结，开胃进食，明目。

【主治】男子诸风，五劳七伤，颜色枯朽，手足不随，语言蹇涩，口眼歪斜，筋脉挛急，腰脚疼痛，元脏虚冷，面色青黑，腹胁胀满，下痢泄精，夜梦鬼交，惊悸健忘，骨髓伤败，未老阳事不兴，胃冷精流，阴囊湿痒，膀胱疝气，小肠下部脾胃俱弱，癥结痰饮，霍乱吐泻，转筋不止，胸膈逆气，不进饮食。

35819 安肾丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】二味安肾丸（《医学入门》卷七）。

【组成】破故纸 茴香子 乳香（要真者，不得真者则不如不用，以没药代之）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服四十丸，空心以白汤送下，或以煎药吞之。

【主治】①《丹溪心法附余》：久患气证，气不归元。②《医学六要》：因肾不收气，喘症已服流气化痰诸法不效。

35820 安肾丸

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】青盐（炒） 补骨脂（盐水炒） 山药 石斛 白茯苓 菟丝子（酒炒） 巴戟（去心） 杜仲（姜汁炒）各一两 肉苁蓉（酒浸） 白蒺藜（炒）各二两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心淡盐汤送下。

【功用】固精补阳。

【主治】肾虚牙齿豁落，隐痛。

35821 安肾丸

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】青盐一两（另研） 鹿茸 柏子仁 石斛 川乌 黑附子（炮） 巴戟 肉桂 菟丝子 韭子 肉苁蓉 葫芦巴 杜仲（姜汁拌炒） 远志 石枣（酒蒸去核） 破故纸

赤石脂（煨） 茯苓 茯神 川楝子肉（酒蒸） 苍术 川椒 茴香（酒炒）各五钱

【用法】上为末，用山药末打糊为丸，如梧桐子大。每服八十一丸，空心以盐汤送下。

【主治】①《杏苑》：肾虚，虚火上炎致牙宣。②《证治宝鉴》：肾虚气不归元，咳嗽动引百骸，自觉从脐下逆奔而上者。

35822 安肾丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】肉桂 川乌头（炮）各一两五钱 白蒺藜（炒，去刺） 巴戟天（去骨） 薯蓣（姜汁炒） 茯苓 石斛（酒炒） 川革薢（炒） 白术 肉苁蓉（酒浸去腐） 补骨脂（炒）各四两八钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空腹以盐汤送下，临卧以温酒送下。

【主治】肾虚风袭，下体痿弱疼痛，不能起立。

【方论选录】肾脏为风寒所袭，所以不安，故用乌头、蒺藜祛风散寒之剂，风去则肾自安，原无事于温补也；其他桂、苓、术、薢、脂、戟、苁、斛，虽日兼理脾肾，而实从事乎祛湿利水，只缘醉饱入房，汗随风蔽，所以肢体沉重，非藉疏通沟洫，病必不除，因仿佛地黄饮子面为制剂，彼用地黄、菖、志、冬、味、萸、附，以交心肾之气；此用蒺藜、术、薢、骨脂、乌头，以祛坎陷之风，与崔氏八味丸迥乎不同也。

35823 安肾丸

《温病条辨》卷三。即原书同卷“安肾汤”改为丸剂。见该条。

35824 安肾丸

【方源】《马培之医案》。

【组成】鹿角霜三钱 焦白术一钱半 肉桂三分 当归二钱 川续断一钱半 独活八分 怀牛膝五钱 大生地三钱 菟丝子五钱 巴戟肉一钱半 红枣三个 桑枝三钱

【主治】肾虚脊驼，足痿疼痛。

35825 安肾汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】鹿茸三钱 葫芦巴三钱 补骨脂三钱 韭子一钱 大茴香二钱 附子二钱 茅术二钱 茯苓三钱 菟丝子三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。久病恶汤者，可用二十分作丸。

【主治】湿久脾阳消乏，肾阳亦惫者。

【加减】大便溏者，加赤石脂。

【方论选录】凡肾阳惫者，必补督脉，故以鹿茸为君，附子、韭子等补肾中真阳；但以苓术二味，渗湿而补脾阳，釜底增薪法也。其曰安肾者，肾以阳为体，体立而用安矣。

【备考】本方改为丸剂，名“安肾丸”（见原书同卷）。

35826 安肾汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地四钱 淮山（炒） 枸杞各二钱 茯苓 牛膝（盐水炒） 萸肉各一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】虚火牙痛。

【加减】或加肉桂四分，泽泻一钱五分，以引火归位。

35827 安和饮

《医钞类编》卷十七。为《女科百问》卷下“安胎和气散”之异名。见该条。

35828 安和散

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】木香 当归 川芎 前胡（去芦） 柴胡（去芦） 青皮（炒） 桔梗（炒） 甘草（炙） 赤茯苓各等分

【用法】上锉散。每服一钱，加生姜三片，大枣一枚同煎，空心服。

【主治】冷热不调泻。

35829 安和散

【方源】《女科指南》。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 川芎 红花 半夏 香附

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】邪正交争，气血不顺，一切腹痛。

35830 安肺汤

【方源】《济阳纲目》卷六十五。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地（酒蒸） 白术 茯苓 五味子 麦冬（去心） 桑白皮（炙） 甘草（炙）各五分 阿胶一钱二分

【用法】上作一服。加生姜，水煎服。

【主治】荣卫俱虚，发热自汗，肺虚喘气，咳嗽痰唾。

35831 安肺汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】参 苓 术 草 归 芍 芎 麦 五味 桑皮各一钱 阿胶一钱半 生姜三片

【功用】保肺。

【主治】肺喘。

35832 安肺散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】麻黄（不去节）二两 甘草（炒）一两 御米壳四两（去顶，炒黄）

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，乌梅一个，煎至七分，去滓，临卧温服。

【主治】咳嗽无问新久。

35833 安肺散

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】款冬花 五味子 乌梅肉（焙微黄） 紫菀茸各一两 甘草（炒）半两 御米壳（去蒂，蜜炒）四两

【用法】上为细末。每服二钱，水二盞，煎至七分，去滓，食后温服，每日二次。

【主治】涎喘嗽，日夜不止。

【加减】癆嗽，加人参二钱。

35834 安肺散

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬五钱 桔梗二钱 生地三钱 白芍三钱 茯苓三钱 紫苏二钱 款冬花一钱 天门冬三钱 紫菀一钱 黄芩三钱 熟地三钱 山茱萸二钱 玄参五钱 贝母五分

【用法】水煎服。

【功用】补肺气，滋肾水。

【主治】人有日坐于围炉烈火之边，肺金受火之伤，以致汗出不止，久则元气大虚，口渴引饮，发热者。

35835 安定汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】黄耆一两 白术五钱 当归五钱 生枣仁五钱 远志三钱 茯神五钱 甘草一钱 熟地一两 半夏二钱 麦冬五钱 柏子仁三钱 玄参三钱

【用法】水煎服。

【功用】生血，大补心肝。

【主治】心虚惊悸。闻声而动惊，心中忪忪，半日而后止，久则不必闻声而亦惊，且添悸病，心中常若有来捕者。

35836 安经丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】香附子（去毛，生） 牡蛎（煨）各二两 木香（生，不见火） 木通（生）各半两 石燕子五对（火煨，用醋淬白为度） 丁香一钱（不见火）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒盐汤送下。

【主治】妇人赤白带下。

35837 安经汤

【方源】《医学正传》卷七。

【组成】归身一钱半 川芎半钱 白芍药八分 生地黄一钱 阿胶珠半钱 艾叶半钱 条芩一钱 甘草半钱 香附一钱 黄柏半钱 知母半钱 黄连（姜汁拌炒）八分

【用法】上切，作一服。水煎，空心服。

【主治】月经先期而来。

35838 安荣丸

《中国医学大辞典》。即《医方类聚》卷二二四引《济生》“安荣散”改为丸剂。见该条。

35839 安荣汤

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【组成】四物汤加阿胶珠 香附子 白术 条芩 砂仁 糯米 桑寄生

【用法】水煎服。

【功用】固胎元，预防小产。

【主治】胎气不固，时常小产。

35840 安荣汤

《宋氏女科》。为《医方类聚》卷二二四引《济生》“安荣散”之异名。见该条。

35841 安荣汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归（去尾）三五钱 熟地五六钱 丹参二钱 淮山药三钱 白芍（酒炒）一钱五分 丹皮一钱二分 阿胶（蛤粉炒）二钱 川续断二钱 甘草（炙）一钱

【用法】煎就，加发灰、百草霜、败棕灰、蒲黄（炒黑，俱存性）各等分（再研），每用一钱，水调服。

【主治】血有热，崩漏日久，六脉虚弱，体亏无神。

【加减】如实火盛，迫血妄行，口渴，舌黄，便燥，血热，六脉洪滑，加黄柏、黄芩、梔仁之类，或加生地、赤芍、青蒿各二三钱，不应，加黄连。

35842 安荣汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】萍蓬根（酒炒）五钱 人参 白术 当归 川芎 黄芩 黄连 桂枝 木香各一钱 甘草三分

【用法】上锉细。每服三钱，麻沸汤浸，绞取汁服。

【主治】产后血晕。

35843 安荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】麦冬 滑石 当归 灯心 人参 赤苓 白芍 甘草梢 黄芩 知母 香附 木通 黄柏 川芎

【主治】妊娠子淋，便后点滴，淋漓不止，欲便则涩而不利，似数非数，已便则时时淋漓，以致胎动不安。

【方论选录】是方参、归、芎、芍、麦、知、柏、苓凉血安荣以滋天一之源，滑、通、苓、草、灯心利水清膀胱之热。养血滋阴则肾不

虚，利水清热膀胱不为虚热所阻，加以香附行气，则小便清利而淋自止矣。

35844 安荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】白芍 当归 生地 熟地 黄芩 槐角 地榆 皂角仁 秦艽 防风 黄柏 甘草 赤石脂

【功用】祛风清燥，除热凉血。

【主治】妊娠五六月后，胎气已成，风淫伤胃，忽患肠风，大便出血，血色鲜红。

【方论选录】白芍平肝风，敛阴血；当归滋养阴血；生地凉心血，滑燥金；熟地补血；黄芩苦寒，泻大肠风热；槐角苦寒入肝，疏风泻热，清大肠，治肠风血痔；地榆苦寒，除血热、治肠风；皂角仁搜风泻热，性燥，胎前宜审；秦艽祛阳明经湿热风邪；防风祛十二经风邪，兼入大肠；黄柏祛热，治肠风下血；甘草泻下焦火；赤石脂固下焦肾气，性甘温，重收湿止血，能催生下胎，恐非胎前所宜用。

35845 安荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】柴胡 当归 白芍 生地 熟地 黄芩 知母 杜仲 川断 山药 麦冬 荆芥 金银花

【主治】妊娠阴户肿痛，由厥阴风热，或受胎后合多，有伤子门，或非理交接所致。

35846 安荣散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生》。

【异名】安荣汤（《宋氏女科》）。

【组成】麦门冬（去心） 通草 滑石各一钱 当归（去芦，酒浸） 灯心 甘草（炙）各半两 人参 细辛（洗）各一钱

【用法】上为细末。每服三钱，煎麦门冬汤调服，不拘时候。

【功用】通利小便。

【主治】妊娠子淋。本因调摄失宜，子脏气虚，盖缘酒色过度，伤其血气，致水脏闭湿，遂成淋漓。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴足太阳少阴药也。陈来章曰：虚热宜补，故用人参、甘草之甘；淋闷宜通，故用木通、灯草之渗，滑石之滑；肺燥则天气不降，而麦冬能清之；肾燥则地气不升，而细辛能润之；血燥则沟洫不濡，而当归能滋之也。

【备考】本方改为丸剂，名“安荣丸”（见《中国医学大辞典》）。

35847 安荣散

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归 白芍 人参 麦冬 石斛 通草各一钱 山梔七分

【用法】空心服。

【功用】滋肾滑热。

【主治】子淋因于膀胱、小肠虚热。

35848 安荣散

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】丹参七分 龙骨一分 大枣三枚 小蒜三个 茯苓七分 当归三钱 人参一钱 火麻子一钱 阿胶一钱 赤豆三十随用

【主治】滑胎。

35849 安胃丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】人参 白术 茯苓 木香各一分 槟榔一个 枇杷叶 藿香 半夏曲 黄橘皮各一两 甘草 丁香各一分 肉豆蔻二个

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以生姜汤送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少，呕逆恶心，腹胁膨胀。

35850 安胃丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】神曲 当归 人参 白术 干姜各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心以粟米饮送下。

【主治】肠胃虚弱，内挟寒湿，邪正相攻，腹中疼痛，大便水谷不消，或冷热客搏，便下赤白，后重频滑，无复节度，虚困无力，肌

体羸瘦，下利既久，脾胃增虚，呕哕肠鸣，全减饮食。

35851 安胃丸

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】好青州白丸子三十粒 好金液丹三十粒 全蝎一枚（去刺） 麝香少许

【用法】上为细末，以糯米饭和为丸，如黍米大。每服三二十丸，煎萝卜糯米汤送下，不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风，吐泻不止，危不可治。

35852 安胃丸

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】白术五钱 干姜（炮）三钱 大麦蘖（炒）五钱 陈皮三钱 青皮二钱 白茯苓（去皮）二钱 缩砂二钱 木香一钱半

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食远以温水送下。

【功用】温中补气，安胃进食。

【主治】寒邪伤胃。

【宜忌】忌冷物。

35853 安胃丸

【方源】《吴鞠通医案》卷三。

【组成】姜半夏八钱 川椒炭六钱 广皮五钱 云苓块六钱 乌梅肉四钱 生姜五钱

【用法】甘澜水八茶杯，煮成三杯。分三次服。

【主治】呕吐不食已久，六脉弦细而弱。

35854 安胃丸

《全国中药成药处方集》（杭州方）。为《伤寒论》“乌梅丸”之异名。见该条。

35855 安胃汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】苏木（酒洗）二钱 红花一钱 丁香五分 延胡索一钱二分 川郁金（酒洗）八分 桂心五分 沉香五分 大黄（酒制）二钱

【主治】产后败血上冲入胃而发哕，或一刻二三声，或连发不已。

【加减】或加橘梗八分。

【方论选录】是方苏木、红花以行瘀血；丁香、桂心、广皮之辛热，佐使速行；大黄荡涤迅猛，制以酒则上行入胃；沉香之苦温，佐使速降。延胡、郁金逐上焦恶血，瘀祛则胃安。

【备考】外用韭菜生捣炒热，按胸下；或炒食盐升许塌之。

35856 安胃汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄连（净）半钱 五味子（去子）乌梅（去核） 生甘草各半钱 熟甘草三分 升麻梢二分

【用法】上咬咀。分作两服，每服水二盏，煎至一盏，食远去滓温服。

【功用】《医略六书》：清热敛津。

【主治】①《脾胃论》：饮食汗出日久，心中虚风虚邪，令人半身不遂，见偏风痿痹之证。②《医略六书》：胃虚热炽，自汗脉数。

【宜忌】忌湿面、酒、五辛、大料物之类。

【方论选录】①《医略六书》：生甘草缓中泻火，炙草益胃缓中，黄连清内迫之热，升麻举下陷之气，五味敛耗散之气，乌梅收热迫之津，使热化津回，则清阳布护而营卫调和，腠理致密，自汗无不止，此清热敛津之剂，为胃虚热迫自汗之专方。②《脾胃论注释》：用黄连苦寒以清胃火，合生甘草以缓阳明之急；五味子、乌梅酸收敛汗，合熟甘草以复耗散之津；用升麻引药入足阳明经，在和缓收敛药中加一味升散之品，煎成于半空腹时服，便于药物的吸收。湿面、酒及五辛、大料，以其不利于出汗之证，故反复叮咛忌食。

35857 安胃汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】人参 白术 川芎 白芷 当归 茯苓 陈米一撮

【主治】①《女科万金方》：产后血下如赤豆汁。②《郑氏家传女科万金方》：产后湿多，泄泻如豆汁。

35858 安胃汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】五味子 生甘草 炙甘草 乌梅 黑枣

【用法】水煎服。

【主治】胃热，食后复助其火，汗出如雨。

35859 安胃汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】人参五分 白术三分 茯苓（去皮） 山药（炒） 当归 陈皮 半夏（姜汁炒） 莲肉各八分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，乌梅一个，水煎温服。

【主治】翻胃。

35860 安胃汤

【方源】《宋氏女科》。

【异名】安胃饮（《简明医彙》卷七）。

【组成】当归 白芍药（煨） 陈皮 香附（炒） 白术 半夏（姜汤泡，香油炒） 茯苓 藿香 神曲 砂仁各等分 甘草减半

【用法】加生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

【主治】妊娠恶阻。

35861 安胃汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】良姜 木香 草果 陈皮 人参 茯苓 白术 胡椒 丁香 甘草（炙）各一两半

【用法】每服五钱，水一钟半，入盐少许，煎七分，食远温服。

【主治】脾败，胃气先逆，饮食过伤，忧思蓄怒，宿食痼癖，积聚冷痰，动扰脾土，不能消磨谷食，致成食罢即吐，或朝食暮吐，暮食朝吐，所吐酸水臭秽，或止黄水。

35862 安胃汤

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】川椒五分（炒去汗） 安吉乌梅一钱（去核） 川黄连一钱 人参三钱 枳实一钱五分 生淡干姜一钱五分

【用法】上为末。每服三钱，水一钟，煎八

分，温服。

【主治】肝气犯胃，饥不欲食。

【方论选录】川椒之辛，佐乌梅之酸行阴以泻肝，枳实、干姜助人参行阳道以益气，黄连于脾胃中泻心火之亢，清脾胃生化之源。统论全方，辛酸同用，以化肝气，酸甘相辅，以和胃气，肝化胃和，自能进谷。

35863 安胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】安胃散（《医学从众录》卷三）。

【组成】陈皮 山楂 麦芽 木通 泽泻 黄芩 石斛

【用法】水一钟半，煎七分，食远服。

【主治】①《景岳全书》：胃火上冲，呃逆不止。②《会约》：胃火上冲呃逆，脉实胸滞，便秘口渴。

【加减】如胃火热甚，脉滑实者，加石膏。

35864 安胃饮

《简明医彙》卷七。为《宋氏女科》“安胃汤”之异名。见该条。

35865 安胃饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】清半夏一两（温水淘洗两次，毫无矾味然后入煎） 净青黛三钱 赤石脂一两

【用法】用作饭小锅，煎取清汁一大碗，调入蜂蜜二两，徐徐温饮下，一次只饮一口，半日服尽。

【主治】妊娠恶阻。

【加减】若服后吐仍未止或其大便燥结者，去石脂加生赭石（轧细）一两；若嫌青黛微有药味者，亦可但用半夏、赭石。

35866 安胃饮

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】藿香三钱 苏梗二钱 川厚朴二钱 砂仁二钱 竹茹三钱 半夏三钱 陈皮三钱 茯苓三钱 生姜汁二十滴（兑服）

【功用】和胃降逆止呕。

【主治】胃虚气失和降所引起的妊娠恶阻。

35867 安胃散

【方源】《普济方》卷三十六引《指南方》。

【组成】五灵脂杏核大(以醋和面裹,烧令香熟,去面) 白茯苓一枚杏核大 丁香三十粒 朱砂五分 人参 木香各一分

【用法】上为细末。每服半钱,茶清调下。

【主治】胃反,呕吐。

35868 安胃散

【方源】《医统》卷二十四引《发明》。

【组成】人参二钱 藿香 丁香各一钱 陈皮八分

【用法】上为细末。每服二钱,以生姜煎汤调服。

【主治】脾胃虚弱,不进饮食,呕吐酸水。

35869 安胃散

【方源】《直指》卷六。

【组成】人参 白术 木香 槟榔 丁香 半夏曲 肉豆蔻(湿纸煨) 橘红 藿香 白茯苓 青皮 甘草(炙)各等分

【用法】上锉散。每服三钱,加生姜四片,水煎服。

【功用】开胃和中,止呕进食。

35870 安胃散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】丁香五分 茱萸 草蔻 参各一钱 炙甘草五分 香一钱 柴胡五分 升麻七分 柏三钱 陈皮五分 归一钱五分 苍术一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】胃寒所致呕吐啰。

【加减】痰饮为患,呕吐痰涎者,加半夏、茯苓、陈皮。

35871 安胃散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】茯苓 白术 车前子各一钱 五味子五分 乌梅一枚 粟壳一钱五分

【用法】上咬咀。水煎,食前温服。

【主治】下痢脓血相杂,里急窘痛,日夜无度。

35872 安胃散

《医学从众录》卷三。为《景岳全书》卷五十一“安胃饮”之异名。见该条。

35873 安胆汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 天花粉 炒栀子各二钱 甘草一钱 白芍 丹皮各三钱

【用法】水煎服。

【主治】少阳春温,由春月伤风所致,见发寒发热,口苦,两胁胀满,或吞酸吐酸。

35874 安脉汤

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】人参 白术各二钱 当归一钱五分 阿胶三钱 炙甘草 陈皮各五分 芎蒭一钱 菟丝子 黄耆各一钱五分 杜仲二钱

【主治】劳役伤胎,胎动不安。

35875 安胎丸

【方源】方出《丹溪心法》卷五,名见《丹溪治法心要》卷七。

【组成】白术 黄芩 炒曲

【用法】上为末,粥为丸服。

【功用】安胎。

【主治】《明医指掌》:妊娠四五月,内热甚而致常堕不安。

【备考】《医学入门》本方用黄芩、白术各等分,为末,粥为丸,如梧桐子大。每服五十丸,白汤送下。

35876 安胎丸

【方源】《广嗣纪要》卷七。

【异名】湖莲丸。

【组成】莲肉(去心)二两 白术二两 条芩二两 砂仁(炒)半两 山药五两

【用法】上为末,山药作糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,以米饮送下。

【功用】预防堕胎。

35877 安胎丸

《回春》卷六。即《金匱》卷下“当归散”改为丸剂。见该条。

35878 安胎丸

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】生地黄四两(砂仁末一两拌酒蒸晒九次) 当归身(酒炒) 白芍(酒炒) 白术各三两(切片,饭上蒸晒五次,蜜炙) 陈

皮(去白) 条芩(酒炒) 川续断(盐水炒) 杜仲(盐水炒断丝) 麦冬(去心) 各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每早砂仁汤送下四钱。

【功用】①《叶氏女科》：妊娠七月，以防堕胎。②《沈氏经验方》：和中保胎，养血调气，健脾进食。

【加减】脾虚泄泻，加淮山药、菟丝饼各三两；气虚，加人参二两；血虚，加阿胶(蛤粉炒珠)二两。

【备考】《大生要旨》：怀孕三月，恶心懒倦已退，脏燥已润，于四、五、六、七、八月逐月服此丸料。

35879 安胎丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】茯苓四两 条芩 白术 香附 益母草各二两 元胡 红花 没药各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸为限，不宜多服，空心以白汤送下。惯于小产者，可预服之。如胎不安，一日间可服四五次，不宜连吃，安则仍一日一服。

【主治】妊娠腹痛，腰痠作胀；惯于小产者；甚至见红将坠者，亦能保足月。

35880 安胎丸

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】川续断 杜仲(炒黑) 山药(炒) 当归 真阿胶(炒) 白芍 熟地 砂仁 黄芩(酒炒) 甘草各四两 川芎 艾叶各二两 白术五两(炒)

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三钱。

【主治】胎动不安，腹中作痛，下血胎漏，势将堕胎，或闪跌误伤，天癸复来，或惯好小产，不能到期。

35881 安胎丸

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】人参五钱(去芦) 白术一两 甘草三钱 橘皮二钱五分 川芎三钱 当归一

两 白芍八钱 紫苏叶一钱五分 黄芩一两 香附八钱(制) 杜仲一两 续断六钱 砂仁一钱五分

【用法】上为极细末，炼蜜为小丸。每服三钱，以温开水或姜汤送下，每日二次。

【功用】益气安胎。

【主治】妊娠气弱，腰酸腹痛，胎动失常。

35882 安胎汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】槐花(炒香熟) 贝母(去心，焙) 当归(锉，焙) 芎藭各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，酒、水各半盏，童便二合，同煎至七分，去滓，温服。

【主治】妇人胞胎不安。

35883 安胎饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归半两(锉) 葱白一分(细切)

【用法】先以水三盏，煎至二盏，入好酒一盞，更煎数沸，去滓，分作三服。

【主治】妊娠胎动不安，腰腹疼痛。

35884 安胎饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】芎藭 阿胶(炙燥) 艾叶 当归(切，焙) 人参 甘草(炙，锉) 白茯苓(去黑皮) 黄耆(锉) 麦门冬(去心，焙) 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空心温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎气不安，腹痛烦闷。

35885 安胎饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】四君合四物加陈皮 紫苏 葛根 前胡 大腹皮 砂仁 竹茹 生姜 大枣

【功用】清痰，温胃，安胎。

【主治】妊娠胃气不调，风冷乘虚，水饮停结积聚，妨食呕逆，甚则伤胎，自受妊三月至九月皆患而不愈者。

【方论选录】是方四君以壮脾土，四物养血

安胎，陈、砂顺气除逆，竹茹、苏、前化痰，枣、姜生津和胃，葛根为使引入阳明。

【宜忌】腹皮宽膨之胀，其性太厉，惟气盛痰多，体肥发喘者酌用之。

35886 安胎饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】艾叶 川断 杜仲 香附 牡蛎 黄芩 地榆 黄耆 川芎 当归 白芍 熟地 人参 茯神 白术

【主治】妊娠卒然下血，血来甚多，如崩如败，俗名血崩，又名血海败；血来成块，精神昏耗，咬牙噤口，其势甚，恐此系胎气上逼下坠而致。

【加减】内伤，加藿香、益智仁；外感，加葛根、防风；吐，加广皮、厚朴、藿香；湿，加茯苓、扁豆、泽泻。

【方论选录】是方四物加杜、断以大补阴血，四君去草，加耆、附以大补元气，牡蛎以固脱，地榆以凉血。但血来势必迅雷不及掩耳，用药如大将登坛不假卒伍小勇。

35887 安胎饮

【方源】《三因》卷十七。

【异名】安胎散（《医学正传》卷七引《良方》）。

【组成】川芎 枳壳（切，麸炒去瓤）各一两半 熟地黄三两 糯米二合

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，金银少许，同煎至七分。食前服。

【主治】妊娠，胎寒腹痛，或胎热多惊，举重腰痛，腹满，胞急，卒有所下，或顿仆，闪肭，饮食毒物，或感时疾，寒热往来，致伤胎脏。

35888 安胎饮

《女科百问》卷下。为《杨氏家藏方》卷十六“安胎散”之异名。见该条。

35889 安胎饮

【方源】《局方》卷九（宝庆新增方）。

【组成】地榆 甘草（微炙赤） 茯苓（去

皮） 熟干地黄（洗，酒洒蒸，焙） 当归（去芦洗，酒浸） 川芎 白术 半夏（汤洗七次） 阿胶（捣碎，麸炒） 黄耆（去苗） 白芍药各等分（一方无半夏、地榆，有人参、桑寄生；一方无白术、黄耆、半夏、地榆，有艾叶，并各等分）

【用法】上为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠三月、四月至九个月恶阻病者，心中愤闷，头重目眩，四肢沉重，懈怠不欲执作，恶闻食气，欲啖咸酸，多睡少起，呕逆不食，或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病。

【宜忌】如或恶食，但以所思之物任意与之必愈。按妊娠禁忌，勿食鸡鸭子、鲤鱼脍、兔、犬、驴、骡、山羊、肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。

35890 安胎饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】四物汤 加砂仁 陈皮 白茯苓 阿胶

【用法】加葱五茎，水煎，食前服。

【主治】受胎不安，非时转动，无故下血，腰腹痛，肢倦力乏。

35891 安胎饮

【方源】《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》。

【组成】香附子 一两（去毛，炒）

【用法】上为末。以白汤送下。

【主治】漏胎腹痛。

【备考】《卫生易简方》本方用法：每服三钱。

35892 安胎饮

【方源】《丹溪治法心要》卷七。

【组成】白术一钱 人参半钱 当归一钱 白芍药一钱 熟地黄一钱 川芎五分 陈皮五分 甘草三分 缩砂二分 紫苏三分 条芩五分

【用法】上作一帖，加生姜一片，水煎，食

前服。

【主治】①《丹溪治法心要》：孕成之后，胎气不安，或腹微痛，或腰间作疼，或饮食不甘美。②《幼幼集成》：孕妇痘已出现。

【加减】孕七八个月服此药，或加大腹皮、黄杨头七枚。

【备考】《妇科玉尺》有香附，无熟地黄。《幼幼集成》有红枣三枚，无条芩。

35893 安胎饮

【方源】《万氏女科》卷二。

【异名】安胎万全饮（《胎产心法》卷上）。

【组成】条芩 白术 人参 归身 生地 陈皮 白芍各一钱 炙草 砂仁（连壳炒，捶碎）各五分

【用法】加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】脾胃素弱，胎失滋养而常堕者。

35894 安胎饮

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】人参 当归 黄芩 大腹皮 川芎 芍药各八分 香附子 紫苏各一两 砂仁 陈皮 甘草各五分

【用法】水二盏，煎一盏，温服。

【主治】妊娠出痘。

【加减】腹痛者，加阿胶。

【备考】《种痘新书》有茯苓，无砂仁，用法：加灯心，糯米煎服。

35895 安胎饮

【方源】《医便》卷四。

【组成】白术一钱 条芩一钱 陈皮（去白）八分 真阿胶（炒珠）一钱 桑寄生（真者）一钱 甘草四分 蕲艾五分 当归头六分 陈枳壳五分 砂仁（炒）六分 川独活五分 白芍药（酒炒）一钱二分

【用法】加生姜一片，大枣一枚，糯米百余粒，水煎，空心服。

【主治】胎动不安，胎漏。

35896 安胎饮

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】大腹皮（酒洗） 人参 陈皮 白

茯苓 白芍 紫苏 砂仁 香附 甘草

【用法】加糯米，水煎服。

【功用】安胎。

【加减】胎漏，加阿胶、百草霜。

35897 安胎饮

《医方考》卷六。为《痘疹金镜录》卷下“安胎散”之异名。见该条。

35898 安胎饮

《回春》卷六。为原书同卷“胶艾四物汤”之异名。见该条。

35899 安胎饮

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】当归 黄芩 白芍药 川芎各二钱 白术一钱

【用法】上为细末。每服方寸匕，以酒送下，一日二次。

【主治】胎动不安，或疼，或见恶露，或不疼，或不见恶露。

35900 安胎饮

【方源】《宋氏女科》。

【组成】加减固胎饮子加茯苓 桑寄生

【主治】胎动不安，奔上冲心。

35901 安胎饮

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】紫苏一钱 当归身一钱 白术（炒）一钱 条黄芩（略炒）一钱 川芎八分 陈皮五分 香附六分 白芍药七分（微炒） 甘草五分 大腹皮六分 砂仁（炒）六分

【用法】水煎，温服。

【主治】妇人胎不安，气不利。

35902 安胎饮

【方源】《虺后方》。

【组成】茯苓 当归 川芎 芍药 地黄 甘草 白术 阿胶 地骨皮 黄芩

【用法】水煎服。

【功用】保全胎产及其期。

【主治】三月妊娠恶阻，常憎饮食，胎动不安，时下血，心神倦怠，欲扶持。

35903 安胎饮

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】当归一钱 川芎六分 益母草一钱 砂仁八分 续断一钱 寄生一钱 陈皮八分 条芩一钱 白术一钱 甘草三分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【功用】自初孕至达月服之百病皆除，安胎。

35904 安胎饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】陈皮 白术 当归 生地 砂仁 香附各一钱 白芍 黄芩 川芎各一钱二分

【用法】加黑枣二枚，水煎，空心服。

【主治】妊娠胎气不安及胎痛。

35905 安胎饮

【方源】《慈幼新书》卷首。

【组成】白术 当归 紫苏 条芩各一钱 川芎八分 白芍七分 砂仁(炒) 香附(炒)各六分 人参 陈皮各五分 炙甘草三分 苎根二钱

【功用】安胎。

35906 安胎饮

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】四物汤加熟艾一钱 阿胶一钱五分 茯苓一钱

【主治】胎动不安。

35907 安胎饮

【方源】《胎产指南》卷一。

【组成】白术一钱五分 陈皮四分(去白) 甘草四分 人参一钱 川芎八分 当归二钱 生地一钱五分 柴胡四分 半夏六分(姜制) 升麻四分

【用法】加生姜为引，空心屡服。盐汤探吐，则气升尿下行。

【主治】孕妇脾胃气虚，胎压尿胞而脐腹作胀，或小便淋闭。

35908 安胎饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】当归 熟地 茯苓 半夏 黄芩 川芎 白芍 阿胶各一钱 甘草三分(炙)

【主治】怀胎七月，胎母不能胜其动静。

35909 安胎饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】当归 白芍 川芎 熟地 地榆 艾叶 黄芩 阿胶 白术 黄耆(一方加白茯苓)

【用法】加砂仁、苏梗、生姜，水煎服。

【主治】胎前内伤，凝血作痛。

35910 安胎饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】白术 茯苓 地榆 甘草 熟地 当归 川芎 白芍 艾叶 黄耆 阿胶

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】①《郑氏家传女科万金方》：胎前下血。②《胎产辑萃》：怀胎三四月至九个月，呕吐痰水，心中愤闷，头重目眩，恶闻食气，或胎动不安，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病。

【备考】《胎产辑萃》本方用法：各等分，每服三钱，加生姜四片，水煎温服，不拘时候。

35911 安胎饮

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】当归身一钱 川芎五分 白芍 熟地 生地各一钱 白术二钱 砂仁一钱 陈皮五分 苏梗五分 杜仲二钱 续断八分 阿胶一钱 条芩一钱半

【主治】血虚有火，曾三个月堕胎。

【加减】见血，加地榆、炒蒲黄各一钱；腹痛或下坠，砂仁、白芍倍加，熟地亦倍加。

【备考】预防五月、七月，为丸；亦可枣肉为丸。

35912 安胎饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参一钱(虚者倍用) 当归二钱 熟地三钱 条芩一钱 川芎七分 白术二钱 陈皮四分 紫苏四分 甘草四分 元枣二枚

【主治】妊娠三月，胎动不安，盖因子宫久虚，气血两弱，不能摄元养胎致令不安欲堕。

【加减】如虚肥人，陈皮去白，加川连五分；脾胃溲泻，加莲子十粒、砂仁五分 川连(炒)五分，去熟地、黄芩；怒而多泻，加木

香三分；渴，加麦冬二钱；怔忡、惊悸，加枣仁二钱、益智仁一钱、龙眼肉十个。

【备考】《梅氏验方新编》本方用法：“水煎服”。

35913 安胎饮

【方源】《女科指掌》卷三。

【组成】陈皮 茯苓 藿香 砂仁 当归 紫苏 甘草 白术 黄芩 大腹皮

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】胎前诸症。

【加减】恶阻，倍藿香、陈皮，加半夏；胸膈不宽，加枳壳、去白术；恶寒，倍苏叶、生姜，去黄芩；虚烦，加麦冬、知母，去白术；子肿，加山梔、木通，倍腹皮；咳嗽，加桑皮、麦冬，去白术；子淋，加木通、淡竹叶、茯苓；头痛，加川芎、羌活、防风；腰痛，加杜仲、续断、补骨脂；痢疾，加黄连、木香、木通；胸腹痛，加香附、白芍、延胡；泄泻，加泽泻、白术、茯苓；伤寒无汗，加羌活，去苓、术；寒热往来，加柴胡、苏、姜；伤食，加枳壳、砂仁，去苓、术；误服毒药，加知母、白扁豆；胎动不安，倍当归、砂仁；胎不长，加参、耆、归、术；下血，加阿胶、艾叶、川芎、当归；胎太盛，加黄杨脑、陈皮；胎气上逼，加砂仁、苏梗；不眠，加茯神、枣仁、竹叶；胎气下堕，加川芎、续断；血虚，加白芍、熟地；疟疾，加柴胡、知母；胎欲堕，加续断、杜仲、芎、归；临产，加川芎、当归。

35914 安胎饮

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】人参二钱 当归 白术 熟地(同) 川芎八分 甘草四分 紫苏 陈皮(同) 条芩一钱

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】孕妇胎气不安，或腹痛、腰痛，或饮食不美；及孕妇屡产，生子无气，或生而不寿，或妊而数堕者。

【加减】如泄泻，减熟地，加莲肉十粒、壳

砂数分；如渴，加麦冬一钱；如惊悸，加枣仁、益智仁各一钱；如怒气，磨木香三分。

35915 安胎饮

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍药(酒炒) 大熟地(九制) 茯苓 阿胶各一钱 甘草(炙) 艾叶各三分 白术二钱

【用法】水煎服。

【主治】①《医学心悟》：妊娠因起居不慎，或饮食触犯禁忌，或风寒搏其冲任之脉，或跌仆伤损，或怒动肝火，或脾气虚弱而致胎动不安。②《产科心法》：孕妇胎动不安，腰痛发热，不食不眠。

【加减】若起居不慎，加人参、黄耆、杜仲、续断；若饮食触犯，加人参，倍加白术；若风寒相搏，当按经络以祛风寒；若跌仆伤损，另用佛手散，加青木香、益母草；若怒动肝火，加柴胡、山梔；若脾气虚弱，去熟地，加人参、扁豆、陈皮。

35916 安胎饮

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五钱 苏梗三钱 白术一钱半(炒) 条芩一钱半(酒炒) 当归二钱 山梔一钱半 木香一钱 香附一钱半(酒炒) 茯苓一钱半 杜仲一钱半(酒炒)

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】怀孕九月，脉洪滑疾，两关弦涩者。

【方论选录】阴阳久踞，胎壅，脾弱挟热而血气不调，故腰腹疼痛而胀满不已焉，宜健中清热以养之。生地凉血热以养胎，苏梗顺胎气以安胎，白术健脾壮气，当归养血和血，山梔降火凉血，条芩清热安胎，香附调气解郁以除痛，木香开胃醒脾以除满，茯苓清肺气以行治节，杜仲壮肾气以强腰府。水煎温服，使脾土健而血气和，胎热降而胎气顺，其疼痛胀满无有不退者乎。

35917 安胎饮

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】黄耆(蜜炙) 杜仲(姜汁炒) 茯

苓各一钱 黄芩一钱五分 白术(蜜炙黄)五分 阿胶(炒珠)二钱 续断八分 甘草三分 糯米一百粒

【用法】水煎，入酒一杯，和服。

【主治】妊娠七八月后，或母有火，或起居不时致试痛，胎不安而痛不止，一阵慢一阵，或乍紧乍慢。

【加减】若胸中胀满，加紫苏、陈皮各八分；下血，加蕲艾、地榆各一钱，阿胶加倍。

35918 安胎饮

【方源】《仙拈集》卷三引《要览》。

【组成】当归 白芍 茯苓 橘红 香附 条芩 腹皮各一钱

【用法】水煎，空心服。

【功用】和血消胀，安胎。

35919 安胎饮

《大生要旨》卷二。为方出《丹溪心法》卷五，名见《医学入门》卷八“芩术汤”之异名。见该条。

35920 安胎饮

【方源】《沈氏经验方》。

【组成】生地三钱 归身 麦冬(去心)各一钱五分 白芍二钱(酒炒) 真阿胶 杜仲(盐水炒) 续断(盐水炒) 条芩(焙) 枳壳各一钱(炒) 炒砂仁末三分

【用法】河水煎服。

【主治】子嗽。怀孕四五月，因火旺上冲肺经而咳嗽，五心烦热，胎动不安，或痰血，或鼻衄。

35921 安胎饮

《妇科玉尺》卷二。为《校注妇人良方》卷十二“安胎散”之异名。见该条。

35922 安胎饮

《验方新编》卷九。为《古方选注》卷下“安胎饮子”之异名。见该条。

35923 安胎饮

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】绵耆三四钱(炙) 生地炭三钱 归身炭二钱 茯苓三钱 泽泻二钱 升麻(炒)五分 银花三钱 条芩(酒炒)一钱五

分 川连(酒炒)八分 广木香五分 范制面二钱

【用法】加荷叶一角，水煎服。

【功用】淡渗利湿，清热安胎。

【主治】妊妇患痢，名子痢。腰痛气滞，里急后重，少腹疔痛。

【加减】如噤口，水汤不进而呕吐频频，加石莲子三钱，石菖蒲三分，生姜三片，去生地炭；口渴者，加青果一枚，乌梅一枚；如赤痢加地榆炭三钱；白痢，加白槿花一钱；如腹痛甚者，加川椒二十粒，去升麻，更加白芍一钱；如赤白兼者，加天仙藤二钱、驴胶一钱，去广木香；或外加扁豆叶二片，以醒胃气。

【宜忌】口渴者，切忌生冷水果。

35924 安胎饮

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】泽兰叶五钱 黄芩三钱(炒) 辽沙参六钱 白芍二钱(炒) 砂仁一钱(炒) 骨皮一钱半 麦冬一钱半(去心) 生草一钱

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【主治】妇人血热，怀胎数月后，动而不安，或向上顶。

35925 安胎饮

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】熟地 当归 茯苓 甘草 川芎 白术 半夏 阿胶 地榆 白芍

【主治】孕妇临产之月，胞水未破，而血先下者。

35926 安胎散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】安胎饮(《女科百问》卷下)、缩砂汤(《妇人良方》卷十二)、小安胎饮(《得效》卷十四)、独圣散(《景岳全书》卷六十一)、独圣安胎散(《种痘新书》卷十二)、独圣汤(《叶氏女科》卷二)。

【组成】缩砂不以多少(熨斗内盛，慢火炒令热透，后去皮、取仁用)

【用法】上为细末。每服二钱，热酒调下；不饮酒者，煎盐艾叶汤调下，食空服。

【主治】妊娠胎动下血，心腹疼痛，气逆呕吐。

- ①《杨氏家藏方》：妊娠偶因所触，或从高坠下，致胎动不安，腹中疼痛。②《古今医鉴》：胎动下血，胃虚气逆呕吐，心腹诸痛。③《痘疹金镜录》：孕妇出痘动胎。

【宜忌】《古今医鉴》：此药非八九个月内，不宜多用。

【备考】服此药后觉胎动处极热，即胎已安。

35927 安胎散

《医学正传》卷七引《良方》。为《三因》卷十七“安胎饮”之异名。见该条。

35928 安胎散

【方源】《女科千金方》。

【组成】川芎 当归 白芍 茯苓 甘草 黄耆 白术 阿胶 地榆 艾

【用法】加生姜三片，水二钟，煎服。

【主治】胎动不安，成见血水，或纯鲜血，腰腹痛。

35929 安胎散

【方源】《校注妇人良方》卷十二。

【异名】安胎饮（《妇科玉尺》卷二）。

【组成】熟地黄（自制） 艾叶 白芍药 川芎 黄耆（炒） 阿胶 当归 甘草（炒） 地榆各五分

【用法】加生姜、大枣，术煎服。

【主治】妊娠卒然腰痛下血。

【加减】或加杜仲、续断。

35930 安胎散

【方源】《广嗣纪要》。

【组成】缩砂不拘多少（和皮略炒，勿令焦黑，去皮取仁为末） 当归 川芎各等分

【用法】水煎当归、川芎作汤，调砂仁末服。

【功用】安胎易产。

【主治】因自高坠下，或为重物所压触动胎气，腹痛下血。

【备考】如觉胎中热，其胎即安矣。

35931 安胎散

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【异名】安胎饮（《医方考》卷六）。

【组成】八珍汤去地黄，加黄芩、砂仁、香附、紫苏、陈皮、大腹皮

【用法】加大枣三枚，水煎服。

【主治】①《痘疹金镜录》：孕妇出痘动胎。②《医方易简》：妊娠痘出稠密者。

【方论选录】《医方考》：人参、白术、茯苓、甘草，所以补气；当归、川芎、芍药，所以养血；黄芩所以清热；砂仁、香附、紫苏、陈皮、大腹皮，所以行滞。

35932 安胎散

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】白术 当归各一钱 黄芩一钱五分 甘草（炙）三分

【用法】上锉。水煎服。

【功用】安胎。

【主治】《医略六书》：妊娠胎动，脉微数者。

【加减】如腹胀，加神曲、麦芽各二分半；气虚泄泻，加人参三分、陈皮二分；潮热，加柴胡一钱；气上逆，加枳壳三分。

【方论选录】《医略六书》：白术健脾生血，当归养血荣胎，甘草泻火缓急，条芩清热安胎。为散水煮，俾热化血荣，则冲任完固，而胎得所养，胎无不安，何胎动之有？

35933 安胎散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】川芎 当归 白芍 人参 白术 茯苓 甘草 黄芩 陈皮 紫苏 砂仁 阿胶 香附 艾叶 紫草各等分

【用法】加益母、生姜、大枣，水煎服。

【功用】安胎。

35934 安胎散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】白术 黄芩各二两 续断 白芍 当归各一两 砂仁五钱 甘草三钱

【用法】上为末。童便调下。

【主治】胎动不安。

35935 安胎散

《文堂集验方》卷三。为《医统》卷八十五“太山磐石散”之异名。见该条。

35936 安胎散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生白术 黄芩 炒白芍各等分

【用法】上为散。每服三钱，以生姜二片，大枣三枚，煎浓汁调服。

【主治】妊娠伤寒已外解，脾气虚馁，热乘虚陷，胎动不安。

35937 安胎散

【方源】《胎产新书》卷一。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地各二钱 白术 茯苓 黄耆（炙） 甘草 阿胶（蛤粉炒） 地榆各一钱半 半夏一钱 艾叶三分 姜三片

【用法】上为末。以米汤调送。

【功用】安胎。

【宜忌】半夏碍胎，宜少用为妥。

35938 安胎散

【方源】《胎产新书》卷二。

【组成】阿胶 人参 茯苓 川归 生地各一钱 川芎 甘草各五分 小茴 八角茴各八分

【用法】水煎，空心服。先急用胶艾汤以止其血，再服本方以护其胎。

【主治】胎前动红。此因失跌动伤，恶血破来，如水流不止。

35939 安胎散

【方源】《胎产新书》卷五。

【组成】人参 川芎各五分 黄芩 当归头各七分 白芍 黄耆各六分 白术 熟地 蛤粉炒阿胶各一钱 炙甘草三分

【用法】水煎，食远服。

【功用】安胎气。

【加减】如腹痛，加杜仲（去粗皮，炒断丝），砂仁各五分；有忧怒郁结，加紫苏、香附各五分。

35940 安胎散

【方源】《经验女科方》。

【组成】苏叶 桔梗 枳实 大腹皮 贝母 知母 川归 五味子 甘草 石膏 桑白皮

【用法】水煎服。

【主治】胎前气紧不得卧。

35941 安胎煎

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 益母草各五钱 川芎三钱

【用法】水煎，入陈酒、童便各一小杯，和匀服，妊娠七八个月，每日服一剂。

【功用】安胎，催生。

【主治】闪跌小产，死胎不下及产后诸症。

【加减】腹痛，加炒砂仁一钱。

35942 安胎膏

【方源】《理渝》。

【组成】老母鸡一只（缉死，勿经水，拔尽毛，竹刀破去肠杂，入梗米、糯米半碗，银针穿线缝好，麻油四斤熬听用） 生地四两 川芎（酒洗） 当归（酒洗） 杜仲（炒） 续断（炒） 白术 黄芩 制香附 淮山药各二两 党参 黄耆 熟地 酒白芍 麦冬 知母 苍术 陈皮 枳壳 半夏（姜汁炒透则不碍胎） 羌活 防风 白芷 柴胡（炒） 苏子（或梗） 藿香 黑山栀 泽泻 甘草（生炙各半） 砂仁各一两 南薄荷 北细辛各五钱 葱白一二斤 益母草（干者）四两 生姜 竹茹 忍冬藤 地骨皮 桑叶 菊花 柏叶 艾各一两

【用法】麻油八斤熬药，并煎油炒丹收，入牛胶四两（酒蒸化，如清阳膏下法）、黄蜡二两（搅），加槐、柳、桑枝各四两，元参、黄连、黄柏、贝母、花粉、乌药、醋延胡、醋灵脂、丹皮、黑地榆各一两 黑蚕砂二两，木香、紫石英、赤石脂各五钱。上贴心口，中贴脐眼，下贴丹田，或背心两腰；如治外感等贴胸背，杂病等贴当脐，胎漏等贴脐下，腰痠白带等贴两腰，护胎贴丹田。

【功用】保胎。

【主治】妇人胎前诸症。凡感受风寒暑湿，或妊娠之初，头目昏晕，肢体沉重，憎闻食气，好食酸咸，恶心呕吐，或心烦躁闷，或咳嗽，或痢，或泻，或寒热往来；或胎中有水，面目身体脚膝肿胀，足指出水；或痰迷发搐；或胎气不和，逆上痛胀；或胎气壅塞，小便淋痛；或肾虚腰痛，或带下腰痠；或胎漏，或胎动下血；热病护胎；孕妇转脘；或小便不通，大便不通，一切闪挫。

【备考】本方保胎为主，治症次之，治以上诸症，宜辨证配合内服药物。

35943 安养汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 百部各一钱 山药一两 甘草三分 麦冬五钱 北五味十粒 白术二钱 茯神三钱

【用法】水煎服。

【主治】肾癆生虫，夜卧常惊，或多恐怖，心悬悬未安，气吸吸欲尽，淫梦时作，盗汗日多，饮食无味，口内生疮，胸中烦热，终朝无力，惟思睡眠，唇似朱涂，颧如脂抹，手足心热，液燥津干。

35944 安宫丸

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为《温病条辨》卷一“安宫牛黄丸”之异名。见该条。

35945 安宫散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】安息香 没药各二钱半(并别研) 甘草(炙) 当归(去芦，酒浸) 香附子(去毛)各一两 乌梅肉二钱半 白芍药一两 乳香二钱(别研)

【用法】上为细末。每服三钱，水一盞半，煎至七分，入酒一大呷，食前服。

【功用】活血定痛。

35946 安宫散

【方源】《永类铃方》卷十八引郑氏方。

【组成】附子(炮) 阿胶(炒) 五味子 黄耆(炙) 山药 当归 熟地黄 赤芍 木香 甘草(炙)各二钱 生姜半两(炒黑) 糯

米一勺(炒焦)

【用法】上锉散。每服半两，苈根三寸，水煎，通口服。

【功用】《普济方》：安胎。

【主治】半产，妊娠血气虚弱，不能卫养，数月而堕。

【宜忌】《普济方》：忌生冷。

35947 安神丸

【方源】《博济》卷四。

【组或】使君子两枚(以面裹于慢火中煨，候面熟为度，去面用之) 水银一钱(结砂子) 香细墨一钱 芦荟一钱 真熊胆一钱 辰砂一钱 腊茶一钱 天竺黄半钱 青黛半钱 蝎梢三七个 乳香一钱 龙脑一钱 轻粉二钱 寒食面一钱半

【用法】上为细末，滴水为丸，如绿豆大。每服一丸，薄荷蜜水化下；如小儿稍觉惊者，化半丸。

【功用】化涎镇神。

【主治】小儿惊风搐搦。

35948 安神丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组或】马牙消 白茯苓 麦门冬 干山药 甘草 寒水石(研)各五钱 龙脑一字(研) 朱砂一两(研)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服半丸，以沙糖水化下，不拘时候。

【功用】补心，定惊，泻火。

①《小儿药证直诀》：补心。②《得效》：定惊。③《幼科释谜》：泻火。

【主治】小儿心虚肝热，面黄颊赤，身热，神志恍惚，惊风，惊啼，因惊吐奶。

①《小儿药证直诀》：小儿面黄颊赤，身壮热；心虚肝热，神志恍惚。②《得效》：小儿因惊吐奶，面色青。③《卫生宝鉴》：小儿心虚痞热，面黄颊赤，壮热惊啼。④《症因脉治》：痰迷心窍。⑤《幼科释谜》：小儿血气虚面急惊者。

35949 安神丸

【方源】《幼幼新书》卷七引《谭氏殊圣》。

【组成】生犀末半钱 雄黄(研) 人参 茯苓 车前子各一分

【用法】上为末,取桃白皮一两,桃符一两,二味以水三升,同煎至一升,去滓,更煎成膏,和前药为丸,如麻子大。每服三丸,芍药汤送下。

【主治】小儿客忤,忽尔连连哭不休,浑身壮热,脉如钩,惊啼不得。

35950 安神丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】琥珀(如无,以茯神代之) 人参(去芦) 远志(去心) 天麻 花蛇肉(酒浸,去骨) 白附子(炮) 麻黄(去节) 羌活 大川乌头(炮,去皮脐) 蝉蜕(洗去土,并去白筋) 南木香(不见火) 真珠末 白僵蚕(直者,炒去丝) 全蝎(生姜汁炙) 各半两 朱砂二钱(别研) 金银箔各三十片(别研) 麝香一钱(别研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如龙眼大,朱砂为衣。一丸作四服,用薄荷汤送下。

【功用】镇心脏热,化痰涎。

【主治】小儿惊疾。

35951 安神丸

《兰室秘藏》卷下。为《内外伤辨》卷中“朱砂安神丸”之异名。见该条。

35952 安神丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】生犀末 人参 茯苓 菖蒲 朱砂 雄黄各等分

【用法】上为末,研桃仁膏为丸,如麻子大。每服三丸,紫苏汤送下。

【主治】①《直指小儿》:客忤。②《普济方》:惊啼,客热。

35953 安神丸

【方源】《奇效良方》卷十七。

【组成】人参 缩砂 香附子(炒,去毛) 三棱 蓬术(煨) 青皮 陈皮 神曲(炒) 麦曲(炒) 枳壳(炒,去瓢) 各等

分

【用法】上为细末,用粳米煮糊为丸,如梧子大。每服三十丸,空心用米饮送下;盐汤送下亦得。

【功用】消食健脾,益气进食。

35954 安神丸

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】人参 茯神 麦门冬 干山药 龙脑各二钱 龙齿一钱 朱砂 甘草 寒水石末各半钱 金箔二片

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。灯心汤调下。

【主治】伤食后发搐,搐退者。

35955 安神丸

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】黄连一钱(炒) 归身一钱半 酸枣仁五分 茯神八分 炙甘草五分 远志一钱 菖蒲一钱

【用法】上为末,猪心血捣烂为丸,如粟米大,辰砂为衣。灯心汤送下。

【主治】痘疹稠密,昏昏而睡,呼之不醒,或口中喃喃,妄言狂语者。

35956 安神丸

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】七味安神丸(《景岳全书》卷六十二)。

【组成】黄连 当归身 麦门冬 白茯苓 甘草各半两 朱砂一两 龙脑二分半

【用法】上为末,汤浸蒸饼和猪心血捣匀为丸,如黍米大。每服十丸,灯心汤送下。

【功用】养血泻火

【主治】小儿痘疮初起,神昏谵语;心经蕴热惊悸及麻疹发搐;妇女经后出痘,热入血室,神识不清,谵妄。

①《痘疹心法》:痘疮起发成浆,欲靥之时,忽然神昏谵语。②《麻科活人》:麻疹发搐。

③《幼幼集成》:妇女经后出痘,热入血室,神识不清,谵妄。④《古方汇精》:小儿心经蕴热惊悸。

35957 安神丸

【方源】《保婴金镜》引《秘旨》。

【组成】人参 半夏(汤泡) 酸枣仁(炒) 茯神各一钱 当归(酒洗) 橘红 赤芍(炒)各七分 五味子五粒(杵) 甘草(炙)三分

【用法】上为末,姜汁糊为丸,如芡实大。每服一丸,生姜汤送下。

【主治】心血虚而睡中惊悸,或受惊吓而作。

【备考】本方改为汤剂,名“秘传安神汤”(见《松崖医径》卷下)、“安神汤”(见《幼科发挥》卷四)。

35958 安神丸

【方源】《疮疡经验全书》卷十三。

【组成】人参 柏子 当归 麦门冬 酸枣仁各一两 生地黄 远志 石菖蒲 玄参 贝母 黄连 五味子各七钱

【用法】上为细末,龙眼肉七两熬膏为丸,如绿豆大,辰砂为衣。每服五十丸,灯心汤送下。

【主治】霉疮愈后,精神恍惚,升痰动火,烦渴者。

35959 安神丸

【方源】《慎斋遗书》卷九。

【组成】龙骨一两 诃子肉七枚 砂仁五钱

【用法】面糊为丸,朱砂一两为衣。每服二三丸,空心温酒送下;大便闭,葱白汤送下。

【主治】虚劳白淫,小便不止,精气不固。

35960 安神丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】茯神(去心) 芦荟 琥珀 黄连 赤茯苓各三钱 胆星 远志 甘草(汤煮,晒干) 虾蟆(烧灰)各一钱 石菖蒲 使君子肉各一钱

【用法】上为末,山药煮糊为丸。灯心汤送下。

【主治】小儿惊疳,病后肌肤消瘦,精神昏

愤。

35961 安神丸

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】牛黄五分 黄连(酒炒)五钱 当归二钱五分 山梔仁(炒)二钱五分

【用法】汤浸蒸饼,以獾猪心血调为丸,如粟米大,辰砂为衣。煎灯心汤送下。

【主治】痘收后邪热攻心,传于胞络,昏睡连日不醒,口中妄语,或有醒时亦似醉人,每多错言。

35962 安神丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归(酒洗) 人参(去芦) 茯苓(去皮) 酸枣仁(炒) 生地黄(酒洗) 黄连(酒炒) 陈皮(去白) 南星(姜制)各一两 天竺黄五钱 牛黄二钱 珍珠二钱 琥珀二钱

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂五钱为衣。每服五十丸,清米汤送下。

【功用】《金匱翼》:镇心安神。

【主治】①《回春》:痼病,卒时晕倒,身软,咬牙,吐涎沫,不省人事,随后醒者。②《金匱翼》:癫痫惊狂属痰火者。

【宜忌】忌母猪肉,牛、羊、犬、马等肉,胡椒、葱、蒜。

【备考】《金匱翼》有雄黄。

35963 安神丸

《痘疹传心录》卷十七。为《御药院方》卷一“龙脑安神丸”之异名。见该条。

35964 安神丸

【方源】《医部全录》卷四三〇引《幼科全书》。

【组成】黄连(去根须) 石菖蒲 远志(去心) 当归身 麦门冬(去心) 山梔仁(炒)各二钱 茯神八钱

【用法】上为末,粟米糊和猪心血为丸,朱砂为衣。灯心汤送下。

【主治】小儿惊痫。

35965 安神丸

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】当归(酒洗) 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 酸枣仁(炒) 生地黄(酒洗) 川黄连(酒炒) 橘红 真胆星 厚黄柏(盐酒蜜炒黑色) 麦门冬(去心) 各一两 朱砂(另研, 水飞过) 五钱

【用法】上为极细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大, 朱砂为衣。服三子散去积痰后服此方, 每服五十丸, 空心清米汤送下; 食远、临卧灯心汤送下。

【主治】羊痫并滑泄, 久而无子, 脉上盛下虚。

【宜忌】忌猪、鹅、牛、羊、犬、马等肉, 胡椒、葱、蒜。

35966 安神丸

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参 天麻(煨) 防风 山药 地黄(炒) 炙甘草各二钱 琥珀一钱 全蝎(去毒)二十个 僵蚕(炒) 朱砂各一钱半 金箔十片

【用法】上为末, 将金箔研匀, 饭为丸, 朱砂为衣。伏龙肝汤送下。

【功用】镇惊安神除风。

35967 安神丸

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】茯苓 茯神 白术各二两 甘草五钱 山药 寒水石各二两 朱砂八钱

【用法】炼蜜为丸, 如弹子大。临卧灯心、淡竹叶汤送下。

【主治】惊恐。

35968 安神丸

《奇方类编》卷下。为《墨宝斋集验方》“琥珀安神丸”之异名。见该条。

35969 安神丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】附子三分 人参三钱 白术三钱 陈皮一钱 归身五钱 朱砂一钱 铁衣(水飞)一钱 茯神三钱 远志二钱 半夏一钱 薄荷一钱 花粉一钱 胆星一钱 川连二钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸。生姜汤送下一钱, 每日一次。

【主治】癫痫。

35970 安神丸

【方源】《活人方》卷一。

【组成】生地黄六两 枣仁六两 柏子仁一两 茯神一两 麦冬一两 川黄连三两 当归三两 五味子二两 甘草一两 朱砂一两(飞过)

【用法】炼蜜为丸, 朱砂为衣。每服三钱, 临睡灯心汤吞服。

【功用】清血中之伏热, 滋心液之内燥, 凉血清心, 宁神定志。

【主治】劳烦太过, 谋虑不遂, 五志之火内炽, 而致神明不安; 或肝虚胆热, 相火行权, 包络热而心液竭, 而致神明不安, 梦寐若惊; 或久病血虚, 心肾不交, 火炎水涸, 其神不敛而无睡; 或伤寒之后, 邪热未尽, 遗于心肺, 使神明不清而无睡。

35971 安神丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】辰砂五分 当归五钱

【用法】以猪心血为丸。每服一钱, 临卧酒送下。

【主治】怔忡。

35972 安神丸

【方源】《幼科释谜》卷六。

【异名】黄连安神丸。

【组成】黄连 龙胆草 当归 石菖蒲 茯神各一钱半 全蝎七个

【用法】蒸饼杵猪心血为丸, 朱砂为衣。灯草汤送下。

【功用】安神。

35973 安神丸

【方源】《采艾编翼》卷二。

【组成】龙脑 麝各三分 朱砂 牙消各三分 牛黄五分 人参 犀角各一钱 茯苓三钱 地骨皮 甘草 麦冬各二钱

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如弹子大,

金箔为衣。每服一丸，盐汤送下。

【主治】男妇五种癫痫，无问远近发作。

35974 安神丸

【方源】《麻疹阐注》卷三。

【组成】黄连 当归 茯神 石菖蒲各一钱 全蝎七只（酒洗）

【用法】上为末，捣猪心血为丸，朱砂为衣。灯心汤送下。

【主治】麻后壮热搐掣。

35975 安神丸

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】朱砂一两 酒黄连一两半 生地五两 当归二两 甘草五钱 白参 白术 茯神 枣仁各一两 寸冬八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，一日三次，白水送下。

【功用】清热，镇静，安神。

【主治】惊悸语无伦次；阳痫卒然倒地，昏迷不省，吐沫抽搐，移时自起；神经刺激太深，发为狂癫，叫骂奔走；神经错乱，不分亲疏，哭笑无定，忧郁欲死。

35976 安神丸

【方源】《中药制剂手册》

【组成】合欢花十六两 生地黄八两 玄参八两 女贞子十六两 合欢皮三十二两 丹参四十八两 夜交藤三十二两 桑椹子四十两

【用法】取合欢花至女贞子四味，共轧碎或捣烂，干燥后再轧为细粉；取合欢皮至桑椹子四味，用煮提法提取二次，得浓缩稠膏约38两。混合、制丸、挂衣，每两约二百粒，每服十五至二十粒，每日三次，温开水送服。

【功用】养心安神。

【主治】神经衰弱，头晕烦躁，失眠多梦。

35977 安神丹

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】朱砂二钱半 南乳香半两 酸枣仁（炒，去皮）一两 人参二钱半 远志（去心）一钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如榛子大，每两作三十丸，金箔为衣。每服一丸，人参汤化下。

【主治】小儿心神不宁，困卧多睡，及痰涎壅塞，恍惚不定。

35978 安神汤

【方源】《幼幼新书》卷十二引张涣方。

【异名】安神散（《御药院方》卷十一）。

【组成】白茯苓二两 甘草 犀角各一分 人参 远志 菖蒲 白鲜皮各一两 石膏半两

【用法】上为末。每服一钱，水小盏，入麦门冬，煎五分，去滓温服。

【功用】《御药院方》：截痫，安心神。

【主治】惊痫。

35979 安神汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】生甘草 炙甘草各二钱 防风二钱五分 柴胡 升麻 酒生地黄 酒知母各五钱 酒黄柏 羌活各一两 黄耆二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二大盏半，煎至一盏半，加蔓荆子五分、川芎三分，再煎至一盏，去滓，临卧热服。

【主治】头痛，头旋眼黑。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“安神散”。

35980 安神汤

《幼科发挥》卷四。即《保婴金镜》引《秘旨》“安神丸”改为汤剂。见该条。

35981 安神汤

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】人参 当归 生地 麦门冬 黄连 山栀 甘草 石菖蒲

【用法】水煎，调辰砂末，搅匀服。

【主治】痘疮后真气虚弱，火邪内攻，发惊，久则成痼。

35982 安神汤

【方源】《幼科铁镜》卷六。

【组成】人参 半夏 枣仁 茯神 当归 橘红 赤芍 五味子 甘草

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】小儿心血不足，惊悸。

35983 安神汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参 石莲肉 莲须 麦冬 茯神 远志 甘草 芡实

【用法】水煎，温服。

【主治】遗精。

35984 安神饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】茯神三钱 枣仁八钱(炒，研) 远志肉五分(炙) 麦冬二钱(去心) 当归三钱(酒炒) 乳香一钱(去净油) 益智仁二钱(盐水炒)

【用法】桂圆肉五枚，灯心三分为引，水煎服。

【主治】痢后心肾受亏，阴虚不寐，神气不宁，夜梦多惊。

【加减】如心虚发空，似怔忡相类，加熟地八钱，煅龙齿三钱；如胆怯，加小麦一两。

35985 安神饮

【方源】《孕产集》卷下。

【组成】人参 柏子仁(去油)各三钱 黄耆 阿胶 当归 茯神各一钱 肉桂 炙甘草各一钱

【用法】共作一服。

【主治】产妇素体虚弱，下血过多而致郁冒，昏迷不省，瞑目无所知；甚则循衣撮空，错语失神。

35986 安神散

【方源】《鬼遗方·附录》。

【组成】人参 茯苓 甘草(炙) 枳壳(去瓢，麸炒) 附子(炮，去皮脐) 白姜 山药 陈皮各一两

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，通口服。

【功用】调气，顺营卫。

【主治】诸色疮肿。

35987 安神散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】人参(去芦)半两 白茯苓 远志(去心)各一两 丁香 木香 官桂(去粗皮) 益智各半两 肉豆蔻 槟榔 诃子青橘(去白) 川芎 蓬莪茂 干姜(炮)各半两 白术 附子(炮)各半两 厚朴(去粗皮，生姜炙) 黄耆 半夏 当归 荆三棱(炮) 神曲(炒) 麦蘖(炒)各一两

【用法】上为散。每服二钱，入盐一捻，水一盞，同煎至七分，和滓温服。

【主治】气劳。心腹胀满，不思饮食，胸闷。

35988 安神散

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】丹砂(研) 铁粉(研)各半两 白茯苓(去黑皮，为末)一钱

【用法】上为极细末。每服半钱匕，鹅梨汁调下；磨刀水亦得。

【主治】惊邪。

35989 安神散

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】人参 白茯苓(去黑皮)各一两 甘草(炙，锉) 丹砂(别研) 茯神(去木) 天竺黄(别研)各半两 凝水石(烧)二两半(别研)

【用法】除别研者外，为散，合和令匀。每服一钱匕，食后、临卧以温荆芥汤调下。

【功用】化风痰，止惊悸，解烦热。

【主治】心神不安。

35990 安神散

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】蝎梢(炒)一钱半 蜈蚣(赤脚全者)一条 轻粉一字 乌头尖(生用)七个 天南星(用生姜同捣作饼子，焙干称)半钱 麝香 龙脑(研)各一字

【用法】上为散。每服一字匕，金银薄荷汤调下。

【主治】小儿惊痫，手足痲痹，头项强硬，状如角弓。

35991 安神散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】黄耆(捶碎,蜜水炙,锉)半两 甘草(炙,锉)二钱 白茯苓(去黑皮) 人参 石莲肉(去心,炒)各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕,水半盏,大枣一枚,煎三五沸,温服。

【主治】小儿疳痢烦渴,肌体羸瘦。

35992 安神散

【方源】《幼幼新书》卷七引《吉氏家传》。

【组成】犀角 雄黄 人参 车前子各半两 茯苓一两

【用法】上为末。每服一钱,桃仁汤调下。

【主治】夜啼。

35993 安神散

【方源】《幼幼新书》卷八引《四十八候》。

【组成】人参 茯苓 朱砂各一钱 真珠半钱 甘草(炙)三寸 蝉蜕七个 麝香 犀角屑各少许

【用法】上为末。每服一钱,薄荷汤调下。

【主治】小儿惊虚,夜啼。

35994 安神散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】御米壳(蜜炒)一两 人参 陈皮(去白) 甘草(炙)各一两

【用法】上为末。每服一钱,临卧煎乌梅汤调下。

【主治】远年近日喘嗽不已。

35995 安神散

《御药院方》卷十一。为《幼幼新书》卷十二引张涣方“安神汤”之异名。见该条。

35996 安神散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】人参(去芦) 白茯苓(去皮) 半夏(汤煮透,滤,仍锉,焙干) 甘草(炙) 陈皮(去白) 枳实(去瓢,锉片,麦麸炒微黄)各五钱

【用法】上咬咀。每服二钱,水一盏,加生姜二片,大枣一枚,竹茹小团,煎七分,不拘时候温服。

【主治】吐泻诸病后,心虚烦闷,触物易惊,气郁生涎,涎与气搏,睡不得宁。

【加减】有微热微渴,加麦门冬(去心)。

35997 安神散

《医学纲目》卷十五。即《兰室秘藏》卷中“安神汤”。见该条。

35998 安神散

《普济方》卷三十四。为原书同卷引《圣惠》“人参散”之异名。见该条。

35999 安神散

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】款冬花 佛耳草各三钱 钟乳石白矾 甘草(生)各一分

【用法】上为末。每服二钱,水一盏,人蜡少许,煎至七分,食后和滓温服,每日二次。

【主治】痰涎喘嗽久不愈。

36000 安神散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】人参 白术 白茯苓各一钱 甘草二钱 辰砂半钱 天麻半钱 茯神半钱 全蝎七个 荆芥穗一钱

【用法】上为末。每服半钱,荆芥汤调下。

【主治】小儿惊啼。

36001 安神散

【方源】《婴童百问》卷三。

【组成】蝉蜕四十九个(只用后一截,除去前一截并嘴脚)

【用法】上为极细末,作四服。用钩藤汤调下,不拘时候。

【主治】①《婴童百问》:婴孩夜啼。②《古今医鉴》:小儿夜啼不止,状如鬼神。

36002 安神散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】全蝎四个(塘水浸一宿) 南星(大者)一个(开一穴,入蝎在内,以南星末盖其口,用面裹,火煨令赤色,取出放地坑一宿,去南星)

【用法】上为末。每服一字,磨刀水调下。

【主治】小儿搐搦。

36003 安神散

【方源】《丹溪治法心要》卷八。

【组成】干漆二钱(炒令烟出) 雄黄五钱

麝香一钱

【用法】上为末。每服三岁半钱，空心苦楝根汤调下，月初服。

【主治】小儿蛔虫疼痛。

36004 安神散

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】人参 茯神 黄连 甘草各一钱 远志七分 石菖蒲 柏子仁 生地 赤芍 木通各一钱二分

【用法】用水二钟，加桂圆肉七枚，煎八分服，滓再煎服。兼服丙字化毒丸。

【功用】益正气。

【主治】霉疮心经形症。

36005 安神散

【方源】《幼科发挥》卷上。

【组成】天水散二两三钱加朱砂末（水飞）五钱

【用法】巳、午时煎灯草汤调服。

【功用】镇神。

【主治】小儿惊后成痫。

36006 安神散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】白茯神（去皮木）一两半 白茯苓（去皮） 人参 石菖蒲各一两 赤小豆五钱

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】妇人脏腑虚，神不守，邪厉得为病，梦交，其状不欲见人，如有对晤，时独言笑，或时悲泣，脉息迟伏，或如鸟啄，或脉来绵绵，不知度数，而颜色不变。

36007 安神散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参 茯苓（去皮） 远志（去心） 天麻 白附子 麦门冬 全蝎 莲肉 茯神（去皮木） 朱砂各等分

【用法】上为细末。灯心汤调下。

【功用】安神定志。

【主治】惊风退后，恍惚虚怯。

36008 安神散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参 黄连（姜汁炒）各一钱半

甘草五分

【用法】上锉。加竹叶二十片，生姜一片，水煎服。

【主治】小儿心经有热有虚，夜啼不止。

36009 安神散

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】人参 枣仁 茯神 甘草 当归 麦冬 白芍 柏子仁 灯心 莲肉

【主治】痘后邪毒净尽，心虚不寐。

36010 安神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】茯神二两（去木） 生地五两 枣仁三两（炒） 远志一两半 当归三两 白芍一两半（炒） 人参一两半 麦冬三两 炙草一两 辰砂一两

【用法】上为散。每服三五钱，猪心汤送下。

【主治】产后恍惚心乱，脉虚微数。

【方论选录】产后心血不足，心神失养，而神明失其主宰，故语言错乱，恍惚如有所见焉。茯苓安神以清心气，生地壮水以滋心血，枣仁养心神，远志交心肾 当归养血以荣心，白芍敛阴以和血，人参扶元补心气，麦冬润肺清心神，辰砂镇心宁神，炙草缓中益胃也。为散，猪心汤下，使心血内充，则心神得养而神明有主，岂有神思错乱，妄见妄言之患乎！

36011 安神散

《梅氏验方新编》七集。为《外科正宗》卷二“内托安神散”之异名。见该条。

36012 安神膏

【方源】《普济方》卷三七一引《全要方》。

【组成】朱砂二钱 全蝎 人参 白茯苓 天麻 附子（炮） 川芎 乳香各一钱 麝香一字 坯子半钱（一方加琥珀）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿心虚多惊，恍惚不宁，腹痛便青；及吐泻之后，欲生慢惊。

36013 安珠散

《眼科菁华录》卷上。为《准绳·类方》卷七

“分珠散”之异名。见该条。

36014 安眠汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】夜交藤 15 克 合欢花 9 克 炒枣仁 12 克 龙齿 9 克 茯神 9 克 麦冬 9 克 石斛 12 克 珍珠母 30 克(先煎) 白芍 9 克 夏枯草 9 克 朱砂 1 克(冲) 琥珀 1.5 克(冲)

【功用】镇静，安神。

【主治】失眠，梦多，头昏，头胀，舌质红，脉细数。

36015 安眠散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】款冬花 乌梅肉 佛耳草 麦门冬(去心)各二钱半 陈皮(去白)半两 甘草(炙)三钱半 御米壳七钱半(酥炒)

【用法】上为细末。每服三钱，水一盞，入黄蜡如枣核许，同煎至八分，去滓，大温，临卧服。

【主治】上喘咳嗽，久而不愈。

36016 安眠散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】佛耳草 知母 贝母 款冬花 桔梗 陈皮(汤浸，去白) 白茯苓(去皮)各一两 汉防己 猪牙皂角(去皮，酥炙)各二两半

【用法】上为细末。每服三钱，水一大盞，入黄蜡、乌梅各少许，同煎至五分，去乌梅，和滓温服。

【功用】调肺止嗽，消痰顺气。

【主治】咳嗽不得息。

36017 安眠散

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】罂粟壳(去蒂瓢) 杏仁 乌梅 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服半两，水煎，卧服。

【主治】一切咳嗽，夜不得卧眠。

36018 安息丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引张道人方。

【组成】安息香 丁香 胡黄连 麝香

雄黄各一两 肉豆蔻二钱 金银箔各五片

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，米饮送下。

【主治】脑疳。鼻下赤烂，身心烦躁，鼻内生疮，头发自落，日夜痛无休歇，状似鬼形。

36019 安息丸

【方源】《普济方》卷二二〇。

【组成】附子二个(重六钱，以火炮裂，去皮脐) 胡芦巴(洗淘净) 白茯苓(去皮) 安息香(酒洗化下，滓酒浸作糊丸药) 桃仁(麸炒，去皮) 苡蓉(酒浸，切，焙) 木香各二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤送下。

【功用】补下元虚惫。

【主治】面色黧黑，一切寒冷病，及小肠尿白浮寒。

36020 安息膏

【方源】《普济方》卷二九三引《仁存方》。

【组成】安息香 花乳石(火煨红) 血竭 乳香各半钱 麝香减半

【用法】上为细末，用蜡少许，入麻油些小同熔开，将药捻作米粒大。看疮口大小深浅入药于疮孔中，以满为度；药透内，从内生肉，一二日退出一粒，渐生肉渐退出，出尽则疮中自然平复；如疮口冷痛浅阔，只用少许干敷。

【主治】漏疮脓水不绝，骨中疼痛。

36021 安脏汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】参芦鞭二两 瓜蒂七个 甘草一两 荆芥三钱

【用法】水煎三大碗，顿服之，即用鹅翎扫喉中。必大吐，吐后面肝叶必顺。

【主治】肝叶倒置所致两目无眵，而视物皆倒置。

36022 安脐散

《直指小儿》卷一。为方出《圣惠》卷八十二，名见《圣济总录》卷一六七“天浆散”之异名。

见该条。

36023 安脐散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】白石灰末(焙,出火气)

【用法】敷之。每日三次。

【主治】小儿脐中汁出,或赤肿。

36024 安脐散

【方源】《幼科类萃》卷三。

【组成】瓜蒂 南星 白藜 赤小豆

【用法】上为末。每用三钱,小儿断脐便用芭蕉自然汁调敷脐四边。

【功用】《慈幼新书》:去湿固气。

【主治】小儿脐风。

36025 安脐散

【方源】《保婴撮要》卷一。

【组成】羚羊角一钱(略炒) 乱发一团(烧令存性) 蜈蚣一条(赤足者,炙)

【用法】上为末。断脐后即敷之,以绢帕紧束。

【主治】小儿脐风。

36026 安营饮

【方源】《蒿崖尊生》卷十四。

【组成】白术 当归 麦冬各二钱 茯苓皮 通草各一钱 甘草四分 灯心五分 黄芩七分 竹叶十个

【主治】淋病。

36027 安营散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两 通草一两半 人参一两半 紫菀二两 灯心一两半 当归三两 车前子三两 麦冬三两(去心)

【用法】上为散。水煎三钱,去滓温服。

【主治】子淋涩痛,脉微数者。

【方论选录】妊娠湿热伤阴,气不施方,故小便涩痛,淋漓不已焉。生地滋阴壮水;木通利水通淋;麦冬清心润肺,以资水之上源;人参扶元补气,以助脾之气化;当归养血荣经脉;紫菀润肺,达州都;车前子清肺火,善利水道;白灯心降心火,兼利小便;为散水煮,俾温热并解,则气化有权,而小便清利,

何涩痛淋漓之不已,胎孕无不安矣。

36028 安崩汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】人参二钱 黄耆 白术各一两三七三钱

【主治】①《医学集成》:大崩不止。②《性病》:五崩。一曰热病下血;二曰寒热下血;三曰经来未断房事,则血漏;四曰经来举重,伤冲任;五曰产后脏开经利,不省人事者。

【备考】《性病》本方用法:水煎前药,调三七根末。

36029 安豚丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参五钱 白术五钱 肉桂一钱 山药一两 巴戟天五钱 蛇床子三钱 附子五分 茯苓三钱 远志一钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】补心肾之虚,温命门、心包之火,去脾经之湿。

【主治】心包、命门二经之火衰,外感寒邪,而发奔豚,如一裹之气从心而下,直至于阴囊之间,其势甚急,不可止遏,痛不可忍。

36030 安惊丸

【方源】《直指小儿》卷一引建阳刘参议方。

【组成】远志肉(姜汁浸,焙) 净铁粉 朱砂 人参 茯神各半两 全蝎二十一个(焙) 南星(中者)一个(姜汁浸一宿,切细,焙) 白附子(略炮)二钱半 花蛇头(酒浸肉,焙) 麝半钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一丸,菖蒲、灯心煎汤调下。

【主治】诸惊风痫,或犬声异物,惊忤打坠,不省人事。

36031 安惊丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四引《保婴集》。

【组成】辰砂(另研)五分 汞粉(另研)五分

【用法】上用青蒿节间虫为丸，如粟米大。一岁一丸，乳送下。

【主治】急慢惊风。

36032 安斑汤

【方源】《医学正传》卷八引汤氏方。

【组成】紫草 木通各五分 蝉蜕 防风各三分 甘草二分

【用法】上细切。水一钟，煎五分，温服。

【主治】疮出不快。

36033 安斑散

【方源】《幼幼新书》卷十八引张涣方。

【组成】川升麻 赤茯苓 羌活 绵黄耆(锉)各一两(去芦须) 人参 枳壳(麸炒，去瓤) 桔梗 甘草(炙)各半两

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，加紫草、薄荷各少许，煎五分，去滓温服。

【功用】《痘治理辨》：凉血解毒，生肌宽肠，导热利小便，快膈。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：疮疹。②《痘治理辨》：疮痘有热无寒者。

36034 安厥汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参三钱 玄参一两 茯苓三钱 白薇一钱 麦冬五钱 生地五钱 天花粉三钱 炒栀子三钱 白芍一两 柴胡五分 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴血不归于阳气之中所致阳厥，日间忽然发热，一时厥去，手足冰凉，语言惶惑，痰迷心窍，头晕眼昏。

36035 安蛔丸

【方源】《金匱翼》卷七。

【组成】人参 白术 干姜 甘草 川椒 乌梅

【功用】理中安蛔。

36036 安蛔丸

《中国医学大辞典》。即《张氏医通》卷十四“安蛔散”改为丸剂。见该条。

36037 安蛔汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】人参七分 白术 茯苓各一钱 干姜(炒黑)五分 乌梅二个 花椒(去目)三分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】伤寒吐蛔。

36038 安蛔散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】乌梅肉三钱 黄连 蜀椒 藿香 槟榔各一分 胡粉 白矾各半钱

【用法】上为散。每服三四钱，水煎如糊，空腹服。

【主治】吐蛔热证，色赤成团而活。

【备考】本方改为丸剂，名“安蛔丸”(见《中国医学大辞典》)。

36039 安脾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】半夏一两 槟榔二钱 雄黄一钱半

【用法】上为末，姜汁和蒸饼为丸，如梧桐子大，小儿丸如黍米大。生姜汤送下。从少至多，渐加服之，以得吐能食为度。

【主治】脾胃虚，肝乘于脾，嘈杂及吐食，脉弦者。

36040 安脾散

【方源】《百一》卷二。

【组成】高良姜一两(以百年壁上土三二合敲碎，用水二碗煮干，薄切成片) 南木香 草果(面裹煨，去壳) 胡椒 白茯苓 白术 丁香(怀干) 人参(去芦) 陈橘皮(汤浸，去瓤)各半两 甘草(炙)一两半

【用法】上为细末。每服二大钱，空心、食前米饮入盐点服；盐酒亦得。

【主治】翻胃吐食，及吃食咽酸，口吐黄水，曾经诸方不愈者。

【临证举例】翻胃 甲申之春，以事至临安，寓止朱家桥詹翁店，詹翁年六十余，苦翻胃，危殆，已治棺在床侧。适予有宣司之辟，往别而去，其詹翁已不能言。及十一月自淮上归，过其门，意此翁已不存，为之惨

然，方访问间，而此翁已出迎揖，见其颜色极红润，甚惊异之，问其所以，乃云：官人此日离去，即有一州官来敬，得药数服，遂无事。其后授得此方，昨以此在建康医朱机宜新妇，及近日医圆通观维那，皆作效。

36041 安脾散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白术 白豆蔻仁（炒） 香附子（炒） 人参 甘草各等分

【用法】白汤点服。

【主治】脾胃病。

36042 安然汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】白豆蔻 苏子 藿香各一钱 胆星 陈皮各八分

【用法】加生姜五片，水煎服，不拘时候。

【主治】吐清痰者。

36043 安痘汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】玄参五钱 当归三钱 连翘一钱 白芍二钱 丹皮二钱 荆芥二钱 甘菊花二钱 升麻五分 天花粉一钱

【用法】水煎服。

【功用】散风热。

【主治】痘症发全，痘毒全无，收痂大愈之后，放心纵欲，饮食过伤，又兼风热，而致数日之后身复发热，通身发出红斑，痒甚，愈抓愈痒，先出大小不一如粟米之状，渐渐长大如红云片。

36044 安痛散

【方源】《丹溪心法附余》卷十五。

【组成】五灵脂（去砂石） 延胡索（炒，去皮） 苍术（煨） 良姜（炒） 当归（去芦洗）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，热酒、醋汤调下，不拘时候。

【主治】心胃痛。

36045 安寐丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参三钱 丹参二钱 麦冬三钱

甘草一钱 茯神三钱 生枣仁五钱 熟枣仁五钱 菖蒲一钱 当归三钱 五味子一钱

【用法】水煎服。

【主治】心血少所致心经之病，怔忡、不寐。

36046 安魂汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】枣仁 茯神 远志各一钱 当归胆星各七分

【用法】加灯心二十茎，水煎服。

【主治】客忤。

36047 安魂汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】龙眼肉六钱 酸枣仁（炒，捣）四钱 生龙骨（捣末）五钱 生牡蛎（捣末）五钱 清半夏三钱 茯苓片三钱 生赭石（轧细）四钱

【用法】水煎服。

【主治】心中气血虚损，兼心下停有痰饮，致惊悸不眠。

【方论选录】方中用龙眼肉以补心血，酸枣仁以敛心气，龙骨、牡蛎以安魂魄，半夏、茯苓以清痰饮，赭石以导引心阳下潜，使之归藏于阴，以成瞋睡之功也。

【临证举例】失眠 一媼，年五十余，累月不能眠，屡次服药无效。诊其脉有滑象，且其身形甚丰腴，知其心下停痰也。为制此汤，服两剂而愈。

36048 安魂散

《育婴家秘》卷二。为原书同卷“秘传三圣散”之一。见该条。

36049 安魂散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】桔梗三钱 甘草一钱 青黛五钱 百部一钱 山豆根一钱 人参三钱 茯苓五钱 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【功用】补土泻火，消痰逐邪。

【主治】肺气虚而中邪，目见鬼神，口出胡言，或说刀斧砍伤，或言弓矢射中，满身疼

痛，呼号不已。

36050 安睡丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍 生地 当归各五钱 甘草一钱 熟地一两 山茱萸 枸杞各二钱 甘菊花三钱

【用法】水煎服。

【功用】补肝血，益肾水。

【主治】肝气太燥，忧愁之后，终日困倦，至夜而双目不闭，欲求一闭目而不得。

36051 安睡散

【方源】《医部全录》卷四三一。

【组成】辰砂(研，水飞) 乳香 血竭各一钱(并细研) 麝香半钱(研) 人参 酸枣仁(炒) 南星(炒) 白附各五钱 蜈蚣一条(酥炙，黄酒浸一宿) 全蝎二十一枚

【用法】上为末。一岁一字，薄荷汁好酒煎沸调下。

【主治】小儿急慢惊风潮搐，不得安睡。

36052 安寝丸

《胎产指南》卷八。为《内外伤辨》卷中“朱砂安神丸”之异名。见该条。

36053 安嘈汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】梔仁 川连(炒) 苍术 陈皮 法半夏 香附 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痰因火动，嘈杂不宁。

【加减】若久不愈，加当归、山药。

36054 安嗽汤

【方源】《济阳纲目》卷六十一。

【组成】五味子十五粒 茯苓 陈皮 知母 川芎各一钱 桑白皮 麦冬(去心)各一钱二分 马兜铃一钱半 粉草五分

【用法】上锉。加乌梅一个(去核)，水煎，食远服。

【主治】咳嗽有血。

36055 安嗽膏

【方源】《济阳纲目》卷六十五。

【组成】天冬(去心)八两 杏仁(去皮)贝母(去心) 百部 百合各四两 款冬花五两 紫菀三两 雪白术八两

【用法】上为粗末，长流水煎三次，取汁三次，去滓，入饴糖八两、蜜十六两，再熬；又入阿胶四两、白茯苓四两(为末，水飞过，晒干)，二味入煎汁内，和匀如糊成膏。每服三五匙。

【功用】敛肺气。

【主治】阴虚咳嗽，火动发热，咯血，吐血。

36056 安露饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地 丹参 益母草各三钱 乌贼骨六钱 茜草根(炒)一钱半 旱莲草 炒蕲艾各三钱

【用法】水煎服。

【功用】养阴止血。

【主治】产后恶露不绝，量较多，色红且有腥臭，腹部偶而作胀，口干心烦，舌淡红苔黄，脉数，属血热者。

36057 安睡散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】川芎 白芷 香附(制)各等分

【用法】生姜汁和酒服。

【主治】脑陷头疼。

36058 安睡散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】川芎 香附 白附子 甘草 白芷 相草 牡蛎各一两

【用法】上为细末。每服二钱，清茶调服。

【主治】脑伤髓出。

36059 安睡丸

《胎产心法》卷中。为《金匱》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

36060 安心煎散

【方源】《千金》卷十三。

【组成】远志 白芍药 宿姜各二两 茯苓 知母 紫菀 赤石脂 石膏 麦门冬各四十二铢 桂心 麻黄 黄芩各三十铢 萎蕤三十六铢 人参二十四铢 甘草十铢

【用法】上为粗散。先以水五升，淡竹叶一升，煮取三升，去滓，煮散一方寸匕，牢以绢裹煮，时动之，煎取八合为一服，一日二次。

【主治】心热满，烦闷惊恐。

【方论选录】《千金方衍义》：此兼竹沥、茯神散二方之制，方中麻黄、远志、萎蕤、即茯苓散中升麻、桂心、麦冬之义，人参、甘草、黄芩，即竹沥汤中人参、白术、梔子之义，三方合，究其微，则滋中寓清，清中寓散，散中寓清之法。

【备考】本方方名，《普济方》卷十六引作“安心散”

36061 安石榴汤

【方源】《外台》卷二十五引康丘公方。

【组成】干姜二两（生姜倍之） 黄柏一两（细切） 石榴一枚（小者二枚） 阿胶二两（别研，渍之）

【用法】上切。以水三升，煮取一升二合，去滓，纳胶令烊，顿服，不愈复作。人羸者稍稍服之，不必顿尽，须臾复服。

【主治】大疟痢及白滞，困笃欲死，肠已滑者。

36062 安和饮子

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】罂粟壳二钱半 木香二钱半 甘草二分 地榆二钱

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】赤白痢。

36063 安胎主膏

【方源】《理渝》。

【组成】党参 酒当归各二两 熟地三两 酒条芩 淮药 白术各两半 酒川芎 酒芍 陈皮 苏梗 香附 杜仲 续断 贝母各五钱（一方加黄耆 生地各一两）

【用法】麻油熬，黄丹收，贴肾俞处。

【功用】安胎，止呕定痛。

【主治】下血，子肿，子喘，子痛，肝脾血热，小便带血，胎动不安。

【加减】下血者，加桑寄生、阿胶各五钱；子肿，加姜皮、茯苓皮、大腹皮、陈皮、梔子末调；子喘、加马兜铃、桔梗、贝母；子痛，加防风、独活、羚羊屑；止呕定痛，加砂仁少许；肝脾血热，小便带血，加紫胡、黑山梔；胎动不安，一月用乌雌鸡，十月用猪腰入药。

36064 安胎饮子

【方源】《古方选注》卷下。

【异名】安胎饮（《验方新编》卷九）。

【组成】建莲子（去心）三钱 台州青芦三钱（洗去胶） 白糯米三钱

【用法】上用水一钟，煎五分，每日清晨服。自怀妊两月服起，至六个月。

【主治】妊娠房劳，伤损足三阴所致小产。

【方论选录】建莲子清君相之火，而能固涩真气；台州青芦利小便而通子户，清淫欲之瘀热；糯米补益脾阴，能实阳明空窍，使肝气不妄动，而胎气自安。以五谷果实为方，诚为王道之剂。

36065 安息香丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【异名】雄黄丸（《普济方》卷一五一）。

【组成】安息香一两 朱砂半两（细研） 硫黄半两（细研） 雄黄一两（细研） 阿魏半两 松脂四两 榴（柏）叶四两 苍术四两 白芷三两 干桃叶三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。时以一丸烧于所居之处。

【主治】时气瘴疫。

36066 安息香丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】安息香一两 石菖蒲一两 当归一两 桂心一两 丁香一两 朱砂一两（细研，水飞） 没药三分 芎藭一两 椒红一两（微炒） 天麻一两 乌蛇肉二两（酒浸，炙微黄） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 天南星一两（炮裂） 干蝎半两（生用） 防风三分（去芦头） 麝香一

分(细研) 木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】风冷，心腹四肢多疼，骨节时痛。

36067 安息香丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九八。

【组成】朱砂半两(细研) 虎头骨半两 獠头骨半两 砒霜半两 天灵盖半两 阿魏半两 安息香半两

【用法】上为末，入朱砂研匀，于端午日午时，用白团和丸，如豌豆大。男左女右，手把一丸，定后用绛绢袋子盛，系于中指上。

【主治】寒疟，手足鼓顛，心寒面青。

36068 安息香丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】安息香五两(黄明者，细锉，入蜜十两煎成膏) 补骨脂三两(微炒) 牛膝二两(去苗) 鹿茸二两(去毛，涂酥，炙微黄) 桂心二两 附子二两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为末，以安息香膏和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】壮腰膝，暖下元。

36069 安息香丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】安息香三两(锉细，以无灰酒一升浸一宿，以瓷碗中盛，重汤煮成膏) 沉香一两 肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙干) 胡桃瓤三两(细研，入安息香膏内) 鹿茸一两(去毛，涂酥，炙微黄) 补骨脂二两(微炒) 附子一两(炮裂，去皮脐) 巴戟一两 丁香一两 桂心一两 牛膝一两(去苗) 鸡舌香一两

【用法】上为末，以安息香膏，更入少许炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】肾脏虚冷，脐腹多疼，腰脚沉重，肌体羸瘦，颜色萎黄，食少无力。

36070 安息香丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】肉桂(去粗皮)二两半 诃子(炮，取皮)二两 阿魏(细研，白面少许搜和作饼子，炙令香熟)一分 茯苓 当归(汤洗，切片，焙干) 干姜(炮，去皮) 肉豆蔻(去壳) 川芎 丁香皮 缩砂仁 五味子(微炒) 巴戟(去心，面炒) 益智子(去皮) 白豆蔻(去皮)各一两半 硃砂(酒半盏化，去砂，入蜜) 香附(去毛) 茴香(微炒)各一两半 胡椒 高良姜 木香 沉香 乳香(别研) 丁香各一两

【用法】除安息香、硃砂外，为细末，用蜜三十两，入安息香、硃砂于蜜中炼熟，与上药为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，以温酒送下；浓煎生姜汤下亦得，食前服。

【主治】一切冷气，心腹疼痛，胸膈噎塞，肋肋膨胀，心下坚痞，腹中虚鸣，逆逆恶心，噎气吞酸，胃中冷逆，呕吐不止，宿饮不消，胸膈刺痛，时吐清水，不思饮食。

36071 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】安息香(研)一两 乳香(研)一两 麻黄(去根节)二两 胡桃仁(汤浸，去皮，研)一两半 干浮萍草(去土)一两半

【用法】上药先捣麻黄、浮萍草为末，与研药拌匀，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以温酒化下。以汗出为效。

【主治】偏风，半体不仁，纵缓不收，或痹痛。

36072 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】安息香(研) 肉苁蓉(酒浸，切，焙) 白附子(炮) 羌活(去芦头)各半两 当归(切，焙) 茴香子(炒) 木香 天麻 桂(去粗皮) 沉香各三分 槟榔(锉) 干蝎(去土)各一两 白花蛇(酒浸，去皮骨，炙)二两 芎藭三分(十四味为末) 桃仁(去皮尖并双仁，研如膏)三两

阿魏(白面裹,灰火内炮令黄熟为度,去面,研) 硃砂(研) 硫黄(研) 各一分

【用法】先将桃仁、阿魏、硃砂、硫黄,用好酒五升,于银石器内慢火熬成膏,和前药末十四味;如硬,入炼蜜少许,为丸,每一两分作十五丸。每服一丸,空心、食前以温酒送下嚼服;以姜盐汤送下亦得。

【主治】风冷及虚风头昏,心胸痞闷,痰唾不下,饮食气胀,腰腹疼痛。

36073 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】安息香(通明无砂石者) 铅丹各一两

【用法】上为细末,入白羊心中血研匀为丸,如梧桐子大。每服十丸,空心以温水送下。

【主治】男子妇人暗风痼病。

36074 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】安息香一分 五灵脂二两半 麻黄(去根节)半两 附子尖七个 巴豆(去皮,醋煮)半两

【用法】上五味,捣罗四味为末,研巴豆为膏,入众药为丸,如弹子大。每服一丸,麸炭上烧存性,以生姜汤化下。

【主治】湿温伤寒四五日后,汗出,肢体冷。

36075 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】安息香四两(锉细,入胡桃瓤四枚,酒五升半同浸一宿,来日滤出,入沙盆研如糊,用前酒调搅,滤去滓,入桃子内煎成煎) 磁石(醋淬)一两 沉香三分(锉) 肉苁蓉(酒浸,去皱皮,炙)一两 巴戟天(去心)一两 桂(去粗皮)三分 草薢三分 附子(炮裂,去皮脐)一两 酸枣仁三分 蒺藜子(炒,去角) 补骨脂(微炒)各一两 鹿茸(酥炙,去毛)三分 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 天麻(酒炙)各一两

【用法】上为末,研桃仁同和匀,入安息香

煎为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以盐汤送下。

【主治】肾脏风虚,腰膝疼痛,阳痿缓弱,言语混浊,呼吸短气。

36076 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】安息香(研) 补骨脂(炒)各一两 阿魏(研)二钱

【用法】上为细末,醋研饭为丸,如小豆大。每服十丸,空心以粥饮送下。

【主治】久冷腹痛不止。

36077 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】安息香(酒化,研) 赤茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 槟榔(生,锉) 白术(锉,麸炒) 甘草(炙) 诃黎勒皮 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 陈橘皮(汤浸,去白,炒)各一两 干姜(炮)半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以生姜汤送下,不拘时候。

【主治】膈气呕逆,不下食,噎塞,腹肚膨胀。

36078 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】安息香(研) 乳香(研)各一分 白胶香(研) 地龙(去土,炒,捣为末)各半两 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,研)二七枚 没药(研)一分 胡桃仁(研)三枚

【用法】上为细末,酒煎为丸,如弹子大。每服一丸,以温酒化下。

【主治】一切风注痛。

36079 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】安息香一分 阿魏半分 乳香一钱(三味一处研) 丹砂一分 雄黄 龙脑 麝香各二钱(四味一处研) 砒霜一分(研细,更入绿豆末二钱同研) 密陀僧(煨)二钱 巴豆三粒(去皮心膜,水一大碗浸一日,六度换出,细研出油)

【用法】上药先将安息香等三味一处入瓷器内，用重汤煮，或于饭甑上蒸一次，再入净钵内，烂研成膏，入诸药，为丸，如绿豆大。每服一丸，空心服。肠风泻血，五痔漏脓血不止，或生鼠乳，并以好茶送下；卒心痛，生姜汤送下；食积，陈曲汤送下；心腹诸气，以温酒送下；妇人心痛、血气，以当归酒送下；水泻冷水诸痢，饭饮送下；疟疾，以桃心汤送下。

【主治】久患肠风痔瘻诸疾，或生鼠乳，卒心痛，食积，心腹诸气，水泻冷水诸痢。

36080 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】安息香 天雄(炮裂，去皮脐) 硫黄(研) 阳起石(研) 附子(炮裂，去皮脐) 钟乳(研) 白矾(熬令汁枯，研) 木香 蛇床子(炒) 白龙骨(研) 各一两

【用法】上为末，更合研三日，用黄狗外肾(去筋膜)研细，以法酒同熬成膏，为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下。

【功用】补元阳，益气血。

【主治】虚冷。

36081 安息香丸

【中藏经】卷下。为《外台》卷十三引《广济方》“吃力迦丸”之异名。见该条。

36082 安息香丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】安息香 桃仁 虎杖 附子 杜仲 山茱萸 吴茱萸 柏子仁 木香 当归 玄胡索各二两 泽兰 艾叶 干姜 牡丹皮 黄耆 桂 苁蓉 厚朴各一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下。

【主治】血脏虚冷，面黄肌瘦，胸腹痞闷，心腹绞痛，呕逆恶心，面色黑黯，鬓发脱落，头旋眼黑，经候不匀，腰腿疼痛，肋肋胀满，不欲饮食，手足烦热，肢节酸疼，或寒或热，发歇无时。

36083 安息香丸

《直指小儿》卷二。即《幼幼新书》卷十引《庄氏家传》“安息香膏”改为丸剂。见该条。

36084 安息香丸

《瑞竹堂方》卷二。为《鸡峰》卷十二“炼阴丹”之异名。见该条。

36085 安息香丸

【方源】《本草纲目》卷三十四引《全幼心鉴》。

【组成】安息香(酒蒸成膏) 沉香 木香 丁香 藿香 八角茴香各三钱 香附子 缩砂仁 炙甘草各五钱

【用法】上为末，以膏和，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，以紫苏汤化下。

【主治】小儿肚痛，曲脚而啼。

36086 安息香汤

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】安息香半两

【用法】上为末。分为二服，以热酒和服，不拘时候。

【主治】恶疮入心欲死。

36087 安息香汤

【方源】《普济方》卷二二三。

【组成】安息香(研)五钱 天灵盖一片(涂酥炙透) 青木香 阿魏(醋化，去沙石，入面作饼子，焙) 甘草(炙，锉)各一两

【用法】上为散。每服三钱，童便一盞半，豉百粒，葱白三寸(拍破)同煎至七分，去滓温服。

【主治】虚劳瘦瘠。

36088 安息香汤

【方源】《普济方》卷二三七。

【组成】安息香 麝香(研)各一钱 天灵盖(酥炙黄)三两 秦艽(去苗土) 鳖甲(去裙襴，炙令黄) 当归(切，焙) 柴胡(去苗)各一两

【用法】上为粗末。每服四钱，童便一盞半，葱白五寸，桃柳枝各七寸，生姜(钱大)二片，同煎至八分，去滓，不拘时候服；夜卧时再煎，放患入床头，至五更，形于梦寐，此

是药效也。

【主治】传尸劳瘵，喘气咳嗽，心胸满闷，渐至羸瘦。

36089 安息香散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】安息香二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 虎胥骨二两（涂酥，炙令黄）

【用法】上为细末。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】风腰脚疼痛冷痹，及四肢无力。

36090 安息香散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】安息香半两 阿胶半两（捣碎，炒令黄燥） 黄连一两（去须，微炒） 桃白皮一两（锉） 汉椒一分（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为细末。每服一钱，食前以粥饮调下。

【主治】休息痢，发歇不恒，羸瘦少力。

36091 安息香煎

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】安息香 苏合香 檀香 藿香 甘草 胆南星各等分

【用法】上为细末，姜汁调作小饼。每用磨化，涂奶上及焚烟。

【主治】小儿物忤逆触。

36092 安息香膏

【方源】《幼幼新书》卷十引《庄氏家传》。

【组成】安息香 桃仁（麸炒） 蓬莪术（湿纸裹煨） 史君子（焙）各半两 干蝎一分 阿魏一钱 茴香（炒）三钱

【用法】阿魏、安息香，酒少许，汤内蒸，去土沙，入余药末研，炼蜜为膏，如皂子大。以姜薄荷汤化下。

【主治】气钩，内钩，虫痛，外疝，心腹痛。

【备考】本方改为丸剂，名“安息香丸”（见《直指小儿》卷二。）

36093 安儿至宝汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参五钱 白术五钱 茯苓三钱

巴戟天三钱 附子一钱 麦芽一钱 枳壳三分 槟榔三钱 车前子二钱 白豆蔻三钱 扁豆二钱 萝卜子一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾胃虚寒，上吐下泻，眼目上视，死亡顷刻，其状宛似慢惊风。

【方论选录】此方全在用参、附之多，所以能夺命于将危，以人参能回阳气既绝，附子能续阴于已亡也；然非群药佐之，则阴阳不能分清浊，而积秽亦不能祛除耳，故用参、术以补气，少少祛除，自能奏功。

36094 安中归气汤

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】当归 羌活 独活 厚朴 半夏 曲 麦芽 苍术 陈皮 米壳 甘草 续断 桔梗 茴香 川芎 南星 槟榔 芍药 熟地黄各等分

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】男子、妇人元阳虚惫，一切远近气疾，上攻头目及喘息，虚浮肿满，下注腿腰腹膝浮满，气噎心惊，十种水气，五种疟疾，三十六种风，二十四般气，咳嗽呕逆，远近泄利。

【加减】春，加阿胶；夏，加甘草；秋，加官桂；冬，加干姜；咳嗽，加杏仁、阿胶。

36095 安中调气丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】广皮二两 半夏（姜制）一两 白茯苓一两 白术（土炒）二两 枳实（麸炒）一两 苏子（炒）六钱 川芎五钱 当归（酒洗）五钱 白芍药（盐酒洗，炒）八钱 木香一钱 甘草（炙）三钱 香附三两（长流水浸三日，洗净，炒黄色） 神曲（炒）一两 黄连（姜汁浸，晒干，猪胆汁拌炒）一两 白豆蔻五钱 萝卜子（炒）五钱

【用法】上为细末，竹沥、姜汁、神曲打糊为丸，如绿豆大。每服八十丸，以白汤送下；清米汤亦可。不拘时候。

【主治】一切翻胃痰膈之症。

34096 安心绝梦汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】人参一钱五分 麦冬三钱 茯神白术 菟丝子各一钱五分 熟地五钱 玄参五钱 芡实 山药各二钱五分 五味五分 丹参 莲子心 枣仁 沙参 归身各一钱五分 陈皮二分

【用法】水煎服。

【主治】劳心过度而梦遗者。

34097 安冲调经汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】山药五钱 白术三钱 炙甘草二钱 石莲三钱 川续断三钱 熟地四钱 椿根白皮三钱 生牡蛎一两 乌贼骨四钱

【功用】平补脾肾，调经固冲。

【主治】脾肾不足，挟有虚热，月经先期，月经频至，或轻度子宫出血。

34098 安妊进食汤

【方源】《简明医教》卷七。

【组成】黄芩(条实者) 白芍药 白术各一两 砂仁五钱

【用法】分四剂。水煎服。

【主治】妊妇不食，胎气冲心，遍身疼痛欲死。

34099 安坤赞育丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】桑寄生十六两 青毛鹿茸(去毛)九十六两 乳香二十四两 血余八两 艾炭三十二两 紫河车八十具(每具约一两五钱) 蚕绵炭八两 大熟地六十四两 杜仲三十二两 茯苓三十二两 桂圆肉四十两 鸡血藤十六两 香附三百八十四两 山茱萸三十二两 鹿角胶二十四两 锁阳三十二两 鳖甲(炙)三十二两 酸枣仁(生炒各半)六十四两 白薇三十二两 琥珀十六两 元胡(醋炙)三十二两 白芍六十四两 甘草十六两 鸡冠花二十四两 枸杞子二十四两 没药(炙)四十八两 人参(去芦)八两 乌

药十二两 牛膝五十六两 补骨脂(盐炒)四十四两 当归六十四两 黄柏三十二两 阿胶九十六两 天冬四十六两 藏红花三两二钱 黄耆二十四两 菟丝子十六两 龟版(炙)三十二两 秦艽三十二两 川牛膝五十六两 肉苁蓉二十四两 鹿尾五两 沙参四十八两(以上均下罐，用黄酒一千九百一十两蒸四昼夜) 川断四十两 川芎四十八两 沉香五十二两 泽泻三十二两 丹参八两 黄芩四十两 赤石脂二十四两 于术四十八两 木香(煨)二十四两 大生地六十四两 苏叶二十两 柴胡二十四两 橘皮五十六两 肉果(煨)二十四两 白术(炒)九十六两 青蒿二十四两 橘红三十二两 远志(去心，炙)三十二两 藁本二十四两 阳春砂九十六两 红花十六两(上为细末，铺槽搅匀，晒干)

【用法】上为极细末，每细末三百二十两兑益母膏汁六十四两，再兑炼蜜为大丸，重四钱，蜡皮封固。每服一九，每日三次，温开水送下。

【功用】益气调经。

【主治】妇女气虚血亏，经血不准，崩漏带下，腹痛腰酸，骨蒸潮热，而色痿黄。

【宜忌】忌气恼、生冷。

34100 安坤赞育丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】桑寄生 乳香 蕲艾 熟地 杜仲 制香附 山茱萸 鳖甲 没药 琥珀 白芍 乌药 当归 红花 龟版 泽泻 砂仁 柴胡 广陈皮 远志 酸枣仁各八两 木香二两 川芎四两 沉香四两 青毛鹿茸四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一九，白开水送下。

【主治】妇女月经不调，崩漏带下，腰酸腹痛，而色萎黄。

【宜忌】忌气恼及辛辣生冷等物。

34101 安坤赞育丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】益母草二斤(分作四分,用盐水、黄酒、姜汁、醋炙,干燥备用) 香附四两(用盐水、黄酒、姜汁、醋分四分炙) 黄芩四两 粉甘草四两 白芍(酒炒)四两 赤芍(酒炒)一两 川贝(去心)一两 血竭一两 丹参四两 陈皮一两 川芎一两 阿胶一两(蛤粉炒) 南红花一两 生地二两 熟地三两 麦芽二两 当归(酒炒)一两 乳香(炒透)五钱 没药(炒透)五钱 砂仁二两 木香一两 云苓一两 丹皮一两 杜仲(炒炭)一两 蕲艾一两(炒炭) 白术(土炒)一两 寸冬一两

【用法】上为极细末,水泛小丸,如绿豆大,朱砂为衣。早、晚各服二钱,腹痛下痢,呕吐,姜汤送服;产后诸症,黄酒送服;余皆白开水送下。

【主治】月经不调,经期腹痛,胸膈痞闷,赤白带下。

【宜忌】禁忌生冷食物。

36102 安枕无忧散

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】陈皮 半夏(制) 白茯苓 枳实(炒) 竹茹 麦冬(去心) 圆眼肉 石膏各一两五分 人参五钱 甘草一钱

【用法】水二钟,煎八分,温服,滓再煎服。

【主治】心胆虚怯,昼夜不得眠。

36103 安卧如神汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【异名】安睡如神汤(《医学集成》卷三)。

【组成】茯苓 茯神 白术 山药 寒水石(煨) 枣仁各一钱 远志 炙草各七分 朱砂五分 人参四分

【主治】通宵不寐。

36104 安肺宁嗽丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】嫩桑叶一两 儿茶一两 硼砂一两 苏子一两(炒,捣) 粉甘草一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,三钱重。早、

晚各服一九,开水送下。

【主治】肺郁痰火及肺虚热作嗽;兼治肺结核。

【方论选录】肺脏具 辟之机,治肺之药,过于散则有碍于阖,过于敛则有碍于辟。桑得土之精气而生,故长于理肺家之病,以土生金之义也;至其叶凉而宣通,最解肺中风热,其能散可知;又善固气化,治崩带脱肛,其能敛可知,敛而且散之妙用,于肺脏阖辟之机尤投合也。蓬砂之性凉而滑,能通利肺窍;儿茶之性凉而涩,能安敛肺叶,二药并用,与肺之阖辟亦甚投合。又佐以苏子之降气定喘,甘草之益土生金,蜂蜜之润肺清燥,所以治嗽甚效也。蓬砂、儿茶,医者多认为疮家专药,不知其理痰宁嗽,皆为要品。且二药外用,能解毒化腐生肌,故内服亦治肺结核,或肺中损烂,亦甚有效验。

36105 安肺桔梗汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】杏 葵 枳 桔 归 香 二母 桑皮 防己 百合 苡仁 地骨 葶苈 五味 草

【功用】利气疏痰,降火排脓。

【主治】肺痈由热蒸肺窍,致咳吐臭痰,胸胁刺痛,呼吸不利。

36106 安荣养胎汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参(少者,以山药四钱炒黄代之) 白术 归身 熟地 杜仲(姜炒) 阿胶(蛤粉炒)各一钱半 艾叶八分 条芩(酒炒) 黄柏(炒) 白芍各一钱 炙草七分(或加三七根二钱)

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【主治】孕妇气血两虚,六脉微弱,不时下血者。

【加减】如血热甚者,加生地、青蒿、丹皮之属;如骨蒸多汗者,加地骨皮一钱半;如热甚而渴者,加石膏二、三钱;如五心热,加玄参一钱半;如下热便涩者,加栀子一钱。

36107 安胃化痰汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】陈皮 黄连 半夏 当归 贝母 枳实 麦冬 甘草 白术 白茯苓 苏梗 覆花 枇杷叶

【用法】加生姜三片，竹茹一团，水煎，食远服。

【主治】胸膈有痰不宽，呕吐，如有碍者。

36108 安胃白术散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】白术二两 茯苓 藿香 厚朴 半夏 甘草 黄橘皮各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚，胸膈膨闷，心腹胀满，呕逆恶心，噎气吞酸，口淡无味，四肢倦怠，全不思食。

36109 安胃行血汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】芎藭一钱 当归四钱 人参一钱 桃仁十粒 姜炭 炙草各五分 藿香 砂仁各四分 姜三片（有汗勿用）

【功用】消块，温胃。

【主治】产后七日内呕吐不止，全不纳谷，血块未除。

36110 安胃和中汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】山楂 槟榔 草果 藿香 白豆蔻各一钱五分 半夏（姜矾制）南星（泡过） 厚朴 苏梗各一钱

【用法】加生姜十片，水煎服。

【主治】饮食过多，一时不能克化，胃窄不能容，又挟寒邪于内，而致呕吐者。

36111 安胃和脾散

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】净苍术二两（用生姜二两，切作片子，一同捣烂，炒黄色） 厚朴（去粗皮，同前治） 小枣儿二十四个（去核，焙干） 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 广术（煨，锉） 青皮（去白） 木香 藿香叶 泽泻

缩砂仁 槟榔 甘草（炙，锉）各半两 陈皮（去白）一两（一方无木香）

【用法】上为细末。每服一二钱，煎生姜汤调下，每日二次。

【主治】小兒脾胃不和，中脘气痞，心腹胀满，全不思食，呕吐痰噎，逆气吞酸，面色痿黄，肌肉消瘦，腹肋刺痛，泄泻不止，便利不调，少力嗜卧，脾胃虚弱，饮食不化。

【宜忌】忌一切生硬冷物。

【备考】《古今医鉴》无青皮、陈皮，有人参。

36112 安胃定胎散

【方源】《产科心法》卷上。

【组成】白术一钱 陈皮七分 砂仁五分 茯苓一钱 当归身八分 藿香三分

【用法】加老姜一片，炒米二钱，水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】妇人见食不喜食，或恶心而吐，或体倦欲卧，虽体质平常，孕脉不现，此是人病脉不病，服本方数剂，孕脉自现矣。

【加减】如恶心而吐痰者，加制半夏五分。

36113 安胃醒脾汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】白术 白茯苓各一钱 滑石（水飞）砂仁（炒）各七分 木香（煨）五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】脾胃俱受病，吐泻兼作者。

【加减】停食，加枳实、山楂、曲蘖；挟惊，加胆星、天麻；风，加防风、干葛；暑，加香薷、扁豆；虚，加人参；内有热，加黄连；口渴，加乌梅肉；吐不止，加藿香；泻不止，加升麻。

36114 安胎万全汤

《仙拈集》卷三。为《医林绳墨大全》卷九“安胎万全神应散”之异名。见该条。

36115 安胎万全饮

《胎产心法》卷上。为《万氏女科》卷二“安胎饮”之异名，见该条。

36116 安胎止痛汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【异名】止痛汤（《准绳·女科》卷四）。

【组成】当归 阿胶（炙） 干地黄 黄连 芍药各一两 鸡子一枚 秫米一升

【用法】上切。以水七升，搅鸡子令相得，煮秫米令如蟹目沸，去滓，纳诸药，煮取三升，分四服。

【主治】妊娠重下，痛引腰背。

【宜忌】忌芜荑。

36117 安胎四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄各一钱 地榆 续断 木香 前胡 丹参 紫苏 阿胶（炒） 砂仁 艾叶（醋炒）各五分

【用法】上锉。加葱白二根，水煎，空心服。

【主治】胎气不安，腹疼重坠。

36118 安胎四物饮

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】四物汤加肉桂 厚朴 枳壳 槟榔

【主治】妊娠诸痛。

36119 安胎白术汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白术（锉，麸炒）四两 桂（去粗皮）二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）二两半 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两 甘草（炙，锉） 芍药 芎藭各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一枚（擘破），煎至六分，去滓，食前热服。

【主治】妊娠腹痛痞刺。

36120 安胎白术散

《卫生宝鉴》卷十八。为《金匱》卷下“白术散”之异名。见该条。

36121 安胎白术散

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】白术 川芎各一两 吴茱萸（汤泡）半两 甘草（炙）一两半

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒调下。

【功用】补荣卫，养胎气。

【主治】妊娠宿有冷，胎痿不长，或失于将理，伤胎多堕。

【宜忌】忌生冷果实之物。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇笺注：天地以大气春生夏长，人身以心肝应之，若有宿冷者，春气不温也，以吴茱萸温之；胎痿不长者，夏气不大也，以川芎大之；白术、甘草乃培土以补其母也。

36122 安胎白术散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】白术 橘红 人参各一钱 前胡 川芎 麦冬 赤茯苓各七分 甘草 半夏各五分

【用法】上咬咀。加生姜五片，竹茹一团，水煎，食前服。

【主治】妊娠烦热头疼，烦闷，胎气不安，吐逆不食。

36123 安胎达生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】紫苏 陈皮 川芎 人参 白芍 甘草 当归 大腹皮 生姜 葱白

【用法】水煎服。

【主治】怀孕八九月，胎动不安，或跌伤痿上，心腹腰痛。

36124 安胎当归丸

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】干姜一分 当归二分 芎藭二分 胶四分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如小豆大。每服五丸，一日三次。

【主治】妊娠腹痛，心胸胀满不调。

36125 安胎当归汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【组成】当归 阿胶（炙） 芎藭 人参各一两 大枣十二枚（擘） 艾一虎口

【用法】上切。以酒水各三升合煮，取三升，去滓，内胶令烊，分三服。

【主治】妊娠五月日，举动惊愕，胎动不安，

下在小腹，痛引腰脇，小便疼，下血。

36126 安胎当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】当归(切，焙) 桑寄生各半两 芎藭一分半 阿胶(炒燥)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，入葱白三寸(切)，鼓三十粒，同煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠胎动，烦热满闷。

36127 安胎如圣丹

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】鲤鱼一个

【用法】煮，并汤食之。

【主治】胎气动。

36128 安胎如圣饮

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】条芩(实者) 白术 归身 砂仁(连壳炒，研) 枳壳 甘草 大腹皮(黑豆水煮三五次) 陈皮 桑树上羊儿藤

【用法】水煎服。

【主治】孕妇痘热不安。

36129 安胎如胜饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】当归二钱 白术(蜜炙)一钱五分 黄芩(酒炒) 白芍(酒炒) 砂仁(炒，去衣) 茯苓 川断(酒蒸)各一钱 炙甘草五分

【用法】水一钟半，煎七分服，六日进一服。

【主治】妊娠六月胎气不和，卒有所动不安，或腹痛，或胀闷。

36130 安胎扶元饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】枳壳(麸炒) 制香附 川续断 白术各一钱 丹参 前胡 黄芩各八分 阿胶一钱半(蛤粉炒) 苏梗一钱 广皮五分 砂仁末六分

【功用】安胎扶元。

【主治】子悬。

36131 安胎利气饮

《宋氏女科》。为《女科百问》卷下“安胎和气散”之异名。见该条。

36132 安胎利水汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】东洋参一钱半 生于术一钱半 大腹皮三钱 阳春砂六分(冲) 茯苓皮三钱 家苏梗二钱 天仙藤三钱 冬葵子三钱

【功用】扶正利水，防胎不足而临产。

【主治】妊娠八九月，浑身肿胀，小便不利，不任行动。

36133 安胎补火汤

【方源】《寿世新编》。

【组成】大熟地五钱(净西砂仁末一钱二分同捣烂) 北枸杞三钱 菟丝饼二钱 正关鹿膏三钱(牡蛎粉拌炒) 破故脂三钱(盐水炒) 川续断二钱(酒炒) 白归身三钱(酒炒，大便溏者用土炒) 正川芎一钱二分 酒杭芍二钱 淮山药四钱 抱茯神三钱 台乌药二钱(后炆)

【用法】桂圆肉七枚为引，初漏之时，急以水浓煎服。久之如口觉干，再加米炒结西洋参二三钱，另炖汁对冲。

【主治】下焦虚冷，命门火衰，不能载胎，而致四五月胎常下坠，腹常胀满，始则漏胎，甚则血大下，腹大痛而堕。

【加减】脾虚火衰，常患腹痛泄泻者，加陈土炒干术二钱。

36134 安胎阿胶散

《卫生宝鉴》卷十八。为《活人书》卷十九“阿胶散”之异名。见该条。

36135 安胎和气饮

【方源】《女科万金方》。

【异名】安胎和气散(《胎产新书》)。

【组成】桔梗 藿香 陈皮 苍术 砂仁 黄芩 益智仁各二钱 旧枳壳三钱 厚朴 甘草 苏叶各一钱 小茴香(炒)一钱五分

【用法】分三服。每服用白水一钟半，煎七分，空心热服，滓再煎。凡有惯堕胎者，一月间须进两服。保过五个月则不用也。

【功用】《郑氏家传女科万金方》：安胎和气。

【主治】胎前二三个月，因挑砖、换石、移床、铺席伤触胎气，以致不安，头晕眼花，恶心呕吐，不思饮食。

36136 安胎和气饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】陈皮 苍术 厚朴 甘草 桔梗 枳壳 香附 木香 当归 熟地 白术 黄芩

【用法】加生姜三片，砂仁五粒，水煎服。

【主治】胎感寒气，饮食少进，乏力寒热。

36137 安胎和气饮

《奇效良方》卷六十三。为《女科百问》卷下“安胎和气散”之异名。见该条。

36138 安胎和气饮

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】归身 白芍各一钱 白术 黄芩 苏叶各一钱半 炙草 砂仁各五分

【用法】加生姜、大枣为引，水煎，食前服。

【主治】跌扑触动，胎动不安。

36139 安胎和气饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【异名】达生散（《女科切要》卷三）。

【组成】白术 陈皮 白芍 木香

【用法】加生姜三片，陈米一撮，水煎服。

【主治】肾间虚热而致子淋，甚者心烦闷乱。

36140 安胎和气饮

【方源】《一盘珠》卷六。

【组成】黄芩 熟地 当归 川芎 白芍 人参 甘草 砂仁 陈皮 苏叶 煨姜各等分

【用法】同煎。怀胎五六个月可服数剂。

【功用】和胎气。

36141 安胎和气饮

《大生要旨》卷二。为《叶氏女科》卷二“安胎和气散”之异名。见该条。

36142 安胎和气饮

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】白芍 木香 益智仁 砂仁 香附 紫苏 甘草

【用法】加葱，水煎服。

【主治】妊娠头晕恶心，不喜饮食，六脉浮紧。

36143 安胎和气饮

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】当归 白芍 生地 川芎 条芩 白术 砂仁

【用法】河水煎服。

【主治】孕妇受伤。

36144 安胎和气散

【方源】《女科百问》卷下。

【异名】安胎和气饮（《奇效良方》卷六十三）、安胎利气饮（《宋氏女科》）、安和饮（《医钞类编》卷十七）。

【组成】诃子（煨） 白术各一两 陈皮 高姜（炒） 木香（煨） 白芍药 陈米（炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胎冷，腹胀虚痛，两胁虚鸣，脐下冷疼欲泄，小便频数，大便虚滑。

【宜忌】忌生冷。

36145 安胎和气散

《普济方》卷三四二引《医学类证》。为原书同卷“木香散”之异名。见该条。

36146 安胎和气散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【异名】安胎和气饮（《大生要旨》卷二）。

【组成】白术（蜜炙）一钱五分 广陈皮（去白，盐制） 白芍（炒） 黄芩（酒炒）各一钱 当归身一钱六分 茯苓八分 香附（盐水制）二钱 川芎 炙甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠四月，倦卧不安，或口苦头痛，脚弱及肿急。

【加减】如热多，加山梔仁（炒黑）一钱。

36147 安胎和气散

《胎产新书》。为《女科万金方》“安胎和气

饮”之异名。见该条。

36148 安胎和伤汤

【方源】《林如高骨伤验方歌诀方解》。

【组成】生地 9 克 白芍 9 克 白术 9 克
当归 9 克 枳壳 6 克 朱砂 6 克 茯神 9 克
续断 9 克 木香 3 克 甘草 3 克

【用法】水煎服。

【功用】镇静安胎，和伤止痛。

【主治】孕妇受伤。

【方论选录】本方用茯神、朱砂镇静安神；当归、生地、白芍补血和血；白术、甘草补脾益气，以生气血；续断补肝肾，且可增强安胎之效；木香、枳壳理气止痛。故本方有镇静安胎、和伤止痛之作用。

36149 安胎织罩散

《准绳·女科》卷四。为《妇人良方》卷十二“安胎铁罩散”之异名。见该条。

36150 安胎枳实散

【方源】《医方类聚》卷二二七引《川玉集》。

【组成】枳实二分（炒） 艾叶 阿胶（炙） 前胡 芍药 石韦（去皮）各一分

【用法】上为散。每服一钱，加糯米一撮，葱白两茎（拍破），水一盞半，煎至一盞，去滓温服。

【主治】妇人妊娠伤寒，至五六日未愈，心腹上气，焦渴不止，食饮不下，腰疼体重。

36151 安胎顺气饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】紫苏 陈皮 白术 当归 川芎各等分 人参 甘草各减半 生姜五片 葱白七寸 砂仁三粒 木香三分

【用法】磨汁，加生姜，水煎服。

【主治】火盛胎热，气逆凌心所致子悬。

36152 安胎顺血汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【异名】安胎顺血散（《胎产新书》）。

【组成】诃子（制）

【用法】水煎，温服。

【主治】妊娠阴肿，胎气不能游动所致。

36153 安胎顺血散

《胎产新书》。为《叶氏女科》卷二“安胎顺血汤”之异名。见该条。

36154 安胎独圣丹

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】砂仁（炒，研，酒调下五分） 人参 黄耆 川芎 当归 白芍 甘草 防风 白芷 桔梗 官桂 木香

【主治】出痘胎动。

【加减】痘色红紫，去桂、香，加紫草、蝉蜕；痘色淡白，去防风、白芷，加糯米；胃虚不食，加人参。

36155 安胎独圣散

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【组成】砂仁（炒）

【用法】上为末。每服五分，酒调下。

【主治】孕妇出痘动胎。

【方论选录】《医方考》：缩砂辛温，利而不滞，故可以利气，可以安胎。

36156 安胎神应丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【异名】加味神应丸。

【组成】补骨脂（盐水炒）二两 肉果（面裹，煨）七钱 山茱萸三两（去核） 扁豆（炒，去壳）二两 大熟地（砂仁酒煮）四两 当归（酒洗）三两 白术（土炒）四两 木香五钱 山药（炒）三两 杜仲（盐水炒）三两 生姜四两（切片） 大枣八十枚（去皮核，同姜片煮一昼夜，去姜） 神曲（炒）四两

【用法】神曲磨筛极细，同蜜炼，入前药，并枣肉为丸。每服七十丸，白天二次，夜间一次，米饮或酒送下。

【功用】益火之源，以消阴翳，大补脾胃。

【主治】妊娠每日五更之时必起泄一、二次者，命门火衰不能运化水谷所致。

【方论选录】是方骨脂、肉果补命门之火为君；归、地、甘苦温以养血，术、药苦温平涩以健脾为臣；茱、仲酸盐以固肾，木香辛

温以运气，扁豆甘淡以利水，姜、枣一辛一甘以和荣卫佐戊己以成功；神曲糊丸消谷运脾以为使。则火旺而上强，饮食进而血长胎安而泄止矣。

36157 安胎铁罩散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【异名】安胎织罩散（《准绳·女科》卷四）。

【组成】白药子一两 白芷半两

【用法】上为细末。每服二钱，煎紫苏汤调下；或胎热，心烦闷，入砂糖少许煎。

【主治】胎动不安。

36158 安胎凉膈饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】知母 麦冬 人参 芦根 葛根 黑梔 竹茹 葱白

【用法】水煎服。

【主治】孕妇热呕。

36159 安胎调气饮

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】人参 白术（炒） 炙甘草 熟地 当归 白芍（酒炒） 川断 杜仲 陈皮 砂仁

【主治】妊娠元气不足，怠倦不能承载，胎动不安。

36160 安胎寄生汤

【方源】《外台》卷三十三注文引《小品方》。

【组成】桑上寄生五分 白术五分 茯苓四分 甘草十分（炙）

【用法】上切。以水五升，煮取二升半，分三服。

【主治】①《外台》引《张文仲方》：妊娠流下。②《景岳全书》：妊娠下血，或胎不安，或腰腹作痛。

【宜忌】忌海藻、菘菜、酢物、桃、李、雀肉。

【加减】若人壮者，可加芍药八分；若胎动不安，腹痛端然有所见，加干姜四分。

36161 安胎鲤鱼粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】鲤鱼一头（重一斤，去鳞鬣肠胃，细切） 苈根一两（干者，净洗，锉） 糯米五合

【用法】以水三碗，先煎苈根，取汁二碗，去滓，下米并鱼煮粥；入五味，空腹食之。

【主治】妊娠因伤动，腹里疝痛。

36162 安宫牛黄丸

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】新定牛黄清心丸（《重订通俗伤寒论》）、安宫丸（《全国中药成药处方集》（吉林方））

【组成】牛黄一两 郁金一两 犀角一两 黄连一两 朱砂一两 梅片二钱五分 麝香二钱五分 真珠五钱 山梔一两 雄黄一两 金箔衣 黄芩一两

【用法】上为极细末，炼老蜜为丸，每丸一钱，金箔为衣，蜡护。脉虚者，人参汤送下；脉实者，银花、薄荷汤送下。每服一丸，大人病重体实者，每日二次，甚至每日三次，小儿服半丸，不知，再服半丸。

【功用】①《温病条辨》：芳香化浊而利诸窍，咸寒保肾水而安心体，苦寒通火腑而泻心。②《全国中药成药处方集》（北京方）：解热去毒，通窍镇静。

【主治】①《温病条辨》：太阴温病。发汗而汗出过多，神昏谵语；飞尸卒厥，五癍中恶，大人小儿痉厥因于热者；手厥阴暑温，身热不恶寒，精神不了了，时时谵语；邪入心包，舌蹇肢厥；阳明温病，斑疹、温痘、温疮、温毒，发黄，神昏谵语，脉不实。②《全国中药成药处方集》（北京方）：瘟毒热盛，神昏谵语，狂躁不安，浊痰内闭，痉厥抽动，不省人事，瘟毒斑疹，口渴目赤，言语不清。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（北京方）：孕妇忌服。

【方论选录】①《温病条辨》：牛黄得日月之精，通心主之神；犀角主治百毒、邪鬼、瘴

气；真珠得太阴之精，而通神明，合犀角补水救火；郁金草之香，梅片木之香，雄黄石之香，麝香乃精血之香，合四香以为用，使闭固之邪热温毒深在厥阴之分者，一齐从内透出，而邪秽自消，神明可复也；黄连泻心火，栀子泻心与三焦之火，黄芩泻胆、肺之火，使邪火随诸香一齐俱散也；朱砂补心体，泻心用，合金箔坠痰而镇固，再合真珠、犀角为督战之主帅也。②《成方便读》：热邪内陷，不传阳明胃腑，则传入心包。若邪入心包。则见神昏谵语诸证，其势最虑内闭。牛黄芳香气清之品，轻灵之物，直入心包，辟邪而解秽；然温邪内陷之证，必有粘腻秽浊之气留恋于膈间，故以郁金芳香辛苦，散气行血，直达病所，为之先声，而后芩连苦寒性燥者，祛逐上焦之湿热；黑栀清上而导下，以除不尽之邪；辰砂色赤气寒，内含真汞，清心热，护心阴，安神明，镇君主，辟邪解毒。

【临证举例】①急性肝昏迷《江西中医药》(1960; 12: 31): 钟某某，男，5岁。前二天脸上略现黄色，四肢软弱，精神困倦，略有冷热，当时检查指纹色紫，舌苔黄腻，全身黄色，而无表情，体温38.5℃，小便红赤。曾用茵陈等清热利湿退黄中药及青霉素、肝精注射二天无效，反而进入昏迷状态。患者欲转县人民医院治疗，行至中途，牙关紧闭，手足抽搐，认为绝望，转来治疗。经会诊采用安宫牛黄丸一颗，分二次化服。次日复诊，诸症大减，续用此丸半颗，另用中药清热利湿退黄，并注射肝精、葡萄糖，每日一次，连治三天痊愈。②流行性乙型脑炎《福建中医药》(1957; 2: 5): 治疗乙脑83例，死亡13例。死亡率为15.66%，有后遗症者2例。作者认为，对于完全昏迷的患者，需持续应用足量的安宫牛黄丸为主，至3~4日之久。再加针刺十宣、曲池、合谷、涌泉等才能收效。③急性脑出血昏迷《中华内科杂志》(1959; 1: 11): 用针刺配合本方治疗急性脑出血昏迷16例，9例生命获得挽救，其中3例完全

恢复健康，疗效为56.3%，死亡率降低至43.7%。方法：用轻而短的手法针刺人中等穴的同时，内服本方（不能吞咽者鼻饲），每日1~4丸，随证增减。④副鼻窦炎《浙江中医杂志》(1985; 8: 376): 治疗副鼻窦炎24例，其中病程半年以内者4例，半年~1年者8例，1年以上者12例。均有头痛头晕，鼻塞或流浊涕，嗅觉减退，口干红，舌质粗红，苔黄，脉滑数等症状，急性发作时头痛剧烈，痛处灼热拒按，怯寒发热。选用安宫牛黄丸内服，并用纱布或药棉外裹少许塞入患侧鼻孔，5~7天为一疗程，一般用1~2个疗程。治后18例症状消失，随访半年以上未复发；6例症状显减，或症状消失但半年内又有轻度发作。

【现代研究】剂型改革《新医药学杂志》(1975; 8: 12): 作者通过对原方分析，将其药物分为清热解毒，镇静安神和芳香化浊，辟秽开窍两类。在清热镇静类药物中，去药源稀少的牛黄，代之以牛黄有效成份牛胆酸和猪胆酸；去价格昂贵的犀角、珍珠，代之以有效成分基本相同的水牛角、珍珠母；去抑菌作用因受氨基酸拮抗而削弱的黄连，另加板蓝根以增强清热解毒功用，并去汞化合物朱砂和基本无药效金箔，依法配制成复方制剂，定名为清开灵（I）注射液。在芳香开窍类药物中，以价廉的麝香皮代替麝香，去辛温有毒的雄黄，加行气化湿，芳香开郁的藿香，配制成复方酊剂，定名为清开灵（I）滴鼻液。分别供肌肉注射和滴鼻用。经临床验证，效果良好。

【备考】按：《全国中药成药处方集》（北京方）将本方改为散剂，名“安宫牛黄散”。

36163 安宫牛黄散

《全国中药成药处方集》（北京方）。即《温病条辨》卷一“安宫牛黄丸”改为散剂。见该条。

36164 安神止痛汤

【方源】《林如高骨伤验方歌诀方解》

【组成】琥珀6克 莲子24克 党参15

克 白芍 15 克 生地 9 克 淮山 15 克 黄耆 9 克 酸枣仁 9 克 三七 3 克 醋元胡 6 克 制乳香 4.5 克 制没药 4.5 克 朱茯神 9 克 远志 6 克 甘草 3 克 双钩藤 9 克

【用法】水煎服。

【功用】宁心安神，益气镇痛。

【主治】重伤痛极，夜寐不安。

【方论选录】本方用琥珀、远志、酸枣仁、茯神安神宁心；双钩藤平肝止痉；“心藏神”，心主血脉，神赖气血濡养，党参、黄耆、淮山、生地、白芍、甘草补气补血；莲子养心补肾，益十二经脉血气；佐以乳香、没药、三七、玄胡活血化瘀，消肿止痛，遂成宁心安神、益气镇痛之功。

36165 安神化痰汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】茯神 远志 陈皮 半夏 杏仁 石菖蒲 麦冬 桔梗 甘草

【功用】安神化痰。

【主治】中恶，牙关紧急，昏不知人，头面青黑，肌肤栗起。

【加减】有食，加枳壳、厚朴。

36166 安神生化汤

【方源】《傅青主女科·产后篇》卷上。

【组成】川芎一钱 柏子仁一钱 人参一二钱 当归二三钱 茯神二钱 桃仁十二粒 黑姜四分 炙草四分 益智八分（炒） 陈皮三分

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后块痛未止，妄言妄见。

36167 安神代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】龙齿三钱（煨） 石菖蒲一钱

【用法】水煎，代茶。

【功用】宁心安神。

【主治】心经病。

【方论选录】方中石菖蒲入心、脾经，具开窍安神之作用，《本经》称本药可“开心孔，补五脏”；龙齿归心、肝经，可镇惊安神、平

肝潜阳，治心悸、惊痫诸证。

36168 安神补气丸

《中药制剂手册》。为《三因》卷九“大补心丹”之异名。见该条。

36169 安神补心丸

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】丹参三十两 五味子（炙）十五两 石菖蒲十两 珍珠母（煨）二百两 夜交藤五十两 旱莲草三十两 合欢皮三十两 生地黄二十五两 菟丝子三十两 女贞子（炙）四十两

【用法】取丹参、石菖蒲为细末，取部分细末与五味子同轧碎，干燥后，为细末，与丹参等细末和匀；将菟丝子轧碎；取珍珠母等七味，用煮提法提取二次，约制稠膏 65 两，制丸，每两约 200 粒。每服十五丸，每日三次；或遵医嘱，温开水送下。

【功用】养心安神。

【主治】由于思虑过度、神经衰弱引起的失眠健忘、头昏耳鸣、心悸。

36170 安神补心汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】当归一钱二分 川芎七分 白芍一钱（炒） 生地黄一钱二分 白术一钱 茯神一钱二分 远志（甘草水泡，去心）八分 酸枣仁（炒）八分 麦门冬（去心）二钱 黄芩一钱二分 玄参五分 甘草三分（一方无远志 麦门冬 黄芩 玄参 加陈皮 柏子仁 酒炒黄连）

【主治】怔忡惊悸。

36171 安神妙香丸

【方源】《圣济总录》卷一九九。

【组成】丹砂半两（研如粉） 松脂三两（炼十次，取一两半） 鹤虱 人参 白茯苓（去黑皮） 狗脊（去毛） 贯众 雄黄（研如粉）各半两 蜡二两 蜜（炼） 乳香（研如粉） 禹余粮（烧三度，研如粉）各一两

【用法】上为末，取十五日合和，先入蜜、

腊、松脂三味于铤子内，化为汁和九味为丸，如皂子大。用糯米一升、杏仁两合（去皮尖双仁，细研）、白腊一两，相合煮粥，饱食一顿，须臾服大豆一合（熟者），仍服药一九，得十八日，续更服一九，得三十四个月，又服一九。若虚无力，吃枣肉三七枚助之，一月后更不服，服时用乳香汤送下；渴，即吃茯苓汤；若要开食时，吃葵菜汤一盏，其药自下。

【功用】镇固肠胃，守炼五脏，消灭九虫，绵永胎息。

【宜忌】戒五辛、色欲、盐、醋。

36172 安神固精丸

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】莲子肉二两 当归一两 金樱一两 芡实 茯神 龙骨 锁阳 牡蛎各八钱 肉桂四钱 川连三钱 远志 枣仁 莲须各六分 生地 黄柏 知母各五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一九，空心淡盐水送下。

【功用】滋补强心，固精安神。

【主治】夜梦遗精，虚弱盗汗，心跳耳鸣，烦躁不宁，头目眩晕，精神衰弱，倦怠无力，睡眠不安。

【宜忌】禁忌五辛、烟、酒。

36173 安神定志丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】人参七钱 远志（去心）一两 茯神（去木） 龙齿七钱 枣仁一两 当归一两 琥珀三钱 朱砂七钱 麦冬（去心）五钱 金箔十张 银箔十张 甘草五分 天竺黄五钱 生地（酒洗）一钱五分（焙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大，金箔为衣。每服三丸，灯心汤化下。

【主治】阴虚血少，神不守舍，恍惚怔忡，健忘。

36174 安神定志丸

【方源】《医便》卷一。

【组成】人参一两五钱 白茯苓（去皮）

白茯神（去心） 远志（去心） 白术（炒） 石菖蒲（去毛，忌铁） 酸枣仁（去壳，炒） 麦门冬（去心）各一两 牛黄一钱（另研） 辰砂二钱五分（水飞，另研，为衣）

【用法】上为末，龙眼肉四两熬膏，和炼蜜三四两为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十九，清米汤送下，每日三次，不拘时候。

【功用】①《医便》：清心肺，补脾胃，安神定志，消痰去热。②《寿世保元》：宁心保神，益血固精，壮力强志，清三焦，化痰涎，育养心神，大补元气。

【主治】①《寿世保元》：咽干，惊悸，怔忡。②《医编》：健忘。

36175 安神定志丸

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】远志一两 人参一两 白茯三钱 菖蒲二钱 琥珀 天花粉 郁金各一两 贝母 瓜蒌各五钱

【用法】上为末，姜汁、竹沥为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱。

【主治】肥人痰迷心膈，惊悸怔忡。

【加减】火盛者，加黄连一两。

36176 安神定志丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】茯苓 茯神 人参 远志各一两 石菖蒲 龙齿各五钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服二钱，开水送下。

【主治】①《医学心悟》：惊恐不安卧，其人梦中惊跳休惕。②《医钞类编》：癫证心中愤乱。

36177 安神定志丸

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】酒地四两 圆肉二两 当归二两 于术一两五钱 川芎一两 菖蒲 茯神 远志（炙）各八钱 枣仁一两 黄芩二两 杭芍 党参 炙草各一两

【用法】上为细末，炼蜜为小丸，或每丸三

钱重，蜡皮封固。每服三钱，开水送下，或清水汤送下。

【功用】安神定志，益气养血。

【主治】心脏衰弱，惊悸失眠，精神恍惚。

36178 安神定志丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】党参 茯苓 柏子仁 远志 枣仁 茯神 当归各一两 琥珀 石菖蒲 乳香各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，朱砂三钱为衣，每丸重三钱。每服一丸，每日二次，温开水送下。

【主治】神志不足，心虚多梦，烦躁盗汗。

36179 安神定志方

【方源】《外台》卷十五引《广济方》。

【组成】金银薄各一百和合 石膏(研) 龙齿(研) 铁精(研) 地骨白皮 茯神 黄芩 生干地黄 升麻 茯苓 玄参 人参 各八分 虎睛一具(微炙) 牛黄 生姜屑 各四分 麦门冬十分(去心) 枳实(炙) 甘草(炙) 蕤蕤 芍药各六分 远志(去心) 柏子仁 白藓皮各五分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，每日二次；渐加至三十丸；食讫，少时煮生枸杞根汁送下。

【主治】风邪狂乱失心。

【宜忌】忌热而、海藻、菰菜、茺莢、炙肉、醋、蒜、粘食、陈臭、油腻。

36180 安神定智汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】益智 远志 当归 白芍 黄耆 天冬 龙骨(煨，炙) 芡实 泽泻各一钱半 茯神 金钗各一钱 甘草三分

【用法】莲肉、梗米、大枣为引，水煎服。

【主治】酒伤心脾，传染膀胱，火熏精漏，神气不爽，饮食少进，赤白二浊。

36181 安神复元汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】黄耆(蜜炙)一钱五分 人参一钱

五分 当归(酒洗)一钱五分 柴胡一钱 升麻五分 黄连(酒炒)一钱 黄芩(酒炒)一钱 黄柏(酒炒)三钱 知母一钱 防风一钱 蔓荆子七分 麦门冬一钱 茯神一钱 酸枣(炒)一钱五分 川芎一钱 甘草五分 甘枸杞子一钱五分

【用法】上锉一剂，加龙眼肉三枚，水煎服。

【主治】思虑烦心而神散，精脱于下，真阴不上泥丸，而气不聚，耳鸣耳重听，及耳内痒。

36182 安神复睡汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】圆眼肉 当归 熟地黄 白芍药 益智 酸枣仁各一两 川芎 远志各五钱(皆照常制)

【用法】上为细末，山药糊为丸；或炼蜜为丸，如绿豆大。临卧沸汤、酒任下。

【主治】诸虚。

36183 安神养血汤

【方源】《温疫论》卷下。

【组成】茯神 枣仁 当归 远志 桔梗 芍药 地黄 陈皮 甘草 龙眼肉

【用法】水煎服。

【主治】疫邪已退，脉证俱平，但元气未复，或因梳洗沐浴，或因多言妄动，遂致劳复发热，前证复起，惟脉不沉实。

36184 安神养志丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】当归 生地 枣仁 黄连 玄参 白术各三两 人参 甘草 胆南星各一两二钱

【用法】上为末，荷叶汤为丸。每服二钱，空心白滚汤送下。

【主治】癫证。

36185 安神益志汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】柴胡 人参 麦门冬 知母 五味子 竹茹 茯苓 远志 生地黄 当归 甘草 黄连(姜炒)

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】伤寒虚烦，心悸微热，四肢无力体倦；又治伤寒六七日，别无刑克症候，昏沉不知人事，六脉俱静者，无脉欲出汗者。

36186 安神清镇丹

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】犀角二钱 朱砂一钱 干漆一钱 山甲片五分 轻粉五分 旱三七二钱 京牛黄五厘 青蒿一捻 甘遂二钱 大黄二钱 麝香三厘

【用法】上为细末，用猪脾一个，阴阳瓦焙焦成炭存性，细研，与药面合一处，稀糊为丸，如梧桐子大。匀二次服，每早服一次。

【主治】痫病，忽然昏倒，目天吊，口嚼舌，手足不能举动者。

【方论选录】方用犀角、京黄、朱砂之凉，大清其热；用麝香、青蒿、山甲、轻粉，引药直达病所；干漆能化有形血块；三七能化血块为水；少佐大黄、甘遂；使其病随吐泻面出；将猪脾焙焦，为其能引药入积块更爽也。

36187 安神犀角丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】犀角（镑） 车前子 白茯苓（去黑皮） 人参各半两 雄黄（研）一两

【用法】上为末，取桃白皮十两、桃符十两，水三升，煎一升，去滓，煎成膏，和前药为丸，如麻子大。每服三丸，桃柳汤送下。

【主治】小儿客忤，惊邪鬼魅。

36188 安神滚痰丸

【方源】《明医指掌》卷七。

【组成】礞石一两（煨） 风化消一两 朱砂一两 沉香五钱 珍珠五钱

【用法】上为末，煎天麻膏为丸，如芡实大。每服三丸，姜汁、竹沥调下。

【功用】①《明医指掌》：利肺安心。②《重订通俗伤寒论》：逐痰醒神。

【主治】①《明医指掌》：痰升致癫。②《重订通俗伤寒论》：痰壅气逆，胸闷呕吐，静

则迷蒙昏厥，躁则狂妄舞蹈，舌苔黄厚而滑。

【方论选录】《医略六书》：青礞石善化顽痰之固结；风化消专泻热结之壅痰；沉香顺气以降逆；朱砂镇心以安神；珍珠乃水精之所结，力能壮水制火，以安神定志；天麻煎膏糊丸，豁痰散结；姜汁、竹沥乃润液散痰，使痰化热降，则心包肃清，神明有主，癫妄自退。此安神下痰之剂，为痰热病癫之专方。

36189 安神镇心丸

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】石菖蒲 远志 人参 茯神 川芎 山药 麦门冬 铁粉 天麻 半夏 南星 茯苓各一两 细辛 辰砂各五钱

【用法】上为末，生姜五两取汁，入水煮糊为丸，如绿豆大，另以朱砂为衣。每服二十五丸，夜卧生姜汤送下，小儿减半。

【功用】消风痰。

【主治】惊悸。

36190 安神镇惊丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】人参（去芦） 白术（炒） 白茯苓（去皮） 明天麻 胆星 橘红 麦门冬各五钱（去心） 甘草（炙）一钱 桔梗 僵蚕（炙）各二钱 木香一钱半 辰砂二钱（水飞） 全蝎十个（洗，炙） 麝香一钱 酸枣仁五钱（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，惊风，薄荷汤送下；伤风，荆芥汤送下；夜啼，灯心汤送下；搐搦，防风汤送下；慢惊，冬瓜子仁汤送下；常服，薄荷、银花汤送下。

【主治】小儿脾胃虚弱，风痰壅塞，昏睡不醒，惊悸搐搦。

36191 安神镇惊丸

【方源】《保婴撮要》卷三。

【异名】百益镇惊丸（《全国中药成药处方集》（杭州方））。

【组成】天竺黄（另研） 人参 茯神 南星（姜制）各五钱 酸枣仁（炒） 麦门冬

当归(酒炒) 生地黄(酒洗) 赤芍药(炒) 各三钱 薄荷 木通 黄连(姜汁炒) 山梔(炒) 辰砂(另研) 牛黄(另研) 龙骨(煅) 各二钱 青黛一钱(另研)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五丸，淡姜汤送下。

【功用】①《保婴撮要》：安心神，养气血。②《全国中药成药处方集》(杭州方)：扶元安神，开膈祛痰。

【主治】①《保婴撮要》：小儿惊退后。②《全国中药成药处方集》(杭州方)：小儿禀赋本虚，感风停食，早进凉药，伤其脾胃，以及病后元虚，将成慢惊，抽搐时作，痰鸣气促，神倦露睛，危险之症。

36192 安神镇惊丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归(酒洗)一两 白芍(煨)一两 川芎七钱 生地(酒洗)一两半 白茯苓(去皮木)七钱 贝母(去心)二两 远志(去心)七钱 酸枣仁(炒)五钱 麦门冬(去心)二两 黄连(姜汁炒)五钱 陈皮(去白)一两 甘草二钱 朱砂一两(研末，飞过)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五十丸，食远枣汤送下。

【主治】血虚心神不安，惊悸怔忡不寐。

36193 安神醒心丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】南星末五两 川连末一两五钱(先以姜汁拌浸半日，入南星末调，和匀成饼，于饭甑内蒸半日) 人参末一两五钱 制远志末一两五钱 飞过辰砂(研)七钱五分 琥珀七钱五分 酸枣仁(炒，研末)一两

【用法】上用雄猪心血三个，入竹沥，面糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服五十丸，食远白汤送下，小者二三十丸。

【主治】①《寿世保元》：小儿大小被惊，神不守舍，痰迷心窍，恍惚健忘，诸痫痲风心风等症。②《医学集成》：痰迷心窍所致惊悸。

36194 安息香煎丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】安息香(别研)半两 木香 沉香 各一两 诃黎勒皮(炮)二两 桂(去粗皮) 白茯苓(去黑皮) 肉豆蔻仁 缩砂仁 芍药 革澄茄 茴香子(微炒) 益智(去皮，炒) 五味子(微炒) 白豆蔻仁 芎藭 当归(切，焙) 丁香皮(锉) 蓬莪术(炮，锉) 京三棱(炮，锉) 莎草根(去毛) 槟榔(锉) 各一两半 硃砂(别研)半两 阿魏一分(细研，用白面少许和作饼子，炙令香熟)

【用法】除别研外，上为末，再同研匀，用蜜三十两，炼熟和为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，温酒或生姜盐汤送下，不拘时候。

【主治】膈气，咽喉噎塞，烦闷呕吐，心胸痞满，腹肋膨胀，不思饮食。

36195 安息活血丹

【方源】《局方》卷九。

【组成】吴茱萸(汤浸七遍，焙干，微炒) 安息香(捣碎，入好酒研，澄去滓，银器内慢火熬成膏) 柏子仁(炒) 山茱萸(去核) 延胡索 桃仁(去皮尖，麸炒微黄色) 虎杖 当归 杜仲(去粗皮，锉，炒) 附子(炮，去皮脐) 木香各二十两 泽兰叶 干姜(炮) 肉桂(去粗皮) 艾叶(微炒) 黄耆(去芦) 牡丹皮各二斤半 肉苁蓉(酒浸，焙) 厚朴(去粗皮，姜汁炙令熟) 各五斤

【用法】上为细末，以前安息香膏入白面同煮作糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下；醋汤亦得。

【主治】冲任不足，下焦久寒，脐腹疼痛，月事不匀，或来多不断，或过期不来，或崩中去血，或带下不止，面色萎黄，肌肉瘦瘠，肌体沉重，胸肋胀满，气力衰乏，饮食减少；一切血气虚寒。

36196 安惊保命丹

【方源】《普济方》卷三七四。

【组成】脑子一片 朱砂一粒 全蝎一个(去尾足) 僵蚕一个

【用法】上为细末。用奶乳调服之。

【主治】小儿惊风。

36197 安喘至圣丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参量须稍大 牛膝三钱 熟地五钱 山茱萸四钱 枸杞子一钱 麦冬五钱 北五味一钱 胡桃三个 生姜五片

【用法】水煎服。

【主治】气虚所致气喘而上者。

36198 安蛔理中汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】人参 白术 干姜 茯苓各一钱半 乌梅三个

【用法】水煎，温服。

【主治】蛔厥。

【加减】如大便闭，加大黄入蜜以利之；口渴，加瓜蒌根。

36199 安蛔理中汤

【方源】《医宗说约》卷四。

【组成】参 术 乌梅 川椒 炮姜 白茯苓 生姜

【用法】水煎服。

【主治】蛔厥，手足冷。

【加减】手足冷甚，加附子；呕，加半夏、陈皮、生姜汁；蛔吐不止，加苦楝根、黄连、细辛；大便秘结，加大黄。

36200 安蛔理中汤

【方源】《医钞类编》卷九。

【组成】花椒三分 干姜 白术 人参 附子(炮) 炙草各一钱 丁香二分 一方有乌梅 砂仁(炒半)，无丁香。

【用法】水煎服。

【主治】小儿吐蛔，虫死不能动者，脾败不能养虫也。

36201 安奠二天汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两(去芦) 熟地一两(九

蒸) 白术一两(土炒) 山药五钱(炒) 炙草一钱 山萸五钱(蒸，去核) 杜仲三钱(炒黑) 枸杞二钱 扁豆五钱(炒，去皮)

【用法】水煎服。

【功用】补脾肾，固胞胎。

【主治】妊娠脾肾亏损，带脉无力，小腹作疼，胎动不安，如有下堕之状。

【临证举例】先兆流产《湖北中医杂志》(1987; 1: 13): 本方加减治疗先兆流产 50 例，基本方: 党参、白术各 24 克，熟地 15 克，山药 20 克，炒杜仲、续断、扁豆各 10 克，菟丝子 15 克，旱莲草 30 克，炙甘草 6 克。腹痛较甚者，加白芍 30 克；血热者，加黄芩 10 克；出血较多者，加地榆炭 15~30 克，阿胶 10 克(烔)；大便干结者，加熟大黄 6 克；纳差腹胀者，去熟地，加砂仁 6 克；恶心呕吐者，加法半夏 10 克，陈皮 6 克。少数病例适当配合西药治疗。结果: 治愈 45 例，无效 5 例。

36202 安魂定魄丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】黑铅二两 水银 硫黄(细研)各一两

【用法】上先销铅成水，次下水银搅令匀，良久，即下硫黄末，当为碧色，匀搅，即去火放冷，细研如粉，以软饭和丸，如绿豆大。每服七丸，以新汲水研服之。

【主治】惊邪癫痫，天行热病，心神狂乱。

36203 安魂琥珀丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】天麻 川芎 防风 细辛 白芷 羌活 川乌(炮，去皮脐) 荆芥穗 僵蚕各一两 薄荷叶三两 全蝎 粉甘草 藿香 朱砂(细研，水飞)各半两 麝香 珍珠 琥珀各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。每服一丸，空心茶清或酒送下。若蛇伤，狗咬，破伤风，牙关紧急，先用一丸擦牙，后用茶清调下一丸；如小儿初觉出痘

疹，即用茶清调一丸与服。

【功用】安魂定魄，疏风顺气。

【主治】中风，左瘫右瘓，口眼喎斜，心神不宁；蛇伤，狗咬，破伤风，牙关紧急；小儿痘疹。

36204 安睡如神汤

《医学集成》卷三。为《杂病源流犀烛》卷六“安卧如神汤”之异名。见该条。

36205 安胎桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】桑寄生一两 熟干地黄二两 木通一两（锉） 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 当归一两（锉，微炒） 白芷半两 知母一两 远志半两（去心） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠五个月，胎不安，腹内疔刺痛，日夜不止，不欲言语，四肢昏沉。

36206 安胎桑寄生散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】桑寄生 芎藭 白术 当归（锉，微炒）各一两 白茯苓三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠惊胎，流下不安，若跳动，心中痛。

36207 安神熟地黄散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 人参一两五钱 黄耆（蜜炙）三钱 龙齿（煨）三钱 远志一两五钱 桂心一两五钱 茯神二两（去木） 炙甘草一两 当归三两

【用法】上为散。水煎五钱，去滓温服。

【主治】悸病脉弦涩者。

【方论选录】熟地补肾水以上交乎心，人参补心气以下交乎肾，黄耆补气实卫，当归养

血益荣，龙齿安魂定魄，远志通肾交心，桂心温营暖血以平肝，茯神定志安神以宁悸，炙甘草缓中以益胃。为散水煎，使心肾交滋，则血气充足，而经脏得养，神志自雄，安有惕然心悸之患。

36208 安胎万全神应汤

《产科心法》下集。为《医林绳墨大全》卷九“安胎万全神应散”之异名。见该条。

36209 安胎万全神应散

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【异名】安胎万全汤（《仙拈集》卷三）、安胎万全神应汤（《产科心法》下集）。

【组成】当归（酒浸）一钱 川芎六分 白芍（炒）七分 熟地（姜汁浸）八分 白术一钱 黄芩一钱 黄耆（蜜炒）七分 杜仲七分 砂仁五分 阿胶六七粒 茯苓七分 甘草三分

【用法】酒、水各一钟，煎八分，空肚服。如痛急，将铜锅煎一钟即服。

【主治】孕妇三月前后，或经恼怒，或行走失跌，损伤胎气，腹痛腰胀。

【加减】胸前作胀，加紫苏、陈皮各六分；白带或红，多加阿胶，地榆一钱、艾叶七分；见红，加川续断一钱，糯米一百粒。

【备考】见血一二日，未离宫者，加一剂自安。倘先三四五月内已经半产者，将及前月分略觉腰骨痠胀，忙服一剂安之，过此必安；不可加减，百发百中。

36210 安胎加味八物汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】人参 条芩 阿胶 桑寄生 茯苓 芍药 续断 白术 当归 熟艾

【用法】水煎服。

【功用】补益固养气血。

【主治】气血虚损，不足荣卫，怀孕自坠者。

36211 安胎易产紫苏饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】苏梗八分 人参 广皮 甘草各五分 当归一钱二分 川芎七分 白芍 条

芩 白术 枳壳各一钱 大腹皮三钱(盐水炒) 砂仁六分(炒,去衣,研)(一方有制香附、姜汁炒厚朴各一钱,葱头五个)

【用法】加黄杨脑七个,河水煎,怀胎八九月服。

【功用】束胎。

【主治】子悬。

【加减】体虚,加人参。

36212 安胎养血益母丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】益母草一斤(阴干,取净末八两) 当归身二两 川芎一两五钱 生地 白芍各一两五钱 壳砂一两五钱 白术(炒)一两 条芩一两五钱(酒炒) 人参(去芦)八钱 阿胶(炒珠)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心白汤送下。怀孕二三个月即便可服,至十个月,俱可服。

【功用】保养血气。

【加减】如腹痛,加川断肉(酒浸)一两;如有白带,加椿皮(炒)一两;如漏胎,月月来,见红者,加荆芥(炒焦)一两,地榆(炒)一两。

36213 安神镇心琥珀丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】琥珀一两(细研) 真珠一两(细研,水飞过) 牛黄半两(细研)、天竹黄一两(细研) 铁粉一两 光明砂三分(细研,水飞过) 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研) 龙齿一两(细研如粉) 膩粉半两(研入) 麝香一分(细研) 犀角屑三分 露蜂房半两(微炒) 龙胆半两 川升麻半两 天门冬三分(去心,焙) 钩藤三分 茯神三分 菖蒲三分 远志三分(去心) 麦门冬三分(去心,焙) 人参三分(去芦头) 白茯苓三分 黄芩半两 蚱蝉半两(微炒) 干蝎半两(微炒) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,

如梧桐子大。每服十五丸,以竹叶汤送下。

【主治】妇人风邪凌心,言语不定,精神恍惚,乃成癫狂,发歇无时。

并

36214 并祛丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】黄耆一两 白术五钱 茯苓五钱 甘菊花三钱 炙甘草一钱 羌活五分 防风五分

【用法】水煎服。

【功用】泻胃与大肠之风湿。

【主治】风湿入于骨髓所致痛风,一身上下,由背而至腰膝两胫,无不作痛,饮食知味,不能起床,即起床席,而痛不可耐,乃复睡卧,必须捶敲按摩,否则其痛走来走去,在骨节空隙之处作楚,而不可忍。

36215 并提汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】兼提汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】大熟地一两(九蒸) 巴戟一两(盐水浸) 白术一两(土炒) 人参五钱 黄耆五钱(生用) 山萸肉三钱(蒸) 枸杞二钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【功用】补肾气,兼补脾胃。

【主治】妇人肾气不足,不孕,饮食少思,胸膈满闷,终日倦怠思睡,一经房事,呻吟不已。

36216 并补两天丸

【方源】《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)。

【异名】两天丸。

【组成】橘红三两 牛膝二两 白术四两 砂仁二两 萸肉二两半 龙骨一两半 莲肉二两 鹿胶四两 木瓜二两半 人参一两 枸杞 白茯苓各二两半 藿香二两 杜仲二两半 山药三两 川附一两

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子

大。每服二钱，每日三次，白水送下。

【功用】温补脾肾。

【主治】脾肾虚弱，纳少溏泄，梦遗滑精，阳痿不举，腰腿酸痛，气短心跳，四肢清冷，神倦面苍。

关

36217 关夫子快脾散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】厚朴 黄连 黄芩 当归 杏仁 木香 草豆蔻 半夏各七分 升麻 吴茱萸 木通 腹皮 枳壳各五分 甘草 柴胡 泽泻 神曲 陈皮 青皮各七分

【用法】上为末。每服五钱，姜汤送下。五日见效，十日除根。

【主治】膨胀。

36218 关节炎汤 1 号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】赤芍 白芍各 9 克 桂枝 3 克 生地 熟地各 9 克 细辛 1.5 克 当归 9 克 秦艽 9 克 片姜黄 9 克 独活 9 克 桑寄生 30 克 桑枝 30 克 防风 6 克 薏苡仁 20 克

【功用】祛风湿，活血通络。

【主治】风湿性关节炎风湿型，关节肿胀，遇风或受潮湿加重，舌苔白腻，脉濡缓。

【方论选录】方中独活、秦艽祛风湿，通痹止痛；桂枝、细辛、防风通经散风寒；当归、赤芍、白芍、姜黄促进血液循环，活血止痛；白芍、熟地养血；桑枝通络走四肢；薏苡仁利湿。其中赤芍、白芍、桂枝为一组药，常用于四肢疼痛；细辛、生地、熟地为一组药，一辛一散一滋补，细辛去熟地之腻，可补真阴，填骨髓，止腰痛；桑枝、桑寄生为一组药，能强腰膝、通络止痛，治风湿所致腰膝酸痛，屈伸不利。

36219 关节炎汤 2 号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】黄耆 24 克 党参 15 克 白术 9

克 制附片 6 克 白芍 9 克 桂枝 9 克 生地 熟地各 9 克 细辛 2 克 独活 9 克 桑寄生 30 克 十大功劳叶 12 克 牛膝 9 克

【功用】补气益肾，散寒通络。

【主治】风湿性关节炎虚寒型，关节疼痛，有凉感，遇寒及劳累痛甚，舌苔白，脉沉紧。

【方论选录】方中补气用党参、黄耆、白术，党参用于各种气虚不足的病症，对神经系统有兴奋作用，能增强机体抵抗力；桂枝、细辛、独活散寒止痛；制附片、寄生、十大功劳叶、熟地益肾；生地、白芍滋阴养血；牛膝引药下行。上药合成共达补气益肾、散寒通络之目的，治虚寒型关节炎为宜。

羊

36220 羊毛饼

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】羊毛

【用法】用鸡子清、桐油各半打匀，以羊毛薄捻作饼如纸样。贴在患处上，以散血膏或补肉膏敷贴。

【主治】打扑伤损，跌蹶刀斧等伤，及虎伤、獐猪牛咬伤。

36221 羊心汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】羊心一枚（以水五盏，煎取三盏汁用） 甘草（炙）一两 远志（去心）半两 防风（去叉）一两 生干地黄（焙）一两半 芍药（锉） 牡蛎（熬）各一两 人参一两半 羚羊角（镑屑）半两

【用法】上九味，将八味为粗末。每服三钱匕，以煮羊心汁一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气惊悸，神志不宁。

36222 羊甲散

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】羊前蹄甲 防风 皂角 蛇床子 莲蓬壳 杜仲

【用法】上药煎汤，乘热熏洗，每日两三次。

【主治】痔疮。

36223 羊矢散

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】羊矢一个(焙) 干胭脂少许

【用法】上为末。用竹筒轻吹入耳内，每日三次。

【主治】耳内臭烂。

36224 羊矢散

【方源】方出《外科全生集》卷三，名见《仙拈集》卷二。

【组成】山羊矢(晒干，炒炭存性，入坛闷熄)

【用法】上为末。疔溃烂，生肌，每服二钱，酒送下；疔雷头风，水粉各一升，浸一夜，绞汁顿熟，每午刻服；疔痢欲死者，三服全愈。

【功用】生肌。

【主治】疮疡溃烂，雷头风，疔痢欲死者。

36225 羊头脍

《圣济总录》卷一八八。为《圣惠》卷九十五“羊头肉方”之异名。见该条。

36226 羊皮面

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊皮二个(捋洗净，煮软) 羊舌二个(熟) 羊腰子四个(熟，各切如甲叶) 蘑菇一斤(洗净) 糟姜四两(各切如甲叶)

【用法】上用好肉酹汤或清汁，下胡椒一两，盐醋调和。

【功用】补中益气。

36227 羊肉丸

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)。

【组成】川楝子(炒) 续断(炒，去丝) 茯苓 茴香 补骨脂(炒) 附子(炮，去皮脐) 葫芦巴(微炒) 各三两 山药(炒) 桃仁(麸炒，去皮尖，别研) 杏仁(麸炒，去皮尖，别研) 各二两

【用法】上为末，精羊肉四两，酒煮烂，研极细，面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心以盐汤、温酒任下。

【功用】固真补气，益精驻颜。

【主治】真阳耗竭，下元伤惫，耳轮焦枯，面色黧黑，腰重脚弱，元气衰微。

36228 羊肉方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】精羊肉八两(切作脍) 肉苁蓉(微炒，碾末)二钱半 苜蓿(末)半两 附子(炮裂，去皮脐，细碾)半两 干姜(炮裂)二钱半 胡椒 荜茇 诃黎勒(炮，去核)各一钱 茺莢(微炒)半两

【用法】上九味，八味为末，以肉并药末等相和拌匀，分作四剂，每剂以面裹之，撮合微拍令扁，用湿纸裹，入煆灰火中煆令熟。空心食之，以饱为度。

【功用】暖腰腹，缩小便。

【主治】冷劳气痢。

36229 羊肉方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肉(去筋膜，取精者薄切，令作片子)四两 胡粉 胡黄连各半两 大枣(煮，去核并皮)二十个

【用法】除羊肉外，先研枣如泥；却别碾胡黄连作末，并胡粉一处，和枣作团，以湿纸包裹，于煆火中煆令干熟；取出为末。每服三钱匕，匀掺羊肉片子中。将湿纸裹，煆令香熟食之。

【主治】休息痢。

36230 羊肉方

【方源】《普济方》卷二五八。

【组成】羊肉(去脂膜，切作片)五两 大蒜(去皮细研)一颗

【用法】上先将蒜入盐醋，蘸羊肉上。空腹任意食之。

【主治】反胃，朝食暮吐，夜食朝吐。

36231 羊肉汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】肥羊肉三斤(去脂) 当归一两 桂心二两 芍药四两 甘草二两 生姜四两 芎藭三两 干地黄五两

【用法】上咬咀。以水一斗半，先煮肉，取七升，去肉，纳余药，煮取三升，去滓，分三服，不愈重作。

【主治】①《千金》：产后虚羸喘乏，自汗出，腹中绞痛。②《产孕集》：产后虚劳，摄养不善，内伤七情，阳陷阴逆，升降倒置，脏腑交病，表里均亏，乍起乍卧，饮食不化，时作咳嗽，目昏头痛，口渴盗汗，寒热往来，喘乏自汗，少气惊悸。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匱》当归生姜羊肉汤为产后腹中疔痛之圣药，即寒疝、小腹结痛亦得用之，况合四物以调其血，加桂以通其滞，用甘草者，以缓姜、桂之急也。缓急得宜，攻补兼济，非深入《金匱》之奥，何以及此。

【备考】《千金翼》有葱白一斤。

36232 羊肉汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】羊肉二斤 成掾大蒜（去皮，切）三升 香豉二升

【用法】以水一斗三升，煮取五升，去滓，纳酥一升，更煮取三升，分温三服。

【主治】产后中风，久绝不产，月水不利，乍赤乍白；及男子虚劳冷盛。

【方论选录】《千金方衍义》：羊肉汤治风入胞门痼疾，故用掾蒜浊恶之味，与羊肉、香豉同煮，以蒜能辟除恶气，豉能解散秽腐，更纳乳酥之润，引领瘀垢下趋，当归生姜羊肉汤之变法也。

36233 羊肉汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】肥羊肉二斤（如无，用麋鹿肉） 茯苓 黄耆 干姜各三两 甘草 独活 桂心 人参各二两 麦门冬七合 生地黄五两 大枣十二枚

【用法】上咬咀。以水二斗，煮肉取一斗，去肉纳药煮，取三升半，去滓，分四服，日三夜一。

【主治】产后及伤身大虚，上气腹痛，兼微

风。

【方论选录】《千金方衍义》：羊肉汤治产后大虚，虽有客邪，若行表散，元气立脱，故需羊肉气血之属煮保元辈，急固本元；略取独活一味，专主下陷之邪；并佐干姜、桂心调和血气之品，深得养正祛邪之妙用也。

【备考】《千金翼》无干姜。

36234 羊肉汤

【方源】《外台》卷三十四引《广济方》。

【组成】肥羊肉一斤 当归 甘草（炙）芍药各一分

【用法】上切。以水一斗煮羊肉，取七升煮药，取二升分服。

【主治】产后内虚，寒入腹，腹中绞痛下赤，烦毒谵语见鬼。

36235 羊肉汤

《外台》卷三十四。即《千金》卷三“羊肉当归汤”。见该条。

36236 羊肉汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】当归 牡蛎 芍药各一两 龙骨半两 桂枝（去皮）二分 黑附子二个（每个五钱重，炮，去皮脐）

【用法】上为粗末。每服用末二两半，羊臀肉四两，生姜二两，葱白五寸，同锉烂，以水五升，同熬至二升半以来，净绞去滓，分作三盏服。

【功用】《医方论》：敛阴生阳，补虚固脱。

【主治】①《伤寒微旨论》：伤寒八九日后，服汗下药太过，两手脉沉细而无力，女子踰足卧多，恶明与入声，身有粟起，时时发战，一如疟证。②《阴证略例》：产后血虚。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阴药也，当归、芍药以补其阴；附子、姜、桂以复其阳；龙骨、牡蛎以收其脱，羊肉大补以生其气血。②《医林纂要》：羊肉甘辛，补命门之火，补命门所以生肝木，又血气之味，以补血气，故以此为君；生姜辛温，为补肝主药，生用欲乘其生气，且与归、附同行，则

皆守于肝部；附子辛润命门，补肝而回欲尽之阳；当归甘辛，滋润补肝，以萃忘归之血；白芍药酸以敛阴，使散者不至于尽；牡蛎咸涩，咸软以行枯竭之血，涩收以敛游散之魂；龙骨咸涩，龙固鳞虫，肝之类也，本飞跃不测，而用其骨，则散者就收，亦所以敛欲脱之阳也；桂枝甘辛，生姜、桂枝皆发汗者，而与归、附而敛之，使与同类皆归，则翻然归矣；用葱白亦反本之意。参、耆和缓，虽补气亦能生血，而未必能遽达下焦，补土以培其根，不若直补其根，使元阳得以相续也。而用羊肉、附子、当归、姜、桂，使生气复于下，而津液亦相滋。又剂之以芍药、牡蛎、龙骨，以收其将脱之阳，使来复于下。

36237 羊肉汤

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】羊肉 葱（并细切）各半斤

【用法】以水五升，煎至三升，去滓温洗，每日三两次。

【主治】寒冻肿痒。

36238 羊肉汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】羊肉一斤（去脂，切碎，水八盏，煮取肉汁四五盏，澄令清）桂（去粗皮）三分 当归（切，焙）三分 吴茱萸（微炒黄）三分 黄耆（锉）半两 芎藭半两

【用法】上除肉外，为粗末。每服三钱匕，肉汁一盏，生姜三片，同煎至七分，去滓温服。

【功用】补虚羸。

【主治】产后恶露未尽，有冷气腹痛。

36239 羊肉汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白羊肉（切）一斤 黄耆（锉）防风（去叉，锉）桂（去粗皮，锉）当归（切，焙）芎藭各半两（锉）大枣（擘破）七枝 生姜（切）三分

【用法】先以水五升，煮羊肉取三升，澄去脂后，纳诸药，煎取一升半，去滓，食前分

温四服，如人行三五里再服。

【功用】补虚，排风，散血，止痛。

【主治】产后虚羸。

36240 羊肉汤

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】羊肉四两 当归 川芎 生姜各半两

【用法】以水十盏，煎至三盏，掠上沫，去滓，空心，分四次热服，一日尽，来日再将前药滓合为一日煎之，当一剂服，入酒煎尤佳。

【主治】妇人体虚及产后感受寒邪，腹内拘急疼痛，往来寒热，头眩自汗，呼吸少气。

①《鸡峰》：虚人及产妇腹中痛，虚眩不支持，两胁当脐疼痛，气上冲，前后相引痛。②《妇人良方》：虚损羸乏，腹中疼痛，往来寒热，呼吸少气，不能支持，头眩自汗，腹内拘急。③《万氏女科》：虚羸及上腹痛，小腹痛，儿枕痛。④《济阴纲目》：产妇脾虚，寒邪所乘，以至腹痛；及寒月生产，寒气入于产门，脐下胀满，手不可犯。

36241 羊肉汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】乌药 延胡 防风 当归 甘草 桃仁 川芎 香附 陈皮 桔梗 苍术 木香 赤芍 葱白 生姜 黄羊肉汁四两

【用法】水煎服。

【主治】产后呼吸冷风，乘虚入腹，脐下痛，牵引左右，两胁下俱大痛者，名曰寒疝。

【方论选录】是方乌药、陈皮、苍术、生姜、木香、香附、防风、川芎以祛风散寒，温经止痛；桃仁、延胡、归尾、赤芍兼治未尽之恶血；葱白、桔梗为引；羊肉甘温补血，盖人参补气，羊肉补形，产后血虚极也。

36242 羊肉汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】当归三钱 生姜一两一分 精羊肉四两 橘皮半两

【用法】上锉散。水三碗，酒少许，煎至一

碗，去滓，分二服，或少加葱盐亦佳。

【主治】①《三因》：产后腹中疼痛，虚劳不足，里急胁痛及寒疝。②《普济方》：寒月中产，寒入产门，脐下胀闷，手不可犯，此寒疝也。

36243 羊肉汤

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】生羊肉半斤(精者，分作八段) 生姜半斤(薄切片子) 当归(洗，焙) 川芎 人参(去芦头) 白术 附子(炮，去皮脐) 肉豆蔻(面裹煨香) 各二两

【用法】上咬咀，每一料分作八服。水三盏，煎至一盏，食前稍热服。

【主治】男子、妇人一切虚损不足，肌体羸弱，不思饮食。

36244 羊肉汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】精羊肉四两 当归 芎藭各五钱

【用法】上将精羊肉薄批作小片子，用水三大碗，煎至一大碗，羊汁入当归、芎藭，再煮七分，去滓，食前服。

【主治】血虚不进饮食。

36245 羊肉汤

《普济方》卷三四九。为《医方集成》引《济生》(见《医方类聚》卷二三八)“当归羊肉汤”之异名。见该条。

36246 羊肉汤

《东医宝鉴·外形篇》卷四。即《金匱》卷上“当归生姜羊肉汤”。见该条。

36247 羊肉汤

【方源】《济众新编》卷二。

【组成】血羊脯二三两 生姜二两 桂皮 干姜各五钱

【用法】水煎服。冬月生羊肉一大盏尤好。

【功用】双补气血。

【主治】男子、妇人阳虚瘦弱。

【加减】血虚，加白芍药(酒炒黄)二钱。

36248 羊肉饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】羊肉一斤(去脂，切碎，水三升，

煮肉汁一升半，澄令清) 白茯苓(去黑皮)三分 黄耆(锉)三分 当归(切，焙)半两 桂(去粗皮)半两 麦门冬(去心，微炒)三分 甘草(炙)半两 大黄(锉，炒)半两

【用法】上除肉外，为粗末。每服三钱匕，以肉汁一盏半，煎至七分，去滓温服。

【功用】补虚。

【主治】产后大肠秘，恶露不下。

36249 羊肉饼

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】羊肉四两 白面六两 生姜汁二合

【用法】上以姜汁搜面，入豉汁煮和，以五味以肉作臠。一日一食。

【主治】虚损。

36250 羊肉粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肉二斤 黄耆一两(锉) 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 大枣五枚 粳米三合

【用法】上先将肉去脂皮，取精者，内留四两细切。余一斤十二两，以水五大盏，并黄耆等，煎取汁三盏，去滓，入米煮粥，临熟，下切了生肉更煮，入五味调和，空心食之。

【功用】助阳壮筋骨。

【主治】虚损羸瘦。

36251 羊肉粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】白羊肉(去脂膜)四两(细切) 粳米(净淘)三合 生地黄汁三合 桂(去粗皮，取末)一分

【用法】以水煮肉并米，熟后入地黄汁并桂末更得所，以五味调和，空心任意食之。产后七日后服。

【主治】产后诸病。

36252 羊肉羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】羊肉半斤(细切) 萝卜一个(切

作片) 草果一钱 陈皮一钱(去白) 良姜一钱 茺菟一钱 胡椒一钱 葱白三茎

【用法】上药水熬成汁,入盐酱熬汤,下面棋子作羹食之;将汤澄清作粥食之亦可。

【主治】肾衰虚弱,腰脚无力。

36253 羊肉羹

《医学入门》卷三。为《寿亲养老》卷二“羊肺羹”之异名。见该条。

36254 羊肉羮

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《圣惠》卷九十五。

【组成】章陆根一斤(刮去皮,薄切) 羊肉一斤

【用法】煮章陆根令烂,去滓,纳羊肉,下葱、豉、盐如食法,随意食之,肿愈后亦宜作此。亦可常捣章陆与米中拌蒸作饼子食之。

【主治】①《肘后方》:卒肿满,身面皆洪大。②《圣惠》:水气洪肿。

36255 羊肉羮

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肉四两(切,炒作羮) 面半两

【用法】上件索饼,于生姜、豉汁中煮,和羮食之。

【主治】初欲有妊,心中愤闷,呕吐不下食,恶闻食气,头重眼肿,四肢烦疼,多卧少起,恶寒,汗出疲乏。

36256 羊血方

【方源】《养老奉亲》。

【组成】羊血一斤(鲜者,面浆作片) 葱白一握 白面四两(擗,切)

【用法】上煮血令熟,渐食之。

【功用】补益脏腑。

【主治】老人脾胃气弱,干呕不能下食。

36257 羊花散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生南星 生半夏各二钱 闹羊花三钱 生川乌 生草乌各一钱

【用法】用麻黄根、芋艿叶拌上药末,或加蟾酥五分,雄黄少许。

【主治】跌扑损伤。

【宜忌】本方为“外麻药”,仅供外用,不宜内服

36258 羊肝丸

【方源】《本草图经》引《传信方》(见《证类本草》卷七)。

【异名】秘传羊肝丸(《局方》卷七(续添诸局经验秘方))、黄连羊肝丸(《原机启微》卷下)。

【组成】黄连末一大两 白羊子肝一具(去膜)

【用法】上同于砂盆内研令极细,为丸如梧桐子大。每食二七枚,以暖浆水送下。连作五剂愈。

【功用】《明医指掌》:补肝明目。

【主治】肝经不足,风毒上攻,眼目昏暗,羞明泪出,隐涩难开,翳障青盲,攀睛胬肉。①《本草图经》引《传信方》:诸眼目疾,及障翳青盲。②《局方》(续添诸局经验秘方):丈夫、妇人肝经不足,风毒上攻,眼目昏暗泪出,羞明怕日,隐涩难开,或痒或痛,近年日近内外障眼,攀睛胬肉,针刮不能治。③《保婴撮要》:痘疮入目不能开。④《医学入门》:拳毛倒睫。

【宜忌】禁食猪肉及冷水。

【方论选录】①《医方考》:眼者,肝之窍,肝木自实则病眼,邪害空窍也。越人云:实则泻其子。故用黄连以泻心;能泻其心,则子食气于母,而肝弗实矣,目也岂不莹然面明乎?然必剂以羊肝者,取其为血气之属,同类相从,用之补肝,非若草木之性,偏一而失冲和也。②《医方集解》:用羊肝引黄连等药入肝,解肝中诸郁,盖肝主目,肝郁解则目之玄府通利面明矣。黄连之类解热郁也。③《本事方释义》:黄连气味苦寒,入手少阴,白羊肝气味苦寒,入足厥阴,此治目疾之方,因操持谋虑,用心太过,厥阳上升,肝阴必致内耗,每每伤目者多。故一味泻心火,兼以血肉之养肝,宜其效验之捷耳。

【临证举例】内障 崔承元为内障所苦,丧

明逾年，依此方合服，不数月眼复明，因传此方于世。

36259 羊肝丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】羊肝一具(去脂膜，切作片子) 白矾三两(烧令汁尽)

【用法】上药以酢醋三升，煮羊肝令烂，入砂盆内研，后入白矾为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心及晚食前以粥饮送

【主治】冷劳久不愈，食少泄痢。

36260 羊肝丸

《圣济总录》卷一一二。为《局方》卷七“锦鸠丸”之异名。见该条。

36261 羊肝丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】羯羊肝一具(新瓦盆中焙干，更焙之。肝若大只用一半) 甘菊花(去萼梗) 柏子仁(研) 羌活(去芦) 细辛(去叶) 官桂(不见火) 白术 五味子(拣) 各半两 黄连三分(去须)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、食前温水送下。

【功用】镇肝明目。

【主治】①《准绳·类方》：眼目昏花。②《审视瑶函》：青盲症。

36262 羊肝丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】活命羊肝丸(《医学入门》卷七)。

【组成】白羯羊肝(只用于肝一片薄切，新瓦上焙干) 熟地黄(酒洒，九蒸九晒，焙干称) 一两半 车前子 麦门冬(水泔，去心) 菟丝子(酒浸，晒干，用纸条子同碾为末) 蕤仁 决明子 泽泻 地肤子(去壳) 防风(去钗股) 黄芩(刮净) 白茯苓(去皮) 五味子(拣) 枸杞子 茺蔚子 杏仁(大者，去皮尖，炒) 细辛(华阴者，去叶) 苦葶苈(炒令香) 桂心(不见火) 青葙子各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温水送下，一日三次，不拘时候。

【功用】①《本事》：镇肝明目。②《全国中药成药处方集》(吉林方)：养肝助肾，清头明目。

【主治】①《医学入门》：肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，多泪昏暗，及年久丧明内障。②《全国中药成药处方集》(吉林方)：瞳仁散大，羞明，视物不清，雀目青盲，眼边赤痒，流泪。

【临证举例】①眼目昏暗 张台卿尝苦目暗，京师医者令灸肝俞，遂转不见物，因得此方服之，遂明。②内障 一男子内障，医治无效，因以余剂遗之。一夕灯下语其家曰：适偶有所见，如隔门缝见火者。及旦视之，眼中翳膜且裂如线。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“内障丸”。

36263 羊肝丸

【方源】《医说》卷四引《类说》。

【异名】观音梦授方(《得效》卷十六)、罗汉应梦丸(《普济方》卷七十九引《经验良方》)、神授羊肝丸(《济阳纲目》卷一〇一)、观音梦授丸(《杂病源流犀烛》卷二十二)。

【组成】净洗夜明砂一两 当归一两 蝉壳一两 木贼(去节)一两

【用法】上为末，羊肝四两水煮烂，捣如泥，入前药拌和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后温熟水送下。

【功用】《全国中药成药处方集》(上海方)：平肝养血，散热退翳。

【主治】内障，赤膜，雀盲，眼目昏花，视物模糊。

①《医说》引《类说》：赤眼成内障。②《医林纂要》：有经热而兼风郁，或血涩而多赤膜及障翳之目疾内障。③《疡医大全》：雀盲眼，一切昏花老眼。④《全国中药成药处方集》

(上海方):视物模糊,眼涩不舒。

【方论选录】①《医方考》:夜明砂能攻目中恶血,当归身能生目中新血,蝉退能去目中翳障,木贼能散目中翳热,乃羊肝者,同类相从,能引四物入肝而利其窍也。②《成方便读》:当归芳香辛苦,能润养肝血,而又兼行血分,以复其肝之本性;夜明砂系蝙蝠矢,食蚊而化,但其眼不化,蚊又为食血之虫,故能入肝破血,为散结行滞之需;蝉退、木贼,一则取其善脱,一则取其善摩,二味皆轻扬治上,为退翳除障之专药;用羊肝者,以羊食百草,其精华皆聚于肝,以为导引耳。

【临证举例】内障 明州定海人徐道亨,因患赤眼而食蟹,遂成内障,凡历五年。乃服羊肝丸,百日复旧。

【备考】本方方名,《医方大全》引作“退翳羊肝丸”。

36264 羊肝丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】黄连(净,为末)二两 杏仁(去皮)半两 白羊子肝一具(去筋膜)

【用法】上为细末,为丸如梧桐子大。每服七十丸,食后、临卧温米泔送下,一日三次。

【功用】解热,消血,明目。

36265 羊肝丸

【方源】《医方类聚》卷七十引《吴氏集验方》。

【组成】大木贼草一两(去节) 九节黄连一两(去须) 南康蚌粉一两

【用法】上为末,以生羊肝一小具,切半开,入药末在内,以麻皮缚定,净碗盛,甑蒸熟,再为细末,为丸如梧桐子大。每服七十丸,食后茶清送下,一日三次。

【主治】眼生翳膜白粟。

36266 羊肝丸

【方源】《脉因证治》卷下。

【异名】明目羊肝丸(《同寿录》卷二)。

【组成】白乳羊肝一具(竹刀刮去膜) 黄连一两 甘菊 防风 薄荷(去梗) 荆芥

羌活 当归 川芎各三钱

【用法】上为末,羊肝捣为丸。浆水送下。

【功用】《医略六书》:养肝明目,清内解外。

【主治】①《脉因证治》:一切目病,不问障翳。②《医略六书》:内外障翳,青盲肿痛,脉数。

【方论选录】《医略六书》:风热伤阴,不能内荣肝木,故邪害孔窍而内外障翳,青盲肿痛焉。生地壮水涵肝,黄连清心降火,川芎活血以养肝,当归养血以荣目,羌活、防风散肿退翳,荆芥、薄荷清利头目,入乳以润之,羊肝以补之,使风热两除,则肝阴暗复而青盲肿痛无不退,内外障翳无不除矣。此养肝明目,清内解外之剂,为青盲肿痛,内外障翳之专方。

【备考】《医略六书》有人乳、生地。

36267 羊肝丸

【方源】《便览》卷一。

【组成】白乳羊肝一具(以竹刀去膜) 黄连一两 甘菊花 防风 薄荷 荆芥 羌活 当归 川芎各三钱 柴胡二钱 槟榔二对 苍术三钱

【用法】上为末,将肝砂锅内蒸熟,捣如泥,酒面糊为丸。食远浆水汤送下。

【主治】一切目疾障翳。

【宜忌】忌铁器。

36268 羊肝丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】羯羊肝一副(竹刀去膜,瓦上焙) 细辛 熟地 羌活 独活 北五味 菊花 草决明各二两 杏仁(去皮尖) 枸杞子 青箱子 茺蔚子各一两 当归二两五钱 藜蘆仁(去壳) 麦门冬(去心) 地肤子各一两二钱

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服二钱,一日三次。

【主治】内障眼疾。

36269 羊肝丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归(酒洗) 熟地(酒蒸) 白茯苓 柴胡 黄芩各一两 草决明 蔓荆子 茯神 知母 黄柏各七钱 赤芍 白芍 苍术(米泔水浸) 香附(四制) 玄参 牛膝 菟丝子(酒煮)各一两 龙胆草 青箱子 枸杞子 石决明(煨) 麦门冬(去心)各五钱

【用法】同羊肝为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温汤送下。

【主治】高风,雀目,内障。

36270 羊肝丸

《眼科全书》卷六。为《景岳全书》卷六十“明目羊肝丸”之异名。见该条。

36271 羊肝丸

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】羊肝一具 当归 川芎 夏枯草各一两 甘菊 柏子仁各七钱

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】痘后肝虚有热,目闭羞明,泪出,暗处能开。

36272 羊肝丸

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】白蒺藜(炒去刺) 菊花(去根叶) 石决明(煨) 生地各一两 楮实子 槐角(炒) 五味子 黄连 当归尾各五钱 防风 荆芥穗各二钱半 甘草一钱 川芎三钱 蕤仁(去壳油,净)七钱

【用法】上为细末,用雄羊肝一具,滚水沸过,共前药捣为丸。每服五六十丸,空心薄荷汤送下。

【主治】肥人酒色太过,红筋侵目,毒气伤肝,白膜伤睛。

【宜忌】忌椒、生姜、辛辣、烧酒等物。

36273 羊肝丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】羊肝一具(洗,去筋膜) 黄连三两 当归一两 蕤仁(去油)一两

【用法】先将羊肝入砂锅内煮烂,后入黄连等末,为丸如梧桐子大。每服五十丸,米汤

送下。

【主治】目有内障,如云掩。

36274 羊肝丸

【方源】《眼科秘书》卷下。

【组成】甘菊五钱 木贼三钱 蝉退五钱(去足) 草决明(炒,研)二钱 蕤仁五钱(炒,研) 蒙花三钱(净) 花椒十五粒 防风二钱

【用法】用黑羊肝一具,去筋膜,手撕成块,用水洗净,不见铁器,用砂锅将药入内,肝放药上,水漫肝上,微火煮干为度,不可令糊,每日早晨食半具,滚水送下;食至数个,将药滓共聚晒干,为末,炼蜜为丸。每服三钱。

【主治】诸般眼症,瞳神未反背者。

36275 羊肝丸

《饲鹤亭集方》。为《医级》卷八“羊肝明目丸”之异名。见该条。

36276 羊肝方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊子肝三具(切为条子) 硃砂半两(取霜)

【用法】调和令匀。以竹杖穿炙熟,空腹食之。

【主治】反胃。

36277 羊肝饼

【方源】《医便》卷五。

【组成】黑羯羊肝一具(去筋膜,切成方寸块,中间割开相连) 白术一两(小米泔浸一宿,切成咀,陈壁土炒黄色,为细末一两) 左顾大牡蛎一个(重一斤者,炭火煨通红,候冷,为细末一两) 真黄蜡一两(溶化开,入前药二味搅匀,乘热成饼,照肝块数目如肝块大,其饼重二钱,小者重一钱五分)

【用法】上将蜡饼夹于肝内,用竹叶包裹,以线缚之,入新砂锅中,以水淹一寸,入粟米五六合煮,以米熟为度,候冷,去竹叶。任小儿食之,一次二三块。夏月将饼系于井中,

勿令色变味臭，小儿不肯食也。重者不过一肝二肝，轻者数块则热止，七日后则积消腹软矣。

【主治】小儿惊积，左肋下有块；女人血瘕，发热瘦弱。

【宜忌】若积块在右，为食积，不宜吃此饼。

36278 羊肝散

【方源】《施圆端效方》引《圣惠》（见《医方类聚》卷一五三）。

【组成】缩砂仁 白芍药 良姜（切，炒） 厚朴（姜制） 橘皮 胡椒半两 破故纸 丁香 白术 木香 吴茱萸（汤洗七次，焙） 肉豆蔻 官桂各三钱

【用法】上为细末，羊肝三两，薄批开，掺药二钱半，铺葱丝一重，卷定麻扎，精火炙熟。每日一剂，分三五次细嚼，食前米饮送下。

【主治】诸虚百损，五劳七伤，年深泄痢，久作滑肠，心腹痞闷，块瘕坚硬，下虚上热，口疮燥渴，一切阴盛阳虚之证。

36279 羊肝散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】蝉蜕末

【用法】每服二三钱，羊子肝汤调服。

【主治】疮疹入眼成翳。

【备考】本方方名，《医方类聚》卷二六四引作“仙退散”。

36280 羊肝散

【方源】《普济方》卷七十四引《德生堂方》。

【组成】谷精草五钱 甘菊花一两 木贼一钱半 甘草三钱 黄连三钱

【用法】上为细末。每服二钱，用羊肝一块切开，入药末在内，炙热，食后啖之。

【主治】翳膜攀睛，赤烂肿痛。

36281 羊肝散

《普济方》卷四〇四，为《圣惠》卷八十四“蜜蒙花散”之异名。见该条。

36282 羊肝散

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】缩砂一两（去皮） 肉豆蔻半两（去壳）

【用法】上为细末，用羊肝半具，细切拌药，以湿纸三五重裹上，更以面裹，用慢火烧令熟，去面并纸，入软饭捣和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】休息痢羸瘦。

36283 羊肝散

【方源】《便览》卷一。

【组成】青箱子一钱 黄菊花一钱半 黄连二钱 黄芩一钱半 苍术三钱 白术二钱 梔子二钱 羌活一钱半 蝉壳一钱半

【用法】如无羊肝，猪肝亦可，将肝用竹刀劈开，去筋膜，掺药末在内，每肝一具，用净药一两五钱，布裹，新砂锅米泔水悬胎煮熟，任意食之。

【主治】大人、小儿癖疾伤眼，及诸眼疾。

36284 羊肝散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】青羊肝（去筋膜，切韭叶厚片）一具 人参 羌活 白术（土炒） 蛤粉各等分

【用法】上为细末，令匀听用。将药置荷叶上，如钱厚一层，铺肝一层包固，外以新青布包裹蒸熟，任儿食之。如不食者，及夏月恐腐坏，则晒干为末，早、晚白汤调服。服完再合，以好为度。

【主治】小儿疳热上攻于眼，故发时痒涩赤烂，眼胞肿疼，白睛生翳，渐渐遮睛，不时流泪，羞明闭目，日久不愈。

【加减】若热者，减人参。

36285 羊肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】羊肝一具（不见水，以皮消揉去血）

【用法】竹刀剖开，入谷精草一撮，砂锅蒸熟，任食。

【主治】小儿雀目，至晚忽不见物。

36286 羊肝散

【方源】《文堂集验方》卷三。

【组成】谷精草五钱 胡黄连二钱 甘草五分 地骨皮五钱 芦荟三分

【用法】上为末。羊肝一具，竹刀剖开一缝，将药末五分入肝内，用线捆好，砂锅内煮肝熟为度。随时服七日，频服即效。

【主治】心脏受疳者，小便不通，口干舌烂，牙臭。

36287 羊肝粥

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】羊肝一具（去筋膜，细切） 葱子（匀炒熟，为末）

【用法】先用水煮葱子熟，去滓，更入水下米煮粥食。

【主治】老人肝虚。

36288 羊肝煎

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【异名】羊肝羹（《医统》卷八十七）。

【组成】羊肝（细切）一具 羊脊膂肉（细切）一条 陈曲末三两 枸杞根五两（切，以水一斗二升，煮取九升，去滓）

【用法】上四味，先以枸杞根汁重煎令沸，次入肝肉、曲末，并葱豉汁调和，渐渐煎如稠糖，分作三服，空腹、日午、夜卧食之。

【主治】①《圣济总录》：虚劳。②《医统》：老人虚损。

36289 羊肝羹

《医统》卷八十七。为《圣济总录》卷一八八“羊肝煎”之异名。见该条。

36290 羊肚方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肚（洗净）一枚 陈橘皮（汤浸去白，切）二两 豉半斤 葱白十茎（切） 盐少许

【用法】上五味，将四味贮入羊肚内，以绳系头，煮熟去药滓，将羊肚细切，任意食之。

【主治】反胃。

36291 羊肚羹

《饮膳正要》卷二。为《圣济总录》卷一八八“羊肚食方”之异名。见该条。

36292 羊角丸

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】蛤蚧二对（涂酥炙） 人参 芸□ 桔梗 知母 紫苏 猪牙皂角（酥炙） 甜葶苈（炒）各六分 鳖甲八分（酥炙） 槟榔 白前六分 柴胡八分 汉防己 杏仁（炒，去皮尖） 羚羊角（炒） 郁李仁（炒，去皮） 紫菀 猪苓各六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后煎糯米、人参汤送下，一日二三次。

【主治】肺劳嗽久患咯吐脓血，及暴嗽，肺痿羸瘦，涎涕粘。

36293 羊角丸

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】羚羊角 虎脑骨 生干地黄 白茯苓 酸枣仁各半两 当归 桂心 防风 黄耆各一分

【用法】上为细末，炼蜜和成剂。每服一皂大，食前温水化下，一日三四次。

【功用】补益肝肾。

【主治】小儿肾虚，或病后筋骨弱，五六岁不能行。

36294 羊角汤

《普济方》卷三十一。即《圣济总录》卷五十二“羚羊角汤”。见该条。

36295 羊角散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】桂心一两 羊角二枚（炙令黄焦）

【用法】上为末。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：卒吐血。②《普济方》：吐血，咳嗽上气。

36296 羊角散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】山羊角（烧存性，为末）

【用法】每吹二三分入内，一日二次。

【主治】耳内脓汁不干。

36297 羊角散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】羊角(连内骨,烧存性)

【用法】上为末。每服三钱,量酒调服。

【主治】瘰及瘰毒赤斑。

36298 羊角散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】羊角一斤(锉碎,炙黄)

【用法】上为末。每早调服三钱。

【主治】瘰癧。

36299 羊肾丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】羊肾二对(去脂膜,切碎,焙干) 人参(去芦头) 白茯苓 白术各一两 桂心 熟干地黄各二两 肉苁蓉(汤浸一宿,刮去皱皮,炙干) 当归 蛇床子各三分 枳壳(麸炒微黄,去瓢) 薯蓣 黄耆 泽泻 山茱萸 白芍药 吴茱萸(汤浸七遍,焙干微炒) 菟丝子(酒浸三日,晒干,别捣为末) 鹿茸(去毛,涂酥,炙微黄) 远志(去心) 附子(炮裂,去皮脐) 牡丹 石斛(去根,锉) 牛膝(去苗) 河黎勒(煨,用皮) 各一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日三十丸,空腹以暖酒送下,晚食前再服。

【功用】补益骨髓,悦泽肌肤。

【主治】虚劳羸瘦。

36300 羊肾丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】羊肾一对(切作片子,放新瓦上焙干) 艾叶(糯米粥拌匀,焙干,为细末) 五两 肉苁蓉(酒浸一宿,焙干) 一两 木香 肉豆蔻(去壳) 各一两 丁香半两

【用法】上除艾叶外,为细末,入艾叶末拌匀,枣肉为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心、食前温酒送下。

【主治】脾劳脏腑滑泄,夜多盗汗,腹中虚鸣,困倦少力,不美饮食。

36301 羊肾丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】天南星一两(切,生姜十片同水煮过) 半夏一两(切,生姜十片同水煮过,焙干) 茴香子一两(微炒) 附子两枚(炮裂,去皮脐) 白附子一两(炮) 干姜一两(炮) 木香一两

【用法】上为末,用羯羊肝一对,和前药一处,为丸如梧桐子大。每服十丸,炒盐汤送下,早晚二次。

【功用】补虚治痰。

36302 羊肾丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】熟地黄(酒蒸,焙) 杜仲(去皮,锉,炒断丝) 石斛(去根) 菟丝子(淘净,酒浸焙干,别研) 黄耆(去芦) 川续断(酒浸) 桂心(不见火) 磁石(煨,醋淬) 川牛膝(去芦,酒浸) 沉香(别研) 五加皮(洗) 山药(锉,炒) 各一两

【用法】上为细末,雄羊肾两对,以葱、椒、酒煮烂,再加少酒,和药为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤送下。

【主治】肾劳虚寒,面肿垢黑,腰脊痛,不能久立,屈伸不利,梦寐惊悸,上气,小腹急,痛引腰脊,四肢苦寒,小便白浊。

36303 羊肾丸

《朱氏集验方》卷九。为方出《圣惠》卷三十六,名见《圣济总录》卷一一四“菖蒲丸”之异名。见该条。

36304 羊肾丸

《得效》卷十。为方出《千金》卷六,名见《圣济总录》卷一一四“肉苁蓉丸”之异名。见该条。

36305 羊肾丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】大鸡头二两一分 家韭子 牡蛎(煨) 各二两 半夏 木猪苓(赤者,同半夏炒) 各三两

【用法】上为末,烂煮羊肾去膜,同药末为

丸，如梧桐子大。入麝香一钱或朱砂为衣，瓦器盛之，每服二十丸，煎猪苓汤送下。

【主治】白浊。

36306 羊肾丸

【方源】《普济方》卷二二一。

【组成】羊肾一个

【用法】煮熟和炼成，拌乳粉半大两。空腹食之。

【功用】补益。

【主治】下焦虚冷，腰膝无力，虚弱。

36307 羊肾丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】鹿茸 菟丝子各一两 茴香五钱

【用法】上为末，以羊肾二对，入酒煮烂，为丸，阴干。每服三十五丸，酒送下，一日三次。

【主治】肾虚腰痛，不能反侧。

36308 羊肾方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肾一对（去膜净洗，切细，如小豆大） 白面三两

【用法】羊肾以白面拌和。同煮熟，入豉、盐、醋等，空心顿食之。

【主治】赤白痢。

36309 羊肾汤

【方源】《外台》卷十七引《经心录》。

【组成】羊肾一具 芎藭一两 茯苓二两 人参三两 附子一两（炮） 桂心二两 牡丹皮一两 磁石二两 当归二两 干地黄三两 大枣五枚（擘） 牡荆子一两（碎）

【用法】上切。以水一斗七升，煮药、肾取一斗，去肾，煮取四升，分四服，昼三夜一。

【主治】肾气不足，耳无所闻。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、胡荽、茺荑、酢物。

36310 羊肾汤

【方源】方出《证类本草》卷十七引《食医心鉴》，名见《普济方》卷三十。

【组成】羊肾一双（去脂）

【用法】细切。于豉汁中以五味、米揉，如

常法作羹食，作粥亦得。

【主治】肾劳损精竭。

36311 羊肾汤

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】人参一两（去芦头） 白芍药一两 麦门冬一两半（去心，焙） 熟干地黄一两 当归一两 杜仲一两（去粗皮，炙令黄，锉） 芎藭一两 远志一两（去心） 白茯苓 石斛一两（去根，锉） 五味子一两 黄耆半两（锉） 桂心一两 续断一两 磁石三两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】上为散。每服用羊肾一对，切去脂膜，以水一大盏半，煎至一盏，去肾，下药末五钱，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，空心及晚食前温服。

【主治】肾劳虚寒，面肿垢黑，腰脊痛，不能久立，屈伸不利。多语惊悸，上气，小腹里急，痛引腰脊，四肢苦寒，小便或白浊。

36312 羊肾汤

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】小羊肾汤（《鸡峰》卷九）。

【组成】磁石一两（捣碎，水淘去赤汁） 肉苁蓉一两（酒浸，刮去皱皮，炙干） 白茯苓半两 桂心半两 石菖蒲半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 五味子半两 当归半两 芎藭半两 石斛半两（去根，锉） 桑螵蛸半两（微炒） 杜仲半两（去粗皮，炙令微黄，锉） 熟干地黄一两

【用法】上为散。每服用羊肾一对，切去脂膜，以水一大盏半，煎至一盏，去肾，下药末半两，加生姜半分，煎至五分，去滓，空腹温服，晚食前再服。

【主治】肾劳虚损，面黑耳聋，腰脚疼痛，小便滑数。

36313 羊肾汤

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】羊肾一对（切，去脂膜） 远志三分（去心） 白芍药三分 熟干地黄一两 黄耆（锉） 白茯苓 人参（去芦头） 防风

(去芦头) 独活 甘草(炙微赤, 锉) 羚羊角屑各半两

【用法】上为散。每服用水一大盏, 先煎羊肾至七分, 去肾, 入药五钱, 煎至四分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】产后体虚, 心气不足, 血邪所攻, 以致荒语, 如见鬼神。

【备考】方中黄耆, 《圣济总录》作“黄芩”。

36314 羊肾汤

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】羊肾一对(切, 去脂膜) 羚羊角屑半两 熟干地黄一两 人参三分(去芦头) 麦门冬半两(去心) 茯神半两 五味子半两 桂心半两 附子一分(炮裂, 去皮脐) 续断半两 黄耆半两(锉) 当归半两(锉, 微炒) 干姜三分(炮裂, 锉) 芎藭半两

【用法】上为散。每服先以水一大盏半, 煮肾至一盞, 去肾, 入药五钱, 椒二七粒, 生姜半分, 大枣三枚, 煎至五分, 去滓, 空心温服。

【主治】产后虚羸, 乏力短气。

36315 羊肾汤

《圣济总录》卷八十六。为《外台》卷十六引《删繁方》“羊肾补肾汤”之异名。见该条。

36316 羊肾汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】磁石三两(煨, 醋淬) 桂(去粗皮) 甘草(炙, 锉) 各一两 五味子 白茯苓(去黑皮) 各二两 牛膝(酒浸, 切焙) 一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水二盏, 先取羊肾一只, 细切, 煎三五沸, 次下药, 煎至一盞, 去滓, 空腹温服, 良久再服。

【主治】虚劳肾气不足, 腰痛无力, 手脚痠痛, 状似骨蒸。

36317 羊肾酒

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】生羊腰一对 沙苑蒺藜四两(隔纸微炒) 真桂圆肉四两 淫羊藿四两(用铜刀去边毛, 羊油拌炒) 仙茅四两(用糯米淘汁浸, 去赤汁) 薏仁四两

【用法】用滴花烧酒二十斤, 浸七日。随量时时饮之。

【功用】种子延龄, 乌须黑发, 强筋骨, 壮气血, 添精补髓。

【主治】腿足无力, 寸步难行; 艰于嗣续。

【临证举例】痿证 有七十老翁, 腿足无力, 寸步难行, 将此甫服四日, 即能行走如常。后至九旬, 筋力不衰。

36318 羊肾散

【方源】《普济方》卷一五五引《卫生家宝》。

【组成】吴茱萸(生用) 食茱萸(生用) 山茱萸(生用) 各一两 川芎(生用) 黑牵牛(生用) 各半两 白牵牛一钱(生用)

【用法】上为末。每服三钱, 羊肾一个, 批开入药在内, 湿纸裹煨熟, 一日二次, 早空心、临卧细嚼温酒送下。

【主治】久患腰膝疼痛挛拳, 行动不得; 及伤寒后汗出不止, 两足不得屈伸。

36319 羊肾散

《普济方》卷二二八。即《千金》卷十九“肾沥散”。见该条。

36320 羊肾散

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】羊肾(为末)

【用法】每服一钱, 酒送下, 每日三次。

【功用】补肾气, 益精髓。

【主治】腰痛。

36321 羊肾粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】白羊肾一对(去脂膜, 切) 羊髓二两 白粳米二合

【用法】上相和, 煮作粥, 加盐、椒, 空腹食之。

【主治】五劳七伤, 羸瘦, 阳气不足, 心神

虚烦。

36322 羊肾粥

【方源】方出《圣惠》卷九十七，名见《魏氏家藏方》卷四。

【组成】白羊肾一对（去脂膜，切） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，切） 葱白三茎（去须，切） 薤白七茎（去须，切） 粳米一合

【用法】上先将羊肾及苁蓉，入少酒炒后，入水二大盏半，入米煮之，欲熟，次入葱白、薤白煮作粥，入五味调和，空腹食之。

【主治】羸瘦久积虚损，阳气衰弱，腰脚无力。

36323 羊肾粥

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】枸杞叶半斤 米三合 羊肾两个（碎切） 葱头五个（干者亦可）

【用法】同煮粥，加些盐味食之。

【主治】腰脚疼痛。

36324 羊肾羹

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】黄耆半两（锉） 羊肾一只（去脂膜，切） 杜仲半两（去粗皮，炙微黄，锉） 磁石五两（捣碎，水淘去赤汁，绵裹悬煎，不得到锅底） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】以水三大盏，先煮磁石，取汁二大盏；去磁石，下黄耆等，文煎，取一盏半；去滓，入羊肾、粳米一合，葱白、生姜、椒、盐、醋一如作羹法。空心服之，磁石重重用之无妨。

【主治】风虚耳聋。

36325 羊肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肾一具（去脂膜，细切） 羊肉三两（切） 嫩枸杞叶（细切）一升 葱白三茎（去须，切） 粳米半两 生姜二分（切）

【用法】先炒肾及肉、葱白、生姜，欲熟下

水二大盏半，入枸杞叶，次入米、五味等，煎作羹食之。

【主治】五劳七伤，肾气不足。

36326 羊肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肾一对（去脂膜，切） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮） 生薯蓣一两 羊髓一两 薤白一握（去须，切） 葱白半两（去须，切） 粳米一合

【用法】炒羊肾并髓等欲熟，下米并豉汁五大盏，次下苁蓉，更加生姜、盐等各少许，煮成羹食之。

【主治】五劳七伤，髓气竭绝。

36327 羊肾羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】白羊肾一对（去脂膜，切） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，切） 葱空三茎（去须，切） 羊肺三两（切）

【用法】以上并于豉汗中煮，入五味作羹。空腹食之。

【功用】令人肥健。

【主治】羸瘦久积虚损，阳气衰弱，腰脚无力。

36328 羊肾羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】羊肾（去筋膜，细切）一对 生山芋（去皮）四两 葱白一握（擘碎） 生姜（细切）一分

【用法】作羹如常法。空腹食。

【主治】耳聋耳鸣。

36329 羊乳丸

《千金》卷二十一注文引《张文仲方》。为原书同卷“黄连丸”之异名。见该条。

36330 羊乳丸

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】秦艽 柴胡 地骨皮 山茱萸肉 黄耆（蜜炙） 地黄（酒浸蒸过）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，不拘时候，煎人参汤送下，一日三次。

【主治】虚劳羸瘦。

【方论选录】《济阴纲目》：此方以黄耆补上焦元气，而配以地骨之苦寒，是补气不补火；以熟地补下焦之水，而配以山茱之温涩，是补水而又生肝；柴胡散结热之气，秦艽利一身之机；方以羊乳名者，以参、耆有羊肉之功也。

36331 羊乳饮

【方源】方出《本草图经》引《传信方》（见《证类本草》卷十七），名见《圣济总录》卷一四九。

【组成】羊乳

【用法】饮之。

【主治】蜘蛛咬，遍身生丝。

【临证举例】蜘蛛毒 贞元十一年，刘禹锡偶至奚吏部宅，坐客有崔员外云：目击有人为蜘蛛咬，腹大如有妊，遍身生丝，其家弃之，乞食于道，后遇僧，教饮羊乳，未几而疾平复。

36332 羊乳饮

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】羊乳一升

【用法】上慢火于银器中，煎令减半，分作五服。

【主治】小儿嘔不止。

36333 羊乳饮

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】羊乳五合

【用法】冷点口中。

【主治】小儿口疮赤烂。

36334 羊乳膏

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】甘草二两 白羊乳三升 羊胰二具

【用法】上相和一宿，先以酢浆洗面水布拭之，夜敷药两遍，明旦以猪蹄汤洗却，每夜洗之。

【主治】面上野黧。

36335 羊肺汤

【方源】《外台》卷九引太医史脱方。

【组成】款冬花一两 紫菀 干姜 细辛各一两 桂心 甘草（炙）各半两 五味子半斤 白前 食茱萸各半两 羊肺一枚（细切）

【用法】上切。以水八升合煮，取三升，去滓，一服三合，每日三次。

【主治】咳嗽。

【宜忌】禁食盐、蒜、生菜、海藻、菘菜、生葱。

36336 羊肺汤

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】钟乳五两 牡蛎（熬） 桂心各六两 射干 桃仁（去尖皮） 贝母 橘皮 百部根 五味子各三两 生姜六两 白石英半夏（洗）各五两 款冬花 甘草（炙） 厚朴（炙）各二两 羊肺一具

【用法】上切。先以水二斗三升，煮羊肺，取一斗，去肺，纳诸药，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】咳嗽昼夜无闲，息气欲绝，肺伤唾血。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饴、生葱。

36337 羊肺汤

《本草纲目》卷五十。即《修月鲁班经后录》引《十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）“润肺膏”。见该条。

36338 羊肺散

【方源】《千金》卷六。

【组成】羊肺一具（干之） 白术四两 苁蓉 通草 干姜 芎藭各二两

【用法】上为末。每服五分匕，加至方寸匕，食后以米饮送下。

【主治】①《千金》：鼻中瘖肉，鼻梁起。②《三因》：肺虚壅塞，鼻生瘖肉，不闻香臭。

【方论选录】《千金方衍义》：鼻梁高起，湿热上攻肺经之验，故首推羊肺之同气相干，以引通草泄热，干姜散结，川芎祛风，生术燥湿，苁蓉之咸引之下泄也。

【备考】《三因》本方用法：为细末，以水

量打稀稠得所，灌肺中煮熟，研细，焙干为末。食后米饮服一二钱。

36339 羊肺羹

【方源】《医方类聚》卷一三六引《食医心鉴》。

【组成】羊肺一具

【用法】上细切。葱白一握，于豉汁中煮食之。

【主治】小便多数，瘦损无力。

36340 羊肺羹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】羊肺一具（治如食法） 精羊肉五两（切） 粳米半合 葱白五茎（切） 生姜少许 盐醋

【用法】上相和，依常法作羹。饱食之。

【主治】三消，小便数。

36341 羊肺羹

【方源】《寿亲养老》卷二。

【异名】羊肉羹（《医学入门》卷三）。

【组成】羊肺一具（细切） 羊肉四两（细切）

【用法】上加五味作羹。空腹食之。

【主治】下焦虚冷，小便频数。

36342 羊胡散

《疡医大全》卷三十。即《外科启玄》卷十二“胶胡散”。见该条。

36343 羊荚顶

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】羊肉（如拳大一块，煮熟） 熟皂荚一个（炙） 黑锡一两

【用法】以无灰酒一升，将皂荚入铜铛内煮三五沸，去滓入黑锡，煎至一合，令病人先啖肉汁，后服一合之药。

【主治】骨蒸传尸。

36344 羊胃汤

【方源】《外台》卷二十引《张文仲方》。

【组成】羊胃一枚（切） 白术一升（切）

【用法】上以水一斗，煮取九升，服一升，每日三次，三日尽，更作两剂。

【主治】久病羸瘦，不生肌肉，水气在胁下，

不能食，四肢烦热。

【宜忌】忌桃、李、雀肉等。

36345 羊骨汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】羊骨一具 生地黄 白术各三斤 桂心八两 麦门冬 人参 芍药 生姜 甘草各三两 茯苓四两 厚朴 阿胶 桑白皮各一两 大枣二十枚，饴糖半斤

【用法】上咬咀。以水五斗煮羊骨，取三斗汁，去骨煮药，取八升，汤成下胶饴令烊，平旦服一升，后且服一升。

【功用】《千金方衍义》：益脾滋肺。

【主治】失精多睡，目眈眈。

36346 羊骨汤

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】羊脊骨一具（连喉者） 豉 白粟米各一升 葱白（切）一把

【用法】上药各分作两度煮，每度用水六升，煮至三升，去滓，渴即温汁量意饮之，以愈为度。

【主治】消渴。

36347 羊骨饮

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】羊脊骨一具（捶碎） 磁石二两半（碎） 白术一两半 黄耆 干姜（炮） 白茯苓（去黑皮） 桂（去皮）各半两

【用法】上药除羊骨外，锉如麻豆大。先以水五升，煮骨取二升，去骨纳药，煎取一升，去滓，空腹分温三服。

【主治】肾虚寒，耳鸣多睡。

36348 羊骨散

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】羊胫骨（烧灰存性）四两 升麻五钱 生地黄五钱 黄连一钱 梧桐木律三钱 龙胆草少许

【用法】上为末，入石膏末五两，擦牙，用水漱；或以寒水石代石膏用亦可。

【主治】肾虚风热牙疼。

36349 羊骨粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊骨两具(捶碎)

【用法】上以水二斗,慢火煎取三升,如常法作粥食;作羹亦得。

【主治】虚劳。

36350 羊骨粥

《圣济总录》卷一八九。为《圣惠》卷九十七“羊脊骨羹”之异名。见该条。

36351 羊骨粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】羊骨一付(全者,捶碎) 陈皮二钱(去白) 良姜二钱 草果二个 生姜一两 盐少许

【用法】以水二斗,慢火熬成汁,滤出澄清,如常作粥;或作羹汤亦可。

【主治】虚劳,腰膝无力。

36352 羊须散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】羖羊须 荆芥 干枣(去核)各二钱

【用法】上烧炒存性,入膩粉五分,为末。先以温水洗净,香油调搽。

【主治】①《疡科选粹》:面上、耳边黄水疮。②《杂病源流犀烛》:羊须疮。

36353 羊须膏

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】羖羊须不拘多少(烧灰)

【用法】上为细末。以腊月猪脂和封之。

【主治】蠼螋尿疮,汁出疼痛。

36354 羊胆丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】羊胆干膏 53克 百部 150克 白及 200克 浙贝母 100克 甘草 60克

【用法】以上五味,甘草、白及各为细末,其余羊胆干膏等三味为细末,过筛,混匀。取部分羊胆干膏等粉末起模,剩余的粉末与白及粉末混匀,用水为丸,再用甘草粉末包衣,干燥。口服,一次3克,每日三次。

【功用】止咳化痰,止血。

【主治】咳嗽,痰中带血;百日咳。

36355 羊胆膏

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】羊胆一枚 猪脂一合 细辛一分

【用法】上以羊胆煎,三上三下膏成。夜涂敷,早起以浆水洗去。

【主治】面皴皯,及产妇黑黧如雀卵色。

36356 羊胆膏

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经后录》。

【组成】羯羊胆一个

【用法】入蜜在内,扎住,入砂器内煮半日,取阴放净地半日。点眼。

【主治】①《医方类聚》引《修月鲁般经后录》:眼目昏花。②《医统》:一切眼疾。

36357 羊胆膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】羊胆一枚 片脑末一分

【用法】腊月取羊胆,入片脑末,置风处挂干。用时以凉水化开,频敷患处,内服槐子酒或加味泻肝汤,若得熊胆更佳。如眼痛者,点眼。

【主治】痔漏,下疳疮;眼痛。

36358 羊胫散

《医编》卷七。为《明医指掌》卷八“羊胫灰散”之异名。见该条。

36359 羊屎散

【方源】《病科全书》。

【组成】山羊屎四两(焙,研)

【用法】菜油调搽患处。

【主治】真元虚损病。环颈破烂,臭秽不堪,久不收口,愈发愈众。

36360 羊屎膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】干羊屎

【用法】上为末,用猪脂和。涂疮口。

【主治】竹木所刺入手足,壮不出脓,疼痛。

36361 羊脊粥

【方源】《养老奉亲》。

【异名】羊脊髓粥(《医便》卷四)。

【组成】大羊脊骨一具(肥者,捶碎) 青梁米四合(净淘)

【用法】以水五升，煎取二升汁，下米煮作粥，空心食之。可下五味常服。

【主治】老人脾胃气弱，劳损不下食。

36362 羊脊羹

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】白羊脊骨一具（全者，捶碎） 梁米一合 羊肾一对

【用法】用梁米一合，水四升，煎骨熟，入羊肾再煎候熟。取出滤过，将肾切，入葱白五味，如常作羹食。

【主治】下元久冷。

36363 羊脂汤

【方源】《千金翼》卷七。

【组成】羊脂五两 当归 干姜 黄柏 黄连各三两

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升，去滓，纳脂令烊，分三服。

【主治】产后下痢。

36364 羊脂粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】羊脂一两 猪脂一两 黄牛脂三两 葱 薤各五茎（切，去须） 汉椒（去目及闭口者，微炒，捣末）半钱 生姜一分（切） 苽萝末一钱

【用法】先将脂等与葱、薤、生姜同炒，次用水入梗米三合，煮成粥，入苽萝、椒末，搅令匀，空腹填服之。

【主治】赤白痢久不愈，困劣，烦渴甚。

36365 羊脂粥

【方源】《寿世青编》卷八。

【组成】羊脂 梗米 葱白 生姜 椒豉

【用法】煮粥。日食一具羊脂。

【主治】半身不遂，中风。

36366 羊脂粥

【方源】《痢症纂要》卷十。

【组成】羊脂 阿胶 白蜡 蜂蜜

【用法】和黍米煮粥。空腹服之。

【主治】休息久痢。

36367 羊脂煎

【方源】《千金》卷十五。

【组成】乱发（灰汁洗去垢腻，烧末） 黄连末各一升 乌梅肉二两 酢七合（煎取稠） 白蜡两棋子 羊脂一棋子 蜜七合（煎取五合）

【用法】上药合纳铜器中，汤上煎之。为丸如梧桐子大。每服三十丸，饮送下，一日三次。

【主治】诸久痢不愈。

【方论选录】《千金方衍义》：羊禀燥金形气，肠最坚韧，而脂有厚肠止痢之功，妙用尤在生煎，而滋气虚枯燥，同气相感之应也。然痢久不愈，虽言正气虚衰，必有热淫于内，又须连、发以胜伏匿之邪，蜡、蜜以滋肠胃之燥，梅、酢以敛津液之脱。用方者勿误认羊脂性滑而致扼腕也。

36368 羊脂煎

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】羊脂一升 牛髓二升 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 桂心一两 人参一两（去芦头） 五味子一两半 芎藭一两 干姜一两（炮裂，锉） 生干地黄二两 远志一两（去心） 生姜汁二合 当归一两（锉，微炒） 生地黄汁一升 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为细散。先用羊脂、牛髓、生姜、地黄等汁，以慢火煎令沸，后入药末，煎炼成膏，收子瓷器中。每服半匙，以温酒调下，每日三四次。

【主治】痿痹气，四肢羸瘦，心神虚烦，皮肤干燥，不欲饮食。

36369 羊脂膏

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷三〇八。

【组成】麝香 大蒜

【用法】上为末，以羊脂和，著小筒中。欲用，取敷疮上。

【主治】沙虱毒。

36370 羊脏方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肝、肚、肾、心、肺各一具(汤洗细切) 胡椒 荏苒各一两 豉一合 葱白一握(细切) 牛酥一两

【用法】上先以五味相和,以水七升,慢火煎取五升,去滓,和羊肝等并汁皆纳羊肚中,系肚口,别用绢袋盛之,煮熟,乘热出,切肚食之,并旋旋服尽药汁。

【主治】虚劳。

36371 羊脏散

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】羊脏头 皮消 槐枝 柳枝 防风 荆芥 川椒

【用法】羊脏头一个,装皮消在内,系紧两头,用阳城罐仍用铁丝丫髻放在内,上用一钉,横在罐口,将铁线系脏挂在内,用油盏盖口,盐泥固封,火煨过,取脏、消并滴下汁,为末;先用槐柳枝、防风、荆芥、川椒煎汤洗净,搽上药末;如不消,用雄猪左蹄悬甲切碎,放在瓦上烧,置于净桶内,盖上留一孔,将患处熏之,再搽前药二三遍。

【主治】痔疮。

36372 羊脏羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】羊肝 羊肚 羊肾 羊心 羊肺各一具(汤洗净) 牛酥一两 胡椒一两 荏苒一两 豉一合 陈皮二钱(去白) 良姜二钱 草果一两个 葱五茎

【用法】先将羊肝等慢火煮令熟,将汁滤净,和羊肝等并药一同入羊肚内缝合,令绢袋盛之,再煮熟,入五味,旋旋任童食之。

【主治】肾虚劳损,骨髓伤败。

36373 羊脑方

【方源】《普济方》卷三一二。

【组成】羊脑一合 龟甲一两半(屑) 生地黄三两(切)

【用法】上以酒焙,和捣如泥。微热裹患处,冷却易之。

【主治】被马坠损,疼痛不可忍。

36374 羊脑玉

【方源】《异授眼科》。

【组成】上好羊脑炉甘石八两(打如莲子大,一分重为则。用新铜罐盛入童便,浸四十九日,滤去宿童便,更入新童便煮,一柱香久,咬咸酸味,不必再煮,又不可煮老,研为细末,用缸片一大块,将药放在上,用硬炭火煨,一柱香久,甘石渐渐转如松花色,细心谨慎取起,总称匀分,作四分。一分用童便再煮三次,候干)

【用法】上药研细,另用瓷瓶收贮。点眼。

【主治】内障,迎风冷泪,怕日羞明,昏花,或胥肉扳睛,赤白翳膜烂弦;及时行火眼,或年久云翳遮睛,不能行路,但见人影,如白衣人行,有血根扳睛者。

【备考】原书用本方,治内障,迎风冷泪,怕日羞明,昏花者,须兑虎液、凤麟、冰片合用;治内障,胥肉扳睛,赤白翳膜烂弦者,须兑虎液、青龙、冰片合用;治时行火眼、须兑虎液、朱砂合用;治年久云翳遮睛,有血根扳睛者,先用本方兑青龙点眼,直点至翳开之后,再用本方兑虎液、凤麟、冰片、珍珠、琥珀合用。

36375 羊脑煎

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】柏白皮 榆白皮 桑白皮 杏仁(去皮尖)各一两 甘草一两 羊脑髓半斤

【用法】上锉细,以羊脑髓煎令黄,滤去滓,瓷器盛。每用以鹅翎蘸药涂。

【主治】冻耳成疮。

36376 羊脑膏

【方源】方出《千金》卷二十五,名见《普济方》卷三一一。

【组成】羊脑一两 胡桃脂 发灰 胡粉各半两

【用法】上为末,和调如膏。敷,生布裹之。

【主治】四肢骨碎,筋伤蹉跌。

36377 羊脑膏

【方源】方出《圣惠》卷六十八,名见《普

济方》卷三〇〇。

【组成】羊脑髓

【用法】用刀薄刮刺上，以新熟酒醅和羊脑髓敷之。一宿愈。

【主治】肉刺。

36378 羊酒方

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】大黄 麻黄(天热减半) 蝉退各一两 羊肉斤许(煮汁三饭碗听用)

【用法】同好酒三碗，煎药至三碗，先以羊肉同饭吃完，次服药汁完。厚盖卧，头至足出大汗，欲泻，至空地，连解连移，勿令气复入肛门，内外毒尽出，无后患。

【主治】杨梅疮。

36379 羊羔酒

【方源】《寿亲养老》卷三引《宣和化成殿方》。

【组成】米一石 肥羊肉七斤 曲十四两(诸曲皆可) 杏仁一斤 木香一两

【用法】米如常法浸浆，将羊肉切作四方块，烂煮，杏仁同煮，留汁七斗许，拌米饭、曲，更用木香同酿，不得犯水，十日熟，味极甘滑。

【功用】《本草纲目》引《宣和化成殿方》：大补元气，健脾胃，益腰肾。

36380 羊粪酒

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】羊粪十颗 好酒二合

【用法】煎取一合，顿服；未愈再服。

【主治】小儿食后无故吐逆，酸水不止，或三五口。

36381 羊粪膏

《普济方》卷五十三。为《圣济总录》卷一一四“食盐丸”之异名。见该条。

36382 羊睛方

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷七十三。

【组成】熟羊眼睛

【用法】晒干，为末。敷目两角。

【主治】目赤生翳。

36383 羊蜜方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【异名】羊蜜膏(《饮膳正要》卷二)。

【组成】熟羊脂 熟牛髓 白蜜 熟猪脂各五两 生姜汁一合 生地黄汁五两

【用法】上先以猪羊脂煎一沸，次下牛髓，又煎一沸，次下白蜜、生姜、地黄汁，微火煎，不住手搅，膏成，贮密器中。每服一匙许，空腹温酒调下，羹粥中服之亦得。

【主治】虚劳腰痛，咳嗽，肺痿骨蒸。

【加减】若食素者，以酥代脂髓，加麦门冬汁；若不能食或多风者，加白术。

【备考】《饮膳正要》有熟羊髓，无熟牛髓、熟猪脂。

36384 羊蜜膏

《饮膳正要》卷二。为《圣济总录》卷一八九“羊蜜方”之异名。见该条。

36385 羊膈丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】羊膈二七枚(炙黄，切) 人参一两半 昆布(洗去咸，炙干)三两 木通(锉) 海藻(洗去咸，炙干)各一两 海蛤(研) 杏仁(汤浸去皮尖，双仁炒) 恶实(微炒)各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，米饮送下，每日二次。

【主治】咽喉不利，颈项渐粗，将成瘰癧。

36386 羊蹄散

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷二七六。

【组成】羊蹄根(净去土)

【用法】细切熟熬，以醋和熟捣，净洗疮，敷上一时间，以冷水洗之，每日一次；又阴干作末，痒时搔汁出，以粉之，又以生葱根搯之。

【主治】久病疥湿疮，浸淫日广，痒不可堪，搔之黄汁出，愈后复发。

36387 羊蹄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】白矾半两 羊蹄根四两(制)

【用法】上为末。入米醋小半盏同擦，不住擦之。后觉癬极痒，至痛即止。隔日洗去再擦。

【主治】小儿顽癬久不愈。

36388 羊藿散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】云羊藿二两 木鳖仁二两 北细辛一两

【用法】先将羊藿、细辛为末，再入木鳖研细，乳匀。用热火酒调敷。

【主治】手脚龟及疮毒。

36389 羊髓粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊髓三合 羊肾一对（去脂膜，切） 葱白三茎（去须，切） 生姜半两（切） 粳米一合 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，切）

【用法】上以髓炒肾及葱、生姜，欲熟，入水二大盏半，次入米、五味等，煮作粥食之。

【功用】补虚，强志，益气。

【主治】五劳七伤。

36390 羊髓粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】羊髓三合 羊脊骨一具（捶碎）米五合

【用法】上以水五升，煮骨取二升，去骨著米，入五味煮粥熟，入羊髓搅，空腹食之。

【主治】腰痛，脚膝无力。

36391 羊髓煎

【方源】《千金翼》卷十九。

【异名】甘草汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】羊髓二合（无即以酥代之） 白蜜二合 甘草一两（炙，切）

【用法】以水三升，煮甘草取一升，去滓，纳蜜、髓，煎令如饴。含之尽，复含。

【功用】濡咽。

【主治】消渴口干。

36392 羊髓膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】羊髓二两 大黄二两 甘草一两

胡粉二分

【用法】上咬咀。以猪脂二升半，并胡粉，微火煎三上下，绞去滓，候冷，敷疮上。每日四五次。

【主治】①《鬼遗》：燥疽浸淫广大，赤黑烂坏成疮。②《圣济总录》：痈疽始作便坏，热毒发疮。

36393 羊髓膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】羊髓一斤 柏白皮一两 生地黄一两 蛇衔草一两 黄芩一两 梔子仁一两 苦竹叶一两

【用法】上为细末。先于锅中炼羊髓令沸，以下诸药同煎，候地黄色黑为度，以绵滤去滓，倾于瓷器中。候冷，涂于疮上，每日三次。

【主治】小儿火烧疮败坏。

36394 羊髓膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】羖羊胫骨髓二两 丹砂（研）半两 鸡子白二枚

【用法】先将髓并丹砂入乳钵中为末，以鸡子白调和令匀，入盒中盛。每用时，先以浆水洗面，后涂之。

【功用】润泽面容。

【主治】面黥黯。

36395 羊髓膏

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】羊髓 熏陆香各三两

【用法】上于铫子中，慢火熬成膏，去滓入瓷器中盛贮。以膏摩背。候鼻通为效。

【主治】小儿鼻塞不通。

36396 羊子肝散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】蕤仁一分（汤浸，去皮） 防风一分（去芦头） 香坡一分（炒黄） 并泉石半两（细研）

【用法】上为细散。用羊子肝一片，并药同煮，肝令烂，四五岁儿，分作二服，以新汲

水送下。

【主治】小儿青盲不见物。

36397 羊头肉方

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】羊头脰(《圣济总录》卷一八八)。

【组成】白羊头一枚(洗如法)

【用法】上蒸令极熟,切,以五味汁食之;或作脰,入五辛酱醋食之亦得。

【主治】①《圣惠》:中风,目眩羸瘦,小儿惊痫,及五劳,手足无力。②《医方类聚》引《食医心鉴》:产后风眩瘦病,五劳七伤,心虚惊悸。

36398 羊头蹄煎

【方源】《华佗神医秘传》卷二十一。

【组成】白羊头蹄一具(草火烧令黄赤,先以水煮半熟) 胡椒一两 荜茇一两 干姜一两 葱白 香豉一升

【用法】更煮令大烂,去骨,空腹任性食之,每日食一具,满七具止。

【主治】五劳七伤虚损。

【宜忌】禁生冷、铅丹、瓜果、肥膩、白酒、大蒜、一切畜血等七日。

【备考】方中葱白用量原缺。

36399 羊肉发药

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】威灵仙一两 蝉衣 川芎 当归各三钱 麻黄(春用七钱,夏用五钱,秋用九钱,冬用二两二钱)

【用法】先用羊肉一斤,水十碗,煎七碗,去羊肉,入前药于汁内,煎至三碗,去滓,一日内分三服,追尽,即将羊肉吃完,水酒过口。用被盖取汗,或吐或泻,至三四次方好,以粥补住。内毒自解,外毒自发。

【主治】杨梅疮初起,皮肤燥痒,上身为多。

【宜忌】忌牛、狗、鸡、鹅、火酒、茶、醋等物,每早食仙枣三枚;如病人不能饮酒,或虚极者,以胰子汤。

36400 羊肉食方

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肉(除皮膜)六两(煮熟) 仓米(淘净,炒香熟,捣末)三两

【用法】薄切羊肉,以仓米末拌掺。不拘时候,随意食之。

【主治】水痢注泻。

36401 羊肉索饼

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】羊肉四两(炒作臠) 白面半斤 陈橘皮一分(汤浸,去白瓢,焙) 生姜汁一合

【用法】上以橘皮末及生姜汁和面,作索饼,于豉汁中煮熟。入臠食之。

【主治】五噎,胸膈妨塞,饮食不下,瘦弱无力。

36402 羊肉索饼

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】白面四两 鸡子二枚(取清) 生姜汁一合 羊肉四两(炒臠)

【用法】上将鸡子清、生姜汁和面作索饼,煮熟入羊肉臠调和。空腹食。

【主治】脾胃气弱,见食呕逆,瘦劣。

36403 羊肉臠膳

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】羊肉一斤

【用法】上切。如常法调和作臠膳食之,煮羹亦得。

【主治】产后虚羸无力,腹肚冷,血气不调,及伤风头疼。

36404 羊肝生方

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】青羊肝一具

【用法】上细切。以水淘,漉出沥干。以葱、酱、盐、醋,食后吃之。

【功用】补肝气,益睛。

【主治】目热赤痛,视物不明。

36405 羊肝夹子

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】蝉壳 黄连各半两 甘草 菊花各一分 蛇蜕皮一条

【用法】上为末，每用羊肝一具，竹刀子批，掺药拌匀，用白面裹作夹子。每日食后吞一服。

【主治】眼退运并翳膜遮障，小儿疳眼雀目。

36406 羊肝饼饅

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】白羊肝一具（去筋膜，细切） 肉豆蔻一枚（去壳，末） 干姜一分（炮裂，末） 食茱萸一分（末） 茺萸仁一分（末） 茱萸一钱（末） 薤白一合（切）

【用法】先炒肝、薤欲熟，入豆蔻等末，盐汤、漉面作饼饅。炉里煨熟。每日空腹食一两枚。

【主治】脾胃气弱，不能食饮，四肢羸瘦。

36407 羊肝饼子

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】羊肝（细切）五两 茺萸（微炒）少许 薤白（细切）二七茎

【用法】入少许五味，以白面裹，依食法作饼子，候熟，空腹食之。

【主治】水痢。

36408 羊肚食方

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【异名】羊肚羹（《饮膳正要》卷二）。

【组成】羊肚（净治如食法）一枚 粳米（净淘）一合 葱白七茎 豉半合 蜀椒（去目并合口者，炒出汗）三十枚 生姜（切细）一分

【用法】上将五味药拌匀，入于羊肚内，烂煮热切。如常食法，淡入五味，每日食一枚，十日止。

【主治】中风。

36409 羊肾饼饅

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肾一两对（去脂膜，细切） 附子半两（炮裂，去皮脐，捣罗为末） 桂心一分（捣罗为末） 干姜一分（炮裂，锉末） 胡椒一钱（捣末） 肉苁蓉一两（酒

浸一宿，刮去皱皮，捣末） 大枣七枚（煮熟，去皮核，研为膏） 面三两

【用法】上将药末并枣及肾等，拌和为饼饅，漉面作饼饅，以数重湿纸裹，于塘灰火中煨，令纸焦，药熟。空腹食之，良久，宜吃三两匙温水饭压之。

【主治】下焦虚损，羸瘦，腰膝疼重，或多小便。

36410 羊肾馄饨

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】五味子 山茱萸 干姜（炮裂） 川椒（去目及闭口者，微炒去汗） 桂心各一两

【用法】上为细散。每日取羊肾一对，去脂膜细切，入散两钱，木臼内杵如泥，作馅用，和面捻作馄饨。以水熟煮，和汁食之。

【主治】肾气虚损，腰脚疼痛。

36411 羊骨煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】羊脊骨一条（去肉，截成段，用礞砂二两，醋二升同煎，旋煎旋蘸，骨炙令焦黄，以醋尽为度，细锉焙干） 沉香（锉） 木香 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 人参 牛膝（酒浸，切焙） 白茯苓（去黑皮） 山芋 郁李仁（汤浸，去皮） 附子（炮裂，去皮脐） 白术 丁香 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切焙） 石斛各半两 阿魏一分（醋化，入面和作饼，炙干）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心盐酒或盐汤送下。

【主治】肾脏虚冷，不思饮食，倦怠。

36412 羊骨煎丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】羊脊骨一条 附子（炮裂，去皮脐） 槟榔（锉） 黄耆（蜜炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两 沉香（锉） 蜀椒（去目并合口，炒出汗） 桂（去粗皮） 木香各半两

【用法】上九味，八味为末，用礞砂二两飞过；法酒、米醋各一升，同羊脊骨入银器内，文武火熬，令酒醋尽，焙燥，为末；别用酒作面糊，同前八味药末为丸，如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，空心，夜卧温酒或盐汤送下。

【主治】下经伤惫，腰膝无力，四肢皱黑，筋骨疼痛，行履艰难。

36413 羊胫灰丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】理脾丸（《得效》卷七）。

【组成】厚朴（去皮取肉，姜汁炒）二两 羊胫（炭火煨过通红，存性）一两

【用法】上为细末，白水面糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米饮送下。

【主治】思虑伤脾，脾不摄精，遂致白浊。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“羊胫炭丸”。

36414 羊胫灰散

【方源】《普济方》卷三九八。

【异名】鹿角散。

【组成】羊胫骨（烧灰） 鹿角（烧灰）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以热水化下，每日三四次。

【主治】小儿洞泄下痢不愈，乳食全少。

【备考】本方方名，据剂型，当作“羊胫灰丸”。

36415 羊胫灰散

【方源】《明医指掌》卷八。

【异名】羊胫散（《医编》卷七）。

【组成】地骨皮五钱 羊胫灰五钱 石膏五钱 升麻五钱

【用法】上为末。擦齿上。

【主治】牙齿疼痛难忍。

36416 羊胫炭丸

《医方类聚》卷一三四。即《济生》卷四“羊胫灰丸”。见该条。

36417 羊桃根散

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普

济方》卷一九三。

【组成】羊桃根半斤（锉） 桑根白皮半两（锉） 木通半斤（锉） 大戟半斤（锉碎微炒）

【用法】上为末，以水二斗，煮至五升，去滓，熬如稀汤。每服一茶匙，空心以茶清送下。得大小便一时通利，三两行为效，宜且吃浆水粥补之。

【主治】水气，心腹膨胀，大小便涩。

36418 羊桃根散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】羊桃根一两（锉） 消石一两 天灵盖半两（以慢火烧令烟绝） 寒水石一两 木香半两 白敛半两

【用法】上为末，以清水调如糊，摊于疏布上贴之，干即易之。不过五七度，候痒即愈。

【功用】拔去疮肿中毒。

【主治】发脑。

36419 羊脊骨汤

【方源】方出《证类本草》卷十七引《食医心镜》，名见《普济方》卷三十一。

【组成】羊脊骨一具（嫩者）

【用法】捶碎，烂煮，和蒜齏空腹食之，兼饮酒少许。

【主治】肾脏虚冷，腰脊转动不得。

36420 羊脊骨粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊连尾脊骨一握 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮） 菟丝子一分（酒浸三日，晒干，别捣末） 葱白三茎（去须，切） 粳米三合

【用法】上锉碎脊骨，水九大盏，煎取三盏，去滓，将骨汁入米并苁蓉等，煮粥欲熟，入葱五味调和，候熟，即入菟丝子末及酒二合，搅转，空腹食之。

【功用】益精气。

【主治】虚损羸瘦乏力。

36421 羊脊骨粥

《饮膳正要》（人卫本）卷二。即原书（丽宋楼

本)“羊脊骨羹”。见该条。

36422 羊脊骨羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】羊骨粥(《圣济总录》卷一八九)。

【组成】羊脊骨一具(捶碎,以水一斗煮取五升) 米二合

【用法】上取汁二大盏半,着米及生姜、盐、葱作羹,或作粥。空心食之。

【主治】脾胃气虚冷,羸瘦不下食。

36423 羊脊骨羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊脊骨一具(捶碎) 葱白四握(去须,切) 粳米四合

【用法】以水七大盏,煎骨取汁四大盏,漉去骨,每取汁二大盏,入米二合,及葱白、椒、盐、酱作羹。空腹食之。

【主治】肾脏风冷,腰脚疼痛,转动不得。

36424 羊脊骨羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊脊骨一具(捶碎,以水一斗,煎取三升) 羊肾一对(去脂膜,切) 羊肉二两(细切) 葱白五茎(去须) 粟米二合

【用法】上炒肾肉断血,即加生姜、葱五味,然后添骨汁,入米重煮成羹。空腹食之。

【主治】肾气虚冷,腰脚疼痛,转动不得。

36425 羊脊骨羹

【方源】《饮膳正要》(丽宋楼本)卷二。

【组成】羊脊骨一具(全者,捶碎) 肉苁蓉一两(洗,切作片) 草果三个 荜拔二钱

【用法】水熬成汁,滤去滓,入葱白五味,作面羹食之。

【主治】下元久虚,腰肾伤败。

【备考】本方方名,原书(人卫本)作“羊脊骨粥”。

36426 羊脊髓粥

《医便》卷四。为《养老奉亲》“羊脊粥”之异名。见该条。

36427 羊脂涂方

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】煅铁下槽中铁屎(捣研为末)半两 羊脂二两 猪粪(烧灰)一两

【用法】上为末如糊。涂之。以愈为度。

【主治】小儿伊火丹,从两胁下起,青黑色。

36428 羊痫疯丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】黄郁金一斤 白矾十二两 黄连一两 煅磁石二两 大黄一两 橘红一两 生栀子二两 神曲(麸炒)五两 黄柏二两 黄芩二两 煅金礞石六两 沉香一两 炒白芥子四两

【用法】上为细末,凉开水为丸,三钱重装袋。成人每次服一袋,小儿一至四周岁每袋分六次服,五至七周岁分三次服,白开水送下。

【功用】清热化痰,镇惊安神。

【主治】痰涎壅盛所致羊痫疯症,牙关紧闭,昏迷不醒,眼目上视,角弓反张。

【宜忌】孕妇及久病气虚者忌服。

36429 羊蹄肭丸

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】羊蹄肭花半两 白矾半两(烧令汁尽) 矾石半两(细研) 肉苁蓉一分

【用法】上为细末。以青羊脂和,绵裹如枣核大。纳鼻中,日夜换四五次。

【主治】鼻中生瘰肉,不通利。

36430 羊蹄根酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】羊蹄根六两 75%酒精十二两

【用法】将羊蹄根碾碎置酒精内,浸泡七昼夜,过滤去滓备用。用棉棒或毛刷蘸药水涂于患部。

【功用】杀虫止痒。

【主治】手癣(鹅掌风),甲癣(鹅爪风),落屑性脚癣(脚气症),体癣(钱癣),神经性皮炎(干癣)。

【宜忌】慎勿入目。

36431 羊蹄根酒

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】羊蹄根(土大黄)180克 土槿皮180克 制川乌 槟榔 百部 海桐皮 白藓皮 苦参各30克 蛇床子 千金子 地肤子 番木鳖 蛇衣 大枫子各15克 蜈蚣末9克 白信6克 斑蝥6克(布包)

【用法】以上各药加入高粱酒2500毫升,密封大口瓶内,浸半月至一月后,去药滓备用。用毛笔蘸药水外涂。

【功用】灭菌止痒。

【主治】体癣,股癣,神经性皮炎。

36432 羊蹄根散

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】羊蹄根八钱(末) 枯白矾二钱

【用法】上为末。米醋调擦癣处。

【功用】杀虫,渗湿,消毒。

【主治】诸癣。

36433 羊肉大黄汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】大黄一两 川芎八钱 威灵仙八钱 蝉蜕八钱 麻黄(去节)五钱 土茯苓二钱 羊肉(剔骨净)一斤

【用法】羊肉碎切,煮烂,去肉,用汤煎药服。

【主治】杨梅疮及鱼口、肾疳,体气壮实者。

【方论选录】方中大黄荡血分热毒;川芎行血分之气,排筋骨之湿;威灵仙散行经络,去滞壅之毒;蝉蜕其气清虚,去经络、皮肤之热湿;麻黄大启腠理,以宣其毒;用羊肉借血气以补血气,然此属火,最能发疮,更藉其力以尽发毒于外。此方大为涤荡宣发,亦厉剂矣。

36434 羊肉天真丸

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】精羊肉 人参 苁蓉 山药 当归 黄耆 白术 天冬

【主治】虚者鼻衄,时流清涕。

36435 羊肉地黄汤

【圣惠】卷八十一。为《千金》卷三“羊肉生地

黄汤”之异名。见该条。

36436 羊肉当归汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】羊肉三斤 当归 黄芩 芍药 甘草 防风各二两 芍药三两 生姜四两

【用法】上咬咀。以水一斗二升,先煮肉熟,减半,纳余药,取三升去滓。分三服,每日三次。

【主治】产后腹中心下切痛,不能食,往来寒热,若中风乏气力。

【方论选录】《千金方衍义》:羊肉当归汤以有寒热往来,虽无腹中绞痛,亦需当归、生姜、羊肉温补散邪;芍药、芍药护持营血;防风、黄芩虽散表热,实通血闭。

【备考】本方方名,《外台》引作“羊肉汤”。

36437 羊肉当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】当归四分 干姜 橘皮 黄耆 芍药 芍药 桂心 独活 防风各一分 人参 吴茱萸 甘草 干地黄 茯苓各一分 生姜六分 大枣三十枚 羊肉半斤

【用法】上 咀。以水一斗半煮肉,取一斗二升,出肉,纳诸药,煮取三升,分三服,每日三次。覆取温暖。

【主治】腹冷绞痛。

【方论选录】《千金方衍义》:《金匱》当归生姜羊肉汤专主产后腹中疝痛及寒疝腹胁急痛,《千金》本之以治腹中绞痛。盖绞痛与疝痛虽有冲击结滞之不同,而和营散结之治则一。如本方合小建中、黄耆建中以治虚劳里急诸不足,合理中、八珍以治气血虚寒诸不足,合吴茱萸汤、三物大建中以治胃虚呕逆诸不足;建中方中除去胶饴之粘滞,理中、八珍方中除去白术之壅闭,大建中方中除去蜀椒之耗气,更加独活、防风,佐黄耆以御外内合邪,橘皮佐姜、桂以涤涎饮下滞气也。

36438 羊肉当归汤

【方源】《外台》卷三十四引《许仁则方》。

【组成】肥羊肉一斤(去脂膜) 当归五两 生姜六两 黄耆四两

【用法】上切。以水一斗，缓火煮羊肉，取八升，澄清，纳药煮，取二升半，去滓温分服。

【功用】补气力。

【主治】产后虚弱，兼腹痛。

【加减】若恶露下不尽，加桂心三两；恶露下多，有风，加芎藭三两；有气，加细辛二两；有冷，加吴茱萸一两；有热，加生地黄汁二合。

【备考】本方方名，《妇人良方》引作“当归羊肉汤”。

36439 羊肉当归汤

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】肥羊肉二斤 当归半两(锉，微炒) 白芍药半两 龙骨三分 附子一(三)分(炮裂，去皮脐) 熟干地黄一两 白术三分 桂心三分 芎藭三分 黄耆三分(锉) 人参三分(去芦头)

【用法】上为粗散。先以水五大盏，煮羊肉取汁二大盏，每服用汁一中盏，加药四钱，生姜半分，大枣三枚，煎至六分。去滓温服，一日三次。

【主治】产后虚羸，乏弱无力，喘急汗出，腹中疼痛。

36440 羊肉杜仲汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】羊肉四斤 杜仲 紫菀各三两 五味子 细辛 款冬花 人参 厚朴 芎藭 附子 草薢 甘草 黄耆各二两 当归 桂心 白术各三两 生姜八两 大枣三十枚

【用法】上咬咀，以水二斗半煮肉，取汁一斗五升，去肉纳药，煎取三升半，去滓，分五服，日三夜二。

【主治】产后腰痛咳嗽。

【方论选录】《千金方衍义》：羊肉杜仲汤合查面用参附、耆术附、桂附、姜附，兼附子理中汤、甘草附子汤等方之制，峻用辛温以

开下著之痹；细辛、甘草以散上浮之咳；姜、桂辛散，五味收之；耆、术气壅，厚朴泄之；草薢、杜仲，湿著腰痛之向导；紫菀、款冬，风淫咳喘之专司。种种主治，仍借当归生姜羊肉汤鼓舞之力。

36441 羊肉扶羸丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】精羊肉一斤半(微断血脉，焙干取末)四两 白姜(炮)一两 川椒(去目，炒出汗) 肉豆蔻(煨)各一两 木香一分 附子(炮，去皮脐) 神曲(炒)半两

【用法】上为末，煮粟米饮为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米汤送下。

【主治】脾胃不和，不进饮食，脏腑虚滑。

【备考】老人虚人尤宜服之。

36442 羊肉补真丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】羊肉十两 当归(洗，焙) 白术 神曲(炒)各二两 丁香 茴香(炒) 肉豆蔻(面裹，煨香) 缩砂仁 干姜(炮) 肉桂(去粗皮)各一两 糯米半升(炒黄)

【用法】上为细末，次入羊肉末拌匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，不拘时候，温米饮送下。

【主治】脾胃久虚，荣卫气涩，精神昏困，肌肉羸瘦，全不入食。

36443 羊肉面棋子

【方源】《寿亲养老》卷二。

【组成】小麦面四两 肉豆蔻(去壳为末) 荜茇(为末) 胡椒(为末) 蜀椒(去目并闭口，炒出汗，为末)各一钱

【用法】上为末，以水和作棋子，用精羊肉四两细切，炒令干，下水五升，入葱、薤白各五茎细切，依常法煮肉，以盐醋调和，候熟，滤去肉，将汁煮棋子，空腹熟食之。

【主治】妇人血气癖积脏腑，疼痛，泄泻。

36444 羊肉桂心汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】羊肉三斤 桂心四两 当归 干

姜 甘草(炙)各三两 吴茱萸 人参 芍药 干地黄各二两(一方有桔梗三两)

【用法】上咬咀。以水一斗煮肉,取汁五升,去肉纳药,煮取二升半,分为三服。

【主治】产后虚冷心痛。

36445 羊肉黄耆汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】羊肉三斤 黄耆三两 大枣三十枚 茯苓 甘草 当归 桂心 芍药 麦门冬 干地黄各一两

【用法】上咬咀。以水二斗煮羊肉,取一升,去肉纳诸药,煎取三升,去滓,分三服,每日三次。

【功用】补益。

【主治】产后虚乏。

【方论选录】《千金方衍义》:前羊肉汤以有腹中绞痛,故用姜、芍之辛以散之;此无腹中绞痛,专宜补虚,故用黄耆、茯苓、门冬、大枣,滋养营气,可无藉于辛散也。

36446 羊肉黄耆汤

【方源】《普济方》卷三五二引《千金》。

【组成】羊肉五斤 黄耆一两半(锉) 白茯苓一两 白芍药一两 当归一两半(锉,微炒) 续断 五味子 草薢(锉) 桂心 熟干地黄各一两 麦门冬一两半(去心,焙)

【用法】上为散。用水一斗煮羊肉,取汁五升,每服用肉汁一中盏,药末四钱,大枣三枚,生姜半分,煎至六分。去滓温服,一日三次。

【主治】产后虚羸,四肢瘦弱,不能饮食。

36447 羊肝明目丸

【方源】《医医大全》卷十一。

【组成】羚羊角 白菊花(去叶蒂) 北五味 青箱子 牡丹皮各一两 白蒺藜(炒,去刺) 蜜蒙花 嫩黄耆(蜜拌,炙) 远志肉(甘草汤浸焙) 天门冬 麦门冬(去心) 白芍药(酒炒) 菟丝子各一两五钱 酸枣仁(炒) 杜仲(盐水拌炒,断丝) 白茯苓(乳拌三次) 于白术(东壁土炒) 怀

山药(炒) 人参各二两 黑羊肝一具(去净膜) 泽泻(盐水拌炒) 八钱 当归身(酒洗) 二两五钱 生地黄(用砂仁五钱,同酒煮烂捣膏) 香附(童便浸一宿,晒干,用醋拌炒) 各四两

【用法】黑羊肝用木贼草二两同酒煮烂,去木贼草,将肝同上药为细末,炼蜜为丸。每早三钱,白汤送下;每晚二钱,白酒送下。

【功用】明目。

36448 羊肝明目丸

【方源】《医级》卷八。

【异名】羊肝丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】黄连三两 甘菊 龙胆 石决(煅) 人参 当归 熟地 枸杞 麦冬 牛膝 青盐 黄柏 柴胡 防风 羌活各八钱 肉桂四钱 羯羊肝一具(蒸捣)

【用法】上为末,炼蜜和肝为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,白汤送下。

【主治】①《医级》:肝虚风热,冷泪赤涩,内外障眼。②《饲鹤亭集方》:肝虚风热,目赤肿痛,内障青盲,昏如云雾,怕火羞明。

36449 羊肝明目散

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】当归 生地 白芍 防风 赤芍 菊花 荆子 草决明 石决明 蒺藜 川芎 柴胡 连翘 青箱子 甘草各一两

【用法】上为细末。

【主治】眼目病。

36450 羊肝退翳丸

【方源】《医医大全》卷十一。

【组成】怀生地 熟地黄 白茯神(人乳拌,蒸晒) 怀山药(炒)各三两 甘枸杞 夜明砂(淘净)各四两 木贼草(蜜水拌炒) 蜜蒙花(蜜拌炒) 青箱子各二两 草决明二两五钱(捶碎,用水浸拌炒) 川黄连八钱(白酒浸一宿,微炒) 黑羊肝一具(去外膜,蒸熟)

【用法】上为粗末,同羊肝捣匀,再烘晒令干,再为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每

服二三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】雀盲眼，一切昏花老眼。

【宜忌】忌萝卜、胡椒、鸡鸭蛋。

36451 羊肝猪胆丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】羊肝一具（切片晒干，冬日可用慢火焙干）

【用法】上为细末，用猪胆汁和为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二钱，开水送下，一日二次。

【主治】有热而益甚，目瞳散大昏耗，视物乏力。

【备考】此方若用熊胆为丸更佳。

36452 羊角补中汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】补中益气汤加木香 茴香 羯羊角

【主治】中虚兼疝，偏坠胀疼。

【加减】左偏胀者，加右角；右偏胀者，加左角。

36453 羊肾苁蓉羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肾一对（去脂膜，细切） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，细切）

【用法】上药相和作羹，著葱白、盐、五味末等，一如常法，空腹食之。

【主治】五劳七伤，阳气衰弱，腰脚无力。

36454 羊肾补肾汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】羊肾汤（《圣济总录》卷八十六）。

【组成】羊肾一具（细切） 磁石（碎绵裹） 白术各八两 黄耆 茯苓 干姜各四两 桂心三两

【用法】上切。以水三斗，煮取七升，绞去滓，分服一升，昼四服，夜三服，燥器贮之，六月减水。

【主治】肾虚寒损，耳鸣好睡，欠眩委顿。

【宜忌】忌生葱、桃李、雀肉、酢等物。

36455 羊肾附子丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】附子一两半（炮裂，去皮脐） 磁石一两（烧令赤，醋淬七遍，捣碎研，水飞过） 牛膝一两（去苗） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 远志一两（去心）

【用法】上为末。用羊肾五对，去脂膜，细切烂研，入酒三升，于银铛中，微火煎如膏，入药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下，盐汤送下亦得。

【主治】劳聩。

36456 羊骨补肾汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】羊胫骨五两（炙黄，锉） 磁石（火煨，醋淬二七遍） 白术各二两 黄耆（锉） 干姜（炮） 白茯苓（去黑皮）各一两 桂（去粗皮）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，煎至一盂，去滓，分温二服，空腹，夜卧各一服。

【主治】肾虚寒，耳鸣好睡，日渐痿损。

36457 羊桃淋藟方

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】羊桃 蒴藳 白蒺藜 苍耳 海桐皮 柳树蠹（末） 商陆 蓖麻茎叶 水藻各一斤

【用法】上为细末。以水五斗，煎至二斗，去滓，看冷热，淋藟痛处。

【主治】风毒攻手足，疼痛赤肿，行立不得，皮肤如小虫行。

36458 羊蹄草合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】羊蹄草 31 克 盆上芫茜 31 克 崩大碗 31 克 白花蛇舌草 31 克 金银花 31 克 鬼针草 31 克 旱莲草 31 克

【用法】上药可采新鲜全草，水煎服。

【主治】鹅口疮。

36459 羊蹄根涂方

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】羊蹄根(捣绞自然汁)半合 生姜(研绞自然汁)半合 石硫黄四钱(研如粉)

【用法】上将二汁与硫黄末同研,令粘。涂患处。一日不得洗。

【主治】紫癜风。

36460 羊肉生地黄汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】羊肉地黄汤(《圣惠》卷八十一)。

【组成】羊肉三斤 生地黄(切)二升 桂心 当归 甘草 芎蒭 人参各二两 芍药三两

【用法】上咬咀。以水二斗,煮肉取一斗,去肉纳药,煎取三升,分四服,日三夜一。

【功用】①《千金》:补中益脏,强气力,消血。②《圣惠》:产妇七日后补虚羸,强力气,消滞血。

【主治】产后三日腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》:羊肉生地黄汤以治新产腹痛,乃兼取当归生姜羊肉汤、内补当归建中汤二方,除去姜、枣、胶饴,加人人参、芎、地平调血气,桂心行芍、地之寒滞,人参助羊肉之滋益也。

兴

36461 兴阳丹

【方源】方出《证类本草》卷十一引《食医心鉴》,名见《普济方》卷二一九。

【组成】栗当二斤(一名列当)

【用法】上为末。以酒一斗浸经宿。遂性饮之。

【功用】兴阳事。

米

36462 米饮

【方源】《食鉴本草》。

【组成】杵头糠(炒)一两

【用法】煮米饮调匀,空心服。

【主治】咽中作梗,下食则塞,反胃不止。

36463 米壳散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】米壳三钱 当归 乳香 没药 血竭 甘草 川芎各一钱半 半两钱一个(火烧醋淬七次)

【用法】上为粗末。每服三钱,用好酒一大盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】折伤。

36464 米莲饮

《卫生鸿宝》卷一。为《绛囊撮要》“晨泻散”之异名。见该条。

36465 米莲散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】糯米五钱 莲子心七枚

【用法】上为末。酒服;或以墨汁作丸服之。

【主治】吐血。

36466 米粉丹

【方源】《普济方》卷二一〇引《续易简》。

【组成】巴豆(去皮心膜,出油) 粉霜 硃砂 朱砂各一钱 砒霜(研)半钱

【用法】上为末,黄蜡二钱,熔成汁,下药搅匀,旋如绿豆大。每服一丸,米饮送下,未愈再进。

【主治】痢症及积痢。

36467 米粉散

【方源】《普济方》卷三六〇引《经验良方》。

【组成】白占米

【用法】上为细末。干扑。候皮肉生干方止。

【主治】小儿初生下,遍身无皮,俱是红肉。

36468 米黄散

【方源】《济阳纲目》卷三十四。

【组成】白术一钱半 苍术一钱三分 陈皮 白芍药 神曲 麦芽 山楂 茯苓 石膏各一钱 厚朴七分 藿香五分 甘草三分

【用法】水煎,临服入砂糖一匙调服。

【主治】黄病,爱吃生米。

36469 米猪肚

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】肥猪肚一具

【用法】入江米一茶钟,线缝严密。煮极烂

吃，连汤饮。

【主治】虚劳吐血；诸汗。

36470 米糖膏

【方源】方出《景岳全书》卷六十四，名见《仙拈集》卷四。

【组成】米糖（即胶饴）

【用法】以碗盛，于饭锅内蒸化，先用花椒、荆芥、防风等药煎汤洗疮净，乃将胶饴薄摊疮上，外以软竹箬盖定，用绢缚之。

【主治】烂腿疮久不愈。

36471 米囊皮散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】米囊皮（旧年者，去瓢，蜜涂，炙熟） 辟臭蔓（亦名香蔓） 厚朴（去皮，姜汁制） 甘草 陈橘皮 羌活各一两

【用法】上焙干，为粗末。每剂一大匙头，以水一盞，炼取七分服，余滓重煎服。

【主治】泻痢后胃气不和，兼治赤白痢。

【加减】白痢，加阿胶。

许

36472 许真君如意丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】党参 茯苓 附子 肉桂 淡姜 川连 川乌（而煨） 川椒 槟榔 厚朴 柴胡 当归 桔梗 紫菀 吴萸 木香 菖蒲 牙皂 巴霜各等分

【用法】上为末，面糊为丸，辰砂为衣。每服五七丸，随症送下。

【主治】瘟疫邪祟，鬼气客忤，岚瘴蛊毒，不服水土，及红白痢疾，反胃噎膈，痞癖疸症，疝气积滞，阴阳二毒，伤寒伤风，诸般痼疾、痰疾。

军

36473 军门丹

【方源】《卫生鸿宝》卷六。

【组成】紫藤香（即降香中最佳者，瓦镰刮下碾细） 五倍子（去虫屎） 牡蛎 白占

三七各一两 生半夏 血竭 乳香（去油） 象皮（焙黄）各五钱

【用法】上为细末，瓷瓶收贮。敷伤处。

【功用】止血止痛，续筋生肌，不脓无瘢。

【主治】刀伤。

36474 军门方

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】当归二钱 大黄（量人体之厚薄，伤之轻重酌用）一钱半至三钱 韭菜子一钱 生蒲黄一钱 熟蒲黄一钱 茜草根一钱 桃仁八分 红花八分 陈皮一钱 厚朴一钱 枳壳八分 甘草（炙）八分

【用法】水一碗，酒一碗，同煎至一碗服。

【主治】跌打损伤。

【方论选录】凡受伤者，有形之血伤为多，故君当归，且使血各归经，不致涌吐；血伤则瘀，瘀则生热，故臣以大黄，使瘀热下行；伤其枝必伤其本，故韭菜子以复元阳，且续其生气；生熟蒲黄、桃仁、红花、茹芦（即茜草根），皆所以理血；陈皮、厚朴、枳壳，皆所以理气；甘草以和中，气调而血始不乱。

36475 军持露

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】没药 乳香 儿茶 轻粉各等分

【用法】上为末。每用三至五钱，水煎黄色洗之，或猪蹄汤煎洗尤佳。

【功用】生肌。

【主治】溃瘍腐尽，见新肉珠时。

36476 军持露

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】熊胆一分许 冰片少许

【用法】凉水五至七茶匙化开，滴入耳内，其冷如冰，其痛立止。少时倾出，三二次痊愈。

【主治】耳内痛引脑项。

36477 军门一笑膏

【方源】《疡医大全》卷七引《邵氏秘书》。

【组成】白芷 川草薢 防风 罂粟壳 甘松 川羌活 三奈 川独活 藁本 高良

姜 官桂 大茴香 秦艽 小茴香 麻黄 威灵仙 川椒各二两 真附子 草乌 天南星 干姜 穿山甲 大黄 闹杨花(火酒拌炒) 半夏各四两 老葱 老姜各二觔 制松香四斤 土硫黄 密陀僧各一斤 广木香五钱 乳香(去油) 没药(去油)各三钱 潮脑一两 麝香三钱

【用法】老姜以上各药用麻油三斤、桐油半斤浸，熬枯去滓，复入净锅内，熬至滴水成珠；入制松香、土硫黄、密陀僧，为细末，收成膏冷定；再下广木香、乳香、没药，为细末，搅匀；再下潮脑、麝香，和匀，收贮。任摊用。

【主治】寒湿诸痼疼痛，贴骨痼疽。

36478 军门立效散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】皂角刺三钱(炒热入) 乳香五七分(炒香化再入) 天花粉三钱 甘草节(一寸长)九个 川椒三十粒

【用法】黄酒二钟，煎一钟，温服。

【主治】①《外科大成》：痼疽诸毒，对口附骨疽。②《疡医大全》：乳痞。

【宜忌】已溃者不宜服。

36479 军门立效散

【方源】《疡医大全》卷二十。

【组成】生麻黄八分 陈香橼一枚 甘草天花粉各八钱 瓜蒌一枚 金银花六钱 黄芩三钱 棉花核(黑色者)五钱

【用法】生酒煎服。出汗。

【主治】乳痞。

36480 军中一捻金

【方源】《永类铃方》卷七。

【异名】草蝎经进方。

【组成】金樱叶二两 桑叶一两 嫩苈叶一两

【用法】捣烂敷；若欲致远，阴干作末，缚上，帛缚。

【功用】止血合口。

【主治】①《永类铃方》：金疮。②《奇效

良方》：刀斧伤、箭伤，血出不能止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“军中一捻金散”。

36481 军中一捻金

【方源】《回春》卷八。

【组成】矿石灰(不拘多少，炒研) 生韭菜(连根)

【用法】同捣作饼，阴干为末。掺上。要端午日制。

【功用】止血生肌。

【主治】金疮伤破出血并狗咬。

36482 军中跌打丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【异名】跌打丸(《中医伤科学讲义》)。

【组成】当归一两 土鳖虫一两 川芎一两 血竭一两 没药一两 麻黄 自然铜乳香各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每重一钱。每服二丸，温开水送下。

【主治】跌打损伤，筋断骨折，瘀血攻心。

【宜忌】忌生冷、油腻、辛辣等食物。

36483 军中一捻金散

《普济方》卷三〇三。即《永类铃方》卷七“军中一捻金”。见该条。

36484 军中第一仙方

【方源】《跌损妙方》。

【组成】生狗头一个(将肉刮尽，文火煨存性，为末) 指甲灰 血余炭各一钱 陈松香五钱

【用法】上为末。掺伤处。以四味等分，用酒调服亦可。

【主治】断骨，刀伤。

异

36485 异功丸

【方源】《袖珍小儿》卷六引汤氏方。

【组成】泽泻一两三钱 猪苓七钱半 桂心二钱半 茯苓七钱半 白术五钱 人参五钱 辰砂一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每

服半丸或一丸，煎灯心、竹叶汤化下。

【功用】消暑毒，生津液，止泻。

【主治】小儿夏月心热，烦渴引饮。

36486 异功丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】半夏 大腹子 人参 赤茯苓各一两 甘草(炙)半两 生姜五两 白术 紫苏叶各半两 乌梅肉半两

【用法】除生姜外，为粗末，将生姜和皮锉碎，与药末为丸，如鸡子黄大。每服一丸，捶破，入紫苏(连茎)五叶，乌梅肉一个，水一大盏半，同煎至一盏，去滓温服。

【功用】升降阴阳，逐痰饮，和气止渴。

【主治】咳嗽喘逆，痰实昏眩。

36487 异功汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】雄鼠粪(炒令烟出)二七粒 山梔子仁五枚 枳壳(去瓢，麸炒)一分

【用法】上锉细。用水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒天行病愈后，食劳加热。

36488 异功汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】麻黄(去根节，先煎，掠去沫，焙)四两 苍术(米泔浸一宿，锉，焙) 白术各二两(米泔浸一宿，锉，焙) 芎藭 甘草(炙黄)各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白二寸，煎至七分，去滓，通口服，每日三次。

【功用】安胎和气。

【主治】妊娠伤寒，头痛体疼。

36489 异功汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】羌活 防风 全蝎 天麻 枳实 黄芩 黄连 胆星 橘红 茯神

【用法】加生姜、水煎服。

【主治】诸痛狂厥。

【加减】实甚，加大黄；虚者，加枣仁、白

术。

36490 异功散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】天麻(酒渍，焙) 赤箭 松黄 鬼白 安息香(研) 羌活(去芦头) 款冬花 枫香脂(研) 天蓼花 侧柏叶 苍耳各一两 苦参一两半 何首乌(炮，去黑皮) 细辛(去苗叶) 防风(去叉) 蔓荆实(去浮皮) 藁本(去苗土) 牛膝(切，焙) 地骨皮(去土) 甘草(炙，锉) 乳香(研) 天门冬(去心，焙) 麦门冬(去心，焙) 丹砂(研) 草薢 木香 虎骨(酒炙) 当归(切，焙) 天南星(炮) 干蝎(炒) 乌蛇(酒浸，去皮骨，炙) 白花蛇(酒浸，去皮骨，炙) 麻黄(去根节) 雄黄(研) 附子(炮裂，去皮脐) 芎藭 白僵蚕(直者，炒) 桂(去粗皮) 鸡舌香(研) 各半两

【用法】上为散，入云母粉六两研，和匀。每服一钱半匕，腊茶或米饮调下，每日三次。

【主治】大风疾涂药后。

36491 异功散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】陈粳米一升(生姜半斤，捣自然汁浸，焙干) 厚朴(去粗皮，涂生姜汁，蜜炙)二两 诃黎勒(煨)三枚(小者) 槟榔(锉)一枚 甘草半两(半生半炙，锉)

【用法】上为散。每服一钱匕，食后米饮调下，每日三次。

【主治】久咳嗽。

36492 异功散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】人参一两

【用法】上为极细末。五更鸡鸣时，打鸡子清调和稀糊，匙抄服；若服一两人参尽甚好，不尽，半两亦可。服讫却卧。

【主治】吐血。

36493 异功散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【异名】犀灰散（《传信适用方》卷三）。

【组成】黄牛角觮一枚（碎） 蛇蛻皮一条（白者） 猪牙皂荚五挺（锉） 鯪鲤甲半两

【用法】上入瓷瓶内，黄泥封固，候干，先以小火烧令烟出，后用大火煨令通赤为度，取出摊冷，为散。先用胡桃肉一枚，分作四分，取一分，临卧时细研如糊，温酒调下，便睡，先引出虫；至五更时，用温酒服药散二钱匕，至辰时更一服。虽患年久，不过三服愈。

【主治】五种痔疾，肠风泻血，外痔内痔；及脱肛，下部四边有努肉如乳。

36494 异功散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】五味异功散（《病疡机要》卷下）。

【组成】人参（切去顶） 茯苓（去皮） 白术 陈皮（锉） 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，大枣两个，同煎至七分，食前温服，量多少与之。

【功用】益气补中，理气健脾。

①《小儿药证直诀》：温中和气。②《保婴撮要》：温补脾胃，调补元气。③《杂病源流犀烛》：调气益气。

【主治】脾虚气滞。饮食减少，胸脘痞闷，食入作胀，大便溏薄，神疲气短，身体羸瘦，或面部浮肿者。

①《小儿药证直诀》：小儿虚冷吐泻，不思乳食。②《女科撮要》：脾胃虚寒，饮食少思；或久患咳嗽；或腹满不食，而浮气逆。③《病疡机要》：食而难化，大便不实。④《保婴撮要》：脾胃虚弱，惊搐痰盛，睡面露睛，手足指冷，肺痿喘咳短气；或胃气虚寒，面色皤白，目无睛光，口中气冷，不食吐水，肌瘦腹痛；或禀赋虚弱，肌肉消薄，荣卫不足而患疮疡，不能收口；或虚热上攻，口舌生疮。⑤《明医指掌》：小儿未断乳，母复有胎儿，饮其乳而患魁病，羸瘦骨立，发黄壮热，大便不调。

【方论选录】《医略六书》：人参扶元气以补

肺，白术燥湿气以健脾，茯苓渗湿清治节，橘红利气化痰涎，炙甘草以益胃气，姜汤煎服，使脾气鼓运，则痰涎自化而肺络清和。

【临证举例】①咳嗽 《校注妇人良方》：一产妇咳而胸满不食，涕唾，面肿气逆，此病在胃面关于肺，用异功散而愈。②喘 《保婴撮要》：一小儿外感风邪，服表散之剂，汗出作喘，此邪气去而脾肺虚也。用异功散而汗喘止，再剂面乳食进。③泄泻 《保婴撮要》：一小儿患泻，乳食不化，手足指冷，服消乳丸，食乳即泻，余用五味异功散加木香，母子服之而愈。④发热 《保婴撮要》：一小儿发热，饮食少思，大便不实，常服芦荟等丸，视其鼻赤，此寒冷之剂复伤脾土而虚热也，用五味异功散，数剂而愈。

36495 异功散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《刘氏家传》。

【组成】藿香 白术（炒） 人参 白茯苓 陈皮 木香 肉豆蔻（面裹，煨） 甘草各等分

【用法】上为末。每服小半钱，以紫苏饭饮调下。

【主治】胃气不和，脏腑泄泻，不思乳食；或吮奶呕逆。

36496 异功散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《张氏家传》。

【组成】盆消一两 甘草（炙）六钱 诃子肉 白僵蚕 贯众 马勃 蛇蛻（点油醋，慢火炒黄）各半两 硼砂 玄精石各一两

【用法】上为细末。每服一字，以芦管吹喉内；缠喉风，每服半钱，以磨刀水调下；寻常置舌根下。

【主治】缠喉风，疔腮，喉闭，及咽喉一切患。

36497 异功散

【方源】《续本事》卷三。

【组成】牡丹 芍药 白芷 干姜各三钱

当归 陈皮(去白) 官桂 玄胡索 乌药 川芎 苦梗各半两

【用法】上为末。每服二钱，加生姜三片，酒、水各半盏，煎至七分，温服；初生产时，每日三次，七日后渐减次数，至十日。

【主治】妇人血冷气痛，心胸烦闷，不思饮食，四肢无力，头目昏疼，寒热往来，状似劳倦。

【备考】服后些少腹痛，不妨事。

36498 异功散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】浮小麦不以多少(拣净，炒令焦，薄纸衬于地上放冷)

【用法】上为细末。每服三钱，用煮软猪嘴薄切数片，临睡捏药吃；不食荤者，用白汤点服。

【主治】盗汗不止。

36499 异功散

【方源】《保婴撮要》卷七引汤氏方。

【组成】泽泻三钱 猪苓(去皮)三钱 陈皮二钱半 白术 茯苓 人参各五钱 辰砂一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，灯心、竹叶汤化下。

【功用】①《保婴撮要》：止渴，消暑，生津。②《景岳全书》：补脾胃。

【主治】小儿脾胃虚寒，泻痢兼呕，或腹中作痛。

36500 异功散

【方源】《医方类聚》卷一八四引《吴氏集验方》。

【组成】黄柏皮三钱(以蜜涂，火炙五次) 白矾一钱(飞过) 鹰爪黄连一钱半 脑子半钱 麝香一字 荆芥穗半钱 甘草半钱(蜜炙三次)

【用法】上为末。先以荆芥、黄连、黄柏皮、白矾、百药煎、川椒木、葱各少许，以水十碗，煎至七碗，用盆盛之，盖盆而小窍，就疮口熏之，水温洗疮净，以净软绢片拭干，以

前药干撒于疮口。

【主治】痔漏下疳，连肛疮，面上伽摩罗疮，脑疽，恶毒脓血不止，腥臭，生虫疮。

36501 异功散

《得效》卷一。即《理伤续断方》“五积散”去麻黄。见该条。

36502 异功散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【异名】正气散。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草(炙) 白扁豆 薯蓣各等分

【用法】上为末。每服二钱，用水六分，加生姜二片，红枣一枚，煎至四分服，不拘时候。

【功用】温中和气。

【主治】小儿吐泻思食，及小儿虚冷病。

【加减】虚冷泄泻，加附子；风证，加天麻；痢，加罂粟壳。

36503 异功散

《袖珍》卷四引《集验方》。为《小儿痘疹方论》“十二味异功散”之异名。见该条。

36504 异功散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙) 陈皮 山药 莲肉 木香 青皮 诃子(面包，火煨，取肉) 泽泻 升麻 车前子(炒)

【用法】大枣、莲肉、糯米为引，水煎，空心服。

【主治】小儿元气下陷，痘疹光壮而色灰白，里虚作泻无后重者。

【加减】泄而作渴，加麦冬、干葛、花粉、乌梅；寒甚而泄不止，加干姜(炒)、丁香。

36505 异功散

【方源】《保命歌括》卷十一。

【组成】人参 白术 白茯苓 陈皮 苍术 香附 抚芎 神曲各等分 炙草减半

【用法】上为末。每服二钱。

【功用】补脾胃。

【主治】诸郁。

36506 异功散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】白术 人参 陈皮 白茯苓 炙甘草 木香 诃子 肉果

【主治】脾元不足，有痢无积，久不愈者。

36507 异功散

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙甘草 陈皮 当归 黄芩 柴胡各等分

【用法】上为末。每服一钱，米饮调下，每日三次。

【功用】补脾和胎。

【主治】妊娠疟久。

36508 异功散

《保婴撮要》卷五。为《婴童百问》卷五“异香散”之异名。见该条。

36509 异功散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】腹皮二钱 当归二钱 木通六分 乳香 没药 沉香 木香 丁香 甘草各三分

【用法】四香研末，葱为引，冲服。

【主治】酒病初发，形如感冒，被医误治，三焦大痛。

36510 异功散

【方源】《回春》卷七。

【组成】当归 川芎 人参(减半) 黄耆 白术(去芦) 白茯苓(去皮) 诃子(煨，取肉) 大附子(而包煨，去皮脐) 半夏(姜汁炒) 各一钱 厚朴(姜汁炒) 肉桂各八分 小丁香七枚

【用法】上锉一剂。水一钟，煎至八分，温服。

【主治】痘疮寒战咬牙，痒塌泄泻；胃虚里热干呕。

【加减】泄泻甚，加肉豆蔻。

36511 异功散

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】龙骨(煨) 薄荷叶 蛇床子各二钱 轻粉半钱

【用法】上为极细末。少许干掺脐。

【主治】脐中疮。

36512 异功散

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】白术一两 茯苓八钱 黄耆一两 当归(土炒)八钱 陈皮四钱 半夏四钱 木香四钱 丁香三钱 豆蔻六钱(去油) 诃子(煨，去核)五钱 肉桂(去皮)五钱 人参一两

【用法】上为末服。

【主治】痘疮虚寒泄泻，灰白不起，咬牙寒颤。

36513 异功散

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】人参 白术 当归 陈皮 半夏 厚朴 茯苓 丁香 木香 豆蔻 附子

【用法】水煎服。

【主治】小儿脏寒，痘疹不能发毒而腹胀，痘淡白，脉微缓。

36514 异功散

《重楼玉钥》卷上。为原书同卷“人中白散”之异名。见该条。

36515 异功散

【方源】《中国医学大辞典》引《疫痧草》。

【异名】拔疔散、咽喉异功散(《疡科纲要》卷下)。

【组成】斑猫(去翅足，糯米炒黄，去米)四钱 血竭 没药 乳香 金蝎 玄参各六分 麝香三分

【用法】共为细末，瓷瓶收藏，封口，切勿走气。用寻常膏药一张，取此散如黄豆大，贴项间；患左贴左，患右贴右，患中贴中。三四时起泡，用银针挑破即愈。凡阴证起泡更速。

【功用】《中药成方配本》：吊泡拔毒。

【主治】烂喉风，喉闭，双单喉蛾。

【备考】本方方名，《中药成方配本》引作“贴喉异功散”；《疡科纲要》有冰片。

36516 异功散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参一钱 白术一钱(炒) 云苓一钱 陈皮五分 制草五分 薏米五分(研)

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】小儿脾胃虚寒，吐泻不食。

36517 异功散

《北京市中药成方选集》。为原书“九圣散”之异名。见该条。

36518 异圣散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】猪蹄甲不以多少(净洗，去带毛处，锉碎，于锅内炒令烟尽，取出于地上厚铺纸，薄摊其药，以盆盖之，候三日出火毒毕，为细末) 金星石 银星石 青礞石各半斤(三石同入一盒内，以马粪和泥固济，晒干，先用熟火渐渐烧之，次添炭火煨令通赤，取出，仍先令掘一地坑，深一尺，取药盒在地坑内，用土盖埋二日出火毒，为细末)

【用法】上用猪蹄末二两，石末一两半，再研匀细，入生麻油半两再研极匀。每服半钱，以浆水研百遍调下，空心食前服。

【主治】小儿痢病日发数次，诸药不能愈。

36519 异香丹

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白芷 藿香叶(新者，净洗) 零陵香叶 木香(不见火) 桂花(不见火) 香附子(去毛，净洗) 甘松(净洗) 丁香(不见火) 鸡心槟榔 白豆蔻仁各一两 榆柑干三钱(去核) 当归(去芦头，洗净，酒浸一宿，焙干) 半钱

【用法】上为细末，用甘草膏子为丸，如鸡头子大。每服一丸，含化。七日后，口有异香，面色光泽。

【主治】劳心思虑过度，胃中客热上攻，口气，齿衄，时时出血，牙齿浮动或疼痛，不能咀嚼饮食。

36520 异香散

【方源】《局方》卷三(吴直阁增诸家名方)。

【组成】石莲肉(去皮)一两 蓬莪术(煨) 京三棱(炮) 益智仁(炮) 甘草(炙)各六两 青皮(去白) 陈皮(去白)各三两 厚朴(去粗皮，姜汁炙)二两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，大枣一个，盐一捻，煎至七分，通口服，不拘时候；盐汤点或盐酒调，皆可服。

【功用】破癥瘕结聚，消宿冷沉积，调五脏三焦，和胃进食。

【主治】①《局方》(吴直阁增诸家名方)：肾气不和，腹胁膨胀，痞闷噎塞，喘满不快，饮食难化，噫气吞酸；一切气痞，腹中刺痛。②《得效》：忧郁气滞不散，腹中膨满刺癢，下痢不止。

36521 异香散

【方源】《普济方》卷三七九。

【组成】三棱(炮) 莪术 青皮 陈皮 半夏曲 藿香 苦楝根 益智仁 枳壳(煨) 香附子(炒) 缩砂仁各五分 丁香二钱 甘草(炙)三分(一方有五灵脂)

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】痞胀虚中有积，其毒与气交并，而致腹胀，脾土受湿，肾水不能宣通，而致头面、手足浮肿。

36522 异香散

【方源】《婴童百问》卷五。

【异名】异功散(《保婴撮要》卷五)。

【组成】透明没药

【用法】上为末。每服一钱匕，以生姜汤调下。

【主治】小儿诸般钩症，角弓反张，胸高脐凸。

36523 异香散

【方源】《鸡鸣录》卷上。

【组成】无名异 地骨皮各一钱 麝香三分 没药(去油) 乳香(去油)各三钱

【用法】上为末。以车前子打汁，入黄酒和，涂患处。

【主治】鹤膝。

36524 异效丸

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】人参 白术 甘草(炙, 锉) 栝楼 枳壳(去瓢, 麸炒) 赤茯苓(去黑皮) 木香 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 各半两 干姜(炮) 三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 加至三十丸, 空心米饮送下, 晚再服。

【主治】伤寒四五日, 大下后, 心中痞满, 气息喘逆欲绝。

36525 异效散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】京三棱(锉, 汤浸一宿, 焙干) 白术各二两 甘草(炙, 锉) 二两 麦蘖(微炒) 陈曲(微炒) 各一两 高良姜半两 肉豆蔻二枚(去核) 青橘皮(汤浸, 去白, 焙) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 各一两 草豆蔻三枚(去皮)

【用法】上为细散。每服二钱匕, 入盐少许, 空心、食前沸汤点服。

【主治】脾气虚弱, 饮食不美, 心胸膨胀, 胁肋痞满, 噫气不通, 满闷噎塞, 积滞不消, 结聚癖瘕。

36526 异效散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】芫青四十九枚 麒麟竭一两

【用法】上二味, 同子藏瓶存性烧过, 地上出火毒, 为细末。每服半钱匕, 加至一钱匕, 米饮调下。

【主治】瘰癧结核久不愈。

36527 异效散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】桃根白皮(锉) 黄柏(去粗皮, 蜜炙, 锉) 芫荇仁 黄连(去须, 微炒) 各一分 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙, 锉) 木香 丁香 槟榔(锉) 各一钱 无食子一钱半 楝根白皮(锉) 半分

【用法】上为散。每服一字, 三岁以上半钱

匕, 五六岁一钱匕, 乳食前用紫苏、木瓜米饮调下, 每日三次。

【主治】小儿疳泻不止, 渐渐羸瘦。

36528 异香膏子

【方源】《医方类聚》卷一六九引《新效方》。

【组成】黄蜡一两半 斑蝥二十枚(去头翅足) 巴豆肉四十九粒 草乌 南星 皂角各一两 麻油一斤(熬净蜡) 猪脂半斤 白胶香半斤

上以麻油先煎斑蝥、巴豆 草乌、南星、皂角五味焦黑, 滤去滓, 次入黄蜡、白胶香、猪脂煎成膏, 瓷盒盛贮, 旋和后项十二味药末, 重汤炖烊丹

吴茱萸 蛇床子 槟榔 雄黄各三两 川椒半两 藜芦 白芷 黄柏 剪草 苦参 白矾(枯) 茴茹各一两

【用法】上为细末。和前膏子敷, 乘痒搔动疮痂, 以指蘸药擦之, 不要药多, 只要擦得入肉。

【主治】顽癣疥癬, 一切痒疮。

【宜忌】休敷面目、男女前后阴及奶上, 休洗热汤。

36529 异方红丸子

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】沉香 硃砂(别研) 使君子(去壳) 蓬莪术(炮, 切) 京三棱(炮, 醋浸过) 朱砂(别研) 木香各一分 槟榔一枚(大者) 肉豆蔻一枚(大者) 母丁香五粒 巴豆二十粒(肥好者, 去皮心膜, 不出油, 研) 黑牵牛一两(炒熟, 取末半两入药, 余者不用) 草澄茄一分

【用法】上为细末, 面糊为丸, 如绿豆大, 朱砂为衣。每服三丸, 食后茴香汤送下; 欲微利, 加至五七丸。

【功用】消酒食, 破积气。

【主治】一切积聚, 心腹疼痛; 妇人血气攻注。

36530 异方油煎散

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】川乌头(炮,去皮) 白芍药 五加皮 牡丹皮 海桐皮各等分

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,油浸开通钱一文,煎至六分,去滓温服,每日三次,不拘时候;如常服,用油浸五七文钱,煎药用。

【主治】妇人血风劳气攻注,四肢腰背疼痛,呕吐恶心,不思饮食,日渐瘦弱,面色痿黄,手脚麻痹,血海冷败。

36531 异方济阴丹

《丹溪心法附余》卷二十。为《袖珍》卷四“异方神仙济阴丹”之异名。见该条。

36532 异方黄耆丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】黄耆(蜜炙) 舶上茴香(炒) 川乌头(生,去皮脐) 川苦楝 乌药 沙苑白蒺藜 赤小豆(比余药如增尤妙) 防风(去芦) 川椒(去目合口,炒出汗) 地龙(去土) 川狼毒 海桐皮 威灵仙 陈皮(去白)各等分

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,茶、酒任下,早、晚食前各一服。

【主治】肾脏风上攻头目,面虚肿,两耳常鸣,或如风雨流注,脚膝痒痛,注破生疮,脚心隐痛,行履艰难,腿膝腰胯冷疼,四肢无力,小便滑数。

36533 异功五积散

《医方类聚》卷五十六引《管见良方》。为《理伤续断方》“五积散”之异名。见该条。

36534 异功快斑汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】人参 黄耆 甘草 白术 木香 归身 桂心 陈皮 诃子 丁香 白茯苓 大枣 生姜

【用法】水煎服。

【主治】痘疹吐泻不止,灰白顶平者。

36535 异功敌暑丸

【方源】《普济方》卷一一七引《仁存方》。

【组成】黄连一斤(净) 陈仓米二升(水一碗拌湿)

【用法】上于锅内如糗饭法,米熟为度,晒干为末,水为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,饭汤送下,不拘时候。

【主治】伏暑或吐或泻。

36536 异香四神散

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【异名】四神汤。

【组成】香附子(去毛,炒)半斤 乌药(炒)四两 甘草(炙)一两

【用法】上咬咀。每服五钱,水一盞,加生姜三片,大枣一个,煎至七分,去滓,空心温服;或用葱白三寸同煎。

【功用】调血顺气安肠。

【主治】妇人室女血气不调,及胎前产后诸疾。

【加减】妇人气血不顺,心胸痞满,加紫苏叶;惊忧闷气,喜怒伤神,心满腹痛,面目虚浮,及一切气疾,加石菖蒲;血脉不调,血膈翻胃,呕吐饮食,及脾胃感冷;加老姜一块(炒令黑,切作五片)、盐少许;血积、血晕闷、血癥、血刺痛,煎熟加好醋一呷;经血行时,被风雨或惊忧相并,经候不时,而成搐脉,腹痛紧张,腰腿疼痛,加炒茴香一撮;血气不顺,喘满气急,面目浮肿,加生姜、紫苏叶;唾血,咯红痰,喉中腥气,加黄桑叶三四片,花桑尤佳;血涩气秘,大便结滞不通,加枳壳数片或去白青皮;经络感热,经水沸溢,血脉妄行,面成热崩,加生地黄;败血攻冲脾胃,血噎,气血嗽逆,加生姜三片、柿蒂五个;血气皆闷,心腹刺痛,加良姜、赤芍药,以水、酒各半盞同煎;妊娠伤食,胸膈不快,噎气食臭,心腹紧满,加南木香或缩砂仁;子悬,加姜片、紫苏;寒疝,加炒吴茱萸;癰病,先用此汤,兼以樗树根(或枝梗)同葱白以花椒煎汤,熏洗子肠。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》引本方有陈皮三钱。

36537 异香鳖甲散

【方源】《普济方》卷二三二引《卫生家宝》。

【组成】鳖甲二两(醋炙黄) 牛膝一两五钱(酒浸) 熟地黄一两五钱 人参二两五钱 大黄三分(煨) 黑附子(炮, 去皮脐) 京三棱(炮) 白茯苓 羌活 枳壳(去瓤, 麸炒) 肉桂(去皮) 厚朴(姜制) 五味子 木香(不见火) 当归 白术(炒) 白芍药 肉豆蔻各一两

【用法】上为粗末。每服三钱, 水一大盏, 加大枣三个, 生姜五片, 同煎至七分, 去滓温服。

【主治】五脏虚劳气攻, 四肢无力, 手足酸痛, 背脊拘急, 日渐虚弱, 心下气满, 不思饮食。

36538 异类有情丸

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】鹿角霜(以角之新者, 寸截, 囊置长流水中七日, 瓦缶水煮, 每角一斤, 入黄蜡半斤, 缶口用露酒一壶掩之, 别沸流水旋添, 勿令下竭, 桑柴火足十二时, 其角软矣, 竹刀切去黑皮, 取白者, 舂细为霜) 三两六钱 鹿茸(新如紫茄者, 熏干, 酒洗数过, 酥油涂, 炭火炙令透, 为细末) 二两四钱 龟版(八字文具者, 醇酒浸七日, 酥炙透黄) 三两六钱 虎胫骨(新而真者, 长流水浸七日, 蜜酥和, 炙透) 二两四钱

【用法】上为极细末, 用水火炼白蜜, 入猪脊骨髓九条, 同舂剂为丸, 如梧桐子大。每服五七十丸, 空心盐汤送下。

【主治】丈夫中年觉衰。

【加减】如厚味善饮之人, 加猪胆汁一二合。

36539 异授金兔丹

【方源】《救产全书》。

【组成】兔皮(连毛, 烧存性)

【用法】上为极细末, 米糊为丸, 如芡实大, 金箔为衣。每服一丸, 以无灰黄酒送下。如再不下, 再服一丸。

【主治】妇人难产, 及胞衣不下者。

36540 异方神仙济阴丹

【方源】《袖珍》卷四。

【异名】异方济阴丹(《丹溪心法附余》卷二十)。

【组成】香附子 三棱 蓬术 陈皮 青皮 败姜各一两(上六味, 用黑豆半升、米醋五升同煮, 豆烂取出焙干, 留余醋打糊) 官桂 当归 赤芍药 生地黄 熟地黄 泽泻 片姜黄 丹皮 干姜 川芎 刘寄奴 泽兰 人参 蒲黄(纸炒) 木香 白术 玄胡索各一两(焙干)

【用法】上为末, 醋糊为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 空心、食前炒姜酒送下, 艾醋汤亦得, 经事不行, 酒送下; 心脾疼, 姜汤送下, 或酒送下亦妙。

【主治】①《袖珍》: 妇人经事不行, 及心脾疼。②《丹溪心法附余》: 妇人内生血积, 经水不调, 腰腹疼痛。

36541 异功拔毒千金托里散

【方源】《片玉痘疹》卷三引闻氏方。

【组成】人参 甘草节 黄芩 黄连 梔子 黄柏(酒炒) 贝母 生地黄 连翘 羌活 防风 白芷 天花粉 南星 陈皮 赤芍 木通节 金银花 黄耆 归尾 山楂肉 川山甲 川续断 荆芥穗 天丁(炮过) 三钱 川松节三钱 乳香二分 没药二分

【用法】上为末。化服。

【主治】痘疮光壮, 浆水不满, 毒气太甚, 收时发毒四五处或六七处者。

【备考】方中人参至荆芥穗 25 味药用量原缺。

36542 异功散加当归川芎汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 归身 川芎各一钱

【用法】生姜、大枣为引，水煎服；兼服地黄丸。

【功用】补脾胃，进饮食，养气血。

【主治】妇人形瘦食少，脾胃衰弱，气血虚少，经过期后行者。

导

36543 导药

【方源】《外台》卷三十四引《素女经》。

【组成】戎盐一升 皂荚半两（去皮子，炙） 细辛一两六铢

【用法】上为散。以三角囊大如指，长三寸，贮之，内阴中，但卧。瘕当下，青如葵汁，养之如产法。

【主治】妇人青瘕。

36544 导散

【方源】《外台》卷三十四引《素女经》。

【组成】皂荚（炙，去子皮） 吴茱萸 当归各一两 蜀椒（汗）各二两 细辛（熬） 矾石（烧） 五味子各三分 大黄 戎盐各二两 干姜二两

【用法】上为散。以轻绢袋如指大，长三寸，盛药令满，纳阴中，坐卧随意，勿行走，小便时去之，别换新者。

【主治】妇人脂瘕，腹中有块，致绝不复生；及未曾生。

36545 导气丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】槟榔（生，锉） 牵牛子（炒）各半两 赤茯苓（去黑皮） 半夏（汤洗七遍，焙）各一两

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温酒送下，每日三次。

【主治】肾气盛实，腰脚不能屈伸。

36546 导气丸

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】牵牛四两

【用法】上为末，用生姜自然汁煮面糊为

丸，如梧桐子大。每服五十丸，以生姜汤送下。

【主治】乳石发，心腹胀满。

36547 导气丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】姜黄四两 香附子四两 缩砂 甘草 广茂各二两 丁皮 甘松 木香 荆三棱各一两 白檀半两 藿香叶半两

【用法】上为末，入绿豆粉二两，用汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后细嚼白汤送下，每日三次。

【功用】宽膈进食。

【主治】心胸满闷，胁肋刺痛，不思饮食。

【备考】本方方名，原书四库本作“逆气丸”。

36548 导气丸

【方源】《普济方》卷三九三引《全婴方》。

【组成】京三棱 青皮 萝卜子（炒） 皂角（不蛀者，酥炙） 黑牵牛（半生半炒）各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。三岁三十丸，以米汤送下。

【主治】小儿腹胀，气粗不食。

36549 导气丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】大黄四两（湿纸裹，煨） 蝎梢（去毒，炒）一两 青橘皮（去白）一两 胡椒四十粒 陈橘皮（去白）一两 黑牵牛（十二两，取头末）四两 茴香一两（微炒） 干姜一两（炮） 甘草（炙）一两 阿魏半钱（用稀面少许，和作饼子，捏干，油煎黄色）

【用法】上为细末，蒸木瓜搜匀为丸，如绿豆大。每服二十丸，以温盐汤送下，不拘时候。

【功用】宣壅导滞，除胀满，利大肠。

36550 导气丸

【方源】《普济方》卷一六五引《卫生家宝》。

【组成】半夏二两(用皂角五铢掇汁,浸一宿,控干,切作片子) 南木香半两 赤茯苓一分 紫苏叶半两 白附子一分

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后以生姜汤送下,不拘时候。

【功用】降气逐风。

【主治】痰涎壅盛。

36551 导气丸

【方源】《医方大成》卷六引《澹寮方》。

【组成】青皮(水蛭炒赤,去蛭) 莪术(虻虫炒,去虻) 三棱(干漆炒,去漆) 槟榔(斑蝥炒,去蝥) 干姜(硃砂炒,去砂) 茺萸(牵牛炒,去牛) 附子(盐炒,去盐) 赤芍(川椒炒,去椒) 胡椒(茴香炒,去茴香) 石菖蒲(桃仁炒,去仁)

【用法】上各锉,与所注药炒熟,去水蛭等并不用,只以青皮等为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五丸至七丸,空心紫苏汤送下。

【主治】诸痞气塞,关格不通,腹胀如鼓,大便虚秘;又治肾气、小肠气等。

【方论选录】《医方考》:青皮、莪术、三棱、菖蒲,气积药也,炒以水蛭、虻虫、干漆、桃仁,则逐败血矣;干姜、附子、胡椒、茺萸,温中药也,炒以硃砂、食盐、茴香、牵牛,则软坚而疏利矣;槟榔炒以斑蝥,下气者得破气者而益悍;赤芍药炒以川椒,泻肝者得疏肝者而益利。制度之工如此,以之而治气实有余之证,斯其选矣。

36552 导气丸

【方源】《医学纲目》卷四。

【组成】青木香 萝卜子 茴香 槟榔 牵牛(头末)各四两

【用法】上为末,薄糊为丸,如梧桐子大。每服三四十丸。

【主治】《准绳·类方》:痢疾。

36553 导气丸

《普济方》卷一八二。即《百一》卷四引钱观文方“导气丹”。见该条。

36554 导气丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】木香 槟榔 火麻仁 枳壳

【用法】上将枳壳每个切作四片,用不蛀皂角三寸、生姜五片、巴豆三枚(略捶碎,不去壳油),用水一盏,将枳壳同煎熟,滤去三味,不用,只将枳壳锉细,焙干为末,入前三味末,炼蜜为丸。以蜜汤送下,不拘时候。

【主治】大便秘结。

36555 导气丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】槟榔一两(斑蝥炒) 厚朴一两(干姜炒) 三棱一两半(干漆炒) 蓬术一两半(虻虫炒) 吴茺一两(牵牛炒) 青皮一两(水蛭炒) 黄芩一两(大黄炒) 赤芍一两(川椒炒) 楂肉二两(草果炒) 菖蒲一两(桃仁炒)

【用法】炒熟,拣去拌药,为末,红酒为丸。每服一二钱,以紫苏汤送下。

【功用】攻坚破结。

【主治】积结于中,日久不能消化,腹胀坚塞,便闭形实,脉实者。

【方论选录】槟榔破结气,斑蝥拌炒,以攻发坚垒;赤芍破血结,川椒拌炒,以驱逐寒积;厚朴散壅塞,干姜拌炒,以开发寒滞;青皮破肝气,水蛭拌炒,以消磨血积;楂肉消肉积,草果拌炒,以扫荡食积;吴茺平逆气,牵牛拌炒,以通利饮积;三棱攻坚积,干漆拌炒,以迅扫瘀结;蓬术破积坚,虻虫拌炒,以蠢动血结;黄芩清郁热,大黄拌炒,以推荡积热;菖蒲通窍门,桃仁拌炒,以润燥开结;酒丸紫苏汤下,使结散积消,则气化调和而诸结自解,大便无不通,腹胀坚塞无不退矣。此攻坚破结之剂,为腹胀坚塞之专方。

36556 导气丹

【方源】《百一》卷四引钱观文方。

【组成】橘皮 生姜各一斤(同碾为曲) 木香二两 草澄茄四两 牵牛一两(碾为末)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以烧萝卜汤送下。

【主治】虚阳上攻，气滞不快，上盛下虚，膈痰壅实，咽干不利，咳嗽中满，喘急气粗，脐腹膨胀，满闷虚烦，微渴引饮，头目昏眩，腰痛脚弱，四肢倦怠；及脚气上攻，中满喘急，下元虚冷，服补药不愈者。

【备考】本方方名，《普济方》卷一八二引作“导气丸”。

36557 导气汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药一两 当归五钱 大黄 黄芩各一钱半 黄连 木香各一钱 槟榔一钱

【用法】上为末。每服三五钱，水一盞，煎至七分，去滓温服；如未止，再煎服，不后重则止。

【主治】下痢脓血，里急后重，日夜无度。

36558 导气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】导气散（《傅青主男女科·男科》卷下）。

【组成】黄耆八钱 甘草六钱 青皮四钱 升麻 柴胡 当归梢 泽泻各二钱 橘皮一钱 红花少许 五味子一百二十个

【用法】上咬咀，分作四服。每服水二大盞，煎至一盞，去滓，食前热服。

【主治】两腿麻木沉重。

【备考】本方方名，《医学纲目》卷十二引作“除湿补气汤”。

36559 导气汤

【方源】《痘疹金镜录》卷上。

【组成】槟榔 枳壳 黄连 厚朴 芍药 甘草 山楂 神曲 升麻

【功用】去宿滞。

【主治】痢疾。

【加减】禀气厚，加大黄、芒消。

36560 导气汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】槟榔 枳壳 厚朴 白木香 山

楂 神曲 紫苏 甘草 砂仁

【用法】水煎服。

【主治】痢疾初起。

【加减】如三日前，加大黄、芒消；红痢，加川连、当归；白，加干姜。

36561 导气汤

《医方集解》。为原书“导滞汤”之异名。见该条。

36562 导气汤

【方源】《医方集解》。

【组成】川楝子四钱 木香三钱 茴香二钱 吴茱萸一钱（汤泡）

【用法】长流水煎服。

【主治】①《医方集解》：寒疝疼痛。②《医方简义》偏坠、小肠疝痛之证。

【方论选录】此足厥阴、少阴药也。川楝苦寒，能入肝舒筋，使无挛急之苦，又能导小肠、膀胱之热从小水下行，为治疝之主药；木香升降诸气，通利三焦，疏肝面和脾；茴香能入肾与膀胱，暖丹田而祛冷气；吴茱萸入肝肾气分，燥湿而除寒。三者皆辛温之品，用以宣通其气，使小便小利，则寒去而湿除也。

36563 导气饮

【方源】《袖珍方》卷二引《仁存方》。

【组成】羌活 独活 木瓜 薏苡仁 青皮 陈皮 桑白皮 大腹皮 枳壳 槟榔 青木香 紫苏 甘草 大腹子 木通 赤茯苓各等分

【用法】上咬咀。每服一两，水二盞，煎至一盞，去滓，通口服。

【主治】寒湿脚气，肿赤疼痛，心腹膨胀，头面手足浮肿，身体腰背疼痛。

【加减】热，加大黄；寒，加苍术。

36564 导气散

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】虎头王字骨（酥炙） 草拔（微焙） 人参 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 羚羊角屑各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，温水调，临

卧、食后服。

【主治】膈气噎塞，不入饮食。

36565 导气散

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】三棱 莪术 甘草 益智 青皮 陈皮 厚朴 石莲（一方有茴香、官桂、砂仁）

【用法】加生姜、盐，水煎服。

【主治】七情胁痛，引肩背不得俯仰。

36566 导气散

《傅青主男女科·男科》卷下。为《兰室秘藏》卷下“导气汤”之异名。见该条。

36567 导火汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】玄参一两 生地五钱 车前子三钱 甘草一钱 泽泻二钱

【用法】水煎服。

【功用】导火解氛。

【主治】有火之腹痛，腹痛欲死，手按之而更甚。胃火者，汗而渴，口中臭；脾火痛者，走来走去，无一定之处也；大肠火者，大便闭结，而肛门干燥后重；小肠火者，小便闭涩如淋；膀胱火者，小便闭涩而若急；肾火者，则强阳不倒，口不渴而面赤，水窍涩痛是也。

【加减】胃火，加石膏；脾火，加知母；大肠火，加地榆；小肠火，加黄连；膀胱火，加滑石；肾火，加黄柏。

【方论选录】夫火之有余，水之不足也。玄参、生地滋其阴，而阳火自降；况又益之车前、泽泻之滑利，甘草之调火，尤能导火解氛，化有事为无事。

36568 导水丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】人参（去芦头） 木香 丁香 槟榔 青橘皮（去白） 陈橘皮（去白） 香白芷 郁李仁（去皮） 杜仲（生用） 桔梗（去芦头） 大戟 泽泻 黑牵牛（生用） 木通 樟柳根 桑根白皮 大黄（湿

纸裹，煨熟用） 干漆（炒烟尽） 甘遂（麸炒令黄） 榆根白皮各等分

【用法】上为细末，每药末二两，炼蜜为丸，分作四丸。每服一丸，临卧用荆芥茶清嚼下。

【主治】男子妇人水气肿满。

【宜忌】忌盐百日并甘草三日。

36569 导水丸

《儒门事亲》卷十二。为《宣明论》卷四“藏用丸”之异名。见该条。

36570 导水丸

【方源】《经验秘方》引范提举方（见《医方类聚》卷一五七）。

【组成】大黄（去皮，煨） 黄芩二两（去皮） 滑石 黑牵牛（头末）四两 木香 槟榔 郁李仁（去皮） 白芥子半两

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，以温水送下，病在上，食后服；病在下，食前服。

【主治】水痼虚肿。

【备考】方中大黄、滑石、木香、槟榔、郁李仁用量原缺。

36571 导水丸

《保命歌括》卷四。为《宣明论》卷四“神芎丸”之异名。见该条。

36572 导水汤

《医学集成》卷三。为《辨证录》卷九“导水散”之异名。见该条。

36573 导水饼

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】真水银粉二钱 巴豆肉（研去油）四钱 生硫黄一钱

【用法】上研成饼，令匀。先用新绵铺脐上，次以饼当脐掩之，外用帛缚。如人行三五里，自然泻下恶水，待行三五次，除去药，以温白粥补之。

【功用】去水。

【主治】肿胀。

36574 导水散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】滑石 木通 泽泻 车前 朴消

大黄 通草 灯心

【用法】上咬咀。水二钟，煎八分，空心服。

【主治】痔疮，大小便不通。

36575 导水散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归二钱 瞿麦三钱 车前子二钱 滑石三钱 赤茯苓三钱 泽泻二钱 猪苓二钱 木通二钱 石莲子(去壳)一钱 山梔子三钱 黄连六分 黄柏一钱五分(酒炒) 知母一钱五分 甘草八分

【用法】上锉。灯心煎，空心温服。

【主治】膀胱有热，小便闭而不通。

36576 导水散

【方源】《辨证录》卷九。

【异名】导水汤(《医学集成》卷三)。

【组成】王不留行五钱 泽泻三钱 白术三钱

【用法】水煎服。

【功用】逐水，利膀胱。

【主治】膀胱火旺，小肠不通，眼睛突出，面红耳热，口渴引饮，烦躁不宁。

36577 导赤丸

【方源】《局方》卷六(续添诸局经验秘方)。

【组成】赤芍药 茯苓(去皮) 滑石各四两 生干地黄(焙) 木通(去节)各半斤 大黄(炒)十五两 山梔子仁(炒)十二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后用温热水吞下。

【功用】排脓，内消肿毒，疏导心经邪热。

【主治】心肾凝滞，膀胱有热，小便不通，风热相搏，淋漓不宣；或服补药过多，水道壅涩，出少起数，脐腹急痛，攻注阴间；或心肺壅热，面赤心忪，口干烦渴；及痈肿发背，血脉瘀闭；内蕴风热，五般淋疾。

36578 导赤丸

【方源】《中国药典》。

【组成】连翘 120 克 黄连 60 克 梔子(姜炒) 120 克 木通 60 克 玄参 120 克

天花粉 120 克 赤芍 60 克 大黄 60 克 黄芩 120 克 滑石 120 克

【用法】上为细末，混匀，每 100 克粉末加炼蜜 120 至 140 克，制成大蜜丸，每丸重 3 克，密闭防潮。口服，每次一丸，每日二次。

【功用】清热泻火，利尿通便。

【主治】口舌生疮，咽喉疼痛，心胸烦热，小便短赤，大便秘结。

36579 导赤片

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】大黄二百七十两 滑石粉七十二两 茯苓(去皮)七十二两 生地黄一百四十四两 梔子二百一十六两 木通七十二两

【用法】上取大黄为细末，与滑石粉混合；茯苓为粗末，用 7 倍量 25% 乙醇按渗漉法提取，并浓缩为稠液约 80 两；取生地黄、梔子，用煮取法提取二次，滤取药液；取木通加水 14 倍量煮沸 3 小时，滤取药液，与生地黄、梔子药液合并，浓缩为稠液约 300 两；另取淀粉 100 两、糊精 50 两，与大黄等细末混合，分次加入茯苓、生地黄等浓缩液，搅拌均匀，分成小块，干燥后为细末，依法压片，每片重 0.3 克，密封。每服四片，每日二次，以温开水送服。

【主治】由于内热火盛引起的口舌生疮，咽喉肿痛，暴发火眼，两腮肿痛，大便不通，小便赤黄等症。

36580 导赤丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连十五两 生地十五两 大黄十五两 黄芩三十两 甘草三十两 滑石三十两 连翘三十两 梔子(炒)三十两 玄参(去芦)三十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱。每服一丸，每日二次，以温开水送下；三岁以下小儿酌减。

【功用】清热利尿。

【主治】小儿口舌生疮，暴发火眼，烦躁不安，大便干燥，小便赤黄。

36581 导赤丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】薄荷一钱 麦冬一钱 木通一钱 黄连一钱 生地一钱 桔梗一钱 甘草一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重一钱，上朱衣。

【功用】清热利尿。

【主治】心经热盛，或心移热于小肠引起之小便赤涩，尿道灼痛；以及口舌生疮，咽喉肿痛等证。

36582 导赤汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】木通 滑石 甘草梢 黄柏 茯苓 生地 枳壳 白术 梔子

【用法】水煎，空心服。

【主治】溺如米泔色。

36583 导赤汤

《外科证治全书》卷五。为《小儿药证直诀》卷下“导赤散”之异名。见该条。

36584 导赤饮

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】生地黄 赤茯苓 木通 麦冬各等分

【用法】灯心一团，水煎服。

【主治】小儿心经热，小便赤。

36585 导赤饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】生地 木通 甘草 人参 麦冬（去心） 车前 滑石 柴胡各等分

【用法】水煎服。

【功用】利小便。

【主治】痘疮小便涩，烦渴，发惊。

36586 导赤散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】导赤汤（《外科证治全书》卷五）。

【组成】生地黄 甘草（生） 木通各等分（一本不用甘草，用黄芩）

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，入竹叶同煎至五分，食后温服。

【功用】《方剂学》：清热利水。

【主治】心经有热或心移热于小肠。口渴面赤，心胸烦热，渴欲冷饮，口舌生疮；小便赤涩，尿时刺痛。

①《小儿药证直诀》：心热目内赤，目直视而搐，目连眨而搐；视其睡，口中气温，或合面睡，及上窜咬牙。②《局方》（淳祐新添方）：大人小儿心经内虚，邪热相乘，烦躁闷乱；传流下经，小便赤涩淋涩，脐下满痛。③《保婴撮要》：心经有热盗汗，小肠实热生疮，作渴发热，小便秘赤。④《幼科发挥》：心热夜啼，急惊。⑤《寿世保元》：麻疹已出谵语，小便闭塞。⑥《证治汇补》：痛证咬牙者。⑦《金鉴》：热气熏蒸胃口，以致满口糜烂，甚于口疮，色红作痛，甚则连及咽喉，不能饮食；心火刑金，火热喘急；孕妇因膀胱水病热甚尿涩而少腹作疼。

【方论选录】①《医方考》：是方也，生地黄可以凉心，甘草梢可以泻热；佐之以木通，则直走小肠、膀胱矣。名曰导赤者，导其丙丁之赤，由溺而泄也。②《古今名医方论》：钱氏制此方，意在制丙丁之火，必先合乙癸之治。生地黄凉而能补，直入下焦，培肾水之不足，肾水足，则心火自降；佐以甘草梢，下行缓木之急，即以泻心火之实，且治茎中痛；更用木通盗小肠之滞，即以通心火之郁，是一治两得者也。此方凉而能补，较之用苦寒伐胃，伤其生气者远矣。③《医方集解》：此手少阴、太阳药也。生地凉心血，竹叶清心气，木通降心火入小肠，草梢达茎中而止痛。④《古方选注》：生地入胃而能下利小肠；甘草和胃而下疗茎中痛；木通、淡竹叶皆轻清入腑之品，同生地、甘草，则能从黄肠导有形之热邪入于赤肠，其浊中清者，复导引渗入黑肠而令气化，故曰导赤。⑤《小儿药证直诀笺正》：方以泄导小水为主，虽曰清心，必小溲黄赤短涩者可用。一本有黄芩，则清肺热，所以宣通水道之上源也。

【临证举例】①淋证《广西中医杂志》（1965；2：17）：本方治疗小便淋证15例，其

中砂淋 5 例, 气淋 7 例, 血淋 3 例, 均见小便短涩, 痛引脐中, 甚则腰痛、腰胀, 脉弦数或细数, 苔白腻或薄黄等。以本方为基础, 砂淋加海金沙、扁蓄、金钱草; 血淋加白茅根、生侧柏、小蓟; 气淋加川朴、香附。治疗结果: 痊愈 9 例, 好转 6 例。②血淋《南雅堂医案》: 小溲血淋, 茎中作痛, 系热入膀胱, 止血非其所宜, 拟用钱氏导赤散加味治之。生地黄三钱, 木通二钱、肥知母一钱五分, 川黄柏一钱五分(炒), 淡竹叶三钱, 甘草梢八分, 水同煎服。③产后尿闭《江西中医药》(1959; 8: 28): 作者用本方治愈产后尿闭多例。本方列举两例典型病案, 在使用本方前曾用过补中益气汤、生化汤、四物汤等, 但疗效不显, 改用本方后痊愈, 且无再度复发现象。④梦遗《金匱翼》: 娄全善云, 一壮年梦遗白浊, 与涩精药益甚, 改用导赤散大剂服之, 遗浊皆止。⑤结膜充血《上海中医药杂志》1982; (11) 10: 张某某, 男, 25 岁。主诉: 两眼发红生眵将近一月, 用过多种眼药水无效。检查: 两眼睑结膜弥漫性充血, 球结膜接近二眦部充血明显, 舌赤, 脉数。症由心火, 治当清降。处方: 导赤散加黄芩。5 剂后复诊, 充血减退, 眼眵已无。再予原方 5 剂而愈。

36587 导赤散

【方源】《秘传外科方》引《李防御五痔方》。

【组成】生地黄二两 黄芩三两

【用法】上锉。每服三钱, 水一盞, 煎至六七分, 温服。

【主治】痔漏。

【加减】用药之后, 小便恐赤涩, 即服之, 加滑石、甘草、灯心。

36588 导赤散

【方源】《得效》卷十一。

【异名】实热导赤散(《普济方》卷三八四)。

【组成】生干地黄二两 木通四两 黄芩

甘草各一两

【用法】上锉散。每服二钱, 水一盞, 加灯草十茎, 白茅根二茎、青竹叶五片煎, 温服, 不拘时候。

【功用】宣导。

【主治】心气热。

36589 导赤散

【方源】《医学纲目》卷三十六引汤氏方。

【组成】赤芍药 羌活 防风各半两 大黄 甘草各一钱

【用法】上为末。灯心、黑豆煎, 食后服。

【主治】小儿心热, 小便赤, 眼目赤肿。

36590 导赤散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】生干地黄(净洗) 木通(去皮节)各一两 黄芩 赤茯苓(去皮)各二钱半 甘草三钱

【用法】上咬咀。每服二钱, 水一盞, 加竹叶三皮, 煎七分, 不拘时候温服。或加麦门冬(去心)同煎。

【主治】小儿心经壅热, 烦躁睡语, 或时复上窜咬牙, 小便黄涩, 久则成惊, 触物易动。

36591 导赤散

【方源】《医方大成》卷七引曾师干家传方。

【组成】牛蒡子(炒) 榆子 槐子(炒) 生干地黄 黄芩各等分

【用法】上为末。每服二钱, 食后麦门冬汤调服。

【主治】心脏积热, 上攻眼目, 两眦浮肿, 血浸白睛, 羞明洒泪。

36592 导赤散

【方源】《医方类聚》卷一三六引《经验良方》。

【组成】木通一钱 生干地黄二钱 甘草七分 麦门冬(去心)一钱 灯草十五茎

【用法】水一盞半, 煎至七分, 食前温服。

【主治】大人、小儿心经内虚, 邪热相乘, 烦躁闷乱, 传流下经, 小便赤涩淋漓, 脐下满痛; 及血淋。

36593 导赤散

【方源】《医方类聚》卷一八三引《修月鲁班经》。

【组成】黄连 黄芩 车前子 木通 滑石 大黄 枳壳各等分

【用法】上咬咀。水煎服。

【功用】通利小便。

【主治】痔漏敷后小便不通。

36594 导赤散

【方源】《普济方》卷十六。

【组成】黄连(去须) 麦门冬(去心) 半夏(汤泡七次) 地骨皮(去木) 茯神(去木) 赤芍药 木通(去节) 生地黄(洗) 黄芩各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎八分，去滓服，不拘时候。

【主治】心脏实热，口干烦渴；或口舌生疮，惊怖不安。

36595 导赤散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】茯苓 猪苓 泽泻 桂枝 白术 甘草 滑石 山梔

【用法】水二钟，生姜一片，灯心二十茎，入盐二字调服。

【功用】利小便。

【主治】伤寒小水不利，小腹满；或下焦蓄热，或引饮过多，或小水短赤而渴，或得病时无热，谵语烦躁不安，精采不与人相当，脉沉数者。

【宜忌】汗后亡津液与阳明汗多者不宜服。

【加减】中湿身目黄者，加茵陈；水结胸证，加木通、灯心。

【备考】《寿世保元》本方用茯苓三钱、猪苓二钱、泽泻二钱、桂枝八分、白术一钱五分、甘草八分、滑石三钱、山梔三钱。

36596 导赤散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】人参 木通 麦门冬(去心) 生地黄 甘草(炙)各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一小盏，煎至半盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿疮疹，心经蕴热，睡卧不宁，烦躁而小便不利，面赤多渴，贪食乳者。

36597 导赤散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】木通 甘草 梔子 黄柏 生地黄 知母

【用法】上为细末。每服四五钱，水一钟，入竹叶、灯心草同煎，食后服。

【主治】目大眦赤脉传睛。

36598 导赤散

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】生地黄 木通 小甘草 防风 薄荷叶 辰砂

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘疮发热有惊搐者。

36599 导赤散

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】木通 甘草 车前子 瞿麦 滑石 赤茯苓 淡竹叶 山梔

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘疮收靥后，小便不利，热蓄膀胱者。

36600 导赤散

【方源】《宋氏女科》。

【组成】山梔仁(盐水炒)一钱五分 五灵脂 草豆仁 真蒲黄(炒)各一钱

【用法】上为末。每服一二匙，以醋汤调下。

【主治】妊娠胃脘当心被寒邪所郁，气不通而痛。

36601 导赤散

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】木通 赤茯苓(去皮) 麦冬各八分 车前子(微炒) 生地各四分 人参 甘草各二分

【用法】加灯心一团如龙服大，同煎，饥时服。

【主治】小儿痘症，小便赤涩者。

36602 导赤散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】生地 木通 甘草各一钱 淡竹叶二十片 犀角 薄荷 连翘各一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】心经发热。

36603 导赤散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 白芍 生地 川芎各五钱 甘草 半夏 陈皮 白茯苓 枳白皮各四钱 青黛 滑石各三钱

【用法】上为末。每服二钱，空心以灯心汤送下。

【主治】赤浊。

36604 导赤散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】生地 木通 黄芩 甘草 竹叶 赤茯苓 麦冬

【用法】水煎服。

【主治】热淋出血。

36605 导赤散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】生地 梔子 木通 甘草 灯心 淡竹根

【用法】水煎，食后服。

【功用】泻火退热。

【主治】三焦相火炎上，或劳神心事太过，或夜观书史，或能饮酒，或好食五辛诸热物，心之实热侵肝，赤脉穿睛，甚则看物如隔纸绢。

36606 导赤散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】生地 木通 茯苓 山梔 甘草

【主治】妇人胎前内热，小便尿血。

36607 导赤散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】木通二钱 生地三钱(酒洗) 丹皮二钱(酒洗) 犀角末一钱 生甘草一钱 竹叶九片

【用法】水煎服。

【主治】心经实热，两大眼角有赤，内外红

丝现，渐入白睛，瘀血堆积不散。

36608 导赤散

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】麦冬三钱 木通一钱 生地三钱 甘草四分 竹叶十片 车前 赤茯苓各一钱五分

【主治】热闭小便不通。

36609 导赤散

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】车前子三钱(炒) 木通一钱 淡竹叶二钱 生甘草八分 生地六钱

【主治】心移热于小肠，口糜淋痛。

36610 导利散

【方源】《普济方》卷二四九引《海上名方》。

【组成】五苓散一帖加灯心三十茎

【用法】上用酒两盏，煎一盏，放温服之，用被盖卧。

【主治】小肠气痛不可忍者。

36611 导饮丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】青皮 陈皮 京三棱(炮) 广茂(炮) 黄连 枳壳(麸炒)各一两 大黄 黄柏各三两 香附子(炒) 黑牵牛各四两

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食后以生姜汤送下。

【主治】一切冷食不消，宿酒不散，伤寒身热恶寒，战慄，头项痛，腰脊强，两手脉沉，及一切沉积水气，两胁刺痛，中满不能食，头目眩，用茶调散涌下冷涎后者。

36612 导饮丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】京三棱(炮) 蓬莪术(炒)各三两二钱 青皮(去白) 陈皮(去白) 白术各一两半 槟榔 枳壳(麸炒，去瓢) 木香各一两 白茯苓(去皮)一两半 半夏一两

【用法】上为细末，水面糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后以生姜汤送下。渐加至一百丸。

【功用】去痰涎，进饮食。

【主治】风痰气滞，膈脘痞满，停饮不消，头目昏眩，手足麻痹，声重鼻塞，神困多睡，志意不清。

【宜忌】忌猪肉、荞面。

36613 导饮丸

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】木香 茴香 槟榔 青皮 橘皮 各一两 黑牵牛 甘遂 大戟各二两 干姜一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸或五丸，以饮送下。

【主治】伤寒心下痞硬痛，噎气不转，腹与右胁满痛者。

36614 导饮丸

《丹溪治法心要》卷二。为《丹溪心法》卷二“导痰丸”之异名。见该条。

36615 导饮丸

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】苍术 白茯苓各一两 独活七钱 黄连五钱 吴茱萸三钱

【用法】上为细末，神曲糊为丸服。

【主治】水饮。

36616 导经丸

《丹溪心法附余》卷二十。即《袖珍》卷四引《圣惠》“寻经丸”。见该条。

36617 导经汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】香附一钱 乌药一钱五分 当归一钱 木香（不见火） 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人月候不调，气滞腹痛，及血海疼痛。

36618 导经散

【方源】《普济方》卷三四七。

【组成】皂角十挺

【用法】上锉细，火内烧过，烟尽，黑色细末，入乳香、没药令匀。每服二钱，温酒调下。

【主治】妇人外吹乳。

36619 导毒丹

【方源】方出《直指》卷二十二，名见《普济方》卷二八五。

【组成】紫草 瓜蒌（连皮）

【用法】上锉。新水煎服；或用黑豆一盞，入生姜、紫苏煎汤服。

【主治】痈疽大便秘。

36620 导热汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】当归 白芍各三钱 柴胡二钱 黄芩一钱 丹皮三钱 甘草 天花粉各一钱

【用法】水煎服。

【功用】引血归经，导火外泄。

【主治】春月伤风，热入血室，下血谵语，头汗出，似狂非狂。

36621 导热散

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】侧柏叶 山梔 车前子 灯心 黄芩 滑石 乌梅 竹叶 大黄（炒） 猪苓 泽泻 蒲黄 赤茯苓 甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】血淋，便血。

36622 导秘丸

《圣济总录》卷十七。为《普济方》卷一〇五引《圣惠》“木香丸”之异名。见该条。

36623 导黄汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】葛根二钱 花粉二钱 山梔一钱五分 连翘一钱五分 木通二钱 茵陈三钱 草薢二钱 茯苓二钱 泽泻一钱五分 车前二钱

【用法】苡仁一两煎汤代水。

【主治】胃火炽盛、湿热熏蒸而致阳黄，面目发黄，口燥而渴，小溲赤涩。

36624 导滞丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】黑牵牛（微炒，取头末）四两 槟榔半两 青皮（去白）二两 木香二钱半 胡椒半两 三棱一两半 丁香皮一两

【用法】上为细末，入牵牛头末令匀，薄面

糊为丸，如小豆大。每服三十丸至五十丸，食后以生姜汤送下。

【功用】和中顺气，消谷嗜食，逐饮渗湿。

【主治】心腹痞满，胁肋刺痛，呕吐痰水，不思饮食。

36625 导滞丸

【方源】《金匱翼》卷二。即《内外伤辨惑论》卷下“枳实导滞丸”。见该条。

36626 导滞汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物加蒲黄(生) 甘草梢 泽兰叶 姜皮 牛膝 红花 瞿麦 陈皮

【功用】祛瘀利水。

【主治】妇人产后污血阻滞，溺窍不通，以致淋漓。

36627 导滞汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄芩(酒炒) 黄连(酒炒) 木香各三钱 当归 赤芍 槟榔 山楂各一钱五分 大黄三钱

【用法】水二钟，煎八分，热服。

【主治】初痢脓血，赤白混杂，里急后重，日夜无度。

36628 导滞汤

【方源】《医方集解》。

【异名】导气汤。

【组成】芍药汤去桂、甘草，加枳壳。

【主治】下痢脓血稠粘，腹痛后重而兼渴者。

36629 导滞汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】大黄 厚朴 槟榔 陈皮 甘草 青皮 归尾 白芍(酒炒)

【用法】水煎服。兼服牛黄丸。

【主治】小儿腹痛有外证初愈，而积滞未行，元气未亏，大便不通，或燥结，唇红者。

36630 导滞汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】香附(酒炒)二钱 玄胡(炒)一

钱五分 归尾二三钱 木香四分 泽泻一钱半 红花(炒黄)一钱 淮牛膝(酒炒) 桃仁(去皮)各一钱五分 苏木一二钱

【用法】水煎，加酒服。

【主治】妇人经期，血因气滞而停，瘀积作痛，拒按属实者。

【宜忌】以上诸证，必实见其有滞无虚，方可用之；若或兼虚，勿行克伐，以伤脾肾；血通瘀下，停药，勿得过服。

【加减】火盛内热，血燥切痛者，加炒梔子二钱；微热者，加白芍一钱半；瘀极而大便燥结者，加大黄二三钱，不应，加芒消、蓬术；寒凝作痛，加肉桂一二钱，或吴茱萸一钱。

36631 导滞散

【方源】方出《圣惠》卷六十七，名见《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)。

【组成】当归三分(锉，微炒) 川大黄三分(锉碎，微炒)

【用法】上为散。每服二钱，不拘时候以温酒调下。

【主治】①《圣惠》：从高坠下，大便下血不止。②《局方》(吴直阁增诸家名方)：重物压挫，或从高坠下，作热五内，吐血、下血，出不禁止；或瘀血在内，胸腹胀满，喘粗气短。

36632 导滞散

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】苍术 陈皮 枳壳 川厚朴 山楂肉 神曲 香附 黄芩各二钱

【主治】伤食便秘。

36633 导滞散

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】大黄一两 当归二钱半 麝少许

【用法】上为末。每服三钱，以热酒调下。

【主治】金疮伤破肚皮，肠与脂膏俱出，二便闭涩。

36634 导滞汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】黄耆（锉）四两 当归（切，焙）人参 白茯苓（去黑皮） 龙齿 远志（去心） 甘草（炙）各三两 桂（去粗皮） 半夏（汤浸，洗七遍，焙）各五两 枳实（去瓢，麸炒） 桔梗（去芦头，锉，炒） 茯神（去木）各二两

【用法】上为粗末。每服先以水二盏，煮粳米半合，米熟去米，即入药五钱匕、生姜五片、大枣二枚（擘破），同煎数沸，去滓，取一盞，不拘时候温服。

【主治】脉痹，血道壅涩。

36635 导痰丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星 半夏各四两 皂角半斤 生姜一斤

【用法】不得犯铜铁器，用水浸高三指许，煮三遍，逐旋煮水干再添，候三遍毕，去生姜、皂角不用，只用半夏、天南星为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，以熟水送下。

【主治】痰饮。

36636 导痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】导饮丸（《丹溪治法心要》卷二）。

【组成】吴茱萸三钱（制） 茯苓一两 黄连半两 滑石七钱半 苍术（泔浸）一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，生姜汤送下。

【主治】痰。

36637 导痰丸

【方源】《普济方》卷一六三引《经验良方》。

【组成】天南星 大半夏（各不锉） 白明矾 生姜各半斤（洗净，切作片） 猪牙皂角四两（锉碎。上五味用瓦罐以水浸过为度，煮干令透，去白矾、生姜、皂角，止取南星、半夏锉焙，同后药同研为末） 真紫苏子 萝卜子 麦蘖各四两（并炒） 糖珠子四两（去核，即山果子，又名猴楂）

【用法】上为末，面糊为丸。每服五六十丸，淡姜汤送下，不拘时候。

【主治】痰饮气滞，胸膈不利，喘咳气促，胁肋满胀，咳嗽多痰，鼻塞稠涕，气不升降，胸膈痞结。

36638 导痰丸

【方源】《医学纲目》卷二十一引《玄珠经》。

【组成】半夏六两（分作三处：一分矾水浸，一分肥皂角为末水浸，一分用巴豆百粒同水煎。上余药在下，半夏在上，浸至十日半月，时时动水，令二药相透，冷相合一处，拣去巴豆、皂角、慢火煮干，取半夏切碎晒干） 甘遂（制）二两 百药煎二两 僵蚕一两 全蝎二两

【用法】上为末，用拣出皂角炼膏为丸；如硬，再入糊，令得所。每服十五丸，实者二十五丸。

【主治】痰。

36639 导痰丸

【方源】《普济方》卷一〇四。

【组成】枯白矾半两 僵蚕一两

【用法】上为细末。每服一钱，生姜汤调下。良久吐涎涎为效；未吐再进，不拘时候。

【主治】中风瘫痪，胸膈有痰涎不利。

36640 导痰丸

【方源】《普济方》卷一〇四。

【组成】黑牵牛（生，用头末）三线 白矾（生用）一钱 猪牙皂角（生用）二钱 半夏少许 南星少许

【用法】上为细末，冷水为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，五更用温茶汤送下。

【功用】化痰行气，免患中风之疾。

36641 导痰丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】黑丑三两 枳实一两五钱 橘红一两五钱 朴消三钱 生矾二钱五分 枯矾二钱五分 牙皂一钱五分

【用法】浓萝卜汁为丸，如芥子大。每服一

钱，早空心以姜汤送下。

【功用】导利。

【主治】停痰积饮，隐僻难除，形神壮健，正气未衰者。

36642 导痰汤

【方源】《传信适用方》卷一引皇甫坦方。

【组成】半夏四两(汤洗七次) 天南星一两(细切，姜汁浸) 枳实(去瓢)一两 橘红 赤茯苓一两

【用法】上为粗末。每服三大钱，水两盏，生姜十片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】痰凝气滞，胸膈痞塞，肋肋胀满，头痛吐逆，痰嗽喘急，不思饮食，以及头晕，不寐，短气，谵语，中风，痰厥，痰呃。

①《传信适用方》痰厥，头昏晕。②《普济方》引《济生》：一切痰涎壅盛，或胸膈留饮，痞塞不通。③《普济方》：肋肋胀满，头痛吐逆，喘急痰嗽，涕唾稠粘，坐卧不安，饮食不思。④《玉案》：痰凝气滞。⑤《医林绳墨大全》：痰阻短气。⑥《伤寒大白》：心胃有痰火攻冲包络而谵语，口不渴，舌苔滑。⑦《杂病源流犀烛》：痰盛中风语涩，痰结碍逆而为痰呃。⑧《会约》：日夜不寐。

36643 导痰汤

【方源】《百一》卷五引费达可方。

【组成】白茯苓 桂心 半夏(汤洗十次) 干生姜 橘红 枳壳(炒香) 甘草各等分

【用法】上为末。加生姜三片，煎至七分，不拘时候温服。

【主治】痰饮。

36644 导痰汤

【方源】《脉因症治》卷二。

【组成】台芎二两 香附八两 陈皮 苏叶 干姜一两

【主治】痰注胁痛。

36645 导痰汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】神曲二钱 枳实二钱 大黄二钱

【用法】上先以水煎，临熟下大黄滚一二

沸，空心服。如利之后，以人参、白术等剂补之。

【功用】消宿食，下郁积。

【主治】过食伤脾，健运无力，致食不得消化，郁于肠胃之间，而为泄泻。

【方论选录】用神曲快脾消宿食，枳实消郁滞，大黄下肠胃中之宿滞，此乃通因通用之义也。

36646 导痰汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏(姜炒)二钱 白茯苓(去皮)三钱 白术一钱五分(去芦) 香附二钱 青皮(去瓢)二钱 黄芩(炒)二钱 瓜蒌仁三钱 砂仁八分 黄连(姜炒)二钱 甘草八分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】暖气声闻于外，胸膈闷，舌黑、因气有痰者。

36647 导痰汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】半夏 南星 橘红 枳壳 甘草 赤茯苓 海石 生姜

【主治】痰积泄泻，脉滑实者。

【加减】应下者，加大黄或玄明粉。

36648 导痰汤

【方源】《治痧要略》。

【组成】僵蚕 瓜蒌 牛蒡子各一钱 陈皮 银花各八分 薄荷 泽泻各五分

【用法】水煎，微冷服。

【主治】痧因痰壅不降者。

36649 导痰汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】旋覆花 半夏 陈皮 荆芥 五味子 前胡 白芍药 杏仁 桔梗 茯苓 甘草

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】妇人月水准信，痰闭子宫，不能受胎，其人肥白，腹不痛者。

36650 导痰汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】半夏四钱 南星一钱 枳实 赤苓 橘红各一钱 炙草五分 竹沥一盏 姜汁三茶匙

【用法】先用瓜蒂(炒)、赤小豆(煮)等分，温浆送下，探吐其痰，随用本方。

【主治】痰厥暴不知人，类于卒中，但未卒仆，喉中痰潮如曳锯声。

36651 导痰汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】半夏二钱 南星 枳实 赤苓 橘红各一钱 炙草五分 白芥一钱

【主治】痰饮胁痛，走注有声。

36652 导痰汤

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】雄黄 贝母 陈皮 茯苓 桔梗 北细辛 菖蒲 瓜蒌 薄荷 蝉退 天麻 郁金 甘草各三分

【用法】竹沥、姜汁为引，水煎服。

【主治】五痫初起轻者。

36653 导痰汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】南星 半夏 陈皮 茯苓 瓜蒌仁 枳实 桔梗 山梔 黄芩 黄连各一钱 甘草 木香(另研) 辰砂二分

【用法】加生姜，水煎，入竹沥、姜汁，磨木香、调辰砂末同服。

【主治】痫，痰壅。

【备考】方中甘草、木香用量原缺。

36654 导痰汤

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】半夏 南星 橘红 枳实 茯苓 人参 菖蒲 竹茹 甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妇人肥白，痰闭子宫，月信准而不受胎，经来腹不痛。

36655 导痰汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】制半夏一钱半 陈皮一钱 木香四分 当归二钱 独活一钱 五加皮一钱半 生白术一钱半 淮牛膝一钱半 川芎八分

竹茹八分 生姜一片

【主治】湿痰攻注背俞，脊驼作痛，脉小滑者。

36656 导痰汤

【方源】《性病》。

【组成】黄连二钱 白术一钱半 陈皮 滑石各一钱 黄芩半钱 木通三分 桃仁十二个 甘草(炙)少许

【用法】水煎服。

【主治】月水不利，脐腹作痛；或小腹引腰，气攻胸膈，躯体肥满而有痰者。

36657 导源饮

【方源】《普济方》卷一九一。

【组成】白茯苓皮二两 车前子 大腹皮(水洗) 通草 木通 薏苡仁(炒)各一两 天仙藤 桑皮 郁李仁 冬瓜子(炒) 木香(纳怀内取燥)各一两半 赤石脂 甜葶苈八钱(用黑枣拌匀蒸用) 大杏仁一两(去皮尖双仁，炒令微黑，另捣) 当归一两半(去芦，酒洗)

【用法】上为细末，用真藕粉打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五六十丸，食前温酒送下；如患人素不饮，淡盐汤送下。

【主治】各种水气。

36658 导源煎

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】党参 白术各一钱五分 桔梗二钱 防风七分 荆芥 薄荷 干姜(炮)各五分(或加蜜附子五分)

【用法】水二钟，煎七分，候凉饮之，徐徐咽下。

【主治】喉痹肿痛不能言者。

36659 导聚散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 赤芍一两半(醋炒) 桂心一两半 青皮一两半 香附三两(醋炒) 木香一两半

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】妇人产后肝脾气滞，结聚不散，而致恶露不尽，小腹疼痛不止，脉沉弦涩滞者。

【方论选录】当归养血脉以荣经，赤芍破血滞以调血，桂心温经通闭，青皮破气平肝，香附调气解郁结，木香调气醒脾胃，为散水煎，务使气化血调，则结聚无不散，而恶露无不尽，何虑小腹疼痛之不痊哉。

36660 导膈饮

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】紫苏 枳实 陈皮 栝楼仁 葛根 香附 茯苓各五分 甘草(炙)三分

【用法】水煎服。

【主治】伤食发热。

36661 导瘕囊

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】川椒 皂角各一两 细辛一两五钱

【用法】上为末。以三角囊大如指者，长二寸，盛药纳入阴户内，欲便则出之，便已再纳。瘕化恶血而下，以温汤洗之。

【主治】妇人血因寒阻，凝结成瘕。

【宜忌】三日勿近男子。

36662 导水饮子

【方源】《医统》卷三十一引《集成》。

【组成】吴茱萸三钱 黄连 茯苓 苍术各一两 滑石七钱半

【用法】上为细末，滴水为丸。每服七十丸，食前车前子、灯心汤送下。

【主治】水饮肿胀。

36663 导赤甘露

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】犀角 木通 知母 石斛 银柴甘草 黄芩 麦冬

【主治】舌菌。

36664 导经散子

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】皂角灰 蛤粉

【用法】上为细末。每服半钱或一字，以温酒调下。急以手揉乳，敷以天南星末，用水调上；未效，加木鳖子，以醋调涂，次服栝

楼散。

【主治】乳痈。

36665 导气抑留汤

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】香附子 萝卜子 乌药 苏子 厚朴 桔梗 羌活 防风 半夏(制) 茯苓 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】瘰癧先从右起。

36666 导气枳壳丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】枳壳(去瓢，麸炒) 木通(锉，炒) 青皮(去白) 陈皮(去白) 桑白皮(锉，炒) 萝卜子(微炒) 白牵牛(炒) 黑牵牛(炒) 莪术(煨) 茴香(炒) 荆三棱(煨) 各等分

【用法】上为末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】分气逐风。

【主治】气结不散，心胸痞痛，气逆上攻。

36667 导气枳实丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】枳实(麸炒)四两 荆三棱 蓬莪术(煨) 青皮(去白) 陈皮(去白) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 各一两 沉香 槟榔各半两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至六十丸，食后生姜汤送下。

【功用】理顺三焦，和调脾胃。

【主治】胀满及痞噎不通。

36668 导气枳实丸

《医学入门》卷八。为《内外伤辨》卷下“枳实导滞丸”之异名。见该条。

36669 导气除湿汤

【方源】《医学发明》(入卫本)卷八。

【组成】羌活一钱半 当归身一钱 枳实 大黄各五分

【用法】上锉，如麻豆大。都作一服，水二

大盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。下利一两行，痛止。

【主治】脚气肿痛。

【备考】本方方名，原书《济生拔萃》本作“枳实大黄汤”。

36670 导气除湿汤

《普济方》卷二四六。即《医学发明》卷八“脚气濯洗法”。见该条。

36671 导气除燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】茯苓（去皮）滑石（炒黄）各二钱 知母（细锉，酒洗）泽泻各三钱 黄柏（去皮，酒洗）四钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水三盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服；如急闭，不拘时候。

【主治】血涩至气不通而致小便闭塞不通。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中黄柏、知母滋肾阴、润肾燥，清其源则流自洁；茯苓、泽泻甘淡，与咸寒为伍，有利尿降热的作用；滑石为石药中的润药，利六腑之涩结，下达膀胱，润滑肠道。本方并无调气药物，而冠以“导气”二字，在于黄柏、知母经过酒洗，酒性散发起先升后降的作用，滑石炒黄借火性以行润滑之药，故曰导气。

36672 导气通经汤

《杏苑》卷六。为《医学发明》卷六“导滞通经汤”之异名。见该条。

36673 导气通幽汤

《中国医学大辞典》。即《脾胃论》卷下“通幽汤”。见该条。

36674 导气通痰涎

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】不去油巴豆一个 斑蝥三个 麝香少许

【用法】以葱涎、蜂蜜和，捻如麦粒形，丝棉裹，置耳中，响声如雷，勿得惊惧，待二十一日，耳中有脓水流出，方可去锭。

【主治】耳聋。

36675 导气清利汤

【方源】《准绳·类方》卷三引《体仁汇编》。

【组成】猪苓 泽泻 白术 人参 藿香 柏子仁 半夏（姜制） 陈皮 白茯苓 甘草 木通 梔子 黑牵牛 槟榔 枳壳 大黄 厚朴（姜制） 麝香少许

【用法】加生姜，水煎服，兼服木香和中丸；吐不止，灸气海、天枢；如又不通，用蜜导。

【主治】关格吐逆，大小便不通。

36676 导气槟榔散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】槟榔（锉）一两 木香 木通（锉） 桑根白皮（炙，锉）各半两 牵牛子二两（一半生，一半熟，同捣，取末一两） 郁李仁（麸炒，去皮）一两（别研如膏） 大黄半两（湿纸裹，煨）

【用法】上除研膏外，为散，入研膏和匀。每服二钱匕，入牛黄、龙脑少许，空心以温蜜汤调下。

【主治】风秘，肠胃痞塞不通。

36677 导气醒脾汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】条参 黄耆 砂仁 官桂 六曲 各一钱 茯苓 当归 白术 青皮 陈皮 腹皮各一钱五分 甘草三分

【用法】旧蒲扇（烧灰）二钱为引，水煎服。

【主治】酒病腹胀，四肢厥冷，冷汗不收，心烦发晕。

36678 导水茯苓汤

【方源】《普济方》卷一九一引《德生堂方》。

【异名】茯苓导水汤（《金鉴》卷五十四）。

【组成】泽泻 赤茯苓 白术 麦门冬（去心）各三两 紫苏 木瓜 槟榔各一两 陈皮 砂仁 木香 大腹皮各七钱半

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，加灯心二十五根，煎八分，去滓，空心服；服此药时，要如熬阿刺吉酒相似，水一斗，止取药一钱，服后小水行时，即渐添多，直至小

便变清白色，方为痊愈。如病重者，前药可均作三大服，每服再加去心麦门冬二两，灯草一大把，均半两重，水一斗于砂锅内，下药五两，熬一大碗，再下小铍内煎至一大盏，五更空心服，滓再煎服，连进三服。

【功用】利小便。

【主治】水肿，头面手足遍身肿如烂瓜之状，手按面塌陷，手起随手面高突，喘满倚坐不得息，不能转侧，不能着床而睡，饮食不下，小便秘涩，溺出如割，便绝少，虽有面如黑豆汁，煮服喘嗽气逆诸药不效。

36679 导水消肾丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】茅山苍术一斤（米泔水浸，切片，炒黄） 木通半斤 肉桂一两（刮去粗皮） 牵牛二两（微炒） 木香一两

【用法】上为细末，陈米粉糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白滚汤、清米汤任下。

【功用】引导水气。

【主治】囊痈。内伤生冷，外受风寒，以致寒湿侵入囊中，小者如升，大者若斗，皮肤顽厚，阳物短缩，小水不利，不痛多冷。

【宜忌】忌生冷、而食。

【备考】此囊虽夏月炎天，亦以衣被盖覆之为妙。

36680 导宁纯阳丹

【方源】《济阳纲目》卷十二。

【组成】苍术（米泔浸三日，再换净水浸洗，切，晒干，以青盐水浸一宿） 莲肉（好者，酒浸一宿） 各四两

上用大公猪肚一个，壁土揉洗净，纳入前二味，以线密封，用无灰酒煮烂取起，入石臼中捣烂，捏成小饼，烘干，研为细末。

南星四两（净，切细，以姜汁一小盏浸一宿，以灶心土同炒，取土不用） 大半夏四两（汤泡去涎，晒干为末，以好醋浸七日蒸熟，不麻为度） 橘皮四两（锉，灶心土炒） 谷

芽（炒） 厚朴 白术 麦芽（炒） 甘草 人参 茯苓 白豆蔻 三棱 莪术 缩砂 茱澄茄各一两 木香 丁香 沉香各半两 粟米四两（姜汁浸，炒）

【用法】上为末，稀面糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心米饮送下。

【主治】真元虚损，心肾不安，精神耗散，脾土湿败，不能化食，所食五味之物，不成精液，乃成痰涎，聚于中脘，不能传导，以致大肠燥涩，小便反多而赤，或时呕吐酸水，久或翻胃结肠。

36681 导赤五苓散

【方源】《济阳纲目》卷一〇五。

【组成】茯苓 猪苓 泽泻 白术 官桂 生地黄 木通 甘草各等分（一方无桂）

【用法】上锉。水煎服。

【主治】膀胱移热于小肠，膈肠不便，上为口糜。

36682 导赤化毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【异名】导神化毒汤（《片玉痘疹》卷九）。

【组成】木通 麦冬 甘草 辰砂（研，调） 灯心 梔子 酸枣仁（炒）

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】痘疮已成浆，脓血稠急面胀痛者。

36683 导赤地榆汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷四引《医方集略》。

【组成】地榆 当归身（酒洗） 各一钱半 赤芍药（炒） 黄连（酒炒） 黄芩（酒炒） 槐花（炒） 各一钱 阿胶珠 荆芥穗 各八分 甘草（炙） 五分

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】赤痢及血痢。

36684 导赤各半汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】导赤泻心汤（《张氏医通》卷十三）、导赤泻心各半汤（《寒温条辨》卷五）。

【组成】黄连 黄芩 甘草 犀角 麦冬

滑石 山梔 茯神 知母 人参

【用法】水二钟，加生姜、大枣煎之，加灯心一握，煎沸热服。

【主治】伤寒经证，心下不硬，腹中不满，大小便如常，身无寒热，热传手少阴心，心火上而逼肺，渐变神昏不语，或睡中独语一二句，目唇赤焦，舌干不饮水，稀粥与之则咽，不与则不思，形如醉人。

【方论选录】①《医方集解》：此手少阴、太阴、太阳药也。陈来章曰：热入心经，凉之以黄连、犀角、梔子；心移热于小肠，泄之以滑石、甘草、灯心；心热上逼于肺，清之以黄芩、梔子、麦冬。然邪之越经而传于心者，以心神本不足也，故又加入参、茯神以辅之。②《张氏医通》：取《金匱》泻心汤为主，以其热在上而不在下，病在气而不在血，故于本方裁去大黄，易入山梔以清心包之热，知母、犀角以解肺胃之烦，人参、麦冬、甘草、茯神以安君主之神，滑石为导赤之向导，姜、枣为散火之问使；用犀角者，即导赤散中之地黄；用滑石者，即导赤散中之木通，虽无导赤散中药味，而导赤散之功效备其中矣。

36685 导赤各半汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】生地 木通 甘草 黄连 麦冬 山梔 赤茯苓 车前子 灯心

【主治】心经咳嗽，脉左寸洪数。

36686 导赤各半汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】生地 木通 甘草 川黄连 麦门冬 犀角

【主治】心火妄动，上刑肺金而致嗽血。

36687 导赤各半汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】生地 木通 川连 甘草 黄芩 山梔 犀角（磨冲）

【主治】心热痿软，四肢关节不能活动，足胫纵缓不能收持，如枢纽之折而不能提挈，面颊常赤，意乱心烦，脉左寸洪数。

36688 导赤各半汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】生地 木通 甘草 川连 麦门冬 山梔 犀角 黄芩 知母 滑石

【功用】《伤寒大白》：清心热，利小便。

【主治】①《症因脉治》：少阴君火旺盛，小便不利。②《伤寒大白》：心热谵语。火动于中，而多消渴。

【方论选录】《伤寒大白》：以导赤合泻心汤，上清心经之火；加滑石，导心火，下通小便而出；加知母、山梔、黄芩，兼清上焦肺火。以利小便，莫如清肺；清肺热，又莫如利二便也。

36689 导赤泻心汤

《张氏医通》卷十三。为《伤寒六书》卷三“导赤各半汤”之异名。见该条。

36690 导赤承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】赤芍三钱 细生地五钱 生大黄三钱 黄连二钱 黄柏二钱 芒消一钱

【用法】水五杯，煮取二杯，先服一杯；不下再服。

【主治】阳明温病，下之不通，左尺牢坚，小便赤痛，时烦渴甚。

36691 导赤通气汤

《麻科活人》卷三。为《痘疹心法》卷二十二“导赤通气散”之异名。见该条。

36692 导赤通气散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】导赤通气汤（《麻科活人》卷三）。

【组成】木通 生地黄 甘草 人参 麦门冬 石菖蒲 当归身

【用法】灯心作引。水煎服。

【主治】痘疹心虚，声不扬者。

36693 导赤清心汤

【方源】《重订通俗伤寒论》

【组成】鲜生地六钱 辰茯神二钱 细木通五分 原麦冬一钱（辰砂染） 粉丹皮二钱 益元散三钱（包煎） 淡竹叶一钱半 莲子心三十支（冲） 辰砂染灯心二十支 莹

白童便一杯(冲)

【功用】清降虚热，导火。

【主治】包络心经虚热，舌赤神昏，小便短涩赤热。

【加减】服后二三时许，神识仍昏者，调入西黄一分。

【方论选录】热陷心经，内蒸包络，血虚热盛，故以鲜生地凉心血以泻心火，丹皮清络血以泄络热为君；然必使其热有出路，而包络心经之热乃能清降，故又臣以茯神、益元、木通、竹叶，引其热从小便而泄；佐以麦冬、灯心，均用朱染者，一滋胃液以清养心阴，一通小便以直清神识；妙在使以童便、莲心咸苦达下，交济心肾，以速降其热，是以小便清通者，包络心经之热，悉从下降，神气即清矣。

34694 导赤解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】木通 防风 甘草 麦冬 连翘 升麻 赤芍 地骨皮 葛根 天花粉 生地 黄

【用法】上咬咀。灯心作引，水煎服。

【主治】痘疹于起发时，身热太盛，过于常时，唇焦口燥，小便短少者。

34695 导赤解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】木通 生地 麦冬 茯神 人参 甘草 山梔仁 石菖蒲

【用法】灯心为引。水煎服。

【主治】痘收后邪热攻心，而心君不肯受邪，传于包络，昏睡连日不醒，口中妄语；或有醒时，亦似醉人，每多错言。

34696 导神化毒汤

【片玉痘疹】卷九。为《痘疹全书》卷下“导赤化毒汤”之异名。见该条。

34697 导滞定功丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】大椒 木香各一钱 蝎梢三钱 巴豆八个(出油为度)

【用法】上为末，后入巴豆霜研匀，醋面糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服五丸至十丸，淡醋汤送下。

【功用】消食止逆定痛。

【主治】一切心腹卒暴疼痛，及胸中不利。

34698 导滞香连丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】木香(生) 黄连(生) 白术(焙) 茯苓各二钱八分四厘 巴豆十四粒(研细，去油取霜)

【用法】上为细末，入巴豆霜和匀，用蒸饼糊为丸，如绿豆大。大人壮实者，每服十三丸，空心白汤送下；虚弱人，止可七丸、八丸；小儿以长幼虚实量减服之。

【功用】行积滞。

【主治】下痢赤白，大便欲去不去，前攻前急。

【宜忌】略行即可，不许过度。

34699 导滞通经汤

【方源】《医学发明》卷六。

【异名】导气通经汤(《杏苑》卷六)。

【组成】陈皮 桑白皮 白术 木香 茯苓(去皮)各一两

【用法】上咬咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，食前去滓温服。

【主治】脾湿有余，及气不宣通，面目手足浮肿。

【加减】霖雨时加泽泻半两。

【方论选录】《卫生宝鉴》：《内经》曰，湿淫所胜，平以苦热，以苦燥之，以淡泄之。陈皮苦温，理肺气，去气滞，故以为主；桑白皮甘寒，去肺中水气，水肿腹胀，利水道，故以为佐；木香苦辛温，除肺中滞气；白术苦甘温，能除湿和中，以苦燥之；以茯苓甘平，能止渴除湿，利小便，以淡泄之，故以为使也。

34700 导滞通经汤

【方源】《外科发挥》卷三。

【组成】五苓散去猪苓、官桂，加木香、陈

皮。

【用法】每服三钱，滚汤调下。

【主治】脾经湿热，壅遏不通，面目手足作痛。

36701 导滞通幽汤

《东垣试效方》卷七。即《脾胃论》卷下“通幽汤”。见该条。

36702 导痰千缙汤

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】半夏 南星 陈皮 茯苓 皂角 枳实。

【主治】喘。

36703 导痰小胃丹

【方源】《古今医鉴》卷四。

【异名】竹沥化痰丸（《回春》卷二）。

【组成】天南星 半夏（二味用白矾、皂荚、姜汁水煮透熟）各二两半 陈皮 枳实（二味用白矾、皂荚水泡半日，去白矾，晒干，炒）各一两 白术（炒）一两 苍术（米泔、白矾、皂荚水浸一宿，去黑皮，晒干，炒）一两 桃仁 杏仁（二味同白矾、皂荚水泡，去皮尖）各一两 红花（酒蒸）一两 大戟（长流水煮一时，晒干）一两 白芥子（炒）一两 芫花（醋拌一宿，炒黑）一两 甘遂（面裹煨）一两 黄柏（炒褐色）一两 大黄（酒蒸，纸裹煨，焙干，再以酒炒）一两半

【用法】上为细末，姜汁、竹沥煮蒸饼糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸；极甚者五七十丸。量虚实加减，再不可太多，恐损胃气也。痰饮，卧时白汤下，一日一次；中风不语，瘫痪初起，每服三十五丸，浓姜汤送下；风头痛，多是湿痰上攻，每服二十一丸，临卧姜汤送下；眩晕多属痰火，每服二十五丸，食后姜汤送下，然后二陈汤、四物汤加柴胡、黄芩、苍术、白芷，倍川芎，热多，加知母、石膏；痰痞积块，每服三十丸，临卧白汤送下，一日一次；哮喘，乃痰火在膈上，每服二十五丸，临睡姜汤送下，每服一次；喉痹肿痛，食后白汤送下。

【功用】上取胸膈之顽痰，下利胃肠之坚结。

【主治】中风，眩晕，喉痹，头风，哮喘等症。

36704 导痰开关散

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】牙皂一两（去皮弦，炙） 僵蚕五钱 白矾五钱 杜牛膝根汁一两（五六月间取根叶打汁，晒干，研末，用瓶固藏）

【用法】上为细末。如遇喉证，连吹数管，吐出稠痰，重者吹数次；若中风痰升，调服一钱许，令吐痰涎，然后续进它药；醋调可敷外肿。

【主治】喉症风痰，中风痰升。

36705 导痰消风散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】陈皮 半夏 甘草 白芷 全蝎 羌活 防风 荆芥 升麻 细辛 芦荟各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】鸱眼凝睛。

36706 导痰消滞汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】南星 半夏 枳实 橘红 厚朴 石菖蒲 竹沥 生姜

【功用】豁痰利窍。

【主治】内伤，口噤不语。

36707 导痰调经汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】秦归 丹参各三钱 橘红一钱半 建菖蒲一钱 竹茹三钱 泽兰四钱

【用法】水煎，温服。

【功用】养血祛痰。

【主治】妇人月经错后，色淡量少而稠粘，白带甚多，身体肥胖，胸闷脘胀，痰多，胃纳减少，面色苍白或淡黄，头晕心悸，舌质淡红，脉细滑。

36708 导痰救苦丹

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】锦纹大黄四两（酒拌蒸，晒干） 制

牙皂二两

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服五六十丸，冷绿豆汤送下，以汗为度。

【主治】伤寒瘟疫，不问传经过经；及大头瘟，目赤咽肿，烂喉丹疹，斑毒。

36709 导赤泻心各半汤

《寒温条辨》卷五。为《伤寒六书》卷三“导赤各半汤”之异名。见该条。

寻

36710 寻气丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】甘遂二钱（炒） 石燕子 雌雄各一枚 斑蝥三枚（去翅足，炒）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如绿豆大。每服三丸，空心、食前、临卧以麝香温酒送下。

【主治】小肠疝气，偏坠疼痛。

【宜忌】忌热物一时，甘草一日。

36711 寻虫散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白丑（一半炒） 黑丑（一半炒） 雷丸 槟榔各一两 广木香五钱

【用法】上为末。每服三钱，黑沙糖调下。

【主治】大人、小儿腹内诸虫。

36712 寻伤丸

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】乳香 没药 苏木 川乌 松节 自然铜（醋煅） 降香 地龙（炒去油） 水蛭（香油炒，炙）各五钱 血竭三钱 龙骨五钱 土狗十二个（焙干）

【用法】上药各为细末。每服三钱，以热酒送下。

【主治】筋骨碎断者。

36713 寻经丸

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【组成】红花少许 当归 川芎 白芍药 甘草（炒） 官桂 桃仁（炒）一两 大黄三两 血竭二钱半 地胆二十个（去翅足）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】妇人经病不通，脐腹连腰腿疼痛。

【备考】本方方名，《丹溪心法附余》引作“导经丸”。方中当归至官桂用量原缺。

36714 寻积丸

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】巴豆不拘多少（和壳研细） 黄连生面各等分

【用法】上药都拌匀，冷水为丸，如梧桐子大，却用面麸、地灰用文武火炒令干，将冷水一碗安于侧，候药丸炒干，可将一丸于冷水内试，以浮在水面为度。每服五七丸至十丸，晚用温热水送下，可服三次。

【主治】诸般积气及痹寒。

36715 寻痛丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】杜仲（去粗皮，姜汁炒）二两 当归（去芦，酒浸） 玄胡索各半两（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以盐酒嚼下，不拘时候。

【主治】腰背并骨节因扑损疼痛发作。

36716 寻痛丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】棕榈皮（烧存性）一两半 皂角子仁二两（炒） 当归（去芦头） 乳香（别研） 没药（别研） 川山甲各一两 木香半两 麝香二两（别研）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以温酒送下，不拘时候；或以木瓜汤送下亦得。

【功用】除疼痛。

【主治】走注流湿袭经络。

36717 寻痛丸

【方源】《得效》卷十八。

【组成】草乌（去皮尖，生用） 乳香（火熨） 没药（火熨） 五灵脂各三两 生麝香少许

【用法】上为末，酒糊为丸，如指头大，朱砂五钱（研）为衣。每服一丸，薄荷、生姜

研汁磨化。

【功用】止痛清心，行气活血。

【主治】《梅氏验方新编》：损伤疼痛难禁者。

36718 寻痛丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】五灵脂 草乌(炮) 杏仁各一两 沉香 木香各五钱 麝香一钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温黄酒送下。

【主治】遍身走注疼痛，并一切肿毒疼痛。

【加减】肿毒，去杏仁、沉香、木香，加桃仁、乳香、没药各等分，烧酒下。

36719 寻常煮散

【方源】《外台》卷十九引《苏恭方》。

【组成】独活 汉防己 麻黄(去节) 茯苓 丹参 牛膝各六两 磁石十六两(碎) 黄耆 防风 人参 犀角各六两 升麻 青木香 桂心各四两 石膏十四两(碎) 吴茱萸八两 生姜 半夏(洗) 槟榔(大者) 杏仁 大黄(切)

【用法】上二十一味，将十六物捣切如豆大，分作三十分，分和为一服服。以槟榔三枚、生姜一两，各合皮切，杏仁十四枚(去皮尖)，以水二升三合，煮取七合，去滓，日晚或夜中服之，每日一次；若气盛时，每日二次；可一服，或二日一服，或三日一服。

【主治】诸脚气弱，未至大发。

【宜忌】忌生葱、醋物、羊肉、饧。

【加减】心下满，呕逆者，加半夏一两；大便涩者，去磁石，加大黄一两。

【备考】方中半夏至大黄用量原缺。

36720 寻痛住痛散

【方源】《救伤秘旨续刻》。

【组成】乳香 没药 淮乌 川乌 川芎 山甲 木香 虎骨 自然铜 赤芍 紫荆皮各二钱 当归一钱五分 小茴 大茴 沉香 白术 桔梗 牛膝 乌药各一钱 枳壳八分 甘草 香附 降香节各五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】头颈从高坠下缩者。

36721 寻痛舒筋丸

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】五灵脂 两头尖各半两 草乌头 乳香 没药各三分

【用法】上为细末，葱汁为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后、临卧以温酒送下；盐汤亦可。

【主治】诸痹。

【宜忌】忌热物。

尽

36722 尽秽丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】大黄一钱 滑石一钱 厚朴一钱 地榆二钱 槟榔一钱

【用法】上药各为细末，用蜜煮老为丸，一次服尽。服后即用膳以压之，不使留于胃中，必得微利为度。

【主治】痢疾正气已复，邪气尚存，长年累月，里急后重，乍作乍止，无有休歇。

良

36723 良宫除害丹

【方源】《白喉全生集》。

【组成】真珍珠三钱(放水豆腐上蒸三尺香久) 地虱婆(放银锅内微火焙焦)二厘 真玛瑙 三钱(入砂坛内火煅七尺香久) 手指甲(瓦焙焦)五分 真珊瑚三钱(入砂坛内火煅七尺香久) 马勃三厘 真琥珀三钱 蚯蚓(瓦焙枯)六分 真辰砂三钱(水飞) 蚕茧七只(烧灰存性) 真麝香五分 大梅片六分

【用法】上为极细末，过绢筛，再碾精细，瓷瓶收贮，蜡封固瓶口，勿使泄气。辨寒热症临时对用。

【主治】一切白喉证。

阮

36724 阮氏桃花汤

【方源】《外台》卷二引《崔氏方》。

【组成】赤石脂八两 粳米一升 干姜四两(切)

【用法】以水一斗,煮米熟汤成,去滓,每服一升,不愈复作。

【主治】伤寒后,赤白滞下无数。

【加减】冷多白滞者,赤石脂、干姜各加四两。

阵

36725 阵王丹

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】大黄一两 石灰六两

【用法】同炒灰紫色为度,去火毒,筛过。敷伤处。

【主治】折伤。

阳

36726 阳丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连 黄柏各一两 大黄 麻黄 川芎 白芷 黄芩 防风 龙胆草各五钱 细辛 千里光 脑荷 当归 连翘 羌活 荆芥 木贼各一钱半 梔子 白菊花 生地 黄 赤芍药 苦参各三钱 苍术(一方有鸡柏树根不拘多少)

上药以井水洗净,锉碎,以井水浸于铜器内,春三、夏二、秋四、冬五日,晒,常将手揉出药味,晒出药力,熟绢滤净,留清汁一碗以飞药,留浊汁三碗以淬药,却用熔铜锅子一个,装打碎甘石一斤在内,新瓦盖上,松炭固济,烧令透极红色钳出,少时淬入药汁内煅淬三次,就将留下清汁飞细,令干万余下,澄清去浊,晒干,再碾令无声为度,细绢重罗过,瓷器收贮听用。

炉甘石一钱 麝香三厘 片脑一分

【用法】上为细末,次入片脑碾嫩,熟绢罗过,磁器收贮。点眼;如有翳膜,配合阴丹、一九、二八、三七、四六等丹。

【主治】诸般外障,赤脉贯睛,怕日羞明,沙涩难开,胞弦赤烂,星翳覆瞳。

36727 阳乌膏

【理源】。为原书“散阴膏”之异名。见该条。

36728 阳旦汤

【金匱】卷下。为《伤寒论》“桂枝汤”之异名。见该条。

36729 阳旦汤

【方源】《外台》卷二引《古今录验》。

【异名】阳旦散(《普济方》卷一三一)。

【组成】大枣十二枚(擘) 桂枝三两 芍药三两 生姜三两 甘草三两(炙) 黄芩二两

【用法】上咬咀。以泉水六升,煮取四升,分四服,每日三次。

【主治】中风伤寒,脉浮,发热往来,汗出恶风,项颈强,鼻鸣干呕。

【宜忌】若脉浮紧,发热者,不可与也。忌海藻、菘菜、生葱等物。

【加减】渴者,去桂,加栝楼三两;利者,去芍药、桂,加干姜三两、附子一枚(炮);心下悸者,去芍药,加茯苓四两;虚劳里急者,加胶饴半升。

36730 阳旦汤

【普济方】卷一四七。即原书同卷引《鲍氏方》“桂枝汤”加黄芩。见该条。

36731 阳旦散

【普济方】卷一三一。为《外台》卷二引《古今录验》“阳旦汤”之异名。见该条。

36732 阳和丸

【方源】《外科全生集》。

【组成】肉桂一两 麻黄五钱 炮姜炭五钱

【用法】上为细末,酒、水为丸服。

【功用】温散。

【主治】阴疽恶核,风寒头痛。

①《外科全生集》:恶核。②《青囊秘传》:风

寒入络头痛。③《全国中药成药处方集》(南京方):阴疽漫肿平塌,皮色如常,久不溃散。

36733 阳和丸

《中药制剂手册》。即《外科全生集》“阳和汤”改为丸剂。见该条。

36734 阳和丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】肉桂四钱 白芥子一两 附子四钱 麻黄二钱 干姜四钱

【用法】每服一至二丸,每日二次,温开水或温黄酒送下。

【功用】温经回阳,活血通络,散寒燥湿。

【主治】淋巴腺结核。

36735 阳和汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】熟地一两 肉桂一钱(去皮,研粉) 麻黄五分 鹿角胶三钱 白芥子二钱 姜炭五分 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】《方剂学》:温阳补血,散寒通滞。

【主治】①《外科全生集》:鹤膝风、贴骨疽,及一切阴疽。②《方剂学》:阴疽属子阳虚寒凝证。贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等。患处漫肿无头,痠痛无热,皮色不变,口中不渴,舌苔淡白,脉沉细等。

【宜忌】①《马评外科全生集》:乳岩万不可用,阴虚有热及破溃日久者,不可沾唇。②《中国医学大辞典》:半阴半阳之证忌用。

【加减】如治乳癖、乳岩、加土贝五钱。

【方论选录】①《成方便读》:以熟地大补阴血之药为君;恐草木无情,力难充足,又以鹿角胶有形精血之属以赞助之;但既虚且寒,又非平补之性可收速效,再以炮姜之温中散寒、能入血分者引领熟地、鹿胶直入其地,以成其功;白芥子能去皮里膜外之痰;桂枝入营,麻黄达卫,共成解散之勋,以宣熟地、鹿角胶之滞;甘草不特协和诸药,且赖其为九土之精英,百毒遇土则化耳。②《中国医学大辞典》:此方用熟地、姜、桂、鹿角

以为温补之品,用麻黄以开腠理,用白芥子以消皮里膜外之痰;且熟地得麻黄则补血不腻膈,麻黄得熟地则通络而不发表,用治诸疽白陷,如日光一照,使寒凝悉解,故有阳和之名。③《方剂学》:方中重用熟地温补营血为主;鹿角胶性温,为血肉有情之品,生精补髓,养血助阳,强壮筋骨为辅;姜炭、肉桂破阴和阳,温经通脉;麻黄、白芥子通阳散滞而消痰结,合用能使血气宣通,且又使熟地、鹿角胶补而不腻,于是补养之用,寓有温通之火,均为佐药;甘草生用者,解脓毒而调诸药。

【临证举例】①脑疽 《经方实验录》:友人周慕莲君患脑疽初起,察其属阴性,法当与阳和汤,顾大便五日未行,疑其有热结,为之躊躇者再,谁知服汤后,次早项背转动便易,大便畅下,乃悟其大便之闭,亦属寒性故也。②骨与关节结核 《中医杂志》(1958; 11: 731):用本方汤剂或丸剂配合外治法,治疗74例骨与关节结核,结果有效率达81%。作者认为该疗法有良好的止痛,消肿作用,能促进溃疡及瘻管愈合,改善全身症状。且该法不用石膏固定,患肢可较早活动,避免关节强直,防止部分并发症的发生。《中华外科杂志》(1959; 5: 458):本方配合犀黄丸内外同治,治疗骨结核60例,阳虚者肉桂、炮姜可增加1~2倍,或加附子;疗程5个月左右。结果: X线证实骨质完全愈合、临床症状消炎者19例;骨质破坏停止,部分吸收好转,临床症状减轻者8例;临床症状减轻,但未经X线复查者33例。患者服药1月后,体重增加,精神好转,疼痛消失,食欲增加。有寒性脓肿者,服药后脓肿停止发展或缩小;有窦道者,创口分泌物于30~40天左右明显减少;血沉逐渐恢复正常。③骨瘤 《贵阳医学院学报》(1983; 4: 32):肖某某,男,十七岁,未婚,石阡县龙洞公社人。一九八〇年十月就诊。数月前左颈部长包块一个约鸡蛋大,不痛,推之不移,压之不痛,而色

无华,精神萎顿,形寒肢冷,舌质胖嫩,脉象沉细无力,诊为骨瘤,证属正气虚衰,阴寒凝滞,宜用温阳散寒、扶正通瘀法治疗。以阳和汤加附片10克,每日一剂,水煎,服3次。连服50余剂后,包块全消,诸症皆愈,仅患处皮肤留有较深色素。④乳核 《岳美中医话集》:姚某某,女性,十八岁,未婚。初时乳部长一硬疙瘩,继之渐次增大,疼痛异常,求诊于余。检视乳房并无破溃,脉缓,舌淡,属乳核阴症,为拟阳和汤全方加贝母四钱,四剂而愈。⑤乳腺小叶增生症 《新医学杂志》(1973; 11: 23):本证中医称“乳癖”。用本方加香附、青陈皮、郁金、治疗属虚寒型者10例。服药6~8剂后,肿块及症状逐渐消失,随访1年以上未见复发。⑥坐骨神经炎 《湖南医药杂志》(1974; 4: 47):本方加味治疗30例,结果:临床治愈(疼痛消失,行走自如)25例,好转(尚有轻微疼痛)4例,无效1例。有效病例疗程一般为10~20天,一般服药1~2剂后自觉发热汗出,疼痛即有缓解,服药5~8剂后,疼痛明显减轻。对子病程短而疼痛剧烈者,疗效高,疗程也短;反之则疗程较长而疗效亦差。服药期间未见不良反应。

【现代研究】对结核菌的抑制作用 《中成药研究》(1981; 11: 41); 据对5例顽固性结核病例的痰培养进行抑菌试验,证实本方确有抑制结核菌作用。但方中七种药物单用则无作用或作用不明显。

【备考】本方改为丸剂,名“阳和丸”(见《中药制剂手册》)。

36736 阳和膏

《经验方》卷上,为《外科全生集》“阳和解凝膏”之异名。见该条。

36737 阳和膏

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】官桂一两 甘松一两 山柰一两 丁香五钱 乳香五钱 没药五钱 上玉桂五钱 牛蒡子五钱

【用法】上药内乳香须熬烊去油,余皆晒干生研,各为极细末,用沪上姜衍泽堂太乙膏药肉烘烊,将药末拌匀摊膏,其摊膏纸用棉料油纸并白纸裱糊双层,大者用红布摊之。凡疮初起未成时贴之皆可消散,但须连四围根脚贴进,不可但贴头上,反致不效;即已溃之疽贴此膏亦可收束,不致蔓延;方内玉桂、官桂并用者,因玉桂价昂,故兼用之,非重味也。

【主治】痈疽、发背、流痰,一切无名肿毒,及风热肿胀。

36738 阳和膏

【方源】《药奁启秘》。

【组成】鲜紫苏 鲜牛蒡 鲜草麻 鲜薄荷 鲜苍耳(俱连根叶)各八两 鲜白凤仙(连根叶)四两 青葱(连根)八两

以上七味,洗净阴干,用麻油十斤浸七日,煎枯去滓,待冷,再入后药:

荆芥 防风 水红花子 川附子 广木香 当归 川乌 草乌 青皮 天麻 穿山甲 连翘 僵蚕 陈皮 芥子 蒲公英 天南星 官桂 桂枝 白芷 乌药 生半夏 青木香 大黄 白藜 赤芍 川芎各一两

以上入前油浸三日,煎枯去滓,滤净,每净油一斤,入炒桃仁七两,文火收膏,于微温时加入下列细料:

上肉桂二两 乳没各一两 丁香油四两 苏合油四两 檀香 琥珀各二两 当门子三钱

【用法】上为极细末,缓缓搅入,和透,置磁器内。隔水炖烊,摊贴。

【主治】痰核、痰毒、瘰癧、乳疽、阴毒、流注,及一切疮疡之色不变者。

36739 阳毒汤

《千金》卷九。为方出《肘后方》卷二、名见《千金》卷九“升麻汤”之异名。见该条。

36740 阳春酒

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】人参(切片) 白术 熟地各五钱 当归身(切片) 天门冬 枸杞各三钱 柏

子仁 远志各二钱五分

【用法】上药用绢袋宽贮，以无灰好酒五斤瓷罐内浸至一伏时。每早、午、晚各饮一杯热服；如夏月天炎易坏，不堪久服，将药分作五份，每次用酒一斤随便浸服亦效；如酒将完，药尚有味，再添酒浸；饮之一次以后，药淡无味，不必再浸用之。

【功用】生长肌肉，强健脾胃，美悦颜色，滋润皮肤，却病延寿。

【主治】脑疽、诸发已溃，流脓尽时，脾胃虚弱，肌肉生迟；或气血原不足，以致肉色淡白，不能生长收敛。

36741 阳消膏

【经验方】卷上。为《鸡鸣录》卷上“阳毒内消膏”之异名。见该条。

36742 阳消散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】乳没各五分 白芷五分 僵蚕五分 方八一钱 青黛五分 冰片二分 银朱二分 大黄一钱

【用法】上为极细末。掺膏药内贴。

【主治】一切痈疽，红肿焮痛。

36743 阳粉散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】麻黄(连节) 藁本 白芷各半两 米粉四两

【用法】上为末。扑之。

【功用】止汗。

【主治】病当发汗，汗不止而致亡阳。

36744 阳液方

【方源】《普济方》卷二二六。

【组成】黄米二升(醋煮粥) 曲细末三升 糯米二升(醋煮粥)

【用法】上量寒温，和器内，停候发过沉澄之时，又入饴稀六斤，等候去糟粕讫，自然上清下澄以成汤液，昼夜十二时辰，停分三度，一度一服，俟药气下沉后，停待一时，温服汤液一盏液后，又停一时，更吃白饴数块，日夜长短品三服，饮液食饴均九度，饮食汤

液造作，如前烹食药相应。

【功用】颐生养气，实腹虚心。

【主治】诸虚百损，气血劳伤，因病久深，变生膈气，胁肋刺痛，噎痞心胸，食结不消，哕逆呕水，翻胃吐食，大便便秘，形体瘦枯，以致难救者。

36745 阳痈散

【直指小儿】卷二。为《卫生总微》卷五“朱砂散”之异名。见该条。

36746 阳燧錠

【金鉴】卷六十一。为《外科大成》卷一“阳燧錠子”之异名。见该条。

36747 阳七贤散

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】黑铅七钱 汞一两 土硫二钱

【用法】先将黑铅化开，入汞，冷定，研细，同土硫末入锅内慢炒作青筋头色，硫不必多加；外用明矾一两，火消九钱，皂矾八分，食盐七钱，共研，入锅炒干，带红色，取起，同上药共研，带青色，入罐，如法封固，打火三文一武，武火擦盏，四炷香，冷定取出；靠盏药如鹤顶色。或入生药研末炒干，又合研，入罐，照前升打火候，更妙。内症可服，每服一二分；外毒腐肉可敷，每用一厘许。

【主治】阳毒不痛者。

36748 阳八味汤

【医门补要】卷中。即《金匱》卷下“肾气丸”改为汤剂。见该条。

36749 阳起石丸

【方源】《普济方》卷二二四引《孟氏说洗方》。

【组成】远志(洗，取肉)半两 阳起石(煨) 沉香(不见火) 北五味 嫩鹿茸 酸枣仁(出皮) 桑螵蛸(微炒) 白龙骨 白茯苓 钟乳粉各一两 天雄一两(姜汁制，去脐) 菟丝子二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸至五十丸，炒茴香、白茯苓煎汤吞下。

【功用】助阴壮阳。

【主治】丈夫阴阳衰微，阳事不举，才交即泄，寒精自流，胸中短气，阴汗盗汗，冷痛或痒而生疮，出黄浓水。

【加减】若强壮人服，觉火热，去天雄，加肉苁蓉。

36750 阳起石丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】阳起石一两（酒煮半日） 白矾灰一两 钟乳粉一两 硫黄一两 龙脑一两 伏火硃砂一两 伏火砒霜半两

【用法】上为末，用软粳米饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下，每日二次。

【主治】肾脏虚损，阳气萎弱。

36751 阳起石丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】阳起石一两 硫黄一两（与水银结为砂子） 水银一两 黄丹一两

【用法】上为细末，固济瓷瓶子盐柜中，以文火养三日后，以五斤火煨之，候冷，取出火毒，细研，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】风痛有积痰在胸膈不散，发时心躁，恶叫迷闷，吐沫痲疯。

36752 阳起石丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】阳起石一两（酒煮半日，细研，水飞过） 乌犀角屑三分 防风三分（去芦头） 羚羊角屑三分 石决明一两（捣，细研，水飞过） 麦门冬一两（去心，焙） 虎睛一对（酒浸一宿，微炙） 真珠末 甘菊花 川升麻 空青（细研） 藏蕤 细辛 车前子 蔓荆子 人参（去芦头） 芍药 赤芍药 青箱子 槐子（微炒） 蕤仁（汤浸，去赤皮） 黄芩 前胡（去芦头） 决明子 汉防己 黄连（去须） 羌藟子 枳实（麸炒微黄） 川大黄（锉碎，微炒） 甘草（炙微赤，锉） 各半两

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，

如梧桐子大。每服三十丸，食后以麦门冬汤送下。

【主治】肝肾久虚，眼目昏暗，渐成内障。

36753 阳起石丸

【方源】《局方》卷九。

【组成】阳起石（酒浸半日，细研）二两 吴茱萸（汤洗七遍，焙，微炒）三分 熟地黄一两 牛膝（去苗，酒浸，焙） 干姜（炮） 白术各三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心食前温酒或温米饮任下，每日二次。若觉有妊，即住服。

【功用】益子宫，消积冷。

【主治】妇人子宫虚冷，劳伤过度，风寒搏结，久不受胎，遂致绝子不产。

36754 阳起石丸

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】阳起石 太阴玄精石 消石 附子（炮裂，去皮脐）各等分

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五丸至十丸，新汲水送下。汗出解。

【主治】伤寒四逆。

36755 阳起石丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】阳起石（飞过）一两 远志（去心） 山芋 巴戟天（去心） 附子（炮裂，去皮脐）各二两 龙骨（研）一两 肉苁蓉（酒浸，切，焙）四两 蛇床子三两 牛膝（酒浸，切，焙） 杜仲（去粗皮，炙） 赤石脂 牡蛎（煨）各二两 石斛（去根） 黄耆（锉） 续断 五味子 菟丝子（酒浸，别捣） 地骨皮 五加皮（锉） 萆薢 卷柏 各二两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前以温酒送下。

【主治】肾劳虚损，腰脚酸疼，少腹急痛，小便滑数，面色黧黑。

36756 阳起石丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】阳起石(煨,研)一两 白芷(末) 黄蜡各半两 生砒(研)一分

【用法】将三味为细末,以黄蜡为丸,如梧桐子大。每服三丸,空心冷盐汤或冷酒任下;微温亦可。

【主治】下元虚惫,耳焦面黑,遗泄白淫,手足冷,肌瘦。

【宜忌】服药后,忌热食少时。

36757 阳起石丸

《圣济总录》卷一八七。为《圣惠》卷二十六“白石英丸”之异名。见该条。

36758 阳起石丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】阳起石(煨) 韭子(炒) 肉苁蓉(酒蒸) 青盐(别研) 鹿茸(酒蒸) 钟乳粉 菟丝子(水淘净,酒蒸,焙,别研) 沉香(别研,不见火) 原蚕蛾(酒浸) 山茱萸(取肉) 各半两 桑螵蛸(酒浸) 山药(锉,炒) 各半两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤任下。

【主治】肾脏虚损,阳气全乏。

36759 阳起石丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】阳起石(火煨红,别研令极细)二两 鹿茸(去毛,醋炙)一两

【用法】上为细末,醋煎艾汁打糯米糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,食前、空心米饮送下。

【主治】冲任不交,虚寒之极,崩中不止,变生他证。

36760 阳起石丸

【方源】《济生》卷七。

【组成】阳起石(火煨红,研极细) 鹿茸(酒蒸,焙) 韭子(炒) 菟丝子(水淘净,酒浸,蒸,焙,别研细末) 天雄(炮,去皮) 肉苁蓉(酒浸) 各一两 覆盆子(酒浸) 石斛(去根) 桑寄生 沉香(别

研) 原蚕蛾(酒炙) 五味子各半两

【用法】上为细末,酒煮糯米糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤、盐酒任下。

【主治】丈夫真精气不浓,不能施化而无子。

36761 阳起石丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】阳起石(煨) 钟乳粉各等分

【用法】酒煮附子末、面糊为丸。每服五十丸,空心米饮送下。以愈为度。

【主治】元气虚寒,精滑不禁,大腑溏泄,手足厥冷。

36762 阳起石汤

【方源】《千金》卷四。

【组成】阳起石 甘草 续断 干姜 人参 桂心各二两 附子一两 赤石脂三两 伏龙肝五两 生地黄一升

【用法】以水一斗,煮取三升二合,分四服,日三夜一。

【主治】妇人月水不调,或前或后,或多或少,乍赤乍白。

【方论选录】《千金方衍义》:于四逆汤中加阳起、人参,则有阳生阴长之功,散子脏之血积;伏龙、石脂专行固脱;地黄、续断专续伤中;桂心佐姜、附,则破寒结,兼行地黄之滞也。

【备考】本方改为散剂,名“阳起石散”(见《圣惠》卷七十二)。

36763 阳起石汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】阳起石二两(别捣) 白茯苓(去黑皮) 人参 甘草(炙,锉) 赤石脂 龙骨各三两 伏龙肝五两 生地黄(细切,焙)一升 附子(炮裂,去皮脐)一两 续断三两

【用法】上咬咀。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,早晨、日午、晚后各一次。

【主治】妇人血海冷败,脱血带下,诸虚冷

疾。

36764 阳起石散

《圣惠》卷七十二。即《千金》卷四“阳起石汤”改为散剂。见该条。

36765 阳起石散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】阳起石(烧)

【用法】上为末。新水调，涂肿处。背疮初发，便可用藏用丸、玉烛散大作剂料，下脏腑一二十行，以铍针于肿焮处乱刺出血，如此者三，后以阳起石散敷之。

【主治】①《儒门事亲》：背疮初发。②《普济方》：刀箭所伤。

36766 阳铁箍散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】细辛半斤 川乌半斤 草乌半斤 官桂半斤 白芥子四两 川椒三两 降香末一升 陈小粉(炒黑，研)十斤 生半夏四两 生南星四两

【用法】用葱头汁调，敷四围。

【主治】疗毒阴证。

36767 阳铁箍散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】降香末(炒)半斤 大黄三斤 炙乳没各四两 赤小豆三升 黄芩八两 方八一斤 生南星四两 山慈姑四两 陈小粉十斤

【用法】上为细末。用醋调敷。

【主治】痈疽阳症。

36768 阳燧錠子

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】阳燧錠(《金鉴》卷六十一)。

【组成】蟾酥 朱砂 川乌 草乌各五分 直僵蚕一条

【用法】上药各为末，和匀，用石硫黄一两五钱，置碗内微火炖化，入前蟾酥等末搅匀，离火，再入当门子麝香二分、冰片一分搅匀，即倾入湿瓷盘内，速盪转成片，俟冷，取收瓷罐内。用时取甜瓜子大一块，要上尖下平，先用红枣肉擦灸处，粘药于上，用油灯草火

点之，灸五壮或七壮、九壮毕，即饮米醋半酒钟，随用小膏药贴之，出黄水些须，其毒即消。如风气痛者，用箸子于骨缝管中揪之酸痛处，于墨记灸之；如腿痛膝痛，放鬼眼穴灸之；再肩担成疮，于肿处各灸一壮。

【主治】痈疽发背，一切诸毒，瘰癧，便毒，蛇引疔，痞块，及风湿气疼痛。

36769 阳明二妙丸

《症因脉治》卷三。为《医学纲目》卷二十引丹溪方“二妙方”之异名。见该条。

36770 阳和二陈汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】半夏三钱(九制) 广橘红三分 白芥子二钱 茯苓二钱 甘草一钱(生) 上鬚桂一钱 炮姜五分 净麻黄三分

【用法】水煎服。

【主治】湿痰流注，耳后阴疽，骨槽风，乳疽，及少腹缓疽。

【加减】骨槽风，去白芥子，加僵蚕。

36771 阳和化坚汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】鹿角胶五钱 炒僵蚕二钱 白芥子二钱 甘草一钱(生) 上鬚桂一钱 炮姜五分 麻黄三分

【用法】酒、水煎服。

【主治】骨槽风。

36772 阳和化癌汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】鹿角胶五钱 土贝三钱 白芥子二钱 甘草一钱 上鬚桂一钱 炮姜炭五分 麻黄三钱 胡桃肉三个

【用法】酒、水煎服。

【主治】妇人乳癌。

【备考】乳癌破则不治。

36773 阳和生化汤

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】当归五钱 炙草五分 炮姜四分 川芎二钱 丹参一钱五分 桃仁九粒(去皮尖)

【用法】煎好，加花酒、童便各半小杯冲服，

一产下即服之，留滓再煎再服。

【主治】产后恶露不行，儿枕作痛，一切血晕，及小产。

【备考】切勿加减。

36774 阳和至宝膏

【方源】《千金珍秘方选》。

【异名】痰块膏。

【组成】鲜紫苏八两 鲜牛蒡八两 鲜白凤仙四两 连根青葱八两 鲜草薢八两 鲜薄荷八两 鲜苍耳草八两

以上七味，取叶、梗、根全草，用麻油十斤浸十日，煎枯去滓待冷，四天后再加

青防风 荆芥 水红花子 木香 川附子 当归 天麻 穿山甲 陈皮 白芷 川芎 连翘 白芥子 官桂 乌药 草乌 僵蚕 天南星 桂枝 大黄 白蔹 赤芍 生半夏 青皮 蒲公英 青木香各一两

熬枯去滓，熬至滴水成珠，入陶丹七两，文火收膏，渐温，入后药：

制肉桂三两 炙乳没各一两 琥珀二两 芸香二两 丁香油四两 苏合油四两 当门子三两

【用法】上为细末，入膏搅匀，瓷罐收贮。用时隔水炖化，摊用。修合时宜于夏末，膏必须熬老；如太老，加苏合油不拘多少。

【主治】痰毒痰核，瘰癧乳疔，阴毒流注，以及外证之色不红者、皮肉所结之痰块。

36775 阳和启脾膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参 白术 黄耆 鹿角 当归 香附 白芍 川芎 独活 附子 干姜 阿魏 橘皮 三棱 川椒 草果仁各一两

用麻油三斤将前药炸枯，去滓，熬至滴水成珠，入飞净黄丹一斤二两，再入后药面：

肉桂 沉香 丁香各三钱

【用法】上为细末，候油稍冷，加入搅匀成粒，每粒约重四五两，候去火气三日后方可摊贴，先摊十张，其余成粒装瓷罐盛之。贴于肚腹或脐部。

【功用】温阳散寒，养血活血，通经络。

【主治】脾虚日久及肾。

36776 阳和救急汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】大熟地一两 鹿角胶三钱 白芥子二钱 上猯桂二钱 附子一二钱 炮姜一二钱 人参三五钱 当归三钱

【用法】水煎服。

【主治】阴疽发背已溃，赋禀虚弱，或误服凉剂，传变倒陷，不化脓腐，垂危等证。

【加减】便溏，去当归，加冬术；便溏泄，加北五味二十粒。

36777 阳和救绝汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】人参三钱 白术三钱 茯苓三钱 制半夏三钱 广橘红三分 僵蚕二钱（炒）甘草一钱（生） 上猯桂一钱 炮姜五分 净麻黄三分

【用法】水煎服。

【主治】骨槽风误服凉剂，致肌肉坚凝腐臭者。

36778 阳和犀角丸

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】桂心 麻黄 炭姜 犀角 乳没 麝香

【用法】上为末，黄米饭捣为丸。每服三钱。

【主治】肝胆经气郁痰结，毒根深固，不易消溃之瘰癧。

36779 阳和解凝膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】阳和膏（《经验方》卷上）。

【组成】鲜大力子（根叶梗）三斤 活白凤仙（梗）四两

上二味，入香油十斤煎枯去滓，次日入下药：

川附 桂枝 大黄 当归 肉桂 官桂 草乌 川乌 地龙 僵蚕 赤芍 白芷 白蔹 白及各二两 川芎四两 续断 防风 荆芥 五灵脂 木香 香橼 陈皮各一两

再煎，药枯沥滓，隔宿油冷，见过斤两。每油一斤，加炒透黄丹七两搅和，文火漫熬，熬至滴水成珠，不粘指为度，即以湿粗纸罨火，以油锅移放冷灶上。

乳香 没药(末)各二两 苏合油四两 麝香一两

【用法】上为细末，入膏搅和，半月后摊贴。疔疾贴背心。

【功用】①《北京市中药成方选集》：散凝化结。②《中国药典》：温阳化湿，消肿散结。

【主治】阴疽溃烂，瘰癧结核，冻疮乳疮，寒湿痹痛，及疔疾。

①《外科全生集》：一应烂溃阴疽，冻疮，疔疾。②《北京市中药成方选集》：一切阴疽乳疮，瘰癧结核，及溃后流水，久不收敛。③《中国药典》：寒湿痹痛。

36780 阳毒内消散

《徐评外科正宗》卷二。为《鸡鸣录》卷上“阳毒内消膏”之异名。见该条。

36781 阳毒内消膏

【方源】《鸡鸣录》卷上。

【异名】阳毒内消散(《徐评外科正宗》卷二)、阳消药(《经验方》卷上)。

【组成】白及 姜黄 铜绿 南星 甲片(土炒) 樟脑各四钱 轻粉 胆矾各三钱 青黛(漂) 梅片 当门子各二钱

【用法】上药各为细末，再研匀，瓷瓶密收，勿使泄气。照所患脚地大小，掺膏药贴之，数日即消。

【主治】阳分痈瘍，及肿毒初起。

36782 阳毒升麻汤

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】升麻汤(《圣济总录》卷二十七)。

【组成】升麻二分 犀角屑一分 射干一分 黄芩一分 人参一分 甘草一分

【用法】上锉，如麻豆大。以水三升，煎取一升半，去滓，饮一汤盏，食顷再服，温覆。手足出汗，汗出则解，不解重作。

【主治】①《活人书》：伤寒一二日，或服

药吐下之后变成阳毒，腰背痛，烦闷不安，面赤狂言，或走，或见鬼，或下利，脉浮大数，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，下脓血。②《景岳全书》：阳毒吐脓血。

【方论选录】《医方考》：吐下后中气必虚，故用人参、甘草以补中；升麻、犀角寒而不滞，故为散斑之要药；佐以麝香，利气窍也；佐以黄芩，清阳毒也。

【备考】本方方名，《普济方》引作“升麻散”。

36783 阳毒升麻汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】升麻一分 犀角屑 射干 人参 甘草各一分

【用法】水一盞半，葱白三茎，煎至八分，去滓温服。

【主治】阳毒，赤斑，狂言，吐脓血。

36784 阳毒梔子汤

《准绳·伤寒》卷三。为《活人书》卷十六“梔子仁汤”之异名。见该条。

36785 阳春白雪膏

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】白茯苓(去皮) 怀山药 芡实仁 莲肉(去心皮)各四两(共为细末) 陈仓米半升 糯米半升 白砂糖一斤半

【用法】上先将药、米二味用麻布袋盛放甑内，蒸极熟取出，放簸箕内，却入白沙糖同搅极匀，揉作一块，用小木印印作饼子，晒干收贮。男妇小儿，任意取食。

【功用】养元气，健脾胃，生肌肉，润肌肤，益血秘精，安神定志，壮筋力，养精神，进饮食。

【主治】虚劳瘦怯，泄泻腹胀，肿满喘嗽。

36786 阳炼秋石丹

《东医宝鉴·杂病篇》卷四。即《得效》卷八“元阳秋石丹”之阳炼法。见该条。

36787 阳起圣灵丹

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】当归 枳壳 川芎各四钱 虎骨(酥炙) 牛膝 木瓜 生地 桑寄生 补骨

脂 天花粉 乌药 麻黄 陈皮 山药 苍术 自然铜各二钱 赤芍 僵蚕 白芷 桔梗 黄芩 红花 黄耆 甘草 阳起石 龙泉香各三钱 防风 荆芥 连翘 风藤各一两

【用法】上为末，用不见水鹅掌二只，酒煮焙干；又用狗蹄四只烧灰，用鹅血煮酒各半碗，不见水狗血一碗，加面少许为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，用葱酒送下，早晚服。

【主治】痛风不举伏床者。

36788 阳病开关散

【方源】《永类铃方》卷六。

【组成】北柴胡(去芦) 桔梗(炒) 秦艽 麦门冬(去心)各半两 芍药 木香 泽泻各一两 木通半两 甘草一钱(炙) 当归 桑白皮(蜜炙) 真地骨皮各一两

【用法】上咀咀。每服三钱，水一大盏，加生姜二片，煎六分，空心服。小便多，疾病去也。

【主治】骨蒸劳瘵阳病，手足烦疼，口干舌疮，小便黄赤，大便难；及热多，咽喉痛，涎唾黄粘，或兼一二虚证。

36789 阳崩胶艾汤

《女科百问》卷上。为《金匱》卷下“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

36790 阳病防风散

《普济方》卷三七六。为《卫生总微》卷五“朱砂散”之异名。见该条。

36791 阳痧救急膏

【方源】《理瀹》。

【组成】苍术三两 藿香 陈皮 枳壳 山楂(炒) 麦芽 神曲(炒) 黄芩(酒炒) 半夏各二两 厚朴 羌活 防风 荆芥 川芎 白芷 杏仁 香附 乌药 青皮 大腹皮 槟榔 草果 木瓜 郁金 细辛 香薷 白术 车前子 黄连(姜汁炒透) 大黄 猪苓 木通 泽泻 莱菔子各一两 紫苏子 柴胡(炒) 干葛 薄荷各七钱 吴

萸 川乌 甘草各五钱 滑石四两 生姜 薤白 葱白 大蒜头 菖蒲各二两 凤仙一株 白芥子 川椒 陈佛手干各一两

【用法】油丹熬，入雄黄、朱砂、砂仁、明矾、降香、木香、丁香、官桂各五钱。贴心脐。

【主治】感受风寒暑湿，饮食失常，霍乱吐泻。

36792 阳毒玄参升麻汤

《元戎》。为《活人书》卷十八“玄参升麻汤”之异名。见该条。

阴

36793 阴丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】炉甘石一两 铜青一钱九分 硃砂六分二厘半 没药二分 青盐三分七厘半 乳香三分七厘半 熊胆一分二厘半 密陀僧二分半

以上八味，用黄连五钱、龙胆草二钱半煎汁滤净，将前药和一处，入汁硃细嫩，晒干，再硃极细用之。

白丁香 海螵蛸 白矾(生) 轻粉各一分七厘半 硼砂二分半 雄黄 牙消 黄丹 血竭 朱砂各一分二厘半 铅白霜 粉霜 鹰条 胆矾各七厘半(一方有黄连六分二厘，胡连、脑、细辛、姜粉、草乌各一分二厘半；一方有石蟹、贝齿、玄明粉、真珠、琥珀各二分)

【用法】上药各为细末，依方称合，和匀，硃令无声至千万余下，瓷器收贮听用。如有翳膜，配合阳丹、一九、二八、三七、四六等丹点眼。

【主治】翳膜遮睛，血灌瞳仁，拳毛翳肉，烂弦风眼。

【备考】黄连、胡连、脑荷、细辛、姜粉、草乌等六味并无去翳之功，不用更妙，恐有碍眼作痛害眼之祸也。石蟹、贝齿、玄明粉、真珠、琥珀等五味或多或少，皆可增入，以

有磨翳消膜之功，不可或缺也。

36794 阴旦汤

【方源】《千金》卷九。

【组成】芍药 甘草各二两 干姜 黄芩各三两 桂心四两 大枣十五枚

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取五升，去滓，温服一升，日三夜再，覆令小汗。

【主治】①《千金》：伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦。②《张氏医通》：冬温，中寒夹食。

【方论选录】《张氏医通》：阴霾四塞，非平旦之气，无以开启阳和，桂枝汤原名阳旦，开启阳邪之药也，《千金》于中加入黄芩之苦寒性轻，以治冬温在表之邪热，加干姜之辛温散结，以治中土之停滞。

36795 阴华散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】净桶白垢（火煨）一钱 铜绿三分 冰片一分

【用法】上为末。敷之。

【主治】走马牙疳，腐烂几死。

36796 阴阳丸

《永类铃方》卷二十一。为《活幼口议》卷十九“青金丹”之异名。见该条。

36797 阴阳丸

《普济方》卷一六八。即《得效》卷三“破块丸”。见该条。

36798 阴阳丸

【方源】《良朋汇集》卷二引王永福方。

【组成】绿豆 胡椒各等分

【用法】上为末，为丸如梧桐子大。每服二十丸，白滚水送下。

【主治】九种心疼，胃痛。

36799 阴阳丹

《普济方》卷二二四。为原书同卷引《德生堂方》“还童丹”之异名。见该条。

36800 阴阳丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】阴丹五分 阳丹五分 硼砂五厘 白矾（生）一厘

【用法】点眼。

【主治】翳膜。

36801 阴阳水

《医方集解》。为《增补内经拾遗》卷三引《易简》“阴阳汤”之异名。见该条。

36802 阴阳水

《医林纂要》卷四。为《肘后方》卷四“生熟汤”之异名。见该条。

36803 阴阳汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《易简》。

【异名】阴阳水、生熟水（《医方集解》）

【组成】滚水半盏，冷水半盏。

【用法】和合服之。

【主治】霍乱腹痛甚。

【方论选录】①《增补内经拾遗》引《易简》：挥霍缭乱，此乃阳不升，阴不降，乖隔而成。方用阴阳汤，取其阳能升，阴能降之义也。慎勿以为寻常而忽之。②《医方集解》：药中治霍乱者最多。然有寒热二证，而本草主治，未尝分别言之。万一误用，立死不救。仓卒患此，脉候未审，切勿轻投偏热偏寒之剂，唯饮阴阳水为最稳。张子和曰：霍乱吐泻，乃风湿喝三气合邪也。湿土为风木所克，郁则生热，心火上炎，故吐，吐者喝也；脾湿下渗，故泻，泻者湿也；风急甚则转筋，转筋者，风也。又邪在上焦则吐，在下焦则泻，在中焦则吐泻交作。此中焦分理阴阳之药也，阴阳不和而交争，故上吐下泻而霍乱，饮此辄定者，分其阴阳，使和平也。

36804 阴阳汤

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】黄耆 白茯苓 白术 山楂肉 甘草 木通 砂仁 杏仁各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

36805 阴阳黄

《医便》卷三。为原书同卷“二黄散”之异名。见该条。

36806 阴阳散

《外科枢要》卷四。为《仙传外科集验方》“冲

和仙膏”之异名。见该条。

36807 阴阳散

【方源】《痘疹全书》卷下。

【异名】赴筵散（《医统》卷六十三）。

【组成】黄连二钱 干姜一钱

【用法】上药共炒，为末。用地鸡（即蛴螬虫）搯水洗净，次敷此药。

【主治】小儿赤口疮。

36808 阴阳散

【方源】《回春》卷二。

【组成】麻黄一两六钱 绿豆粉二钱 川芎 白芷 石膏 甘草 苏叶各一钱

【用法】上为细末。每服一钱，凉水调服，吃水二三次，待汗出来方止水。盖被出汗足，以身凉为度。

【主治】伤寒三五日，或近期，或初觉无汗。

【宜忌】二三日勿出门见风。食淡饭。

36809 阴阳散

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】黄连 干姜 生蒲黄各一钱

【用法】上为末。妇女阴火舌肿，敷之；木舌，先将生姜蘸硼砂擦之，后再敷之。

【主治】妇女阴火舌肿，木舌。

36810 阴红汤

【方源】《理伤续断方》。

【组成】鹿角胶 产妇油发（烧）各一钱 没药三钱

【用法】用酒一大盏煎服。

【主治】妇人伤损，瘀血不散，腹肚膨胀，大小便不通，上攻心腹，闷乱至死者。

36811 阴疔丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】鳖甲丸加芎 归 赤芍各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】夜疔及血虚。

36812 阴毒汤

《千金》卷九。为方出《肘后方》卷二，名见《千金》卷九“甘草汤”之异名。见该条。

36813 阴挺丹

【方源】《江苏省中药成药标准暂行规定汇编》。

【组成】黄柏（微炒）五两 雄黄二两五钱 五味子（炒）二两五钱 枯矾十两 龙骨（煅）十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，呈卵圆形，每丸重一钱五分，用丝棉包好，丝线扎紧，留一长些绳头，再用蜡纸包严，置室内阴凉干燥处。每用一丸，纳入阴道，绳头留在口外，三日一次，八丸为一疗程。

【功用】收敛固湿。

【主治】子宫下垂。

36814 阴疮膏

【方源】《千金》卷三。

【组成】米粉一酒杯 芍药 黄芩 牡蛎 附子 白芷各十八铢

【用法】上咬咀，以不中水猪膏一斤煎之，于微火上三下三上，候白芷黄膏成，绞去滓，内白粉和令相得。敷疮上。

【主治】男女阴疮及口疮。

【方论选录】《千金方衍义》：膏中芍药和血痹寒热，黄芩主恶疮疽蚀，牡蛎治赤白带下，附子破癥坚积聚，白芷疗阴肿寒热，煎用猪脂滋血解毒，和米粉止痛生肌，专借附子透入阴经也。

36815 阴痢方

【方源】《三因》卷十八。

【异名】阴痢散（《直指小儿》卷二）、阴痢附子散（《普济方》卷三七六）。

【组成】黑附子（生，去皮脐） 生天南星 半夏各二钱 白附子一钱半

【用法】上为细末，井花水浸七日，每日换水，浸讫控干，入朱砂二钱，麝香一钱拌匀。每服一字，薄荷汤调下。

【功用】《直指小儿》：祛风豁痰，回阳正胃。

【主治】①《三因》：小儿发痢阴证。因吐泻或只吐不泻，日渐困，面色白，脾虚；或冷而发惊，不甚搐搦，微微目上视，手足微动者。②《普济方》：唇青面黑，四肢逆冷。

36816 阴痢散

《直指小儿》卷二。为《三因》卷十八“阴痢方”之异名。见该条。

36817 阴湿汤

【方源】《普济方》卷八十八引《余居士选奇方》。

【组成】白术 白茯苓 苍术(米泔浸) 藿香叶(去土) 甘草(炙) 橘红 厚朴(制) 半夏各一两 附子六钱(炮) 生姜二两

【用法】上以厚朴、半夏、生姜一处捣作饼子，焙干，同众药为粗末。每服三钱，水二盏，加生姜十片，煎至一盏，不拘时候。

【主治】一切中风自汗，渐渐恶风，翁翁发热，呼吸少气，风湿风温，表实里虚，或表虚里实，腠理开疏，气道壅塞，虚汗盗汗，目黄身肿，小便不利，胸膈痞满，腰疼体痛，呕吐涎沫。

36818 阴鹭丸

《医学入门》卷七引周益公方。为《本草纲目》卷十一引《张三丰仙传方》“伐木丸”之异名。见该条。

36819 阴六贤散

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】黑铅七钱 汞一两

【用法】上先将黑铅化开，入汞，冷定，为细末，入锅内慢炒作青筋头色，外用明矾一两，火消九钱、皂矾八分、食盐七钱共研，入锅炒干，带红色，取起，同上药共研带青色，入罐，如法封固，打火三文一武，武火擦盛，四炷香，冷定取出，靠盛药如鹤顶色，或入生药研末炒干，又合研，入罐，照前升打火候，更妙。内症可服，每服一二分；外毒腐肉可敷，每用一厘许。

【主治】阴毒不痛者。

36820 阴铁箍散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》

【组成】降香末半升 大黄三斤 乳香四两 赤小豆三升 没药四两 黄芩八两 方八一斤 生南星四两 山慈菇四两 陈小粉

(炒黑，研) 十斤

【用法】用膏醋调敷四围。

【主治】痈疽阳证。

36821 阴分生阳汤

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】白术七分 白芍(煨，锉，或酒浸，姜汁浸) 六分 当归一钱 甘草二分 苍术五分 陈皮八分

【主治】①《丹溪心法附余》：阴虚内热。②《东医宝鉴·杂病篇》引《医学入门》：虚劳。

【加减】或加参、苓，或以山药代参、苓、姜、枣煎服，入蜜亦可；加肉果、破故纸亦可；冬日尤宜用故纸。

36822 阴伏紫灵丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硫黄四两(研) 盐花一升

【用法】上先布盐花半升于平底铛中，次铺硫黄末，又以余盐盖之，湿纸固缝，长令如鱼目沸，七日七夜，勿令绝火，水耗即添汤，时时开看，搅之勿令粘着铛底，日满泣干，入固济了瓷瓶内煨令通赤，候冷，以汤淋去盐味，取硫黄晒干，为细末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每日五丸，空心以茶、酒任下。

【主治】男子女人久积冷气，肠风痢疾，脐腹疼痛，颜色萎黄，不思饮食。

【备考】本方方名，《普济方》引作“阴伏紫霞丹”。

36823 阴伏紫霞丹

《普济方》卷二六五。即《圣惠》卷九十五“阴伏紫灵丹”。见该条。

36824 阴阳二气丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】天门冬(捣膏) 麦门冬(捣膏) 五味子(炒，研) 黄柏 人中白(小儿溺者，生用，研) 玄参(汤泡，去粗皮，捣膏) 各一两 青黛(色娇嫩者) 甘草 枯矾 辰砂(为衣) 泽泻各三钱 冰片一钱

【用法】上各为细末，同玄参、二冬膏子，加炼蜜少许为丸，如梧桐子大。每服六十丸，

空心用童便、乳汁各一钟送下，安睡一时。

【主治】脱疽。久服丹石补药，致亏肾水，孤阳独旺，口燥咽干，饮冰雪不知其冷。

36825 阴阳二气散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】出山黑铅一两。

【用法】入勺内火化 铅熔，入杏仁四十九粒炒焦，去杏仁，入硫黄些须于铅上，用槐枝搅之，候硫烟尽，又入硫些须，搅炒如前，以硫黄三两完为率；仍候硫烟尽，其铅成灰。每用铅灰二钱，配干姜末二钱，和匀，用黄酒一大壶，入大葱五七根，煮葱烂，取酒调药服之，再尽量饮之。盖暖出汗，一香尽，粉毒随汗出，其痛即止；如未痊愈，过三日再一服。

【主治】梅疮结毒，筋骨疼痛，夜重昼轻，喜热手揉捻者。

【宜忌】避风寒。

36826 阴阳二血丸

【方源】《本草纲目》卷五十一引《孙氏集效方》。

【组成】鹿血 兔血(各以青纸盛，置灰上，晒干) 乳香 没药各一两 雄黄 黄连各五钱 朱砂 麝香各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，空心以酒送下。

【主治】小儿痘疮。

36827 阴阳二炼丹

《本草纲目》卷五十二引《水云录》。为《得效》卷八“元阳秋石丹”之异名。见该条。

36828 阴阳至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【异名】阴阳至圣膏(《洞天奥旨》卷十五) 阴阳起死膏(《外科十三方考》)。

【组成】金银花一斤 生地八两 当归三两 川芎二两 牛膝一两 丹皮一两 麦冬三两 生甘草一两 荆芥一两 防风五钱 黄耆三两 茜草根五钱 玄参五两

用麻油五斤煎数沸，将药滓滤出，再熬

至滴水成珠，入下药：

广木香一两 黄丹二斤(炒飞过，去砂) 没药一两 乳香一两 血竭一两 象皮(为末)五钱 麝香一钱

【用法】上各为细末，入油中，少煎好，藏瓷罐内。发背疮必须用一两，其余疮口，量大小用之。

【主治】膏粱之客，失志之人，心肾不交，阴阳俱耗，又加忧愁抑郁，拂怒呼号，其气不散，结成阴症痼疽。

36829 阴阳至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】人参一两 冰片一钱 乳香(去油)三钱 透明血竭五钱 三七末一两 儿茶一两(水飞过，去砂) 川倍子一两 藤黄三钱 贝母二钱 轻粉一钱

【用法】上药各为极细末，以无声为度。

【功用】温散。

【主治】膏粱之客，失志之人，心肾不交，阴阳俱耗，又加忧愁抑郁，拂怒呼号，其气不散，结成阴症痼疽。

【备考】《疡医大全》：阳疮每用二钱，阴疮每用五钱，掺于疮上。其余疮毒不消用二次，阴疽不消用三次。

36830 阴阳至圣膏

《洞天奥旨》卷十五。为《石室秘录》卷四“阴阳至圣丹”之异名。见该条。

36831 阴阳攻积丸

《类证治裁》卷三。为《医宗必读》卷七“新制阴阳攻积丸”之异名。见该条。

36832 阴阳两救汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】熟地八钱 附子三钱 人参二钱 菟丝子八钱(盐水炒) 枸杞四钱 茯神二钱 远志一钱(甘草水炒) 干河车三钱(切) 炮姜炭一钱

【用法】水煎浓汁，时时饮之。

【主治】中脏虚症，四肢懈散，昏不知人，遗尿鼾睡。

36833 阴阳和合汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术五钱 人参二钱 甘草一钱 柴胡一钱 白芍五钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】阳气大虚腹痛，从右手指冷起，渐上至头，如冷水浇灌，由上而下，而腹乃大痛，既而遍身大热，热退则痛止，或食或不食，或过于食而皆痛也。初则一年一发，久则一月一发，发久则旬日一发也。

36834 阴阳起死膏

《外科十三方考》。为《石室秘录》卷四“阴阳至圣丹”之异名。见该条。

36835 阴阳兼治汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参一钱 白术五钱 甘草一钱 陈皮一钱 柴胡二钱 熟地半两 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【主治】阳虚兼阴虚，发寒发热，日间重于夜间。

36836 阴阳兼培丸

【方源】《会约》卷十四。

【组成】熟地八两 枣皮 淮药 茯苓各四两 鹿角胶六两（蛤粉炒成珠，或酒蒸溶合，炼蜜为丸） 附子三两 杜仲（淡盐水炒）三两 枸杞四两（酒蒸） 淮牛膝三两（酒蒸） 北五味一两半（微炒） 当归三两（酒蒸） 白芍二两（煨，酒炒） 菟丝子（淘净泥沙，酒蒸，晒干）四两（或加肉桂三两）

【用法】先将地黄、枣皮、枸杞、当归捣如膏，后入药末、鹿胶，量加炼蜜为丸。每服七八钱，早用淡盐水送下。

【主治】先天不足，精亏阳萎，后天不足，食少体倦，一切不足之证。

【加减】阳萎，加补骨脂（盐炒）三两、巴戟三两、胡桃肉四两；下焦虚滑，去淮牛膝。

36837 阴毒内消散

《徐评外科正宗》卷二。为《鸡鸣录》卷上“阴

毒内消膏”之异名。见该条。

36838 阴毒内消膏

【方源】《鸡鸣录》。

【异名】阴毒内消散（《徐评外科正宗》卷二）。

【组成】樟脑四钱 轻粉 川乌 甲片（土炒） 阿魏（瓦上炙去油） 腰黄各三钱 乳香 没药（皆去油） 牙皂 当门子各二钱 良姜 丁香 白胡椒 肉桂各一钱

【用法】上药各为细末，再研匀，瓷瓶密收，勿使泄气。照脚地之大小，掺膏贴之。

【主治】①《鸡鸣录》：一切阴分疽毒初起，如对口、发背、瘰癧、乳癖、便毒之不红肿焮热者。②《药奁启秘》：背疽、脑疽、寒湿流注，鹤膝风等不高肿、不焮痛、不发热、不作脓，一切皮色不变，漫肿无头。

36839 阴毒升麻汤

《准绳·幼科》卷六。为《金匱》卷上“升麻鳖甲汤”之异名。见该条。

36840 阴毒甘草汤

《活人书》卷十六。为《伤寒总病论》卷三“甘草汤”之异名。见该条。

36841 阴毒甘草汤

《普济方》卷一三五。为方出《肘后方》卷二，名见《千金》卷九“甘草汤”之异名。见该条。

36842 阴蚀黄连膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香粉一两 青黛而一两 黄连膏八两

【用法】上药调匀成膏。外敷患处。

【功用】清热解毒，生肌止痛。

【主治】女阴溃疡（阴蚀）、过敏性阴茎部溃疡。

36843 阴炼秋石丹

《东医宝鉴·杂病篇》卷四。即《得效》卷八“元阳秋石丹”之阴炼法。见该条。

36844 阴病开关散

【方源】《永类铃方》卷六。

【组成】当归 赤芍药 肉桂 白芷 甘草（炙）各半两 木香二钱 制枳壳三钱 天

南星一钱(去皮、姜汁浸一宿,焙)

【用法】上咬咀。每服三钱,加生姜三片,煎七分,入无灰酒三分盏,童便三分盏,又煎七分,温服。先服起胃散一二日后,不问退否,兼玉童膏服之。

【主治】骨蒸劳热阴病,大便溏利,小便白浊,及多饮食不化,胃逆口恶,虽有热,痰唾白色。

36845 阴崩固经丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】艾叶(醋炒) 鹿角霜 伏龙肝各等分 干姜

【用法】上为末,溶鹿角胶和药,乘热为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前淡醋汤送下。

【主治】妇人冲任虚弱,月候不调,来多不断,淋漓不止;或忽然暴下,受冷而白,谓之阴崩。

【备考】按:方中干姜用量原缺。

36846 阴痢附子散

《普济方》卷三七六。为《三因》卷十八“阴痢方”之异名。见该条。

36847 阴痧急救膏

【方源】《理瀹》。

【组成】生附子四两 白附子 川乌 官桂 生半夏 生南星 白术 干姜(炮) 木瓜 蚕砂各二两 吴萸 苍术 草乌 独活 故纸 良姜 延胡 灵脂 草薢仁各一两 川芎 防风 桂枝 细辛 酒芍 当归各七钱 陈皮 厚朴 藜澄茄 乌梅 炙甘草 巴戟 益智仁 大茴 姜黄连 乌药 麦冬 五味子 肉蔻仁各五钱(或加党参 黄耆各一两 生姜二十片 薤白七个 韭白 艾各二两 菖蒲三钱 凤仙 白芥子五钱 白胡椒一两)

【用法】油丹熬,入雄黄、朱砂、矾、檀香、木香、丁香、砂仁、乳香、没药各五钱。贴胸脐。

【主治】麻脚痧。

【加减】冷汗厥逆者,加附、桂、丁、麝末。

36848 阴湿化痰汤

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】橘红 桔梗 枳实 川芎 白芍药各七分 半夏 茯苓 甘草 黄连 黄芩各一钱 苍术 神曲 山楂 贝母各八分

【用法】水二钟,加生姜三片,煎至八分,空心温服。

【主治】痰嗽。

36849 阴湿痼痛汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】苍术一钱五分 羌活一钱 茯苓一钱 泽泻一钱 白术一钱 陈皮八分 防己七分 木通七分 黄柏(盐酒炒)七分 牛膝(酒焙)八分 槟榔五分 大腹皮(酒洗)五分 甘草三分

【用法】水二钟,煎至一钟,临服入姜汁三茶匙。

【主治】中湿。

36850 阴虚生内热方

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】阴虚生内热汤(《杂病源流犀烛》卷十七)。

【组成】当归八分 白芍(煨,锉,或酒浸,姜汁浸)六分 川芎八分 白术七分 苍术八分 黄柏三分 陈皮八分 玄参五分 甘草二分 沙参七分 麦门冬七分(夏月多用) 天花粉六分半 梔子(炒焦)六分(或以山药代参、术)

【用法】水二碗,加生姜三片,煎至七分,食前热服。

【主治】①《丹溪心法附余》:阴虚内热。②《杂病源流犀烛》:火病虚损。

【加减】久服,去川芎;冬月,加破故纸。

36851 阴虚生内热汤

《杂病源流犀烛》卷十七。为《丹溪心法附余》卷二十四“阴虚生内热方”之异名。见该条。

36852 阴毒升麻鳖甲汤

《元戎》。为《金匱》卷上“升麻鳖甲汤”之异名。见该条。

防

36853 防己丸

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】甜葶苈四两 杏仁二两(炒) 贝母二两(去心) 甘草二两 防己二两

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】①《传家秘宝》：咳嗽，不计新久者。②《普济方》：肺癰

【备考】方中甜葶苈用量原缺，据《普济方》补。

36854 防己丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【异名】人参丸(《普济方》卷一〇二)。

【组成】防己(锉) 白薇(锉) 桔梗(去芦头，炒) 干姜(炮裂) 白茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 大黄(锉，醋炒) 各一两 牛膝(去苗) 远志(去心) 各一两 一分 银箔二十片(研入) 桂(去粗皮) 人参各二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日二次。

【主治】风惊恐，恍惚善忘；或风邪上冲，胸胁胀满，不思饮食。

36855 防己丸

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】防己半两 桑根白皮(锉) 三分 葶苈子(炒) 郁李仁(炒) 各半两 木通(锉) 三分 赤茯苓(去黑皮) 百合各半两 泽漆(炒) 一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心煎桑根白皮汤送下。

【主治】伤寒后，毒气攻四肢虚肿，及喘息促急。

36856 防己丸

《圣济总录》卷四十八。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“汉防己丸”之异名。见该条。

36857 防己丸

《圣济总录》卷五十九。为《圣惠》卷五十三

“汉防己丸”之异名。见该条。

36858 防己丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】防己 海蛤(研) 各一两 葶苈一升(蒸熟) 杏仁六十枚(汤浸，去皮尖，炒，别捣) 甘遂(微炒) 一分

【用法】上先将葶苈、杏仁一处拌和，后以三味为末，再研匀，加枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至二十五丸，米饮送下。以微利为度。

【主治】水肿，眠卧不得。

36859 防己丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】防己 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 大戟(炒) 苦葶苈(纸上炒) 各半两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温熟水送下，不拘时候。

【功用】定喘急。

【主治】十水喘急。

36860 防己丸

《圣济总录》卷七十九。为《金匱》卷中“防己椒目葶苈大黄丸”之异名。见该条。

36861 防己丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】防己 白前 五味子 紫菀(去苗土) 各半两 桑根白皮(锉) 马兜铃 麻黄(去根节) 桔梗(炒) 柴胡(去苗) 大腹皮(锉) 各三分 赤茯苓(去黑皮) 陈橘皮(汤浸去白，焙) 各一两 甘草(炙，锉) 一分 杏仁五十粒(汤浸，去皮尖双仁，炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，温生姜汤送下，不拘时候。

【主治】水气肿满，肺气喘急，咳嗽胀闷，坐卧不得，喉中作声，心胸痞滞。

36862 防己丸

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】防己 附子(去皮脐) 半夏(汤洗去滑) 各一两 斑蝥(去翅足) 半两 防

风(去叉) 天南星各三分 麻黄(去根节)一两半

【用法】上为末,粟米饭为丸,如梧桐子大。初用生姜汤入童便送下十丸,盖覆取汗;服十日后,每日酒送下,良久以猪肾一只(切二片),先用水煮绿豆一合令烂,入肾更略煮了吃,用压下前丸药。

【主治】风毒脚气上冲,脐腹满闷,坐卧不得,但不吐者。

36863 防己丸

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】防己 赤茯苓(去黑皮) 牵牛子(洗去黑汁,焙干) 白术各一两 玄参 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 海蛤各一两半 泽泻一两一分 郁李仁(汤浸,去皮尖)二两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹米饮送下。

【主治】脚气不愈,变成肺气,或上气喘急,夜卧不得,奔豚气频发,急喘,渐成水气。

36864 防己丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】防己二两半 杏仁(去皮尖双仁,麸炒)三分 苦葶苈(炒香)三两一分 陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两 赤茯苓(去黑皮) 郁李仁(汤浸,去皮尖,麸炒) 紫苏叶各一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前温酒送下。

【主治】虚劳脾肾不足,身面浮肿,卧即胀满,喘急痰嗽,胸膈痞闷,大小便不利,渐成水气。

36865 防己丸

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】防己 大黄(锉,醋炒)各三两 芍药 槟榔(煨)各二两一分 牛膝(去苗,酒浸,切,焙) 薏苡仁(炒) 生干地黄(焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 各二两 麦门冬(去心,焙) 木香各一两半 桂(去粗

皮)一两一分 茯神(去木)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐增至三十丸,食后良久温酒或生姜汤送下,一日三次。

【主治】热毒肿,四肢肿热,气脉壅滞。

36866 防己丸

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《惠眼观证》。

【组成】汉防己 牵牛子 马兜铃 甜葶苈各等分

【用法】上为末,枣肉为丸,如绿豆大。每服十丸,糯米饮送下。与温肺散间服。

【主治】小儿疳嗽。

36867 防己丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】防己二钱 杏仁三钱 木香二钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服二十丸,食后煎桑白皮汤送下。

【功用】调顺气血,消化痰涎。

【主治】肺不足,喘嗽久不已者。

【加减】如大便秘,加 葶苈一两。

36868 防己丸

《普济方》卷一六一。即《圣惠》卷四十六“汉防己丸”。见该条。

36869 防己汤

【方源】方出《外台》卷十九引《苏恭方》,名见《普济方》卷四十三。

【组成】防己 芍药各二两 枳实(炙) 独活 防风 桂心各三两 生姜八分 葛根三两 半夏一升(洗)

【用法】上切。以水九升,煮取三升,分四服,相去八九里久,中间食少粥。

【主治】脚气下焦冷,肿满胸塞,吐不下食者。兼去温毒。

【宜忌】忌羊肉、饴、生葱。

36870 防己汤

【方源】《外台》卷十九引《苏恭方》。

【组成】桑白皮五两 大豆五升(以水二斗、并桑白皮煮取一斗,去滓) 防己 橘皮 赤茯苓 麻黄(去节)各三两 生姜五

两 旋覆花一两 杏仁八十枚 紫苏茎叶二两(切)

【用法】上切。以前件药汁煮取三升，去滓，分为三服，力弱者分为五服，相去六七里久。微覆当大汗，小便利，肿气消下。

【主治】脚气，通身体满，小便涩，上气，不能食，食则胀者。

【宜忌】忌酢物。

【加减】冷多，加茱萸四两；热多，加玄参四两。

36871 防己汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】防己 茯苓 白术 桂心 生姜各四两 乌头七枚 人参二两 甘草三两

【用法】上咬咀。以苦酒一升，水一斗，煮取三升半，每服八合，日三夜一。当觉焦热，痹忽忽然，慎勿怪也。若不觉，复令服，以觉乃止。

【主治】风历节，四肢疼痛如锤锻，不可忍者。

【宜忌】凡用乌头，皆去皮熬令黑，乃堪用，不然至毒人，宜慎之。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匱》防己黄耆汤本治风湿关节疼痛，腰下疼重，自汗恶风，取二味合用，以司开合而祛湿着。《千金》又恐黄耆之助卫，乃摒去不用；易入乌头，专开痹着；桂心、茯苓二味，又于防己茯苓汤中采入；加入参者，助防己逐痹之力也。煎用苦酒，取辟恶毒之气耳。

36872 防己汤

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】木防己三两 茯苓一两 桑白皮(切)二升 桂心三两 芎藭三两 甘草一两半(炙) 大枣十二枚(擘) 芍药二两 麻黄二两(去节)

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮麻黄，减一升，纳药煮取三升，分三服。渐汗出，令遍身，以粉粉之。

【主治】风湿，四肢疼痛，挛急浮肿。

【宜忌】慎风冷。

36873 防己汤

【方源】《圣济总录》卷八十引《膜外气方》。

【异名】防己饮(《圣济总录》卷七十九)。

【组成】防己 大戟 木香 赤茯苓(去黑皮) 海蛤 犀角屑 胡椒 白术 葶苈 防风(去叉) 木通 桑根白皮 紫苏 陈橘皮(炙) 牵牛子 诃黎勒(去核) 郁李仁 白槟榔各一两 大黄二两 麝香少许(汤成下，不用研)

【用法】上二十味并须新药，锉后称为二剂。以水三升宿浸，明日五更用铛文火煎，减去一升，绞取饮可三盏，平旦空腹服一盏，如人行五里更服一盏，又如人行五里更服一盏，至第二第三服，如药冷用重汤暖之，不可冷服。若久病腹中虚，服至第三盏，即微利三两行。若腹中实者，至日午即转泻，宜用盆盛验之，必有恶浊黄水，或青黑恶物出三五升，并气化为之。泻若不甚困，慎而止之，必自住，若觉力乏，即服浆水粥补之。后隔三五日，更服一剂，还依此法服之，小儿及老人，随意加减。

【主治】膜外气水病，不限年月深浅，洪肿大喘。亦治脚气，时时冲心。

【备考】同书防己饮中胡椒，作“胡黄连”。

36874 防己汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】汉防己一两半 赤茯苓 百合 郁李仁(别研)各一两 桑白皮(切)三两

【用法】上咬咀，分八服。每服以水一升半，煮取强半升，分二次温服，明日准此。一剂尽，更作一剂，揆度多少。

【主治】水气。

【宜忌】不得闻灯油烟气及食盐。

36875 防己汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】防己(锉) 桂(去粗皮) 麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙干) 葛根(锉)

各二两 甘草(炙, 锉) 防风(去叉, 锉) 芍药各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 加生姜半分(切), 煎取七分, 去滓温服, 日三夜一。

【主治】中风口噤, 颈项筋急, 饮食不下, 失音不能言者; 亦治伤寒失音不能语, 口噤。

36876 防己汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防己 麻黄(去根节, 先煎, 掠去沫, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 芎藭 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 芍药 人参 甘草(炙, 锉) 防风(去叉) 各一两 杏仁(去皮尖双仁, 炒) 四十枚

【用法】上锉, 如麻豆大。每用十钱匕, 以水三盞, 加生姜十片, 煮取二盞, 去滓, 分温三服, 日二夜一。

【主治】偏风, 半身不随, 口眼喎斜, 不能言语, 筋脉拘急, 不得转侧。

36877 防己汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防己(锉)一两 竹沥(旋入) 防风(去叉, 锉)一两 升麻一两 桂(去粗皮)一两 麻黄(去根节, 先煎, 掠去沫, 焙干)一两半 芎藭一两 羚羊角(镑)一两

【用法】上先将七味为粗末。每用药十二钱匕, 以水四盞, 煎至二盞, 去滓, 入竹沥二合, 更煎三沸, 分三次温服, 空心、午时、夜深各一服。

【主治】中风, 半身不随, 口面喎斜, 语不得转。

【加减】常服, 加独活一两半; 若手足逆冷, 加干姜一两(炮裂)。若不即除, 更服麻黄防风汤。

36878 防己汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防己二两 白术一两半 桂(去粗皮) 茵芋 丹参 五加皮(锉)各一两 牛膝(酒浸, 切, 焙) 细辛(去苗叶) 甘

草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜五片, 煎至八分, 去滓温服, 不拘时候, 一日二次。

【主治】风湿痹, 肌肤不仁, 体重, 汗出恶风。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“茵芋散”。

36879 防己汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防己二两 甘草(炙) 黄耆(薄切) 麻黄(去根节, 先煎, 掠去沫, 焙)各一两 白术一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加大枣二枚(擘破), 生姜三片, 煎至一盞, 去滓温服, 空心一服, 夜卧并二服。服讫用椒葱汤小浴, 继以生姜酒粥投之。药后汗出, 慎外风。皮肤中当如虫行。

【主治】风湿痹, 脉浮身重, 汗出恶风。

36880 防己汤

《圣济总录》卷三十二。为《圣惠》卷三十“汉防己散”之异名。见该条。

36881 防己汤

《圣济总录》卷三十二。为《金匱》卷中“防己茯苓汤”之异名。见该条。

36882 防己汤

《圣济总录》卷四十九。为《圣惠》卷六“汉防己散”之异名。见该条。

36883 防己汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】防己 大腹皮(和子用)各一两半 郁李仁(汤浸去皮) 大麻仁(炒) 槟榔(锉) 陈橘皮(汤浸去白, 焙) 桑根白皮(炙, 锉) 甘草(炙, 锉) 河黎勒(微煨, 去核)各一两

【用法】上除郁李仁、大麻仁外, 为粗末, 再同捣匀。每服三钱匕, 加生姜半分(拍碎), 以水一盞, 煎至八分, 去滓温服, 空心、午时各一服。以利为度。

【功用】下气。

【主治】肺积息贲。

36884 防己汤

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】防己 百合(干者) 郁李仁(去皮, 别研如膏) 各一两 木通(锉) 一两半 吴茱萸(陈者, 淘七遍, 炒) 半两 陈橘皮(汤浸去白, 焙) 当归(切, 焙) 赤茯苓(去黑皮) 各三分

【用法】上为散。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 空心温服。

【主治】结瘕气结, 腹满如石, 气急少卧, 小便不利。

36885 防己汤

《圣济总录》卷七十九。为《金匱》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

36886 防己汤

《圣济总录》卷八十。为《圣惠》卷五十四“汉防己散”之异名。见该条。

36887 防己汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】防己 秦艽(去苗土) 葛根各二两 桂(去粗皮) 一两半 陈橘皮(汤浸去白, 焙) 麻黄(去根节, 汤煮, 掠去沫) 各三两 甘草(炙, 锉) 一两半 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 炒) 八十枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜三片, 煎至七分, 去滓温服, 一日三次。衣覆出汗。

【主治】脚气痹弱。

36888 防己汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】防己一两半 白术 枳壳(去瓤, 麸炒) 各二两 独活(去芦头) 防风(去叉) 桂(去粗皮) 各一两 芍药一两半 葛根(锉) 半夏(汤洗去滑, 炒) 各二两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加生姜一分(拍碎), 同煎至八分, 去滓, 空心、食前温服, 服讫良久吃粥, 一日三次。

【主治】脚气风毒, 冷痹肿满, 胸膈噎塞, 呕逆不下食, 兼去湿毒。

36889 防己汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】防己 猪苓(去黑皮) 郁李仁(去皮, 炒) 槟榔(锉) 各三分 木通(锉)

紫苏叶 枳壳(去瓤, 麸炒) 各半两 赤茯苓(去黑皮) 甘草(炙, 锉) 各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕, 水一盞半, 加生姜三片, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】①《圣济总录》: 湿脚气, 脚膝肿满。②《普济方》: 湿脚气, 小便不利, 气壅烦闷, 胁腹连膀胱气虚胀, 上气喘促, 坐卧不得。

36890 防己汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】防己 白药子各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎七分, 去滓温服。未效再服。

【主治】妊娠咳嗽, 喘满短气。

36891 防己汤

《圣济总录》卷一五七。为《圣惠》卷七十五“汉防己散”之异名。见该条。

36892 防己汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】防己 枳壳(去瓤, 麸炒) 桑根白皮(锉) 芎蒭 萎蕤 当归(切, 焙) 各一两 葶苈(隔纸炒) 一分 木香半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生枣二枚(擘破), 煎至七分, 去滓温服。以疏利肿消为度。

【主治】产后通身肿满, 气喘烦闷。

36893 防己汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】防己二两 防风(去叉) 芎蒭 附子(炮裂, 去皮脐) 甘草(炙, 锉) 当归(切, 焙) 陈橘皮(去白, 焙) 各一两 赤小豆(拣) 二合

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 同煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】产后肿满，不能食。

36894 防己汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】防己三两 人参四两 桂心二两 茯苓四两

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】皮水，由肺气久虚，为风邪所客，气不得运，百脉闭塞，气结阴聚成水。腹满，按之没指，随手而起，余与正水皆同，但四肢聂聂动，其脉亦浮。

36895 防己汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】汉防己 防风（去叉股） 桂心（不见火） 附子（炮裂，去皮）各半两 威灵仙（去苗，洗）三分 麻黄半两（去节）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，以竹沥、荆沥、地黄汁各一盏，姜汁半盏为引，和匀用，煎至七分，去滓温服，一日三四次。

【主治】久风，邪入肝脾二经，言语不传。

【方论选录】《本事方释义》：汉防己气味辛平，能行下焦，祛风利湿，人足太阳；防风气味辛甘温，人足太阳；桂心气味辛甘大热，人足少阴，厥阴；附子气味咸辛大热，入手足少阴；威灵仙气味苦微辛咸平，通利诸经络；麻黄气味辛温，入手太阴、足太阳，表散药中之峻者也。肝脾二经之风邪久不能去，得群药之疏利，犹虑留邪，佐以竹沥、荆沥之甘寒而滑，生地黄汁之苦寒而润，生姜汁之辛温而通，邪岂能留耶？

36896 防己汤

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】汉防己 川升麻 天麻 川芎各一两 桂心 羚羊角屑 麻黄（去根节）各半两

【用法】上为细末，用杏仁一分（汤浸，去皮尖，炒黄），研细拌匀。每服一钱，水一盏，加生姜三片，薄荷三片，同煎至五分，去滓稍热，时时与服。

【主治】小儿中风，口眼喎斜，视不能平，语不能正。

36897 防己汤

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】防己一两 香白芷二两

【用法】上为细末。每服一钱，新汲水调下，不拘时候。

【主治】伏暑吐泻，阴阳不分。

36898 防己汤

【方源】《妇人良方》卷十五。

【异名】防己饮（《校注妇人良方》卷十五）、防己散（《医学入门》卷八）。

【组成】防己三分 桑白皮 紫苏茎叶 赤茯苓各一两 木香一分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，加生姜四片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠脾虚，通身浮肿，心腹胀满，喘促，小便不利。

36899 防己汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】防己（去黑皮） 麻黄（去节存根，锉碎，汤泡滤过，焙干） 薄桂（去粗皮）各半两 赤芍药一两 赤茯苓（去皮）一两 苍术（米泔水浸一宿，去粗皮，滤干，锉片，用火炒至微黄色）一两 甘草（炙）七钱半

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盏，加生姜二片，葱一根，煎七分，空心热服。或入薤白同煎。

【主治】小儿感冒风湿之气，失于解表，流注两足疼痛，至两膝浮肿，不能屈伸，转成瘫痪。

36900 防己汤

【方源】《普济方》卷一九三引《鲍氏肘后方》。

【组成】防己四两 白术三两 甘草二两

【用法】上为末。每服三钱，加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】湿气浮肿。

36901 防己汤

【方源】《医学纲目》卷三十三。

【组成】防己四钱 甘草 黄耆各一两
生姜二两 白术三两 人参一两

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞半，煮取一中盞，去滓，饮讫，仍坐被中，汗出如虫行，或被卧取汗出。

【主治】风温，脉浮，身重，汗出。

36902 防己汤

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】防己一两 诃子(炮，用肉) 麻黄(不去节) 杏仁(去皮尖，麸炒)各一两

【用法】上咬咀。水煎，临热入腊茶少许，再沸去滓服。

【主治】婴孩伤寒喘促，及久年喘急。

36903 防己汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】黄耆 白术 防己 防风 甘草 大青

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】风温，身重汗出。

36904 防己汤

《医统》卷八十五。为原书同卷“竹沥饮”之异名。见该条。

36905 防己汤

《杏苑》卷四。为《金匱》卷中“木防己汤”之异名。见该条。

36906 防己汤

【方源】《女科指掌》卷三。

【组成】桑白皮 防己 茯苓 紫苏 木香 砂仁 姜皮

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子满。

36907 防己汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】苍术 川柏(炒) 防己 苡仁 独活 赤苓 防风 草薢 豨莶草 车前子

【主治】脾肾两虚，气血错乱，湿邪内扰，每临暑湿之令，外湿激动内湿，使足胫皮肤红肿坠痛，名肾气游风。

36908 防己饮

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防己 桑根白皮(锉) 桂(去粗皮) 麻黄(去根节)各三两 白茯苓(去黑皮)四两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风寒湿痹，四肢挛急，或身体浮肿。

36909 防己饮

《圣济总录》卷七十九。为原书卷八十引《膜外气方》“防己汤”之异名。见该条。

36910 防己饮

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【异名】防己散(《普济方》卷一九二)。

【组成】防己 赤茯苓(去黑皮) 桑根白皮 羌活(去芦头)各一两 苍术(米泔浸一宿，切，焙) 郁李仁(去皮)各一两半

【用法】上咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎取一盞，去滓温服，不拘时候，一日三次。

【主治】风水，面肿骨痛，恶风咳嗽。

36911 防己饮

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】防己一两 葶苈(隔纸炒) 赤茯苓(去黑皮)各半两 陈橘皮(汤浸去白，焙) 玄参 黄芩(去黑心) 泽漆(炒)各一两 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 猪苓(去黑皮) 白术(锉) 大豆(炒)各一两半 桑根白皮(锉)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧各一服。

【主治】妇人因经水断绝，水病浮肿，名曰水分。

36912 防己饮

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】白术 木通 防己 槟榔 川芎 甘草梢 犀角 苍术(盐炒) 黄柏(酒炒) 生地黄(酒炒)

【主治】①《丹溪心法》：脚气。②《医方集解》：湿热脚气，足胫肿痛，憎寒壮热。

【加减】大便实，加桃仁；小便涩，加杜牛膝；有热，加黄芩、黄连；大热及时令热，加石膏；有痰，加竹沥、姜汁。

【方论选录】①《医方考》：是方也，木通、防己、槟榔，通剂也，可以去塞；犀角、黄柏、生地黄、甘草梢，寒剂也，可以去热；苍、白二术，燥剂也，可以去湿。然川芎能散血中之气，犀角能利气中之血，先痛而后肿者，气伤血也，重用川芎；先肿而后痛者，血伤气也，重用犀角。②《医方集解》：此足太阳药也。防己行水疗风，泻下焦之湿热；槟榔攻坚利水，坠诸药使下行；木通降心火，由小便出；草梢泄脾火，径达肾茎；黄柏、生地滋肾阴，而凉血解热；苍、白二术燥脾湿，而运动中枢；肿由血郁，川芎行血中之气；痛由肝实，犀角凉心而清肝。合之以清热利湿，消肿止痛也。③《退思集类方歌注》：防己、苍术、白术、川芎行血燥湿，生地、黄柏、草梢、犀角凉血清热，木通通关节、利湿热，槟榔下行疾速，坠诸药入下焦，消肿痛也。脚气无不由湿热而成，其证憎寒发热，状类伤寒，但足胫肿痛为异耳。

【备考】《医学正传》：有黄连。用量及用法：黄柏、苍术、白术、防己各七分，生地黄、槟榔、川芎各五分，犀角屑、甘草节、木通、黄连各三分。上细切，作一服，水一盞半，煎至一盞，去滓，食前温服。

36913 防己饮

《校注妇人良方》卷十五。为《妇人良方》卷十五“防己汤”之异名。见该条。

36914 防己饮

【方源】《仙拈集》卷二引郑总戎方。

【组成】汉防己五钱 当归四钱 苍术 黄柏 茵陈 泽泻 牛膝各三钱

【用法】用生姜五片，黄酒一大碗，水二大碗，煎服。

【主治】腿膝流火。

36915 防己饮

【方源】《梅氏验方新编》七集。

【组成】防己 木通 槟榔 生地 炒芩 川芎 焦白术 制苍术 甘草梢 黄柏（盐水炒） 牛膝 木瓜 苡仁

【用法】水煎服。

【主治】脚气肿痛，寒热。

36916 防己饮

【方源】《顾松园医镜》卷十五。

【组成】汉防己一钱许 黄柏二钱 忍冬花（鲜藤数两，煎汤代水更效） 川萆薢各五钱 木瓜 白茯苓各三钱 泽泻 木通各一钱许 石斛 米仁各五钱

【主治】脚气，湿热在足。脚胫红肿（亦有不红者），筋挛掣痛，发热恶寒。

【加减】如红肿，加犀角，冲心烦闷亦用，再加槟榔、羚羊角；如喘呕，加麦冬、枇杷叶；如头痛，加甘菊。

【方论选录】汉防己通下焦湿热，壅遏脚气，非此不除，黄柏治下焦湿热肿痛，忍冬花疗脚气筋骨引痛，川萆薢祛浊分清，木瓜祛湿舒筋，白茯苓、泽泻、木通利水除湿，石斛、米仁益脾除湿。此清热除湿利水之剂，脚气皆由湿热，通宜以此方为主，随兼症而扩充，以加减之则善。

36917 防己散

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《普济方》卷二五一。

【组成】防己 防风 甘草 桂

【功用】解芫花毒。

【备考】《普济方》本方用防己、防风（去芦）、甘草（生，锉）、桂（去粗皮）各一两。上为末散，每服二钱匕，冷水调下，连并三服。

36918 防己散

【方源】《千金翼》卷十九。

【异名】栝楼根散（《圣济总录》卷五十八）、栝楼散（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】木防己一两 栝楼 铅丹 黄连各二两

【用法】上为散。以苦酒一升，水二升合为

浆，每于食后服方寸匕，一日三次。服讫当强饮，极令盈溢，一日再服则憎水，当不欲饮也。

【主治】消渴，肌肤羸瘦，或转筋不能自止，小便不禁。

【备考】方中栝楼，《圣济总录》作“栝楼根”。

36919 防己散

【方源】方出《证类本草》卷九引《初虞世方》，名见《普济方》卷二十七引《仁存方》。

【组成】汉防己 黄葶苈各等分

【用法】上为末。每服一钱，糯米饮调下。

【主治】肺痿，咯血多痰。

36920 防己散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】防己（锉）一两半 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）三两 独活（去芦头） 秦艽（去苗土） 黄耆（锉，炙） 丹参（去苗土，微炙） 乌头（炮裂，去皮脐） 松脂（炼过，放冷研） 人参 苦参（锉） 白术（炒） 桂（去粗皮） 芍药各一两一分 芎藭 黄连（去须） 蒺藜子（炒，去角） 白茯苓（去黑皮） 天门冬（去心，焙） 葛根（锉）各一两半 干姜（炮） 蜀椒（炒去汗，去闭口者并子）各一两 玄参二两

【用法】上为散。每服二钱匕，渐加至三钱匕，空心食前、夜卧温酒调下。

【主治】大风癰，眉须堕落，及身面痒痒，腹中烦热，身上癰疹，起如枣核，疼痛生疮。

36921 防己散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】防己（生用）三两

【用法】上为细散。每服二钱匕，新汲水调下；老人、小儿酒调一钱匕服。更用热汤调少许，搐鼻。

【主治】鼻衄。

36922 防己散

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】防己（煮） 河黎勒（煨，去核）

郁李仁（汤浸去皮，研如膏） 白术 槟榔（锉）各一两半 吴茱萸（陈者，淘七遍，炒）三分

【用法】上除郁李仁外，为散，入郁李仁同研令匀。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，和滓空心温服。

【主治】结瘕癖实，腹满如鼓，食即欲吐，喘息急，其脉弦而紧。

36923 防己散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】防己一两 海蛤 滑石 木香各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，浓煎木通汤调下。

【主治】膀胱积热，小便不通。

36924 防己散

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】防己 人参 白茯苓（去黑皮） 鬼臼 鬼箭羽 附子（炮裂，去皮脐） 曲（炒）各一分

【用法】上为散。每服二钱匕，以桃仁研泔一盞，煎至六分，温服，一日五次。

【功用】补虚。

【主治】尸注传尸，服逐下药后。

36925 防己散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引张涣方。

【组成】汉防己半两 川朴消 犀角屑 黄芩 黄耆（锉） 川升麻各一分

【用法】上为细末。每服半钱，煎竹叶汤调下。

【主治】风热邪毒搏于血气，则皮肤赤而肿起，游走不定，名赤游肿。

【方论选录】《医林纂要》：防己祛风去湿，中通似木通，亦去心火，为君，此者欲其搜治经络，达于腠理，无所不至；朴消消气分之热，犀角消血分之热；黄芩、黄耆益其正气，所以去其邪热；升麻升达阳明之热，而散之肌肤，此实治斑治丹主药。此去热而兼升散，治丹毒之搏于风湿者。

【备考】《直指》有川芎。

36926 防己散

【方源】方出《妇人良方》卷十四，名见《准绳·女科》卷四。

【组成】防风 羌活 防己各一两 麻黄(去节)半两 黄松木节一两 桂心 荆芥穗 羚羊角屑 桑寄生 甘草 薏苡仁各半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。

【主治】妊娠中风，口眼不正，手足顽痹。

36927 防己散

《普济方》卷一五九。为《得效》卷五“嚼药防己散”之异名。见该条。

36928 防己散

《普济方》卷一八八。即《博济》卷一“汉防己散”。见该条。

36929 防己散

《普济方》卷一九二。为《圣济总录》卷七十九“防己饮”之异名。见该条。

36930 防己散

【方源】《普济方》卷二四三。

【组成】汉防己一两 麻黄一两(去根节) 赤茯苓一两 丹参一两 牛膝一两(去苗) 独活一两 黄耆一两(锉) 防风一两(去芦头) 人参半两(去芦头) 犀角屑一两 木香半两 桂心一两 石膏一两 半夏半两(汤浸，去滑) 川大黄半两(碎，微炒) 杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 桑白皮一两(锉) 附子一两(炮裂，去皮脐) 枳壳半两(去瓢 麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱，水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】脚气缓弱，顽痹，心神烦闷，言语謇涩，不欲饮食。

36931 防己散

《普济方》卷二四四。即《圣惠》卷四十五“汉防己散”。见该条。

36932 防己散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】防己 人参各等分

【用法】上为末。每服一钱，桑白皮煎汤调下，不拘时候。

【主治】小儿伤寒喘急，及诸病喘促。

36933 防己散

《医学入门》卷八。为《妇人良方》卷十五“防己汤”之异名。见该条。

36934 防己散

《准绳·类方》卷二。为《圣惠》卷五十四“汉防己散”之异名。见该条。

36935 防己散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】防己一两 羌活一两 当归二两 防风一两 白芍一两(酒炒) 川芎一两 米仁四两(炒) 甘草六钱 羚羊角一两

【用法】上为散。每服五钱，水煎去滓，加竹沥一杯，姜汁一匙，温服。

【主治】孕妇中风，口眼歪斜，脉浮者。

【方论选录】妊娠血虚风中，遇热于经，而络脉受病，故口眼歪斜，胎孕为之不安焉。防己泻血分湿热以清血室，羌活散太阳风邪以宁经腑，当归养血荣经脉，白芍敛阴和血脉，川芎入血海以活血行气，米仁健脾气以泻湿舒筋，防风为风药之使，羚羊清厥阴之火，甘草缓中以和胃也。为散水煎，更入竹沥、姜汁散痰养液，务使血液内充，则风热外解，而经脉融和，胎得所养，何口眼歪斜之不即端正哉！

36936 防己膏

《普济方》卷二四六。即《圣惠》卷四十五“汉防己膏”。见该条。

36937 防己膏

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】汉防己(去皮)半斤 茵芋五两

【用法】上咬咀。用酒五升，浸药一宿，取猪脂肪一斤，文武火熬三上三下成膏，摊在纸花上。贴病人患处，以热手不住摩膏上。

【主治】产后中风，四肢筋脉挛急，身体麻痹。

36938 防风丸

【方源】《医心方》卷三引《范汪方》。

【组成】芎藭四分 蜀椒三分 贝母三分 防风二分 当归二分 白芷二分 皂荚一分 术二分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如弹子大。食前顿服一九。服药十三日，风当出去，当有热处，随以水洗之。

【主治】风病。一日入头，头重，耳塞鼻衄，目视茫茫；二日入肌，肤皮隐疹，搔痒生疮；三日入筋，筋急缩痛；四日入脉，脉动上下无常；五日入骨，齿摇，胫疼痠不能久立；六日入心，憔悴，愤怒自悲，自喜；七日入肝，令人咳逆短气，昼愈夜剧；八日入肝，头眩，目视不明；九日入脾，令人肠鸣，舌上疮，两胁下心满坚闷不利；十日入肾，令人耳中雷鸣，甚则脓出。

【宜忌】禁食生鱼、猪肉、生菜。

36939 防风丸

【方源】方出《千金》卷三，名见《普济方》卷三五二。

【组成】防风一两半 桔梗三十铢 人参一两 菖蒲 半夏 丹参 厚朴 干姜 紫菀 杜衡各十八铢 秦艽 白薇 牛膝 沙参各半两

【用法】上为末，白蜜为丸，如小豆大。每食后服十五丸，一日三次。不知，增至二十丸，有妊止。服药后七日，方合阴阳。

【主治】产后劳损，无子，阴中冷汁溢出，子门闭，积年不愈，身体寒冷。

36940 防风丸

【方源】《千金》卷十三。

【组成】防风 桂心 通草 茯神 远志 甘草 人参 麦门冬 白石英各三两

【用法】上为末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，酒送下，一日二次。

【功用】补虚调中。

【主治】①《千金》：小肠腑寒，脉虚，惊跳不定，乍来乍去。②《三因》：脉虚极则咳，咳则心痛，喉中介介如哽，甚则咽肿。

【方论选录】《千金方衍义》：脉虚而用桂心，石英、远志当矣，反用防风为主，兼木通同入手、足太阳，引领人参、茯神等味归就心与小肠。《千金》奥旨，于此稍露一斑，特为拈出，以开学人心目。

【备考】方中茯神，《三因》作“茯苓”。

36941 防风丸

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】防风二两 秦艽二两 石斛二两 丹参一两 薏苡仁三合 前胡 橘皮 杜仲(炙) 附子(炮，去皮) 白术各一两 桂心一两半 麻仁一升(熬取脂)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次

【主治】①《千金翼》：服补虚防风汤已，脚气仍不止者。②《普济方》引《经验方》：风壅气涩，痰涎不利，言语謇涩，大肠燥结，神昏气浊。

36942 防风丸

【方源】《外台》卷十五引《千金翼》。

【组成】防风 茯神各三分 天门冬四分(去心) 芎藭 白芷 人参各二分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至十五丸，酒送下，一日二次。

【主治】肺间风热，旦朝好喷嚏。

【宜忌】忌鲤鱼、鲈物。

36943 防风丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】防风半两(去芦头) 犀角屑三分 茯神一两 远志半两(去心) 人参三分(去芦头) 白僵蚕三分(微炒) 白附子半两(炮裂) 芎藭半两 朱砂三分(别研，水飞过) 羌活半两 桂心三分 当归半两(锉，微炒) 麦门冬半两(去心，焙)

【用法】上为细末，入研了朱砂令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，不拘时候。

【主治】肝风筋脉拘挛，不得屈伸，恍惚，或多喜忘，有时恐怖。

【宜忌】忌猪肉、毒鱼等。

36944 防风丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】防风三分（去芦头） 茯神一两 人参三分（去芦头） 麦门冬一分（去心，焙） 天麻三分 白鲜皮一两 薏苡仁三分 小草三分 犀角屑一两 天竺黄三分 牛黄一分（研入）

【用法】上为末，加研了牛黄令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以糯米饮送下，不拘时候。

【主治】心脏中风，惊悸，言语混浊，烦热恍惚，心神不安。

36945 防风丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】防风一两半（去芦头） 茯神一两半 人参一两半（去芦头） 天门冬一两半（去心，焙） 黄连半两（去须） 豉一合 白术二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】伤寒后心虚惊悸，精神昏乱，烦闷，四肢沉重，不能饮食。

36946 防风丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】防风一两（去芦头） 酸枣仁一两（微炒） 蔓荆子半两 槟榔半两 晚蚕沙半两（微炒） 薏苡仁二两 附子一两（炮裂，去皮脐） 汉防己一两 独活一两 秦艽一两（去苗） 芎藭一两 藁本一两 牡丹一两半 甘菊花一两半 五加皮一两半 熟干地黄一两 大麻仁一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，一日二三次。

【主治】虚劳胃闷，筋脉拘挛，皮肤不仁。

【宜忌】忌生冷、粘滑。

36947 防风丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】防风一两（去芦头） 黄芩一两

羌藭三分 玄参三分 川大黄半两（锉碎，微炒） 知母三分 人参半两（去芦头） 赤茯苓三分 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎竹叶汤送下。

【主治】斑豆疮入眼，体热心烦，少得睡卧。

36948 防风丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】防风一两（去芦头） 秦艽三分（去苗） 石斛二两（去根，锉） 薏苡仁一两 白术一两 芎藭一两 杜仲一两（削去皱皮，微炙，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 大麻仁一两 草薢一两（锉） 丹参一两 桂心一两 牛膝一两（去苗） 独活一两 槟榔一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】脚气，疼痛不仁，脚膝无力。

36949 防风丸

【方源】《局方》卷一。

【异名】天麻丸（《普济方》卷一〇五）。

【组成】防风（洗） 川芎 天麻（去苗，酒浸一宿） 甘草（炙）各二两 朱砂（研为衣）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，每两作十丸，以朱砂为衣。每服一丸，荆芥汤化服，茶酒嚼下亦得，不拘时候。

【主治】一切风，及痰热上攻，头痛恶心，项背拘急，目眩旋运，心怔烦闷，手足无力，骨节疼痛，言语蹇涩，口眼喎动，神思恍惚，痰涎壅滞，昏愤健忘，虚烦少睡。

36950 防风丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防风（去叉）一两一分 白茯苓（去黑皮）三分 酸枣仁（炒）三分 肉苁蓉（酒浸，切，焙）一两一分 五味子三分 桂（去粗皮）半两 石斛（去根，锉）三分 人参三分 山茱萸三分 槟榔（锉）三分 熟干地黄（焙）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空腹时煎枣汤送下。

【主治】肾中风，腰膝重疼，脚膝无力，胸中气满，两胁膨胀。

36951 防风丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】防风(去叉) 白僵蚕(炒) 干蝎(酒炒) 白附子(炮) 五灵脂(研) 丹砂(研) 羌活(去芦头) 天麻 天浆子(去壳，入药末，研) 各一分 牛黄(研) 一钱

【用法】上为细末，拌匀，糯米煮糊为丸，如麻子大。每次五丸，加至七丸，薄荷酒送下；或口噤，研化灌下。小儿急惊风，每次二丸至三丸，荆芥、薄荷汤送下。

【主治】中急风，及小儿急惊风。

36952 防风丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】防风(去叉) 二两 酸枣仁(炒) 一两 槟榔(煨过) 一两半 薏苡仁(炒熟) 二两 独活(去芦头) 甘菊花 芎藭 各一两 藁木(去苗土) 二两 大麻仁(别研如粉) 一两半

【用法】上八味为末，和大麻仁粉重罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】气血不和，为风寒所侵，不得宣泄，蕴结皮肤间，寒热相搏，痛如针刺。

36953 防风丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】防风(去叉) 桔梗(锉，炒) 丹砂(研) 各二两 天麻 细辛(去苗叶) 独活(去芦头) 秦艽(去苗土) 芎藭 木香各一两 天南星(用牛胆制者) 由跋(炮) 各一两半 甘草(炙，锉) 茯苓(去黑皮) 各半两 藿香叶三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后、临卧荆芥汤嚼下。

【主治】风气，肢节疼痛，四肢少力，头痛

烦闷。

36954 防风丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】防风(去叉) 甘草(炙) 各一两 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 桔梗(去芦头，炒) 各半两 芎藭 白芷各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，食后荆芥汤嚼下。

【主治】风头旋，眩晕，肩背拘急，发热恶寒，肢节疼痛。

36955 防风丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】防风(去叉) 白茯苓(去黑皮) 细辛(去苗叶) 白术 附子(炮裂，去皮脐) 桂(去粗皮) 泽泻各半两 甘草(炙，锉) 紫菀(去苗) 芍药 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 栝楼根各三分 山茱萸 熟干地黄(焙) 半夏(汤洗七遍去滑，焙) 独活(去芦头) 山芋各一分 黄耆三两(锉)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空腹温酒送下，一日二次。未愈，更加丸数。此药宜久服。

【主治】肾脏虚冷，邪气乘虚，或因房室发动，身体冷痹不仁，手足牵强，举动艰难，或肌肉跳动，引腰脊及左右偏急，不能饮食。

36956 防风丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防风(去叉) 羌活(去芦头) 茯神(去木) 牛膝(酒浸，切，焙) 桂(去粗皮) 人参 枳壳(去瓤，麸炒) 五加皮(锉) 芍药 丹参 薏苡仁 玄参 麦门冬(去心，焙) 生干地黄(焙) 各一两 磁石(煨，醋淬) 四两 槟榔(锉) 二两 松子仁 大黄(锉，炒) 木香各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】热痹。

36957 防风丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】防风(去叉) 芎藭各一分 黄耆(锉) 术各半两 五味子 续断 陈橘皮(汤浸去白)各一分 石硫黄(研)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心盐米汤送下。

【主治】大肠气虚,又因伤风冒雨,大肠中下血。

36958 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】防风(去叉) 黄连(去须) 生干地黄(焙)各四两 蔓荆实九两 柑皮(焙)一两半 萎蕤二两半 茯神(去木)三两半 大黄(锉,炒) 甘草(炙,锉)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心粥饮送下。

【主治】白秃发落。

【备考】本方原名“防风膏”,与剂型不符,据《普济方》改。

36959 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】防风(去叉) 决明子 人参 车前子各一两半 黄连(去须) 菊花 槐实(炒) 蓝实各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,食后温浆水送下,临卧再服。

【主治】目赤肿痛。

36960 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】防风(去叉)二两 细辛(去苗叶)一两半 五味子一两半 羌藭子二两 黄芩(去黑心)一两 桔梗(锉,炒)一两 车前子二两 知母二两 人参一两 玄参一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后米饮送下。

【主治】目风肿痛。

36961 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】防风(去叉) 山芋各一两半 萎蕤二两 赤芍药一两半 车前子三两 秦皮(去粗皮) 泽泻各一两 芎藭二两 山梔子仁 白茯苓(去黑皮)各一两半 独活(去芦头) 白槟榔(煨,锉) 甘菊花(择) 羚羊角(镑)各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、临卧煎苦竹叶汤送下。

【主治】眼生翳,目系急,其翳生瞳人上,及睑肿合,痛如针刺。

36962 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】防风(去叉) 玄参 决明子(炒) 车前子 茯神(去木) 地骨皮 枳壳(去瓢,麸炒) 龙齿 甘菊花 苦参 大黄(锉,炒) 麦门冬(去心,焙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后温浆水送下,临卧再服。

【主治】五脏风热毒气攻目,或赤或涩,或昏或痛,翳障不明者。

36963 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】防风(去叉) 蝉壳 猪牙皂荚(酥炙,去皮子)各一两半 天麻二两

【用法】上为细末,用精羊肉煮熟捣烂,以酒熬为膏,丸如绿豆大。每服三十丸,荆芥酒或茶汤送下。

【主治】一切风疮疥癣,皮肤瘙痒,搔成癰疹。

36964 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】防风(去叉) 苍耳(炒) 苦参 蒺藜子(炒)各二两 枳壳(去瓢,麸炒)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,荆芥茶送下亦得,不

拘时候。

【主治】妇人血风，皮肤瘾疹痒痛，或有细疮。

36965 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】防风（去叉） 钟乳粉 牛黄（研） 白术各半两 熟干地黄（焙） 甘草（炙）各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，温水化下。

【主治】小儿解颅，脑缝开不合。

36966 防风丸

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】防风（去芦头） 连翘 桑根白皮（炙，锉） 牡丹皮 白头翁 黄柏（去粗皮，微炙） 豉（炒令黄） 独活（去芦头） 秦艽（去苗土）各一两 海藻（洗去咸，焙）三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，米饮送下，早晨、日晚各一服。

【主治】小儿瘰癧结核，寒热。

36967 防风丸

《永乐大典》卷九七八。即《幼幼新书》卷九引《赵氏家传》“天麻防风丸”。见该条。

36968 防风丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】防风半两 枳壳半两（去瓢，麸炒） 白术一两

【用法】上为细末，烧饼为丸。每服五七十丸，生姜汤送下。

【主治】痰嗽，胸中气不清利者。

36969 防风丸

【方源】《永类铃方》卷二十引《全婴方》。

【组成】天麻 防风 人参 川芎各一两 全蝎 甘草 僵蚕各一两半 朱砂 雄黄 牛胆南星各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【主治】小儿惊风痰热，神昏惊悸。

36970 防风丸

【方源】《得效》卷十一。

【组成】天麻 防风 人参各一两 全蝎（去毒）七个 僵蚕（炒断丝） 粉草各五钱 朱砂 雄黄各三钱半 麝香半钱

【用法】上炼蜜为丸，如小指头大。用人参汤化服一丸，不拘时候。冬瓜仁汤尤妙。

【主治】慢惊不省，手足微动，眼上视，昏睡。

36971 防风丸

【方源】《普济方》卷三七三引《鲍氏方》。

【组成】全蝎半两（略炒） 白附子（炮） 天麻 白茯苓 僵蚕 甘草 防风各一两

【用法】上为末，蜜为丸，如鸡头子大，朱砂为衣。每服半丸至一丸。

【主治】小儿风痰壅盛，惊风已成或未成者。

【加减】热加知母，寒加附子。

36972 防风丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】防风（勿见火）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二钱五分，空腹葱白汤送下。

【主治】风入胞门，崩漏下血，色清淡者。

36973 防风丸

《盘珠集》卷下。为《校注妇人良方》卷十二“防风黄芩丸”之异名。见该条。

36974 防风丹

【方源】《普济方》卷三七四引《仁存方》。

【组成】全蝎 白附子

【用法】上为末，蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，用麝香、荆芥汤送下。

【主治】小儿惊风，神困不睡。

36975 防风丹

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】羌活 防风 枳实 川芎 甘草（炒） 大黄（湿纸裹煨）各一钱半

【用法】上锉。每服三字，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿惊风，风热痰壅，大便不通。

【加减】或加赤芍药。

36976 防风汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】防风 白术 桂心 蜀椒(汗) 黄芩 细辛 芍药 人参 甘草(炙) 各一两 麻黄三两(去节) 石膏二两(碎, 绵裹) 大枣三十枚(擘)

【用法】上切。以水九升, 煮取三升, 分三服。

【主治】中风发热, 头痛面赤, 吸吸苦热, 恶风烦闷, 身中惛惛面疼, 其脉浮而数者。

【宜忌】忌海藻、菰菜、桃、李、生葱、生菜。

36977 防风汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】防风 甘草(炙) 黄芩 茯苓 当归各一两 杏仁五十枚(去两仁皮尖) 秦艽半两 生姜五两 干枣三十枚(擘) 麻黄二两(去节)

【用法】上咬咀。以清酒、水共四升, 煮取三升, 分三服。

【功用】发汗。

【主治】中风, 两目不开, 不能言, 短气欲死。

【宜忌】忌海藻、菰菜、大酢。

36978 防风汤

【方源】《千金》卷十四引《徐嗣伯方》。

【组成】防风 赤石脂 石膏 人参 生姜 白石脂 寒水石 龙骨 茯苓各三分 桂心二分 紫石一分

【用法】上咬咀。以水八升, 煮取三升, 分三服。

【主治】风眩, 服薯蓣汤后, 四体尚不凉冷头目眩动者。

【方论选录】《千金方衍义》: 服薯蓣汤, 四肢热尚未除, 头目转觉眩晕, 虚阳不能即敛故取风引汤中四石、龙骨、桂心, 加参、苓以镇固之, 生姜开发中气, 防风开发表气, 风引汤专取大黄引风热下行, 此以人参助防风上泄, 仍取江水煮取, 乃薯蓣汤之成法, 半

夏汤之变法也。

【备考】此汤大都宜长将服, 但药中小小消息之, 随冷暖耳。

36979 防风汤

【方源】《千金》卷八引甄权方。

【组成】防风 芎藭 白芷 牛膝 狗脊 革薺 白术各一两 羌活 葛根 附子 杏仁各二两 麻黄四两 生姜五两 石膏 薏苡仁 桂心各三两

【用法】上咬咀。以水一斗二升, 煮取三升, 分三次服。服一剂觉好, 更服一剂, 即一度针, 九剂九针即愈, 灸亦得。

【主治】偏风。

【宜忌】《外台》: 忌桃、李、生葱。

【备考】方中附子, 《外台》作“人参”。

36980 防风汤

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】防风 桂心 知母各四两 白术 生姜各五两 芍药 甘草各三两(炙) 附子二枚(炮)

【用法】上切。以水一斗, 煮取三升, 分为三服。

【主治】历节风。身体四肢节解疼痛如坠脱, 肿按之皮急, 头眩短气, 温温闷乱如欲吐。

【宜忌】忌生葱、猪肉、海藻、菰菜、桃、李、雀肉等。

36981 防风汤

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】防风 白术 防己 干姜 甘草(炙) 各一两 附子(炮) 桂心各半两 蜀椒一百枚(汗)

【用法】上切。以水四升, 煮取一升半, 分为三服。

【主治】风眩呕逆, 水浆不下, 食辄呕, 起即眩倒, 发作有时, 手足厥。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、海藻、菰菜、桃、李、雀肉等。

36982 防风汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】防风五两 当归 芍药 人参 甘草 干姜各二两 独活 葛根各五两

【用法】上咬咀。以水九升，煮取三升，去滓，分三服，一日三次。

【主治】产后中风，背急短气。

【方论选录】《千金方衍义》：背急，表实可验；短气，内虚可凭。故以人参辅正祛邪，一举而两得其平。非若虚阳上逆，竹叶汤之两难分解也。

36983 防风汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】防风 麻黄 芍药 人参 芍药 当归 茯苓 半夏 甘草各一两 鳖甲 生姜 桂心各二两 杏仁一两半 赤小豆一升 贝子五枚 乌梅五枚 大枣二十枚 吴茱萸五合 犀角 羚羊角各半两 橘皮一两 薤白十四枚

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分三服，一日令尽。

【主治】脚痹，并主毒气上冲心胸，呕逆，宿癖，积气，疝气。

【方论选录】《千金方衍义》：防风汤方下主治脚痹，毒气冲心，虽合桂枝、麻黄二方和营开痹为主，究其所治，尤在冲心毒气，攻以犀角、羚羊、鳖甲、贝子解毒舒筋，散血消坚之味，协济桂枝、麻黄之力；参、苓、芍、归，又协济犀角、羚羊、鳖甲、贝子之力也。然痹湿外着，必有痰气内伏，有诸内，形诸外，是二陈、姜、半又不可缺，其吴茱萸下气逐痹，赤小豆利水泄热，薤白涤除陈垢，乌梅收敛脾津，各有所主。至于防风一味，乃卒伍卑贱之职，《千金》独取名方者，以《本经》主治恶风，风行周身骨节疼，为治风之专药。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防风散”。

36984 防风汤

【方源】方出《千金》卷七，名见《外台》

卷十八。

【组成】防己 蜀椒 细辛 桂心 麻黄 石膏各一两 独活 防风 黄芩 茵芋 葛根 芍药 芍药 甘草各一两 生姜 茯苓各三两 乌头二枚

【用法】上咬咀。以竹沥一斗，煮取四升，分六服，令一日一夜服尽。其间可常作赤小豆饮。

【主治】①《千金》：脚弱。②《普济方》：脚气痹弱，昼夜不安。

【临证举例】风毒脚弱 有人脚弱，先服常用竹沥汤四剂，未觉增损，作此方后，觉得力。

【宜忌】忌海藻、菰菜、猪肉、冷水、生葱、生菜、醋物。

36985 防风汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】防风散（《证治要诀类方》卷三）。

【组成】防风 麻黄 秦艽 独活各二两 当归 远志 甘草 防己 人参 黄芩 升麻 芍药各一两 石膏半两 麝香六铢 生姜 半夏各二两（一方用白术一两）

【用法】上咬咀。以水一斗三升，煮取四升，一服一升。初服厚覆取微汗，亦当两三行下，其间相去如人行十里久更服。

【主治】肢体虚风，微痉发热，肢节不随，恍惚狂言，来去无时，不自觉悟；亦治脚气缓弱。

【加减】有热，加大黄二两；先有冷心痛疾者，倍当归，加桂心三两，不用大黄。

【方论选录】《千金方衍义》：方中明言功用胜于续命、越婢、风引诸汤，考其药味与防风散、大鳖甲汤相同者。及方后又云，有热加大黄，有寒加桂心，总不出大鳖甲汤、防风散中之法。

36986 防风汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】防风 白术 知母各四两 生姜 半夏各五两 芍药 杏仁 甘草 芍药各三

两 桂心四两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】身体四肢节解如堕脱肿，按之皮陷，头眩短气，温温闷乱欲吐者。

【方论选录】《千金方衍义》：详本方见证，不独毒风外贼，兼有痰热内蕴，故于《金匱》桂枝芍药知母汤中退麻黄、附子之悍烈，进杏、半、芎藭之和平，以桂心、芎、芍内护营虚，防风、杏仁外泄卫实，白术、姜、半中启脾湿，妙在知母一味，滋桂心、姜、半之辛燥，甘草一味，和桂心、知母之刚柔，较《古今录验》尤为稳当。

36987 防风汤

《千金》卷十三。为《医心方》卷三引《集验方》“防风枳实汤”之异名。见该条。

36988 防风汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】防风

【用法】煎汁饮服。

【功用】解乌头、附子毒。

36989 防风汤

【方源】《永类铃方》卷十八引时贤方。

【异名】羌活酒（《普济方》卷三三九）。

【组成】防风五钱 羌活一钱半

【用法】上为细末，以黑豆一合炒焦，大烟出，投无灰酒，候沸定。以酒调药灌下，稍苏再灌。

【主治】妊娠中风，口噤，四肢强直反张。

【备考】本方原名“防己汤”，但方中无防风，据《普济方》改。

36990 防风汤

【方源】《伤寒微旨》卷上。

【组成】防风（去芦）半两 桔梗三分 甘草（炙）旋覆花各半两 厚朴（炒）三分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，加生姜一块如枣大（擘破），煎至七分，去滓温服。

【主治】中风。恶风，自汗出，两手脉浮数而缓。若寸脉力小尺脉力大，在清明以后至

芒种以前者。

【加减】如三五服后，寸脉力尚小，加荆芥穗五七枚同煎。

36991 防风汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防风（去叉） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）各三分 芎藭 防己 附子（炮裂，去皮脐） 人参 芍药 黄芩（去黑心） 桂（去粗皮） 杏仁（汤浸，去皮尖并双仁，炒） 甘草（炙）各半两 羚羊角（镑）一两 石膏（碎）三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（切），煎至八分，去滓；更入竹沥、葛汁各少许，再煎三五沸，温服，日二夜一。觉减损，更服后防己竹沥汤。

【主治】初得中风，四肢不收，心神昏愤，眼不识人，不能言语。服荆沥汤后，觉四体有异。

36992 防风汤

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷十九“防风散”之异名。见该条。

36993 防风汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防风（去叉）一两半 羌活（去芦头）一两 黄耆（炙，锉）二两半 五加皮（锉）一两半 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）一两半 丹参一两一分 酸枣仁（炒）一合 桂（去粗皮）一两半 赤芍药一两半 麻黄（去节，煎掠去沫，焙）一两一分 槟榔（煨，锉）一两 当归（切，焙）一两 木通（锉）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，空心温服，及晚食前再服。

【主治】肾中风，腰脚痠痹不仁，骨髓痠疼，不能久立，渐觉消瘦。

36994 防风汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】防风（去叉） 赤芍药 独活（去芦头） 黄芩（去黑心） 枸杞根 芎藭 防

己 白术 乌头(炮裂,去皮脐) 甘草(炙,锉) 茵芋各二两 麻黄(去根节) 生姜(切,焙)各三两 细辛(去苗叶) 桂(去粗皮) 白茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,研石膏一钱匕,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】卒中恶风,口噤不能言,肢体缓软,心神恍惚。

36995 防风汤

《圣济总录》卷六。为《圣惠》卷十九“防风散”之异名。见该条。

36996 防风汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】防风(去叉) 防己 升麻 桂(去粗皮) 麻黄(去根节,煎掠去沫,焙干) 芎藭各一两 羚羊角(镑)一两半

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,以水一盞,煎取六分,去滓,加竹沥半合,更煎三两沸,空心热服,日午及临卧各一服。

【主治】中风,口面喎斜,泪出失音。

36997 防风汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风(去叉)一两 芎藭一两半 麻黄(去节,煎,掠去沫,焙干)一两半 独活(去芦头)一两半 桂(去粗皮)一两 升麻一两 羚羊角(镑)一两

【用法】上为粗末。每用十钱匕,水三盞,煮取二盞,加竹沥一合,更煎三沸,去滓,分三服,日二夜一,微热服之。

【主治】偏风不随。

【加减】若手足冷,加生姜三两。

36998 防风汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风(去叉,锉) 独活(去芦头) 防己 秦艽(去苗土) 黄耆 芍药 白术 芎藭 远志(去心)各二两 石膏(碎)三两 升麻二两 石斛(去根,锉)三两 牛膝(去苗,酒浸,切,焙)二两 丹

参二两 陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两半 甘草(炙,锉)二两 厚朴(去粗皮,生姜汁炙五遍)二两 天门冬(去心,焙)二两 薏苡仁(炒)二两半 羚羊角(镑屑)二两 五加皮二两 熟干地黄(焙干)一两半 麻黄(去节,先煎,掠去沫,焙干)一两半 地骨皮二两 人参二两 茯神(去木)二两

【用法】上咬咀。每以六钱匕,水三盞,煎至一盞半,去滓,分温二服,空心、夜卧服之。

【主治】风痹,四肢不收,言语蹇涩。

【加减】若觉心中烦热,每煎将熟,别入竹沥一合,更煎三沸温服。

36999 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】防风(去叉)二两 白术一两 白鲜皮二两 桂(去粗皮)一两三分 黄耆(锉)二两 薏苡仁(炒)三两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盞半,加生姜三片,煎至一盞,去滓温服,日三夜一。

【主治】历节风,周身百节疼痛,腰脚痿弱。

37000 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】防风(去叉) 麻黄(去根节,先煎,掠去沫,焙) 石韦(去毛) 络石 桑根白皮 大腹皮 芎藭 生干地黄各一两半 附子(炮裂,去皮脐)二两 白术 桂(去粗皮) 羌活(去芦头) 牡丹皮 射干各一两 草豆蔻(去皮)四枚 桃仁二十枚(去皮尖双仁,炒)

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,同煎取八分,去滓温服。

【主治】风湿脚膝肿痛。

37001 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】防风(去叉) 五加皮(锉) 附子(炮裂,去皮脐) 草薢 薏苡仁 桂

(去粗皮)各一两 牛膝(酒浸,切、焙) 独活(去芦头) 赤茯苓(去黑皮) 当归(切,焙) 杜仲(去粗皮,炙) 海桐皮各一两半 木香 枳壳(去瓢,麸炒) 仙灵脾各半两

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一枣大(拍碎),同煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】风腿腿,肌肉虚满,四肢不收,骨节疼痛。

37002 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】防风(去叉) 益母草 苦参各三两 蒺藜子(炒)五两 荆芥穗二两 蔓荆实二两 枳壳(去瓢,麸炒)二两

【用法】上为粗末。每用三两,水一斗,煎至八升,乘热淋洗患处。

【主治】风瘙痒如虫行,或痒痹不仁。

37003 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】防风(去叉) 黄耆(锉) 犀角(镑) 升麻 漏芦(去芦头) 秦艽(去土)各一两半 乌蛇(酒炙,去皮骨) 芒消(研) 枳壳(去瓢,麸炒)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服,一日二次。

【主治】风瘙瘾疹,皮肤痒痛,心神烦闷。

37004 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】防风(去叉) 白术 桂(去粗皮)各一两 细辛(去苗叶)半两 赤芍药 黄芩(去黑心) 甘草(炙)各一两 麻黄(去根节,煮,掠去沫)三两 石膏(碎)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加大枣二枚(擘破),煎至八分,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】中风,头痛面赤,翕翕发热,恶风烦闷,身痛如碎。

37005 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】防风(去叉) 独活(去芦头) 羌活(去芦头) 柴胡(去苗) 白术 甘草(炙) 麻黄(去节)各一两 芎藭二两 荆芥穗 菊花各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,煎去七分,去滓,食后温服。

【主治】劳风壅滞,多痰逆头昏。

37006 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】防风(去叉) 甘草(炙) 黄芩(去黑心) 桂(去粗皮) 当归(切,焙) 白茯苓(去黑皮)各一两 秦艽(去苗土) 葛根各半两 杏仁五十枚(汤浸,去皮尖双仁,炒)

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏,酒半盏,加生姜三片,大枣一枚(去核),煎至一盏,去滓温服,一日三次。取汗为度。

【主治】中风,寒热时作。

37007 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】防风(去叉) 赤茯苓(去黑皮) 芎藭各二两 枳壳(去瓢,麸炒) 麻黄(去根节,先煎,掠去沫,焙)各一两半 前胡(去芦头)一两半 细辛(去苗叶)一两 石膏(研碎)二两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,加竹沥半合,再煎令沸,去滓温服,一日三次,不拘时候。

【主治】风头眩欲倒,眼旋脑痛。

37008 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】防风(去叉) 柴胡(去苗) 黄连(去须) 当归(炙) 枳壳(去瓢,麸炒) 大黄(锉,熬) 天雄(炮裂,去皮脐) 地骨皮各一两 桑根白皮(锉,炒) 羌活(去芦头) 芎藭各一两半 石膏(捶

碎)一两 旋覆花 桂(去粗皮) 菊花各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜半分(切),煎取八分,去滓温服。

【主治】风头痛。

37009 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】防风(去叉)一两 桂(去粗皮)一两 生干地黄(切,焙)一两 赤芍药一两 当归(切,焙)一两 吴茱萸(汤浸,洗七遍,焙干)半两 干姜(炮裂)半两 细辛(去苗叶)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】风入腹,疝痛拘急。

37010 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】防风(去叉) 地骨皮 王不留行 山梔子仁(微炒) 荆芥穗 恶实(炒)各一两 甘草(炙)三分 人参 生干地黄(焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,入恶实根二寸,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风热熏蒸,皮肤白癩。

37011 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】防风(去叉)一两 芎藭 黄耆(锉) 五味子 人参 茯神(去木) 独活(去芦头) 羚羊角(镑屑) 前胡(去芦头)各三分 细辛(去苗叶) 酸枣仁(微炒) 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加大枣三枚(擘破),同煎取七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝痹,头目昏塞,四肢不利,胸膈虚烦。

37012 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【异名】防风散(《杏苑》卷五)。

【组成】防风(去叉) 甘草(炙,锉)各一两 黄芩(去黑心)三分 当归(切,焙) 赤茯苓(去黑皮)各一两 秦艽(去苗土) 葛根(锉)各三分 桂(去粗皮) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各一两 麻黄(去根节,煎掠去沫,焙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,酒一盞,水一盞,加大枣三枚(擘破),生姜五片,同煎至一盞,去滓温服,日二夜一。

【主治】行痹,痛风,伤风寒热。

①《圣济总录》:行痹,行走无定。②《赤水玄珠》:痛风。③《医钞类编》:伤风寒热。

37013 防风汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】防风(去叉) 芎藭 麻黄(去根节)各一两 独活(去芦头) 桂(去粗皮) 前胡(去芦头) 五味子 附子(炮裂,去皮脐) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒) 人参 茯神(去木)各三分 细辛(去苗叶) 甘菊花 黄耆 山茱萸 甘草(炙,锉)各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服四钱匕,水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】肺中风寒湿,项强头昏,胸满短气,噎吸颤掉,言语声嘶,四肢缓弱,皮肤痞痹。

37014 防风汤

《圣济总录》卷十九。为《圣惠》卷十九“防风散”之异名。见该条。

37015 防风汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【异名】防风饮。

【组成】防风(去叉) 麻黄(去节,先煎,掠去沫,焙)各三两 石膏 黄芩(去黑心) 芎藭 当归(切,焙)各一两 杏仁(去双仁皮尖,熬)四十枚 桂(去粗皮) 熟干地黄(焙) 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，空心温服，一日二次。

【主治】风冷痹，身体不随，四肢痹麻，不觉痛痒，不能言语。

37016 防风汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】防风(去叉) 蕤苡仁各二两 麻黄(去根节，汤煮，掠去沫，焙干)四两 白术 芎藭 细辛(去苗叶) 羌活(去芦头) 茵芋(去粗茎) 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 狗脊(去毛) 革薢 侧子(炮裂，去皮脐) 杏仁(去皮尖双仁，炒微黄) 赤箭 桂(去粗皮)各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盞，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风寒湿痹，筋脉挛急，身体手足不随。

37017 防风汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】防风(去叉) 麦门冬(去心，焙) 山芋 大黄(锉，炒) 桂(去粗皮)各一两 白术 白附子(炮) 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 半夏(汤洗七遍，与生姜等分同捣，焙) 芎藭 肉苁蓉(酒浸，切，焙) 黄耆(锉) 远志(去心，焙) 干姜(炮)各三分 甘草(炙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(拍碎)，大枣二枚(去核)，同煎至八分，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】中风伤寒。

37018 防风汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】防风(去叉) 白术 附子(炮裂，去皮脐) 白鲜皮 黄耆 桂(去粗皮) 蕤苡仁各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分(拍碎)，同煎至半盞，去

滓温服，一日三次。

【主治】伤寒后，遍身骨节疼痛，脚膝无力。

37019 防风汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】防风(去叉) 芎藭 甘草(炙，锉) 人参 茯神(去木) 独活(去芦头) 前胡(去芦头)各一两 细辛(去苗叶) 菊花各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，早、晚食后各一次。

【主治】伤寒后，肝虚目暗，视物不明，或见黑花。

37020 防风汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】防风(去叉)一两 麻黄(去根节)三分 桂(去粗皮)二分 牛膝(去苗，酒浸，切，焙)一两 丹参半两 五加皮半两 杜仲(去粗皮，炙，锉)三分 芎藭三分 附子(炮裂，去皮脐)一两 细辛(去苗叶)半两 当归(切，焙)一两 芍药一两 羌活(去芦头)一两 续断一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盞半，加生姜半分(拍碎)，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后腰痛，或皮肉痹痹，腿膝疼痛，行履艰难，不可俯仰。

37021 防风汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】防风(去叉) 麻黄(去根节) 半夏(汤洗七遍去滑，切，焙) 秦艽(去苗土) 独活(去芦头)各二两 当归(切，焙) 远志(去心) 甘草(炙，锉) 防己 人参 黄芩(去黑心) 升麻 芍药各一两 石膏(碎)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加麝香末少许，生姜一枣大(拍碎)，煎至一盞，去滓温热服，不拘时候。

【主治】肝气壅逆，肢体沉重，面色多青，时欲嗔怒，甚者恍惚狂言，心神不安。

37022 防风汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【异名】防风散（《鸡峰》卷十一）。

【组成】防风（去叉） 桑根白皮 甘草各二两

【用法】上锉，米泔浸一宿，晒干，为粗末。每服三钱匕，水一盞，加黄蜡皂子大，同煎至七分，去滓温服。

【主治】风热咳嗽。

37023 防风汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】防风（去叉）半两 大枣七枚（去核） 桂（去粗皮） 麻黄（去根节） 当归（切，焙）各半两 槟榔（为末）一两 犀角（镑）一分 赤茯苓（去黑皮）半两

【用法】上药除槟榔外，锉如麻豆。每服五钱匕，水二盞，煎至一盞，去滓，入槟榔末一钱匕，再煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】风毒脚气，无力，痹痛疼痛，四肢不仁，失音不语，及风毒冲心。

37024 防风汤

《圣济总录》卷八十三。为原书卷八十一“防风麻黄汤”之异名。见该条。

37025 防风汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】防风（去叉） 防葵（生用） 泽泻 白术 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 黄耆 麻黄（去根节） 独活（去芦头） 赤茯苓（去黑皮）各半两 大豆（炒熟）三合 赤小豆（炒熟）半升 桑根白皮（锉，炒）四两 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 泽漆 麦门冬（去心，焙） 猪苓（去黑皮）各三分 大戟（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分（拍破），煎至七分，去滓，空心，日午温服。

【主治】脚气肿满，变为风水。

37026 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】防风（去叉）一两半 远志（去

心） 黄芩（去黑心） 人参 桔梗（锉，炒） 细辛（去苗叶） 芍药各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食后、临卧温服。

【功用】泻肝补胆。

【主治】蟹目疼痛。

37027 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】防风（去叉） 甘菊花 菱蕤 旋覆花 升麻 决明子（微炒） 秦皮（去粗皮，锉） 黄连（去须） 梔子仁 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙令赤，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：肝脏风热，冲目赤涩痛，风泪肿合。②《普济方》：风热冲肝，目多倒睫。

37028 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】防风（去叉） 甘菊花各三分 芎藭 赤芍药各半两 黄芩（去黑心）一两 羚羊角（镑）半两 细辛（去苗叶）三分 枳壳（去瓤，麸炒）半两 黄连（去须）三分 甘草（炙）半两 石膏（碎）一两 人参半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食后、临卧温服。

【主治】风热眼赤，痛痒不定。

37029 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】防风（去叉） 白鲜皮 独活（去芦头） 陈橘皮（汤浸，去白）各一两 芎藭一两半 甘草（炙，锉） 细辛（去苗叶）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】肝肾风气久积，客于目不散，目干涩痛。

37030 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】防风(去叉)一两一钱 芎藭 甘草(炙, 锉) 白茯苓(去黑皮) 独活(去芦头) 前胡(去芦头)各一两 人参 细辛(去苗叶)各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加大枣二枚(擘), 煎至七分, 去滓, 食后温服, 一日二次。

【主治】肝虚寒, 目暗眊眊, 视物不明, 并生黑花。

37031 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】防风(去叉) 芎藭 白鲜皮各一两 细辛(去苗叶) 甘草(炙) 独活(去芦头) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 加大枣二枚, 竹叶十片, 煎至八分, 去滓, 下蜜半匙, 再煎沸, 食后、临卧温服。

【主治】肝虚寒, 目视眊眊。

【备考】方中独活, 《普济方》作“羌活”。

37032 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】防风(去叉)三分 甘菊花 羌活(去芦头) 藁本(去苗土)各一两 石膏二两 旋覆花 蔓荆实 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕, 以水一盞, 加生姜一枣大(切), 煎取七分, 去滓, 食后温服, 一日二次。

【主治】风热上攻, 眼眉骨连头疼痛。

37033 防风汤

《圣济总录》卷一〇九。为《圣惠》卷三十三“羚羊角散”之异名。见该条。

37034 防风汤

《圣济总录》卷一〇九。为原书同卷“除风汤”之异名。见该条。

37035 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】防风(去叉)二两 地骨皮 远志(去心) 人参 黄耆(锉) 白茯苓(去黑

皮)各一两 知母 大黄(锉碎, 炒)各二两

【用法】上为粗末。每服一钱匕, 水一盞, 煎至五分, 去滓, 食后、临卧温服。

【主治】眼漏睛脓出。

37036 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】防风(去叉)二两 犀角(镑) 知母 黄芩(去黑心) 玄参各一两 桔梗(锉, 炒) 羚羊角(镑)各一两半 大黄(炒)半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕, 水一盞, 煎至五分, 食后去滓温服, 一日二次。

【主治】眼睑生风粟。

37037 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】防风(去叉) 羌蔚子 五味子 知母(焙) 桔梗(炒) 玄参 车前子 大黄(锉, 焙) 细辛(去苗叶) 黄芩(去黑心)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓, 食后、临卧温服, 一日二次。

【主治】内障圆翳, 及涩翳。

37038 防风汤

《圣济总录》卷一一六。为《圣惠》卷三十七“木通散”之异名。见该条。

37039 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】防风(去叉)半两 菊花一两 升麻 独活(去芦头) 知母(焙) 黄芩(去黑心) 玄参 藁本(去苗土) 大黄(锉, 炒) 梔子(去皮) 前胡(去芦头) 桔梗(锉, 炒) 甘草(炙, 锉) 麦门冬(去心, 焙) 生干地黄(焙)各半两

【用法】上为粗末。每用三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食后服, 一日三次。

【主治】脾胃蕴结热气, 复为风冷相搏, 唇边生核, 结硬疼痛。

37040 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】防风(去叉) 当归(切, 焙) 芎藭 细辛(去苗叶) 各一两 附子(炮裂) 半两

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每用药五钱匕, 以水一盞, 加生姜五片, 煎十余沸, 去滓, 热嗽冷吐。

【主治】牙齿疼痛。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“防风散”。

37041 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】防风一两 蔓荆子一两 细辛半两 川升麻半两 地骨皮半两 赤茯苓半两 芎藭一两

【用法】上锉细和匀。每用半两, 以水一大盞, 酒一盞, 同煎至一盞, 去滓, 热含就于患处, 良久冷即吐, 含尽为度, 每日二次。

【主治】齿根出露, 摇动疼痛。

37042 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】防风(去叉) 柴胡(去苗) 白芷 桔梗(炒) 木通(锉) 当归(切, 焙) 各一两半 羌活(去芦头) 麻黄(去根节, 煎, 掠去沫, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 甘草(炙, 锉) 各一两

【用法】上咬咀。如麻豆大。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓温服, 食后、临卧各一次。如欲出汗, 空心并两服, 后投以热姜稀粥, 盖复取汗, 慎外风。

【主治】风毒中人, 留血脉不散, 与荣卫相搏, 结成风疽。身体烦热, 昏冒肿痛。

37043 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】防风(去叉) 威灵仙 赤芍药 牡丹皮各一两 乌头(炮裂, 去皮脐) 半两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人血风走注, 上焦不利, 头目昏重, 少力多倦, 浑身刺痛, 四肢麻木。

37044 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】防风(去叉) 人参 远志(去心) 桂(去粗皮) 独活(去芦头) 甘草(炙) 各一两 茯神(去木) 一两半 细辛(去苗叶) 干姜(炮) 白术(锉, 炒) 酸枣仁(炒) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎七分, 去滓温服, 日二夜一。

【功用】安神定志, 解风邪。

【主治】妇人惊悸。

37045 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】防风(去叉) 羚羊角(镑) 地榆 赤芍药各一两半 茯神(去木) 鳖甲(去裙襴, 醋炙) 熟干地黄(焙) 枳壳(去瓢, 麸炒) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓温服。

【主治】妇人月水不调, 脐腹胀满, 四肢寒热, 不嗜饮食。

37046 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】防风(去叉) 一两半 芎藭一两 吴茱萸(汤浸, 焙干, 炒) 一分 天雄(炮裂, 去皮脐) 人参 山芋 秦艽(去苗土) 各三分 狗脊(去毛, 锉, 炒) 白薇 干姜(炮) 干漆(炒烟出) 桂(去粗皮) 各半两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 大枣一枚(擘破), 煎七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后中风偏枯, 疼痛拘挛, 言语謇涩。

37047 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】防风(去叉) 独活(去芦头) 黄

耆 羚羊角(镑) 枳壳(去瓢,麸炒) 乌头(炮裂,去皮脐) 旋覆花 生干地黄(焙) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,薄荷三叶,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后伤风冷,头疼痛,目眩恶心。

37048 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】防风(去叉) 升麻 黄芩(去黑心) 芍药 石膏(生) 葛根(锉) 芎劳 羌活各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓服,不拘时候。

【主治】产后风热,头痛,目掣动。

37049 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】防风(去叉) 黄耆(锉) 甘草(炙,锉) 人参 连翘各半两 山梔子仁一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水八分,煎至六分,去滓温服。

【功用】止烦渴,除风疹,治惊悸。

【主治】小儿风热,惊悸。

37050 防风汤

《圣济总录》卷一八〇。为《圣惠》卷八十九“甘菊花散”之异名。见该条。

37051 防风汤

《圣济总录》卷一八一。为《圣惠》卷八十九“防风散”之异名。见该条。

37052 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】防风(去叉) 白茯苓(去黑皮) 升麻 贝母(去心) 蒺藜子(炒去角) 大黄(锉,炒) 甘草(炙,锉)各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水七分,煎至四分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】小儿瘾疹,风痒。

37053 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】防风(去叉) 当归(切,焙) 泽泻 威灵仙(去土) 甘草(炙,锉) 黄连(去须) 虎杖各一两半 石韦(去毛) 天门冬(去心,焙) 白石脂(研) 槐实(炒) 地榆各二两 石膏(捶碎)三两 生地黄(切,焙)六两 大黄(锉,炒) 黄芩(去黑心) 犀角(镑) 消石(研)各一两

【用法】上咬咀。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜一分(拍碎),同煎取八分,去滓温服。

【主治】石药发动,上冲头面,疼痛浮肿,心神恍惚。

37054 防风汤

【方源】《幼幼新书》卷三十七引张涣方。

【组成】防风 鼠粘子 荆芥穗 人参(去芦头)各一两 甘草(炙) 天麻各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水八分一盞,加生姜、薄荷各少许,煎五分,去滓温服。

【主治】小儿瘾疹,疮疥。

37055 防风汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】石斛(洗,去根)一两半 熟干地黄(酒洒,九蒸九晒,焙干) 杜仲(去皮,锉如豆,炒令黑) 丹参各一两一分 防风(去叉股) 川芎(洗) 麦门冬(用水泡,去心) 桂枝(不见火) 川独活(黄色如鬼服者,去芦,洗,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱,水一大盞半,加大枣二枚,同煎八分,去滓温服。

【主治】中风内虚,脚弱,语謇。

【方论选录】《本事方释义》:石斛气味甘平微苦咸,入足太阴、少阴;干地黄气味甘寒微苦,入足少阴;杜仲气味辛平微温,入足少阴、厥阴;丹参气味苦微寒,入心;防风气味苦辛甘温,入手、足太阳;川芎气味辛温,入足少阳、厥阴;麦门冬气味甘凉微苦,入手太阳、少阴;桂心气味辛甘大热,入足少阴、厥阴;独活气味苦辛甘平,入足少阴、厥阴之风药。因内虚中风,语謇脚弱,表平

温经之品，得风药之引入经络，祛邪扶正，其功岂不伟哉！

37056 防风汤

《本事》卷六。为《圣济总录》卷十三“防风散”之异名。见该条。

37057 防风汤

【方源】《宣明论》卷一。

【组成】黄芩 人参 甘草(炙) 麦门冬(去心)各一两 川芎一两 防风(去芦)一两半

【用法】上为末。每服二钱，沸汤点之，食后服，一日三次。

【主治】鼻渊脑热，渗下浊涕不止，久而不已，必成衄血之疾。

【备考】《医学六要·治法汇》有黄连，无黄芩。《嵩崖尊生》有沙参，无人参。

37058 防风汤

【方源】《三因》卷二。

【组成】防风(去叉) 泽泻 桂心 杏仁(麸炒，去皮尖) 干姜(炮) 甘草(炙)各等分

【用法】上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，食前服。

【主治】中风挟暑，卒然晕倒，面青黑，四肢缓弱，喜伸欠，口喎斜，四肢不仁，好笑。

37059 防风汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】防风 羌活 独活 川芎各等分

【用法】上咬咀。每服五钱 水一盞半，煎至七分，去滓温服。二三服后，宜调蜈蚣散。

【主治】破伤风，同伤寒表证，未传入里，宜急服此药。

37060 防风汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】苍术四两 防风三两 当归一两半 羌活一两半

【用法】上为粗末。每服一二两，水三盞，煎至一盞半，取清，连续常服，不拘时候。

【功用】正脾胃之气，兼除风邪。

【主治】产后经水适断，感于异证，手足抽

搐，咬牙昏冒，服增损柴胡汤及秦艽汤后，前证已退，用此调治。

37061 防风汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】解毒防风汤(《小儿痘疹》)。

【组成】防风一两 地骨皮 黄耆 芍药 枳壳 荆芥穗 牛蒡子各半两

【用法】上为细末，温水调下；或为粗末，煎服二三钱，更妙。

【功用】安里解毒。

【主治】①《保命集》：小儿斑疹。②《小儿痘疹》：小儿痘疮毒气炽盛。

37062 防风汤

《女科百问》卷下。为《圣惠》卷七十八“防风散”之异名。见该条。

37063 防风汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】防风 麻黄 独活 秦艽(去芦) 黄芩 石膏 当归 白术各半两

【用法】上为粗末，加半夏片子搅匀，每服四钱，水二中盞，加生姜七片，煎至一盞，去滓，取清汁六分，加麝香少许，带热食后服。

【主治】①《儒门事亲》：风寒湿痹，腰脚沉重浮肿，夜则痛甚，两足恶寒，饮食转减，肢体瘦乏。②《普济方》：诸风疾。

37064 防风汤

《妇人良方》卷三。为《普济方》卷一〇五引《指南方》“防风散”之异名。见该条。

37065 防风汤

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】黄耆散(《普济方》卷三二二)。

【组成】黄耆一两 白芍药 防风各三分 甘草半两 当归 生干地黄各三分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】劳气，此病因失血，荣卫损也。食后身疼倦，夜间盗汗。

37066 防风汤

【方源】《医方大成》卷五引《济生》。

【组成】防风(去芦)二两 川独活(去芦,洗) 川当归(去芦,洗) 赤茯苓(去皮) 秦艽(去芦,洗) 赤芍药 黄芩各一两 桂心(不见火) 杏仁(去皮尖) 甘草(炙)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,煎至七片,去滓温服,不拘时候。

【主治】血痹,肌痹,皮痹。

①《济生方》:血痹,皮肤不仁。②《内经拾遗》:肉苛,肌肉痿重,痛痒不知。③《医学入门》:肌痹,皮痹。

37067 防风汤

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】防风散(《袖珍小儿》卷二)。

【组成】羌活 防风 枳实各半两 川芎 甘草(炒) 大黄(湿纸煨)各二钱半

【用法】上锉末。每服三字,加生姜、大枣,水煎服。

【主治】小儿惊风,风热痰壅,大便不通。

37068 防风汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】防风(去芦) 白术 北芍药(白者) 当归(洗) 人参 牛膝(酒浸) 杜仲(制) 黄耆(炙) 熟地黄 粉草 川芎 羌活各等分

【用法】上为末。每服三钱,水一盞,加生姜三片,枣子一个,煎七分,不拘时候服。

【主治】中风后,足履缓弱疫痹,精神昏倦。

37069 防风汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】北防风 川升麻 川独活 川羌活 北芍药 甘草各等分

【用法】上锉散。每服二钱,水一盞半,煎至八分,随证上下,分空心、食后通口服。如觉气通逐,旋服活血丹、地仙丹之类。

【主治】手足不仁,或肿不已。

37070 防风汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】防风(去芦) 川芎 大黄 白芷

黄芩 甘草各半两 细辛(去叶)二钱 薄荷叶二钱半

【用法】上为末。每服一钱,用温汤调下,不拘时候。

【主治】小儿急惊后,余热未退,时复手足抽掣,心悸不宁;及风邪中入肺经,两目视人开眨不常。

【备考】《奇效良方》有茯苓,无大黄。

37071 防风汤

【方源】《普济方》卷二三一引《经验良方》。

【组成】防风 川芎各二钱五分 甘草一钱 枇杷叶(去毛)一两

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,煎至九分,下硫黄丸五十丸,空心服。

【主治】劳嗽,缘正气不足,感寒而作。虚喘气粗,喉中涎响,不可睡卧。

37072 防风汤

《医学纲目》卷二十七。即《内外伤辨》卷中“通气防风汤”。见该条。

37073 防风汤

《普济方》卷八十四。即方出《圣惠》卷三十二,名见《圣济总录》卷一一〇“洗眼秦皮汤”。见该条。

37074 防风汤

《普济方》卷八十四。即《秘传眼科龙木论》卷四“治风黄耆汤”。见该条。

37075 防风汤

【方源】《普济方》卷一三六。

【组成】防风二两(去芦头) 芍药二两 羌活一两 熟地黄二两(切,焙) 甘草(炙)半两

【用法】上为粗末。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,同煎至七分,去滓温服,日三夜一。取愈为度。

【主治】伤寒头痛。

37076 防风汤

【方源】《普济方》卷一四二。

【组成】防风 甘草各一两(炙) 天南星 生姜二两(炙)

【用法】以水四升，煮取二升，去滓，每次温服七合，一日三次。

【主治】少阳病，筋牵急而疼痛，发作有时，此为痹也。

【备考】方中天南星用量原缺。

37077 防风汤

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】防风一两 猪肾一具 芎藭 橘皮 泽泻 桂心 石斛 生姜 丹参 茯苓 通草 半夏各二两 干地黄

【用法】上咬咀。以水一斗半，先煮肾，取三升，去肾下药，煮取二升七合，去滓，分三服。

【主治】左胁气冲膈上，满头上有风如虫行，手足顽痹，鼻塞，脚转筋，不能屈伸，两目时痛。

【备考】方中干地黄用量原缺。

37078 防风汤

【方源】《普济方》卷三三八。

【组成】防风（去芦，炒） 藁本（去芦） 独活（去芦） 细辛（去叶） 甘草 阿胶（炒令沸燥）各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞煎，热服之。

【主治】妊娠身痛。

37079 防风汤

《普济方》卷三五〇。为方出《经效产宝》卷中，名见《圣惠》卷七十四“防风散”之异名。见该条。

37080 防风汤

【方源】《医统》卷十一。

【组成】防风一钱半 独活 当归 川芎 秦艽 赤芍药 黄芩各七分 甘草（炙）五分 细辛 杏仁各一钱

【用法】水二盞，加生姜五片，煎服。

【主治】血痹皮肤不仁。

37081 防风汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】防风 荆芥 葛根

【主治】风寒发热，风邪伤卫，有汗恶风。

37082 防风汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】防风 当归 赤茯苓 杏仁 秦艽 葛根 羌活 桂枝 甘草

【主治】风痹。风寒攻痛，上下左右行而不动。

37083 防风汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】防风 葛根

【主治】外感风泻。自汗头汗，恶风发热，头痛额疼，泻下水谷，或下清水，右关脉弦。

37084 防风汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】防风 葛根 柴胡 桂枝 甘草 白芍药

【主治】风气腹痛，腹中攻注，或腹中作响，大便作泻，寒热脉浮。

37085 防风汤

【方源】《诚书》卷十六。

【组成】荆芥 木通 石菖蒲 防风 桔梗各五分 山楂一钱 郁金（磨）三分

【用法】水煎服。

【主治】小儿客忤。

37086 防风汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】防风 川芎 黄芩 桔梗 甘草 大力子

【主治】①《证治汇补》：统治鼻病在标者。②《医略六书》：外感鼻赤，脉浮微数者。

【方论选录】《医略六书》：防风解散风邪于外，黄芩清降肺热于内，川芎活血调营，桔梗开提清肝，大力子疏风解热，生甘草泻火缓中也。水煎温服，使风火并解，则肺气肃清而鼻赤无不退矣。此疏风解热之剂，为邪郁鼻赤之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

37087 防风汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】防风 荆芥 羌活 桂枝 薄荷

甘草

【主治】自汗畏风，虽炎天必须棉衣。

37088 防风汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】防风 柴胡 炒白术 木香 木通 炒厚朴 陈皮 甘草

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿风泻。及大肠受风，或泻沫，或黄白冻，兼腹痛者。

37089 防风汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】防风 木香 厚朴（炒） 白芍（酒炒） 甘草 苍术（炒） 砂仁 陈皮 麦芽

【用法】生姜一片为引。

【主治】因受冷，腹痛忽然而作，或兼泄泻者。

37090 防风汤

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】防风 白芷 甘草 赤芍 川芎 当归尾各二钱 雄猪蹄一节

【用法】加连须葱白五根，用水三大碗煎。以绢片蘸水洗之，拭干，然后上药。其深曲处，以羊毛笔洗之。

【主治】痈疽已溃未收口者。

37091 防风汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】防风一钱半 羌活一钱半 桂枝一钱 当归二两 川芎一钱 赤苓一钱半 秦艽一钱半 甘草五钱

【用法】水、酒各半煎，去滓温服。

【主治】风痹，行走掣痛，脉浮者。

【方论选录】防风行气于肌表而邪自散，羌活除痛于百节而痹自舒，桂枝温营散邪，秦艽活络祛风，当归养营却痹，川芎活血定疼，赤苓渗湿，营气清和，甘草缓中。风邪解散，俾行痹外解，则血脉融和，而掣痛无不自平矣。此祛风活血之剂，为行痹掣痛之专方。

37092 防风汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】防风一钱半（砂糖炒） 独活一钱半（盐水炒） 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 人参一钱半 当归三钱 甘草一钱半（炙）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后中风，项背强急，脉浮濡涩者。

【方论选录】产后血虚受风，不能养筋脉，故项背强急，转动不便焉。方中防风祛头项之风，砂糖炒以引入血分，独活祛脊背之风，盐水炒以直入少阴，川芎行血中之气，白芍敛经脉之阴，人参扶元气以内托，当归养血脉以荣筋，炙草缓中和胃也。水煎温服，务使经血充润，则风邪外解而筋脉得养，项背柔和，安有强急之患乎？

37093 防风汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】防风一钱半 当归三钱 麻黄一钱（炒） 石膏三钱 川芎一钱 白芍一钱半（酒炒） 秦艽一钱半 羚羊角一钱 黄芩一钱半（酒炒） 甘草一钱半

【用法】水煎，去滓，冲竹沥三匙，姜汁一匙，温服。

【主治】产后癰疽，脉浮数大者。

【方论选录】产后血燥风淫，风火内炽，伤厥阴而筋脉失养，故癰疽不已。方中麻黄开表逐风，石膏清里泻火，防风疏风于外，黄芩清热于膈，当归养血以润经脉，白芍敛阴以和血脉，小川芎活血行血中之气，羚羊角泻火熄外淫之风，秦艽祛风活血，甘草泻火缓中也。水煎，入竹沥以润液，姜汁以散痰，使火化风消，则痰行液润而筋脉柔和，何癰疽之不痊哉？

37094 防风汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】羌活 独活 荆芥 防风 芍药 甘草

【主治】太阳中风，身热头痛，自汗。

37095 防风汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】防风 荆芥 蔓荆子 川芎 白芷 黄芩 木贼 羌活 金银花

【主治】风泪初起。疹正潮时，冷风入眼，或扇风入眼，或冷水洗眼，致余毒留于锐眦，蕴结不散，迎风流泪，遇夏暂愈，逢冬益甚，久之则四季常流，遂成终身风泪。

37096 防风汤

《医学集成》卷二。为《活幼口议》卷二十“小防风汤”之异名。见该条。

37097 防风汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】防风 人参 黄耆 当归 生地 白芍 黄芩 黄连 黄柏 知母 麦冬 白及 百合 甘草

【用法】加丝瓜近根三五尺，煨存性，和酒冲药服。

【主治】脑漏。鼻流臭脓，时时脑痛。

37098 防风饮

【方源】《外台》卷十五引《延年秘录》。

【异名】防风饮子（《奇效良方》卷二十五）。

【组成】防风 人参 橘皮各二两 白术 茯神各三两 生姜四两

【用法】上切。以水六升，煮取三升，去滓，分温四服，中间任食，一日令尽。

【主治】风痰气，发即头旋，呕吐不食。

【宜忌】忌大醋、桃、李、雀肉、蒜、面等物。

37099 防风饮

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风（去叉） 白术 芎藭 白芷 牛膝（切，酒浸，焙） 狗脊（去毛） 萆薢 葛根（锉） 人参 羌活（去芦头） 薏苡仁各一两 杏仁（去皮尖双仁，炒）二两 麻黄（去节，先煮去上沫，焙） 石膏 桂（去粗皮）各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盂半，加生姜半分（切），煎取八分，去滓，空

腹温服。

【主治】偏风，半身不随，筋脉抽牵，行履不得。

37100 防风饮

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】防风（去叉） 当归（切，焙） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙） 白术 赤茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 山茱萸 黄芩（去黑心）各一两 人参 甘草（炙） 大黄（锉，炒）各三分 熟干地黄（焙）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盂半，加大枣二枚（擘破），生姜半分（切），煎至八分，去滓温服，空心，日晚各一次。

【主治】中风发热，无汗，肢节烦疼，腹内急痛，大小便秘涩。

37101 防风饮

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】防风（去叉）一两 龙骨（去土）二两 升麻 赤芍药 黄芩（去黑心）各一两 葛根（锉） 石膏（碎）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，煎至一盂，加菖蒲半合，更煎一二沸，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】首风，脑项掣痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防风散”。

37102 防风饮

《圣济总录》卷二十。为原书同卷“防风汤”之异名。见该条。

37103 防风饮

《圣济总录》卷一〇七。为《圣惠》卷三十二“防风散”之异名。见该条。

37104 防风饮

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】防风（去叉） 升麻 桂（去粗皮） 白石脂（研） 当归（切，焙） 槟榔（锉） 桑根白皮（锉，炒） 干木瓜 人参 黄连（去须） 羌活（去芦头） 芎藭

(锉) 天雄(炮裂, 去皮脐)各二两 黄芩(去黑心)一两 远志(去心)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 加生姜五片, 煎取七分, 去滓温服。

【主治】齿痛舌痒, 食物不得。

37105 防风饮

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】人参 当归 黄耆 甘草各八分 防风 黄柏各五分 蔓荆子 细辛各三分

【用法】水煎, 食后温服。

【主治】拳毛倒睫外障。

【宜忌】须避风忌口。

37106 防风饮

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】四君子汤加防风 羚羊角 犀角 苡仁 大黄 川芎 当归 牛膝 杏仁 麻黄 麦冬 半夏 生姜

【用法】水煎服。

【主治】肝风挛痛, 痰壅食少。

37107 防风饮

《中国医学大辞典》。即《张氏医通》卷十五“防风饮子”。见该条。

37108 防风饼

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】防风(去叉) 鸡冠花 续断 甘草(炮) 天麻 人参各半两

【用法】上为末, 以油饼剂三个, 入药三钱匕, 分做三个油饼。早晨、日午、近晚以淡粥送下。

【主治】肠风泻血。

37109 防风酒

【方源】《千金》卷三。

【组成】防风 独活各一斤 女萎 桂心各二两 茵芋一两 石斛五两

【用法】上咬咀, 以酒二斗, 渍三宿。初服一合, 稍加至三四合, 每日三次。

【主治】产后中风。

37110 防风酒

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风(去叉)二两 白术一两半

山茱萸(并子用)一两半 山芋(干者)一两半 附子(炮裂, 去皮脐)一两半 天雄(炮裂, 去皮脐)一两半 细辛(去须叶, 轻炒)一两半 独活(去芦头)一两半 秦艽(去土)一两半 茵芋(去粗茎)一两半 杏仁(汤浸, 退去皮尖双仁, 炒)一两半 紫巴戟(去心)二两 桂(去粗皮)二两 麻黄(去节, 先煎去沫, 焙干用)二两 生姜(切, 焙)二两 磁石(生, 捶碎如大豆粒, 浸去赤汁)半斤 薏苡仁(炒)三两 生地黄(净洗, 细切, 焙)二两半

【用法】上锉, 如麻豆大, 生绢囊盛, 以无灰清酒三斗, 浸六七日。空心温饮四合至五合, 以知为度。

【主治】肉苛。荣虚卫实, 肌肉不仁。

37111 防风酒

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】防风(去叉, 锉碎)一斤 天麻(锉碎)五两 黍米一石 枸杞根(刮去皴皮, 去心, 锉碎用)五斤 好面曲十五斤

【用法】上将防风、天麻、枸杞根三味, 以水六斗, 煮取三斗, 去滓, 置于不津器中; 将黍米依造酒蒸饷, 蒸讫, 入曲末拌, 分三酸, 如常法, 又取槐白皮一斤(细锉), 并用三年纯黑猫儿一个, 去皮肠肚外烂煮, 同锉槐白皮相和入酒, 酒熟压去糟。每服温饮三四合至五合, 日二夜一。

【主治】恶风癩病。

37112 防风散

【方源】方出《千金》卷五, 名见《圣惠》卷八十二。

【组成】防风一两半 柏子仁 白及各一两

【用法】上为末。以乳和敷囟上, 每日一次。

【主治】小儿囟开不合。

37113 防风散

【方源】《千金》卷十三。

【组成】防风五两 桂心 天雄 细辛 朱砂 干姜 人参 乌头 附子各二两 蕤

草 茯苓 当归各二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】头面风在眉间，得热如虫行，或头眩目中泪出。

【方论选录】《千金方衍义》风眩泪出，乃风毒外扰，所以眉间如虫行状。故用三建汤之天雄、乌、附佐莽草、辛、防以搜风毒，参、苓、干姜兼当归、桂心以温血气，丹砂一味安镇心神，不使毒邪干犯君主也。

37114 防风散

【方源】《千金》卷十三。

【组成】防风二两 泽泻 细辛 附子 薯蓣 茯苓 天雄各一两 白术二两半 桂心一两半 干姜半两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，当令酒气相接，则脱巾帽，解发梳头百过，复投一升酒，便洗手足，须臾自热，解发以粉粉之，快然，便熟眠愈。亦可洗头面汗出。

【主治】风头眩，恶风，吐冷水，心闷。

【方论选录】《千金方衍义》：风眩恶风，吐水心闷，此阳虚水停心下。故用五苓散中之四并雄、附、姜、辛以散水逆，薯蓣以疗虚风，防风以祛风湿也。至于方后服法，岂非宿有成验而为详述如此。

【备考】方中泽泻，《千金翼》作泽兰，天雄作人参。

37115 防风散

【方源】《千金》卷十三。

【组成】防风二两 白芷一两 白术三两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】头面遍身风肿。

37116 防风散

【方源】《千金翼》卷十六。

【组成】防风 蜀椒（去目、闭口者，汗） 麦门冬（去心）各一两 天雄（炮，去皮） 附子（炮，去皮） 人参 当归各五分 五味子 干姜 乌头（炮，去皮） 细辛 白术

各三两 柴胡 山茱萸 莽草 麻黄（去节） 桔梗 白芷各半两

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三次。不知稍增，以知为度。

【主治】风所为，猝起眩冒不知人，四肢不知痛处，不能行走，或身体偏枯不遂，口吐涎沫出，手足拘急。

37117 防风散

【外台】卷十。即《千金》卷八“八风防风散”。见该条。

37118 防风散

【方源】方出《经效产宝》卷中，名见《圣惠》卷七十四。

【异名】防风汤（《普济方》卷三五〇）。

【组成】防风 葛根 芎藭 干地黄各八分 麻黄（去节） 甘草 桂心 独活 汉防己各六两 杏仁五个（去尖）

【用法】以水八升，煮麻黄去沫后，下诸药，煎取三升，分温三服。

【主治】产后中风，腰背强直，时时反张。名曰风痉。

【宜忌】《普济方》：有汗者，不可服。

37119 防风散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】防风三分（去芦头） 细辛三分 白茯苓三分 柏子仁三分 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 山茱萸三分 蔓荆子半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一中盏，加大枣三枚，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝脏不足，两胁胀满，筋脉拘急，不得喘息，四肢少力，眼目不利。

37120 防风散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】防风三分（去芦头） 麻黄二分（去根节） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 白术半两 赤茯苓一两 芎藭半两 杏仁三分

(汤浸,去双仁,麸炒微黄) 麦门冬一两(去心) 当归半两(锉,微炒) 川大黄半两(锉碎,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 犀角屑一两

【用法】上为末。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,同煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝风,筋脉拘挛,四肢疼痛,心膈痰壅,不欲饮食。

【备考】《普济方》有人参半两(去芦头)、牛膝一两(去苗)、薏苡仁一两、羚羊角屑一两。

37121 防风散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】防风麻黄散(《校注妇人良方》卷三)。

【组成】防风三分(去芦头) 麻黄三分(去根节) 人参三分(去芦头) 芎藭三分 附子三分(炮裂,去皮脐) 桂心三分 羚羊角屑三分 黄耆三分(锉) 赤茯苓三分 酸枣仁二分(微炒) 白术三分 独活三分 甘草半两(炙微赤,锉) 桑根白皮三分(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾脏中风,手足缓弱,舌强语涩,胸膈烦闷,智意恍惚,身体沉重。

37122 防风散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】防风三分(去芦头) 人参三分(去芦头) 赤茯苓三分 贝母三分(煨令微黄) 前胡三分(去芦头) 半夏三分(汤浸七遍去滑) 芎藭三分 木香二分 天麻三分 羌活三分 桂心三分 甘菊花三分 细辛三分 附子三分(炮裂,去皮脐) 麻黄二分(去根节) 藁本三分 桑根白皮三分(锉) 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,薄荷二七叶,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺脏中风,气攻背痛项强,皮毛焦枯,头疼鼻塞,四肢不利,遍身瘙痒。

【宜忌】忌热面、鸡、猪、鱼等。

37123 防风散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】防风一两(去芦头) 木通一两(锉) 麦门冬一两(去心) 川升麻一两 甘草三分(炙微赤,锉) 虎杖一两(锉) 石膏二两 葛根一两(锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒阳痉,壮热不歇,筋脉拘急,牙关急痛。

37124 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】防风汤(《圣济总录》卷五)。

【组成】防风一两(去芦头) 羚羊角屑一两 独活一两 赤箭一两 当归一两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 秦艽半两(去苗) 麻黄二两(去根节) 桂心一两 前胡半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,人生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:中风失音不语,两目不开,短气欲死。②《圣济总录》:中风不语,两目不开,手足抽掣,发歇往来,昏塞涎潮。

37125 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】防风一两(去芦头) 赤芍药一两 葛根一两(锉) 独活一两 茵芋一两 甘草一两(炙微赤,锉) 芎藭一两 细辛一两 白术一两 麻黄一两(去根节) 羚羊角屑一两 人参一两(去芦头) 石膏二两 汉防己一两 川乌头一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，加竹沥一合，更煎一两沸，放温，不拘时候，拗开口灌之。

【主治】中风，口噤不开，烦热闷乱。

37126 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】防风汤（《圣济总录》卷六）。

【组成】防风一两（去芦头） 麻黄二两（去根节） 白术一两 黄芩一两 赤芍药一两 桂心一两 汉防己一两 芎藭一两 人参一两（去芦头） 甘草一两（炙微赤，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风癰。舌强不能言，四肢拘急，迷闷不识人。

【宜忌】服后有汗，宜避风为妙。

37127 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】防风一两（去芦头） 羌活二两 川升麻一两 桂心一两 芎藭二两 羚羊角屑三分 麻黄一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 薏苡仁一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，加竹沥一合，重煎一二沸，不拘时候稍热服。如人行五七里再服，以衣盖之，汗出为度。

【主治】中风口面喎僻，手足不遂，风入于脏，则语不得转，心神昏闷。

37128 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】防风一两（去芦头） 白术一两 芎藭一两 细辛一两 羌活一两 茵芋一两 牛膝一两（去苗） 狗脊一两（去苗） 草薢一两 薏苡仁二两 麻黄四两（去根节） 侧子一两（炮裂，去皮脐） 杏仁一两（汤

浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤箭一两 桂心一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿痹，及偏风身体手足不遂，筋脉挛急。

37129 防风散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】防风汤（《圣济总录》卷十九）。

【组成】防风二两（去芦头） 甘草三两（炙微赤，锉） 独活三分 当归一两 赤茯苓一两 秦艽一两（去苗） 茵芋半两 桂心三分 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以酒一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风血痹，皮肤不仁。

37130 防风散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】防风三分（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 麻黄一两（去根节） 泽泻一两 天门冬一两（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 生地黄一两 白术一两 山茱萸一两 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】卒中瘫痪风，手足不遂，身体拘急，神思昏沉。

37131 防风散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】防风半两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 赤芍药三分 半夏半两（汤浸七遍去滑） 甘菊花半两 芎藭半两 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉） 前胡一两（去芦头）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，

加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痰，头目昏闷，四肢烦疼。

37132 防风散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】防风半两（去芦头） 茯神一两 羚羊角屑半两 芎藭半两 人参三分（去芦头） 细辛半两 桂心半两 枳实半两（麸炒微黄） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 天麻三分 山茱萸三分 龙齿一两 甘菊花半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风虚恍惚，多痰晕闷，不欲饮食。

【宜忌】忌羊肉、饴糖。

37133 防风散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】防风一两（去芦头） 川升麻一两 黄芩一两 赤芍药一两 蔓荆子一两 石膏一两 葛根一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加淡竹沥半合，更煎一二沸，不拘时候温服。

【主治】风头痛掣动。

37134 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】防风三分（去芦头） 白术三分 芎藭三分 白芷三分 牛膝三分（去苗） 狗脊三分 草薢三分（锉） 薏苡仁三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 侧子一两（炮裂，去皮脐） 当归三分（锉，微炒） 羌活三分 麻黄三分（去根节） 石膏二分 桂心三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】偏风。手足不遂，肌体不仁，筋脉

拘急，时有疼痛。

【宜忌】忌生冷，油腻，猪、鸡、犬肉。

37135 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】防风三分（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 羌活半两 川椒半两（去目及闭口者，微炒，去汗） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 赤箭半两 白术三分 干姜半两（炮裂，锉） 细辛半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 前胡一两（去芦头） 白芷半两 莽草三分 麻黄一两（去根节） 山茱萸半两 丹参三分 人参三分（去芦头）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】偏风顽痹，心神冒闷，身体疼痛。

37136 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】防风三分（去芦头） 薏苡仁一两 羌活三分 细辛半两 当归三分 仙灵脾一两 芎藭三分 肉桂三分（去皱皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 骨碎补一两 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至八分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】风身体疼痛，转侧不得。

37137 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】防风三分（去芦头） 沙参半两（去芦头） 犀角屑一两 川升麻一两 木通一两（锉） 羌活一两 秦艽一两半（去苗） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 甘草一两（炙微赤，锉） 茯神一两 龙齿一两 前胡一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，下生地黄汁一合，更煎一二沸，不拘时候温服。

【主治】热毒风，痰壅头目晕闷，心神不宁。

37138 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】防风一两(去芦头) 麻黄一两(去根节) 川乌头一两(炮裂,去皮脐) 干姜半两(炮裂,锉) 肉桂一两(去皱皮) 羌活一两 细辛一两 当归一两 干蝎半两(微炒)

【用法】上为细散。每服一钱,温酒调下,不拘时候。

【主治】破伤风,伤刀中箭,筋脉拘急,疼痛。

37139 防风散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】防风二两(去芦头) 独活二两 芎藭一两 赤茯苓一两 当归一两 葛根一两(锉) 桂心一两 麻黄二两(去根节) 附子二两(炮裂,去皮脐) 细辛一两 汉防己一两 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风奄忽不能言,四肢痹曳,皮肉不知痛痒。

37140 防风散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】防风二两(去芦头) 独活一两 牛膝一两(去苗) 茵芋一两 芎藭一两 丹参一两 赤芍药一两 甘草一两(炙微赤,锉) 细辛一两 泽漆一两 汉防己一两 麻黄一两(去根节) 石膏一两 桂心一两 白茯苓一两 乌头一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】柔风,四肢软弱,皮肤不仁,脚膝浮肿,行立无力。

37141 防风散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】防风一两(去芦头,微炒) 地龙二两(微炒) 漏芦二两

【用法】上为细散。每服二钱,以温酒调下,

不拘时候。

【主治】白虎风,走转疼痛,两膝热肿。

37142 防风散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】防风一两(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 麻黄三分(去根节) 茯神一两 芎藭半两 前胡半两(去芦头) 细辛半两 石膏二两 虎掌半两(汤浸洗七遍,生姜汁拌炒令黄) 黄芩半两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,加淡竹沥、荆沥各半合,更煎二三沸,不拘时候温服。

【主治】头风,目眩眼旋欲倒,头痛。

37143 防风散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】泽泻散(《圣济总录》卷十三)。

【组成】防风一两(去芦头) 泽泻一两 牡蛎一两(烧为粉) 苍术一两(锉,炒微黄) 桂心三分

【用法】上为细散。每服二钱,以温粥饮调下,不拘时候。

【主治】风虚多汗,恶风寒颤。

【宜忌】忌炙爆,热面。

37144 防风散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】防风一两(去芦头) 赤茯苓一两 芎藭一两 白蒺藜一两(微炒,去刺) 麻黄一两(去根节) 桂心一两 海桐皮一两(锉) 当归一两 人参一两(去芦头) 白术一两半 独活一两 细辛一两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】腰退风,肌肉虚满,肢节缓弱,皮肤不仁,骨节疼痛。

37145 防风散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】防风一两(去芦头) 羌活一两 黄耆一两(锉) 五加皮一两 牛膝一两(去苗) 丹参一两 酸枣仁一两(微炒) 桂心一两 赤茯苓一两 麻黄一两(去根节) 槟榔三分 当归三分 附子一两(炮裂, 去皮脐) 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓤)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】风, 四肢不利, 筋脉拘挛, 发歇疼痛。

【宜忌】忌生冷油腻、猪、鸡、犬肉。

37146 防风散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】防风一两(去芦头) 细辛一两 赤茯苓一两 柏子仁一两 桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 桂心一两 枳实半两(麸炒微黄) 赤芍药一两 山茱萸二两 甘草半两(炙微赤, 锉) 酸枣仁二两(微炒) 鳖甲二两(涂酥炙令黄, 去裙襕)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】肝脏风劳, 两胁虚满, 筋脉拘急, 不得喘息, 四肢烦疼, 头目不利, 体多青色。

37147 防风散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】防风一两半(去芦头) 独活一两半 白茯苓一两半 人参一两(去芦头) 干姜一两(炮裂, 锉) 附子半两(炮裂, 去皮脐) 五加皮一两 甘草一两(炙微赤, 锉) 当归一两 桂心一两 芎藭一两

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水、酒各半中盏, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】肉极。肌肉变, 舌强阴缩, 腰脚痿弱。

37148 防风散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】防风(去芦头) 天麻 海桐皮 附子(炮裂, 去皮脐) 沉香各一两 桂心

芎藭 白术 白茯苓 山茱萸 熟干地黄各三分 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓤)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】风劳, 体虚食少, 羸瘦, 筋脉不利, 手足多疼。

37149 防风散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】防风一两(去芦头) 五加皮一两 草薢一两(锉) 薏苡仁一两 杜仲一两半(去粗皮, 炙微黄) 牛膝一两半(去苗) 海桐皮一两(锉) 桂心一两 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓤) 赤芍药一两 续断三分 鼠粘子三分 黄耆一两(锉) 熟干地黄一两 羚羊角屑三分

【用法】上为细散。每服二钱, 以温酒调下, 一日三四次。

【主治】虚劳, 筋脉拘挛, 腰膝疼痛。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒滑鱼肉。

37150 防风散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】防风三分(去芦头) 山茱萸三分 羚羊角屑三分 枳实半两(麸炒微黄) 黄耆二分(锉) 白茯苓一两 羌活三分 黄芩半两 当归三分 麦门冬一两半(去心, 焙) 五味子半两 薏苡仁半两

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 一日三四次。

【主治】虚劳, 肝气乏弱, 四肢不收, 筋骨疼痛, 目多昏暗。

37151 防风散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】防风(去芦头) 芎藭 川升麻 犀角屑 羚羊角屑 赤芍药 前胡各半两(去芦头) 细辛 秦皮 朱砂(细研) 甘草(炙微赤, 锉) 各一分 牛黄二钱(细研)

【用法】上为散, 入牛黄、朱砂, 都研令匀。每服一钱, 食后煎地黄汤调下。

【功用】退上焦壅热，止痛消肿。

【主治】眼赤肿痛，多眵泪。

37152 防风散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】防风(去芦头) 黄连(去须) 决明子 黄芩 甘草(炙微赤，锉) 川大黄(锉碎，微炒) 各一两 木通一两(锉) 甘菊花三分 赤芍药一两半

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】风毒攻眼，睫落肿痛。

【宜忌】忌毒鱼肉、炙爆、热面。

37153 防风散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】防风饮(《圣济总录》卷一〇七)。

【组成】防风(去芦头) 黄芩 葳蕤 黄连(去须) 甘草(炙微赤，锉) 各一两 梔子仁三分

【用法】上为细散。每服一钱，食后煎竹叶汤调下。

【主治】①《圣惠》：眼冲风多泪。②《圣济总录》：目偏视。

【宜忌】忌油腻、热酒、湿面。

37154 防风散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】防风(去芦头) 犀角屑 羚羊角屑 川大黄(锉碎，微炒) 各二两 前胡(去芦头) 黄芩 玄参 地骨皮各二两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏半，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】险生风栗，及生珠管。

37155 防风散

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】防风一两(去芦头) 甘菊花一两 赤芍药二两 石膏四两 葛根一两(锉) 柴胡二两(去苗) 蔓荆子一两 甘草一两(炙微赤，锉) 杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，加竹沥半合，更煎二三沸，不拘时候温服。

【主治】上焦风壅头痛，口干烦热。

【宜忌】忌炙爆、热面、大蒜等。

37156 防风散

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】防风一两(去芦头) 石膏二两(细研，水飞过) 小荆子一两 梔子仁一两 芥苳一两 枸杞子一两(微炒) 白蒺藜一两(微炒，去刺) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。每服二钱，食后以温水调下。

【主治】肺脏风毒，及过饮生酒皴。

37157 防风散

《圣惠》卷四十四。为张文仲引《小品方》(见《外台》卷二十六)“牡丹散”之异名。见该条。

37158 防风散

【方源】方出《圣惠》卷四十四，名见《普济方》卷二四七。

【组成】黄柏半两 牡丹半两 桂心半两 防风半两(去芦头)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】阴癰，卵偏大，有气上下胀肿，或行走便发肿大。

37159 防风散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】防风一两(去芦头) 甘菊花一两 牛蒡子一两(微炒) 白附子一两(炮裂) 前胡一两(去芦头) 石膏二两(细研，水飞过)

【用法】上为细散。每服二钱，食后以生姜茶清调下。

【主治】痰厥头痛。

37160 防风散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】防风一两(去芦头) 猪苓一两(去黑皮) 泽泻一两 赤茯苓一两 麻黄一

两(去根节) 泽漆一两 白术一两半 大戟一两(锉碎, 微炒) 黄耆一两(锉) 独活二两 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 入煮赤小豆汁一合, 煎至五分, 去滓, 每日早晨温服。良久, 当小便极利; 不利, 晚再服之。

【功用】利小便。

【主治】风水, 通身肿, 皮肤欲裂。

37161 防风散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】防风一两(去芦头) 白茯苓一两 白芷一两 桔梗一两(去芦头) 远志半两(去心) 甘草半两(炙微赤, 锉) 人参一两(去芦头) 芎藭一两 当归一两(锉, 微炒) 黄耆一两(锉) 附子半两(炮裂, 去皮脐) 桂心一两 赤小豆一合(炒熟) 厚朴二两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为细散。每服二钱, 以黄耆汤调下, 一日三四次。

【功用】《圣济总录》: 托里内补。

【主治】大疮热已退, 脓血不止, 疮中肉虚疼痛。

37162 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 石膏二两半 麻黄二分(去根节) 细辛半两 黄芩半两 川升麻半两 当归半两(锉, 微炒) 汉防己三分 桂心半两 芎藭半两 羌活半两 赤茯苓半两 甘草半两(锉, 炙微赤)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至五分, 去滓, 加竹沥一合, 更煎一二沸, 不拘时候温服。

【主治】妇人中风, 言语謇涩, 四肢拘急, 身体壮热, 头疼目眩, 心胸不利。

37163 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 羌活半两

当归半两(锉, 微炒) 天南星半两(炮裂) 天麻半两 白僵蚕半两(微炒) 麻黄三分(去根节) 桂心半两 芎藭半两 乌蛇肉半两(酒拌炒令黄) 桑螵蛸半两(微炒) 麝香一分(研入) 朱砂一分(细研入)

【用法】上为细散, 入研了药令匀。每服一钱, 以温酒调下, 不拘时候。

【主治】妇人中风, 言语謇涩, 肢节疼痛, 皮肤不仁, 口面喎戾。

37164 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 酸枣仁半两 芎藭半两 当归半两(锉, 微炒) 牛膝一两(去苗) 狗脊一两(去毛) 葶藶一两(锉) 薏苡仁二两 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 人参半两(去芦头) 葛根半两(锉) 羌活二两 麻黄一两(去根节) 石膏二两 桂心一两

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妇人中风, 半身枯细, 筋脉抽掣, 心神烦闷, 行立不得。

37165 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 五加皮一两 羌活一两 赤芍药一两 薏苡仁三两 羚羊角屑一两 附子一两(炮裂, 去皮脐) 牛膝一两(去苗) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妇人风痹, 手足不随, 言语謇涩。

37166 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 赤芍药一两 葛根一两(锉) 黄芩一两 茵芋一两 白术一两 桂心一两 麻黄一两(去根节) 甘

草一两(炙微赤, 锉) 人参半两(去芦头) 汉防己半两 石膏一两

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 拗开口温灌之, 不拘时候。

【主治】妇人卒中风, 口噤不能语, 四肢急掣, 偏挛。

37167 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风二两(去芦头) 人参一两(去芦头) 茯苓一两 远志半两(去心) 细辛半两 羚羊角屑三分 生干地黄三分 赤芍药三分 沙参半两(去芦头) 白术半两 酸枣仁半两(微炒) 桂心半两 独活一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 当归三分(锉, 微炒)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三枚, 同煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妇人血风烦热, 心神惊悸, 筋脉拘急, 肢节疼痛, 不欲饮食。

37168 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】防风茯神散(《校注妇人良方》卷三)。

【组成】防风一两(去芦头) 茯神一两 独活一两 远志一两(去心) 人参一两(去芦头) 龙齿一两 秦艽半两 菖蒲一两 石膏一两 牡蛎一两 禹余粮半两 蛇蛻皮一尺(烧灰) 桂心半两 甘草二分(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妇人风邪癫狂, 或啼泣不止, 或歌笑无度, 或心神恐惧, 或言语失常。

37169 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】防风一两(去芦头) 五加皮二两 薏苡仁二两 羌活一两 附子一两(炮裂, 去

皮脐) 酸枣仁一两(微炒) 芎藭一两 川大黄二两(锉碎, 微炒) 羚羊角屑一两 当归一两(锉, 微炒) 枳实三两(麸炒微黄) 甘草一两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】妇人脚气, 肿满疼痛, 筋脉拘急。

37170 防风散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】防风三分(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓢) 柴胡一两(去苗) 延胡索一两 桂心半两 木香半两 当归三分(锉碎, 微炒) 红蓝花三分 白术三分 鳖甲一两(涂醋炙令黄, 去裙襴) 芎藭三分 赤芍药三分 琥珀半两 川大黄半两(锉碎, 微炒) 牛膝半两(去苗)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妇人血风劳气, 经络不通, 腹肋妨闷, 发歇寒热, 四肢拘急疼痛, 头目不利, 少思饮食。

37171 防风散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】防风一两(去芦头) 葛根一两 细辛半两 当归半两(锉, 微炒) 甘菊花半两 汉防己半两 羚羊角屑半两 桂心半两 秦艽半两(去芦头) 茯神半两 桑寄生二两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 加竹沥半合, 不拘时候温服。

【主治】妊娠中风卒倒, 心神闷乱, 口噤不能言, 四肢急强。

37172 防风散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】防风(去芦头) 秦艽(去苗) 赤茯苓 独活 芎藭 人参(去芦头) 当归(锉, 微炒) 汉防己 白鲜皮(锉) 白薇

各一两 麻黄二两(去根节) 石膏二两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓, 加竹沥半合, 搅匀, 拗开灌之, 不拘时候。

【主治】产后中风, 口噤心闷, 通身强直, 腰背反僵, 状如风痉。

37173 防风散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】防风汤(《女科百问》卷下)。

【组成】防风一两(去芦头) 葛根一两(锉) 芎藭一两 生干地黄一两 麻黄一两(去根节) 甘草三分(炙微赤, 锉) 桂心三分 独活二两 汉防己三分 蔓荆子三分 藁本一两 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后中风, 如角弓, 时时反张, 口噤。

37174 防风散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】防风(去芦头) 川升麻 羚羊角屑 羌活 石膏各半两

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓, 加竹沥半合, 更煎一二沸, 不拘时候温服。

【主治】小儿中风, 卒口噤不开, 昏沉, 冥冥如醉。

37175 防风散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】防风(去芦头) 川升麻 桂心 羚羊角屑 麻黄(去根节) 羌活 芎藭 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 各一分

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓, 加竹沥半合, 更煎一二沸, 分温二服, 如人行十里再服。衣盖令汗出为效。

【主治】小儿中风, 口喎斜僻, 手足不遂,

风入于脏, 或语不得, 心神昏闷。

37176 防风散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】防风汤(《圣济总录》卷一八一)。

【组成】防风(去芦头) 羚羊角屑 黄芩 人参(去芦头) 枳壳(麸炒微黄, 去瓤) 甘草(炙微赤, 锉) 各一分 半夏半分(汤浸七遍去滑)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 加生姜少许, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿脾肺风热, 膈上多涎, 心神昏闷, 少欲乳食。

37177 防风散

【方源】《博济》卷三。

【异名】菊花防风散(《圣济总录》卷一〇四)。

【组成】菊花 防风 甘草 威灵仙 黄连 牛蒡子各三分

【用法】上为末。每服一钱, 风眼, 葱汤送下; 赤眼, 新汲水调下, 一日二次。

【主治】①《博济》: 风毒眼, 暴赤眼。②《圣济总录》: 时气病后, 余毒不尽上攻, 目赤涩痛, 或生障翳。

37178 防风散

【方源】《普济方》卷一〇五引《指南方》。

【异名】防风汤(《妇人良方》卷三)。

【组成】防风一两 羌活半两 甘草一分

【用法】上为粗末。每服五钱, 水二盏, 煎一盞, 去滓, 加麝香一字, 温服。

【主治】①《普济方》引《指南方》: 贼风口喎。②《妇人良方》: 卒然口喎斜, 言语牵急, 四肢如故, 别无所苦。

37179 防风散

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】防风 麻黄 芍药各三分 防己 桂心 黄芩 白术 附子(炮) 羚羊角屑 各一两 甘草 人参 芎藭 独活 升麻各

半两 石膏一两

【用法】上为粗散。每服四大钱，水一大盏半，加竹沥二合，生姜一分，同煎九分盏，去滓服。

【主治】卒暴风，口面僻斜，半身不遂，语不转，服竹沥汤方药不除者。

37180 防风散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防风(去叉)二两 天麻三两 白僵蚕(炒)二两 白附子(炮裂)二两 乌蛇(酒炙，用肉)二两 人参一两半 白茯苓(去黑皮)一两半 枳壳(去瓢，麸炒)二两 羌活(去芦头)一两 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙三遍)二两 独活(去芦头)一两 蝉壳(微炙)一两半 白蒺藜(炒)一两半 芎藭一两 蔓荆实(揉去白皮)一两半 犀角(镑)一两 羚羊角(镑)一两 当归(切，焙)一两 槟榔(煨，锉)一两 大麻仁一两 郁李仁(汤浸，去皮并双仁，炒)一两 木香一两 牛黄(研)半两

【用法】上先将二十二味为散，次入牛黄同拌匀。每服二钱匕，食后温酒调下，日二夜一。如要丸，人麝香半两与末同研，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒调下，一日三次。

【主治】肺中风，项背强直，胸满短气，身如虫行，四肢无力。

【加减】春时即去木香，用大黄一两半，锉如生栗，醋炒令紫色。

37181 防风散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】防风(去叉) 杏仁(去皮尖双仁，炒黄色) 白僵蚕(炒)各二两 甘草(炙，锉)一分

【用法】上为散。每服三钱匕，空心蜜酒调下。

【主治】风毒，面生痞瘤，遍体瘙痒。

37182 防风散

【方源】《圣济总录》卷十三。

【异名】防风汤(《本事》卷六)。

【组成】防风(去叉)一两一分 泽泻 牡蛎(煅赤) 桂(去粗皮)各三分

【用法】上为细散。每服三钱匕，空心温酒调下，一日二次。

【主治】风虚多汗恶风。

37183 防风散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】防风(去叉) 芎藭 山芋 人参 白术 远志(去心) 独活(去芦头) 桂(去粗皮) 茯神(去木)各三分 莽草(去根，酒洒，焙) 天雄(炮裂，去皮脐)各半两

【用法】上为细散。每服一钱半匕至二钱匕，食前浸菊花酒调下，日再夜一。

【主治】风头眩，旋运欲倒。

37184 防风散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】防风(去叉) 羌活(去芦头) 甘菊花(择去梗) 白附子(炮) 山芋 藁本(洗，切，焙) 附子(炮裂，去皮脐) 蒺藜子(炒，去角)各半两 麝香(研)一分

【用法】上为细散。每服一钱匕，食后茶清调下。或炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下。

【主治】风头眩，目昏痛。

37185 防风散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】防风(去叉) 芎藭 荆芥穗 黄耆(锉) 蒺藜子(炒)各一两 人参(去芦头) 恶实(炒) 甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后沸汤调下。

【主治】头面风，皮肤瘙痒，或生疮不已。

37186 防风散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】防风(去叉) 黄耆(锉) 旋覆花 枳壳(去瓢，麸炒) 羌活(去芦头) 独

活(去芦头) 枇杷叶(炙,去毛) 蒺藜子(炒,去角)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心晚食前温酒调下。

【主治】肾脏风上攻下注,头面肿痒,足膝生疮。

37187 防风散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】防风(去叉)二两 菊花四两 蒺藜子(炒,去角) 恶实各一两(炒)

【用法】上为散。每服三钱匕,食后以熟水调下。

【主治】肝风,目睛不正,视物偏斜。

37188 防风散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】防风(去叉)一两半 黄芩(去黑心) 人参 甘草(炙,銼) 芎藭 天门冬(去心,焙)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,食后沸汤调下,一日三次。

【主治】脑热鼻渊,下浊涕不止。

37189 防风散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】防风(去叉)一两 龙胆一两 生地黄(切,焙)二两 沉香(銼)半两 升麻半两

【用法】上为散。每用二钱匕,加盐少许,沸汤调匀,揩齿含咽便睡。

【主治】口舌生疮。

37190 防风散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】防风(去叉) 羌活(去芦头) 槐白皮 黄芩(去黑心) 地骨皮 当归(切,焙)各三分 升麻一两

【用法】上为散。每用三钱匕,水一盞,加盐少许,煎三五沸,热漱冷吐,以愈为度。

【主治】风疳宣露,脓汁臭气。

37191 防风散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】防风(去叉)一两 白附子三分

地骨皮半两 真麝香(研)三分 丹砂(研) 膩粉(研) 白术 马牙消(研) 桂(去粗皮)各一分 赤茯苓(去黑皮)一两

【用法】上为散。每服半钱匕,温酒调下。

【主治】喉痹,及咽喉垂倒。

37192 防风散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】防风(去叉) 人参 白术 独活(去芦头) 草豆蔻(去皮)各三分 天麻 芎藭 白芷 赤茯苓(去黑皮)各一两 细辛(去苗叶) 高良姜 青橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙)各半两 京三棱(炮,銼)一两半 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)三钱

【用法】上为散。每服三钱匕,温酒调下,枣汤亦得,一日三次,不拘时候。

【主治】咽喉中如有物,妨闷噎塞,胸膈痰滞。

37193 防风散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】防风(去叉)一两半 牵牛子(炒令香)二两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心用沸汤调下。取微利为度,未利再服,渐减服之。

【主治】乳痈。

37194 防风散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】防风(去叉) 母猪肉各二两

【用法】上同煮数沸,去猪肉,取防风焙干,捣罗为散。每服一钱匕,白汤点服,不拘时候。

【主治】一切癣。

37195 防风散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】防风(去叉) 天麻各二两 陈橘皮(汤浸去白,焙)一两

【用法】上为细散。每服三钱匕,空心酒调下。

【主治】诸疮癣疥。

37196 防风散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】防风(去叉,炙令黄) 黄耆(炙,锉) 各二两 甘草(炙,锉) 人参各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,食前粟米饮调下。

【主治】肠风。

37197 防风散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】防风(去叉,生用)不以多少

【用法】上为散。每服二钱匕,酒调下。

【主治】①《圣济总录》:妇人经血不止。②《医级》:肝经受风,留伏不散,以致血得风而溢泄,倒经,或发咳微甚,缠绵不已。

37198 防风散

【方源】《刘氏家传》引李琬方(见《幼幼新书》卷十九)。

【组成】防风(去芦头) 甘草(炙草) 柴胡(去苗) 连翘 山梔子各等分

【用法】上为粗末。每服一钱,水五分,煎三分,去滓温服。一岁儿一服可分四次;三岁儿可作二服饮之。

【主治】小儿五脏积热、惊风,头面赤热,口舌生疮,好饮冷。

37199 防风散

《鸡峰》卷十一。为《圣济总录》卷六十五“防风汤”之异名。见该条。

37200 防风散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】防风 防己 葛根 秦艽 当归 川芎 乌药 甘草 羌活 独活 白术 杏仁 黄芩 白芍 前胡 川断 菊花 天虫

【主治】妊娠中风。

【方论选录】中风一症,男妇老少皆有之,重者中脏,轻者中腑,又次中经络。治妇人独难,以妊娠耳。二防、二活、秦、芎、根皆治风药也;风必生热,故用黄芩、白芍、甘菊以凉之;风必多痰,故用前胡、杏仁、天虫以豁之;风盛则气必喘急,故用乌药以顺之,甘草以缓之;而当归、白术、川断配以

川芎,佐以黄芩、白芍,皆可以安胎也。但此方风药太多,风能胜湿,且有防己、独活直达下焦,恐伤胎气,用者审之。

37201 防风散

《三因》卷七。为《理伤续断方》“至真散”之异名。见该条。

37202 防风散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】防风(去芦头) 川芎 香白芷 甘菊花 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱,食后荆芥汤调下。

【功用】常服祛风明目。

【主治】①《杨氏家藏方》:头目不清,神志不爽。②《普济方》:时疫温病,嗽喘烦渴,头痛体疼,目涩多睡,肌肉蠕动,痰逆松悸。

37203 防风散

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】厚朴(去皮,姜汁制) 陈皮(去白) 甘草(炙) 藁本各二两 独活 防风(去芦) 桔梗(微炒) 各三两 苍术(于木臼内略杵去皮,却入布袋内打,净称) 二两

【用法】上为细末。每服三钱,加生姜三片,大枣二个,水一大盏,煎七分,温服;沸汤点亦得。

【主治】伤寒时气,头痛壮热,恶风,百节痠疼,肩背拘急,面赤虚烦,声重咳嗽,寒热不除。

37204 防风散

【方源】《直指》卷九。

【组成】川芎一分 人参半分 防风二分

【用法】上为末。每服一钱,临卧米饮调下。

【主治】盗汗。

37205 防风散

【方源】《直指》卷十七。

【组成】麻黄(去节) 牵牛(炒,取末) 甘草(炙) 各一分半 杏仁(去皮) 防风 半夏(制) 芍药 辣桂 白芷 防己 当归 川芎 羌活 独活 槟榔各一分

【用法】上锉。每服三钱，加生姜四片，紫苏三叶，煎服。

【主治】风肿皮粗，麻木不仁，或时疼痛。

37206 防风散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】北防风 川当归 赤芍药 牛蒡子各一两(炒) 荆芥穗一两二钱 蝉壳七钱半(去土) 生地黄 香白芷 甘草 白附子 白僵蚕(去丝) 何首乌 乌蛇肉(酒浸，去皮骨，焙干)各半两 紫参七钱半

【用法】上为细末。每服三大钱，加至四五钱，温酒调下。如不饮酒，以蜜汤调下，终不若酒之有功。

【主治】妇人经脉不匀，气血壅滞，肺有风热，遂令遍身瘾疹，红紫成片，肌肉顽痹，皮肤粗涩，或时瘙痒。

37207 防风散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】防风 大粉草各一钱半 川芎 荆芥 牛蒡子 连翘各一钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎五分，空心服。

【主治】小儿身疮。

【加减】风丹，加薄荷。

【备考】《普济方》有天花粉，无大粉草。

37208 防风散

【方源】《普济方》卷一一三引《医方集成》。

【组成】防风一两 藁本 羌活 地骨皮 荆芥穗各半两

【用法】上为细末。每服三钱，酒调服。

【主治】破伤疮疡风邪，或身体疼痛，风邪攻注挛急，及皮肤瘙痒，麻木不仁，头昏闷，牙关紧，欲成破伤风者。

37209 防风散

【方源】《得效》卷七。

【组成】羌活 荆芥 防风 枳壳 僵蚕(炒去丝) 薄荷各等分

【用法】上锉散。水煎，空心温服。

【主治】大便下血。因食热物过度，风气蕃盛，销铄大肠膏脂，以致营卫之血渗流而下。

【宜忌】忌再吃热物。

37210 防风散

【方源】《得效》卷十。

【组成】防风(去芦) 羌活(去芦) 薄荷(去粗梗) 当归(去尾) 大黄 梔子(去须) 川芎各一两 蝉退二十个(去足白) 粉草五钱

【用法】上为散。每服四钱，水一盏半，加灯心二十茎，苦竹叶十片煎，食后服。

【主治】积热上冲，头热如火，痛入顶中。

37211 防风散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】防风 鹤虱各等分

【用法】上锉散。浓煎，噙漱。

【主治】牙疼。

37212 防风散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】防风(去芦)一两 羌活 黄药子 白药子(蜜炙) 僵蚕(炒) 硼砂 大黄(纸裹，煨令香熟) 荆芥 细辛 川芎 红内消 郁金 山豆根 甘草各五钱 牙消三钱 薄荷叶半斤

【用法】上为末。研薄荷汁同蜜少许调药。虚者少用，实者多用。

【主治】咽喉疼痛。

37213 防风散

【方源】《眼科龙木论》卷一。

【异名】圆翳防风散(《金鉴》卷七十七)。

【组成】羌藟子 防风 桔梗 五味子 知母各二两 黑参 川大黄 细辛 芒消 车前子 黄芩各一两

【用法】上为末。每用一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【功用】《金鉴》：泄其热邪。

【主治】圆翳内障。脑脂流下，肝风上冲，玉翳青白，瞳仁端正，阳看则小，阴看则大。

37214 防风散

《普济方》卷十四。即《千金》卷十一“防风煮

散”。见该条。

37215 防风散

《普济方》卷四十六。即《圣济总录》卷十五“防风饮”。见该条。

37216 防风散

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】防风 轻粉 荆芥各二分 密陀僧 乳香各一钱

【用法】上为细末。每夜遇晚，用药一钱涂面上，以乳汁调敷之，次日空心，再用盐、荆芥汤洗之。

【主治】面上风刺、粉刺。

37217 防风散

【方源】《普济方》卷五十二。

【组成】防风 荆芥穗 吴白芷 白茯苓 蔓荆子 威灵仙 何首乌 川芎各三两 苦参 白牵牛各半斤

【用法】上为粗末。每用药末三两，好浆水三升，煎五七沸，去滓，洗面，每日早晚二次

【主治】一切风毒，头面生疮。

37218 防风散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】川乌头 防风（去芦） 白芷各一两 川芎一两半 草乌头半两 细辛（去苗土）七钱半 苍术二两（去皮实者）

【用法】上先用盐搽，后方用药末搽上。

【主治】牙痛。

37219 防风散

《普济方》卷六十五。即《圣济总录》卷一一九“防风汤”。见该条。

37220 防风散

【方源】《普济方》卷一〇二。

【组成】防风（去叉） 龙骨 远志 铁精（别研）各一两 紫石英（别研） 丹砂（别研）各二两 熟干地黄（洗，切，焙）二两人参二两半 干姜（炮） 细辛（去苗叶） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白茯苓（去黑皮）二两

【用法】上除别研外，为末，再和匀。每服

一钱许，加至二钱，煮取枣汤调下。

【功用】定心。

【主治】中风惊悸，心虚恍惚，言语失常，或瞋或怒，志意不乐。

【加减】如风热盛者，去干姜，加玄参一两。

37221 防风散

《普济方》卷一一二。即《圣济总录》卷十八“除风散”。见该条。

37222 防风散

《普济方》卷一八七。即《千金》卷七“防风汤”。见该条。

37223 防风散

《普济方》卷二四七。为方出《千金》卷二十四，名见《济生》卷四“牡丹散”之异名。见该条。

37224 防风散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】山药半两 白茯苓半两 白附半钱 甘草二钱 全蝎一钱 人参 防风各一钱

【用法】上为末。每服一钱，或半钱，钩藤同煎服。

【主治】小儿变蒸潮热，焦啼吮乳，欲发疮癰。

37225 防风散

《普济方》卷三六九。为《活人书》卷二十“连翘饮”之异名。见该条。

37226 防风散

《袖珍小儿》卷二。为《直指小儿》卷一“防风汤”之异名。见该条。

37227 防风散

《证治要诀类方》卷三。为《千金》卷七“防风汤”之异名。见该条。

37228 防风散

《校注妇人良方》卷三。为《圣惠》卷五“独活散”之异名。见该条。

37229 防风散

【方源】《校注妇人良方》卷十二。

【组成】防风

【用法】上为末。每服一钱，白汤调下。

【主治】肝经有风，以致血得风而流散不归经，妊娠卒然下血者。

【备考】本方方名，《景岳全书》引作“一味防风散”。

37230 防风散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】防风 羌活 白芷 当归 黄耆 甘草各五分

【用法】上为细末。灯心汤少许调下。

【主治】小儿脐风。

37231 防风散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】羌活 防风 枳实 川芎 粉草 大黄(煨) 赤芍各等分

【用法】上每服二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿风热痰壅，大便不通。

37232 防风散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】荆芥穗 当归 川芎 防风 赤芍药 防己 梔子各等分

【用法】上为细末。每服二钱，茶清调下。作汤煎服亦可。

【主治】小儿痘疹后风热上攻，目赤肿流血及痘风疮。

37233 防风散

《杏苑》卷五。为《圣济总录》卷十九“防风汤”之异名。见该条。

37234 防风散

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 桔梗 厚朴 甘草 石膏 干葛

【主治】肺胃风热，上冲头痛。

【加减】兼少阳者，加柴胡、川芎、薄荷、荆芥。

【方论选录】防风散风，石膏清热，与桔梗同用，清肺也；与干葛同用，清胃也；厚朴、甘草和胃气以升降浮沉也。

37235 防风散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 红花 金银花 防风 荆芥 苡仁 白茯苓 连翘 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿中湿生风，满身作痒，疮疥遍身者。

37236 防风散

【方源】《医钞类编》卷十一。

【组成】防风 荆芥 黄芩 石膏 梔仁 薄荷 赤芍 连翘 生地黄 甘草

【用法】水煎服。

【主治】眼泡内生毒如菌。

37237 防风散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】赤芍一两 防风(去皮)五钱 麻黄(去根节，汤泡) 薄荷各五钱 炙草七钱五分 赤茯苓一两 苍术(米泔浸一宿，去粗皮，晒干，炒黄)一两

【用法】上为末。每服三钱，大儿五钱，加生姜二片，葱头三个。

【主治】痘疹后，感冒风湿之气，两足两膝疼痛浮肿，不能屈伸，遂成瘫痪者。

37238 防风粥

【方源】方出《医方类聚》卷二十四引《千金月令》，名见《脚气治法总要》卷下。

【组成】防风二大分

【用法】煮取汁作粥服。

【功用】去四肢风。

【主治】《脚气治法总要》：四肢风湿。

37239 防风粥

【方源】《药粥疗法》。

【组成】防风10~15克 葱白二茎 粳米30~60克

【用法】取防风、葱白煎取药汁，去滓，先用粳米煮粥，待米将熟时加入药汁，煮成稀粥服食。

【功用】祛风解表，散寒止痛。

【主治】感冒风寒，发热畏冷，恶风自汗，头疼身痛，风寒湿痹，骨节痠楚，肠鸣泄泻。

【方论选录】防风祛风止痛,既能祛风寒而解表邪,又能祛风湿而止疼痛,性微温而不燥,力量缓和而弱;故又加葱白协助其祛风止痛功能;同米煮粥则疗效倍增。

37240 防风煎

《千金方衍义》卷十一。即《千金》卷十一“防风补煎”。见该条。

37241 防风膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】防风(去叉) 藁本(去苗土) 辛夷 芍药 当归(切,焙) 白芷 牛膝(切,焙) 商陆 细辛(去苗叶) 密陀僧(细研) 芎藭 独活(去芦头) 姜蕤 木兰皮 蕤仁各二两 杏仁(汤浸,去皮尖) 丁香 鸡舌香 零陵香 真珠屑 麝香各一两 油一斤 獐鹿髓各一升(如无,猪骨髓亦得) 牛髓一升(如无,脂亦得) 蜡四两(炼过者)

【用法】上先将髓以水浸令白取出,除真珠屑、麝香外,余药并锉碎,次将油、髓、蜡入锅中,熬令消,入诸药,用文火煎之,若白芷黄色,量稀稠得所,以新绵滤去滓,方将真珠屑、麝香别研为细末,入前汁中,熬成膏,贮瓷器内。临卧涂面上,旦起以温水洗去。避风、日妙。

【功用】能令面光润。

【主治】面黧黯。

37242 防风膏

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】当归 防风 黄蜡各一两 黄丹半两(飞过,炒)

【用法】上以油四两,先煎当归、防风,候紫黑色,却入炒过黄丹沸一二次,以绵滤过,入黄蜡收膏。

【主治】灸疮。

【加减】若要止疼痛,加乳香一两。

37243 防附汤

【方源】《普济方》卷三七四引《卫生家宝》。

【组成】防风一分 僵蚕一分(炮) 白附子一分(炮) 川芎二分 荆芥一分 雄黄一钱 全蝎七个(瓦焙干) 朱砂一钱 麝香少许

【用法】上为细末。每服半钱,用好茶清调下;小儿惊风,用冬瓜子汤调下,一日二次。

【主治】小儿惊风,及一切头风。

37244 防苓汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】土茯苓四两 茯苓二两 防己二两 防风二两 木瓜一两 黄耆一两 当归一两 羊蹄(后蹄,以疮之左右分用) 戴菜百丛(连根用)

【用法】煮羊蹄、戴菜,滤汤煎药,去滓服。外煎戴菜汤洗去瘀血,后用桑白皮、栝白皮共捣成饼,麻油和敷。

【主治】瘰疬及牛犍疮。

【方论选录】二苓、二防皆所以去湿毒。足胫少肉,则气血亦薄,故耆、归以益其气血,以木瓜行之。在下药未易达,故羊蹄、戴菜引之;且以血气养血气,又能软坚去骨中毒,而戴菜能解毒治脚气。

37245 防疟方

【方源】《广笔记》卷一。

【组成】何首乌十二两 真茅山苍术十两 半夏六两 橘红八两 人参四两 白茯苓八两 藿香叶三两 白豆蔻仁一两五钱

【用法】上为细末,米粉糊加姜汁为丸,如绿豆大。每次五钱,下午及临卧白汤调下。夏秋不辍,必无疟矣。

【主治】疟疾。

37246 防俭饼

【方源】《寿世保元》卷十。

【组成】栗子 红枣 胡桃 柿饼

【用法】四果去核皮,于碓内一处捣烂揉匀,捻作厚饼,晒干收之。

【功用】救荒辟谷。

37247 防疫丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】法夏六两 广陈皮二两 佩兰叶二两 粉甘草三两 苏叶一两五钱 苍术二两 白芷三两 广藿香四两 厚朴二两 神曲四两 香附四两 槟榔二两 砂仁二两 茯苓六两 薄荷冰四钱

【用法】上为极细末。每服一钱，温开水下。轻者日服一次，重者日服二次。小儿、老人酌减。

【主治】夏季暑湿蕴结，颈痛，恶寒发热，腹鸣呕吐、水泻。

【宜忌】水份不足，无寒湿蕴结者忌服。

37248 防疫丹

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】牛黄六钱 麝香三钱 蟾酥三钱 梅片六钱 大黄三两 甘草四十两 细辛七钱五分 朱砂二十五两 白矾一两五钱 薄荷冰四两

【用法】牛黄、麝香、蟾酥、梅片、薄荷冰、朱砂另乳，余药共研细末。玻璃装，每重一钱包装，常用二分至三分。

【功用】提神醒脑，宽中解郁，通利肠胃，生津止渴。

【主治】晕船晕车，口舌烦渴，恶心呕吐，昏厥拘挛。

37249 防枯汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】防风一钱 麦冬 玄参各一两 桔梗三钱 甘草一钱 天花粉二钱 黄芩二钱

【用法】水煎服。

【功用】补水之不足，散火之有余。

【主治】身热之后，其身不凉，遍身俱红紫之色，此热在皮肤，名曰火丹。

37250 防眩汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地 当归 白芍 焦术各一两 川芎 枣皮 半夏各五钱 人参三钱 天麻一钱 陈皮五分

【主治】眩晕。

37251 防葵丸

【方源】方出《外台》卷三十五引刘氏方，名见《普济方》卷三九一。

【组成】防葵 当归 枳实(炙) 厚朴(炙) 楮实 人参 黄耆 茯神 白术 诃黎勒皮各八分 郁李仁(去皮) 柴胡 大麻仁 芍药 橘皮 防风 紫菀(洗去土) 薏苡仁各六分 鳖甲(炙) 三棱根各十二分 桂心七分 仙鼠二枚(如无，以粪二合代) 大附子二枚(炮) 干姜(末)二分 甘草(炙) 干地黄各十分 大黄十分 五味子四分 槟榔四颗 牛膝二分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。大小增减，以意量之，须饮服之，良。

【主治】小儿冷癖疰气，不下食，羸瘦，时时肋下痛。

37252 防葵丸

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《婴童方》。

【组成】防葵 当归 旋覆花 橘皮 诃黎勒皮 吴茱萸 桂心 桔梗各四分 杏仁六十个(炒) 大附子一个(炮) 大黄十二分 鳖甲六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日二次。

【主治】老小疰癖，不食，羸瘦。

【备考】本方去桔梗，加枳壳四分，名“当归防葵丸”(见《普济方》)。

37253 防葵丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】防葵一两 柴胡一两(去苗) 木香三分 桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 鳖甲一两(涂醋炙微黄，去裙襴) 桂心半两 川大黄一两(锉碎，微炒) 当归半两 京三棱一两(炮，锉) 赤芍药半两 槟榔一两 郁李仁一两(汤浸，去皮尖，微炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳积聚，胁下妨满，腹胀不能食，及腹中痛。

【宜忌】忌苋菜、生冷、湿面。

37254 防葵丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】防葵一两 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襴） 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄一两半（锉碎，微炒） 京三棱一两（炮，锉） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前煎橘皮汤送下。

【主治】骨蒸痲癖。按之隐手，不能下食，羸瘦，日渐无力。

37255 防葵丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】防葵半两 芫花半两（醋拌，炒令干） 干姜半两（炮裂，锉） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襴） 礞砂一两（不夹石者，细研入）

【用法】上为细末。研入礞砂令匀，以米醋一升，煎令稠，下诸药末，慢火熬，入少蒸饼，和溶可丸，即丸如绿豆大。每服十丸，空心温酒送下。

【主治】积聚气成块。

37256 防葵丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】防葵三分 芎藭半两 赤茯苓三分 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襴） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 木香半两 川大黄二两（锉，微炒） 当归半两（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 桂心半两 细辛半两 桔梗半两（去芦头） 京三棱三分（微煨，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】癖气。两胁下硬，按之痛，心闷咳逆，不下饮食，四肢羸瘦，积年不愈。

37257 防葵丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】防葵一两 没药半两 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 礞砂半两（细研） 水蛭一分（炒令微黄） 狗胆一枚（干者） 姜黄半两 芫花一分（醋拌，炒令干）

【用法】上为末，用糯米饭为丸，如绿豆大。每服七丸，五更初以热酒送下，良久当下恶物如未，次日再服。

【主治】妇人月水不通，结为瘕块，时攻心腹疼痛。

【备考】方中礞砂，《普济方》作礞砂。

37258 防葵丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】防葵半两（末） 牛黄半分 巴豆二十枚（取霜） 滑石半两 膩粉一分 蛇蛻皮一条（烧灰） 朱砂一分 麝香半分

【用法】上为细末，以糯米饭为丸，如黍米大。每服二丸，以粥饮送下。

【主治】小儿食痢，心胸痰滞，大小便常多秘涩。

37259 防葵丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】防葵半两 肉豆蔻一分（去壳） 木香一分 川大黄一分（锉碎，微炒） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襴） 京三棱半两（微煨，锉） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 麝香一分（细研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。三岁儿，每服五丸，以粥饮送下，一日二三次。

【主治】小儿食痢。寒热羸瘦，不能饮食。

37260 防葵丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】防葵一两 人参半两 诃黎勒皮半两 川大黄三分（锉碎，微炒） 桑菌半两 郁李仁半两（汤浸，去皮尖，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，以温酒送下，一日二次。

【主治】小儿癖气，久不散消。

37261 防葵丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】防葵半两 当归半两(锉, 微炒) 桔梗半两(去芦头) 桂心半两 诃黎勒皮半两 附子一分(炮裂, 去皮脐) 陈橘皮半两(汤浸, 去白瓤, 焙) 川大黄半两(锉碎, 微炒) 吴茱萸一分(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 鳖甲半两(涂醋炙令黄, 去裙襕) 杏仁二十枚(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。每服五丸, 以粥饮送下, 晚后再服。

【主治】小儿疝气, 不能下食, 肌体瘦。

37262 防葵丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】防葵 牡丹 桂心 黄柏(锉) 滑石各一两 豉半两(微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。三四岁儿每服五丸, 以粥饮送下, 早晨、晚后各一次。

【主治】小儿阴偏大, 卵核坚硬。

37263 防葵丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】防葵(锉碎) 柴胡(去苗) 赤茯苓(去黑皮)各三分 桂(去粗皮) 木香各半两 鳖甲(去裙襕, 醋蘸慢火炙令黄色) 槟榔(锉)各一两半 桔梗(炒) 郁李仁(汤浸, 去皮尖, 别研如膏)各一两 大黄(锉碎, 微炒)一两一分 当归(切, 焙) 京三棱(炮, 锉) 五味子各半两

【用法】上药除研外, 为末, 入郁李仁同研匀。炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空腹温酒送下。

【主治】癥癖气块, 胁肋满, 腹胀不能饮食, 腹痛。

【备考】方中赤茯苓, 原书卷七十三作赤芍药。

37264 防葵丸

《普济方》卷一七三。为《圣惠》卷四十九“防

葵方”之异名。见该条。

37265 防葵方

【方源】《圣惠》卷四十九。

【异名】防葵丸(《普济方》卷一七三)。

【组成】防葵三分 桂心半分 木香半两 吴茱萸半两(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 鳖甲一两半(涂醋炙令黄, 去裙襕) 桔梗三分(去芦头) 川大黄一两(锉碎, 微炒) 当归半两(锉, 微炒) 京三棱三分(微煨, 锉) 赤芍药三分 五味子半两 槟榔一两半 郁李仁一两(汤浸, 去皮, 微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以温酒送下, 不拘时候。

【主治】癥瘕喘嗽, 腹中疝痛, 吃食减少, 四肢乏力。

37266 防葵饮

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】防葵 鳖甲(醋炙, 去裙襕) 松萝 甘草(生)各半两 常山三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盂半, 煎至八分, 去滓, 未发前徐徐温服。取吐为度。

【主治】痰疟寒热, 温疫。

37267 防葵散

【方源】方出《千金》卷十四, 名见《普济方》卷九十九。

【组成】防葵 代赭 人参 铅丹 钩藤 茯神 雷丸 虎骨 远志 桂心 防风 白僵蚕 生猪齿各六分 卷柏 苘蓉子 光明砂 升麻 附子 牡丹 龙齿各一分 牛黄二分 蚱蝉十四枚 蛇蛻皮 白马眼睛各一具 白薇四分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕, 酒送下, 一日二次, 亦可为丸服。

【主治】癫痫厥时发作。

37268 防葵散

【方源】方出《千金》卷十四, 名见《普济方》卷一〇一。

【组成】防葵 人参 贯众各五两 防风

桂心各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分四服，亦可稍服。

【主治】狂邪发无常，披头大唤欲杀人，不避水火。

37269 防葵散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】防葵 人参(去芦头) 贯众 远志(去心) 茯神 犀角屑 天雄(炮裂，去皮脐) 防风(去芦头) 桂心各一两 甘草三两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏风邪，恍惚失常，言语错乱。

37270 防葵散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】防葵一两 代赭一两(细研) 人参一两(去芦头) 铅丹一两半 钩藤一两 茯神一两 雷丸一两 虎头骨一两半(涂酥炙令黄) 远志一两(去心) 白僵蚕一两(微炒) 生猪齿一两 防风一两(去芦头) 卷柏一两 川升麻一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 虎掌三分(汤洗七遍，生姜汁拌炒令黄) 朱砂一两(细研) 牡丹一两 牛黄半两(细研) 龙齿二两 蚱蝉十四枚(微炒) 蛇蛻皮一条(烧为灰) 白薇一两 白马眼睛一对(炙令微黄)

【用法】上为散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风癫，精神错乱，发作无时。

37271 防葵散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】防葵三分 京三棱三分(锉碎，醋炒三遍) 蓬莪术半两 诃黎勒半两(煨，用皮) 槟榔半两 赤茯苓半两 人参半两(去芦头) 白术半两 桂心半两 枳壳半两(麸炒微黄，去瓢) 白豆蔻半两(去皮) 木香半两 川大黄半两(锉碎，微炒) 丁香一分 附子半两(炮裂，去皮脐) 郁李仁

三分(汤浸，去皮尖，微炒) 鳖甲三两(洗去尘土，用礞砂半两研碎，以醋二合浸礞砂去却石，涂醋炙鳖甲、礞砂，醋尽为度)

【用法】上为细散。每服一钱，空心及晚食前以温酒调下。

【主治】虚劳癥瘕，或气攻脾胃，令人心下及胃管两傍坚硬，喘息急促，牵引两肋妨痛。

【宜忌】忌苋菜、生冷、湿面。

37272 防葵散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】防葵一两 诃黎勒皮三分 白术三分 郁李仁三分(汤浸，去皮，微炒) 吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒) 桂心三分 枳实半两(麸炒微黄) 木香三分 槟榔三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】肥气在左肋下，结聚成块，心腹妨实，不欲饮食。

37273 防葵散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】防葵一两 京三棱一两(炮裂) 桂心一两 赤芍药各一两 鳖甲一两半(涂醋炙令黄，去裙襕) 当归一两 诃黎勒皮一两 川大黄一两(锉碎，微炒) 枳壳三分(麸炒微黄，去瓢)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】伏梁，气在脐上心下，结固如梁之状，胸膈不利，食饮减少。

37274 防葵散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】防葵半两 桔梗三分(去芦头) 川朴消三分 川大黄三分(锉碎，微炒) 桃仁半两(汤浸，去皮尖，麸炒微黄) 木香半两

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓，食前稍热服。当利下恶物为度，未利再服。

【主治】积聚气，心腹胀硬如石，肚上青脉起，食饮不下。

37275 防葵散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】防葵一两 木香一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 白术一两 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 牛膝一两（去苗） 桂心一两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】妇人心腹积聚气，时有疼痛，经络不利，四肢渐瘦，食少腹胀。

37276 防葵散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】防葵一两 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 桂心一两 鬼箭羽一两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒） 当归一两 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】妇人瘕痞，心腹胀硬如石，经络不利，四肢瘦弱，少思饮食。

37277 防葵散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】防葵半两 柴胡半两（去苗） 川大黄半两（锉碎，微炒） 桑根白皮半两（锉） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿疳发后，肚胀，兼头面浮肿。

37278 防葵散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】防葵一两 木香五钱 柴胡 黄芩各半两

【用法】上锉细。每次五钱，水煎服。

【主治】伤寒汗下后，脐左有动气者。

37279 防喘汤

【方源】《千家妙方》引庄奕周方。

【组成】冬虫夏草 10 克 黄耆 12 克 大枣 10 枚 猪肺 1 具（不落水）

【用法】取猪肺与诸药清水炖烂，饮其汤，食其肺。

【功用】保肺益气。

【主治】支气管哮喘属肺气虚弱，卫外不固，有发作先兆者。

【临证举例】王某某，女，45 岁，干部，患支气管哮喘已 10 多年，每因气候骤变或感冒均发作，经过多方治疗，未见效果。曾注射人血丙种球蛋白 6 次，预防感冒及哮喘发作，均未奏效。查见患者语言声低，疲乏无力，平时汗多，纳食二便尚可，脉细弱，舌淡苔薄。证系肺气虚弱，卫外不固。嘱用防喘汤，以保肺益气，在气候变化、有感冒或哮喘发作先兆时用之。平时可常服六君子丸（汤）之类药物，如此半年即未见哮喘发作。

37280 防温汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】羌活 苍术（炒） 防风 赤茯苓 猪苓 泽泻 木通（去节） 白术 官桂各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘湿难收。

37281 防犀饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】防己三钱 朴消 犀角 黄芩 黄耆 升麻各八分

【用法】淡竹叶十五片煎服。

【主治】丹疹遍身如洒珠者。

37282 防腐汤

【方源】《外科十三方考》。

【组成】豆豉 甘草

【用法】先以上药煎水洗后，再用五倍子、荆芥煎水洗之。

【功用】使不生脓。

【主治】痔核落后。

37283 防己煮散

《外台》卷二十引《古今录验》。为《千金》卷二十一引褚澄方“汉防己煮散”之异名。见该条。

37284 防风饮子

【方源】《幼幼新书》卷三十七引《惠眼观证》。

【组成】防风 甘草(炙) 连翘各一两 山梔子半两

【用法】上为末。每服二钱，水五分，煎三五沸，去滓服。

【主治】小儿风虚疮癬。

37285 防风饮子

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛 蔓荆子各三分 葛根 防风各五分 当归身七分半 炙甘草 黄连 人参各一钱

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏，食远服。避风寒。

【功用】《医方集解》：去内热火邪。

【主治】①《兰室秘藏》：倒睫拳毛。②《医钞类编》：白眼痛。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、阳明药也。参、甘以补其气，归身以濡其血，黄连以清其火，防、葛以散风热，细辛入少阴而润肾，蔓荆走头面而升阳。

【备考】《原机启微》有黄耆，无黄连。

37286 防风饮子

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】防风 羌活 白附 甘草 川芎 白茯苓 全蝎 人参各等分

【用法】上为散。每服一钱，加钩藤同煎服。

【主治】小儿变蒸惊悸，焦啼吮乳，手足抽掣。

37287 防风饮子

《奇效良方》卷二十五。为《外台》卷十五引《延年秘录》“防风饮”之异名。见该条。

37288 防风饮子

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】黄耆 附子 甘草 苍术 陈皮

羌活 防风 桔梗各等分

【用法】每服五钱，加生姜一片，水煎服。

【主治】痹证，项筋急痛，诸药不效者。

37289 防风饮子

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】蔓荆子 黄耆(生) 黄连各一钱半 甘草(炙) 防风 葛根各一钱 细辛三分

【用法】水煎，食远热服。

【主治】倒睫拳毛，眦睑赤烂。

【加减】虚人，加人参一钱，当归七分。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“防风饮”。

37290 防风补煎

【方源】《千金》卷十一。

【组成】防风 细辛 芎藭 白鲜皮 独活 甘草各三两 橘皮二两 大枣三七枚 甘竹叶(切)一斗 蜜五合

【用法】上咬咀。以水一斗二升，先煮九味，取四升，去滓，下蜜，更煎两沸，分四服，日三夜一。若五六月，以燥器贮，冷水藏之。

【主治】肝虚寒，目眈眈，视物不明，谛视生花。

【方论选录】《千金方衍义》：防风、白鲜皮、甘竹叶上散头目诸风；细辛、独活、芎藭下通肾肝之结；甘草、橘皮、蜂蜜、大枣培土以御木邪之下陷也。

【备考】本方方名，《千金方衍义》引作“防风煎”。

37291 防风根汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】防风根 于术 当归 姜黄 生黄芪 桑枝

【主治】络虚而致之肩膊疼痛连臂，渐下人环跳，髀膝。

37292 防风浴汤

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】防风三两 蒺藜(切)一升 羊桃根三两 石南一两 秦艽一两 川升麻一两

苦参三两 茵芋一两 白蒺藜一两 蛇床子一两 白矾一两 枳壳一两

【用法】上锉细。以水七斗，煎至五斗，去滓，于暖室中洗浴，令汗出。避风冷。

【主治】风瘙痒不可止。

37293 防风浴汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】荆芥穗四两 苦参 地骨皮 白牵牛 赤小豆各三两 白蒺藜（炒，去刺） 防风（去芦头） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 香白芷 蓖麻叶 杉木 蒴藋叶各二两 木鳖子一两半（去壳，炒令焦黄色） 当归（洗，焙） 独活（去芦头） 吴茱萸（汤洗七次）各一两

【用法】上为细末。每用半两，水四碗，入连根葱白五茎，擘开，同煎五七沸，倾出，入朴消末二钱，重搅匀，先熏，候通手淋灏。

【主治】风湿脚气，气血凝滞，皮肤粗涩，不自润泽。

37294 防风浴汤

【方源】《医方类聚》卷二十四引《御医撮要》。

【组成】防风 羊桃根各三两 石南 秦艽 茵草 蒺藜子 蛇床子 白及 枳壳各一两 苦参三两 升麻一两

【用法】上件合煎，浴之。

【主治】诸风顽痹，皮肤不仁，瘙痒麻木。

37295 防风煮散

【方源】《千金》卷十一。

【组成】防风 茯苓 萎蕤 白术 橘皮 丹参各一两三分 细辛二两 甘草 升麻 黄芩各一两半 大枣三七枚 射干一两 酸枣仁三分

【用法】上为粗散。以方寸匕两匕帛裹，以井花水二升煮，时时动上裹帛，煎取一升，分服之，每日二次。

【主治】肝实热，梦怒，虚惊。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防风散”。

37296 防风煮散

【方源】《传家秘宝》。

【组成】柴胡 川大黄（煨） 元参 木通 酸枣仁（炒） 大腹子 虎骨（醋炙） 芍药 五加皮 麻黄（去节） 黄耆（炙） 当归 牛膝 羌活 防风 丹参 海桐皮 官桂 木香 鳖甲（炙）各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，入青蒿枝同煎至七分，去滓温服。

【主治】骨蒸劳气，日渐消瘦，腰脚疼痛，寒热不调。

37297 防己地黄汤

【方源】《金匱》卷上。

【组成】防己一分 桂枝三分 防风三分 甘草一分

【用法】上四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁，生地黄二斤咬咀，蒸之如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁和。分二次服。

【主治】癫狂病，痹证。

①《金匱》：病如狂状妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。②《千金》：语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。③《张氏医通》：癫痫语言错乱，神气昏惑。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：此狂者，谓五脏阴血虚乏，魂魄不清，昏动而然也。桂枝、防风、防己、甘草酒浸绞汁，用是轻清归之于阳，以散其邪；用生地黄之凉血补阴，熟蒸以归五脏，益精养神也。盖药生则散表，熟则补衰，此煎煮法也，又降阴法也。②《千金方衍义》：此皆惊痰堵塞于心包，乱其神识所致，故以防己逐其痰气，防风泻其木邪，桂心通其关窍，地黄安其本神，甘草专和桂心、地黄寒热之性也。③《成方切用》：此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滯凝，滯凝则流湿，湿留壅火，邪聚于心，故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火，凉血热，谓如狂妄行独语不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热，则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚无疑

尔。后人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。

【临证举例】①癫狂（《黑龙江中医药》（1985；4：30）：一张姓男孩，18岁，精神失常。半年前因与邻里吵闹，遂精神失常，心神不定，常坐室内独语不休，入夜不寐，或信步外游，时喊头痛，多忧善虑，曾延医诊治，屡施导痰、涌吐、攻下三法治之罔效，诊见舌红少津，脉浮大如弦。方用：生地90克，防己9克，防风9克，桂枝10克，生甘草10克。煎服3剂后，心神稍定，夜能入眠，未见出走。后又以此方在剂量上略加变通，并加生赭石40克，生龙、牡各30克，桃仁15克。煎服10剂后，病患遂爽然若失，精神转佳，如常人，并能参加劳动。②痹证（《新中医》1981；2：36）：刘氏以防己地黄汤加味治疗急性风湿性关节炎50例，所选病例均有明显的游走性关节疼痛，血沉明显增速，最高达162mm/h（魏氏法），部分病人伴低热或中等度发热，自汗，少数病例皮肤出现环形红斑。50例中，风湿活动首次发作者12例，有反复发作史1~20余年者38例。本证乃风寒湿三气杂至与气血相搏，营气不通，郁而化热所致，治以祛风胜湿，活血通络，清热凉血为法，方用防己地黄汤（木防己15克、生地15克、防风9克、桂枝9克、甘草9克）为主，加入蒲公英30克（或野菊花30克），以助控制风湿活动，治疗期间停用任何西药，嘱患者充分休息。结果50例中，显效25例（关节痠痛消失，血沉在2~3周内降至正常范围）有效18例（关节痠痛消失或减轻，血沉在4周内降至正常范围，或2~3周内明显下降，但未达到正常水平），无效7例（关节痠痛及血沉变化不大）。

37298 防己竹沥汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防己（锉）一两 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）三两 防风（去叉）升麻 桂（去粗皮）芎藭·独活（去芦头）羚

羊角（镑）各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，煎至八分，去滓，更入竹沥一合，再煎三五沸，温服，日二夜一。风若未除，更服防风独活汤。

【主治】初得中风，四肢不收，心神昏愤，眼不识人，不能言语，已服荆沥汤及防风汤，诸症好转者。

【加减】手足逆冷，加生姜三两、白术二两。
37299 防己苡仁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】酒炒木防己 杜赤豆 川草薢 大豆卷 绵茵陈各三钱 晚蚕沙四钱（包）制苍术 宣木瓜各八分 川柏五分 木通一钱

【用法】先用生苡仁、酒炒桑枝各一两，煎汤代水，以本方送服桃仁控涎丹。

【主治】着痹。湿郁化热，留滞关节肢络。

37300 防己枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】防己一两 枳壳（去瓤，麸炒）二两 桑根白皮（锉） 当归（切，焙）各一两 木香半两 紫苏茎（锉） 槟榔（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，煎至一盂，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后肿满喘咳。

37301 防己茯苓汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】木防己汤（《外台》卷二十引《深师方》）、防己汤（《圣济总录》卷三十二）、茯苓汤（《鸡峰》卷十九）、防己加茯苓汤（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】防己三两 黄耆三两 桂枝三两 茯苓六两 甘草二两

【用法】以水六升，煮取二升，分温三服。

【主治】①《金匱》：皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者。②《圣济总录》：伤寒病后气虚，津液不通，皮肤虚满。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌海藻、松菜、生葱、酢物。

【方论选录】①《医方集解》：防己行经络，茯苓善渗泄，黄耆达皮肤，桂枝走肢节。②《金匱要略心典》：皮中水气，浸淫四末而壅遏卫气，气水相逐，则四肢聂聂动也。防己、茯苓善驱水气，桂枝得茯苓，则不发表而反行水，且合黄耆、甘草助表中之气，以行防己、茯苓之力也。③《退思集类方歌注》：水在皮肤，卫阳必虚而汨没，故用桂枝宣卫阳以解肌；君茯苓，泄皮中水气；黄耆益卫气，生用亦能达表，治风注肤痛；汉防己大辛苦寒，通行十二经，开腠理，泄湿热，此治皮水之主方也。里无水气，故不须白术以固里。

37302 防己茯苓汤

【方源】《普济方》卷二四三。

【组成】汉防己一两 赤茯苓二两 桑白皮三两(锉) 桂心一两半 甘草一两半 赤芍药一两 麻黄一两(去节)

【用法】上为散。每服四钱，水一中盏，入生姜半分，大枣二个，煎至六分。去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气痹挛肿闷。

37303 防己茯苓汤

【方源】《温热经解》。

【组成】木防己一钱 茯苓一钱 泽泻一钱 甘草八分 苍术八分 滑石二钱 酒黄柏八分 猪苓一钱

【主治】湿热跗肿。

37304 防己宣痹汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】防己三钱 木瓜二钱 地龙三钱(炒) 穿山甲三钱(炒) 灵仙二钱 木通一钱五分 苡仁八钱 赤苓四钱 丝瓜络一钱五分 飞滑石六钱(包) 秦艽二钱 嫩桑枝三尺

【主治】湿热下注，流走筋络，两足痿重或痛。

37305 防己桂枝汤

《三因》卷十三。为《金匱》卷中“木防己汤”之异名。见该条。

37306 防己桂枝汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】桂枝 川草薢 独活 秦艽 川牛膝 白茄根 木防己 赤芍 苍术 炙没药 全当归 炒桑枝

【主治】寒湿鹤膝初起，肿痛按之不热者。

37307 防己黄耆汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】木防己汤(《外台》卷二十引《深师方》)、汉防己汤(《活人书》卷十七)、防己汤(《圣济总录》卷七十九)、逐湿汤(《永乐大典》卷一三八七九引《风科集验方》)、白术煎(《仙拈集》卷一)、黄耆防己汤(《杂病源流犀烛》卷五)。

【组成】防己一两 甘草半两(炒) 白术七钱半 黄耆一两一分(去芦)

【用法】上锉，如麻豆大。每抄五钱匕，加生姜四片，大枣一枚，水一盞半，煎至八分，去滓温服，良久再服。服后当如虫行皮中，从腰下如冰，后坐被上，又以一被绕腰下，温令微汗，愈。

【功用】《医编》：固表以散风水。

【主治】肌表气虚，风湿外客，一身尽重，关节烦疼，或腿足浮肿，汗出恶风，脉浮者。

①《金匱》：风湿或风水脉浮身重，汗出恶风者。②《局方》：风湿相搏，客在皮肤，一身尽重，四肢少力，关节烦疼，时自汗出，洒淅恶风，不欲去衣；及风水客搏，腿脚浮肿，上轻下重，不能屈伸。③《医方集解》：诸风诸湿，麻木身痛。④《治疫全书》：风湿误汗，恐致亡阳者。

【加减】喘者，加麻黄半两；胃中不和，加芍药三分；气上冲者，加桂枝三分；下有陈寒者，加细辛三分。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：以黄耆实卫，甘草佐之；防己去湿，白术佐之。然则风湿二邪，独无散风之药何耶？盖汗多知

其风已不留,以表虚而风出入乎其间,因之恶风尔。惟实其卫,正气壮,则风自退,此不治而治者也。②《医方集解》:此足太阳、太阴药也。防己大辛苦寒,通行十二经,开窍泻湿,为治风肿、水肿之主药;黄耆生用达表,治风注肤痛,温分肉,实腠理;白术健脾燥湿,与黄耆并能止汗为臣;防己性险而捷,故用甘草甘平以缓之,又能补土制水为佐;姜、枣辛甘发散,调和荣卫为使也。③《成方便读》:防风、防己二物,皆走表行散之药,但一主风而一主湿,用各不同,故方中不用防风之散风,而以防己之行湿。然病因表虚而来,若不振其卫阳,则虽用防己亦不能使邪逐去而病愈。故用黄耆助卫气于外,白术、甘草补土德于中,佐以姜、枣通行营卫,使防己大彰厥效。服后如虫行皮中,上部之湿欲解也。或从腰以下如冰,用被绕之,令微汗出愈,下部之湿仍从下解。虽下部而邪仍在表,仍当以汗而解耳。④《中国医学大辞典》:何以不用桂枝、麻黄以发表祛风,而用防己、黄芪以补虚行水乎?盖以汗出为腠理之虚,身重为土虚湿胜,故用黄耆以走表塞空,枣、草、白术以补土胜湿,生姜辛以去风,温以行水,重用防己之走而不守者,领诸药环转于周身,使上行下出,外通内达,迅扫而有余矣。

【临证举例】①功能性水肿《陕西中医》(1987; 1: 27): 赵某,女,46岁。半年前出现水肿,经检查肝、肾功能正常,心脏听诊及尿常规检查亦属正常,诊为功能性水肿。曾服西药利尿剂,水肿消,但不能巩固,且出现乏力。诊见下肢浮肿,按之没指,晨轻暮重,乏力肢麻,白带多,大便溏薄,舌苔白薄而腻,脉濡。用防己黄耆汤加味:生黄耆、防己各15克,生炒白术各10克,生姜3片,大枣5枚,赤小豆、玉米须各30克。煎服7剂后肿消,半个月后浮肿又起,仍投上药,再服7剂,病即痊愈。随防半年,未复发。②更年期综合征《陕西中医》(1987; 1: 27):

王某,女,47岁。常自汗出,手足发麻,小便量少,下肢浮肿,舌质淡胖,月经错乱,舌苔薄白,脉濡。曾在内分泌科检查,未发现明显阳性指征,诊为更年期综合征用生黄耆15克,白术、防己各12克,生姜3片,大枣3枚。煎服14剂,水肿消退。③狐臭《贵阳中医学院学报》(1985; 3: 34):以防己黄耆汤治疗狐臭12例,其中男3例,女9例,年龄最大48岁,最小14岁,病程1~25年不等。处方:防己、黄耆各30克,炒白术15克,甘草6克,生姜9克,大枣20克。若水湿甚者,加茅术、车前子(草);脾虚明显者,加茯苓皮、泽泻;肥胖者,加茵陈、焦山楂各20克。结果12例全部治愈,平均疗程3.5月。

37308 防己麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】防己一两一分 麻黄(去节,先煎、掠去沫,焙干)一两 厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙五遍)一两半 独活(去芦头)一两 芎藭三分 石膏一两一分(捣) 秦艽(去苗土)三分 牛膝(酒浸,切,焙)一两一分 桑寄生三分 桂(去粗皮)一两 葛根(锉)三分 甘草(炙,锉)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓温服,日三夜一,不拘时候。

【主治】中风,四肢拘挛,急强疼痛,口燥咽干,舌上白屑,兼理寒冷风湿、风毒,肢节挛急,及胸胁腰背心腹暴痛,不可转侧。

【加减】咳嗽者,加杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,同捣)。

37309 防己椒苈丸

《准绳·类方》卷二。即《金匱》卷中“防己椒目葶苈大黄丸”。见该条。

37310 防己椒苈汤

《中国医学大辞典》。即《金匱》卷中“防己椒目葶苈大黄丸”改为汤剂。见该条。

37311 防己葶苈丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】防己一两 葶苈(隔纸炒)三分 杏仁(去皮尖双仁,炒,研如脂)一分

【用法】上药先捣前二味为细末,与杏仁同研令匀,取枣肉和丸,如梧桐子大。每日三次,每服二十丸,空腹煎桑白皮汤送下。

【主治】肺癰。

37312 防己葶苈丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】葶苈 黑牵牛 白术各半两 防己三分 郁李仁 桑白皮 茯苓 羌活 黄橘皮 泽泻各三分

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每次空腹服二十丸,熟水送下。五日未效,加五丸,止于三十丸。

【主治】腹中湿热,并手足微肿,胸满气急。

37313 防己葶苈丸

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】汉防己 木通 贝母各一两 苦葶苈(炒) 杏仁

【用法】上为末,枣肉膏为丸,如梧桐子大。桑白皮汤送下。

【主治】水气凌肺,喘嗽,面目浮肿,小便赤涩,喘促不得卧。

【备考】方中葶苈、杏仁用量原缺。

37314 防己槟榔丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】防己 槟榔(煨,锉) 郁李仁(去皮尖,炒,研)各三分 葶苈(纸上炒)半两

【用法】上为细末,炼蜜和丸,如小豆大。每服十丸至二十丸,空心用葶苈汤送下。

【主治】十种水气。

【备考】本方方名,《普济方》引作“槟榔丸”。

37315 防风一字散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】川乌五钱 川芎 荆芥各三钱 羌活 防风各二钱半

【用法】上为末。每服二钱,薄荷煎汤送下。

【主治】胆受风热,瞳仁连眦头痒极,不能收睑。

37316 防风干葛汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】防风 荆芥 干葛 升麻 广皮 甘草 白芷

【主治】邪入阳明,风中于右,口眼喎斜,脉右关弦长。

【加减】身痛,加秦艽、钩藤。

37317 防风子芩丸

《医略六书》卷二十八。为《校注妇人良方》卷十二“防风黄芩丸”之异名。见该条。

37318 防风天麻丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】防风(去芦) 天麻 升麻 白附子(炮) 定风草 细辛(去苗) 川芎 人参(去芦) 丹参(去芦) 苦参(去芦) 玄参(去芦) 紫参(去芦) 蔓荆子 威灵仙 穿山甲(炒) 何首乌各一两(另捣为末) 蜈蚣一对

【用法】上为细末,与何首乌末拌匀,每药末二两,胡麻一斤,淘净晒干,炒香熟,另碾为极细末,与药末一处拌匀,炼蜜和丸,共作九十丸。每服一丸,细嚼,温浆水送下,不拘时候,每日三次。初服药有呕吐者,不可怪,服药得安如故。

【主治】痲风癰病。

【宜忌】宜食淡白粥一百二十日,病人大忌房劳,将息慎口。

【备考】本方为末,蜜酒调下一钱,名“防风天麻汤”(见《中国医学大辞典》)。

37319 防风天麻丸

《杂病源流犀烛》卷十三。即《宣明论》卷三“防风天麻散”改为丸剂。见该条。

37320 防风天麻汤

《医学六要》卷五。为《宣明论》卷三“防风天麻散”之异名。见该条。

37321 防风天麻汤

《中国医学大辞典》。即《准绳·类方》卷五“防风天麻丸”改为汤剂。见该条。

37322 防风天麻散

【方源】《宣明论》卷三。

【异名】防风天麻汤（《医学六要》卷五）。

【组成】防风 川芎 天麻 羌活 香白芷 草乌头 白附子 荆芥穗 当归（焙）甘草各半两 滑石二两

【用法】上为末。热酒化蜜少许，调半钱，加至一钱，觉药力运行微麻为度。或炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸或半丸，热酒化下；细嚼，白汤化下亦得。

【功用】散郁结，宣通气血，解昏眩。

【主治】风湿麻痹走注，肢节疼痛，中风偏枯，或暴暗不语，内外风热壅滞昏眩。

【宜忌】《普济方》：热势太甚及目疾口疮、咽喉肿痛者，不宜服之。

【备考】本方改为丸剂，名“防风天麻丸”（见《杂病源流犀烛》）。《证治宝鉴》有独活。

37323 防风天麻散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】防风 天麻 川芎 白芷 甘草 川乌一个（炮） 麻黄（去节）各等分

【用法】上为细末。葱蜜汤调下，薄荷汤亦可。

【功用】《普济方》：祛风镇惊。

【主治】①《朱氏集验方》：惊风，头疼。②《普济方》：伤寒夹惊。

【加减】惊搐，加全蝎一个，乌蛇肉尾、白附子、麝香各少许，羌活煎汤下；伤风，加零陵香、羌活。

37324 防风天麻膏

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】防风 天麻 人参（去芦头）各一分 甘草（炙） 白僵蚕 干全蝎 白附子各半两（以上为细末） 朱砂（细研，水飞）一两 牛黄（研）一分 麝香（研）一钱

【用法】上为末，炼蜜和丸，如皂子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】祛风镇惊。

【主治】小儿伤寒夹惊。

【备考】本方方名，据剂型当作“防风天麻丸”。

37325 防风木通汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】防风 木通

【功用】上下分消。

【主治】风湿腹胀之证。发热身重，不能转侧，一身尽痛，心腹胀满，外连头面，内外皆热。

37326 防风牛蒡汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】防风 山梔 石膏 黄芩 苍术 木通 甘草 牛蒡子

【主治】手足忽如火燃，起紫白黄泡，血热之极者。

37327 防风升麻汤

【方源】《幼科类萃》卷二十一。

【组成】防风 升麻 山梔（去壳） 麦门冬（去心） 木通 甘草节各一钱

【用法】上咬咀。用淡竹叶三片煎，食远服。

【主治】小儿丹瘤赤肿。

37328 防风升麻汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】升麻 防风 山梔仁 甘草 麦冬（去心） 荆芥穗 木通 葛根 薄荷叶 玄参 连翘 牛蒡子

【用法】水煎服。

【功用】解毒发表。

【主治】小儿十种丹毒。

【加减】便秘者，加大黄。

【备考】《幼幼集成》有灯心，无连翘。

37329 防风升麻汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】防风五钱 升麻三钱 半夏（汤泡七次） 苍术（清水漂，不炒）各七钱 石膏（煨） 黄芩（酒炒）各一两 白芍 甘草各二钱 枳实（麸炒）五钱

【用法】上为末。每服二三钱，用薄荷、生姜煎水调服。

【主治】痘因痰郁，咳嗽而出不快者。

37330 防风升麻汤

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】防风 升麻各八分 青皮 生地 黄 牡丹皮 当归 细辛各五分

【用法】水二钟，煎至八分，食远温漱口服，滓再煎。

【主治】牙疼。

【加减】上牙疼属心火，加黄连、麦冬各五分；下牙疼属肾火，加知母、黄柏各七分；上左边牙疼属胆火，加羌活、龙胆草各八分；下左边牙疼属肝火，加柴胡、梔子各八分；上右边牙疼属大肠火，加大黄、枳壳各八分；下右边牙疼属肺火，加黄芩、桔梗各八分；上两边牙疼属胃火，加川芎、白芷各七分；下两边牙疼属脾火，加白芍、白术各八分。

37331 防风平胃散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】苍术 厚朴 广皮 甘草 防风

【主治】风湿腹胀，发热身重，不能转侧，一身尽痛，心腹胀满，外连头面，胸前饱闷。

【加减】下部胀，加防己。

37332 防风石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 石膏 干葛 白芷

【主治】风温项强，病在阳明。

【加减】症兼太阳，加羌活；兼少阳，加柴胡。

37333 防风石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】干葛石膏汤加防风。

【主治】阳明风热面赤色。

37334 防风归芎汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】川芎 当归 防风 荆芥 羌活 白芷 细辛 蔓荆子 丹参 乳香 没药 桃仁 苏木 泽兰叶

【用法】水煎，温服。

【功用】化瘀宣散。

【主治】头部跌打损伤，青紫肿胀。

37335 防风四苓散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】四苓散加防风

【主治】风邪入土，水谷偏渗大肠，小便不利，溏泄。

37336 防风四物汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤加防风，倍川芎

【主治】妇女春季月水不调，脐腹疼痛，脉弦头痛。

37337 防风白术汤

【方源】《医部全录》卷四九四。

【组成】防风（锉）五钱 炒术 茯苓 当归 大腹皮

【用法】水煎服。

【主治】痘日久不靥。

37338 防风白术散

《伤寒总病论》卷二。为方出《深师方》引赵子高方（见《外台》卷十五），名见《元和纪用经》“牡蛎术散”之异名。见该条。

37339 防风立效散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】柴胡 升麻 牛蒡子（炒） 全蝎 石膏（生用） 干葛 赤芍药 甘草各一两 北防风 郁金 薄荷叶 半夏（泡） 赤茯苓 北细辛 川芎 羌活各半两 桔梗 荆芥各二两

【用法】上为粗末。每服四大钱，水一盞半，葱头一个，煎至一盞，食后卧时温服，滓合煎服。候发散后，又相间服《局方》解毒雄黄丸。

【主治】咽喉病。

【宜忌】忌酒、毒物。

37340 防风必效散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】防风 防己 荆芥 白鲜皮 连翘 槐花 苍术 皂角针 风藤 木通 白芷 天花粉 木瓜 金银花 翻白草各一钱 甘草五分 土茯苓四两 大黄（初起）三钱

【用法】水三碗，煎至二碗，分二次服；滓再煎一碗，服后饮酒一大杯，即静睡一时许更妙。

【主治】杨梅疮，湿热太盛，疮高稠密，元气素实者。

37341 防风半夏丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】防风（去叉）三两 半夏（汤洗七遍，切，焙）一两半 天麻二两 芎藭半两 白芷一两 独活（去芦头）半两 人参三分 茯苓（去黑皮）半两

【用法】上为末，酒煮面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【功用】化痰涎，利头目。

【主治】风气身体疼痛，胸膈烦满。

37342 防风发表汤

【方源】《活幼心法》卷二。

【异名】荆防发表汤（《痘疹定论》卷四）。

【组成】防风五分 干葛八分 红花三分 枳壳（炒）七分 桔梗八分 苏梗六分 川芎五分 荆芥六分 当归六分 陈皮六分 甘草五分 杏仁（炒，去皮尖）一钱 山楂肉二钱

【用法】引用细葱白半寸，水煎服。

【功用】疏风清热。

【主治】痧疹初起发热，二三日或四五日内未见外证时，或奶疹、风疹。

【加减】冬令天寒，或加蜜水炒麻黄，或加羌活。

【备考】方中苏梗，《痘疹定论》作苏叶。

37343 防风芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】防风 芍药 黄芩各一两

【用法】上咬咀。每服半两或一两，水三盏，煎至一盏，滤清温服。

【主治】①《保命集》：泄痢、泄、身热脉弦，腹痛而渴，及头痛微汗。②《丹溪心法》：痢疾有表证者。

【备考】《金匱翼》有苍术。

37344 防风芍药汤

《不知医必要》卷三。为《医学正传》卷二引刘草窗方“痛泄要方”之异名。见该条。

37345 防风芎归汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】生地五钱 当归三钱 川芎一钱 甘草一钱 防风三钱

【功用】补血祛风。

37346 防风百解散

【方源】《普济方》卷一四九。

【组成】麻黄（去根节）三两 甘草（锉，炒）二两 防风二两 苍术半斤（为末，炒黄）

【用法】上为细末。每服三钱，水一钟半，葱白三寸，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。进二三服，微汗周而已。

【主治】伤寒风头痛，项强，身体疼痛，肌热恶寒，咳嗽喘促。

37347 防风至宝汤

【方源】《古今医鉴》卷二引刘尚书方。

【组成】当归 川芎 白芍药 防风 羌活 天麻 僵蚕（炒） 白芷 青皮 陈皮 乌药 牛膝肉（酒洗） 南星（制） 半夏（制） 黄连（姜汁炒） 黄芩（酒炒） 山梔仁（炒黑） 连翘 麻黄 甘草各八分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】诸风瘫痪，痿痹。

【宜忌】忌葱、蒜、猪、鸡、羊肉。

【加减】久病，去麻黄。

37348 防风当归丸

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】防风 当归（去尾）各等分

【用法】上药为丸。每服一钱，白汤送下。

【主治】肝经有风，血得风而流散不归经，以致妊娠下血。

37349 防风当归汤

《医学正传》卷五。为《此事难知》“防风当归散”之异名。见该条。

37350 防风当归汤

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】金银花 山茨菇 青木香 当归 赤芍药 白芷 防风 荆芥 连翘 升麻 羌活 独活 甘草 大黄

【用法】加薄荷、生地黄，水煎服。

【主治】疔疮发热，大便实者。

37351 防风当归汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】防风 当归各一钱五分 赤茯苓 独活 秦艽 赤芍药 黄芩各一钱 杏仁 甘草五分 桂心四分 生姜五片

【用法】上咬咀。水二钟，煎至一钟，食前温服。

【主治】血痹，皮肤不仁。

【备考】方中杏仁用量原缺。

37352 防风当归饮

《医学入门》卷七。为《宣明论》卷十二“防风当归饮子”之异名。见该条。

37353 防风当归饮

《证治汇补》卷三。为《此事难知》“防风当归散”之异名。见该条。

37354 防风当归散

【方源】《此事难知》。

【异名】防风当归汤（《医学正传》卷五）、防风当归饮（《证治汇补》卷三）。

【组成】防风 当归 川芎 地黄各一两

【用法】上锉。每服一两，水三盏，煮至二盏，去滓温服。

【功用】祛风养血。

【主治】①《此事难知》：发汗过多，发热头面摇，卒口噤，背反张者，太阳兼阳明也。②《妇科玉尺》：产后痉。

37355 防风当归散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】防风半两 甘草节半两 赤芍药半两 绵黄耆半两 当归半两 白芷半两 左缠藤 皂角刺各加众药五倍 肉桂（阴证）半两，（阳证）一钱 大黄（阳证）半两，（阴证）一钱

【用法】上咬咀。水四碗，砂瓶内煎至两碗；

加好酒一碗，再煎至两碗，放温作数起服。

【主治】诸般疮疖及热毒疮。

37356 防风冲和汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】防风 白术 生地各一钱半 羌活 黄芩 白芷 甘草各一钱 川芎五分

【用法】水煎，温服。

【主治】伤风有汗，脉沉缓。

【加减】汗未止，加黄耆、芍药。

37357 防风冲和汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷三。

【异名】加减冲和汤。

【组成】羌活 防风各一钱半 白术 川芎 白芷 生地黄 黄芩各一钱 细辛 甘草各五分。

【用法】上锉。入生姜三片，葱三茎，煎服。

【主治】春夏秋感冒风寒，头痛身热，自汗恶寒，脉浮缓。

37358 防风羊角汤

【方源】《济阴纲目》卷十二。

【异名】防风羚羊角汤（《医略六书》卷三十）。

【组成】防风一两 赤芍（炒） 桂心各半两 羚羊角 川芎 羌活 当归 酸枣仁（炒） 牛蒡子（炒）各二钱

【用法】上锉。每服四钱，水煎服。

【主治】①《济阴纲目》：产后气血不足，风邪所袭，肢体挛痛，背项强直。②《医略六书》：产后血亏寒滞，热郁于经，中风挛痛，强直，脉浮数者。

【方论选录】《医略六书》：防风疏风邪之外客，羚羊清郁热之炽热，羌活除肢体之痛，牛蒡除项背之强，当归养血脉以荣经，川芎行血气以活络，赤芍泻血中之滞，桂心温血室之寒，枣仁养心润燥以资营血也。水煎温服，使滞化血荣，则热郁自泄而风寒解散，经络清和，肢体项背无不皆受其荫，安有挛急疼痛、牵强挺直之患乎？

37359 防风导赤散

【方源】《观聚方要补》卷十引《局方》。

【组成】导赤散加防风

【主治】小儿初惊。

【备考】《朱氏集验方》本方用法：上咬咀。每服三钱，水一盞，竹叶少许同煎。

37360 防风导赤散

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】生地黄 木通 防风 甘草 黄芩 赤芍 羌活各等分

【用法】每服三钱，加竹叶三片、灯草三茎，水煎服。

【主治】小儿初见惊搐之证，而热尚浅者。

【加减】热不甚者，去黄芩、赤芍、羌活。

【方论选录】生地黄滋肾水以济心火，木通泻心火于小肠，防风宣达肝木之气，甘草和中缓肝，黄芩保肺清肺气，赤芍敛肝靖血热，羌活助防风以达肝气，且祛外风，竹叶达肝气，灯草降心火于下极。

37361 防风如神散

【方源】《妇人良方》卷八。

【组成】防风 枳壳各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】①《妇人良方》：妇人风虚，大便后时时下血。②《校注妇人良方》：风热气滞，粪后下血。

37362 防风苍术汤

【方源】《田氏保婴集》。

【组成】防风半两 苍术 石膏各一两 炙甘草半两 川芎 黄芩各二钱半

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜三片，薄荷七叶，水煎，每日二次。

【功用】解表，透斑疹。

【主治】小儿邪热在表，恶风恶寒，疮疹未出者。

37363 防风苍术汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】麻黄八分 防风一钱 苍术二钱 白术三钱

【用法】上咬咀。水煎熟，热服。取汗。

【功用】散风邪，健脾疏壅。

【主治】风壅肝木，损伤脾土，不能输布水湿，飧泄身热，脉弦腰重，微汗头疼。

【方论选录】麻黄解热助表，防风以散风邪，苍术、白术补中健脾，疏壅湿以止泄。

37364 防风苍术汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】防风 苍术 桔梗 陈皮 桃仁 白芷 川芎 当归 枳壳 厚朴

【主治】因风腰痛，左右无定处，牵引两足，脉浮。

【加减】痛甚者，加全蝎。

37365 防风赤芍汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】汉防己二两 木防己三两 赤芍药一两半 秦艽肉二两 苡米仁五两 宣木瓜三两 川续断三两（酒炒） 杜牛膝三两（酒炒）

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】产后瘀血内滞，湿热不化，下注而致脚气，足胫红肿疼痛不止，脉数涩大者。

【方论选录】汉防己泻血分湿热，木防己散血分风邪，赤芍破瘀血以通经，米仁渗湿热以除痹，秦艽通肌活血，木瓜醒脾舒筋，续断续经脉，牛膝利血脉也。为散水煎，使瘀血消散，则湿热自化而经脉清和，何红肿疼痛之不退哉。

37366 防风羌活丸

《普济方》卷一一四。为《外台》卷十四引《张文仲方》“十九味丸”之异名。见该条。

37367 防风羌活汤

【方源】《保命歌括》卷一。

【组成】防风 羌活 枳壳 桔梗 川芎各六分 白芍（酒炒）一钱 甘草（炙）四分 白茯苓七分 陈皮 半夏（汤洗七次） 白术 荆芥各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】真中风初起，其邪在表，气虚血虚挟痰，无汗而拘急者。

【加减】药后无汗者，加麻黄（去节）一钱，葱白三茎；头痛，加白芷、细辛各五分；血虚无汗，加生地黄，当归各五分；气虚有汗，加黄耆、人参各五分；口干有热，加柴胡、葛根、黄芩各五分；四肢恶寒，加桂枝一钱；风痰，加胆星一钱；胸中多痰、满闷，加竹沥、姜汁；搐掣，加白天麻、僵蚕（炒，去丝嘴）各八分。

37368 防风羌活汤

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】防风 羌活 连翘 升麻 夏枯草 牛蒡子 川芎 黄芩（酒浸） 甘草 昆布（洗） 海藻（洗） 僵蚕

【用法】加薄荷，水煎服。

【主治】瘰癧发热者。

【加减】虚者，加人参、当归；实者，加黄连、大黄。

【备考】《金鉴》本方用量：防风、羌活各一钱，连翘（去心）二钱，升麻七分，夏枯草二钱，牛蒡子（炒，研）一钱，川芎一钱，黄芩（酒浸）一钱，甘草五分，昆布（酒洗）一钱，海藻（酒洗）一钱，僵蚕（酒炒）二钱，薄荷一钱。

37369 防风羌活汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】防风 羌活 细辛 黄芩（酒洗） 白芷 南星 半夏 白术 藁本 甘草各等分

【用法】上为末。每服四钱，水煎，温服。

【主治】①《眼科全书》：风寒痰湿，眉棱骨痛。②《眼科阐微》：痰胜入于经络，壅塞通明孔窍，清气不得上升，渐生云翳。

【备考】按：《审视瑶函》有川芎，无白芷、藁本。

37370 防风羌活汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】羌活 防风 荆芥 柴胡 干葛

甘草

【主治】太阳病，项背强几几，无汗恶寒。

【加减】冬令，加生姜；夏令，加石膏；里有积热，加川连；胸前饱闷，加枳壳、厚朴。

37371 防风羌活汤

【方源】《不居集》下集卷二。

【组成】防风 羌活 秦艽 荆芥 薄荷 赤芍 连翘 梔子 滑石 甘草 玉竹

【主治】太阳风热上壅。

37372 防风羌活散

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】防风 羌活 全蝎 薄荷 荆芥 各一两

【用法】上为细末。每服三钱，酒调服，茶清亦可，不拘时候。

【主治】疥癣风疮。

37373 防风羌活散

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】防风 羌活 荆芥 独活 黄耆 牛蒡子 山梔 甘草 木通 苍术 车前子 天花粉

【主治】下疳。

37374 防风败毒饮

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】防风败毒散（《片玉痘疹》卷十二）、防风葛根汤（《赤水玄珠》卷二十八）。

【组成】升麻 葛根 防风 赤芍 甘草

【用法】水煎服。外用活蚬子不拘多少，以水养五七日，旋取其水洗，用天水散拭之。

【主治】①《万氏家抄方》：痘后余毒发癰疹。②《赤水玄珠》：痘发癰疹及麻疹发热。

37375 防风败毒散

《片玉痘疹》卷十二。为《万氏家抄方》卷六“防风败毒饮”之异名。见该条。

37376 防风败毒散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】生地 防风 连翘 升麻 荆芥 穗 牛蒡子 玄参 酒柏 人参 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒。

【主治】小儿麻痘发热。

37377 防风败毒散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】荆芥 防风 羌活 独活 川芎 枳壳 陈皮 葛根 甘草

【主治】风寒霍乱。风淫木贼，水谷不化，头痛身热，上吐下泻，心腹绞痛，甚则转筋，脉象浮紧。

37378 防风败毒散

《麻科活人》卷二。为《痘疹全书》卷下“防风解毒汤”之异名。见该条。

37379 防风明目汤

《医林纂要》卷十。即《兰室秘藏》卷上“神效明目汤”。见该条。

37380 防风泻白散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风 桑白皮 地骨皮 甘草

【主治】哮喘外有感冒，身发热者；或风寒喘咳，以风气为胜者。

37381 防风泻肝散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】防风 远志 桔梗 羚羊角 甘草 赤芍药 细辛 人参 黄芩各等分

【用法】上为细末。温水调服。

【主治】蟹眼睛疼。

【备考】《审视瑶函》本方用法：每服一钱半或二钱，食远沸汤调服。《医钞类编》有元参，无人参。

37382 防风枳实汤

【方源】《医心方》卷三引《集验方》。

【异名】防风汤（《千金》卷十三）、防风枳实散（《普济方》卷四十七）。

【组成】防风三两 枳实三两（炙） 茯神四两 麻黄四两（去节） 细辛二两 芎藭三两 前胡四两 生姜四两 半夏四两（洗） 杏仁三两 竹沥三升

【用法】上切。以水六升，合竹沥煮取二升七合，分三服。频服两三剂尤良。

【主治】风头眩欲倒，眼旋屋转，头脑痛。

37383 防风枳实散

《普济方》卷四十七。为《医心方》卷三引《集验方》“防风枳实汤”之异名。见该条。

37384 防风柏子散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】防风 柏子仁 百合 川乌 朗黎树根皮各等分

【用法】上为末。酒调涂囟上。

【主治】小儿囟大不合。

37385 防风荆芥散

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】荆芥穗 莎草根（去毛）各半斤 甘草（炙，锉）三两半 甘菊花（拣）半两 芎藭 白芷 羌活（去芦头） 防风（去叉）各三两

【用法】上为细末，炼蜜和匀，每一两分作三十饼。每服一饼，细嚼，茶、酒任下，不拘时候。

【主治】诸风及沐发未干，致头皮肿痒，多生白屑。

【备考】本方方名，据剂型，当作“防风荆芥饼”。《普济方》本方用法：上为细散，每服一钱匕，茶、酒任调下，不拘时候。

37386 防风荆芥散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】当归（洗，焙） 川乌头（炮，去皮尖） 羌活（去芦头） 防风（去芦头） 栝楼根 荆芥穗 木贼（去节）各一两 甘草半两（炙） 乌贼鱼骨一两半

【用法】上为细末。每服三钱，食后茶清调下。

【主治】风毒攻注眼目，常多昏暗，冷泪不止。

37387 防风茯苓汤

【方源】《外台》卷七引《深师方》。

【组成】防风二两 茯苓二两 桂心六两 甘草二两（炙） 半夏四两（洗） 干姜四两（炮） 人参三两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，绞去滓，分三服。

【主治】胸满短气，心痛吐涎，虚冷。

【宜忌】忌酢物、生葱、海藻、菰菜、羊肉、饧。

37388 防风茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】防风（去叉） 赤茯苓（去黑皮） 萎蕤 白术 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 丹参各一两三分 细辛（去苗叶）二两 甘草（炙）一两 升麻 黄芩（去黑心）各一两半 射干一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，加大枣二个（擘破），煎至一盏，去滓温服，每日三次。

【主治】阳厥怒狂。

37389 防风茯苓散

《校注妇人良方》卷三。为《圣惠》卷六十九“防风散”之异名。见该条。

37390 防风复元散

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】防风 麻黄 人参 白芷 当归 枸杞 秦艽 桔梗 黄芩 甘草 羌活 独活 细辛 半夏 防己 茯苓 芍药 前胡 苍术 藿香 官桂 香附 生地 熟地

【用法】加生姜，水煎服。五贴后，再服散风复元散。

【主治】紫稍疯，色如紫藤，模样似牛皮。

37391 防风独活汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】防风（去叉） 独活（去芦头） 秦艽（去苗土） 黄耆 芍药 人参 茯神（去木） 白术（锉，炒） 芎藭 山茱萸 薯蓣 桂（去粗皮） 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 羚羊角（镑） 升麻 甘草（炙） 丹参 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 五加皮 石斛（去根） 地骨皮 远志（去心）各四两 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）各三两 甘菊花（半开者，

微炒） 薏苡仁各一升 石膏（碎） 熟干地黄（焙）各六两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入生姜半分（切），煎至八分，去滓，空心、日午、夜卧各温服。如觉心膈虚烦满闷，气喘面赤，即与荆沥汤相间服。

【主治】中风初得，四肢不收，心神昏愆，眼不识人，不能言语，服防己竹沥汤后，风若未除者。

37392 防风独活汤

《普济方》卷九十六。为《圣济总录》卷五“独活汤”之异名。见该条。

37393 防风独活汤

《普济方》卷三三九。为《圣惠》卷七十四“麻黄散”之异名。见该条。

37394 防风胜金汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】鲍五（《痧书》卷下），三十七号无妄方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】防风 乌药 玄胡索 桔梗 枳壳各七分 卜子二钱 槟榔 金银花 山楂 连翘 赤芍各一钱

【用法】水二钟，煎至七分，稍冷服。

【主治】痧因子食积血滞者。

【临证举例】小儿夜啼痧汪洪皋子二岁时，夜深啼哭，至清晨不止。延余四子端英视之，腿弯有痧筋现，放一针，出紫黑毒血，乃与防风胜金汤倍加麦芽，稍冷饮之而安。

37395 防风胜湿汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风 荆芥 葛根 白芷 桔梗 甘草

【主治】风湿咳嗽。身重身痛，或发热有汗，或面目浮肿，或小便不利，骨节烦疼，气促咳嗽，脉象浮缓，带表症者。

37396 防风胜湿汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】防风 荆芥 苍术 白芷 羌活 川芎

【主治】湿气霍乱应汗者。

37397 防风胜湿汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】防风 川芎 苏叶 前胡 泽泻 陈皮 厚朴 杏仁 腹皮 茯苓

【用法】加葱白二个，水煎服。

【功用】祛风胜湿利水。

【主治】小儿疹出时饮冷形寒，或入水洗浴，或饮水食瓜，脾伤于湿，不能运通水道，致令水邪留滞，疹毒内攻，疹出一时即没，食少腹胀，喘促目闭，四肢软弱，小水不利，其脐凸出寸许，按之虚软有声，举之随手而起。

【加减】疹因风寒不起，加麻黄；因水湿，加苍术。

37398 防风神术汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 苍术 甘草 石膏

【主治】风湿热三气头痛。

【加减】风气胜者，倍防风，加羌活；湿气胜者，倍苍术，加白芷；热气胜者，倍石膏，加黄柏；太阳见症，加藁本；阳明见症，加升麻；少阳见症，加柴胡。通加川芎少许，上行头角。

37399 防风秦艽汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 赤茯苓 连翘各一钱 槟榔 甘草 栀子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术各六分

【用法】水二钟，煎至八分，食前服。

【主治】①《外科正宗》：痔疮不论新久，肛门便血，坠重作疼者。②《金鉴》：肠风下血，粪前点滴而出者。

【加减】便秘者，加大黄二钱。

37400 防风桔梗汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风 半夏 枳壳 陈皮 桔梗

【功用】散风解表。

【主治】肺风痰喘，脉象浮缓，风气胜者。

【加减】不应，加桑白皮、地骨皮。

37401 防风桔梗汤

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】牛蒡 防风 荆芥 麦冬 花粉 桔梗 茯苓 白芍 天冬 黄芩 玄参 柴胡 百合 山豆根

【用法】水煎服。

【主治】咳嗽，痘后肺癰，咽哑口渴，吐痰。

37402 防风桔梗汤

【方源】《仁端录》卷十一。

【组成】桔梗 防风 甘草 人参 腹皮 苏子 杏仁 麦冬 诃子

【用法】上为末。姜汁调下。

【主治】痘疹咳嗽声哑者。

【加减】肺虚，加五味子。

37403 防风柴胡汤

【方源】《不居集》下集卷二。

【组成】柴胡 防风 玉竹 黄芩 栀子 薄荷 赤芍 连翘 荆芥 甘草 滑石

【主治】太阳兼少阳风热上壅。

37404 防风消毒饮

【方源】《麻疹备要方论》

【组成】荆芥 防风 牛蒡子 甘草 枳壳 桔梗 石膏 苏叶 百部 马兜铃 葶苈 桑皮

【用法】水煎服。

【主治】麻毒内攻，喘促胸突，肚急目闭者，九死一生之症。

【备考】《治疹全书》有苏子、麦冬，无苏叶。

37405 防风消毒散

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】防风七分 桔芩一钱 薄荷五分 羌活五分 升麻五分 天花粉一钱 桔梗一钱 半夏五分 川芎五分 荆芥五分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】喉风。

37406 防风通气汤

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】羌活 独活各二钱 防风 甘草

(炙) 藁本各一钱 川芎五钱 蔓荆子三钱

【用法】上锉，分二贴。水煎服。

【主治】瘰癧不消，脓清不敛，服八珍汤少愈而肩背忽痛，不能回顾，此膀胱经气郁所致。

37407 防风通气汤

《杏苑》卷三。为《内外伤辨》卷中“通气防风汤”之异名。见该条。

37408 防风通圣丸

《全国中药成药处方集》(北京方)。即《宣明论》卷三“防风通圣散”改为丸剂。见该条。

37409 防风通圣散

【方源】《宣明论》卷三。

【异名】通圣散(《伤寒标本》卷下)。

【组成】防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒消各半两 石膏 黄芩 桔梗各一两 滑石三两 甘草二两 荆芥 白术 梔子各一分

【用法】上为末。每服二钱，水一大盏，生姜三片，煎至六分，温服。

【功用】疏风退热，泻火通便。

①《宣明论》：解酒，退热毒，兼解利诸邪所伤。②《医方类聚》引《修月鲁般经》：消风退热，散郁闭，开结滞，宣通气血。③《不居集》下集：疏风解热，利水泻火，扶脾燥湿，上下分消，表里交治。

【主治】风热壅盛，表里三焦俱实之证。身热烦躁，头痛昏眩，口苦而渴，咽喉不利，胸膈痞闷，腹部胀痛，谵妄惊狂，手足痠痲，大便秘结，小便短赤；小儿诸疳积热，诸疮，丹斑瘾疹，风肿火眼，舌苔黄腻，脉洪数或弦滑。

①《宣明论》：风热怫郁，筋脉拘倦，肢体焦萎，头目昏眩，腰脊强痛，耳鸣鼻塞，口苦舌干，咽嗑不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠粘，肠胃燥热结，便溺淋闭；或夜卧寝汗，咬牙睡语，筋惕惊悸；或肠胃怫郁结，水液不能浸润于周身，而但为小便多出者；或湿热内郁，而时有汗泄者；或因亡液而成燥

淋闭者；或因肠胃燥郁，水液不能宣行于外，反以停湿而泄；或燥湿往来，而时结时泄者；或表之，阳中正气与邪热相合，并入于里，阳极似阴而战，烦渴者；或虚气久不已者。或风热走注，疼痛麻痺者；或肾水真阴衰虚，心火邪热暴甚而偃仆，或卒中久不语，或一切暴暗而不语，语不出声，或暗风痼者，或洗头风，或破伤，或中风诸潮搐，并小儿诸疳积热，或惊风积热，伤寒疫疔而能辨者；或热甚佛结而反出不快者，或热黑陷将死；或大人、小儿风热疮疥及久不愈者，或头生屑，遍身黑黧，紫白斑驳，或面鼻生紫赤风刺瘾疹，俗呼为肺风者，或成风疔，世传为大风疾者；或肠风痔漏，及伤寒未发汗，头项身体疼痛者，并两感诸症。兼治产后血液损虚，以致阴气衰残，阳气郁甚，为诸热症，腹满涩痛，烦渴喘闷，谵妄惊狂，或热极生风而热燥郁，舌强口噤，筋惕肉瞤，一切风热燥症，郁而恶物不下，腹满撮痛而昏者。兼消除大小疮及恶毒，兼治堕马打扑伤损疼痛，或因而热结，大小便涩滞不通，或腰腹急痛，腹满喘闷者。②《医学正传》：痢后鹤膝风。③《片玉心书》：冻耳成疮者。④《寿世保元》：风热实盛发狂，及杨梅疮。⑤《眼科全书》：时行暴热，风肿火眼，肿痛难开，或头面俱肿。⑥《金鉴》：胃经积热生疮面致之秃疮。

【宜忌】《准绳·疡医》：若时毒饥馑之后胃气亏损者，须当审察，非大满大实不用。

【加减】涎嗽，加半夏半两(姜制)。

【方论选录】①《医方考》：防风、麻黄解表药也，风热之在皮肤者，得之由汗而泄；荆芥、薄荷清上药也，风热之在巅顶者，得之由鼻而泄；大黄、芒硝通利药也，风热之在肠胃者，得之由后而泄；滑石、梔子水道药也，风热之在决渎者，得之由溺而泄。风淫于膈，肺胃受邪，石膏、桔梗清肺胃也，而连翘、黄芩又所以祛诸经之游火；风之为患，肝木主之，川芎、归、芍和肝血也，而甘草、白术又所以和胃气而健脾。诸痛痒疮痒，皆属心火，故表有疥疮，必里

有实热。是方也,用防风、麻黄泄热于皮毛;用石膏、黄芩、连翘、桔梗泄热于肺胃;用荆芥、薄荷、川芎泄热于七窍;用大黄、芒消、滑石、梔子泄热于二阴;所以各道分消其势也。乃当归、白芍者,用之于和血;而白术、甘草者,用之以调中尔。②《医方集解》:此足太阳、阳明表里血气药也。防风、荆芥、薄荷、麻黄轻浮升散,解表散寒,使风热从汗出而散之于上。大黄、芒硝破结通幽;梔子、滑石降火利水,使风热从便出而泄之于下。风淫于内,肺胃受邪,桔梗、石膏清肺泻胃;风之为患,肝木受之,川芎、归、芍和血补肝;黄芩清中上之火;连翘散气聚血凝;甘草缓峻而和中(重用甘草、滑石,亦犹六一利水泻火之意);白术健脾而燥湿。上下分消,表里交治,由于散泻之中,犹寓温养之意,所以汗不伤表,下不伤里也。

【临证举例】头痛①《天津医药》(1977; 2: 82):将防风通圣散改为汤剂治疗顽固性头痛 27 例,疗效显著。患者均表现为持续性或反复发作性头痛,病程 3 个月以上,经多种治疗效果不佳,并排除颅内占位性病变及颅内炎症所致之头痛。其中偏头痛及类偏头痛型血管性头痛 6 例;非偏头痛型血管性头痛 8 例,肌收缩性头痛 7 例,神经官能性头痛 3 例,鼻窦鼻窦炎伴发头痛 1 例,高血压所致头痛 2 例。治疗以防风通圣散作为基本方,无大便秘结,去大黄、芒消;无小便黄赤,去山梔、滑石;头昏眼花者,加菊花。结果,治愈 19 例,显效 5 例,有效 2 例,无效 1 例,未见副作用。作者认为:本方药味太多,应加筛选,可以防风、荆芥、薄荷、麻黄发汗解表,川芎、当归、白芍活血和营作为主药,随证加减。②咽喉肿痛《齐氏医案》:一患者咽喉肿痛,作渴引冷,大便秘结,按之六脉俱实,乃与防风通圣散。因其自汗,去麻黄、加桂枝;因涎嗽,加姜制半夏;重用消、黄下之而愈。

【备考】本方去芒消,名“贾同知通圣散”;去麻黄、芒消,加缩砂仁,名“崔宣武通圣

散”;去芒消,加缩砂仁,名“刘庭瑞通圣散”(见原书同卷)。本方改为丸剂,名“防风通圣丸”(见《全国中药成药处方集》北京方),又名“通圣丸”(见《全国中药成药处方集》哈尔滨方)。

37410 防风通圣散

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】防风二钱半 川芎五钱 石膏一钱 滑石二钱 当归一两 赤芍五钱 甘草二钱半(炙) 大黄五钱 荆芥穗二钱半 薄荷叶二两 麻黄五钱(去根苗节) 白术五钱 山梔子二钱 连翘五钱 黄芩五钱 桔梗五钱 牛蒡(酒浸)五钱 人参五钱 半夏(姜制)五钱

【用法】上为粗末。每服四钱,水一盂,加生姜三片,煎至六分,去滓温服,不拘时候,每日三次。病甚者,五七钱至一两;极甚者,可下之,多服二两或三两,得利后,却当服三五钱,以意加减。病愈,更宜常服,则无所损,不能再作。

【主治】一切风热郁结,气血蕴滞,筋脉拘挛,手足麻痹,肢体焦痿,头痛昏眩,腰脊强痛,耳鸣鼻塞,口苦舌干,咽嗑不利,胸膈痞闷,咳呕喘满,涕唾稠粘,肠胃燥热结,便溺淋闭,或肠胃蕴热郁结,水液不能浸润于周身而为小便多出者;或湿热内甚,而时有汗泄者;或表之正气与邪热并甚于里,阳极似阴,而寒战烦渴者;或热甚变为疟疾,久不已者;或风热走注,疼痛麻痹者;或肾水阴虚,心火阳热暴甚而中风;或暴暗不语,及暗风痼者;或破伤中风,时发潮热抽搐,并小儿热甚惊风,或斑疹反出不快者;或热极黑陷,将欲死者;或风热疮疥久不愈者;并解耽酒热毒,及调理伤寒,发汗不解,头项肢体疼痛,并宜服之。

【备考】《御药院方》有牛膝,无牛蒡。

37411 防风通圣散

【方源】《病疡机要》卷下。

【组成】防风 当归 川芎 芍药 大黄

(煨) 芒消 连翘 薄荷 麻黄 桔梗 石膏(煨) 黄芩(炒)各一两 白术 山梔 荆芥各二钱五分 甘草二两 滑石三两 白芷 蒺藜(炒) 鼠粘子各五钱

【用法】上为末。每服三五钱，白汤调下。

【主治】风热炽盛，大便秘结，发热烦躁，表里俱实者。

37412 防风通圣散

《片玉痘疹》卷三。为原书同卷“双解散”之异名。见该条。

37413 防风通圣散

【方源】《痲门全书》。

【组成】北防风 荆芥 白附 白芷 白蒺藜 僵蚕 苍术 白鲜皮(无癣不用) 灵仙 苦参(无癣去之) 元参 赤芍 川芎 川连 焦梔 槟榔 银花 牛子 大黄 芒消 桔芩 生石膏 条甘草 灯心

【用法】大黄、芒消二味，俟起药时放下，令二三沸止。

【主治】痲疾。

【加减】足痹作热，加黄柏；大便洞泄，去消、黄。

37414 防风通圣散

【方源】《痲症集成》卷四。

【组成】防风 薄荷 力子 麻黄 黑梔 甘草 荆芥 桔梗 连翘 石膏 元参 木通

【用法】加生姜、葱、水煎服。

【主治】痲症表里三焦俱实，昏睡壮热，目赤舌干咽痛。

37415 防风通圣散

【方源】《秘传大痲疯方》。

【组成】防风 荆芥 当归 羌活 独活 僵蚕 甘草 滑石 黄柏 白术 桔梗 薄荷 山梔 川芎各等分

【用法】上为末。先吃一眼，后加大黄、芒消、连前药各四钱，水煎缓服。至利为度，不用服尽。后服返元丸。

【主治】紫云痲，起时形如紫云，从上而下，

前后一同。

37416 防风黄芩丸

【方源】《校注妇人良方》卷十二。

【异名】防风子芩丸(《医略六书》卷二十八)、防风丸(《盘珠集》卷下)。

【组成】条芩(炒焦) 防风各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食远或食前米饮或温酒送下。

【主治】妇人肝经风热所致的吐血，衄血，便血，尿血，血崩，漏胎。

①《校注妇人良方》：肝经有风热致血崩、便血、尿血。②《医略六书》：漏胎，脉浮数者。

③《叶氏女科》：肝经风热，妊娠吐衄。

【方论选录】《医略六书》：妊娠风热，干于血室，胎孕为之不安，致经血妄行，漏胎下血不止焉。子芩清热于里，防风疏风于外，二味成方，丸以粥糊，下以米饮，使风热两除，则经脉清和而经血无不固，胎孕无不安，何漏胎之不愈哉？

37417 防风黄连汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄连 大黄 防风 远志 茯神各半两

【用法】上锉细。每服一两，水三盏，煎服。

【主治】伤寒后，心风狂妄者。

37418 防风黄耆汤

【方源】方出《奇效良方》卷三十九，名见《医统》卷五十九。

【组成】防风半两 蛇床子 黄耆各一两 木通 荆芥 莽草各二两

【用法】上为粗末。浓煎汤，极滚沸，搁腿在桶上，熏令通手时即洗之。脚趾露出不要洗。

【主治】脚气。

37419 防风黄耆汤

【方源】《古今名医方论》卷二引柯韵伯方。

【组成】防风 黄耆等分

【用法】水煎服。

【主治】中风不能言，脉沉而弱者。

【方论选录】用防风以驱逐表邪；邪之所凑，其气必虚，故用黄耆以鼓舞正气，黄耆得防风，其功愈大，一攻一补，相须相得之义也。

37420 防风麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【异名】防风汤（原书卷八十三）。

【组成】防风（去叉） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫） 独活（去芦头） 秦艽（去苗土）各二两 当归（切，焙） 防己 甘草（炙，锉） 人参 黄芩（去黑心） 升麻 芍药各二两 远志（去心） 石膏（碎）各一两 麝香（研）半两 半夏（汤洗去滑，生姜汁制）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜三片，煎至八分，去滓，连三服。衣覆取微汗。

【主治】脚气痹弱；或风毒脚气，攻身体发热，肢节不遂，精神不遂，语言謇涩。

37421 防风麻黄散

《校注妇人良方》卷三。为《圣惠》卷五“防风散”之异名。见该条。

37422 防风散结汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】防风散结散（《医钞类编》卷十一）。

【组成】防风 羌活 白芍药 归尾各五分 红花 苏木各少许 茯苓 苍术 独活 前胡 黄芩各五分 炙草 防己各六分

【用法】上作一服。水二盞，煎至一盞，用手法除病后热服，滓再煎。

【主治】目上下睫隐起肉疣。

【加减】病在上睫者，加黄连、柴胡，以其手少阴、足厥阴受邪也；病在下睫者，加藁本、蔓荆子，以其手太阳受邪也。

【方论选录】以防风、羌活升发阳气为君；白芍药、当归尾、红花、苏木破凝行血为臣；茯苓泻邪气，苍术去上湿，前胡利五脏，独活除风邪，黄芩疗热滋化为佐；甘草和诸药，

防己行十二经为使。

37423 防风散结汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】玄参一钱 前胡 赤芍药 黄芩 桔梗 防风 土贝母 苍术 白芷 陈皮 天花粉各八分

【用法】上锉。水二钟，煎至八分，去滓，食后热服。

【功用】《金鉴》：化痰散热。

【主治】痰火结滞，脾生痰核。脾外皮内，生颗如豆，坚而不疼。

37424 防风散结散

《医钞类编》卷十一。为《原机启微》卷下“防风散结汤”之异名。见该条。

37425 防风散痧汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】金一（《痧书》卷下）、一号乾象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】防风 陈皮 细辛 金银花 荆芥 枳壳各等分

【用法】水二钟，煎至七分，稍冷服。

【主治】痧因于风者。

【加减】头面肿，加薄荷、甘菊；腹胀，加大腹皮、厚朴；手足肿，加威灵仙、牛膝、倍银花；内热，加连翘、知母；痰多，加贝母、瓜蒌仁；寒热，加柴胡、独活；吐不止，加童便；小腹胀痛，加青皮；血滞，加茜草、丹参；咽喉肿，加山豆根、射干；食积腹痛，加山楂、卜子；心痛，加玄胡索、蓬术；赤白痢，加槟榔；口渴，加花粉；面黑血瘀，加苏木、红花；秽触，加藿香、薄荷；放痧不出，倍细辛，加苏木、桃仁、荆芥。

【备考】方中、金银花，《痧书》、《杂病源流犀烛》作“旋复花”。

37426 防风葛根汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】防风 葛根 川芎 生地黄各二两 杏仁（制） 麻黄（去节）各一两半 桂心 独活 甘草 防己各一两

【用法】上咬咀。每次四钱，水煎服。

【主治】妊娠中风，腰背强直，时复反张。

37427 防风葛根汤

【方源】《医学纲目》卷十一。

【组成】葛根四两 麻黄三两 芍药 防风各二两 桂枝一两

【用法】上锉细。每用一两，先煮麻黄，去上沫，入后药，同煎数沸，温服。

【主治】胎前痉，由风寒湿邪乘虚而感，口噤，角弓反张，太阳无汗者。

37428 防风葛根汤

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】防风 甘葛 茯苓各八分 麦门冬（去心）八分 芍药 黄芩各六分 犀角四分 甘草三两

【用法】上咬咀。以水二升，煎取七合，分为二服。

【主治】产后风虚，头目痛，语言时僻。

37429 防风葛根汤

《赤水玄珠》卷二十八。为《万氏家抄方》卷六“防风败毒饮”之异名。见该条。

37430 防风葛根汤

【方源】《不居集》下集卷二。

【组成】防风 葛根 白芷 花粉 薄荷 贝母 玉竹 知母 甘草 石膏

【主治】太阳兼阳明风热上壅。

37431 防风煮肝散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】防风（去叉） 黄连（去须） 谷精草 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 天南星（炮）各一两 蛤粉半分

【用法】上为细散。每服一钱匕，用羊子肝一片，铜竹刀批开，掺药在内，以麻缕缠定，研粟米饭一大盏，银石锅内煮熟，放温，临卧嚼服。病甚者，不过再服。

【主治】雀目。

【宜忌】不得犯铁器。

37432 防风雄黄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】赤芍药八两 防风（去芦头） 香

白芷 川乌头（炮，去皮脐尖） 麻黄（去根节） 白蒺藜（炒）各四两 雄黄（水飞） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 细辛（去叶土） 天麻（去苗） 川芎各二两 甘草（炙） 干姜（炮） 藿香叶（去土） 甘松（去土，焙）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十五丸。每服一丸，细嚼，茶、酒任下，不拘时候。

【主治】左瘫右痪，手足麻痹，腰膝疼痛。或风气面浮，口苦舌干，头昏目运，并暗风、夹脑风、偏正头痛；兼治妇人血气、荣气虚，遍身疼痛，及洗头风，破伤风。

37433 防风温胆汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】半夏（制） 枳壳（麸炒） 茯苓各半两 橘皮 防风各二钱半 甘草（炒）一钱半

【用法】上锉散。每服一钱，加生姜、紫苏，水煎服。

【功用】消痰，顺气，疏风。

【主治】小儿痉瘳。

【备考】《得效》有人参。

37434 防风解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下

【异名】防风败毒散（《麻科活人》卷二）。

【组成】防风 薄荷 荆芥 石膏 知母 桔梗 甘草 牛蒡 连翘 木通 枳壳 淡竹叶

【功用】辛凉透发。

【主治】①《痘疹全书》：温暖时出疹。②《麻科活人》：麻疹初起，发热咳嗽，或乍冷乍热，已现麻路，或初潮未明是否麻证。

【方论选录】《古方选注》：防风、荆芥、薄荷、牛蒡以辛散之；石膏、知母、连翘、淡竹叶辛寒以清之；木通通气，枳壳疏表，桔梗、甘草载引诸药以达肺经。仲淳曰：痧疹不宜依证施治，惟当治肺，使痧疹发出，毒解则了无余蕴矣。

【备考】《赤水玄珠》有灯心，诸药各等分，水煎服。

37435 防风解毒汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 荆芥 桔梗 牛蒡子 连翘 甘草 石膏 薄荷 枳壳 川芎 苍术 知母各一钱

【用法】水二钟，入灯心二十根，煎至八分，食后服。

【主治】风毒瘰癧。寒暑不调，劳伤凑袭，多致手、足少阳分耳项结肿；或外寒内热，痰凝气滞者。

37436 防风解毒汤

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】防风一钱 地骨皮 生黄耆 白芍 荆芥穗 大力子各五分

【用法】水一大钟，煎至五分，温服。

【功用】汗散清解。

【主治】毒气散漫于皮肤，痘后遍身疮癤如芥如癰，脓水浸淫，皮肤溃烂，日久而不愈者。

【加减】或加升麻五分。

37437 防风解毒汤

【方源】《麻症集或》卷三。

【组成】防风 连翘 薄荷 前胡 木通 荆芥 力子 江枳壳 甘草

【主治】时温初期，斑疹未明发者。

37438 防风解温汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】防风三钱 桔梗三钱 桑叶三钱 连翘三钱 杏仁三钱 芍药三钱 丹皮三钱 甘草二钱

【用法】流水三杯，煎至八分，温服。覆衣，饮热粥，取微汗。

【主治】温证，太阳经头项痛，腰脊强，发热作渴者。

【加减】如入阳明经，身热，目痛，鼻干，不卧，胸燥，口渴者，去防风、桑叶、桔梗、杏仁，加葛根，热加元参，再热加石膏，呕

加半夏；如入少阳经，胸胁疼痛，耳聋，口苦咽干作渴者，去防风、桑叶、桔梗、杏仁，加柴胡、黄芩、半夏，热加元参；如入太阴经，腹满咽干，发热作渴者，去连翘、桔梗、杏仁，加生地；如入少阴经，口燥舌干，发热作渴者，去连翘、桔梗、杏仁、芍药，加生地、天冬、元参；如入厥阴经，烦满囊缩，发热作渴者，去连翘、桔梗、杏仁，加生地、当归。

37439 防风蔓荆丸

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】防风（去叉）二两半 蔓荆实（去皮） 羚羊角（镑） 玄参 山梔子仁各一两半 萎蕤 大麻仁（研） 芍药 朴消（研）各三两 黄连（去须） 枳壳（去瓢，麸炒）各一两 菊花三分 麦门冬（去心，焙）二两

【用法】上为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，稍加至三十丸，食后临卧温浆水送下。

【主治】风热目赤，昏涩碜痛。

37440 防风藁本汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】防风 藁本 生地 薄荷 连翘 荆芥 蝉蜕 红花 甘草 牛蒡子 元明粉 紫草

【用法】灯心为引。

【主治】痘疹。

37441 防术牡蛎汤

《医学入门》卷四。为方出《深师方》引赵子高方（见《外台》卷十五），名见《元和纪用经》“牡蛎术散”之异名。见该条。

37442 防独神术汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】白术 黄柏 防风 独活

【主治】湿热腰痛，内热烦热，自汗口渴，二便赤涩，痠痛沉重，右关细数者。

37443 防桂术苓散

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术 茯苓 防风各五钱 巴戟

天三钱 肉桂一钱 桂枝八分 天花粉 黄耆各二钱

【用法】水煎服。

【功用】理肺肾脾胃之气，兼以散邪。

【主治】风寒湿邪犯于三焦而致痹证，一身上下尽痛，有时而止，痰气不清，欲嗽不能，咽喉气闷，胸膈饱胀，二便艰涩。

37444 防耆分湿汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】黄耆 白术 茯苓各五钱 薏仁五钱 防风 柴胡 天花粉各一钱 桂枝三分 麻黄五分

【用法】水煎服。

【主治】气虚而痰结于经络皮肤，遍身生块而痛。

37445 防病牛黄汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】牛黄 芍药 杏仁（炒，去皮尖） 蜣螂 蜂房 黄芩 人参 葛根 甘草（炙） 蚱蜢（炙） 芒消 川芎 桂心各一分 大黄三分 当归三分 石膏四分（碎）（一方有生姜三分，无芒消）

【用法】上细切。取豚五脏及卵，以水一斗，煮脏卵得三升，去滓澄清，纳诸药，煮取一升三合，去滓入芒消，烱尽，每服一合，日三夜一，临卧，末牛黄纳汤中。

【主治】少小心惊，又治痫发，众医不复治者。

37446 防盗止汗汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】麦冬五钱 生枣仁一两 熟地一两 山茱萸三钱 黄连五分 人参三钱 丹参三钱 茯神三钱 肉桂五分

【用法】水煎服。一剂汗少止，二剂汗全愈。

【功用】泻心中之热，补肾中之水。

【主治】梦遗之后，身体虚弱，加之行役太劳，或行房大甚，遂至肾阴大亏，心火失济，盗汗淋漓。

37447 防椒蒴黄丸

《准绳·类方》卷五。即《金匱》卷中“防己椒目葶苈大黄丸”。见该条。

37448 防椒蒴黄汤

《证治宝鉴》卷四。即《金匱》卷中“防己椒目葶苈大黄丸”改为汤剂。见该条。

37449 防葛二陈汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风 干葛 半夏 白茯苓 甘草 广皮

【主治】风气呕吐兼痰者。偶遇风冷，即发呕吐，头额疼痛，而赤面热，脉浮滑。

【加减】风寒，加生姜；风热，加山梔、黄连、竹茹。

37450 防葛平胃散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】防风 葛根 苍术 厚朴 广皮 甘草

【功用】散风清胃。

【主治】风气呕吐之症，偶遇风冷，即发呕吐，头额疼痛，面赤面热，脉浮。

【加减】风寒，加生姜；风热，加山梔、黄连、竹茹。

37451 防葛石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 葛根 石膏 知母 广皮 甘草

【功用】和解。

【主治】阳明证口渴消水，表里俱见。

37452 防葛石膏汤

《医级》卷七。为原书同卷“葛根白虎汤”之异名。见该条。

37453 防己加茯苓汤

《赤水玄珠》卷五。为《金匱》卷中“防己茯苓汤”之异名。见该条。

37454 防风加葛根汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 干葛 甘草 黄芩 山梔 广皮

【主治】太阳病，项背强几几，反汗出恶风，脉浮缓。

【加减】恶寒身痛者，加羌活、独活；时寒时热，加柴胡；头痛，加川芎；湿胜身重者，加苍术、白芷；汗多者，加白芍药。

37455 防风当归饮子

【方源】《宣明论》卷十二。

【异名】防风当归饮（《医学入门》卷七）。

【组成】防风 当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草（炙） 芍药各一两 滑石六两

【用法】上锉。每服三钱至五钱，水一大盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服。

【功用】①《宣明论》：宣通气血，调顺饮食。②《丹溪心法附余》：泻心肝之阳，补脾肾之阴。

【主治】脾肾真阴损虚，肝心风热郁甚，阳胜阴衰，邪气上逆，上实下虚，怯弱不耐；或表热而身热恶寒；或里热而燥热烦渴；或邪热半在表，半在里，进退出入不已，而为寒热往来；或表多则恶寒，里多则发热；或表之阳分正气与邪相助，并甚于里，蓄热极深而外无阳气，里热极甚，阳极似阴而寒战，腹满，烦渴者；或里之阴分正气反助邪气并甚于表，则燥热烦渴而汗出也；或邪热壅塞者；或烦热痛者；或热结极甚，阳气不通而反觉冷痛；或中外热郁烦躁甚，喜凉畏热者；或热极闭寒不得宣通，阳极似阴，中外喜热而反畏寒者；或燥热烦渴者；或湿热极甚而腹满不渴者；或一切风热壅滞，头目昏眩，暗风眼黑，偏正头痛，口干鼻塞，耳鸣耳聋，咽嗑不利；或目赤肿痛，口疮舌痹；或上气痰嗽，心胁郁痞，肠胃燥涩，便溺淋秘；或是皮肤瘙痒，手足麻痹；又或筋脉拘急，肢体倦怠；或浑身肌肉跳动，心忪惊悸；或口眼喎斜，语言謇涩；或狂妄昏惑，健忘失志；及或肠胃燥热，怫郁而饥，不欲食，或湿热内余而消谷善饥，然能食而反瘦弱；或误服燥热毒药，及妄食热物过多而耗损脾肾，则风热郁甚而多有如此，不必全见也。

【方论选录】《丹溪心法附余》：大黄泻阳明之湿热从大便出，滑石降三焦之妄火从小便

出，黄芩以凉膈，柴胡以解肌，防风以清头目，人参、甘草以补气，当归、芍药以补血，无半味辛香燥热之谬药也。

【备考】方中“防风”原脱，据《袖珍方》补。《杂病源流犀烛》有赤苓，无黄芩。

37456 防风钩藤钩丸

【方源】《医钞类编》卷五。

【组成】防风二两 瓜蒌根 黄耆（炙）羌活 白芍各五分 犀角屑 甘草各二钱半 蛇蛻（炙赤） 钩藤钩 麻黄各一钱

【用法】枣肉为丸，薄荷汤送下。

【主治】头摇便血。

37457 防风羚羊角汤

《医略六书》卷三十。为《济阴纲目》卷十二“防风羊角汤”之异名。见该条。

37458 防风蔓荆子丸

【方源】《外台》卷三十二引《近效方》。

【组成】防风 黄连 干地黄各十六分 蔓荆子二十分 甘皮六分 萎蕤十分 甘草八分（炙） 茯神十二分 大黄八分（锦文者）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮下二十丸。稍稍加之，以大肠畅为度，尽更合服。

【功用】令眼目明。

【主治】眼中黑花。

37459 防风白术牡蛎汤

《活人书》卷十六。为方出《深师方》引赵子高方（见《外台》卷十五），名见《元和纪用经》“牡蛎术散”之异名。见该条。

37460 防风白术牡蛎散

《校注妇人良方》卷三。为方出《深师方》引赵子高方（见《外台》卷十五），名见《元和纪用经》“牡蛎术散”之异名。见该条。

37461 防风芍药甘草汤

【方源】《保婴撮要》卷十七。

【组成】防风 芍药 甘草

【用法】上锉。每服一二钱，水煎服。

【功用】《小儿痘疹方论·附方》：解痘毒。

【主治】小儿痘疮出迟，以身侧出不快，属

足少阳经者。

【备考】《医学入门》本方用量：防风、芍药、甘草三药各等分。

37462 防风松肌败毒汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】防风三钱 薄荷二钱 蝉蜕二钱（去头足） 杏仁三钱 白芍三钱 丹皮三钱 连翘二钱 桔梗二钱 甘草一钱（生）

【用法】加鲜芦根一两，水煎大半杯，温服。服三四剂，疹回尽，自身凉而安。

【主治】温病斑疹初出者。

【加减】如身热渐退，疹毒渐回，即去防风、薄荷、蝉蜕、杏仁，加生地三钱。

37463 防风荆芥甘草汤

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】防风 荆芥 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】太阳病，恶寒身热，气急尿赤，痘出不快。

37464 防风通圣三黄丸

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】防风 白芍 滑石 川芎 芒消 大黄 栀子 桔梗 荆芥 石膏 麻黄 连翘 当归 薄荷 甘草 白术

【用法】上为末，泛为丸。噙化。

【主治】实火蕴热积毒，二便闭塞，风痰上壅，将发喉痹，胸膈不利，脉弦而数。

【加减】若泄，去芒消。

37465 防风黄芩二物汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】防风一两 黄芩三两

【用法】上药煎至一碗，入阿胶五钱，热服。

【主治】妊娠肠风下血。

37466 防风葛根石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】防风 干葛 知母 石膏 甘草

【主治】阳明风湿身重。

37467 防饥救生四果丹

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】栗子（去壳） 红枣（去皮核） 胡

桃（去壳皮） 柿饼（去蒂）各等分

【用法】入甑蒸二时，取出。石臼中杵捣，不辨形色，捻为厚饼，晒干收贮，冬月吉日焚香修合。凡饥者与食一饼，茶汤任嚼服，腹中气足自饱，一饼可耐五日，再服不限日数。

【功用】补肾水，健脾土，润肺金，清肝木，而心火自平也。

37468 防己加茯苓芒消汤

《医醇剩义》卷三。为《金匱》卷中“木防己加茯苓芒消汤”之异名。见该条。

37469 防毒气防疫疫灵药

【方源】《集成良方三百种》卷中。

【组成】明雄黄 鬼箭羽 丹参 赤小豆各二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三五丸，空心白水送下。再用茅术二两半，白芷一两半，羌活一两半，细辛四钱，柴胡八钱，吴茱萸一两半，共为末，于香炉内随意焚烧少许，毒气自消。另用黄布作袋，装药末五钱，随身佩带，必要时置于口鼻上。

【功用】避一切毒气、瘟疫。

37470 防己椒目葶苈大黄丸

【方源】《金匱》卷中。

【异名】己椒苈黄丸（《金匱》卷中）、椒目丸（《千金》卷十八）、防己丸（《圣济总录》卷七十九）。

【组成】防己 椒目 葶苈（熬） 大黄各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。先食饮服一丸，每日三次。稍增，口中有津液。

【主治】肠间有水气，腹满，口舌干燥。

【加减】渴者，加芒消半两。

【方论选录】①《退思集类方歌注》：肺与大肠为表里，肠间水气不行于下，以致肺气臃郁于上而燥热之甚。用防己疗水气，椒目治腹满，葶苈泻气闭，大黄泻血闭，急决大肠之水以救肺金之臃郁，不治上而治下，故

用丸剂也。②《中国医学大辞典》：此方以防己、椒目导饮于前，大黄、葶苈推饮于后，前后分消，则腹满减而水饮行，脾气转而津液生矣。

【备考】本方方名，《准绳·类方》引作“防己椒苈丸”、“防椒苈黄丸”。本方改为汤剂，名“防椒苈黄汤”（见《证治宝鉴》）、“防己椒苈汤”（见《中国医学大辞典》）。

37471 防风通圣散加蝎尾方

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】防风通圣散加蝎尾

【主治】破伤风火盛，有阳明证者。

收

37472 收火汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地三两 山茱萸一两 茯苓五钱 肉桂三钱

【用法】水煎，冷服。

【功用】大补肾水，引火归脏。

【主治】少阴肾火上炎咽喉之阴蛾。咽喉肿痛，日轻夜重，喉间亦长成蛾，自觉一线干燥之至，饮水咽之少快，至水入腹，而腹又不安，吐涎如水甚多，将涎投入清水中，即时散化为水，亦有勺水不能下咽者。

37473 收舌散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】黄连三钱 人参三钱 菖蒲一钱 白芍三钱

【用法】先以冰片少许，点之即收；后用本方水煎服，二剂可也。

【主治】阳火盛强，舌吐出不肯收进。

37474 收伤油

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】麻油一合 椰子油二钱 乳香没药各五分 小麦五钱

【用法】以小麦入麻油中，煮一炊时，候麦变黑色，浮油上，以绢布滤去滓，下火，入余药搅匀，绵浸，瓷器收贮。外敷。

【主治】金疮及分娩擦破阴门者。

37475 收血汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】熟地二两 生地一两 荆芥一钱 三七根末三钱 当归一两 黄耆一两

【用法】水煎服。

【功用】补血，补气，止血，引经。

【主治】失血之证，有从口鼻出者，有从九窍出者，有从手足毛孔而出者。

37476 收血汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】二地 当归 黄耆各一两 焦术 炮姜 侧柏（炒） 山漆各三分

【主治】鼻衄属虚火，饮热恶冷者。

37477 收肌饮

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】熟地二两 白术二两 山茱萸一两 人参五钱 当归一两 生甘草三钱 甘菊花三钱 肉桂三钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】背痈溃烂，洞见肺腑，疮口不收。

【宜忌】节守房事一月。

37478 收汗丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参二两 当归二两 黄耆二两 桑叶三十片 北五味一钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】产妇产半月，忽然大汗如雨，口渴舌干，发热而躁，口虽渴而不欲饮，舌虽干而苔又滑，甚心躁而不至发狂。

【方论选录】参、归、黄耆大补其气血；麦冬、五味清中有湿；佐桑叶止汗。盖此等虚汗，非补不止，而非湿亦不收也。

37479 收汗丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】玄参三钱 生地三钱 荆芥一钱 五味子三分 桑叶十片 白芍五钱 苏子一钱 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【功用】滋阴止汗，消痰降气。

【主治】胃气盛，饮食之时，头项至面与颈额之间，大汗淋漓。

37480 收汗丹

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】人参 黄耆 麦冬 熟地各一两 枣仁五钱 五味子三钱 当归五钱 甘草一钱

【功用】实卫。

【主治】大汗亡阳，津脱。

37481 收汗汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄耆 当归各一两 五味子一钱 桑叶七片

【主治】大汗伤阳。

37482 收汗散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】陈蒲扇（烧灰）

【用法】加砂糖，开水冲服。

【功用】止汗。

【主治】酒伤肺脏，肺气虚，大汗如雨。

37483 收阳汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参三两 桑叶三十片 麦冬二两 元参一两 青蒿五钱

【用法】水煎服。一剂而汗止，再剂而狂定，不可用三剂。

【主治】产后感阳明之邪发狂。

37484 收阳粉

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】藁本 麻黄根 白芷各半两 米粉一两半

【用法】上为细末，搅和匀，纱帛包。扑敷汗出、腿痛处。

【主治】一切虚汗、盗汗、自汗及漏风。

37485 收阴散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【异名】收胎散（《女科旨要》卷三）。

【组成】当归 白芍 川芎 熟地 人参 白术 枳壳 升麻 陈皮各三钱 沉香 肉桂（另研） 茺莢 甘草各一钱

【用法】上作四贴。水煎服。

【主治】产后因劳伤过度，兼举重物，致伤脏腑之血，气弱血冷，因而膀胱坠出不收。

【加减】夜睡不安转动，将于脐下四寸半灸七壮。

【备考】《女科旨要》本方用法：加生姜三片，水煎，空心热服。

37486 收束散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】山药 莲须 益智仁各一钱

【用法】上为末。汤调服。

【主治】小便数而多。

37487 收呆汤

《串雅内编选注》卷一。即《石室秘录》卷三“救呆至神汤”。见该条。

37488 收肛散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】收肠散（《证治宝鉴》卷八）。

【组成】鳖头一枚（烧灰）

【用法】上为极细末，候肠头出，以药干掺在上，用纸衬手，轻轻操入。

【主治】脱肛。

37489 收肛散

【方源】《医方考》卷三。

【异名】收肠散（《证治宝鉴》卷八）。

【组成】熊胆五分 孩儿茶三分 冰片一分

【用法】上为细末。乳调，涂肛上。

【主治】①《医方考》：热泻脱肛。②《济阳纲目》：痔疮。

【方论选录】热则肛门涩，涩则便不易出，不易出则令人努责，努责之久，则令脱肛。此与寒脱不同者，此则肛门涩，寒脱则洞泄面不涩也。苦可以胜热，故用熊胆；涩可以固脱，故用儿茶；辛可以拔邪，故用冰片。

37490 收肛散

【方源】《外科大成》卷五。

【组成】陈皮三两 枳壳一两

【用法】水二钟，煎一钟服。

【主治】痔漏。

37491 收肛散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】五倍子 浮萍草(炒)三钱 诃子肉(炒)三钱 龙骨三钱 木贼三钱

【用法】干搽或麻油调敷。

【功用】收缩肛肠。

【备考】方中五倍子用量原缺。

37492 收肠丸

《嵩崖尊生》卷十三。为《活人心统》卷三“收肠养血和气丸”之异名。见该条。

37493 收肠散

《证治宝鉴》卷八。为《医方考》卷三“收肛散”之异名。见该条。

37494 收肠散

《证治宝鉴》卷八。为《杨氏家藏方》卷二十“收肛散”之异名。见该条。

37495 收泪散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】绿芦甘石一钱 海螵蛸五分 冰片少许

【用法】上为极细末。点大眦角。

【主治】风泪不止。

【方论选录】二药以燥，片脑辛散之。

37496 收泪散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】煅甘石三钱(水飞) 海螵蛸五分 煅龙骨三分 荸荠粉一钱 硼砂五分 蕤仁七分(去油) 梅片三分

【用法】上为细末。点眼。

【主治】迎风热泪症。

37497 收毒散

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】白芷 木鳖子 草乌 南星 大黄

【用法】上为末。醋调敷。

【主治】痈疽初发。

【备考】红肿，用大黄；白肿，用草乌。

37498 收毒散

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】盐霜梅十个 山皂角一挺(不蛀

的)

【用法】上烧灰，研细末。如发热者，米醋调涂四围及开处，厚些即不走开。或姜汁同醋调，或蜜同醋调，或茶卤调涂枯之。

【主治】发背一两头，开发不住，势在危急。

37499 收带丸

《简明医轍》卷七。为《回春》卷六“收带六合丸”之异名。见该条。

37500 收带汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】白术 杜仲 人参各一两 荆芥二钱

【用法】水煎服。

【功用】大补任督之气。

【主治】妇人产后亡血过多，无血以养任、督，带脉崩堕，水道中出肉线一条，长三四尺，动之则痛欲绝，随溺而随下，每作痛于腰脐。

37501 收胎散

《女科旨要》卷三。为《郑氏家传女科万金方》卷四“收阴散”之异名。见该条。

37502 收珠散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】血竭二钱 冰片二分 乳香四钱(去油) 没药四钱(去油)

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。点之。

【主治】目受外伤，眼珠落出。

【备考】《外科集腋》有龙骨。《外科集腋》本方用法：上为末，井花水调稠，以银针蘸药点之。或用银针蘸井花水拔去血筋，将收珠散敷之，随用青绢挪上。先用还魂汤，次服明目生血饮。

37503 收脂汤

《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“收膜汤”之异名。见该条。

37504 收脓散

【方源】《急救仙方》卷四。

【异名】收脓膏(《秘传外科方》)。

【组成】海金沙 乳香 白及 雄黄等分

【用法】上为末。入疮口。次以乳香膏贴之。

【主治】痔证。

37505 收脓膏

《秘传外科方》。为《急救仙方》卷四“收脓散”之异名。见该条。

37506 收痔丸

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】透明阿胶(炒酥) 黄连(净) 贯众各半两 盈尺皂角(去弦核,醋炙焦) 猬皮(炙焦) 蜂房(炒焦) 蛇皮(略炒) 皂角刺(略炒) 穿山甲(插入热火灰中令焦) 猪后蹄垂甲(烧,以上各存性) 当归 川芎 槐花各二钱半

【用法】上为末,米醋煮面糊丸,如桐子大。每服七十丸,调气用枳壳散下;消血热荆芥煎汤下,食前服。

【主治】诸痔。

【备考】本方方名,《普济方》引作“治痔丸”。

37507 收痔散

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】轻粉 冰片 文蛤 荔枝草

【用法】先将文蛤一枚敲小孔,用荔枝草塞满,用纸塞孔,湿纸包煨片时,取出,去纸。研为细末。每一钱加轻粉三分,冰片五厘,冰片田螺水调搽。

【主治】痔疮,掀疼肿痛。

37508 收痔散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】五倍子

【用法】上为细末。用麻油调敷。

【功用】收痔。

37509 收痒丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】龙骨一钱 皂角刺一条(烧灰存性) 冰片三分 雄鼠胆一枚

【用法】先将前药为末,后以鼠胆水调匀,面后以人乳再调,如厚糊一般。将此药尽抹入耳孔内,必然痒不可挡。必须入执其两手,痒定而自愈矣。愈后常服六味丸。

【主治】肾肝之火,结于耳中,耳中作痒,

以禾刺之,尚不足以安其痒,自欲以刀刺其底,始快然,否则痒极欲死。

37510 收惊汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】当归 山茱萸各一两 白芍二两 北五味二钱 附子三分

【用法】水煎服。

【主治】因惊而胆堕,失心如痴。

【备考】一剂惊收,二剂再不痴矣,三剂全愈。

37511 收箭散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】轻粉一钱 乌梅肉三钱(煨)

【用法】上为细末。掺箭肉上,外用膏贴。

【主治】一切痈疽溃后,箭肉凸出。

37512 收箭散

《集验良方》卷一。为原书同卷“黑龙丹”之异名。见该条。

37513 收湿粉

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】铅粉 310 克 松香末 310 克 枯矾 310 克 五倍子末 150 克

【用法】上为细末,调和。用药末直接掺于皮损上,或用麻油调敷疮面。

【功用】收湿止痒。

【主治】湿疹渗水多时。

37514 收膜汤

【方源】《傅育主女科》卷下。

【异名】收脂汤(《辨证录》卷十二)。

【组成】生黄耆一两 人参五钱 白术五钱(土炒) 白芍五钱(酒炒焦) 当归三钱(酒洗) 升麻一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人产前劳役过伤,又触动恼怒,以致肝不藏血,血亡过多,产后阴户中垂下一物,其形如帕,或有角,或二岐,往往出产门外者,至六七寸许,且有粘席干落一片,如手掌大者。

【宜忌】收垂下之物全赖白芍之功,不可用炭。

【方论选录】或疑产后禁用白芍,恐伐生气之源,何以频用之而奏功也。是未读仲景之书者。嗟乎!白芍之在产后不可频用者,恐其收敛乎瘀也,而谓伐生气之源,则误矣。况病之在肝者,尤不可以不用,且用之于大补气血之中,在芍药亦忘其为酸收矣,又何能少有作祟者乎?矧下坠之物,正借酸收之力,助升麻以提升气血,所以奏功之捷也。大补其气与血,而少加升提之品,则肝气旺而易生,肝血旺而易养,肝得生养之力,而垂下之物自收。

37515 收膜散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】乌梅一两(去核) 五倍子五钱 绿矾三钱

【用法】上为末。醋调敷上。

【主治】目受外伤,油膜突出。

37516 收干药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】银粉散一两 甘石粉一两 雄精一钱

【功用】收敛解毒,生肌长肉。

【主治】阴症及阳症窦道、瘰管,疮口清洁趋于愈合,肉芽组织健康或有轻度水肿者。

【宜忌】阴阳痈疽初期者不宜用,对汞过敏者禁用。

37517 收口掺药

《景岳全书》卷六十四。即《洪氏集验方》卷二引童县尉方“背疽掺药”。见该条。

37518 收口掺药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】龙骨一钱(煅熟) 厚象皮二钱(煅) 熟石膏五钱 儿茶 轻粉 乳香(去油) 没药(去油) 琥珀各五分 白螺蛳壳(煅末)二钱

【用法】上为细末。掺患处。

【功用】长肉收口。

37519 收功后药

【方源】《古今医鉴》卷八引徐宪副方。

【组成】人参 当归 生地黄 乳香 没

药 官桂 木香 麝香(八味用酒浸过) 青皮 陈皮 白芷 良姜 麻黄 米壳 甘草 各一钱

【用法】上锉。水煎服。出汗,外用川椒、枯矾各一两为末,擦腋下。

【主治】腋气。

【宜忌】终身忌鳊鱼、羊肉。

37520 收阳温粉

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】白术 藁本 川芎 香白芷各等分

【用法】上为细末。每药末一两加细米粉一两五钱,和匀,用夹生绢袋盛,周身扑之。另以玉屏风散,水煎热服。

【主治】发汗太过,遂漏不止,其人发狂。

37521 收黑虎汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】玄参一斤 柴胡三钱 生甘草一两

【用法】煎汤十碗为主,倘生于头而,加川芎二两 附子二钱,再煎汁,取三碗,分作三日服完。倘生于身中前后、左右,加当归二两,甘菊花一两,附子三分,亦如前煎服。倘生子手足四肢,加白术二两,附子五分,茯苓一两,亦如前煎服。

【功用】补阴散郁。

【主治】淫欲无度,又加之气恼忧郁,火乘其有隙之处,蕴藏结毒之无名肿毒,未破者或已破者。

【方论选录】玄参最善退浮游之火,得甘草之助,能解其迅速之威,得柴胡之辅,能舒其抑郁之气,且又有各引经之味,引至结毒之处,大为祛除。妙在用至一斤,则力量更大。又妙是补中去散,则解阴毒而不伤阴气,所以奏功更神。

37522 收干生肌膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】收干生肌药粉四两 祛湿药膏(或凡士林)六两

【用法】上药混匀成膏。外敷患处。

【功用】活血止痛，收敛生肌。

【主治】疖、痈破溃后，水火烫伤，女阴溃疡（阴蚀），下肢溃疡（臁疮）等的清洁肉芽疮面。

【宜忌】疮面毒未净者勿用。

37523 收口八宝散

【方源】《理瀹》。

【组成】珍珠 牛黄 冰片 象牙 枯矾 铜绿 银朱 轻粉 枯盐 鸡金 金箔

【用法】泔水洗净，敷药。

【主治】心脾热毒之舌肿。

37524 收口生肌散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】象皮（火焙干）三钱 龙骨 乳香 没药 轻粉各一钱 朱砂五分 冰片五厘

【用法】上为极细末。先以茶椒汤洗净，敷药。

【主治】多年顽疮不收口。

37525 收口红宝膏

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】松香一两 大麻仁三钱 银朱 乳香 没药（俱枯）各三钱 轻粉一钱

【用法】先将麻仁捣烂，次下松香，再捣成膏，方入众药，捣千余下，瓷罐装。重汤顿化。每用少许，填疮口内外，以黑膏药固之。

【功用】去疔，长肉收口。

【主治】结毒顽疮。

37526 收功万全汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】黄耆（蜜水炒）二钱五分 人参一钱 白术（去芦，炒）一钱 白茯苓（去皮）一钱 当归身一钱五分 川芎七分 白芍（酒炒）七分 怀熟地黄一钱 官桂三分 白芷三分 陈皮五分 甘草三分 防风五分

【用法】上锉。加生姜一片，水煎，温服。

【主治】痈疽、发背、诸疮毒溃脓后，毒气已尽，气血虚弱，不长肌肉，不合口，脓清欲作余症。

【加减】如渴，加麦门冬、五味子；烦躁，加生地黄，麦门冬；有痰，加姜制半夏；泄泻，加厚朴（姜炒）；小便不利，加泽泻；怔忡不寐，加远志、酸枣仁（炒）；胸膈不宽，加厚朴（姜炒）、楂肉。

37527 收功尽根丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】枯矾 雄黄 文蛤（炒） 乌梅肉（炒）各三钱 冰片一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，分五服。每日一服，空心白滚汤送下。

【主治】痔漏。

37528 收功补漏丸

【方源】《寿世保元》卷五引徐学韦方。

【组成】白茯苓（去皮） 赤茯苓（去皮） 没药各二两 破故纸四两

【用法】上药俱不犯铁器，于石臼中捣成块，春、秋酒浸三日，夏二日，冬五日，取出，木笼蒸熟，晒干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，缓缓加至五十丸，空心温酒送下。

【主治】痔漏多年不愈。

37529 收功拔毒散

【方源】《吉人集验方》。

【组成】黄升药五钱 上血竭一钱 煅石膏三两五钱

【用法】上为极细末。

【功用】拔毒长肉。

37530 收血双解散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】柴胡二钱 苡蓉（去甲）一钱 山梔 天冬 麦冬 黄芩 胆草 羌活 故纸各一钱半 香附 黄柏各一钱 甘草四分

【用法】葱白三茎、荷叶烧灰为引。

【主治】牙缝流血如泉，不拘身热身凉，及衄血不止。

37531 收汗生阳汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 麦冬一两 北五味三钱 黄耆一两 当归五钱 熟地一两 炒枣

仁五钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】亡阳。

37532 收阴养胃煎

【方源】《证因方论集要》卷二引黄锦芳方。

【组成】人参 乌梅 麦冬 白芍(炒) 山药 制首乌 伏龙肝 粳米

【主治】痢，阴已受伤，日夜烦躁，口渴唇红，脉细而数。

【方论选录】六阴皆虚，非用纯阴不能以救其逆。人参、麦冬、粳米甘以生津；乌梅酸以止渴；首乌、白芍、山药育阴以除烦躁；伏龙肝去湿，如是则胃阴旺而真元复矣。

37533 收呆至神汤

《串雅内编》卷一。为《石室秘录》卷三“救呆至神汤”之异名。见该条。

37534 收毒外消膏

【方源】《直指》卷二十二。

【异名】内消膏（《普济方》卷二八四）。

【组成】黄明牛皮胶（长流水半升溶开）一两 琥珀（再煎，柳枝急搅五六沸）一两

【用法】上药候冷收入瓷合，以鸡羽摊于疮上，留口。如未破，敷，肿自消。

【功用】《普济方》：敛疮。

【主治】痈疽。

37535 收带六合丸

【方源】《回春》卷六。

【异名】益气固肠丸（原书同卷）、收带丸（《简明医彙》卷七）。

【组成】白术（米泔浸，焙） 苍术（米泔浸，焙） 白茯苓（去皮） 陈皮（盐水洗，去白） 当归（酒洗） 白芍（酒炒）各二两 熟地黄（酒洗） 半夏（姜制）各一两半 椿根白皮（洗，炒） 牡丹皮 黄柏（酒炒）各一两二钱 防风九钱 甘草（炙）一两 升麻八钱（一方加香附、枳壳）

【用法】上为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤下；盐汤亦可。

【功用】和脾胃，燥中宫之湿，提下陷之气，

化痰清火。

【主治】赤白带下，肚腹疼痛。

37536 收晕白玉膏

《传信适用方》卷三。为《三因》卷十四“白玉膏”之异名。见该条。

37537 收涩异效散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】干姜 枯矾 硼砂各等分

【用法】上为细末，米醋调和，敷大眦。

【主治】热眼风痒殊甚，流泪汪汪不止。

37538 收靥黑龙丹

《外科方外奇方》卷二。为《集验良方》卷一“黑龙丹”之异名。见该条。

37539 收干生肌药粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香面一两 没药面一两 琥珀而二钱 血竭面四钱 儿茶面五钱 水飞甘石面七钱

【用法】薄敷于疮面，或制成药捻用。

【功用】收敛止痛，固皮生肌。

【主治】烫灼伤，女阴溃疡（阴蚀），下腿慢性溃疡（赚疮），疮面脓毒已尽者。

【宜忌】痈疔疮面脓毒未净者慎用。

37540 收肠养血和气丸

【方源】《活人心统》卷三。

【异名】收肠丸（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】白术 当归 白芍各一两 川芎 槐角(炒) 山药各八钱 莲肉一两 人参七钱 龙骨(煅) 五倍(子) 赤石脂各五钱

【用法】米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮送下。

【主治】肠虚，脱肛日久。

【备考】本方改为汤剂，名“收肠养血和气汤”（见《中国医学大辞典》）。

37541 收肠养血和气汤

《中国医学大辞典》。即《活人心统》卷三“收肠养血和气丸”改为汤剂。见该条。

迅

37542 迅行汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】王不留行 猪苓 茯苓 黄芩各三钱 白术三钱

【用法】水煎服。

【功用】清膀胱之热，迅利其小便。

【主治】受暑湿之毒，膀胱热结而气不化，水谷倾囊而出，一昼夜七八十行，脓血稠粘，大渴引水，百杯不止，小溲短赤。

37543 迅补丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】舶上硫黄(别研) 阳起石(大火煨一昼夜) 钟乳粉(别研) 矾石(大火煨二昼夜) 各一两 川乌头四两

【用法】上为细末，水煮面糊和丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服十丸至十五丸，空心及晚食前温米饮送下。

【主治】脾胃久虚，积寒在内，气羸食少，食饮迟化，腹胀倦怠，服药不能取效者。

37544 迅雷散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】熟附片十两 淡干姜十两 吴茱萸五两 母丁香二两 上上紫油桂心四两 乌梅二两 细辛二两 贯众三两 太子参四两

【用法】上为细末，用瓷罐收好。每副计重六钱，河水煎，连滓温服；重者三刻后再服一副。外用食盐填脐中，以艾圆火灸十四壮。

【主治】瘰癧。上吐下泻，汗出淋漓，手足厥冷，指甲青紫，十指螺瘰，眼珠亦陷，乍烦乍躁，闷扰将死。

如

37545 如玉散

【方源】《古今医鉴》卷九引宗橘泉方。

【异名】红玉散(《东医宝鉴·外形篇》卷一)。

【组成】白芷 藿香 牙皂(去皮子)各一钱 甘松 三奈 水泽 白丁香(另研)各一钱 天花粉 白茯苓各一钱半 杏仁(去

皮，另研) 细辛 密陀僧各一钱 樟脑五分(另研) 白及少许

【用法】上为末。临卧用津唾调，或乳汁调，敷面上，明早温水洗去，其面如玉。

【主治】面上一切酒刺、风刺，黑靨斑子。

37546 如圣丸

【方源】《准绳·疡医》卷二引《梅师方》。

【组成】樟脑(另研) 牛黄(另研) 桔梗 甘草(生用)各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作二十丸。每服一丸，噙化。

【主治】风热毒气上攻咽喉，痛痹肿塞妨闷，及肺癰喘嗽唾脓血，胸满振寒，咽干不渴，时出浊沫，气臭腥秽，久久咯脓状如米粥。

37547 如圣丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】牛黄二钱(细研) 犀角屑一分 朱砂一分(细研) 雄黄一分 麝香一钱(细研) 人参一分(去芦头) 白茯苓一分 龙齿一分(细研) 钩藤一分 羌活一分 蝉壳二七枚(微炒) 甘草半分(炙微赤，锉)

【用法】上为末，入研了药，同研令匀，以枣肉和丸，如绿豆大。每服三丸，煎犀角汤送下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊风。精神昏迷，痰涎逆上，咽喉中作声，有时口噤，发歇搐搦。

37548 如圣丸

【方源】《普济方》卷六十引《博济》。

【组成】大黄末一分 蜗牛二七枚 白矾末 陈白梅皮 马勃各一分

【用法】上于五月五日午时，用白梅皮，蜗牛同研，和丸如楝实大。如患者开口不得，即以水磨，用竹管子吹下入喉中，立愈；如轻者，以绵裹含化一丸。

【主治】缠喉风及喉痹。

37549 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】巴豆三粒(去壳) 黑豆四十九粒

砒霜(研)半两

【用法】上将巴豆、黑豆用米醋浸一宿，去皮膜，入乳钵内顺研一百匝，入砒又逆研一百匝，为丸如小豆大，用丹砂为衣。每服一丸，取嫩桃叶七片，水一盞，煎数沸，倾入盞内，用醋一二滴打匀，通口令病人面向东方吞下。如无桃叶，以桃枝七寸煎汤代之。

【主治】疟疾结成癥瘕。

37550 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】豉七粒(慢火微炒转色，倾出，搓去皮) 斑蝥一枚(去翅足，微炒)

【用法】上为末，饭为丸，如豌豆大。每服一丸，温酒或热醋汤送下。

【主治】卒暴心痛。

37551 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】巴豆(去皮心膜，研出油)一两 丁香三钱 乌梅(去核)一两半 干漆(捣碎，炒烟出)一两 滑石一钱

【用法】上为末，然后入巴豆同研匀，用粳米饭同捣烂，丸如粟米大。每服二丸至三丸，随所伤物下。

【主治】积聚癖块，一切所伤，吃食减少，日渐黄瘦。

37552 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】乌头(端正大者，炮裂，去皮脐) 绿豆各等分

【用法】上为末，新水为丸，如绿豆大，以丹砂为衣。每服五丸，白痢，煎干姜汤送下；赤痢，煎甘草汤送下；赤白痢，煎干姜甘草汤下；水泻，用新汲水下。小儿服一二丸，不拘时候。

【主治】水泻并赤白痢。

37553 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】干姜(炮) 高良姜 胡椒 蜀椒(去目并闭口，炒出汗)各等分

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早晨空心食前粥饮送下。

【主治】水泻滑肠，气虚久冷。

37554 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】草乌头(去皮尖，锉，油煎令焦) 枫香脂(研) 赤小豆 踯躅花 威灵仙 地龙(去土，用火烧地赤色，将醋浇过，放地龙在上，用碗盖一时许取用) 仙灵脾 蒺藜子(炒去角) 干蝎(去土，炒) 白僵蚕(瓦上炒) 天南星(炮) 防风(去叉)各半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸至十五丸，空心温酒送下。

【主治】脚膝下注生疮，热肿痛。

37555 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】枳壳(去瓢，麸炒) 威灵仙(去土) 陈橘皮(去白)各一两 续断(炒) 白矾(飞过) 当归(去芦头，炒) 干姜(炮裂) 附子(炮裂，去皮脐) 生干地黄(焙) 连翘(炒) 槐荚子各半两(炒香为度，取荚内子)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心食前用陈粟米饮送下，每日二次。如年深者，加丸数。疼痛甚者，当日见效。此药能疗积年患，二十年以上，只可十服；新患，三二服便止，更不再发。

【主治】五种痔疾。

37556 如圣丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胡黄连 白茺莢(去扇，炒) 川黄连各二两 使君子一两(去壳) 麝香(别研)五分 干虾蟆五枚(锉，酒熬膏)

【用法】上为末，用膏为丸，如麻子大。每服人参汤送下，二三岁者五七丸，以上者十丸至十五丸，不拘时候。

【主治】①《小儿药证直诀》：冷热痢泻。②《张氏医通》：热痢善食腹大。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方为治疳杀虫之剂。积久必热，故用二连清积热，合使君子以加强杀虫之力，茺莢燥湿杀虫，虾蟆为疳积腹膨主药，又佐以芳香开窍之麝香，故疳泻可愈。

37557 如圣丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《庄氏家传》。

【组成】干姜(炮) 槐花(炒)各一两 宣连半两

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服大人三十丸，小儿七八丸，如常泻，温水下；赤多，米饮下。

【主治】冷热泻痢，腹痛，米谷不消，脓血赤白。

37558 如圣丸

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《朱氏家传》。

【组成】石燕子二个

【用法】上为细末，米醋调成膏子，涂在肾上。

【主治】小儿外肾肿赤胀痛。

37559 如圣丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】草乌头 黄连各三分 官桂 干姜 桔梗 茯苓 川椒 茺莢 柴胡 厚朴 干地黄 菖蒲 紫菀 防风 人参 鳖甲 大芎 枳壳 贝母 甘草 甘遂各一两 巴豆一两半(取白霜)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，食前米饮送下，每日只一服。

【主治】腹内诸积聚，岁久癖块不消，黄瘦宿水，朝暮咳嗽；及积年冷气，脐下绞结冲心，膀胱两胁彻背连腰痛无休息，绕脐似虫咬不可忍；及十种水病，五般痔疾，九种心痛，反胃吐逆，饮食减少；宿食不消；妇人月水不通，五邪八瘕，沉重欲死，恐惧歌笑不定，心神狂乱，形体羸瘦；一切风，遍身顽痹，不知痒痛，或似虫行，手足烦热，夜

卧不安；小儿惊疳等。

【临证举例】跌打损伤，一人先因马坠，临老痛楚，不能饮食，命在须臾，日服五丸，经旬日取下血如鸡肝一二千片，与脓清水二升许，其病遂愈。虚劳 三原主簿妻病十五年羸瘦至甚，日服五丸，旬日取下青虫六十四个，脓血三四升，其病遂愈。大风病 一人患大风病，眉毛落尽，遍身生疮，服药百日，取下五色脓并清水各数升，遂得平复。食即吐逆 一人食即吐逆，羸病十年，服药半月，取下虾蟆七个，清水一升许，便愈。癖块 一人患癖块积年，服药二十日取肉蛇二条，各长尺余。带下 一人久患带下，服药二十日后汗出，取下鸡肝色恶物面病愈。

37560 如圣丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】猪悬蹄 穿山甲 蛭皮 红样儿各三两

【用法】上锉，用藏瓶一个，入药在内，盐泥固济，留眼子一个，用炭火烧令通赤，烟尽为度，为细末，入没药一两，乳香半两，麝香一钱，同再研匀，用黄蜡三两熔化和丸，如粟米大。每服五丸至七丸，甘草末一钱，同温酒调下。

【主治】年深痔疾，恶疮肿痒。

37561 如圣丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】杏仁四两(去皮尖并双仁，砂盆研，滤候滓尽)

【用法】上以银石器慢火熬，更用大枣二十九枚同煎，枣熟剥去皮核，再熬候稠，入葶藶末二两 更熬候可丸，即丸如梧桐子大。每服三四十丸，空心食前锉散下，日二服。

【主治】痔漏不问久新，有虫无虫。

37562 如圣丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】白茺莢(微炒，去皮)二两 黄连(去须) 神曲(炒) 麦蘖(微炒)各一两

【用法】上为细末，猪胆汁煮糊为丸，如黍

米大。每服一二十丸，米饮送下。

【主治】小儿五疳羸瘦，面黄腹急，盗汗体热，乳食不消。

37563 如圣丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】川百药煎（好者）不拘多少

【用法】上为细末，用白汤调陈米糕为丸，如梧桐子大，略用百草霜为衣。如白冷痢，以罌粟壳一枚（炙黄色）煎汤送下；赤痢，甘草汤下，不拘时候。

【主治】赤白痢。

37564 如圣丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】黄柏 黄芩 黄连 防风各半两 白僵蚕一两 全蝎三分 轻粉半钱

【用法】上为细末，羊蹄根汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，嚼羊蹄根汁送下。随病入上下，分食前后。又以羊蹄根涂癣。

【主治】癣疮。

37565 如圣丸

【方源】《普济方》卷一六九引《医学切问》。

【组成】陈皮 干姜各三钱 巴豆一钱 甘草一钱 三稜 莪术 芫花各半两（加醋一升煮，耗大半，取焙干）

【用法】上为末，和匀，余醋煮糊为丸，如绿豆大。每服五七丸，淡姜汤送下。

【主治】男子妇人，饮食所伤，结成积块痞痛。

37566 如圣丸

《普济方》卷六十一引《仁存方》。即《圣济总录》卷一二二“如圣散”改为丸剂。见该条。

37567 如圣丸

【方源】《医方类聚》卷二一八引《医林方》。

【组成】马兜铃半两 山梔子一两 红芍药一两 没药二钱 当归半两 定风草半两 防风半两 乳香二钱 五灵脂半两 玄胡索半两 干漆半两（炒令烟出）

【用法】上为细末，酒曲糊为丸，如梧桐子

大。每服三十丸，空心服，如腹痛，乳香汤送下；咳嗽，人参、杏仁汤送下。

【主治】妇人心腹痛，气冲上，不省人事，邪风透入小肠，咳嗽，两胁积血成片。

37568 如圣丸

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】大蒜（研细） 淡豆豉 地榆各等分

【用法】上为末，大蒜同研令匀，入炼蜜少许，捣令得所为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎椿树叶汤送下；若无椿叶，取大眼桐皮（刮去青皮，取白），煎白汤送下。

【主治】肠风脏毒，下血不止，日久羸瘦。

37569 如圣丸

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】僵蚕 南星 马屁勃各等分

【用法】上为细末，用盐梅生姜汁为丸，如弹子大。噙化。

【主治】九种咽喉。

37570 如圣丸

《普济方》卷一〇六。即《普济方》卷一〇五引《圣惠》“木香丸”加甘菊、诃黎勒、生姜、干地黄、山芋各二两。见该条。

37571 如圣丸

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】地胆三十二个（去头足） 斑蝥五十个（去头翅足） 盐豉七十个 轻粉半钱（为衣）

【用法】上药用枣肉为丸，如绿豆大。每服五十丸，先饮好酒三五盏，后用温酒送下，如重车行五里，小腹微觉痛，取下胞中病如雀脑相似，是病根；妇人产后，脐腹痛，恶物未尽，服七丸，童子小便送下；男子妇人疝气并小腹脐痛，每服一丸，温酒送下，妇人用童子小便下。

【主治】男子五种疝气；妇人产前经血不来，赤白带下，经血不止；产后恶物不行，脐腹撮痛。

【宜忌】忌食杂鱼、湿面及鸡、猪、马、牛

等肉。

37572 如圣丸

《普济方》卷三二四。为《圣惠》卷七十一“抵圣丸”之异名。见该条。

37573 如圣丸

《普济方》卷三七四。为原书同卷引《瑞竹堂方》“万金丸”之异名。见该条。

37574 如圣丸

【方源】《本草纲目》卷二十引《乾坤秘蕴》。

【组成】草血竭 羊膻草 桔梗 苍术各一两 甘草五钱

【用法】上为末。先以陈醋二碗入锅，下皂矾四两煎熬，良久下药末，再入白面不拘多少，和成一块，为丸如小豆大。每服三五十丸，空腹醋汤送下，每日二次。数日面色复旧。

【主治】脾劳黄疸。

37575 如圣丸

【方源】《外科理例·附方》。

【异名】如圣丹（《寿世保元》卷九）。

【组成】全蝎（酒洗） 连翘 天麻 防风各一两半 荆芥 川芎 白芷 当归（酒洗） 黄柏 羌活 桔梗 大黄（煨） 滑石 石膏（煨） 白术 麻黄 苦参 僵蚕（炒） 蝉蜕 芍药 山梔 枳壳 细辛 皂角刺 大风子肉各一两 独活 人参 郁金 芒消 黄连各五钱

【用法】上为细末，用红米糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，用六安茶煎汤送下，每日三次，半年全愈。小便尿如靛水黑色，此病久深者，只用此药二料。

【主治】癩风。

【宜忌】如眉毛须发脱落日渐生者，切不可食羊肉、鹅、鸡、猪头、蹄、鲤鱼、生冷，如肯食淡，百日全愈。

【加减】如疮破裂，只用大风子壳煎汤洗，春夏滑石、石膏依方用，秋、冬二味减半，过春分、秋分服防风通圣散一帖，空心服，利

三四次，以粥补之。

37576 如圣丹

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【异名】火龙丹（《普济方》卷三三一引《神效方》）

【组成】枯矾四两 蛇床子二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如弹子大，用干胭脂为衣。绵裹放阴中，如热极再换。

【主治】妇人经脉不调，赤白带下。

37577 如圣丹

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】干蟾七个（烧灰） 蝉壳（去土尽）半两 蝮蛇胆一分 大枣一个（去核烧灰，以上先为末） 黄丹一分（研） 定粉一分（研） 麝香一钱（研）

【用法】上为细末，用好醋看干湿拌匀，白杵一二百下成膏为丸，如黍米大。每服五七粒，米饮送下，量大小加减。又化三二粒，涂调患处。若虫出乃愈。

【主治】①《卫生总微》：小儿肾疳成匿，肠虚，虫蚀下部肛肠等。②《普济方》：肠胃俱虚，腹内虫动，侵蚀下部，疳痢湿虫。

37578 如圣丹

【方源】《普济方》卷一九七。

【异名】辰砂丹。

【组成】人言 雄黄 黄丹各等分

【用法】上为末。每服一字，早晨空心服。一方用雄黑豆九十八粒，水浸一宿，去皮，同药捣为丸，分作二十六丸，朱砂为衣。每服一丸，发时用新水面东送下。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌鸡、猪、鱼、兔等物。

37579 如圣丹

《寿世保元》卷九。为《外科理例·附方》“如圣丸”之异名。见该条。

37580 如圣水

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】干艾叶（烧灰，炒）半钱 黄连（去须，捣细末，炒）半钱

【用法】上药入新瓷器内，用无油沸汤浸，

稀稠得所，新水内沉令极冷，入青古老钱一文，浸二时辰。每临睡仰卧，用古老钱蘸药点眼。候口中觉味苦即验。

【主治】眼赤肿痛生疮。

37581 如圣汤

《幼幼新书》卷三十四引《养生必用》。为《伤寒论》“桔梗汤”之异名。见该条。

37582 如圣汤

【方源】《普济方》卷六十引《旅舍》。

【异名】如圣麦门冬散（《杨氏家藏方》卷十九），如圣饮子（《癰疽论萃英》），如圣饮（《治痘全书》卷十四）。

【组成】桔梗一两 甘草（生）一两 牛蒡子（炒）一两 麦门冬半两

【用法】上为细末。沸汤调下，细细服。入竹叶煎，尤妙。

【功用】治痰祛热，利咽喉。

【主治】咽中有疮，咽物不下，及咳嗽咯血，肺痿痰唾气促，并小儿疮疹毒，攻咽喉肿痛。

37583 如圣汤

《小儿药证直诀》卷下。即原书同卷“甘桔汤”加荆芥、防风。见该条。

37584 如圣汤

【方源】《百一》卷六引焦济卿方。

【组成】人参 当归各三寸（洗） 滴乳一块（黑豆大） 甘草二寸（炙） 乌梅七个 罌粟壳一个（去瓤，蜜炙） 大北枣七个 缩砂仁 大丁香 白豆蔻各二十一个 陈生姜二块（指大，用湿纸裹，煨熟）

【用法】上为末，分作三服。水一盏半，煎至七分，滤去滓服。

【主治】下痢赤白甚重者。

【加减】不用罌粟壳亦可。

37585 如圣汤

【方源】《济生》卷七。

【异名】如圣散（《广嗣纪要》卷八）。

【组成】鲤鱼皮 当归（去芦，酒浸） 熟地黄（酒蒸） 阿胶（锉，蛤粉炒成珠） 白芍药 川芎 川续断（酒浸） 甘草（炙）各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，入苈根少许，生姜五片，煎至七分，去滓，空心食前温服。

【功用】顺气安胎。

【主治】妊娠饮食冷热，动风毒物，或因再交，摇动骨节，伤犯胞胎，或服热药太过，血气相搏，致胎动腹痛，多呕，气不调和，或为漏胎。

【备考】本方原名“如圣丸”，与剂型不符，据《普济方》改。

37586 如圣汤

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施园端效方》。

【组成】桔梗二两 甘草（炒） 陈皮 半夏（姜制）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜七片，同煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】咽喉噎塞，咳脓血者。

37587 如圣汤

【方源】《得效》卷十一。

【组成】白芍药 川升麻各一两 甘草 紫草各五钱 干葛一两 木通五钱（去皮节）

【用法】上锉散。每服二钱，水一中盏，加生姜二片，葱白二根，山楂子根三寸同煎，热服。

【主治】①《得效》：身热如火，头痛，颊赤面红，呵欠，鼻疮，疮疹已出未出时。②《景岳全书》：痘疹毒盛不起。

【加减】壮热心烦，加人参、赤茯苓，石膏，麦门冬（去心）。

37588 如圣汤

【方源】《医方类聚》卷二六五引《经验良方》。

【组成】川升麻 赤芍药 甘草三钱半 紫草半两 白术二钱 陈皮一钱半

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盏，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】小儿身热头痛，颊赤面红，呵欠清

涕，疮疹已出未出。

37589 如圣汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通 猴梨各等分

【用法】加生姜一片，葱白三茎，水煎，热服。

【主治】痘已出，身热如火。

【加减】心烦，加麦冬、赤茯苓；烦渴，加生脉散；七八九日身如火者，加酒炒黄芩、地骨皮。

37590 如圣汤

《证治宝鉴》卷一。为《赤水玄珠》卷十八“如圣散”之异名。见该条。

37591 如圣汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】荆芥 防风 桔梗 甘草 连翘

【用法】水煎服。

【主治】时感风寒，头疼身热，及咽痛等症。

37592 如圣饮

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】甘草（炙） 柴胡（去苗） 常山 乌梅（去核）各半两

【用法】上锉。用银器或沙石铫，当发日绝早，以好酒二升，慢火熬至一盞，滤去滓，放温，作一服饮尽。良久吐涎即愈。如尚觉有寒气未退，候五七日再服。

【主治】疟疾及有孕妇入患者。

37593 如圣饮

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄（去根不去节，寸截，沸汤掠去沫，晒干）六两 甘草（炙）一两 桂（去粗皮）半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）四十九枚

【用法】上锉，如麻豆大。以水五盞，银石器内慢火煎取三盞，澄清放温，每服半盞。服罢去枕仰卧，其喘立止，余药以净瓶盛，外以温汤养之，旋旋服。

【主治】肺气上喘，不以久新。

37594 如圣饮

【方源】《易简方》。

【组成】生甘草 桔梗各等分

【用法】水煎服。

【主治】小儿咽喉疼痛。

37595 如圣饮

【方源】《百一》卷六。

【异名】如圣散（《奇效良方》卷十三）。

【组成】当归 地榆 缩砂仁 赤石脂 陈皮 石榴皮 诃子肉 甘草 罂粟壳 干姜各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，入陈霜梅一个，煎至七分，去滓，赤痢冷服；白痢热服；赤白痢温服。年高、妊娠、小儿皆可服。

【主治】一切痢疾，无问久新，或赤、或白，或赤白相杂，日夜无度。

【宜忌】忌生冷、肥腻物。

37596 如圣饮

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳（去顶蒂瓤，蜜炙）四两 橘皮（去白） 白艾 当归（去芦） 甘草（炙）各二两 乌梅一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，加生姜三片，枣子一枚，如赤痢入地榆；白痢入干姜一小块，煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】痢疾。

37597 如圣饮

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【组成】甘草一钱 桔梗三钱 麦冬一钱半 牛蒡一钱半 玄参一钱 荆芥一钱 防风七分

【用法】加葱三茎，水煎服。

【主治】痘疹，风热痰嗽，声哑喉痛。

【加减】热甚，加犀角尤妙，或加黄芩。

37598 如圣饮

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】羌活 防风 柴胡 枳壳 甘草 川芎 人参 白术 白芷 芍药

【用法】加生姜一片，水煎，临服入姜汁、竹沥各二匙，温服。

【主治】伤寒重感寒湿，则成刚柔二痉，头面赤，项强直，手足搐，口噤背张。

【加减】有汗，去枳壳，加桂枝；无汗，去白术，加麻黄；口噤咬牙，加大黄；手足挛搐，加当归。

37599 如圣饮

《治痘全书》卷十四。为《普济方》卷六十引《旅舍》“如圣汤”之异名。见该条。

37600 如圣饮

《明医指掌》卷七。为《赤水玄珠》卷十八“如圣散”之异名。见该条。

37601 如圣饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】鼠粘子一钱 甘草五分 荆芥七分 桔梗六分 防风五分 麦门冬一钱 竹叶十片（一方无竹叶，有黑参）

【用法】水煎，不时温服。

【主治】痘出不快，咽喉不利。

37602 如圣饮

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】羌活一钱半 秦艽一钱半 川芎一钱 白芍一钱半（酒炒） 当归二钱 白芷一钱 黄芩半钱（酒炒） 人参一钱 半夏（制）一钱半 甘草一钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】刚痉，脉弦细数。

【方论选录】风热伤筋，血脉不能荣养，面约束之权顿失，故搐搦反张，遂成刚痉焉。羌活疏风以利关节，黄芩清热以定搐搦，人参扶元托邪，当归养血荣经，白芷散阳明之邪，川芎行血中之气，白芍敛阴和血，秦艽活血祛风，半夏燥湿痰，甘草缓中州，使中气调和，则血行邪散，而筋得所养，刚痉无不痊矣。此活血祛邪之剂，为刚痉邪盛之专方。

37603 如圣饼

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】寒食面 铅丹（研） 白矾（烧令汁尽，研） 轻粉（研） 硫黄（研）各等

分

【用法】上为末，用倒流水拌和作饼，如钱大。每发时以慢火炙黄熟，一饼分四服，用温熟水嚼下，日午、夜卧时服。

【主治】痔瘻及脏毒下血。

37604 如圣饼

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】密陀僧五钱 诃子（大者）八个（火煨，去核） 硫黄三钱 轻粉二钱 石燕一对（洗净，烧红，酒淬）

【用法】上为末，面糊为丸，如龙眼大，捏作饼。每用一饼，入灰中略煨，热茶清下。

【主治】大肠冷热不调，下赤白痢，及大人小儿一切积滞。

37605 如圣饼

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【组成】乳香 没药 木香 血竭 当归各等分 麝香减半

【用法】上为末，用酒糊和饼二个。乘热熨之。

【主治】流注及一切疮疡不能消散，或溃面不敛。

【加减】毒疮，加蟾酥。

37606 如圣散

【方源】方出《外台》卷四十，名见《普济方》卷三〇八。

【组成】麝香

【用法】上用少许，敷疮上。

【主治】沙虱毒。

37607 如圣散

【方源】方出《圣惠》卷六十五，名见《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【组成】水银一分（并胡粉点少许水，研令星尽） 胡粉一两 蛇床子半两（捣为末） 黄连三分（去须，捣为末）

【用法】上件药，都以生麻油和如稀膏。每用药时先以盐浆水洗疮令净，后以药涂之，干即更换。不过三五度愈。

【功用】《局方》（吴直阁增诸家名方）：活

血脉，润皮肤，散风邪，止瘙痒。

【主治】①《圣惠》：干疥久不愈，皮肤痒痒。②《局方》：（吴直阁增诸家名方）：肺脏风毒，攻发皮肤，血气凝涩，变生疥疮，痒痒，搔之皮起作痂，增展侵引，连滞不愈。

37608 如圣散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】鹿茸半两（去毛，涂酥炙微黄） 黄连三分（去须，微炒） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，日三四服。

【主治】小儿洞泄，下痢不愈，乳食全少。

37609 如圣散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】大川乌二两半（炮） 草乌（炮）一两半 白芷二两半 细辛一两半 防风五钱 全蝎（去毒）半两 天麻（去芦）半两 白术（炮）二钱半 川芎二两半 麻黄半两 苍术（泔浸，炒）二两半 （一方有桔梗，无全蝎、麻黄）

【用法】上为细末。每服一钱，温酒调下。如金疮血出，用药贴之，汗出即愈；如诸疮，贴患处；头风，口噤水，鼻内搐之。

【主治】诸风湿并破伤风。

37610 如圣散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】苍术六两 川乌头（炮，去皮）四两 草乌头（炮，去皮）二两半 两头尖（炮，去皮）四两 白术 川芎 白芷各一两半 防风 细辛各二两半 蝎梢（微炒） 雄黄各五钱

【用法】上为末。每服一钱，酒调下，不拘时候。

【功用】止血定疼。

【主治】①《袖珍》引《圣惠》：破伤风。②《普济方》：一切金刃伤，及诸般伤损、中风搐倒，牙关紧闭。

【加减】如损骨，加乳香五钱。

【备考】《医方类聚》引《袖珍》有天麻一两，无白术、蝎梢。《普济方》本方用法：金刃箭伤，先以药末一钱重，干贴伤口，后用温酒调一二钱服之。

37611 如圣散

【方源】《证类本草》卷二十一引《经验方》。

【组成】露蜂房 甘草各等分

【用法】用麸炒令黄色，去麸为末。水二碗，煎至八分一碗，令温，临卧顿服。明日取下恶物。

【功用】解药毒上攻。

37612 如圣散

《证类本草》卷二十八引《经验方》。为《妇人良方》卷十九引《华陀方》“愈风散”之异名。见该条。

37613 如圣散

【方源】《博济》卷三。

【组成】箭竿内蛀末（如有虫子，一处同研，令细）三钱 麝香一钱（研） 腻粉一钱

【用法】上为细末。每用先以绵杖子撮净，然后可三刺耳子深送，以棉塞定，如觉刺扎，即是恶物也，要出去棉，侧耳令流出。肿痛甚者，三服愈。

【主治】水入耳内，脓出疼痛，日夜不止。

37614 如圣散

【方源】《博济》卷三。

【异名】车螯散（《圣济总录》卷一四三）。

【组成】车螯（一合）两个 皂角刺四十九个 硃砂 朱砂 乳香各一分（三味同研）

【用法】上药入车螯合内，以蚯蚓泥裹，用炭火六斤煅，火尽为度，取出研为细末。每服一钱，空心温酒调下。

【主治】肠风泻血，日夜不止。

37615 如圣散

【方源】《博济》卷四。

【组成】蛇蜕皮二条（各长二尺，用纸烛烧炭，研） 谷精草一两（去根土） 黑附子末二钱（去脐子） 蝉壳（去足）一分 石决明一分 定粉四钱

【用法】上药前三味先为末，次入诸药研为散。每服一字半，羊子肝一具，切破掺末，用麻皮线缠，米泔煮熟熏眼，后与吃。如未能吃食，研汁灌之。

【功用】退翳。

【主治】小儿多时泻痢，眼生翳膜并瘖眼。

37616 如圣散

【方源】《博济》卷五。

【异名】如神散（《圣济总录》卷一三九）。

【组成】龙骨半两 虎骨半两 黄丹五文（放熨斗内，以火烧令通赤） 朱砂一钱 膩粉一钱 麝香二十文 乳香一块（好者，皂子大）

【用法】上为细末。一切疮，以黄连汤或盐汤拭干，掺在疮上。不得以衣物粘着疮口。

【主治】一切刀斧所伤，并久患恶疮。

37617 如圣散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】金星石 银星石 禹余石 寒水石 不灰木 半夏 川大黄 蛤粉各等分

【用法】上药生用，为细散。每服一钱，新汲井水调，入龙脑少许服更佳。

【功用】解五毒。

【主治】吐血极者。

37618 如圣散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】板蓝根二两（肥者，炒令黄色） 甘草一两（炮令黄色） 井泉石一两半 乳石一两半 丁香半两

【用法】上为末。吐泻时梗米饮调下半钱，待哭立效。如惊风用乳石薄荷水调下。

【主治】①《传家秘宝》：小儿风热，吐泻不定。②《卫生总微》：伤热生风，聚泻不定，或时惊悸，睡卧不宁。

37619 如圣散

【方源】《证类本草》卷八引《孙尚药方》。

【组成】草薢（细锉） 贯众（去土）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，空心食前服。

【主治】肠风痔漏。

37620 如圣散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】狐心肝三副 乌鸦二只（去嘴爪翅，并腊月者，以上两味用大新藏瓶一枚，斡开口子纳之，瓦盖合留一眼子，外以纸筋泥固济，泥干以火烧令赤，候烟细无香气，去火盖定眼子，候冷取出，以绢帛裹地坑内碗，复出火毒一复时，取出研细） 丹砂（研） 龙脑（研） 麝香（研）各二钱 牛黄（研）半钱 犀角（镑） 琥珀各一字 真珠（麻子大者）五颗（小者十颗）（细研） 金箔 银箔各十片

【用法】上以丹砂以下诸药为极细末，同前药研匀。每服一钱匕，用薄荷自然汁入酒少许调下，空心、日午、临卧各一服。

【主治】急风。

37621 如圣散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】胡麻二斤（九蒸九晒） 天麻一两 乳香（研） 松脂（研） 款冬花 旋复花 苍耳 人参 玄参 沙参 苦参 紫参 丹参 松花 白茯苓（去黑皮）各半两 木香 丁香 胡麻子花各一分

【用法】上为散，和匀。每服三钱匕，薄茶调下，日三四服，不拘时候。服药五日，遍身及百骨节疼痛，起止不得，乃见效也。两三日，却得安。及一月，身体黑瘦，方渐平复。

【主治】恶风。

37622 如圣散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】色白瓷碗碟

【用法】上为细末。每服二钱匕，打皂荚子煎汤调下。连服三次立愈。

【主治】吐血不止。

37623 如圣散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】枫香脂不拘多少

【用法】上为细散。每服二钱匕，新汲水调下，不拘时候。

【主治】吐血不止。

37624 如圣散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】郁李仁（去皮尖）

【用法】上为细末。每服一钱匕，研鹅梨汁调下。

【主治】血汗。

37625 如圣散

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】臭橘 草薢各一两

【用法】上药同捣碎，炒令烟出，放冷，为细末。每服二钱至三钱匕，茶清调下。

【主治】后重下脓血。

37626 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】桂（去粗皮） 郁金各半两 马牙消二两 甘草一分

【用法】上为散。每服一钱匕，临卧新汲水调下。服药毕去枕卧少时，令药行到眼中，觉痛泪出为度。小儿十岁半钱匕，五岁以下一字。

【主治】上焦壅热，一切眼疾。

37627 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】蛤粉 青箱子 石决明各半两

【用法】上为细散。用牛肝二两 批开掺药三钱匕在内，麻缕札定，用米泔水煮熟为度，细嚼米饮下，临卧服。觉时便见物。若用鸡、兔肝煮药皆可。

【主治】肝虚雀目，夜不见物。

37628 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】胡粉半两 麝香（研）一字 甜瓜蒌七枚（为末，入粉内同研）

【用法】上为末，用蟾酥少许，水浸一宿，次日取蟾水，先和胡粉，次同和丸，如绿豆

大。每用二丸，水化敷疮上。鼻下赤烂者，涂赤烂处。小儿每用一丸。

【主治】疳虫蚀鼻生疮，及鼻下赤烂。

37629 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】白僵蚕（直者，炒） 天南星（炮）各半两

【用法】上为散。每服一字，以生姜自然汁调下，如咽喉大段不通，即以小竹筒灌之。涎出后，用生姜一片，略炙，含化咽津。

【主治】喉痹。

37630 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】宽咽救生散（《普济方》卷六十一引《仁存方》）、僵蚕散（《普济方》卷六十三）。

【组成】白僵蚕不拘多少（直者，新瓦上炒）

【用法】上为末，用生姜自然汁为丸，如鸡头子大。含化。急者生姜汁调药末一大钱，以竹筒子灌入喉中。

【主治】缠喉风，一切喉痹危急。

【临证举例】喉痹 《普济方》：葛彦恢提举阁中，曾患喉痹，五八主簿，用此治之即安。

【备考】本方改为丸剂，名“如圣丸”、“如神丸”（见《普济方》）。

37631 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】赤芍药一两 防风（去叉）三分 天麻半两

【用法】上为散。每服一钱匕，冷茶调下，不拘时候。

【主治】狗咽，及咽喉紧急。

37632 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】栝楼（用瓢）二枚 杏仁（去皮尖双仁，炒）一两半 甘草（炙）三分 皂荚（炙）一寸（与甘草同为末）

【用法】上药先研栝楼、杏仁烂，次以甘草

皂荚末，和为饼子，铛中焙令干，重捣为细末。每服一钱匕，腊茶一钱匕，调下黄腊少许，水一盏，同煎七分，热服亦得，未效再服。

【主治】咽物误置喉中不出。

37633 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】风化石灰半两 铅丹二钱 膩粉一钱 石硫黄半钱

【用法】上为细末，用生油调，先以布揩破癣，涂之。未涂药间，煎葱白、甘草汤淋洗，如换时亦依此。

【主治】一切干湿癣。

37634 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】白猬皮二枚（烧） 鸡冠花（炒） 皂荚针（炙）各二两 栝楼一枚（烧） 胡桃十枚（烧） 槐花二两（炒） 不蛀皂荚二挺（酥炙） 黄耆（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒）各二两 白矾 绿矾各一两半（二味飞过）

【用法】上为散。每服二钱匕，酒调下，或作丸服。

【主治】诸痔。

37635 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【异名】如胜散（《朱氏集验方》卷十）、如神散（《仙拈集》卷三）。

【组成】棕榈一两（烧黑灰） 乌梅一两 干姜一两（并烧过，存伍分性）

【用法】上为散。每服一钱匕，乌梅汤调下，食前服。久患甚者不过三服。

【功用】《医方集解》：止崩漏。

【主治】①《圣济总录》：经血不止。②《普济方》：经血不调，兼治血崩。

【方论选录】《医方集解》：此足厥阴药也，涩能止血，故用棕榈；酸能收敛，故用乌梅；温能守中，故用干姜；黑能止血，故并煨用。

37636 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】人参 白术各一两 干姜（炮）丁香（炒）各半两 缩砂仁（炒） 檀香（锉） 桔梗（炒）各一两 胡椒（炒）一分 甘草（炙）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，盐汤点服。

【主治】妊娠心痛，胸膈不利，不思饮食。

37637 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】生过蚕纸（烧灰）

【用法】上为细散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】妊娠数日不产。

37638 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】地胆草 栝楼根 莒荻子各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，温葱酒调下，日三四服。

【功用】下乳。

【主治】产后乳不流行。

37639 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】好枣一枚（去核） 铅丹半钱 硃砂一皂子大 膩粉（抄）一钱

【用法】上为细末，入枣内，用大麦面裹，塘灰火烧香熟为度，去面烂研为粉。每一枚枣分两服，煎槐花汤调下。二服定。

【主治】小儿脏毒，久痢下脓血。

【备考】《普济方》有甘草三分。

37640 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】蛇蜕皮一尺 皂子十四枚 马勃一分

【用法】上药以蛇皮裹皂子，更用马勃裹蛇皮，入罐子中瓦盖，黄泥裹合晒干，炭火煨，候烟欲断即止，取出油单贴入地中，出火毒一宿，研细，入麝香少许再研。每服半钱匕，葱汤调下，每日三次。

【主治】小儿斑疮入眼，成疮疤。

【宜忌】忌一切发眼物。

37641 如圣散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】赤小豆一升 川乌头一两 草乌头一两(炮) 乳香半两 芸台子一两

【用法】上为细末。每用一钱，入白面一钱，疮肿用水调稀，煮一二沸放温摊纸花上，贴患处；伤折用醋调；骨损用黄米粥调，依患处大小贴之，上用帛子缠系，成以杉木箴夹，五日一换，六十日当愈。

【功用】消毒，接骨定痛，活养血脉。

【主治】一切无异色疮肿，并内脑折伤。

【宜忌】已破者不可用。

37642 如圣散

【方源】《幼幼新书》卷三十七引《惠眼观证》。

【组成】细辛 芫荇(无盐者) 剪刀草 藜芦 白矾 硫黄各等分

【用法】上为末。用面油调入猪筒骨髓一条，再研匀和，揩擦疮上。

【主治】小儿疥癣。

37643 如圣散

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《赵氏家传》。

【组成】大丁香二十一个 密陀僧半两 粉霜一字半 舶上硫黄二钱半 硃砂一钱 白丁香四十个(全者)

【用法】上为末。每服半钱，冷面汤调下，日一服。正午时见效。三岁以上每服半钱；三岁以下每服一字。

【主治】小儿奶癖。发寒热，肌瘦，不思饮食，渐渐黄瘦，欲成疳气。

【备考】本方原名如圣丸，与剂型不符，据《普济方》改。

37644 如圣散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】焰消二钱 青黛一分 郁金 薄荷叶 川芎各二钱 硼砂一字

【用法】上为末。鼻内搐之。

【主治】风毒上攻，头目偏痛。

37645 如圣散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】五倍子一个(不破者，于顶上开一窍子，去其瓢，别用芦荟为细末填满，更用生蟾酥五七点滴在内，用好纸面糊封其口，文武火烧存性，放冷) 麝香 雄黄各少许

【用法】上为细末。每用少许，干掺患处，咽津无妨。

【主治】大人小儿走马疳。

37646 如圣散

【方源】《卫生总微》卷一。

【组成】铅霜一分(研细) 真牛黄一分(研细) 太阴玄精石一分(研细) 朱砂一分(研细，水飞晒干)

【用法】上为细末，入白龙脑细末半钱相合。每用抄一字至半钱，掺儿口中。

【主治】垂痈。儿自初生，至七日内外，因胎毒上攻，血气不敛，儿口中上腭连喉舌生物，如芦簪盛水之状，成作疱，在悬雍之前，塞其气路不通，令儿危殆。

37647 如圣散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】白附子二钱 僵蚕(炒，去丝嘴)一钱 全蝎二钱(中者，用面炒，去足，留身尾甲) 人参(去芦)二钱 草乌半两(炮，去皮) 牙消二钱 丁香一钱(不见火) 膩粉半钱 天竺黄一钱 天南星(米泔浸一宿，焙干)二钱 龙齿二钱 郁金一钱 脑 麝各少许

【用法】上为细末。十岁以下儿每服半钱，以上者每服一钱，冷薄荷汤调下。如儿惊结，大小便不通，连进二三服，不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风，吊眼撮口，搐搦不定，壮热困重。

37648 如圣散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】蛇蛻皮(放灯焰烧)

【用法】先用碗一只在下，才烧焰绝，放在

碗内，急用碗一只复之，不令透气，良久揭开，细研为末。每服一字或半钱，用藿香汤调下。

【主治】疮疹已生，反倒靨内陷，舌缩，啼声不出，腹胀肚急，一切恶证。

37649 如圣散

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】海金沙（炒） 滑石各等分

【用法】上为细末。每服一字或半钱，乳前食煎灯心汤调下。

【主治】小儿小便涩滞，滴沥不得通快。

37650 如圣散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】绵黄耆一两（锉） 连翘一两 鸽粪半合（烧灰） 川大黄半两（锉，炒） 糯米半两（用斑螫七个，同炒米黄，去斑螫） 犀角屑半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，入酒三四滴，同煎至五分，去滓放温，时时呷。

【主治】小儿项边生核子不消。

37651 如圣散

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】松脂半两（研细） 轻粉半两

【用法】上药和匀。油调敷之。

【主治】小儿一切头疮。

37652 如圣散

【方源】《普济方》卷三〇六引《宣明论》。

【组成】川乌 防风（去芦） 白芷各二两 川芎一两二钱半 草乌头半两 苍术二两（去皮） 细辛（去苗土净）七钱半

【用法】上药俱不见火，生用晒干，研为细末。外敷。又蛇蝎螫狗咬，用口含浆水洗净，用药末贴上，三二次勤敷即愈。诸小虫血伤无口者，唾津调药搽上，勤易，三五次即愈。

【主治】①《普济方》引《宣明论》：蛇蝎诸虫毒伤，狗咬。②《普济方》：雷头风，癩干风，遍身麻木；金疮破伤风；肿疔、丹瘤、诸疔、发背、搭手、脑疽、臁疮、汤火、牙疼、杖疮；一切小血伤无口。

37653 如圣散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】腊月野狸一枚（盘在瓦罐子内） 大枣半升 枳壳半升 甘草四两（寸截） 猪牙皂角二两

【用法】都入在罐子内，上用瓦子盖定，瓦片子上钻小窍子，都用盐泥固济，令干。作一地坑，用十字瓦支定，令罐子不着地，用炭五秤簇烧至黑烟尽，若有青烟出，便去火取出，用湿土罨一宿。上药研令极细。每服二钱，盐汤调下。

【主治】年深日近，肠风下血，或诸般痔漏。

37654 如圣散

【方源】《传信适用方》卷二引严仲和方。

【组成】鸡心槟榔半两 大腹子半两 甘草（炙）半两 地榆半两 陈橘皮三钱（去白）

【用法】上为粗末。每半两作一服，水一盞半，紫苏茎旧者一二寸，煎至一盞，空心食前热服，留滓再煎。如痢止，不必多服，屡试皆效。

【主治】痢疾。

37655 如圣散

《普济方》卷六十三引《卫生家宝》。为《圣济总录》卷一二二“通喉散”之异名。见该条。

37656 如圣散

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】蓬莪术（醋煮）半两 天台乌药 白术各一两

【用法】上为末。每服二钱，温葱酒调下，每日三服至五服，不拘时候。服药三日后，用淋瀝药逐邪气。

【主治】初中风，瘫痪，不经针灸者。

【宜忌】实人可用。

37657 如圣散

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人参 当归各一两 鳖甲 胡黄连 沉香 知母各半两 桑寄生 干葛各三分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加乌梅一个，大枣二个，麦门冬数粒，煎至八分，不拘时候。

【主治】妇人所禀气血不足，不耐寒暑，易感疾伤，月水不调，久而心虚，状若心劳，四肢易倦，筋骨少力，盗汗易惊，或时不宁，五心烦热，肌肤不长，间作头昏，饮食无味，胸膈不利，或产前、产后受病。

37658 如圣散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】备急如圣散（《卫生宝鉴》卷十一）。

【组成】雄黄（细研） 藜芦（厚，去皮用心，并生用） 白矾（飞） 猪牙皂角（去皮，炙黄）各等分

【用法】上为细末。每用一豆大，各鼻内搐之。

【主治】时气缠喉风，渐入咽塞，水谷不下，牙关紧，不省人事。

37659 如圣散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施园端效方》。

【组成】青黛一两 盆消 牙消各七钱 井盐半两 片脑少许

【用法】上为末。鼻内搐少许。

【主治】睛痛不止。

37660 如圣散

【方源】《杂类名方》。

【异名】皂针散（《普济方》卷二八四）。

【组成】甘草一两（半生熟） 皂角三钱（烧存性，去皮弦）

【用法】上为细末。每服三钱，热酒调下，不拘时候。

【主治】恶疮，背脑疽，寒痈，吹奶，打扑损伤。

37661 如圣散

【方源】《医方类聚》卷七十三引《经验秘方》。

【组成】细辛（去叶土） 鸡肠草 旱莲子

茴香 白矾 诃子（煨，去核） 晚蚕沙 青盐 皂角 茜根 麻糝各一两

【用法】上为粗末，入瓶内，盐泥厚固济，瓶口留一窍，出烟，用炭半秤煨，候青白烟，去火候冷，取药细研如粉。揩牙如常法。

【主治】元脏气虚，风热内攻，牙龈浮肿，疼痛发歇。

37662 如圣散

【方源】《医方类聚》卷七十七引《经验秘方》。

【组成】川芎 桔梗 薄荷叶 甘草 盆消各等分

【用法】上为细末。每用一钱，干掺。

【主治】舌肿喉痹。

37663 如圣散

【方源】《瑞竹堂方》卷四。

【组成】川江子一粒或二粒

【用法】上研烂，不去油，入朱砂或黄丹、赤土少许，剃开小儿囟门，贴在囟上。如四边起粟米泡，便用温水洗去药，恐成疮，便用菖蒲水洗，便安。

【主治】小儿口疮，不能吃乳者。

37664 如圣散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】蚕沙一升

【用法】上用水二斗，煎至一斗，滤去滓，夜卧避风处淋洗，水冷即拭干，便睡。

【主治】浑身瘙痒，抓之成疮，及瘾疹之类。

37665 如圣散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】顽荆子 苦参 玄参 紫参 厚朴 荆芥 沙参 陈皮 麻黄（去节）各一两 蔓荆子 防风 白芷 威灵仙各二两 桃枝 柳枝各一把

【用法】上为末。每用三钱，入水五升，煎数沸，临卧热洗之。

【主治】大风疾。

【宜忌】忌酒、湿面、五辛之物。

37666 如圣散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】麻黄(烧灰)半两 盆消二钱半 麝香少许 脑子少许

【用法】上为末。搐鼻内。

【主治】眼目偏痛及头风。

37667 如圣散

《普济方》卷三〇〇引《德生堂方》。为《卫生宝鉴》卷十三“如神散”之异名。见该条。

37668 如圣散

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁班经》。

【组成】苍术一斤 白芷半斤 细辛五两 川芎十两 两头尖四两 川乌半斤 天麻二两 全蝎二两(去节) 白术一两 防风半斤(去芦)

【用法】上为细末。凡遇刀伤，药到血止，用软帛系之；如疮久，用口噙浆水洗净，软帛拭干上药；破伤风，热酒调一钱服，出汗，如无汗，再加半钱，直至汗出为妙；蜘蛛咬伤，用津唾调涂；头风，酒调一盞服，出汗为度；肿疔，水调毛扫；疔疮，新水调涂纸贴，热酒调服；头风遍身，用竹筒吹鼻；杖疮，水调上；牙疼，将炒盐擦牙出涎，勿咽，温水漱；臁疮，口噙浆水洗，软帛拭干搽药；系之伤，新水调涂；蛇犬咬，诸虫伤，口噙浆水洗净，贴之；一切疮痍损伤，津液调涂；下疳疮，口噙浆水洗，贴药。

【主治】诸毒，刀伤，疮久，破伤风，头风，肿疔，疔疮，杖疮，牙疼，臁疮，蛇犬咬，诸虫伤，一切疮痍损伤及下疳疮。

37669 如圣散

【方源】《普济方》卷三四二引《医学类证》。

【组成】鲤鱼皮 阿胶(麸炒) 芎藭 当归(去头尾) 青竹茹 生姜 干地黄各二钱(一方有干姜)

【用法】上咬咀。用水二盞，煎至一盞，去滓温服。

【主治】胎动腹痛。或缘饮食冷热，动风毒物，或因房室过度，摇动骨节，伤犯胞胎，其

候多呕，气不调和。或服热药太过，气血相搏变成漏胎。

37670 如圣散

【方源】《普济方》卷二一五引《经验良方》。

【组成】马蔺花 麦门冬 甜葶苈 白茅根 车前子 檀香 连翘各等分(炒)

【用法】上为末。每服四钱，水煎，临热入烧酒少许服。

【主治】沙淋。

【加减】如渴，加黄芩。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“如胜散”，有苦葶苈。

37671 如圣散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《急救仙方》。

【组成】威灵仙 防风 荆芥 防己 麻黄 杏仁 细辛 川芎 白芷各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片，用好酒煎，待发时热服。后用黄荆柴大者以火炙，取两头汗，水调腊酒，吞下金箔镇心丸。

【主治】诸寒风证，不问男女年久者。

【宜忌】忌发风，诸毒食。

37672 如圣散

《仙传外科集验方》。为《杨氏家藏方》卷十一“一字散”之异名。见该条。

37673 如圣散

《普济方》卷六十二。为原书同卷“救生散”之异名。见该条。

37674 如圣散

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】牛膝一两(酒浸一宿，焙干) 肉苁蓉一两(酒浸一宿，焙干) 葫芦巴半两 巴戟半两(去心) 南木香半两(不见火，日晒干) 破故纸半两(微炒) 桂心半两(不见火) 干山药半两 草澄茄半两 川附子一两(炮，去皮脐，切作骰子块) 川乌头半两(炮，去皮尖，切作骰子块) 黑牵牛半两 蜃青三十个 川楝子一两(每个作四片，酒煮十沸，焙干)

【用法】上将川楝子、川附子、川乌头，同黑牵牛、虻青，于银器中慢火炒令黄色，火不可紧，去牵牛、虻青，只将附子、乌头、川楝，同前药为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】小肠疝气，发作无时，疼莫能忍。

【备考】本方方名，据剂型当作“如圣丸”。

37675 如圣散

【方源】《普济方》卷二五一。

【组成】石蟹

【用法】熟水磨服之。

【主治】中一切药毒，并虫毒。

37676 如圣散

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】蛇床子四两 黄柏 苦参 茵茹各二两 白矾 狗脊 藜芦 剪草各一两 轻粉 胡粉各半两

【用法】上为细末。清油调搽。

【主治】疥风疮癣。

37677 如圣散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】石膏 黄芩（去皮心）各一两

【用法】上为细末。干掺疮上。先用佛手散扫，再干掺本药于疮上。

【主治】湿疖、疮癣痒痛，皮烂。

37678 如圣散

《普济方》卷三五六。为原书同卷“如圣膏”之异名。见该条。

37679 如圣散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】黄蜀花三钱（焙干，无花用子，烂研少半） 好当归二钱（焙干）

【用法】上为末。每服二钱，热酒调下；如不饮酒，用汤服。

【功用】催生。

37680 如圣散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】蛇床子一两 轻粉三钱

【用法】上为末。小油调搽。

【主治】小儿头面耳连引甜疮，流水极痒，

不住手搽，又痛，久不愈者。

37681 如圣散

《普济方》卷四〇三。为《杨氏家藏方》卷十九“活血散”之异名。见该条。

37682 如圣散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】生白矾一两 沥青末一两 轻粉二钱半

【用法】上为末。先用葱白、槐枝熬汤，洗疮净，绢帛拭干，掺药上，再用小油调搽三五上，发自然生出。

【主治】小儿秃疮，白痴，痒不可忍。

37683 如圣散

【方源】《杂病治例》。

【组成】仙术四两 川芎 防风 白芷各二两 细辛一两 川芎半两 草乌一两 天麻半两 雄黄半两

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下。

【主治】风客肢体，如痹疼痛。

37684 如圣散

《奇效良方》卷十三。为《百一》卷六“如圣饮”之异名。见该条。

37685 如圣散

《丹溪心法附余》卷四。为《准绳·类方》卷一引《医学统旨》“追风如圣散”之异名。见该条。

37686 如圣散

《丹溪心法附余》卷十六。为《袖珍》卷一“如神散”之异名。见该条。

37687 如圣散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】川草乌二两（用豆腐煮过，取出用） 苍术（切片，用泔水浸二宿，炒）四两 葱汁十三两 黄柏（去皮）四两 生姜四两

【用法】上为末。入生姜、葱汁捣匀作饼，晒干研末。每服五分，温酒调下。

【主治】风气走注，历节麻痹，左瘫右痪，手足疼痛麻木，风痹。

37688 如圣散

《广嗣纪要》卷八。为《济生》卷七“如圣汤”之异名。见该条。

37689 如圣散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】五倍子二钱 片脑一钱 黄连五分 芦甘石(煨)三分

【用法】上为末。干敷。

【主治】下疳腐久不愈。

【加减】毒未尽者，加黄连末三分。

37690 如圣散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】白芷 川乌 防风各一两 细辛二分半 雄黄二分 草乌(炮过，去皮) 两头尖

【用法】上为末。温酒调下，二日服一次。

【主治】患眼，偏正头痛，属风冷者。

【备考】方中草乌、两头尖用量原缺。

37691 如圣散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】人中白(煨尽烟)一钱 铜绿二分 麝香半分

【用法】上为末。以腊茶浸米泔水洗净血后，搽此药；内服黄柏丸。

【主治】牙疳，状如狐惑，初作气臭，次则牙齿黑，甚则龈肉烂面出血，或上下唇破鼻穿，牙齿落者，气喘痰潮，饮食减少。

37692 如圣散

【方源】《赤水玄珠》卷七引钱氏方。

【组成】桔梗 甘草 阿胶(炒白)

【用法】煎甘、桔取清，纳胶化服。

【主治】肺癰。

37693 如圣散

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【异名】如圣饮(《明医指掌》卷七)、如圣汤(《证治宝鉴》卷一)。

【组成】羌活 防风 川芎 白芷 柴胡 芍药 甘草 当归 乌药 半夏 黄芩

【用法】水二钟，加生姜三片，煎之，临用人姜汁、竹沥温服。

【主治】刚柔二痉，头摇口噤，身反张，手

足挛搐，头面赤，项强急与癰疽。

【加减】有汗是柔痉，加白术、桂枝；无汗是刚痉，加麻黄、苍术。口噤咬牙者，如大便实者，入大黄利之。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳厥阴药也，羌防芎芷柴胡甘草，辛甘以发散风邪；用乌药者，治风须顺气也；用归芍者，治风先治血也；用半夏竹沥姜汁者，风必挟痰也；用黄芩者，风必生热也。柔痉加白术、桂枝，有汗欲其无汗；刚痉加苍术，麻黄，无汗欲其有汗；口齿属阳明，阳明实则口噤咬牙而便秘，故加大黄以泄胃热也。

【备考】按：《明医指掌》有人参。

37694 如圣散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】白术 黄芩 当归 枳壳 黑豆 大腹皮 砂仁 甘草 桑上羊儿藤(即桑寄生)各等分

【用法】水煎服。

【功用】安胎。

【主治】妊娠出痘。

37695 如圣散

【方源】《便览》卷四。

【组成】羌活一钱 苍术八分 防风八分 五倍子三钱(焙) 黄柏五钱(炙)

【用法】上药前四味炒赤色，后加黄柏，再炒枯，研为细末。外敷，如湿，干掺；干者，用烛油调敷。

【主治】湿毒，黄水出如脓颗。

37696 如圣散

【方源】《回春》卷三。

【组成】人参 常山各三钱 丁香二十四个 甘草二分

【用法】上为细末。用好酒一钟，乌梅一个，煎熟露一宿，临发日五更温服。用糖拌乌梅下药，时时可食之。

【主治】疟久不止者。

37697 如圣散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】鹿角(烧灰)一两 芜蔚草(小暑前取,阴干为末)三钱 乳香二钱 没药二钱 当归(炒黑)二钱 麻黄(去节)一钱

【用法】上为细末。每服一二钱,重者三钱,好黄酒调下。有汗避风。

【功用】和血止疼。

【主治】痛风。

37698 如圣散

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】片脑 白矾各四厘 火消三厘 胆矾二厘半

【用法】上为细末。点眼。

【主治】蝎螫眼病。

37699 如圣散

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】紫苏叶 当归各等分

【用法】上咬咀。每服三五钱,用长流水煎服;如无流水,以水顺搅动煎服。

【主治】孕妇难产。

【方论选录】《医略六书》:临产血虚气涩,不能润泽胎孕,而兼感风燥,故孕育艰难,身疼口燥不安焉。紫苏散血气以疏通关窍,当归养经络以利产滑胎,为散水煎,使血盛气行,则窍道润泽,而孕育无不顺,何有身疼口燥之患哉?

37700 如圣散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】白术 黄芩 枳壳 当归 黑豆砂仁 甘草 大腹皮 薜荔(即桑上牛儿藤)

【用法】水煎服。

【主治】孕妇出痘。

37701 如圣散

【方源】《外科大成》卷二。

【异名】如金散(《惠直堂方》卷三)。

【组成】鸡粪四两(用雌雄鸡二只,饿二日,次早用猪胰子切碎,拌糯米粉一二合,徐徐喂之,六七日接粪四两为度,晒干听用) 雌黄六钱 雄黄六钱 明矾一两 皮消一两

胆矾五钱

【用法】上为末,入倾银罐内,用瓦盖之,火煨青烟为度,取出加乳香、没药各三钱、冰片五分,共为末,瓷罐收封口。用唾津调敷痔上,良久去药,再上药,如此七次,看痔黑色,则不须上药,待七日,其痔自落。略用生肌散,二三日收口。

【主治】诸痔。

37702 如圣散

【方源】《医部全录》卷四九〇引《身经通考》。

【组成】使君子肉 胡黄连 黄连(炒) 山楂肉 薄荷 白术(麸炒) 荆芥穗 陈皮各等分 灯芯十茎

【用法】水一钟,煎四分,不拘时服。

【主治】小儿痘靨,潮热未除,鼻口内发疳。

37703 如圣散

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】竹三(《痧症全书》卷下)、二十七号解象方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】牛蒡子 苏梗 薄荷 甘菊 金银花 川贝母 连翘 枳壳各一钱 桔梗五分 乌药四分

【用法】水煎,微温加重便冲服。

【主治】痧,咽喉肿痛。

37704 如圣散

【方源】《痧症全书》卷下。

【组成】枳壳(面炒)三两 小茴(微炒)三钱 盐砖(铲上烧红)三分

【用法】上为细末。每服二钱,温酒调下;如不止,再服一钱。

【主治】当心而痛,遍身骨节牵疼,或呕吐恶心,不时发作,兼治疝气劳根及痧胀。

37705 如圣散

《胎产秘书》卷下。为《郑氏家传女科万金方》卷三“如圣膏”之异名。见该条。

37706 如圣散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】紫草 前胡 牛子各一钱 赤芍八分 升麻 木通各六分 干葛五分 甘草

三分

【用法】生姜、葱白为引。

【主治】痘已出，身热如火。

【加减】烦躁，加麦冬、炒芩；体弱，加人参。

37707 如圣散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】茯苓 桂枝 防风 羌活 香附子各一钱 梔子 甘草各三分 川芎 紫苏薄荷 升麻 陈皮各七分

【用法】上为末。每服一钱，白汤送下；煎服亦可。

【主治】诸般眼疼痛。

37708 如圣散

《喉科枕秘》卷二。为《回春》卷五“清热如圣散”之异名。见该条。

37709 如圣散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】羌活 黄芩 防风 当归 明麻 麻黄 竹沥 荆芥 甘草 僵蚕

【主治】项强面赤头摇，口噤，角弓反张。

37710 如圣膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】蔷薇根（锉） 乳香（研） 阿魏（研）各一两 铅丹六两 柳枝三两（锉，长一寸） 清油一斤

【用法】上药先熬油令沸，下柳枝、蔷薇根煎，候黄黑色，以绵滤过，下丹煎搅，候变黑色，次下乳香、阿魏，更搅令匀。一切疮肿，并用故帛上涂贴之；如患赤眼，头痛眼涩，贴太阳两穴；驴伤马坠，妇人血气，并当归酒下三丸，如梧桐子大；癰疮先抓破，取膏涂贴，以愈为度。

【主治】一切恶疮疔毒。赤眼，头痛眼涩。驴伤马坠，妇人血气。癰疮。

37711 如圣膏

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】芫花根不计多少

【用法】上药洗净阴干，木臼内捣，入水少许绞取汁，于银石器内，慢火煎成膏。将丝

线就膏内度过，以线系痔头。初时微痛心躁，候落，以纸捻子膏药纳于窍内。永除根本。未落不得使水。

【主治】痔瘻有头，或如鼠乳。

37712 如圣膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】黄连 赤石脂各一两（研） 羊脂肪二钱（铔消去滓） 硃砂 白矾（研） 熊胆 龙脑 牙消 麝香 乳香（研）各一钱 炉甘石四两（火煨一伏时，捣罗，水飞，用一两细研） 白沙蜜四两（以二重生绢滤之）

【用法】上为极细末，后入羊脂肪，次入蜜和诸药，入白瓷碗盛之，于盆内用冷水浸一宿，去火毒。每次点粟粒大，如眼中有翳膜，每日早、午、晚点三次。

【主治】一切眼疾，诸药疗不愈。

【宜忌】点柱不得用铁。

37713 如圣膏

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】菜油一两 黄蜡半两 沥青一钱 黄丹半钱 羊筒骨内髓一个

【用法】上一处熬成膏，摊于纸上。贴患处，用冷铁一片，于疮口上压定，四面针破，如脓出不快，以纸捻撮之。

【主治】小儿头上生软疔。

【宜忌】熬药不得犯铜、铁器。

37714 如圣膏

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】荞麦梗灰 茄梗灰 桑柴灰 矿灰 炭灰 黑豆梗灰各等分

【用法】上为末，水三碗淋取汁，将淋下汁再淋二次，慢火熬成膏。每用少许，针刺破疔子，敷之。

【功用】出疔子。

37715 如圣膏

【方源】《百一》卷十三。

【组成】良姜 吴茱萸 金毛狗脊（去皮） 木鳖子（去壳） 白胶香（别研） 败龟壳

(醋蘸炙黄) 牛膝 当归各半两

【用法】上为细末，入面同药末、酒熬成膏子。敷贴，用纸七重封，系定。筋骨自然相连，七日一换。酒面皆不可多用，以面熟为度，熬过恐失药力。

【功用】接骨定痛。

【主治】打扑伤损，筋断骨折。

37716 如圣膏

【方源】《百一》卷二十。

【组成】当归 熟地黄 玄参 大黄 香白芷 续断 赤芍药 官桂各二两 蓬术一两 黄丹秋夏用三斤半，春冬用三斤

【用法】上用麻油六斤，将前六味锉碎，留香白芷一块，入锅内以炭火熬白芷焦黄色，滤去诸药不用，候油冷下黄丹，用柳枝不住手搅，再上火熬，色转为度，放冷自成膏。

【主治】诸般恶疮。

37717 如圣膏

【方源】《得效》卷十三。

【组成】附子 硫黄

【用法】姜汁调匀。先以布擦洗其疮令损，却以茄蒂蘸药擦。

【主治】白紫癜风。

37718 如圣膏

【方源】《普济方》卷八十四引《德生堂方》。

【组成】寒水石 防风 细辛 薄荷 川芎 白芷 独活 黄芩 蓖麻子(去壳，别研)各等分

【用法】上为末。冬用蜜水调，春、夏、秋月用井花水和，涂太阳穴。

【主治】风眼头痛。

37719 如圣膏

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】乳香(好者，研) 没药(研)各一两 当归三两 血竭一两 川芎三两 黄丹一两半(别研) 清麻油二斤半 槐枝白皮 水杨树白皮各十四条(每长一寸) 葱半斤(连根洗，令干) 苦参一分 川楝子

肉一分

【用法】上药除没药、乳香别研，余药为末。先将油、葱、槐、杨树皮同煎令黄色，绵滤过，去葱、树皮。再将油入锅内烧沸，入黄丹煎令紫色，入水不散，倾入钵内令温，将前别研药末搅油内，以水杨树枝打令匀和，新汲水顿冷为度，却覆地上三日出火气。如用膏药，临摊贴时不可厚，但频易。

【主治】一切恶疮，痈疽。

37720 如圣膏

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】巴豆(取肉)二十七枚 密陀僧半两(别细研) 天南星半两 附子 乳香(别研) 没药 木香 当归 防风 紫藤白及 白藜 香白芷 黄芩 黄耆 赤芍药各一分 黄蜡一分(另入) 盐花半钱(炒) 头发一结(净洗，控干)

【用法】上为粗末。用清油一斤，熬令黄色，以绢袋滤去滓，煎令极沸。春、秋入黄丹七两，夏用八两，冬用六两，慢火煎熬成膏，于铁刀上试令软硬得所，摊得成膜为度。每用摊纸上，贴如常法。

【主治】不问年深日近，发背恶毒，痈疽漏疮，瘰癧。

37721 如圣膏

【方源】《普济方》卷三五六。

【异名】如圣散。

【组成】蓖麻子七粒(去壳)

【用法】上细研成膏。涂脚心。

【功用】速下胞衣。

【主治】难产，胞衣不下，及死胎。

37722 如圣膏

【方源】《医方类聚》卷一九二引《疮科通玄论》。

【组成】清油半斤 巴豆三钱(去皮) 当归半两 轻粉一钱 黄蜡三两

【用法】上先将清油文武火熬，次下巴豆，当归熬黑焦，又下轻粉、黄蜡熔开，冷定，盒子内盛顿。每用量疮大小搽之。

【主治】风疖，疥癣，或痒或疼，经年不效者，及一切恶疮。

37723 如圣膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】巴豆十六个 蓖麻子四十九个 麝香二钱

【用法】共捣如泥，摊绢帛上。如胎死腹中，贴脐上一时，产下即时揭去；如胞衣不下，贴脚心，胞衣下即洗去。若稍迟肠便出，即以此膏涂顶上即入。

【主治】胎死腹中，胞衣不下。

37724 如圣膏

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【异名】如圣散（《胎产秘书》卷下）。

【组成】蓖麻子二两（去壳） 雄黄二钱

【用法】将二味研成膏，涂产母右足底下，才下即洗去。

【主治】难产及死胎不下，或胎衣不下。

37725 如圣膏

【方源】《疡医大全》卷三十七。

【组成】车脂鞣油不拘多少 磁石

【用法】研如膏，调磁石细末。摊纸上如钱许，贴之，每日换二次。

【主治】针入肉。

37726 如冰散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】朴消五两（别研） 蛤粉 寒水石各三两 香白芷一两 脑子一钱（别研）

【用法】上为细末。每用新汲水调，稀稠得所，鸡翎涂扫，不令药干。

【主治】风邪热毒，壅滞肌肉，荣卫不宣，蕴积成痈肿；血涩肤腠，如丹之状，风随气行，游无定处，邪毒攻冲，焮焮热痛。

37727 如冰散

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】无名异 苦杖 香白芷各等分

【用法】上为细末。用新汲水调，外敷。

【主治】一切肿毒。

37728 如金丸

【方源】《准绳·女科》卷三。

【组成】好川黄连一斤（分上中下三等拣开，以生姜三斤，先刮下皮，以皮存一处，将姜捣汁，分浸黄连一宿）

【用法】先用干壁土研细铺锅底，又铺厚绵纸一层，上放黄连，炒燥，再拌姜汁再炒，如此九次，方与姜皮同为细末，滴水为丸。

【主治】泄泻。

37729 如金散

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】甘草半两（炙） 乌梅半两 罂粟壳三十个（蜜炙） 陈皮一分（一方有枳壳，无乌梅）

【用法】上为散。三岁一钱，水半盏，煎至三分，去滓。

【主治】小儿泻痢频并，不食多渴，脓血相杂，腹中疼痛，里急后重，心燥身热。

【宜忌】忌食鱼腥、油腻、肥甜、肉食。

37730 如金散

《痘疹金镜录》卷四。为《闻人氏痘疹论》“紫背荷叶僵蚕散”之异名。见该条。

37731 如金散

《惠直堂方》卷三。为《外科大成》卷二“如圣散”之异名。见该条。

37732 如圣散

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】香白芷 苓苓香叶 甘草各一两 寒水石三两 草乌头末三钱 石胆 砒霜 铅白霜各一钱 硼砂半钱

【用法】上为细末，密收。每用时先漱净口，用半字轻揩，有涎吐了。

【主治】大人、小儿急慢牙疳，及牙断蚀漏，脓出不止，并骨槽风及牙肿痒闷者。

37733 如胜散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】白矾（生）二钱半（研） 川乌头（去皮）二钱半（瓦上焙） 黄连（去须）二钱

【用法】上为细末，入白面半钱和匀，取生姜、薄荷汁调作糊子。贴太阳穴。

【主治】暴赤眼，昏涩羞明痒痛。

37734 如胜散

《朱氏集验方》卷十。为《圣济总录》卷一五二“如圣散”之异名。见该条。

37735 如胜散

《医方类聚》卷一三三。即《普济方》卷二一五引《经验良方》“如圣散”。见该条。

37736 如胜膏

《袖珍小儿》卷七。为《得效》卷十二“如圣黑膏”之异名。见该条。

37737 如神丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】乌头（去皮脐） 干漆 干姜 桂（去粗皮）各一两（同为末） 硃砂（别研）半两 巴豆半两（去皮心膜，研为霜）

【用法】上为末，取炊枣肉和成块，用湿纸厚裹，盐泥固济，厚一指许，阴三日，晒干，于地坑子内，以炭三斤簇烧，候火销半取出，看硬软为丸，如小豆大。每服三丸至五丸，木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】久积癖气，心胸不和，呕吐痰逆，肋肋胀满疼痛。

37738 如神丸

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】蜗牛二七枚 白矾（末） 马勃（末） 陈白梅肉 大黄（末）各一分

【用法】上于端午日午时同研为丸，如苦楝子大。每遇患开口不得者，取一丸，以水磨，用竹管子吹下，入喉中即愈；轻可只以绵裹含化一丸。

【主治】喉中忽然结塞不通。

37739 如神丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】乌蛇（酒浸，去皮骨，炙） 大黄（湿纸裹，煨） 防风（去叉）各二两 黄耆（锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 刺猬皮（炙黑焦） 陈橘皮（浸，去白，焙） 土茯苓（炒，去角） 秦艽（去苗土）各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三十丸，空心温酒送下，夜卧更服。当日血止痛定。

【主治】肠风，五痔。

【备考】本方方名，《普济方》引作“乌蛇丸”。

37740 如神丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】樗根皮

【用法】上于腊月内日未出时，取背阴地北引者，不以多少，用东流水净洗锉碎，于透风处挂令干，杵研为细末，每称二两入寒食面一两，搅拌令匀，再罗过，新汲水为丸，如梧桐子大，阴干。每服二十丸，先以水湿药丸令润，后于碟子内用白面滚过，水煮五七沸倾出，用煮药水放温送下，不拘时候。如急要使，不待腊月，随时依法采合亦得。

【主治】肠风下血不止，兼治血痢。

【宜忌】服时忌见日色，见即无效。

37741 如神丸

【方源】《百一》卷九。

【组成】光明硫黄 消石各一两

【用法】上为极细末，水为丸，如指头大。每服一丸，空心腊茶嚼下。

【主治】头痛。

【备考】陈州怀医用此药丸如梧桐子大，每服十五丸，中暑者，冰水服；伤冷者，以艾汤送下。

37742 如神丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】天南星（炮） 羌活 白芷 甘草（炙） 京三棱（醋浸，炮，捶） 干姜（炮） 附子（炮，去皮脐） 半夏（汤洗二七遍，姜汁炒令干）各等分

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心生姜盐汤送下。患泻，二宜汤送下三十丸；小儿赤痢，甘草、橘皮汤送下三丸至五丸；白痢，干姜汤送下。

【功用】消癖气，和脾胃，补下元。

【主治】一切冷热气。

37743 如神丸

《普济方》卷四十四。为方出《圣惠》卷四十，名见《普济方》卷四十四“硫黄丸”之异名。见该条。

37744 如神丸

《普济方》卷六十二。即《圣济总录》卷一二二“如圣散”改为丸剂。见该条。

37745 如神丸

《普济方》卷二〇八。即《三因》卷十一“止泻如神丸”。见该条。

37746 如神丸

《证治宝鉴》卷七。即《医方类聚》卷一三三引《经验良方》“如神散”改为丸剂。见该条。

37747 如神丸

【方源】《名家方选》。

【组成】芫花 甘草 大戟各五分 大黄三分

【用法】上为细末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服五分或一钱，空心生姜汤送下。宜随虚实增减，以利水为佳，勿大泄下。

【主治】脚气肿满，气冲心，气急不可忍者。

37748 如神丸

【方源】《名家方选》。

【组成】阿片一钱 黄连 沉香 砂仁 黄柏 甘草三分

【用法】上为末，小麦糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。

【主治】痢疾。

37749 如神丸

《家塾方》。为原书“仲吕丸”之异名。见该条。

37750 如神丸

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】阿片一钱 黄柏 黄连 木香 面粉各五分 沉香 乳香各三分

【用法】上为细末，打米糊为丸，每丸重一分，辰砂为衣。

【主治】妊娠赤白痢疾及泄泻不止。

37751 如神丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】钢铁二十钱 大黄五十钱 荞麦粉五十钱 没药十五钱

【用法】上药糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】积聚留饮，水肿经闭，及青白黑之内翳初起。

37752 如神丹

【方源】《医学正传》卷七。

【组成】巴豆三枚 蓖麻子七枚

【用法】上药各去壳，研，入麝香少许，捏作饼子，贴脐。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：催生。

【主治】难产。

37753 如神汤

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】茛菪根一握（生用，旋采）桑白皮各等分

【用法】上咬咀。水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】喘。

37754 如神汤

【方源】《医方类聚》卷一〇七引《神巧万全方》。

【组成】厚朴二两（去粗皮，生姜汁炙黄）高良姜一两 甘草半两（炙）

【用法】上为散。以新汲水调下二钱；素有冷气者，用温酒调下。

【主治】霍乱吐泻。

37755 如神汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳（大者，去顶蒂瓢净，锉，蜜拌湿，炒干） 当归（去芦） 丁香（不见火） 白术各一两（炒） 乳香半两（别研）

【用法】上咬咀。病轻者每服三钱，水一盏，煎七分，去滓，通口服；甚者每服半两，水一盏半，煎至八分，去滓服。只一二服见效。

【主治】新久泻痢，或赤或白，或水泻。

37756 如神汤

《妇人良方》卷四。为《百一》卷三“三圣散”

之异名。见该条。

37757 如神汤

【方源】方出《妇人良方》卷二十，名见《校注妇人良方》卷二十。

【组成】生料五积散加桃仁。

【功用】逐败血，祛风湿。

【主治】产后腰痛。

【方论选录】《医略六书》：产后败血不化，流注腰间，而风湿袭人经中，故腰部疼痛不止焉。五积散温经调营气，以祛风湿；桃仁泥破瘀润燥结以开痹气也；水煎温服，务使营气调和，则邪自外解，而经脉清肃，何有腰痛之患哉！

【备考】《医略六书》本方用五积散一两，桃仁泥三钱，水煎，去滓温服。

37758 如神汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】金毛狗脊（去毛） 吴茱萸（生用） 山茱萸（生用连核） 木鳖子（去壳）各一两

【用法】上咬咀，分作四剂。每用水五碗，煎数沸，乘热熏后，去滓淋洗。

【主治】一切风寒暑湿痺，诸般脚气。

37759 如神汤

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】半夏子（神曲不拘多少，与半夏同炒黄色，去半夏留神曲） 丁香

【用法】上用水一盞半，煎至八分，其药自然煎成浓汁不妨，通口服。

【主治】痰证呕吐，连日不效。

37760 如神汤

【方源】《医学纲目》卷二十八。

【异名】如神散（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】玄胡索 当归 桂心 杜仲各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。甚者不过数服。

【主治】①《医学纲目》：腰痛。②《仙拈集》：闪挫腹痛，妇人产后腰痛。

37761 如神汤

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】厚朴（姜炒）一钱 半夏（汤泡）六分 枳壳（炒）七分 白芍（酒炒）八分 木香六分 桂心六分 陈皮六分 干姜六分 桔梗八分（去芦） 香附（醋炒）七分 茴香（炒）六分 苍术（米泔浸，晒干，炒）一钱 甘草（炙）五分 人参（去芦）六分 白茯苓六分 川芎劳七分 当归（酒洗）一钱 白芷八分 木瓜六分 桃仁（去皮尖，炒）六分

【用法】上锉。加生姜三片，水二盞，煎至八分，食前热服。

【主治】产后余血不尽，流入腰、脚、腿、膝疼痛。

37762 如神汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】生茅草根一握

【用法】打碎。水二盞，煎至一盞，食后温服。甚者三服止。

【主治】肺热气喘。

37763 如神汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】黄芩 黄连 木通 白芷 丁子香 木香 升麻 茯苓 防风 连翘 大黄 枳壳 沉香 乳香 熏陆香 地黄 土茯苓 白鲜皮各等分 甘草少许

【用法】水煎服。

【主治】一切疮毒侵眼，目生翳膜。

【加减】脓出者，加独活；毛发脱者，加皂角子；牙齿痛者，加木瓜、薏苡仁；舌痛者，加蝉蜕、人参、白僵蚕。

37764 如神饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】常山 草果 甘草 厚朴 陈皮 乌梅一个 生姜三片

【用法】隔夜煎，五更温服。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌鸡、鹅、羊、一切腥燥之物。

37765 如神饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】蒲黄 艾叶 升麻 黄芩 地榆 各八分 归身 柴胡 血见愁 黄连 山梔 各一钱 紫荆皮一钱二分

【用法】加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】血崩，来如涌泉，面黄肌瘦。

37766 如神散

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【组成】香附子 赤芍药各等分

【用法】上为末。盐一捻，水二盏，煎至一盞，去滓，食前温服。

【主治】妇人血崩不止，赤白带下。

37767 如神散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 白术（捶碎，用浆水煮半日，焙干）各一两 干姜（炮） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，空心温米饮调下；如热泻，新水调下。

【主治】洞泄，不拘冷热，注下不止。

37768 如神散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】天南星（炮）一枚 草乌头（炒）一两 矾石（煨）半两

【用法】上为散。先用热汤洗，次以生油调散涂纸上，贴之。

【主治】疮久不愈，时常痛痒，皮缩肉消，黄汁脓血不断。

37769 如神散

《圣济总录》卷一三九。为《博济》卷五“如圣散”之异名。见该条。

37770 如神散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】独头蒜一颗（研） 楼葱一寸（研） 膩粉半钱 凌霄花（末）一钱

【用法】上为末。调涂肋肋上硬处，用醋面饼子贴盖之，候口内闻蒜气，急用温汤洗去。

【主治】小儿乳癖，攻肋肋紧痛。

37771 如神散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】独头干姜 草乌头各等分 香白芷少许。

【用法】上为细末。先令痛者噙水一口，鼻内搐药一字，不移刻便止。

【主治】夹脑风，及一切头痛不可忍。

37772 如神散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】蜈蚣一条（全者，酒炙黄） 蝎十四个（全者，微炒） 辰砂一钱（水飞）

【用法】上为细末。百日儿一字，荆芥汤调下，渐大，以意加之，不拘时候。

【功用】安神魂，定心气。

【主治】虚风慢惊，发搐瘵痲。

37773 如神散

【方源】《三因》卷十。

【组成】苦瓠子（去皮） 苦葫芦子（去皮）各三七个 黄黍米三百粒 安息香二皂子大

【用法】上为末。以一字搐入鼻中，滴出黄水一二升。若过多，则以黍糠烧灰、麝香末各少许，搐鼻，立止。

【主治】酒毒不散，发黄，久久浸渍，流入清气道中。

37774 如神散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】肥赤马肉三斤或五斤

【用法】每一斤肉入硃砂二两同拌和，以器物盛之，于有日处顿放，候作成蛆，令自干，研为细末，每蛆末一两，入粉霜半两，同研匀。如用时先以针拨动牙根四畔空虚，次用灯心蘸药少许，点于牙根下。良久其牙自动落。

【功用】取虫牙。

37775 如神散

【方源】《普济方》卷二四九引《卫生家宝》。

【组成】蛤粉半两（烧过） 甘草半两 干葛一两

【用法】上为末。酒调二钱，沸汤点服。

【主治】小肠气块，从小肠起至心膈间，痛不可忍，及口吐清水。

37776 如神散

《局方》卷七(续添诸局经验秘方)。为《直指》卷二十一“椒盐散”之异名。见该条。

37777 如神散

【方源】《朱氏集验方》卷九引张太医方。

【组成】胆矾(纯绿者，研细如粉)

【用法】上用酸黄醋一呷调咽下，自服不得者灌之。即时吐下稠粘痰涎，便愈。吐不止者，可少以冷水解之。

【主治】咽喉病，深在咽下，针刀不能及者。

37778 如神散

【方源】《医方类聚》卷七十七引《济生续方》。

【异名】缩舌膏(《普济方》卷五十九引《仁存方》)。

【组成】梅花片脑不拘多少

【用法】上为细末。以一字掺于舌上，未知，再掺则愈。

【主治】伤寒热毒攻心，舌出过寸。

37779 如神散

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施圆端效方》。

【组成】白僵蚕(炒) 白矾(生) 藜芦玄参(去皮弦，炒) 雄黄各二钱 乳香一字

【用法】上为细末。每用一字，分两鼻内搐之，口含水，及舌下搽。嚏出涎，立效。

【主治】咽喉一切急患不得开。

37780 如神散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】如圣散(《普济方》卷三〇〇引《德生堂方》)。

【组成】川大黄

【用法】上为末。新汲水调，搽冻破疮上。

【主治】冻疮皮肤破烂，痛不可忍。

37781 如神散

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】真皂角(去皮弦)八两 海亦儿半两(即合孩儿香茶者) 北枣四两

【用法】先将皂角熬成清汁，滤去滓，将枣及海亦儿入瓷器内，用桑柴文武火熬至七分，去海亦儿，再熬干，取枣藏于瓷器内。每服二三个，多则三四个，细嚼咽下，后饮酒一盞。

【主治】风湿手臂痛，左瘫右痪，风气。

【宜忌】不得多吃。

37782 如神散

【方源】《普济方》卷二七七引危氏方。

【组成】陈江茶 箬叶

【用法】以箬叶裹陈江茶烧灰，为细末。用生油、轻粉调敷，若湿者干掺。痛止无痕。

【主治】汤火伤。

【临证举例】烫伤 陈侍制楠，奉道甚谨，冬日澡浴，偶坐凳倒，不敢以手擦地，遂坠身火炉旁有伤，人传此方用之，效。

37783 如神散

【方源】《医方类聚》卷八十九引《必用全书》。

【组成】木通二两 黄芩二两 甘草一两

【用法】上咬咀。每服五钱，水二大盞，煎至一盞，冷服，不拘时候。

【主治】小肠气。

37784 如神散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《经验良方》。

【组成】阿胶(蛤粉炒)二两 梔子 车前子 黄芩 甘草各三钱半

【用法】上为细末。每服半钱，加至一钱，井花水调下，日三服。

【主治】心脏有热，乘于血分，血渗小肠，尿血。

【备考】本方改为九剂，名“如神丸”(见《证治宝鉴》)。《金匱翼》本方用法：合犀角地黄汤用之良。

37785 如神散

【方源】《医方类聚》卷一四三引《经验良

方》。

【组成】香附子 陈皮 神曲 麦蘖 肉豆蔻 苍术 乌药 甘草各半两

【用法】上为细末。每服半钱，煎木瓜饭饮调下。

【功用】调气止泻。

【主治】泄泻，腹痛膨胀。

37786 如神散

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】麻叶（即今人用作布者之麻。五月五日采，阴干。）

【用法】上为细末。每服二钱，空心以冷水半盏调下；若大人病重者，服二钱半。

【主治】白痢。

【宜忌】忌食热物。

37787 如神散

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】白芍药 川当归 吴茱萸 黄连（炒赤色）各等分

【用法】上为末。每服二钱，空心食前米饮调下，每日三次。

【主治】肠胃气虚，冷热不调，下痢赤白，状如鱼脑，里急后重。

37788 如神散

【方源】《袖珍》卷一。

【异名】如圣散（《丹溪心法附余》卷十六）。

【组成】香白芷 川芎 防风（去芦）各五钱 细辛五钱 雄黄二钱半 草乌（去皮脐）四钱 两头尖（去皮脐）四钱 苍术（米泔浸一宿，去皮）一两

【用法】上为极细末。血不止，干贴；破伤风，牙关紧急，用热酒一盞，调服一钱，又贴破处；风牙虫疼，擦之流涎即愈；狗咬蛇伤，煎盐汤洗净干贴，用热酒调半钱服，如重车行五里，并服三服，如重，服一钱；小儿量力减服；多年不效恶疮，煎葱白、盐汤浆水口漱，洗去脓血一二次，拭干贴；一切蜂蝎小虫所伤，唾调于痛处贴之；如妇人产

后，败血上冲下注，热酒调服一钱。

【主治】一切金刃所伤，血不止，牙关紧急。

【宜忌】忌腥、荤、面、油腻等物。

37789 如神散

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】松香末一两 白矾三钱

【用法】上为末。香油调搽；干搽亦可。

【主治】瘰癧已溃，腐肉不去，疮口不合。

37790 如神散

《治痘全书》卷十三。为《百一》卷三“三圣散”之异名。见该条。

37791 如神散

《女科指掌》卷四。为《朱氏集验方》卷十引《胡氏经效方》“催生神效散”之异名。见该条。

37792 如神散

【方源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】何首乌（制）一两 当归三钱 陈皮二钱 煨生姜三钱

【用法】水煎服。

【主治】气血已虚，久疟不止。

【加减】邪未净，加柴胡一钱；力欠者，加人参二钱。

37793 如神散

【方源】《医编》卷七。

【组成】猪苓 泽泻 赤苓 赤芍 青皮 小茴 故纸 川楝 木通 车前 石苇 腹皮 官桂 槟榔 香附 急性子 红花子

【主治】疝气。

37794 如神散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】细辛 白芷 川乌 草乌 川芎 白术 当归各一两 苍术 牛膝 天麻 鳔胶 川山甲 白花蛇（酒浸，微炒）各五钱 朱砂 雄黄各三钱

【用法】上为细末。每服一钱半，夜卧时热黄酒送下。盖暖出微汗，避风寒，三四服即见效，以愈为度。

【主治】半身不遂。

【宜忌】忌发物。

37795 如神散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】粟壳(醋炒)四两 杏仁二两 五味(焙干)一两 枯矾五钱

【用法】上为末。每服二钱，白汤调下。

【主治】诸般咳嗽。

37796 如神散

《仙拈集》卷三。为《圣济总录》卷一五二“如圣散”之异名。见该条。

37797 如神散

【方源】《救急选方》卷下。

【组成】松叶 凤仙花茎叶并子各等分

【用法】上烧存性，为末。每服五七分，温酒送下。

【主治】针及竹木刺入肉，并一切骨鲠。

37798 如神散

《伤科汇纂》卷七。为《医学纲目》卷二十八“如神汤”之异名。见该条。

37799 如神膏

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】蓖麻子(去壳) 杏仁(去皮尖) 印子盐 芎藭 防风(去叉) 松脂各一分 蜡半两 油一升

【用法】先入油于银器中，次将诸药作粗散，入油中，微火上煎成膏，滤去滓，瓷器盛。每用约大小贴之，每日一换。

【主治】鼻塞，不闻香臭。

37800 如神膏

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】斑蝥三十个 埤巴豆三十粒。

【用法】上入脂麻或菜油半 盏许，和盏坐慢火上，入甘草一寸，同熬黑色，滤去三色药，入黄蜡一块，轻粉半两，凝冷成膏。涂疮上。

【主治】湿癣、疥癩、风疮久不愈。

37801 如神膏

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】阿魏 朴消 硫黄 甘草 甘遂各一钱 麝香三分 青皮三钱

【用法】上为末，独蒜一个，葱头七个捣烂，

入前药末捣匀，摊布上。隔布贴患处。

【主治】痞积。

37802 如雪汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】朴消 黑豆皮(生)一两 木香一两 大黄(生)半两

【用法】上药除朴消外，为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下朴消一钱，搅令匀，不拘时候温服。以微利为度。

【主治】膈热咽干，风毒攻心，狂闷。

37803 如智丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】木香末 硫黄各半两 密佗僧一两 附子半两(炮，去皮，为末，醋煮成膏)

【用法】上前三味为细末，以附子膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，茶送下。

【主治】胃弱湿停生虫，心痛而冲聚往来，上下行痛，时休时止，腹中热，燥烦，吐清水，其脉弦而无常，此属虫痛。

37804 如智丸

《普济方》卷二三九。为《圣济总录》卷九十九“香附丸”之异名。见该条。

37805 如智丸

《普济方》卷二五二。为《圣济总录》卷九十九“密佗僧丸”之异名。见该条。

37806 如智散

【方源】《博济》卷一。

【组成】萎蕤 川芎 青皮(去白) 肉桂(去皮) 木鳖子 当归(去须) 羌活 秦艽 柴胡(去苗) 乌梅 黄耆各一两 甘草一两

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，入青蒿头子七枚，同煎至七分，去滓温服。若冬月无青蒿，以生姜、大枣代煎之。

【主治】五心虚烦，夜多盗汗，面色黄瘁，四肢少力，多困饶睡，饮食不进。

【加减】如五心发热，甘草减至半两。

37807 如意丸

【方源】《传家秘宝》。

【组成】硃砂一两五钱(研) 木香一两 陈丁香一两 附子二两 桂二两 草澄茄一两 干姜二两 大黄末二两(别研) 巴豆一两(研) 陈橘皮二两 牵牛子一两 香墨(烧) 青橘皮 蓬莪术 京三棱 筒子漆各二两(炒)

【用法】上为末,用醋熬硃砂、巴豆成膏,和前药末为丸,如绿豆大。每服五丸,温水任下。

【功用】消酒食。

【主治】五积气。

37808 如意丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】草乌头(去皮脐) 五灵脂 茴香于(炒) 青橘皮(去白,焙) 陈橘皮(去白,焙) 木鳖子(去壳) 芸薹子 防风(去叉)各二两(并生用) 巴豆四十九粒(去皮心膜,研出油) 斑蝥八十一个(去头足,炒) 木香一分

【用法】上为末,用宿炊饼末以醋煮糊为丸,如豌豆大。每服一丸,酒送下,不拘时候。

【主治】风毒走注,筋骨疼痛。

37809 如意丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】威灵仙(去苗土) 附子(生,去皮脐)各半两(同为末,用好醋半盏浸一宿) 硃砂(细研)一分 巴豆二十一粒(去皮心膜,出油。二味同研,用酒半升、醋半升同煎,与前二味同熬成膏) 蓬莪术(煨,锉) 木香各半两 青橘皮(汤浸,去白,炒)一两 大黄(锉,炒)三分 陈曲(炒)半两 丁香一分

【用法】上药,将后六味为末,以前四味膏和,更别熬醋少许,研墨汁同为丸,如绿豆大。每服五丸至七丸,生姜汤送下。

【功用】消积化气,温胃思食。

【主治】食后心膈妨闷。

37810 如意丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】硃砂(半皂子大)十二块 巴豆三十六枚(去皮) 大枣十二枚(去核,取六枚,每枚各入巴豆肉三枚,硃砂一块,各用湿纸裹二重,塘火内煨焦,候有烟取出,去纸,于地上以盏子合定一宿,出火毒,其余枣并巴豆、硃砂并生用) 白丁香八十四个(坚实者) 腻粉一钱

【用法】上药,将已去核枣六枚,水煮熟同捣细,纳余药捣膏为丸,如绿豆大。每服五丸,临卧煎生姜汤送下;小儿每服二丸至三丸,煎皂子汤送下。

【功用】导滞气,消癖块。

【主治】虚积。

37811 如意丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】硃砂一两半 木香 拣丁香 草澄茄 牵牛子各一两 附子 桂 干姜 大黄 巴豆 陈皮 香墨 青橘皮 蓬莪术 京三棱 筒子漆各二两

【用法】上为细末。用醋熬硃砂、大黄、巴豆成膏,和前药末为丸,如绿豆大。每服五丸,温水、好茶任下。

【功用】消酒食。

【主治】五积气。

37812 如意丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】枳壳(去瓢) 槟榔 橘红 半夏(汤炮七次) 蓬术 京三棱 干姜(炮) 黄连(去须)各二两 巴豆三七粒(连壳用)

【用法】上除巴豆外,锉如豆大,用好醋合巴豆煮干,去巴豆,余药焙为细末,薄糊为丸,如绿豆大。每服十丸,加至十五丸,食后临卧清茶、姜汤任下。

【主治】中虚积冷,气弱有伤,不能传化,心中坚痞,两胁胀满,心腹疼痛,噎宿腐气;及霍乱吐泻,米谷不消;久痢赤白,脓血相杂,久病黄色羸瘦;及腹中一切食癥之疾。

【宜忌】孕妇不宜服。

37813 如意丸

【方源】《直指》卷五。

【组成】沉香 木香 大丁香 革澄茄 使君子 辣桂 川白姜(炒) 桃仁(炒) 五灵脂(炒) 硃砂(醋浸半日) 雄黄 没药 大戟 牵牛(炒,取末) 巴豆(去油) 各一两 荆三棱 蓬莪术 肉豆蔻(炮) 各半两

【用法】上为末,水煮面糊为丸,如麻子大。每服二丸,加至三丸止,温酒送下。

【主治】积聚块痛,疝瘕癥癖。

37814 如意丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】黑牵牛(头末)八两 官桂三钱 丁香三钱 木香三钱 白豆蔻三钱 缩砂仁三钱 人参三钱 白茯苓一钱 南木香三钱 香附子五钱半(去毛净) 干山药五钱 甘草少许

【功用】消食化气。

【主治】赤白痢,并酒食伤。

37815 如意丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】生地黄 熟地黄各二两 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 川椒(去目,炒) 胡芦巴(酒炒) 补骨脂(炒) 苁蓉(酒浸) 杜仲(炒去丝) 白茯苓 小茴香(炒) 菟丝子(酒浸) 川楝肉 地龙(酒浸,去土) 石菖蒲 枸杞 远志(去心) 各一两 青盐半两(炒) 山梔(去皮)二钱(炒) 川山甲十四片(炙) 甘菊花三钱半

【用法】上为末,用晋枣(煮,去皮核)二两,核桃肉(煮,去皮)二两,各研如泥,余再炼蜜和丸,如梧桐子大。每服七八十丸,白汤温酒任下。

【功用】补损。

37816 如意丸

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】黄连 青皮 川乌 枳壳 巴豆

十粒(去壳油心膜尽) 干姜 蓬莪术 陈皮各一两

【用法】上为细末,煮薄糊为丸,如绿豆大。常服三五丸,食后夜卧茶清送下。妇人血气,艾醋汤送下;酒积,炒姜酒送下;黄肿,淡姜汤送下;脏腑不快,茶清送下;冷食伤,生姜汤送下;小肠气,炒茴香酒送下;小儿疳,饭汤送下一二丸。

【功用】消积化气。

【主治】妇人血气,酒积,黄肿,脏腑不快,冷食伤,小肠气,小儿疳。

【宜忌】孕妇忌服。

37817 如意丸

【方源】《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【异名】如意丹。

【组成】茅苍术五两 飞雄黄六两 麝香五钱 蟾酥一两六钱 大黄十两 天麻六两 飞朱砂六两 甘草四两 公丁香一两 麻黄六两

【用法】除蟾酥、麝香、朱砂外,取上药进行干燥,混合碾细,将蟾酥用酒化开,用液送成小丸,再以飞朱砂、麝香为衣,每钱不得少于六十粒。每服二十粒至六十粒,温开水送下。对不能服药的急症病,亦可研成细末,吹入鼻内。

【主治】寒热头痛,闷乱呕吐,内热无汗,烦躁便秘。

【宜忌】孕妇慎用。

37818 如意丸

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】天麻 钩藤 僵蚕各二两 蝉衣一两 麻黄五钱 细辛三钱 桂枝一两 琥珀一两五钱 沙参一两 薄荷六钱 槟榔一两 胡黄连 雄黄(飞)各五钱 川贝母 枳壳 胆南星各一两五钱 广木香 沉香各一两 全蝎三钱 法夏 杏仁各一两五钱 白附子八钱 防风 天竺黄各一两五钱 使君子一两 蟾酥五钱 牵牛子一两 熟大黄二两 冰片一钱六分 西牛黄 芥子各五钱

广陈皮一两五钱 麝香一钱六分 云黄连五钱 朱砂(水飞)十两五钱

【用法】上为极细末,水泛为丸,如芥子大,朱砂为衣。四个月内小儿,每服二粒至五粒;五个月至一岁,每服五粒至七粒;一岁至二岁服十粒;三岁至五岁,每服十五粒;五岁至十岁,每服二十粒,根据病情轻重,每日服一次或三次,温开水化服。幼儿服此药时,宜先检视口腔,如牙龈上发现粟粒形水泡,即以软绸开水洗净,去其恶血,然后服此丸药。

【主治】小儿夜啼,发热惊恐,痰喘气促,及急惊风,手足搐搦,角弓反张。

【宜忌】体弱儿童忌服。

37819 如意丹

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】硫黄 赤茯苓 陈皮 猪苓 白术 泽泻各一两(一方有桂一两)

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大,每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】脾湿肿满,小便不利。

37820 如意丹

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】川乌八钱 槟榔 人参 柴胡 吴茱萸 川椒 白姜 白茯苓 黄连 紫菀 厚朴 肉桂 当归 桔梗 皂角 石菖蒲各五钱 巴豆二钱半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服三丸,或五丸、七丸,温疫及一切鬼祟,伏尸,传瘧,癫狂失心,山岚瘴气,枣汤或白汤送下;风疫及宿患大风,身体顽麻,不知痛痒,眼泪不下,睡卧不安,面如虫行,日久须眉痒脱,唇烂齿焦,偏头痛、紫癜、疮癬、左瘫右痪、鹤膝风疼,一切风疾,荆芥煎汤送下;寒疝及小肠气痛,小茴煎汤,或吴茱萸煎汤送下;暑疫及五淋,灯心煎汤送下;热甚,大黄煎汤送下;燥疫,生地或麻子仁煎汤送下,或冷水送下;湿疫及水肿,车前子或木通煎汤送下;十种水气,甘遂、大戟煎汤送下;癰疽,甘遂煎汤送下;膀

胱疝气肿疼,萝卜煎汤送下;五般痔,白矾汤送下;五痢,乳香汤送下;肾脏积,咬齿唾涎,腰疼,盐汤送下;五疳,桃枝煎汤送下;失心中邪,柳枝桃枝汤送下;阴阳二毒,伤风咳嗽,薄荷煎汤送下;五疳八痢,肠风脏毒,陈米煎汤送下;诸般咳嗽,姜汤送下;小儿十二惊风,薄荷煎汤送下;丹瘤,癰疽、瘰癧、疮痍、涎喘、消渴、大小肠闭,或泄或利,酒毒便红,喉痹、重腮,误吞铜铁,金石、药毒,不服水土,温汤送下;痢疾红甚,黄连煎汤送下;妇人血海久冷,带下赤白,难为生育,及诸般血气,艾汤送下。

【主治】温疫及一切鬼祟,伏尸,传瘧,癫狂失心,山岚瘴气;风疫及宿患大风,身体顽麻,不知痛痒,眼泪不下,睡卧不安,面如虫行,日久须眉痒脱,唇烂齿焦;偏头痛,紫癜疮癬、左瘫右痪,鹤膝风疼,一切风疾;寒疫及小肠气痛;暑疫及五淋;热甚,燥疫、湿疫及水肿,十种水气;癰疽、膀胱疝气肿疼;五般痔,五痢,肾脏积,咬齿唾涎,腰疼;五疳;失心中邪;阴阳二毒,伤风咳嗽;五疳八痢,肠风脏毒;诸般咳嗽,小儿十二惊风;丹瘤、癰疽、瘰癧、疮痍、涎喘、消渴、大小肠闭,或泄或利,酒毒便红,喉痹,重腮,误吞铜铁,金石、药毒,不服水土;痢疾;妇人血海久冷,带下赤白,难为生育,及诸般血气。

37821 如意丹

【方源】《本草纲目》卷三十四引《顾真堂经验方》。

【组成】母丁香三十六粒 滴乳香三钱六分

【用法】上为末,同活兔胆和杵千下,丸作三十六丸。每服一丸,好酒化下。

【主治】妇人产难。

37822 如意丹

【方源】《玉案》卷四。

【组成】青礞石(煨) 硼砂 款冬花 薄荷叶各四两 黄芩(酒炒) 玄明粉 桔梗

各六钱 大黄(酒蒸九次)五钱

【用法】上为末,乌梅肉捣烂为丸。每服二钱,白滚汤送下。

【主治】嗽久不愈,诸火上升,口苦面赤,顽痰壅塞,气逆口疳。

37823 如意丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】苍术(米泔浸一宿,晒)十二两 厚朴(姜汁炒)十二两 甘草(去皮)八两 木通(去皮)八两 莪术(醋炒)六两 陈皮十二两 三棱(去毛)六两 枳壳(去瓢)十两

【用法】上为细末,将三年陈晚米一斗,巴豆四百九十粒同炒至黄色,拣去巴豆,碾米为末,同前药水泛为丸,如梧桐子大。小儿一岁服一分,至十五岁服二钱五分,十六岁以上服三钱,不能服丸者,可研化服。肚腹痛,枳壳汤送下;食伤气滞腹痛,砂仁汤送下;隔食风寒,胸膈饱满,头痛发热,生姜葱头汤送下;心腹时常作痛,或大便不实,噎气吞酸作胀,水泻及白痢,生姜汤送下;红痢,甘草汤送下;红白痢,甘草生姜汤送下;痞积气块作痛,生姜汤送下;停食,槟榔汤送下;逆气上升噎满,生姜汤送下;气塞痛,陈皮汤送下;其余诸病,俱滚汤送下。

【主治】伤食气滞腹痛,隔食风寒,胸膈饱满,头痛发热,大便不实,或水泻,痢疾,噎气吞酸噎满,痞积气块作痛等证。

【宜忌】孕妇忌用。

37824 如意丹

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】川五倍(焙燥)二两 明雄精 炙山甲各四钱 蜈蚣(焙) 全蝎(焙)各七只 蝉蜕(焙)十四只 真云麝 上梅冰各三分

【用法】上为极细末,和匀再研,以瓷瓶收贮,勿令出气。临用时先将腐脓用柔纸拭净,以破散羊毫笔蘸丹搽患处,金花散盖面,云台膏贴之,每日早、晚各换一次。

【功用】解毒排脓,去腐生肌。

【主治】痈疽大毒恶疮,并刀石破伤溃烂。

【宜忌】忌食发气、煎炒、酒糟等物。

37825 如意丹

《北京市中药成方选集》。为《中国医学大辞典》“灵宝如意丹”之异名。见该条。

37826 如意丹

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为原书同页“如意丸”之异名。见该条。

37827 如意汤

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】荆芥穗 防风 薄荷叶 白芷 黄柏 黄连 地骨皮 贯众各等分。

【用法】上为粗末。水煎,温漱;外洗金疮。

【主治】骨槽风,走马牙疳,及金疮。

37828 如意汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】防风 紫苏 当归 枳壳 桃仁 各一钱五分 广木香 荆芥 玄明粉 山楂 各一钱

【用法】加葱白五根,水煎服。

【主治】风闭结。

37829 如意饮

【方源】《一草亭》。

【组成】人参一钱五分 黄耆一钱五分 麦冬(去心)一钱 贝母一钱 归身八分 陈皮五分 川芎五分 黄芩四分 家菊五分 麦芽四分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】脾土虚弱,两目昏昧,咳嗽头痛。

【临证举例】头痛 一妇人,年四十余,两目昏昧,咳嗽头痛。诊脉皆细弱,脾部尤近弦弱,此脾虚五脏精气皆失所司,不能归明于目矣;邪逢其身之虚,随眼丝入于脑,则脑鸣而痛,心火妄行,侮其所胜,故咳嗽也。上药煎服二剂,前症悉除。

37830 如意油

【方源】《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【组成】防己六两 荆芥八两 香附四两 细辛十两 苦杏仁四两 沉香四两 藿香四两 桂枝十两 乳香六两 甘草八两 木香四两 丁香八两 大黄二两 血竭八两

冰片十两 棉油二斤半 樟脑油十斤 薄荷油六斤 檀香油一斤半 丁香油一斤

【用法】先取棉油、樟脑油，合群药浸一星期后，再用蒸汽加温至七十度，经十八小时，冷后过滤去滓，再加薄荷油、檀香油、丁香油混合摇匀，成油十七斤十三两。外用搽涂患处，少量可以内服。

【主治】风湿头痛，关节痛，以及腹痛。

37831 如意酒

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】新鲜大如意草一两

【用法】捣烂，滚酒冲入，少倾挤汁，温服，滓敷肿上，缚住。三服愈。如无新鲜者，取叶阴干为末，作丸服亦可。

【功用】解毒，消肿，止痛。

【主治】一切痈疽疮毒。

37832 如意散

《洪氏集验方》卷五。为《元和纪用经》“神效八味散”之异名。见该条。

37833 如意散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】吴茱萸 牛蒡子 荆芥各一分 牡蛎半两 轻粉半钱 信砒二钱

【用法】上为细末。每用一钱，临卧油调，遍身搓摩上一半，如后有痒不止，更用少许涂之股髀之间，闻香悉愈。

【主治】疥癣无时痛痒，愈发有时，不问久新。

37834 如意散

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】百合 黄耆（蜜炙） 当归（去芦） 茯神（去木） 人参（去芦） 五味子 甘草（炙） 柏子仁 白茯苓（去皮）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，乌梅一枚，煎至七分，不拘时候服。

【主治】忧思过度，心血不足，倦乏瘦悴，或夜发寒热。

37835 如意散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】干漆（生） 黑狗脊（生） 轻粉（研） 僧黄耆（生，研）各一两

【用法】上为细末。每用药前，先微搔破，以生油调药如稀糊，搽患处，一日二三次。

【主治】疥疮时发痒痛。

37836 如意散

《准绳·女科》卷四。为《妇人良方》卷十七“催生如意散”之异名。见该条。

37837 如意散

【方源】《种痘新书》卷九。

【异名】如意膏（《梅氏验方新编》卷五）。

【组成】生南星八钱 生半夏一两 郁金五钱 生大黄一两 姜黄五钱 白芷五钱 苍术五钱

【用法】上为末。先刺去恶血，然后用醋调敷患处四围，留口莫敷，令出毒气。将四围之毒赶聚一团，再用膏药贴之，拔尽脓汁而自愈矣。内服调元固本，排脓解毒之剂。

【主治】痘后余毒，痘疔肿硬。

37838 如意散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】如意草（又名箭头草，阴干。若急用，瓦上焙干，微炒）

【用法】上为末。鸡子清调，涂患处。

【主治】痈疽发背，瘰癧，疔疮，黄白火泡，痒痂皮烂。

37839 如意散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】生军八两 陈皮二两 南星二两 芙蓉叶四两 白芷二两 花粉四两 白及二两 姜黄四两 五倍八两 毛茛二两 甘草一两 血竭二两 小朴四两 枯小粉一斤

【用法】晒脆为末。鸡蛋清、醋皆可调敷。

【主治】一切痈疽红白相兼之症。

37840 如意散

【方源】《外科方外奇方》卷一。

【组成】生南星 生大黄 生半夏 朴消

【用法】上为末。姜汁调敷。

【主治】痰毒。

37841 如意膏

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】蓖麻子三七粒(去壳,研如膏) 丹砂半钱(研细)

【用法】上为末。用油单一片,方圆如盏口大,将药摊之,当脐下少腹间贴之,外以带帛系令固,候产罢,并胞衣下毕速去之,稍缓即脱人气血,此药觉腹痛便宜用之。

【功用】催生。

【主治】产难。

37842 如意膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】半夏(炮裂) 南星(炮裂)各一两半

【用法】上为末,以生姜汁和匀,捻作小饼如钱样,用慢火炙干;再为末,复取姜汁如前,经二次炙干,仍焙为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸至二丸,用姜蜜汤化服,不拘时候;有热者,以薄荷汤化服。

【主治】①《活幼心书》:小儿痰喘气促,咳嗽连声不已,冷热二证皆可用。②《幼科折衷》:小儿龟胸,风痰停饮,积聚心胸,唇红面赤,咳嗽喘促,致胸高如覆掌。

【备考】本方方名,据剂型当作“如意丸”。

37843 如意膏

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】半夏 赤茯苓 枳壳 朴消

【用法】用消风化,以生姜打糊为丸,如绿豆大。淡姜汤送下。

【功用】祛风化痰。

【主治】小儿胸膈,风痰潮紧,气促而喘。

37844 如意膏

《梅氏验方新编》卷五。为《种痘新书》卷九“如意散”之异名。见该条。

37845 如圣饮子

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参(去芦头)一两 款冬花一两 罂粟壳(去瓤)二两(炙) 乌梅一两(捶碎)

【用法】上咬咀。每服五钱,用水二盏,煎

至一盏,去滓,食后临卧热服。

【主治】肺气虚寒,咳嗽喘急。

37846 如圣饮子

《癰论萃英》。为《普济方》卷六十引《旅舍》“如圣汤”之异名。见该条。

37847 如圣金錠

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】硫黄 川芎 腊茶 薄荷 川乌 消石 生地各等分

【用法】上为末,生葱汁和成錠子。每服一錠,先以凉水灌漱,次嚼薄荷五七叶,却用药同嚼烂,以井花水咽下,甚者连进二服,并含之。

【主治】咽喉急闭,腮颌肿痛,乳蛾结喉,木舌重舌。

37848 如圣饼子

【方源】《局方》卷三(绍兴续添方)。

【组成】防风 天麻 半夏(生)各半两 天南星(洗) 干姜 川乌(去皮尖)各一两 川芎 甘草(炙)各二两

【用法】上为细末,汤浸蒸饼为丸,如鸡头子大,捻作饼子晒干。每服五饼,同荆芥三五穗细嚼,茶、酒任下,熟水亦得,不拘时候。

【功用】清头目,消风化痰,暖胃。

【主治】男子妇人气厥,上盛下虚,痰饮风寒伏留阳经,偏正头疼,痛连脑颠,吐逆恶心,目瞑耳聋。

37849 如圣饼子

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】沉香二钱半 安息香 木香各一钱半(不见火) 丁香(不见火) 藿香叶(去土) 乳香各三钱(别研) 半夏(汤泡七次) 桂心(去粗皮)各二两

【用法】上用天南星一两半,炮紫色为末,半两用生姜自然汁煮糊,别用硫黄三钱(研细)、水银二钱,同前药用南星糊为剂,分作四十九饼。每服半饼,用生姜汁化开,空心白汤送下。

【主治】膈气反胃。

37850 如圣饼子

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】苍术(泔浸)四两 川芎 白芷各二两 草乌一两(姜汁炒)

【用法】上为细末，酒糊为饼，如小围棋子大。每服七饼，用细茶一撮，嚼烂，早晨茶清送下。服后一日不可见风。

【主治】头痛、头风因寒者。

37851 如圣饼子

《普济方》卷四十六。为原书同卷“天麻饼”之异名。见该条。

37852 如圣饼子

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】雄黄(研)半钱 人言半钱 乳香一钱(研)

【用法】用糯米粥为锭子，如小麦大。疮有眼，如钱眼大，贴在疮口上，未破者灸三五壮，将饼放在灸处，再用白及为膏贴之。至一日余，球子自然下，将饼子依前贴。

【主治】疔子。

37853 如圣黑膏

【方源】《得效》卷十二。

【异名】如胜膏(《袖珍小儿》卷七)。

【组成】豆豉半升 龙胆草 茺莢各一分

【用法】上用湿纸裹，盐泥固济，火煨存性，研为末，以生清油半斤，熬取四两，下药急搅匀得所，瓷盒收贮。外敷。凡人耳轮疮极痒，临睡时敷一遍；治白秃，剃头后外敷。

【主治】头疮久不愈，耳轮疮及白秃。

37854 如圣煎丸

【方源】《圣济总录》卷七(人卫本)。

【异名】金铁如圣煎丸(《普济方》卷九十三)。

【组成】麻黄(去根节，锉)四两 桑根白皮半斤(锉) 桃心 柳心各四两(锉) 黑豆二升 童子小便三升 河水十五升(井水亦得，以上七味，同入银石器内熬三分至一分，去滓，别入后药) 天南星(生用)二两 天雄(去皮脐，生用)二两 干蝎(去

土，炒) 二两半 天麻二两 天蓼花一两 麝香三分 膩粉一钱 乳香半斤 木鳖子(去壳)一两(以上九味，捣研为末，以生地黄汁入在前药水中，再用文火同熬成膏，以不津器密收) 丹砂一两 云母末一两半 金箔 银箔各十片

【用法】上药将后四味研如粉，用瓷盒盛之，用益母草固济，于地坑子内，用炭五斤，煨令通赤，用湿土盖，候冷取出，如粉红色为度。服时先取清酒三升，膏子一两，煨过丹砂(研)半两，同入银石器中，熬酒至一升，分作五服，先日午温服一服，日晚一服，更后一服。如入行二十里后，取下恶物为候，随病人虚实加减用之，虚者少与，实者稍多。服药后，如汗出不止，煎麻黄根节汤令服，且于密室中将理二十日则安。

【主治】瘫痪风疾。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“金映如圣煎丸”。据剂型当作“如圣煎”。

37855 如神饼子

【方源】《百一》卷九。

【组成】乌鱼骨(去皮，细研) 木贼(去节，为末) 朱砂(水飞)各一钱 南鹏砂四皂子大(细研)

【用法】上同研三千遍，汤溶蜡少许，以柳枝子搅四十九遍，入脑子少许，更多尤妙，于五月五日合丸作饼子。每用一饼子，临卧安于眦内，来早以净水于盏内洗，临卧再用一饼子，可使三次。

【主治】目生翳膜。

37856 如意仙丹

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】真鸦片四钱 沉香 朱砂 本香各二钱 京牛黄二分 麝香一分

【用法】上为细末，用头生人乳合作八十丸，重裹金箔为衣。每服一丸，用梨一个捣烂，白布包绞自然汁，先将丸药用净布包，打碎，再用梨汁研，化服，其痛立止，如久痢不止，西瓜水送下。

【主治】九种心痛，疝气牵引，遍身作痛，大渴饮水，随饮随吐，饮食不进，昼夜不睡，噎膈反胃，久痢不止。

37857 如意金丹

《玉机微义》卷十五引郭氏。为原书同卷“万灵夺命丹”之异名。见该条。

37858 如圣千金散

【方源】《普济方》卷三〇三引《卫生家宝》

【组成】海金沙 生郁金 滑石各半两

【用法】上为末。每服二钱，用砂糖块，新汲水调下，不拘时候。

【主治】金疮出血，痛不可忍。

37859 如圣无比散

《妇人良方》卷一。为《圣惠》卷七十三“绿寒散”之异名。见该条。

37860 如圣针头丸

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】木香 巴豆 淡豆豉各等分

【用法】上和匀，为丸如萝卜子大。每服一丸，白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草浸水送下；赤白痢，用干姜甘草汤送下。

【主治】痢疾。

37861 如圣围毒膏

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】三梅片一钱 川黄柏一钱 生蒲黄一钱 生人中白一钱 生甘草五分 元明粉五分 西月石五分 川黄连一钱五分 薄荷叶一钱五分 净青黛五分 枯白矾四分

【用法】上为细末。以蜜水调如膏，围敷患处，令其渐消，加上玉枢活血更妙；丹毒，以靛青水调敷。

【主治】喉外红肿焮痛，风毒发颐炸腮，温毒疫炎诸毒，兼治丹毒。

37862 如圣青金丸

【方源】《博济》卷四。

【异名】青金丸（《圣济总录》卷一七〇）、青金丹、睡惊丸（《普济方》卷三七三引《全婴方》）。

【组成】龙脑一钱 麝香一分 香墨一钱

半 膩粉一钱 白面三钱 使君子二个（以白面裹，慢火煨令熟） 金箔 银箔各十片（如无，少用） 青黛二钱

【用法】上为细末，滴井水为丸，如鸡头子大。慢惊风，每服一丸，薄荷水化下。服讫，须臾便睡，睡立愈，后更服二三服。如些须小惊者，及急惊，只服半丸以下；慢惊，取下清涎为效。

【功用】定搐搦，疗疳病，坠痰涎，镇心神。

【主治】小儿体热，忽发吐逆，夜惊啼，荏苒不解，或秘或泄，变成慢惊，或为疳疾。

【备考】本方方名，《幼幼新书》引作“如圣青金丹”。《圣济总录》有芦荟，治慢惊，三岁以上服一丸，以下服半丸。《普济方》本方用法：若吐泻成惊者，先与神宝丹一二服，次用此药，涎下后再与神宝丹；若只吐不泻，便服此药，涎下后再与神宝丹少许。

37863 如圣青金丹

《幼幼新书》卷九。即《博济》卷四“如圣青金丸”。见该条。

37864 如圣青金丹

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】青黛半两 瓜蒂一分 朱砂一分（水飞） 轻粉一分 蝉壳（去土）三个 雄黄一分（水飞） 芦荟一分 胡黄连一分 熊胆一分（化开） 麝香少许

【用法】上为细末，用猪胆汁为丸，如梧桐子大，瓷盒贮之。诸般惊痫风疾，搐搦上视，温水化一丸，滴鼻中取嚏，更用薄荷水化下一丸；久患泄泻，腹胀肚大，脚细诸疳，米饮化下；疳虫蛔咬，苦楝子汤送下；疳蚀口疮鼻烂，乳汁研涂；疳眼雀目，白羊子肝一片，竹刀劈开，研药作末，掺在肝片内，麻缠，米泔煮熟，空心服。

【主治】小儿一切风痫搐搦，及寒热腹痛，诸虫五疳八利，肚大脚细，泄泻无时，天吊胎惊，暗风痫病，热疳口疮。

【宜忌】乳母常忌鱼、大蒜、鸡、鸭、猪肉。

37865 如圣金刀散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】金刀散(年氏《集验良方》卷一)。

【组成】松香末七两 枯矾 生矾各一两五钱

【用法】上为极细末，罐密收贮。掺伤处，纸盖绢扎；血止三四日后，必焮痛作脓，换掺生肌散，三日三次，其疼即止；以后日用葱汤洗之，换搽玉红膏长肉生肌。避风为要。

【功用】①年氏《集验良方》：脱腐生新，收敛。②《伤科补要》：止血燥湿。

【主治】①《外科正宗》：刀刃所伤，皮破筋断，飞血不止。②年氏《集验良方》：痈疽发背，诸般溃烂，棒毒金疮。

37866 如圣柘黄丸

【方源】《外科发挥》卷四。

【组成】柘黄一两(为末) 百齿霜(即梳垢)三钱

【用法】面糊为丸，如梧桐子大。每服三五丸，米饮送下。

【主治】肺痈，咳而腥臭，或唾脓痰，不问脓成与否，并效。

【备考】柘黄，乃柘树所生者，其色黄，状如灵芝，江南最多，北方鲜有。

37867 如圣胜金锭

【方源】《局方》卷七(宝庆新增方)。

【组成】硫黄(细研) 川芎 腊茶 薄荷(去枝梗) 川乌(炮) 消石(研) 生地黄各二两

【用法】上为细末，绞生葱自然汁搜和为锭。每服先用新汲水灌漱吐出，次嚼生薄荷五七叶微烂，用药一锭同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进三服即愈；重舌腮肿，先服一锭，次以一锭安患处，其病随药便消；治冒暑伏热，不省人事，用生薄荷水调研一锭，灌下即苏；如行路常含一锭，即无伏热之患；口舌生疮，不能合口及食热物，如上法服讫，用水灌漱，嚼薄荷十叶，如泥吐出，再水灌漱，嚼药一锭含口内聚涎裹之，觉涎满方吐出，如

此服三锭，便能食酒醋；遇食咸、酸、酢脯、炙煖，喉中生泡，须掐破吐血，方与薄荷数叶，以一锭同嚼，井水吞下；砂淋、热淋，小便出血，同车前草七叶、生姜小块研烂，水调去滓，嚼药一锭，以水送下。此药常常随身备急。小儿只服半锭。

【功用】分阴阳，去风热，化血为涎，化涎为水。

【主治】急喉闭，缠喉风，飞疡，单双乳蛾，结喉，重舌木舌，腮颌肿痛，不能吞水粥。及冒暑伏热，不省人事，砂淋、热淋，小便出血。

【备考】本方方名，《玉机微义》引作“如圣胜金锭子”。

37868 如圣胜金锭

【方源】《局方》卷七(续添诸局经验秘方)。

【组成】朴消四两 川芎一两 硫黄(细研)一两半 贯众二两 薄荷叶 荆芥穗 嫩茶各半两

【用法】上件为末。绞生葱自然汁搜和为锭。每服先用新汲水，灌漱吐出，次嚼生薄荷五七叶微烂，用药一锭，同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进三服即愈；重舌腮肿，先服一锭，次以一锭安患处，其病随药便消；治冒暑伏热，不省人事，用生薄荷水调研一锭，灌下即苏；如行路常含一锭，即无伏热之患；口舌生疮，不能合口并食热物，如上法服讫，用水灌漱，嚼薄荷十叶，如泥吐出，再水灌漱，嚼药一锭，含口内聚涎裹之，觉涎满方吐出，如此服三锭，便能食酒醋；遇食咸酸酢脯、炙煖，喉中生泡，须掐破吐血，方与薄荷数叶，以一锭同嚼，井水吞下；砂淋、热淋，小便出血，同车前草七叶、生姜小块研烂，水调去滓，嚼药一锭，以水送下。此药常常随身备急。小儿只服半锭。

【功用】分阴阳，去风热，化血为涎，化涎为水。

【主治】急喉闭，缠喉风，单双乳蛾，结喉，

重舌木舌，腮颌肿痛，不能吞水粥。及冒暑伏热，不省人事，砂淋、热淋，小便出血。

37869 如圣消惊丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《王氏手集》。

【组成】羚羊角屑 犀角末 麝香各一分 牛胆囊天南星四两 天麻 人参 白茯苓各一两 白僵蚕（炒） 全蝎各半两 朱砂一两三钱半 龙脑一钱 （一方加牛黄一分）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，一两作八十丸。每服一丸，麝香汤化下。儿小涂乳上，令吮之。

【功用】消磨一切惊痛。

【主治】新生儿在胎中之时，其母宿挟惊、忧、喜、怒，举动惊胎，致儿生后常惊悸，眠睡不稳，精神恍惚，摇头上视，温壮多睡，反折啼叫，口眼相引。

37870 如圣黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（锉） 乌梅（去核） 知母（焙） 甘草（炙，锉） 款冬花 秦艽（去苗土） 贝母（去心，炒） 半夏（汤洗七遍，焙）各一两 糯米 桑根白皮（锉）各一分 桃仁（去皮尖，麸炒） 鳖甲（去裙襕，醋炙黄）各半两 人参一两半 柴胡（去苗）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜三片，桃枝、柳枝、葱白、薤白各少许，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，心肺俱伤，咳唾脓血。

37871 如圣救苦散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效》。

【组成】金银花二两 香附子二两（去须） 御米壳二两（去蒂隔） 甘草二两 黑豆黄一两

【用法】上药并生，为细末。每服五七钱，水半碗，煎三五沸，微温服之。

【功用】托里，解诸痛。

【主治】一切恶疮，及赤白泻痢，咳嗽脓血。

【加减】恶疮，量虚实老幼加减，入大黄少许。

37872 如圣救苦散

《杂病治例》。为《普济方》卷九十三引《瑞竹堂方》“如神救苦散”之异名。见该条。

37873 如圣紫草汤

《普济方》卷四〇三。为《卫生总微》卷八“紫草如圣汤”之异名。见该条。

37874 如圣黑丸子

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】白及 当归各四钱 白蔹一两六钱 南星（焙）三钱 百草霜 芍药各一两 牛膝（焙）六钱 川乌（炮）二钱 赤小豆一两六钱 骨碎补（焙）八钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤或酒送下；风疾更煨葱一茎，温酒送下。

【主治】风寒袭于经络，肿痛或不痛；或打扑跌坠，筋骨疼痛，瘀血不散，遂成肿毒；及风湿四肢疼痛，或手足缓弱，行步不前；并妇人血风劳损。

【宜忌】孕妇勿用。

37875 如金解毒汤

《医钞类编》卷六。为《痈疽神秘验方》“如金解毒散”之异名。见该条。

37876 如金解毒散

【方源】《痈疽神秘验方》。

【异名】如金解毒汤（《医钞类编》卷六）。

【组成】桔梗一钱 甘草一钱半 黄连（炒） 黄芩（炒） 黄柏（炒） 山梔（炒）各七分

【用法】水二钟，煎至八分，作十余次呷之，不可急服。

【功用】降火解毒。

【主治】肺痈。发热烦渴，脉洪大。

37877 如神千金方

【方源】《外科发挥》卷七。

【组成】好信石（色黄明者）三钱（打如豆

大) 明白矾一两(为末) 好黄丹(水飞, 炒变色) 五钱 蝎梢七个(净洗, 瓦上焙干, 研末) 草乌(紧实光滑者, 去皮, 生研末) 一钱

【用法】上将紫泥灌以炭火煨红, 放冷拭净; 先下明矾烧令沸, 次下信石, 入矾内拌匀, 文武火煨, 候沸, 再搅匀; 次看罐通红, 烟起为度, 将罐掇下, 待冷取, 研末, 方入草乌、黄丹、蝎梢三味, 再同研极细, 入瓷罐内收贮。如欲敷药, 先煎甘草汤, 或葱椒煎汤, 洗净患处, 然后用生麻油调前药, 以鹅毛扫药痔上, 每日敷药三次。之后, 必去黄水如胶汁, 而痔头渐消, 痔病年远者, 不出十日可取尽, 日近者, 俱化为黄水, 连根去净, 更搽生好肉药。

【主治】痔漏。

【备考】本方方名, 《外科十三方考》引作“枯痔散”。

37878 如神开骨膏

【方源】《妇人良方》卷十七引《经验方》。

【组成】乳香不以多少。

【用法】上为极细末。滴水为丸, 如鸡头子大。每服一丸, 无灰酒吞下。

【功用】催生。

【备考】本方方名, 据剂型, 当作“如神开骨丸”。

37879 如神开骨膏

【方源】《妇人良方》卷十七引《海上方》。

【组成】乳香 朱砂各等分

【用法】上为末。麝香酒调下。

【功用】催生。

【备考】本方方名, 据剂型, 当作“如神开骨散”。

37880 如神木香丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】木香 硫砂(滴淋控干) 蓬术(炮) 胡椒 半夏(浆水煮) 干漆(炒大烟尽) 各半两 缩砂仁 桂心 青皮各三两 附子(炮, 去皮脐) 三棱(醋煮一宿) 各

一两 白姜(炮) 一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三五十丸, 空心生姜橘皮汤送下。

【主治】谷气结聚癥瘕, 胸胁闷痛, 或吐酸水, 食后噎作生熟气, 腹胀泄泻及四肢浮肿。

37881 如神木香丸

【得效】卷四。为《局方》卷三(新添诸局经验秘方)“卢氏异方感应丸”之异名。见该条。

37882 如神止泻丸

【局方】卷六(续添诸局经验秘方)。为《三因》卷十一“止泻如神丸”之异名。见该条。

37883 如神化毒汤

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】官桂 白芍 甘草各一钱 青皮 木香 枳壳各七分 山楂 连翘各五分

【主治】痘疮腰腹痛。

37884 如神白虎汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】石膏 知母 甘草 人参 山梔 麦门冬 五味子

【用法】水二钟, 加大枣一枚, 生姜一片, 淡竹叶十片, 水煎, 热服。

【主治】①《伤寒六书》: 伤寒身热, 渴而有汗不解, 或经汗过而渴不解, 脉来微洪。②《简明医彙》: 中喝。

【宜忌】无渴不可服。

【加减】心烦者, 加竹茹一团; 大渴心烦, 背恶寒者, 去山梔, 加天花粉。

37885 如神白虎汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】石膏 知母 甘草 糯米 人参 麦门冬 五味子 山梔 天花粉

【用法】入生姜一片, 水煎, 临服入乌梅汁一匙。

【主治】身热, 渴而有汗不解, 或经汗过, 渴不解者, 脉来微洪。

【加减】心烦, 加竹茹; 湿温证, 热不退而大便溏者, 加苍术。

【宜忌】无渴不可服。

37886 如神宁嗽膏

《寿世保元》卷四。为《古今医鉴》卷七“宁嗽膏”之异名。见该条。

37887 如神托里散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】苍耳根 兔耳草根（又名枝箭）金银藤（用花亦可） 五味子根各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，用生白酒二盏，煎至七分，去滓服。卧盖取微汗，滓再煎。

【功用】发散伤寒。

【主治】发背等疮初起，又治疗疮并一切肿毒及伤寒。

37888 如神定喘汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】黄芩 川连 梔子仁 桔梗 花粉 赤苓 贝母 牛蒡子 瓜蒌仁 杏仁 麦冬 生石膏

【用法】水煎，冲竹沥一杯服。

【主治】麻疹已出，热实气喘，大便坚结，小便赤涩，热重不退。

37889 如神救苦散

【方源】《普济方》卷九十三引《瑞竹堂方》。

【异名】如圣救苦散（《杂病治例》）。

【组成】御米壳一两（去顶，蜜炒） 陈皮五钱（去白） 虎骨（酥炙） 乳香（研） 没药（研） 甘草各二钱半

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，煎至八分（煎药时，须顺搅），连滓热服，病在上食后服，病在下食前服。

【主治】左瘫右痪，风湿痹，走注疼痛，无问男子妇人、远年近日，并宜服之。

【宜忌】①《普济方》引《瑞竹堂方》：忌猪、马、驴、鱼、兔等肉。②《丹溪心法》：非痛不可服。

37890 如神救苦散

【方源】《医学正传》卷一。

【组成】御米壳（蜜炒）一钱 陈皮五钱 壁虎（炙黄，即蜥蜴） 乳香 没药 甘草各二钱五分

【用法】上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】瘫痪，手足走痛不止。

【宜忌】非痛勿用。

37891 如神断痛丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】黄连五钱 白茯苓 石菖蒲各三钱 胆星 珍珠 铁花粉各一钱 朱砂（飞）三钱 甘遂五分

【用法】上为细末，粟米粉煮糊，入獾猪心血三枚同杵匀为丸，如弹子大。每一丸，取獾猪心一枚，切开两片，入药在内，线扎定，水煮熟，分三服，本汤送下。

【主治】急惊风后，急痰停聚，迷其心窍，变成痼疾。或一月一发，或半年一发、或一年一发，发过如常。

37892 如神鳖甲汤

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】鳖甲（好醋炙透，去裙襴） 常山 乌梅肉 桂心 柴胡（去苗） 知母各一两 牡蛎半两（炮，烧）

【用法】上为粗末。每服二钱，水二钟，煎至八分，去滓，发前一服，已发一服。

【主治】一切瘰疬。

37893 如童老奴丸

【方源】《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。

【组成】稍花 灯心灰 蛇床子 车前 苘蓉 菟丝子 马蔺花 大茴 韭子 菴澄茄 故纸各二两 川楝 羊藿 枸杞 胡桃肉 茯苓各一两半 母丁香 远志 泽泻 川附各五钱 巴戟二两 蜘蛛七个（酒浸） 柏仁一两半 桑蛸一两半 黄肉一两半

【用法】上为细末，炼蜜为小丸，如梧桐子大。每服二钱，淡盐汤送下，日服二三次。

【功用】补血填精。

【主治】精血衰弱，营养不足，神倦体软，气短心跳，不能支持，风寒湿痹，五劳七伤，阳事不举。

37894 如童大力丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】蒺藜(净末)半斤 当归(酒洗)二两 大生地(酒洗) 牛膝 木瓜 杜仲(盐水拌炒,去丝) 枸杞 骨碎补(去毛,盐水拌炒) 熊掌骨(酥炙)各一两 虎胫骨(酥炙)一两二钱 甜瓜子(微炒)一两 乳香(去油) 没药(去油)各五钱 黄柏八钱(盐水炒) 菟丝子(酒浸拌,蒸) 龟板(酥炙) 白茯苓(人乳泡) 知母(盐水炒) 续断(酒洗) 大熟地各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸三钱重。每服一丸,空心滚白水送下。

【功用】强壮气力,保命护身。

37895 如意金黄散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】金黄散(《嵩崖尊生》卷十二)、神效金黄散(《良朋汇集》卷五)、金黄如意散(《奇方类编》卷下)。

【组成】天花粉(上白)十斤 黄柏(色重者) 大黄 姜黄 白芷各五斤 紫厚朴 陈皮 甘草 苍术 天南星各二斤

【用法】上咬咀,晒极干燥,用大驴磨连磨三次,方用蜜绢罗厨筛出,瓷器收贮,勿令泄气。凡遇红赤肿痛,发热未成脓者,及夏月火令时,俱用茶汤同蜜调敷;如微热微肿,及大疮已成,欲作脓者,俱用葱汤同蜜调敷;如漫肿无头,皮色不变,湿痰流毒,附骨痈疽,鹤膝风等症,俱用葱酒煎调;如风热恶毒所生疾患,必皮肤亢热,红色光亮,形状游走不定,俱用蜜水调敷;如天泡、火丹、赤游丹、黄水漆疮,恶血攻注等症,俱用大兰根叶捣汁调敷,加蜜亦可;汤泼火烧,皮肤破烂,麻油调敷。

【功用】《外科十三方考》:清热、解毒、消肿、定痛。

【主治】外科一切痈疡属阳证者,及跌打损伤,虫蛇咬伤。

①《外科正宗》:痈疽发背,诸般疗肿,跌扑损伤,湿痰流毒,大头时肿,漆疮,火丹,风

热天泡,肌肤赤肿,干湿脚气,妇女乳痈,小儿丹毒,凡外科一切顽恶肿毒。②《金鉴》:小儿玉烂疮,腑热内蒸,湿气外乘,身热皮红,能食米面者。③《全国中药成药处方集》(沈阳方):蛇虫咬伤,蜂蝎螫毒,癣疥湿癩,皮肤瘙痒,冻疮痒痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(南昌方):皮色不红者忌敷,并忌入口。

37896 如意金黄散

【方源】《外科方外奇方》卷一。

【组成】天花粉十两 川黄柏五两 姜黄五两 白芷五两 广陈皮二两 甘草二两 苍术二两 南星二两 厚朴二两 石菖蒲二两 川郁金二两 生半夏二两

【用法】上为细末。醋、或蜜、或水、或葱汁水调敷。

【主治】痈疽发背,诸般疗肿,跌打损伤,湿痰流注,大头时肿,漆疮火丹,湿热天泡,肌肤赤肿,干湿脚气,妇女乳痈,小儿丹毒,外科一切顽恶肿毒。

37897 如意铁箍散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大黄四两 陈皮二两 南星二两 白及二两 姜黄四两 白芷三两 毛茛二两 厚朴四两 花粉四两 甘草一两 血竭二两 芙蓉叶四两 五倍子(炒)半斤 陈小粉(炒黑)一斤

【用法】上为细末。鸡子清或醋调敷。

【主治】一切痈疽,红白相兼之症。

37898 如意通圣汤

《嵩崖尊生》卷十。为《准绳·类方》卷四引《集验方》“如意通圣散”之异名。见该条。

37899 如意通圣散

【方源】《解围元藪》卷三。

【异名】麻黄赤芍汤。

【组成】罂粟壳 丁香 麻黄 赤芍 防风 荆芥 当归 川芎 羌活 独活 白芷 甘草 黄芩 威灵仙 草乌(炒黄色) 桔梗 葛根各二钱五分

【用法】水煎，去滓，乳香、没药末各三分，盖被取汗。趁热冲服。如病在肩背上，冲服白芷末二钱。

【主治】白虎历节，痛风，寒湿，手足不能举，浑身走注，抽掣疼痛。

37900 如意通圣散

【方源】《准绳·类方》卷四引《集验方》。

【异名】如意通圣汤（《嵩崖尊生》卷十）。

【组成】当归（去芦） 陈皮（去白） 麻黄（去节） 甘草（炙） 川芎 御米壳（去顶膈） 丁香各等分

【用法】上用慢火炒令黄色。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】行痹，走注疼痛。

【加减】如腰脚走注疼痛，加虎骨、没药、乳香；如心痛，加乳香、良姜；如赤眼，加草龙胆、黄连。

【方论选录】《金匱翼》：麻黄之猛，而得粟壳之涩，则内行经络，不复外发皮毛，故得治痹痛之疾；芎、归所以行血，陈皮、丁香所以行气，气血以行，邪气以去；炙草则和药缓急之用耳。慢火同炒者，欲令气味和合，使不相悖而相就也。

【备考】《嵩崖尊生》有枳壳，无御米壳。

37901 如意通圣散

【方源】《医统》卷十一。

【组成】麻黄 防风 川芎各一钱 罂粟壳 当归 丁香 甘草各五分

【用法】水二盏，煎至八分，去滓，人乳、没少许，再煎一沸，热服出汗。

【主治】风湿注痹走痛。

37902 如意紫沉煎

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】沉香 木香 朱砂 硃砂 使君子 草澄茄 荆三棱 莪术各一分，肉豆蔻 槟榔各一两 母丁香五个 巴豆二十个 黑牵牛粉半两

【用法】上为细末，水煮面糊和丸，如麻子大。每服三二丸，空心温酒送下。

【主治】气虚中寒，脾胃不和，宿谷迟化，饮食多伤，胸膈痞闷，心腹疼痛，噫醋吞酸，呕逆恶心，胁肋胀痛，泄痢里急，久新积聚，疝瘕癖结。

37903 如圣加枳实汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】甘草 桔梗 枳实（炒）各五钱

【用法】上锉细。每服五钱，入五味子半钱，水煎服。

【主治】伤寒噫气。

37904 如圣麦门冬散

《杨氏家藏方》卷十九。为《普济方》卷六十引《旅舍》“如圣汤”之异名。见该条。

37905 如圣胜金錠子

《玉机微义》卷二十七。即《局方》卷七（宝庆新增方）“如圣胜金錠”。见该条。

37906 如圣加吴茱萸汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】甘草 桔梗 吴茱萸（炒）各五钱

【用法】上锉细。每服五钱，入五味子半钱，水煎服。

【主治】伤寒气逆而甚，无汗下证。

37907 如妙辰砂化痰丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】胆星 天麻各一两 全蝎 僵蚕 白附子各七钱（俱用苏叶包，煨） 滑石 蝉蜕 人参 川乌 玄明粉各五钱 防风 天竺黄 石菖蒲各四钱 桔梗 青黛 枯矾 礞石各三钱 雄黄 硼砂 朱砂 巴霜 轻粉各二钱 冰片 麝香各三钱 水银三钱 硫黄八钱（熔化，入水银同研） 石菖蒲 薄荷 荆芥各一两

【用法】上煎膏为丸，如芡实大，以青黛、朱砂、雄黄、金箔、银箔作五色衣。每服一丸，淡姜汤化下。

【主治】小儿风热，身热恶风鼻塞，身重咳嗽有痰，面赤唇干，微汗尿赤者。

37908 如圣加人参藿香杏仁汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】甘草 桔梗 人参 藿香各五钱

杏仁三个(去皮尖)

【用法】上锉细。每服五钱，水煎服。

【主治】伤寒汗下后，喘而噎气。

妇

37909 妇宝丸

【方源】方出《女科万金方》，名见《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】四制香附丸(《墨宝斋集验方》)。

【组成】香附不拘斤两(分作四份，一份盐水浸煮，焙干；一份童便浸煮，焙干；一份与山梔四两同炒，去山梔；一份醋浸煮，焙干)

【用法】上为末，醋糊为丸。空心服五六十丸，醋汤或盐汤、米饮、酒皆可送下。

【主治】妇人经候不调。

【宜忌】《墨宝斋集验方》：忌萝卜、豆腐、葱白。

【备考】《墨宝斋集验方》本方用法：蒸饼为丸，如梧桐子大，每服百丸，日进三服。

37910 妇宝丹

【方源】《医方集解》。

【异名】妇科妇宝丹(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】艾附暖宫丸加阿胶

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：调经养血。

【主治】①《医方集解》：虚寒，经水不调。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：带下淋浊，腰痠腿痛，四肢倦怠，崩中漏血，气促头眩，手足冰冷，气血两亏。

【备考】《医林纂要》本方用当归四两(酒洗)、生地黄三两(酒润)、白芍药二两(炒)、川芎二两、艾叶二两、香附二两(童便、盐水、酒、醋各浸三日)、阿胶二两。《全国中药成药处方集》(沈阳方)本方用法：上为细末，阿胶化烊，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，白开水送下。

37911 妇康片

【方源】《吉林省中成药暂行标准》。

【组成】益母草 250 克 熟地黄 125 克 当归 100 克 川芎 75 克 酒白芍 75 克 茯苓 75 克 炒白术 75 克 延胡索 50 克 蜜甘草 50 克 人参 50 克 阿胶 25 克

【用法】将当归、川芎、白术、阿胶共研细粉，过 120 目筛；将益母草、熟地黄、白芍、茯苓、甘草酌予碎断，煎煮三次，分次过滤，合并滤液，浓缩成膏；将人参、延胡索分别以 60%、70% 乙醇按渗漉法提取，提取液浓缩成膏；将上述药粉、浓缩膏混合均匀，干燥，粉碎，过 100 目筛，加入适量的黄糊精，混合均匀，干燥，整粒，应出颗粒 510 克，公差率 ± 3%，加硬脂酸镁混合均匀，压片，每片重 0.5 克。口服，每次五片，每日二次。

【功用】补气，养血，调经。

【主治】气血两亏，体虚无力，月经不调，经行腹痛。

37912 妇科金丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归四十两 杭芍四十两 白术(炒)四十两 柴胡四十两 阿胶(炒珠)二十四两 蛇床子二十四两 吴萸(炙)二十两 椿根皮(炒)十六两 海螵蛸十六两 艾炭十六两 黄芩十二两 益母草十六两 灵仙十六两 藁本二十两 秦艽二十二两 茯苓十六两 牡蛎(煅)八两 木瓜十六两 益智仁十六两 香附(炙)三十二两 远志(炙)十二两 黄耆十六两 甘草八两 补骨脂(炒)十六两 青皮(炒)十二两 黑郁金十六两 法半夏十二两 使君子十六两 白芷八两 羌活八两 九菖蒲二十四两 川牛膝八两 川芎十六两 杜仲炭二十四两 苍术(炒)十二两 川续断十六两 首乌(炙)十六两 桂枝四两 玄胡(炙)十六两 党参(去芦)四十八两 枣仁(炒)十六两 丹皮八两 胡连八两 独活八两 黄连八两 绿七爪八两 白矾十六两 赤石脂(煅)十两 豆蔻仁一两六钱 砂仁一两六钱 莲子

肉一百六十两

【用法】上为极细末。炼蜜为丸，重三钱三分，油纸包裹。每日晚临睡时服一丸，温开水送下。

【功用】调经养血，舒郁止痛，健脾养胃。

【主治】经血不调，经期不准，行经腹痛，两胁胀满，赤白带下。

37913 妇科金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】元胡(醋制) 生黄耆 人参(去芦) 生阿胶 白薇 生白芍 甘草 茯苓(去皮) 制没药 当归 黄柏 生鹿角(洗净) 各四斤 制松香二斤 制乳香一斤 杜仲炭(盐炒)二斤 故纸(盐炒)一斤 益母膏十斤 锁阳一斤 小茴香(盐炒)八两 菟丝子一斤 血余炭八两 艾炭八两 红白鸡冠花二斤(以上用黄酒一百斤，装入罐，或不生锈的桶内，将罐口封固，隔水蒸煮，至酒尽为度) 生山药 川芎 丹皮 熟地 白芷 白术(麸炒) 藁本 黄芩各四斤 红花一斤 陈皮六斤 砂仁四斤 广木香一斤 续断 青蒿 肉桂(去粗皮) 苏叶各一斤 益母草十五斤 煅赤石脂四斤(以上轧成粗末)

【用法】共和一起，拌匀晒干，研为细粉，炼蜜为丸。每丸三钱重，蜡皮或蜡纸筒封固，每次服一丸，白开水送下。

【功用】调经活血。

【主治】体虚血少，月经不调，经期不准，腰痠背痛，肚腹疼痛，饮食不化，呕逆恶心，自汗盗汗。

【宜忌】孕妇忌服。

37914 妇人归附丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】香附子(大者，砂罐内醋煮极熟，水洗，焙干为末)一斤 当归(大者，去芦梢，用身，酒洗，切片，焙干为末)十两 鹿角(大者，刮去粗皮，镑末二三两，绵纸垫铁锅内，文火炒，为细末)二两

【用法】上药和匀，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，早起、临睡各一服，白滚汤送下。一月，经后入房即孕，且无小产、产后诸证。

【功用】种子。

37915 妇女止痛酒

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】小红花一两 茶香根二两 刮金板五两 香附子二两 小血藤三两 月月红六两 对月草六两 茴香根二两 血当归三两 茜草根三两 女儿茶三两 益母草六两 三月记根三两

【用法】用干酒十斤，泡十日即成。每日三次，每日服一至二两。

【主治】肚痛，腰痛，月经不调。

37916 妇女乌发丹

【方源】《文堂集验方》卷三。

【组成】侧柏叶一握 核桃一个 槌子三个

【用法】上药捣烂，用滚水泡。待凉搽发，频年不断。

【功用】乌发，头发至老黑而不秃

37917 妇女抽筋丸

【方源】《吉林省中药成方集》。

【组成】海螺(煅)一百两 线麻炭五两 杜仲(炒)二两 红花二两 川芎二两 牛膝二两 桂枝二两

【用法】上药共轧为细粉，和匀过80~100目细罗，损耗率5~10%，用冷开水泛为小丸，晒干或低温干燥，每两约五百粒。每服一钱，日服二次，温黄酒送服。

【功用】舒筋、活血、止抽。

【主治】妇女抽麻筋，鸡爪风。

【宜忌】孕妇及儿童忌用。

37918 妇女香身丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】沉香 大黄 藿香 红花 檀香 青木香 甘松各二钱 细辛一钱 槟榔三钱 香附五钱 甘草 白芷 当归各一两 麝香五分 芎藭八钱 豆蔻五钱 藁本八钱 防

风五钱 龙脑三分 公丁香四钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，一钱重。每服一丸，每日服三次，饭后两小时，白开水送下。

【主治】腋臭狐臊，口臭气秽，白带白浊，恶气熏人。

【宜忌】孕妇勿服。

37919 妇女养血丸

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】当归五两 香附(醋炙)三两 川芎一两 肉桂二两 木香(煨)一两 熟地黄三两 白芍(酒炒)三两 砂仁一两 山药三两 川贝母二两 阿胶珠一两 茯苓三两 炮姜一两 党参二两 黄耆(炙)二两 续断二两 白术(麸炒)二两 知母二两 甘草一两 地骨皮一两 艾叶炭二两 杜仲炭 柴胡(醋制)一两

【用法】将地骨皮、杜仲炭、艾叶炭、柴胡加清水煮过，过滤取汁，残渣再煎取汁，二次煎汁合并；当归等十八味为细粉，取部分细粉与熟地黄同碾或捣烂，干燥后轧为细粉，再与其他细粉和匀，用煎汁酌加冷开水泛为丸，每千丸十两，用朱砂细粉九钱为衣。每服一钱，日服二至三次，温开水送服。

【功用】益气养血，调经止痛。

【主治】妇女血亏，月经愆期，时来时止，血枯色淡，腹痛腰痠，精神倦怠，日晡潮热，咳嗽自汗。

37920 妇女养营丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】熟地黄 二泉胶 香附(制)各八两 全当归 黄耆 杜仲各四两 于术五两 茯苓 白芍药各三两 砂仁 川芎 陈皮 益母膏 艾绒(炒)各二两 甘草(炙)一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四钱，熟汤送下。

【主治】妇女阳虚阴弱，经水不调，带下淋漓，经闭腹痛，饮食少思，面黄发脱，肌体

消瘦，久不受胎，及经水不止，一切血证。

37921 妇女调经膏

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】益母草一两 延胡索一两 穿山甲一两 香附二两 南红花一两 巴豆一两 五钱 川芎一两 丹皮五钱 柴胡二两 生地三两 干姜一两 苍术一两 吴茱萸一两 透骨草一两 木香五钱 荆芥二两 小茴香二两 蕲艾一两 边桂五钱 薄荷一两 防风二两

【用法】用香油十斤，将药浸在油内，冬七日，夏三日，熬至药焦，去滓再熬，至滴水成珠；入炒章丹四斤，搅熬成膏。将膏摊于布上，微火化开，贴于丹田穴，大小酌用，临时用姜片擦净。

【主治】经血不调，阴寒肚疼，赤白带下。

37922 妇女紫金丹

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】砂仁 枳壳(炒焦) 天台乌药各一两五钱 广木香 陈皮 延胡索 红豆蔻 蓬莪术 京三棱各一两 槟榔一两三钱

【用法】上为细末，赤米汤泛为丸，如梧桐子大。每服三钱，熟汤送下。

【主治】妇女气郁血凝寒滞，经水不通，或乱经痛经，不能受孕，及肝血气块作痛。

37923 妇女痛经丸

【方源】《北京市中成药规范》第二册。

【组成】延胡索 93.75 千克 蒲黄炭 93.75 千克 五灵脂 93.75 千克 丹参 93.75 千克

【用法】丹参煮提两次，时间为 2.5 小时、1.5 小时；五灵脂 31.25 千克，沸腾后立即关气，保持(80℃)左右，温浸二次，时间分别为 2.5 小时、1.5 小时；合并以上药液过滤沉淀，减压浓缩至比重 1.35，温度 50℃的稠膏；延胡索、蒲黄炭、五灵脂各 62.5 千克粉碎为细粉，过一百孔罗，混匀；取原粉及稠膏按比例制丸，低温烘干，包绿色衣，每 50 千克干丸药用滑石粉 15.74 千克、白沙糖

16.6 千克、食品用色素柠檬黄 3 克、靛蓝 0.8 克为衣闯亮,每百粒包衣前干重 12 克。口服,每次五十粒,每日二次,温开水送下。

【功用】调经止痛。

【主治】气血凝滞,小腹胀疼,经期腹痛。

37924 妇宝宁坤丸

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】吉林人参二钱 大熟地五钱 制香附五钱 紫苏叶二钱五分 大生地五钱 驴皮胶二钱五分 全当归五钱 广橘红五钱 川牛膝二钱 于术五钱 沉香一钱 川芎五钱 台乌药五钱 西砂仁一钱五分 炒黄芩五钱 西琥珀二钱五分 白茯苓五钱 广木香二钱五分 炙甘草一钱五分 东白芍五钱 益母草三钱

【用法】各取净粉,用柏子仁一两,煎汤去滓,和炼白蜜为丸,每重三钱,蜡壳封固。每服一丸,开水化服。

【功用】调经种子,养血安胎。

【主治】妇人气血两亏,月经不调,崩漏带下,诸虚百损,久不受孕,一切胎前产后诸病。

37925 妇宝胜金丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 熟地 川芎 白薇 肉桂 藁本 白芷 丹皮 没药 元胡 赤石脂各一两 香附十五两(一次稻叶,二次童便,三次米醋)

【用法】上药蜜丸。每服一丸,温酒化下。

【主治】妇人经水不调,色淡色瘀,行经腹痛,赤白带下,子宫虚冷,久不受孕,癥瘕癖痞,胎前产后一切之患,及半身不遂,中风瘫痪。

37926 妇宝胜金丹

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】人参 全当归 白芍药 赤芍药 川芎 白芷各三两 熟地黄九两 茯苓 桂心 牛膝 牡丹皮 藁本各五两 血珀 朱

砂(飞)各一两 白薇八两 赤石脂 白石脂 乳香 没药各二两 粉草一两五钱 香附(制)二斤

【用法】先将赤、白石脂醋浸三日,炭火上煨七次,再淬,醋干为度,研细;次将各药用好黄酒浸,春五、夏三、秋七、冬十二日,晒干为末,与石脂和匀,炼蜜为丸,每重三钱,辰砂、金箔为衣。每服一丸。经水不调,或多或少,或前或后,或经前腹痛,或经后淋漓,一切赤白带下,血瘀血瘕,妊娠呕恶冲逆,腹痛腰痠,胎气不安,饮食少进,砂仁壳汤化下;妊娠带下见红,似欲小产,人参汤化下;妊娠临月阵痛,腰痠下坠,乳香米汤化下;产后偏身发热,不省人事,陈黑鱼头煎汤化下;产后风寒发热,桔梗汤化下;产后停食发热,枳壳、藜藜煎汤化下;产后儿枕骨痛,山楂肉(炒焦)三钱煎汤化下;产后血晕,血崩,头热心烦,有汗者,人参煎汤,加重便少许化下;产后恶露不尽,腰痛发热,红花汤化下。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方):调经活血,止带除浊。

【主治】胎前产后一切杂证。经水不调,或经前腹痛,或经后淋漓,或赤白带下,或血瘀血瘕;妊娠呕恶冲逆,腹痛腰痠,胎气不安,饮食少进,或带下见红,似欲小产,或临月阵痛,腰痠下坠;产后偏身发热,不省人事,或风寒发热,或停食发热,或儿枕骨痛,或血晕,血崩,头热心烦,有汗,或恶露不尽,腰痛发热。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(沈阳方):孕妇忌服。

37927 妇宝胶归丸

【方源】《活人方》卷七。

【组成】生地八两 香附八两 芍药六两 山萸肉六两 丹皮四两 杜仲四两 续断四两 茯苓四两 白术四两 黄芩三两 椿皮三两 黑荆芥三两

【用法】上药炼蜜为丸。早空心白滚汤吞服

四五钱，临睡服二三钱。

【主治】月事先期而至，红紫不一，甚则或崩或漏，淋漓不净，日久去血过多，气亦虚陷，非淋即带，腥秽绵绵，块结脐腹，痛连腰脊，胸膈痞闷，饮食日减，头目眩晕，肢体疲倦；多产成癆，或气虚半产，营卫虚极，形神羸弱，骨蒸烦热，四肢浮肿，昼则嗜卧，夜反无寐；先天不足，久不怀孕。

37928 妇宝调经汤

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】当归二钱 熟地黄 白芍药 川芎各一钱半 香附一钱二分 大腹皮 吴萸 紫金皮 肉苁蓉（洗净） 条芩各一钱 甘草五分

【用法】加生姜、大枣，水煎，经时服。

【主治】经期不准，或前或后，紫淡不同，多少不等。

37929 妇科十味片

【方源】《北京市中成药规范》第二册。

【异名】妇科调经片（《湖南省中成药规范》）。

【组成】香附 250 千克 川芎 10 千克 当归 90 千克 玄胡索 20 千克 生白术 14.06 千克 甘草 6.5 千克 红枣 50 千克 白芍 7.5 千克 赤芍 7.5 千克 熟地黄 30 千克

【用法】将生白术、白芍、赤芍、香附打碎，甘草切碎，熟地黄、红枣破开；生白术、甘草、红枣、白芍、赤芍、熟地、香附 20 千克煮提 3 次，时间分别为 3 小时、2 小时、1 小时，合并药液，过滤沉淀，减压浓缩至比重 1.38~1.40、温度（50℃）的稠膏；香附 230 千克、当归、川芎，玄胡索粉碎为细粉，过 100 目筛，混匀。每料用白沙糖 20 千克，加入适量清水制成糖浆，加入淀粉 5 千克冲浆或打浆，将碳酸钙粉 32.5 千克加上述稠膏与糖浆，置搅拌机内搅拌，加入药粉，再加入淀粉糊，搅拌均匀以后过 14 目筛制粒，用 60~70℃干燥，以 12 目筛整粒，加 2%滑石粉，均匀压片，每片重 0.3 克。口服，每次四片，

每日三次。

【功用】补气，益血，调经。

【主治】月经不调，经期腹痛。

37930 妇科五淋丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归八两 川芎八两 生地八两 白芍五两 木通五两 梔子（炒）四两 茯苓皮四两 石苇（去毛）二两 甘草二两 琥珀二两 海金沙十两 黄连一两

【用法】上药共研细粉，过罗，用冷开水泛为小丸，每十六两用滑石细粉四两为衣闯亮。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】清热利水，分解止淋。

【主治】妇女便溺涩滞，小便红赤淋漓浑浊，湿热肿痛。

37931 妇科五淋丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【异名】妇科分清丸（《中国药典》一部）。

【组成】当归 生地各四两 川芎 滑石各三两 木通 甘草 生梔子 生白芍各二两 石苇（去毛） 黄连各一两 海金沙五钱

【用法】上为细粉，凉开水泛小丸。每次三钱，白开水送下。

【功用】清热利水。

【主治】膀胱湿热，淋漓不断，混浊带血，小便不利，尿道刺痛。

【宜忌】孕妇忌服。

【备考】《中国药典》本方用法：先将石苇加水煎煮二次，滤过，余药粉碎成细粉，混匀，用石苇煎液泛为丸。每服三钱，每日二次。

37932 妇科分清丸

《中国药典》一部。为《全国中药成药处方集》（天津方）“妇科五淋丸”之异名。见该条。

37933 妇科乌金丸

《中国医学大辞典》。为原书“乌金丸”之异名。见该条。

37934 妇科白带丸

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】太子参二两 牡蛎四两 鳖甲四两 瞿麦四两 莲子四两 芡实四两 龙骨二两 豆腐巴五两

【用法】上为细末，和鸡蛋清十只糊为丸。

【主治】妇人赤白带下，经水不调，四肢无力，腰痠，胸闷，头晕眼花，骨蒸内热，饮食减少。

37935 妇科回生丹

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】大黄一斤 红花 苏木各三两 黑豆 黄酒各一斤 醋三斤(先将大黄轧成小碎块，红花、黑豆、苏木三味用清水熬汁，熬透去滓滤净，用汁煮大黄，待汁浸入，次将醋倒入，用微火徐徐煮之，须用铲不停地搅动，至稠膏形，再将黄酒倒入，微煮后起入盆内) 当归 川芎 熟地 茯苓(去皮) 炒苍术 香附(醋制) 乌药 元胡(醋制) 桃仁(去皮) 炒蒲黄 川牛膝各二两 生白芍 广皮 广木香 三棱(醋制) 五灵脂(醋炒) 地榆炭 羌活 山萸肉(酒制)各五钱 人参(去芦) 青皮(醋炒)各三钱 白术(麸炒) 木瓜各三钱 良姜四钱 制没药 制乳香各一钱 甘草五钱(以上轧成粗末，和煮制之大黄共和一起拌匀，晒干)

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，三钱五分重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】通经活血，化瘀止痛。

【主治】经闭不通，肚腹疼痛，及产后恶露不净，腹胀头痛。

【宜忌】孕妇及产后下血过多者忌服。

37936 妇科妇宝丹

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为《医方集解》“妇宝丹”之异名。见该条。

37937 妇科补益丸

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【异名】人参玉液金丹。

【组成】人参二两 生地一两二钱 制香附二两六钱 山楂肉八钱四分 黄耆一两三钱 淡黄芩一两五钱 沉香一两六钱 橘红一两六钱 益母草六钱四分 甘草三两二钱 白芍一两六钱 川羌活八钱四分 阿胶二两六钱 当归二两二钱 紫丹参四两二钱 大腹皮八两四钱 杜仲二两六钱 白茯苓六两四钱 怀山药四两二钱 白术八钱四分 菟丝子三两二钱 川芎二两四钱 血余八钱四分 川续断六钱四分 枳壳一两二钱 莲子六两四钱 川厚朴一两五钱 麦冬二两五钱 砂仁二两九钱 广木香八钱四分 苏叶二两五钱 琥珀八钱四分 淡苁蓉一两二钱 蕲艾六钱四分 川贝母二两二钱 沙苑子二两二钱

【用法】上为细末，以大腹皮煎汁和阿胶烱化，加炼蜜为丸，每粒潮重三钱，朱砂为衣，蜡壳封护。每服一粒，开水和服。

【功用】益气养血调经。

【宜忌】孕妇忌服。

37938 妇科调经丸

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】益母草二十两 五灵脂七两 制香附二十一两 香白芷七两 西当归十四两 薄官桂七两 广陈皮十四两 白薇七两 延胡索七两 藁本七两 抚川芎七两 粉甘草七两 炒白芍七两 制没药七两 白茯苓七两 鹿角胶七两 炒白术七两 西党参五两五钱 大熟地七两 西砂仁五两 牡丹皮七两 阿胶七两 淡黄芩七两

【用法】上为细末，以阿胶烱化，加炼白蜜为丸，每钱约做二十粒。每服三钱，一日二次，空腹时开水吞服。

【功用】调经，和血。

【主治】月经不调，腰痠腹痛。

37939 妇科调经片

《湖南省中成药规范》。为《北京市中成药规范》第二册“妇科十味片”之异名。见该条。

37940 妇科得生丹

【方源】《北京市中药成方选集》引黄毓息方。

【组成】益母草三百二十两 白芍八十两 当归八十两 羌活三十两 木香三十两 柴胡三十两

【用法】上为细粉，过罗，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下。

【功用】调经化瘀，解郁和肝。

【主治】气滞胸满，经血不调，血瘀腹痛，四肢倦怠。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(北京、承德方)：孕妇忌服。

37941 妇科散瘀丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】炙黄耆八两 川附子 桃仁各四两 川芎二两 五灵脂四两 小茴 炮姜各三两四钱 郁金二两四钱 没药 当归各四两 沉香二两四钱 白芍二两 藏红花四两 吴萸 姜黄各三两四钱 炙甘草二两六钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，黄酒送下。

【功用】通经化瘀，行血止痛。

【主治】产后恶露不尽，瘀血凝滞，癥瘕胀满，赶前错后，经闭不通，干血劳。

【宜忌】孕妇忌服；血虚无瘀者禁用。

37942 妇科黑豆丸

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《金鉴》卷四十八“回生丹”之异名。见该条。

37943 妇女救苦金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】元胡 山药 熟地 黄耆 人参 白芍 甘草 茯苓 当归 鹿角各四两 川断一两六钱 阿胶四两 杜仲一两六钱 茴香八钱 故纸一两六钱 菟丝一两六钱 祁艾八钱 血余八钱 没药四两 乳香四两 红鸡冠花一两六钱 白鸡冠花一两六钱 石脂四两 黄柏四两 益母膏一斤(诸药共置一罐内，兑黄酒十斤，用火煮七天七夜，取出晒干) 川芎 丹皮 白术 白芷 黄芩

各四两 红花一两六钱 陈皮六两 砂仁四两 木香一两六钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】调经养血，平肝理气。

【主治】妇女气虚血弱，经水不调，赤白带下，不思饮食，行经腹痛。

【宜忌】忌食生冷。

37944 妇科花蕊石散

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】花蕊石一斤 土色硫黄四两

【用法】上为末，和匀，用瓦罐一个，入二药，以纸泥封口，晒干，用炭火煨二柱香，次日取出研细。每服一钱，童便和热酒调下。

【主治】产后败血不尽，血迷血晕，胎衣不下，不省人事。

【加减】甚者用二三钱。

37945 妇科大黄廑虫丸

《饲鹤亭集方》。为《金匱》卷上“大黄廑虫丸”之异名。见该条。

好

37946 好乳汤

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】人参一钱 人乳一钟 桔梗一钱 枇杷叶三片

【用法】上药共煎，去滓服。

【功用】养浆。

【主治】痘浆已起。

37947 好槐枝汤

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】槐枝(锉)二两 秦皮 黄连(去须) 蕤仁(去皮) 马牙消 黄柏(去粗皮) 山梔子各半两 古字钱十四文 淡竹叶一握(细切) 食盐一分

【用法】上为粗末。每用五钱，水二盏，入钱，煎至一盏半，滤去滓，放温洗眼，冷再暖洗。

【主治】赤目昏痛，泪出隐闷。

观

37948 观音丸

【方源】《直指》卷十二。

【组成】圆白半夏(生) 乌梅肉 母丁香 川巴豆(不去油)各十枚

【用法】上为末,姜、面糊为丸,如麻子大,上下以厚纸盖贴,有油再易纸。每服五丸,临卧冷水送下。

【主治】暑毒,瘴毒。

【备考】《医编》有常山,无母丁香。

37949 观音丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】血竭 熊胆(研)各二钱 人参 蛇蛻(皂角水洗,新瓦焙)各半两 木贼(去节,童便浸,晒) 苍术(童便浸二宿,晒) 威灵仙 鹰爪黄连(去须) 地骨皮(洗,晒) 蔓荆子 茺蔚子 车前子 川芎 当归 羌活 蝉蛻(洗,晒) 石决明(煨,存半生)各一两 蚕蛻纸二十幅(炒焦)

【用法】上为细末,用羯羊肝一具,去筋膜,慢火煮至半生熟,带血性和药同捣,以粟米粉用肝汁煮,糊为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,温米泔送下或石菖蒲煎汤送下,食后常服。

【主治】内外障失明,或欲结青光内障,或赤脉疼痛。

37950 观音针

【方源】《跌损妙方》。

【组成】麝香一钱 冰片五分 硫黄二钱

【用法】先将硫黄煨化,再入冰、麝,取起存冷为度。

【主治】久损并核子。

37951 观音针

《良朋汇集》卷三。为原书同卷“九龙针”之异名。见该条。

37952 观音灸

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】硫黄一两 全蝎一钱(水泡一宿) 蝉酥二分 矾红土五分 火消一钱 飞黄丹

一钱 潮脑五分

【用法】上为细末,先将硫黄化开,再入诸药,候温又入麝香三分,搅匀,摊在青石上半钱厚。用时只一米粒,先将饭箸寻穴痛处,点上,用粗香头燃着,后用青布一块包中指蘸水揉患处。

【主治】风湿疼痛。

37953 观音灸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】麝香 西丁各等分

【用法】上药烱化,嵌铜钱孔内,逢痛处灸之。

【主治】六淫所侵,头脑痛不可忍。

37954 观音茶

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】黑脂麻(微炒) 藕粉 山药(微炒) 粘黄米(面炒) 白糖各一斤 莲肉(微炒)八两

【用法】上为末。每日当茶汤,不拘多少,滚水冲服。

【功用】补虚损。

【主治】咳嗽。

37955 观音散

《幼幼新书》(古籍本)卷二十三引《家宝》。即原书(人卫本)“神妙观音散”。见该条。

37956 观音散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】辰砂(成块者) 乳香 人参 滑石(研)

【用法】上为末。临产每服四钱,鸡子清一个,生姜汁半合,无灰酒一盞,同调热下。

【主治】难产。

37957 观音散

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】白术一分 人参一分 甘草一分(炙) 干葛(出粉)一分 藿香叶一分 白扁豆三钱(炒) 茯苓三钱 罂粟子三钱(炒) 绵黄耆一分(炙) 木香一分

【用法】上为细末。每服二钱,用生姜、枣子、紫苏煎汤调下,不拘时候,每日三次。

【功用】理脾胃。

【主治】小儿脾胃不和，气弱昏倦多困，不思食。

37958 观音散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】人参（去芦头） 白术 冬瓜子各半两 天南星一两（炮裂，入地坑内去火毒用）

【用法】上咬咀。每服二钱，淡浆水七分，白扁豆五粒捶碎，同煎至三分，去滓，乳食前温服。

【主治】小儿脾胃气弱，呕吐下利，昏困不省。

37959 观音散

【方源】《普济方》卷二一〇引《十便良方》。

【组成】木香一块（方一寸） 黄连半两

【用法】上药用水半升同煎干，去黄连，只薄切木香，焙干为末，分三服。第一服橘皮汤下，第二服陈米饮下，第三服甘草汤下。

【主治】大人、小儿痢。

37960 观音散

《活幼口议》卷十四。为原书同卷引东汉王氏方“观音全蝎散”之异名。见该条。

37961 观音散

【方源】《得效》卷十一。

【组成】人参 白术（纸裹，煨） 扁豆（炒）各二钱半 白茯苓 冬瓜子仁 酸枣仁（去皮，蚌粉炒） 甘草（炙）各半两 藿香 枳壳（去瓢）各二钱半 紫苏叶少许 木香（不见火） 石莲肉（去心） 嫩黄耆各半两

【用法】上为末。每服一钱，乌梅汤、冬瓜子仁汤或陈米汤调皆可。

【主治】小儿慢惊；或胃气不和，脾困，下泻过多，不思饮食，乳食不化，精神昏慢，四肢困冷。

37962 观音散

《普济方》卷一五八引《经验良方》。为《百一》卷五引《夷坚·已志》第三卷“观音人参胡桃汤”之异名。见该条。

37963 观音散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】人参 白术 白茯苓 陈皮 扁豆 莲肉 藿叶 薏苡仁 丁香 甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱，木瓜苏盐汤调下。

【主治】身冷吐乳。

【加减】慢惊、阴痢，加全蝎。

37964 观音散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】扁豆（炒） 白术（煨） 茯苓 人参（炙） 神曲（炒） 麦芽（炒） 香附子各等分

【用法】上为末。空心米饮调下。

【主治】小儿肠虚而胃气上逆，以致吐利。

37965 观音散

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】全蝎（去毒，炒）十个 天麻（煨） 防风 白芷 黄耆 甘草 白茯苓各二钱五分 人参二钱 扁豆（姜汁炒）一钱五分

【用法】上为末。枣汤调下。

【主治】慢惊风。

37966 观音露

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】小蛤蟆骨 皮消四两

【用法】小蛤蟆骨独装酒瓶内，入皮消，埋阴处四十九日取出，其药化为水。遇肿毒，着笔蘸水，从外肿密圈至中，即结一红疱，针刺出血立愈。

【主治】诸般恶毒疮疽。

【备考】方中小蛤蟆骨用量原缺。

37967 观音露

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】甘草 威灵仙各一斤

【用法】水二担，将药煎五六滚，倾入大缸内，令病人用小凳坐其中，周围用蓆围定熏浸，待水温方洗，令浑身汗透淋漓，共洗三日，药味尽止。浴后大避风寒。

【主治】大麻风坏烂，并一切风痹疼痛。

37968 观音露

【方源】《经验各种秘方辑要》引杨季明方。

【组成】蝌蚪七十个 滴乳香 净没药各二钱(研细末) 蟾酥末二分 寸香一分 芒消七钱

【用法】上药共装入瓶罐内，以黄蜡封口，埋土内七天，其药自化为清水，连瓶收藏。临用时将笔蘸药水涂患处。

【主治】痈疽，发背，对口毒疮。

37969 观音全蝎散

【方源】《活幼口议》卷十四引东汉王氏方。

【异名】观音散(《活幼口议》卷十四)、全蝎散(《永乐大典》卷九八一引《如宜方》)、全蝎观音散(《医统》卷八十九)。

【组成】黄耆一两 人参一分 木香一两 炙草 石莲肉(炒) 扁豆(炒) 白茯苓各一两 白芷 全蝎 防风 羌活各一两 天麻二两

【用法】上为末。每服半钱或一钱，用大枣半个，水一小盏，煎至半盏，不拘时候服。

【功用】清神固气，补虚益脉，开胃止吐，生胃气，截风定痛。

【主治】①《活幼口议》：小儿因吐而传为慢惊风者。②《金鉴》：频吐清涎，身体发热，心神烦躁，睡卧不宁。

【备考】《医统》本方用法：上为末，每服二钱，用生姜、大枣汤调服或煎服。

37970 观音全蝎散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】全蝎二十一个 天麻(炮) 防风(去芦) 羌活各半钱 川白芷 甘草(炙) 扁豆(姜制) 黄耆(蜜炙)各三钱 砂仁 赤茯苓各五钱

【用法】上为末。每服一钱，用冬瓜仁煎汤，不拘时候调服。

【主治】小儿外感风寒，内伤脾胃，致吐泻不止，遂成慢惊。

37971 观音应梦散

《冯氏锦囊》卷十二。为《百一》卷五引《夷坚·已志》第三卷“观音人参胡桃汤”之异名。见该条。

37972 观音应梦散

《普济方》卷三十六引《澹寮》。为原书同卷“甘露汤”之异名。见该条。

37973 观音应梦散

《证治要诀类方》卷三。即《百一》卷五引《夷坚·已志》第二卷“观音人参胡桃汤”。见该条。

37974 观音妙济散

【方源】《普济方》卷三七五引《典药方》。

【组成】僵蚕(直者，去嘴生用) 全蝎(全用) 轻粉各等分 生朱砂少许

【用法】上为末。每服一钱，用乳汁，男用女乳，女用男乳，或薄荷汤调下。

【主治】小儿急、慢惊风。

【加减】下利三五行，减轻粉，用后药调前药，再服；不利，加轻粉，后加金箔、琥珀、珍珠末各等分，入前药调服。

37975 观音梦授丸

《杂病源流犀烛》卷二十二。为《医说》卷四引《类说》“羊肝丸”之异名。见该条。

37976 观音梦授方

《得效》卷十六。为《医说》卷四引《类说》“羊肝丸”之异名。见该条。

37977 观音救生散

【方源】《医方类聚》卷二二九引《琐碎录》。

【组成】桂心不拘多少(不见火)

【用法】上为细末。每服一大钱，痛阵密时，暖童便调下。

【主治】①《医方类聚》引《琐碎录》：妇人生产不利，或横生倒生，至三四日不生者。②《本草纲目》：死胎不下。

37978 观音救苦丹

《冯氏锦囊·杂症》目录。即原书卷十九“神效观音救苦丹”。见该条。

37979 观音救苦丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】苏叶四两 羌活四两 川芎二两 甘草一两 黄芩(酒炒)二两 防风二两 白芷二两 生地二两 细辛一两 苍术(炒)三两 陈皮二两 葛根四两 香附子(炒)三两

【用法】上为细末，姜汁打糊为丸，如弹子大，每丸重三钱。葱汤送下。

【主治】感冒风寒，头疼身热，口渴目胀，筋骨酸疼，兼治一切风寒瘟疫。

37980 观音救苦丹

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】杏霜一两半 干姜(炒) 良姜 白豆蔻 木香 元胡 五灵脂(醋炒)各一两 乳香 没药各五钱 巴霜二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七丸，男用左手，女用右手，以盐一撮放手心内拌药，砂仁汤送下。

【主治】九种心胃痛。

【宜忌】不可多服。

37981 观音救苦丹

【方源】《松峰说疫》卷三。

【组成】火消一两 白矾四两 黄丹二两 朱砂 明雄各五分

【用法】上为细末，勺化开候稍冷，搓成小锭，瓷器收贮听用，毋出气。磨点眼角二三次；治咽喉诸症，含麦大一块化咽；一切肿毒恶疮，蛇蝎伤，津研擦患处。

【主治】阴阳二痧，咽喉诸症，一切肿毒恶疮，蛇蝎伤。

37982 观音救苦丹

【方源】《外科十三方考》。

【组成】麝香五分 白矾五分 雄黄(水飞)一钱半 辰砂(水飞)一钱半 乳香(去净油)一钱半 没药(去净油)一钱半 全蝎(炮，炙)三钱 真血竭一钱半 山甲(炙)三钱 蟾酥一钱 僵蚕(炙，去丝)五钱

【用法】上为极细末，收贮备用。每服三分，以红糖、葱白煎汤送下。汗出即愈。

【主治】一切痈疽，发背，疔毒，肿痛初起，红肿高大者。

37983 观音救苦丹

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】茯苓 木瓜 麦冬 生地 当归 各二两 藿香 菖蒲 茅术 半夏 腹皮 白矾 陈皮 防风 黄芩 杏仁各一两 山梔 柴胡 木通 香附 桔梗 泽泻 远志 各八钱 砂仁 川芎 油朴 羌活 独活 青黛 川连 雄黄 甘草 黄柏 神曲 枳壳 广木香 青木香 嫩苏梗 广郁金各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，一钱四分重，或三分五厘重，均朱砂为衣，瓷罈存贮。每服一钱四分重丸一丸，或三分五厘重丸四丸，鲜姜汤为引。服后取汗。

【功用】解表和中，化湿解毒。

【主治】四时感冒，伤食感冒，头痛体痛，发热畏冷，泛恶呕吐，泄泻。山岚瘴气，霉浊秽气，卒然中人，四肢清冷，呕吐搅闹，神昏吐沫；湿浊中阻，头痛身重，大便溏泄，不欲饮水。

【宜忌】忌食生冷。

37984 观音救苦方

【方源】《寿世保元》卷四引马伏方。

【组成】木香四两 黄连二两

【用法】黄连切片煎汁，浸木香，慢火焙干，为末，乌梅肉捣为丸，如梧桐子大。每次空心服六十丸，滚汤送下。

【主治】大便下血。

【备考】本方方名，据剂型，当作“观音救苦丸”。

37985 观音救苦针

《卫生鸿宝》卷一。即《冯氏锦囊·杂症》卷十九“神效观音救苦丹”。见该条。

37986 观音救苦散

【方源】《医方类聚》卷一一七引《修月鲁般经》。

【组成】人参 当归 滑石 甘草 粟壳

(蜜炙)

【用法】上咬咀。用乌梅一枚，水二钟，临睡煎服。

【主治】嗽。

37987 观音救苦散

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】川芎 藿香 藜芦各三钱 丹皮(去心) 元胡索 朱砂各二钱 雄黄 白芷 牙皂各四钱

【用法】上为细末，朱、雄另研调入收贮。用时先噙水在口内，次以药吸入两鼻孔，吐水取嚏。

【功用】预防瘟疫。

【主治】伤风、伤寒并疫气所侵，稍觉头昏脑闷，项背拘急。

37988 观音救苦锭

【方源】《良朋汇集》卷三。

【异名】盐水锭、北京盐水锭(《外科方外奇方》)卷一。

【组成】火消八两 黄丹 皂矾各一两 雄黄 朱砂各五分

【用法】先将消熔化后投四味，频频为锭。磨擦患处。

【主治】痒疙瘩，口内疮，点火眼，马骨眼。

37989 观音救苦膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】绿豆粉 黄柏 黄连各一钱

【用法】上为末。用猪胆一个，倾入碗内，调匀敷患处。

【功用】止痛消瘀。

【主治】杖疮。

37990 观音救苦膏

《验方新编》卷十一。为《仙拈集》卷四“观音救苦神膏”之异名。见该条。

37991 观音救命散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】木香一钱 川连一两

【用法】以水三碗，煮干，去川连，只以木香干焙为末。分三服，或两服，量儿大小与之，加灯草数茎，各长四寸，枣子一枚，乳

食前煎汤调下。

【主治】小儿热泻。

37992 观音救急丹

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【异名】感应救急丹(《全国中药成药处方集》上海方)。

【组成】真朱砂六两 雄精六两 革茛二钱 大梅片二钱五分 真佛金二百张 当门子二钱五分 明矾一两 月石二两 牙消四两(后下)

【用法】上为末，用瓷瓶每装一分，黄蜡封口。遇有急痧等症，先点两眼角，再取半分入脐内，膏药贴之；如遇重症，再将余丹放舌上，阴阳水送服，小儿减半。

【主治】①《经验各种秘方辑要》：急痧，阴阳反错，寒热交争，四时不正之气，郁闷成痧，绞肠腹痛，吐泻不止；小儿惊风闭急。②《全国中药成药处方集》(上海方)：伤暑泄泻。

【宜忌】孕妇忌服。

【备考】《全国中药成药处方集》(上海方)无真佛金，诸药各取净粉，共研极细粉。每次服二分，温开水化服。

37993 观音普济丹

【方源】《卫生鸿宝》卷五引汪迈园方。

【异名】乌金丸。

【组成】陈徽墨五钱(顶烟无霉者佳，先置烘箱烘软切开，再和后药研磨) 百草霜五钱(微烘俟干透细罗) 东天麻(透明者)四钱 广木香三钱(忌火)(上三味并忌泡水) 飞面三钱(烘干罗净)

【用法】上药各为细末，罗去粗头，再入陈墨，细罗，取长流水为丸，每料分四十九粒，晒干瓷瓶收贮。每服一九，陈老酒送下。

【功用】固气调血，催生。

【主治】难产，交骨不开，横生倒养，胎衣不下，子肠努出，胎死腹中；产后中风，血晕，血崩，鼻衄，瘀积，腹痛；妇女月经不调。

【宜忌】忌烟、酒。

37994 观音救苦神膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【异名】观音救苦膏（《验方新编》卷十一）、观音大士救苦神膏（《春脚集》卷四）、大士膏（《外科方外奇方》卷二）。

【组成】大黄 甘遂 蓖麻子各二两 当归一两半 木鳖子 三棱 生地各一两 川乌 黄柏 大戟 巴豆 肉桂 麻黄 皂角 白芷 羌活 枳实各八钱 香附 芫花 天花粉 桃仁 厚朴 杏仁 槟榔 细辛 全蝎 五倍子 川山甲 独活 玄参 防风各七钱 黄连 蛇蜕各五钱 蜈蚣十条

【用法】香油六斤，人药末五日，煎，去滓，再煎至滴水成珠，加密陀僧四两，飞丹二斤四两，熬至不老不嫩收贮，埋地下出火毒三日，随病摊贴；或作丸如豆大，每服七粒，滚水送下。偏正头风，各贴患处或捲条塞鼻；眼科赤肿，将耳上用针刺出血贴上；障膜倒睫，各贴患处；咽喉单双蛾，喉闭，各贴患处，将膏含化；头面虚肿，风火牙疼，贴患处；九种心胃肚腹疼痛，各贴患处，甚者作丸，滚汤送下；中风，箸撬开口，作丸，滚水吞服；疟疾，俱贴脐上，甚者作丸，热酒送下；痢疾，贴胃口，不愈，红痢用龙眼连壳核七枚，打碎煎汤，送丸服，白痢荔枝连壳核七枚打碎煎汤送丸服，赤白痢兼用；劳瘵有虫，贴夹脊、尾间、肚脐，饮甘草汤；咳嗽吐痰，贴前后心；臌胀，贴脐下、丹田，服丸；噎膈，贴胃口，服丸；痰火哮喘，贴前后心，服丸；大小便闭，贴肚脐，服丸；伤寒，葱汤服丸，一汗而愈；六七日不大便者，服丸；妇女赤白带下，贴丹田；难产，胞衣不下，作丸，热酒服；血块痞积，贴痞上，若壮健者作丸服；小儿惊风，作条塞鼻，作丸服；疳症，贴脐；肿毒恶疮，贴患处，服丸；臁疮十年不愈，摊贴，每日洗换，十日全愈；痔漏，内痔，捲条纳入，外痔，贴；便血肠风，梦遗白浊，俱贴脐；吐血鼻血，贴两脚心，俱饮甘草汤。

【主治】偏正头风，眼科赤肿，障膜倒睫，咽喉单双蛾，喉闭，头面虚肿，风火牙疼，九种心胃肚腹疼痛，中风，疟疾，痢疾，劳瘵，咳嗽吐痰，臌胀，噎膈，痰火哮喘，大小便闭，伤寒，六七日不大便，妇人赤白带下，难产，胞衣不下，血块痞积，小儿惊风，疳症，肿毒恶疮，臁疮十年不愈，痔漏，便血肠风，梦遗，白浊，吐血，鼻血。

【宜忌】①《仙拈集》：咳嗽吐痰，禁吞服。②《验方新编》：孕妇忌用。

【备考】《验方新编》有草乌、莪术。

37995 观音人参胡桃汤

【方源】《百一》卷五引《夷坚·已志》卷三。

【异名】人参胡桃汤（《济生》卷二）、观音散（《普济方》卷一五八引《经验良方》）、参桃汤（《古今医鉴》卷四）、神授汤（《医林绳墨大全》卷二）、参胡汤（《证治汇补》卷五）、观音应梦饮（《冯氏锦囊·杂症》卷十二）。

【组成】新罗人参一寸许 胡桃肉一个（去壳，不剥皮）

【用法】煎汤服。

【功用】《医宗必读》：定嗽止喘。

【主治】肺肾虚衰喘嗽。

①《百一》引《夷坚·已志》：痰喘。②《直指》：肺虚发喘，气乏。③《证治宝鉴》：肾虚而气不归原，冲脉之火上冲清道，气喘。④《兰台轨范》：老人虚嗽。

【方论选录】①《百一》引《夷坚·已志》：人参定喘，带皮胡桃敛肺。②《古方选注》：胡桃可解膈内之痰饮，膈间痰化而嗽止声清；连皮能收肺经耗散之气，连隔能通命门之火。

【临证举例】痰喘《本草纲目》引《夷坚·已志》：溧阳洪辑幼子病痰喘将危，凡五昼夜不乳食，用此方煎汤一蛎壳，灌之，喘即定。

【备考】本方方名：《永类铃方》引《澹寮》引作“观音梦感参桃汤”；《证治要诀类方》引作“观音应梦散”。《永类铃方》引

《澹寮》本方用法：切碎，用生姜五片，大枣二枚，食后、临卧水煎服。《证治宝鉴》有白蜜。

37996 观音梦感参桃汤

《永类铃方》卷十三引《澹寮》。即《百一》卷五引《夷坚·已志》卷三“观音人参胡桃汤”。见该条。

37997 观音救苦甘露饮

【方源】《霍乱吐泻方论》。

【组成】观音柳一枝(五钱) 滑石 炒谷芽 焦神曲各三两 苍术(泔水浸) 云茯苓各二两 柴胡一两五钱 川厚朴(姜汁炒) 黄芩 枳壳 葛根 苏叶 姜半夏 陈皮(盐水炒) 芍药 檀肉 乌药各一两 香附 木香 甘草各五钱 陈茶叶二斤(安化茶或六安茶之陈者佳)

【用法】上为细末，每次三钱，用阴阳水煎服。

【功用】避邪逐恶，祛风清热，疏滞和中。

【主治】感冒时邪，瘟疫疟疾，伏暑停食，霍乱吐泻，头痛腹胀，口渴心烦，脾胃不调，吞酸噎腐，一切不服水土。

37998 观音大士救苦神膏

《春脚集》卷四。为《仙拈集》卷四“观音救苦神膏”之异名。见该条。

欢

37999 欢喜散

【方源】《卫生总微》卷七。

【异名】清解散(《直指小儿》)、人参清解散(《奇效良方》卷六十四)。

【组成】防风(去芦并叉枝) 人参(去芦) 甘草(炙) 天麻(去芦) 前胡(去芦)各二钱半 细辛(去苗) 柴胡(去芦)各一钱半 白茯苓(去黑皮) 桔梗(去芦)各二钱 枳壳(去瓢，麸炒)二钱半 川芎三钱

【用法】上为细末。每三岁以上抄一钱，水六分，薄荷二叶，同煎三两沸，通口服，不

拘时候。

【主治】小儿伤风寒，发热头痛，无汗恶风；或温热鼻塞流清涕，泪出嚏喷。

羽

38000 羽白散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】白矾(半生半熟)

【用法】上为末。黄酒调化，以鹅翎蘸扫患处。

【主治】面上吹花癣，并钱癣。

【加减】甚者，枯矾末二两，朝脑一钱，为末。醋调敷。

38001 羽泽丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二引史越王方。

【组成】天南星(生) 半夏(生)各等分

【用法】上切碎，南星用皂角水，半夏用矾水，各浸七日，取出焙干，别用白僵蚕四两，锉、炒，同为细末，生姜自然汁和为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食后姜汤送下。

【主治】风痰及酒后痰饮。

38002 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾末二三钱

【用法】生姜自然汁调，灌服。

【主治】中风，痰厥，不省人事。

38003 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末一匙

【用法】临卧滚白汤调下。三四次愈。

【主治】哮喘。

38004 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾一钱 石膏二钱

【用法】上为末。白痢，桂皮汤下；红痢，甘草汤下。时气暑泄，老米汤下。

【主治】痢疾，时气暑泄。

38005 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末

【用法】吹耳。

【主治】耳聋疼痛或出水。

38006 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末

【用法】上药用绵裹塞鼻中，数日自消。

【主治】肺气盛之瓮鼻塞肉。

38007 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾 硼砂少许

【用法】上为末。吹鼻。

【主治】鼻中肉赘，臭不可近，痛不可摇。

【备考】方中枯矾用量原缺。

38008 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾二钱 硼砂一钱

【用法】上为末。蜜调，敷患处。

【主治】口疮。

38009 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 甘草各等分

【用法】上为末。掺口。

【主治】口疮。

38010 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末三钱

【用法】生姜自然汁调如膏，抹纸上，令患人闭目，将药贴眼上。烧一炷香，痛即止，温水洗去。

【主治】眼暴发疼痛。

38011 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 银珠少许

【用法】上为末。吹喉。

【主治】咽喉肿痛，水浆不下。

【备考】方中生矾用量原缺。

38012 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾 雄黄各等分

【用法】上为末。吹喉。

【主治】咽喉肿痛，水浆不下。

38013 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 地肤子

【用法】煎水外洗。

【主治】满颈生小瘰子。

38014 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 胡椒各一钱

【用法】上为末。每服五分，黄酒调服。

【主治】心腹冷痛。

38015 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】矾（半生半枯）

【用法】上为末。好酒调服，尽量饮之。发汗，汗后用油针刺患处。

【主治】疔疮初愈，便毒复生。

38016 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾末

【用法】擦手足心。

【主治】杨梅疮初起。

38017 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾

【用法】上为末。香油调搽。

【主治】汤烫、火烧肿痛。

38018 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 硝各等分

【用法】上为末。酒浆调擦数次。

【主治】顽癣。

38019 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾 血余灰各等分

【用法】上为末，青鱼胆拌成饼，阴干，研细，吹鼻中。

【主治】脑漏、鼻流脓涕。

38020 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾

【用法】上为细末。掺患处。

【主治】脚丫烂。

38021 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末

【用法】敷脐中。

【主治】小儿脐中汗出。

38022 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾（装入五倍子内，烧过）

【用法】上为末。掺牙。

【主治】小儿牙疳。

38023 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 茶牙末各等分

【用法】冷水调下。

【主治】中诸毒。

38024 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾 枯矾各等分

【用法】上为末。水调搽患处。如有血出，或水出，以药掺之。

【主治】蜈蚣咬伤。

38025 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾末二钱

【用法】温酒调下。

【主治】一切痈疽肿毒。

38026 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末一钱

【用法】百沸汤点服。

【主治】霍乱吐泻，头旋眼晕，手足转筋，四肢逆冷。

38027 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾末 陈醋

【用法】敷疮四周，好皮上干则换，渐渐收敛则渐渐敷之。

【主治】疔疮。

38028 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】生矾

【用法】上药入水化开，用皮纸蘸矾水，频搭患处。立消。

【主治】一切肿毒疮疖。

38029 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】白矾（端午日取者）三钱

【用法】上为末，加葱头（切），拌匀，好酒调服。

【主治】诸肿毒发背，恶疮，疮毒初起者。

38030 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】枯矾 白僵蚕（炒）各等分

【用法】上为末。吹喉。

【主治】乳蛾。

38031 羽泽散

【方源】《回春》卷七。

【组成】枯矾少许

【用法】上为细末。吹入耳中。

【主治】耳中出脓，或痛或疼，或出水。

38032 羽皇散

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】鹅不食草（用盐、酒焙干）一两 谷精 白蒺藜各一两 旋复花 蝉蜕 川芎 龙胆各五钱 决明二两 羊胆三具

【用法】炼蜜为丸。每服五钱，盐汤送下，随饮酒半盏。

【功效】去翳。

【备考】本方方名，据剂型，当作“羽皇丸”。

38033 羽液膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】白矾五两 童便一升 黄酒三合

【用法】上药合煎如稀糊。以棉帛蘸药擦之。

【主治】痲疹，风痒不止。

买

38034 买子木汤

【方源】《普济方》卷三一一引《圣惠》。

【组成】买子木 当归(锉,微炒) 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)各一两 红雪 赤芍药各一两半 东向桃枝三两(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一盞,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,日三四服。

【主治】伤折,瘀血聚于腹中,不便,结颗粒冲心。

孙

38035 孙武散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】草茛 生半夏 南星 肉桂 乳香 没药 胡椒各一钱 川乌 三七 蟾酥 草乌各二钱 丁香八分 麝香少许 花蕊石二钱半 风茄子三钱

【用法】上为细末,入瓷瓶内。临用敷之。

【功用】令外科动刀针不痛。

38036 孙思邈真人丸

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】牙皂 苦参 蒺藜 防风 当归 荆芥穗 蔓荆子 牛蒡子 胡麻各一两 黄柏三两 白花蛇 诃子各四两 麝香二钱

【用法】上为末,黄米饭为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服四十丸,日服三次,清茶送下。

【主治】风痹。

【宜忌】忌食盐物,只食淡鸭。

38037 孙思邈真人煎

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】防风 苦参 薄荷 芍药 黄芩 连翘 山梔 知母 柴胡 大黄 麻黄 天麻 半夏 花粉 甘草 紫苏 香附 白芷 当归 羌活

【用法】上药加细茶一撮,临卧煎服。五六帖退斑;十服效。

【主治】核桃、紫云等风证。

【宜忌】忌见风。

38038 孙真人五汁膏

【方源】《灵验良方汇编·续编》。

【组成】蔗汁 梨汁 藕汁 萝卜汁各一碗 姜汁半碗

【用法】上药共煎成膏。加白蜜三两再煎片时,加川贝母一两、薄荷叶三钱,俱研为极细末,拌入膏中,瓷器收藏,勿令出气。服时用白沸汤调下。

【主治】老年痰火。

【加减】火重者,姜汁减半;畏寒者,姜汁增至一碗。

38039 孙真人红枣丹

【方源】《理渝》。

【组成】巴豆霜 杜蟾酥 当门麝 冰片各一钱 山豆根五分 硼砂 老姜粉各二分

【用法】红枣去蒂装药。塞鼻,即闭口目,避风,嚏出浓血后,银花、甘草煎浓汤漱之,治喉蛾,塞蛾一边;喉风,男左女右,周时方可拔出。

【主治】喉风,喉痹,双单乳蛾。

【宜忌】虚火及阴毒证忌用。

38040 孙真人活命神丹

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】麝香一钱 月石(净末)三分 冰片一钱 山豆根(净末)五分 蟾酥(不见火,晒干,净末)一钱 老生姜(取汁澄粉)三分 新江子仁(去净油)一钱 大千地龙(去泥)二条

【用法】上为极细末。合匀,瓷瓶收贮,蜡口封固。临时用小红枣一枚,去蒂去核,取核只开近蒂半截,免走药性,入药黄豆大,将枣开蒂孔一头,塞入鼻中,令病人闭口目。避风少顷,即能得涎嚏或出脓,以银花甘草汤漱之,喉中便觉通快,俟鼻内热时,即将药枣拿去。病甚者,再换药枣一枚。凡左蛾塞左,右蛾塞右,双蛾左右先后塞之,唯喉风喉痹,男左女右塞之。

【主治】喉风，喉痹，双单喉蛾。

【宜忌】阴虚喉痛、虚人、孕妇忌用。

38041 孙真人透骨小灵丹

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】蟾酥五钱 雄黄一钱 硃砂一钱 轻粉 血竭 辰砂各五分 麝香少许

【用法】上为细末，乳面糊为丸，如黄米大。每服三丸。用葱三枝，开孔入药于内，纸捲慢火烧，热酒送下；小儿诸病，用金、银研，凉水送下。

【主治】诸般痲病，积气疔疮，三十六疔，七十二黄，诸寒。

驯

38042 驯龙汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】龙齿二钱 真珠母八钱 羚羊角一钱五分 杭菊二钱 生地六钱 当归二钱 白芍一钱 薄荷一钱 沉香五分 续断二钱 独活一钱 红枣十枚 钩藤钩四钱（后人）

【主治】五心烦扰，自头至腰，时时作颤，坐卧不安。

38043 驯龙驭虎汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】龙齿二钱 琥珀一钱 真珠母八钱 生地六钱 玉竹四钱 瓜蒌皮三钱 石斛三钱 柏子霜二钱 白芍一钱五分 薄荷一钱 莲子二十粒（打碎，勿去心） 沉香四分（人乳磨，冲）

【主治】惊悸气促，喉舌作痛。

驰

38044 驰源散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】猪荷花 旱莲草 雪里青 水萍

【用法】上药取汁，再磨山豆根和服。

【主治】咽喉肿痛。

红

38045 红丸

《永乐大典》卷九七八。即《幼幼新书》卷九引《刘氏家传》“软红丸”。见该条。

38046 红丸

《兰台轨范》卷六。即《易简方》“红丸子”。见该条。

38047 红油

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】红油膏（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】红砒一钱

【用法】敲细如粳，以麻油一两，煎至砒枯烟绝为度，去砒留油。每日以烘油擦患处二三次。

【主治】鹅掌风及一切疯症。

38048 红药

《理渝》。即《外科发挥》卷六“金钥匙”加枯矾、劈砂。见该条。

38049 红粉

《东医宝鉴·内景篇》卷二。即《得效》卷九“止汗红粉”。见该条。

38050 红粉

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】水银 白矾 火消各一两一钱 朱砂三钱三分

【用法】以锅煨热取起，入白矾，一沸；见清，入消，一沸；见清，入朱砂，一沸，见定，则取出研末，入锅内，下水银，盖碗，封打如法。下疳，嚼细茶毫三次，次掺之即愈；杨梅痘子，点之即愈；杨梅喉疳，用新笔蘸粉点之即愈；杨梅粉毒，用麻油四两、黄蜡一两融化成膏，离火候温，入红粉一钱搅匀，绵纸摊贴，一日一换。

【主治】一切顽疮，杨梅粉毒，喉疳，下疳，痘子。

【备考】粉霜必以朱砂色为度，如红黄为嫩，上疮必疼，须再封打一番。先用朱砂末、急性子各一钱五分，于锅内炒烟尽，去药拭净，入消、汞，升打如法，为之净锅。用煨石膏、赤石脂各二两为末，盐水调之封口，次以香炉灰盖之更佳。初打出红粉，用绵纸包好，入小南青布袋内，用绿豆水或槐花八两、

甘草一两煎汤，悬胎煮一、二百沸，取袋埋黄土内一日夜，去火毒及消、矾之气。

38051 红粉

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】水银一两 焰消一两（炒干为末，用四钱五分） 白矾一两（煨枯，四钱五分） 朱砂一钱（为末）

【用法】用筛过净香炉灰二三斤，盐卤水四五斤听用。取中样新铁锅一口，以砖架起，安朱砂末于锅中，如莲子大为度；次取消、矾末研匀，盖朱砂上，用等盘轻轻按消、矾如银底样，周围如茶钟口大；次将茶钟盖之，如口外有消、矾即吹去之，将钟揭起，用筷子在消、矾中间轻轻点一小窝，用茶匙挑水银入窝内，仍将先覆茶钟盖之；次取前香灰，用盐卤水调，干稀得所，先将手按茶钟勿令动，随将湿灰周围涂过，只留钟底在外，用石压之；次锅下发火，烧三香，二文一武，不时视香灰，如稍有白色，即用棕蘸卤水，于灰上刷之，为浇水三香完，离火过宿，用斧从旁轻轻凿开，取茶钟，用黄纸包好，临时刮用。下疳，嚼细茶毫三次，次掺之即愈；杨梅痘子，点之即愈；杨梅喉疳，用新笔蘸粉点之即愈；杨梅粉毒，用麻油四两、黄蜡一两融化成膏，离火候温，入红粉一钱搅匀，绵纸摊贴，一日一换。

【主治】一切顽疮，杨梅粉毒，喉疳，下疳，痘子。

【备考】粉霜必以朱砂色为度，如红黄为嫩，上疮必疼，须再封打一番。先用朱砂末、急性子各一钱五分，于锅内炒烟尽，去药拭净，入消、汞，升打如法，为之净锅。用煨石膏、赤石脂各二两为末，盐水调之封口，次以香炉灰盖之更佳。初打出红粉，用绵纸包好，入小南青布袋内，用绿豆水或槐花八两、甘草一两煎汤，悬胎煮一、二百沸，取袋埋黄土内一日夜，去火毒及消、矾之气。

38052 红粉

年氏《集验良方》卷六。为《医林绳墨大全》

卷九“红粉霜”之异名。见该条。

38053 红粉

【方源】年氏《集验良方》卷六。

【组成】红粉四钱 乳香二钱（去油） 没药二钱（去油） 儿茶二钱 珍珠一钱（豆腐内煮）

【用法】上为细末。先用酒洗疮，棉花拭净，将药掺上，温水蘸竹纸贴上，一日一洗。

【主治】发背、对口疮不收口。

38054 红袍

【方源】《囊秘喉书·医方》卷上。

【异名】铜绿散。

【组成】铜绿五分 腰黄一钱 冰片七厘五毫

【主治】肾经黑色铁皮疳，及牙宣，如牙龈与口唇内皮烂如云片，或眼中出血，或口碎。

38055 红雪

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】川朴消五斤（去滓） 川升麻三两 桑根白皮二两（锉） 犀角屑二两 羚羊角屑二两 朱砂二两（细研） 诃黎勒三十颗 槟榔二十枚 梔子仁三十颗 苏枋木六两

【用法】上锉细，以水一斗半浸三宿，煎取五升，去滓；下朴消，又煎，以柳木篦搅，勿住手，候稍稠，即歇火；入朱砂更搅令匀，入于新瓷盆内，候冷即成。每服含化一枣大，咽津；或为散，每服一钱，温水调下。

【主治】热毒风壅，心神烦躁，头疼目赤。

38056 红雪

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】通中散（原书同卷）、红雪通中散（《局方》卷六）、红雪煎（《圣济总录》卷一一九）。

【组成】川朴消十斤 羚羊角屑三两 川升麻三两 黄芩三两 枳壳二两（麸炒微黄，去瓢） 赤芍药二两 人参二两（去芦头） 淡竹叶二两 甘草二两（生用） 木香二两 槟榔二两 葛根一两半 大青一两半 桑根白皮一两半 蓝叶一两半 木通一两半 梔

子一两半 朱砂一两(细研) 苏枋三两(捶碎) 麝香半两(细研)

【用法】上药除朱砂、麝香外，并锉细，以水二斗五升，煎至九升，去滓，更以绵滤过，再以缓火煎令微沸，下朴消，以柳木篦搅，勿住手，候凝，即下朱砂、麝香等末，搅令匀，倾于新瓷盆中，经宿即成，细研。每服一钱至二钱，以新汲水调下，临时量老少加减服之。

【功用】解酒毒，消宿食，开三焦，利五脏，爽精神，除毒热，破积滞，去脑闷。

【主治】①《圣惠》：烦热黄疸，脚气温痺，眼昏头痛，鼻塞口疮，重舌，喉闭，肠痈。②《局方》：伤寒狂躁，胃烂发斑。

38057 红雪

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】神仙红雪(《鸡峰》卷四)。

【组成】升麻三两 大青三两 桑白皮二两 犀角屑一两半 羚羊角一两 诃子三十枚(去核) 槟榔三十枚 苏木六两 山梔子三十个 槐花末一两 淡竹叶四两

【用法】上锉细，以水二斗浸经宿，煎取一斗；下上好朴消十斤，又煎，以柳木篦子搅，于新瓦盆中贮；又经宿，去余煎不尽水即成。

【主治】脚气，气毒，身内外烦热，疮肿狂叫，及诸般石毒，瘡痂时行，一切风热。

38058 红散

《普济方》卷五十五。为原书同卷“红绵散”之异名。见该条。

38059 红膏

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】朱砂一两 麝香半两 牛黄半分 雄黄三分

【用法】上为细末，令匀，以面脂和为膏。匀敷面上。经宿粉刺自落。

【主治】面上粉刺。

【宜忌】避风。

38060 红膏

《普济方》卷三一四。为《济生》卷六“红膏

药”之异名。见该条。

38061 红膏

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】广丹一钱五分 轻粉一钱 蓖麻肉一两 松香(嫩者)一两 巴豆肉五钱 硃砂一钱

【用法】用斧捶千余下，取豆大按孔上，黑膏盖之。

【主治】疔疮。

38062 红丸子

【方源】《理伤续断方》。

【组成】牛膝(酒浸一宿) 川乌(炮) 南星(醋煮三次) 细辛(去苗，洗净) 何首乌(用水煮熟) 桔梗(去芦) 山桂(去粗皮) 当归 自然铜(煅，醋淬七次，别研) 白蔹 赤芍药 骨碎补(去毛) 没药(别研) 羌活(去芦) 赤小豆(不见火)

【用法】上除研药外，余并打和，炒干为末，酒煮面糊为丸。每服五十丸，随病上下服之。

【功用】补损，坚筋固骨，滋血生力。

【主治】打扑伤损，骨碎筋断，疼痛痹冷，内外俱损，瘀血留滞，外肿内痛，肢节疼痛，应诸伤损，不问年月日久，并宜服之。

【宜忌】孕妇勿服。

38063 红丸子

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】鹤顶丹(《圣济总录》卷一六九)、朱粉丹(《卫生总微》卷五)。

【组成】朱砂半两(细研，水飞) 蝎尾半两(微炒) 膩粉一分 巴豆五枚(去皮心，纸裹压去油)

【用法】上为末，用面糊和为丸，如黍米大。每服二丸，以桃仁汤送下，不拘时候。

【主治】小儿急惊风，壮热吐涎。

【备考】本方方名，《普济方》引作“鹤顶丸”、“桃符丸”。

38064 红丸子

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《灵苑

方》。

【组成】郁李仁一百粒(温水浸, 去皮尖) 坯子胭脂一分 麝香半钱(别研)

【用法】上先研郁李仁细烂, 次入胭脂、麝香同研, 用粳米饭为丸, 如麻子大。每服三九至五九, 一日三服, 用薄荷汤送下。

【功用】肥儿。

【主治】小儿五疳。

38065 红丸子

【方源】《局方》卷三(绍兴续添方)。

【组成】荆三棱(浸软, 切片) 蓬莪术 青橘皮 陈皮(去白)各五斤 干姜(炮) 胡椒各三斤

【用法】上为细末, 用醋面糊为丸, 如梧桐子大, 矾红为衣。每服三十丸, 食后生姜汤送下。小儿临时加減与服。

【功用】①《医方大成》: 壮脾胃, 消宿食, 治冷症, 去膨胀。②《赤水玄珠》: 温脾胃, 消寒冷食积。

【主治】脾胃寒凝气滞, 胸闷腹胀, 食欲不振, 腹有癖块; 妇女气滞血瘀, 致成瘕瘕; 小儿食积, 面黄体瘦, 腹胀食少。

①《局方》: 脾积气滞, 胸膈满闷, 面黄腹胀, 四肢无力, 酒积不食, 干呕不止, 背膈连心胸及两乳痛; 妇女脾血积气, 诸般血瘕气块; 小儿食积, 骨瘦面黄, 肚胀气急, 不嗜饮食, 渐成脾劳。②《直指》: 食症, 食积, 气滞腹胀; 谷疸, 腹满眩暈, 佛郁怔忡; 酒疸。③《得效》: 妇女妊娠恶阻; 经水不调, 腹中癖聚成块, 流走作痛, 肌肤消瘦, 胀满不敢食。④《医方考》: 伤寒冷之物, 腹痛成积。

【方论选录】《医方考》: 三棱、莪术, 攻坚药也, 故可以去积; 干姜、胡椒, 辛热物也, 故可以去寒; 青皮、陈皮, 快气药也, 故可以去痛。而必以醋糊为丸者, 经曰: 酸胜甘, 故用之以疗肥甘之滞; 必以矾红为衣者, 取其咸能软坚, 枯能着癖也。

【备考】《直指》本方用法: 治食症、食积, 以二陈汤或四兽汤送下; 治谷疸、酒疸, 以

二陈汤加缩砂仁煎汤送下。《得效》治经水不调, 以乌梅浓煎汤, 入盐少许服之。③《医方类聚》引《王氏集验方》有良姜, 名“胡椒红丸子”; 去胡椒, 加良姜、阿魏, 名“阿魏红丸子”。

38066 红丸子

【方源】《三因》卷六。

【组成】蓬莪术 京三棱各二两(醋煮一伏时) 胡椒一两 青皮三两(炒香) 阿魏一分(醋化)

【用法】上为末, 别研仓米末, 用阿魏醋煮米糊为丸, 如梧桐子大, 炒土朱为衣。治食症, 每服五十至一百丸, 以老症饮下; 治霍乱, 丸以矾朱为衣, 每服一百至二百丸, 生姜、甘草煎汤送下。

【主治】①《三因》: 食症; 因饮食饥饱伤及胃气, 或诸症饮食不节而成, 病者寒热, 善饥而不能食, 食已支满, 腹急疔痛, 病以日作; 脾胃虚冷, 饮食不节, 宿食留饮, 聚癖肠胃; 或因气不调, 冲冒寒湿, 忽作霍乱, 吐利并, 作心腹绞痛, 肠胃缠刺, 疲茶不胜。②《玉机微义》: 谷疸发黄。

【方论选录】《医方考》: 食症者, 食积成症也。《内经》曰: 留者攻之, 故用蓬术、三棱、阿魏以攻积; 积之为患, 气快则行, 气滞则止, 得热则行, 得寒则结, 故用青皮之辛以快气, 胡椒之温以散结; 复用矾红为衣者, 假其土性以培脾胃云尔。

38067 红丸子

【方源】《易简方》。

【组成】蓬莪术五斤 荆三棱五斤(水浸软, 切片) 橘皮五斤(拣净) 青皮五斤 胡椒三斤 干姜三斤(炮) 阿魏三斤 矾红

【用法】上为细末, 醋糊为丸, 如梧桐子大, 矾红为衣。每服六十丸, 生姜汤送下。脾寒症疾, 生姜、橘皮汤送下; 心腹肠满, 紫苏、橘皮汤送下; 脾疼作楚, 菖蒲汤送下; 酒疸, 谷疸, 大麦煎饮送下; 两胁引乳作痛, 沉香

汤送下；酒积，食积，煨姜汤送下；妇人脾血积气诸疾，醋汤送下；产后状如癫痫，热醋汤送下；妊娠恶阻，二陈汤送下。

【功用】《兰台轨范》：破癥消瘕。

【主治】脾积气滞，胃膈满闷，面黄腹胀，四肢无力，酒积不食，或大病之后，谷食难化，及中脘停酸，脾寒疟疾，脾疼作楚，酒疸、谷疸，遍身皆黄，两胁引乳作痛，酒积、食积，时或干呕；妇人脾血积气，诸般血瘕气瘕，经血不调，或过时不来，寒热往来；产后败血上攻，迷乱心神，状如癫痫；妊娠恶阻，呕吐，全不纳食；小儿食积，骨瘦面黄，渐成脾劳。

【备考】本方方名，《兰台轨范》引作“红丸”。

38068 红丸子

【方源】《医方类聚》卷二五四引《保童秘要》。

【组成】糯米四十九粒 酸石榴三个 底胭脂少许 杏仁七个（去皮尖） 穿山甲一分（炮，冷水浸）

【用法】上为末，用水为丸，如麻子大。每服三丸，金银薄荷汤送下；取惊，诃子汤送下。

【主治】小儿惊疳。

38069 红丸子

【方源】《得效》卷十一。

【组成】三棱（煨） 莪术（煨） 芫花 桃仁（去皮，别研） 杏仁（去皮，别研） 朱砂 乌梅（炒） 巴豆

【用法】上为末，醋糊为丸，如小绿豆大，朱砂为衣。空腹米汤送下。

【主治】癖气，血膜包水，僻侧子胁傍，时时作痛，发寒热；疟家中脘多蓄黄水，日久结癖。

【备考】《普济方》本方用量：各等分。

38070 红丸子

【方源】《普济方》卷三八四引《鲍氏方》。

【组成】透明天麻 防风 冬瓜子各一两

全蝎 白附子三钱 南星 半夏（炙，锉）共六钱 辰砂 雄黄半钱 麝香少许

【用法】上为末，面糊为丸，如芡实大，辰砂为衣。实证，用青丸子二丸、红丸子一丸；虚证，用青丸子一丸、红丸子二丸；虚甚及泄泻，只用红丸子；平证，用青、红丸子各一丸。

【主治】发热风壅。

【备考】方中全蝎、辰砂用量原缺。

38071 红丸子

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】白矾一二枚（出火毒） 半夏一分（炮） 雄黄一钱三分半 朱砂二钱二分半

【用法】上为末，用生姜自然汁煮面糊为丸，如绿豆大，以一半朱砂为衣。每服二十丸。以痰尽为度。

【功用】化痰。

【主治】一切惊痫。

38072 红丸子

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】巴豆四十九粒（去皮、壳、心、油） 木香四钱（末） 乳香四钱（研） 槐花一钱半 抚丹一两 黄蜡半两

【用法】先将蜡入石器内熔开，滤净，再化，入前药末拌匀，再入丹拌匀，待冷自然成膏，油纸包，为丸，如粟米大。每服三五十丸，白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；水泻，煨姜饮子送下。

【主治】泻痢。

38073 红丸子

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】白茯苓 泽泻各一钱 半夏曲二钱 滑石（水飞）一两六钱 大粉草 朱砂各三钱

【用法】上为末，井花水为丸，如豌豆大，朱砂为衣。灯草汤化下。患口疮者，用一丸，同青丸子一丸，芍药、灯心汤化下。

【主治】鹅口疮，口疮。

38074 红丸子

《片玉心书》卷四。为原书同卷“五色丸”组成之一。见该条。

38075 红子汤

《幼幼新书》(人卫本)卷十八引张涣方。即原书(古籍本)“红花子汤”。见该条。

38076 红升丹

【方源】《医宗说约》卷六。

【异名】大红升(《疡科遗编》卷上)。

【组成】水银一两 朱砂 雄黄各五钱 皂矾六钱 白矾一两 火消一两

【用法】先将二矾、火消研碎，入大勺内，加火酒一小杯炖化，一干即起，研细；另将水银、朱、雄研细，待水银不见星，方入消、矾研匀，将羊城罐用纸筋泥搪一指厚，阴干，常轻轻扑之，不致生裂，如有裂，以罐子泥补之，极干再晒，无裂方入前药于内。罐内以铁油盏盖定，加铁梁，盏上下用铁棒铁丝系紧，用绵纸捻条蘸蜜，塞罐口缝间，外用熟石膏细末，醋调封固盏上，加炭火二块，使盏热，罐口封固易干也。又用铁钉三根，钉地下，将罐子放钉上，罐底下置大炭火一块，外砌百眼炉，升三炷香，第一炷香，用底上火，如火大则水银先飞上；第二炷香，用大半罐火，以笔蘸水擦盏上；第三炷香，火平罐口，用扇煽之，频频擦盏不可令干，干则水银先飞，预用盐滴卤调罐子泥极湿，将铁丝系笔头在管上，如罐上有绿烟起，即水银走也，急用笔蘸罐子泥固之，上三香完，去火冷定，开罐，方气足，盏上约有丹六七钱，刮下研细，瓷罐盛之。用时，鸡翎蘸丹少许，外扫疮口。

【功用】拔毒，祛腐，生新。

【主治】一切疮疡溃后，疮口坚硬，肉暗紫黑。

【临证举例】①慢性不愈合伤口及淋巴结核溃疡 《中华外科杂志》(1957; 12: 999); 以凡士林纱布条粘满红升丹，填入创口、溃疡内，治疗化脓后久治不愈的创口 23 例、淋巴结核溃疡 19 例，除 2 例结核性溃

疡未继续门诊治疗而疗效不详外，全部治愈。作者体会：红升丹治疗慢性长期不愈的创口及结核性溃疡，确有显效，对不良的肉芽组织有腐蚀作用，可使异物(如线头等)早日脱出，从而促进愈合。②瘰管 《新中医》(1986; 8: 32): 用红升丹治疗 58 例瘰管，其中病位在颈项者 15 例(瘰癧 10 例，脓肿术后 5 例)，躯干者 26 例(乳痈术后 7 例，阑尾炎术后切口感染 11 例，臀部脓肿术后 5 例，肾输尿管术后切口感染 3 例)，四肢 17 例(慢性骨髓炎 12 例，脓肿切开 5 例)。结果，58 例全部治愈，其中疗程在一个月者 44 例，二个月者 14 例。

【备考】《串雅内编》：升丹为外科要药，不能不用，然总宜陈至五、七年者方可用，且须少用为妙。如系背疮及胸腹诸处疮之溃大者，更须慎用，往往有疮未愈而升药热毒攻入腹内，以致口干喉破者，人多不知也。

38077 红升丹

《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。为《医林绳墨大全》卷九“红粉霜”之异名。见该条。

38078 红玉散

《宣明论》卷十。即原书同卷“益元散”加黄丹。见该条。

38079 红玉散

【方源】《局方》卷八(淳祐新添方)。

【组成】寒水石(炭火烧通赤，候冷细研)二两 黄丹半两

【用法】上为细末。干掺在疮口内，后用万金膏贴，每日一上，再上尤妙。

【功用】敛疮口，生肌肉，止疼痛，去恶水。

38080 红玉散

《保婴集》。为方出《阎氏小儿方论》，名见《卫生总微》卷十八“桃红散”之异名。见该条。

38081 红玉散

【方源】《鲁府禁方》。

【组成】生白矾九钱 朱砂一钱

【用法】上为细末。每服钱抄一字，温水调下。

【主治】心痛。

38082 红玉散

【方源】《鲁府禁方》。

【组成】官粉二钱 黄丹五分 拔过松香五钱

【用法】上为极细末。干搽患处；如疮结痂，则用香油调敷。

【主治】头面黄水，到处生疮。

38083 红玉散

《东医宝鉴·外形篇》卷一。为《古今医鉴》卷九“如玉散”之异名。见该条。

38084 红玉散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】轻粉 血竭各三钱 珍珠 甘草 黄连 铅粉各二钱

【用法】上为细末。搽疮口。

【主治】疔疮不收口。

38085 红玉散

【方源】《医级·杂医类方》卷八。

【组成】枯矾 黄丹各五分 水龙骨(即船底老油灰)一钱(煨，研) 海螵蛸

【用法】上为细末。以棉挺子搅尽耳内脓水，用药一字，搽灌耳中，每日二次。勿令风入。

【主治】聾耳流脓。

【备考】方中海螵蛸用量原缺。

38086 红玉散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】石膏(煨，研，水飞)一两 黄丹五钱 血竭三钱 轻粉一钱 冰片二分

【用法】上为细末。每用少许敷患处，或以太乙膏贴之。

【功用】生肌收口。

【主治】痘疹后发痂疽疮毒，出脓者。

38087 红玉錠

《中国医学大辞典》。为《玉机微义》卷十五“红玉錠子”之异名。见该条。

38088 红玉膏

【方源】《疡医大全》卷七引《济生》。

【组成】乳香(另研) 没药(另研)各二两 蓖麻仁四百粒 木鳖子(去壳)二两四

钱 当归四两 血余五钱 儿茶 血竭 白蜡 黄蜡各一钱 嫩杨柳枝一两(打碎) 黄丹(飞)四两 真麻油八两 芸香(白嫩者)一斤四两

【用法】先将麻油同杨柳枝、血余、当归熬数滚，绞去滓；再将油同芸香、蓖麻、木鳖子熬熟，绞去滓；入黄、白蜡，将成膏时入黄丹，离火，下乳、没、儿、竭末，搅匀成膏。外贴。

【主治】痈疽，瘰癧，乳痈。

38089 红玉膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】黄丹(水飞)五钱 轻粉 乳香(炙，去油) 没药(炙，去油) 白蜡各一钱 黄蜡二钱 猪板油(夏三钱，春秋四钱，冬五钱)

【用法】先熬猪板油，去滓，次将二蜡融化，离火即下诸药末，搅匀。随疮口大小，用绵纸作隔纸膏，刺细孔贴上，以帕缚之，三日一换。

【主治】湿毒臃疮。

38090 红玉膏

【方源】《何氏济生论》卷八。

【组成】芸香(白者)一斤四两 没药二两(研) 当归四两 血余五钱 蓖麻仁四百个 乳香二两(研) 木鳖子(去壳)二两四钱 真麻油八两

【用法】上药以真麻油调匀，油纸摊成隔纸，不可钻孔，用浓茶水洗净患处脓液。每膏一张，两边各贴一日，第三日须另换新者。半月可愈。

【主治】痈疽，瘰癧，乳痈。

38091 红玉膏

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】鸡蛋十个 头发五钱 黄蜡五两 黄丹五两

【用法】香油二十两，熬滚入鸡蛋，炸黑枯捞去；入头发，炸令尽；再入黄蜡，化开住火，看锅内四边油定，下飞过黄丹。搅匀成

膏,任用摊贴。

【主治】恶疮疔毒,乳花无名,痛不可忍。

38092 红玉膏

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】葳蕤三两 人参三两 五味子二两 龟版胶二两 当归二两 大生地二两 白茯苓二两 川牛膝一两 白莲须五钱 枸杞二两 明丹砂一钱

【用法】用河水十碗,煎至五碗,去滓,再煎至二碗,加川蜜慢火熬成膏,瓷瓶收贮。随便用。

【功用】添精补髓,固气养血,和五脏,利九窍,益身心。

38093 红玉膏

【方源】年氏《集验良方》卷六。

【组成】麻油二两五钱 柏油二两五钱 管仲三钱 象皮(切片)五分 血余一大团 朱砂五分 儿茶五分 轻粉 没药(去油) 川椒 樟脑各五分 乳香(去油)三钱五分 血竭一钱五分(朱砂以下共为末)

【用法】前五味药同煎至发枯,去发,再煎至滴水成珠,下炒飞黄丹五钱,再下朱砂以下药末,搅匀,离火候半冷,下黄蜡二钱五分、杭粉一两五钱,如法熬成膏。摊贴患处,一日一换。

【主治】湿烂疔疮,足上恶疮,诸般疮毒风湿,臭气难闻,杨梅结毒,及一切顽疮不收口者。

38094 红玉膏

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】紫草一两 红花一两 当归二两 黄蜡三两

【用法】用香油半斤,先将药炸焦去滓,后下黄蜡令匀,以冷为度。摊贴患处。

【主治】痘后痈毒。

38095 红玉膏

《串雅内编》卷三。为《本草纲目》卷九引《閤阁事宜》“太真红玉膏”之异名。见该条。

38096 红玉膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】蛇蜕 蜈蚣各一条 头发(洗去油垢) 黄蜡各二两 香油四两

【用法】上药同熬,滤清,用黄丹收膏,再下黄蜡融化。摊贴。

【功用】拔毒去脓。

38097 红玉膏

【方源】《良方汇录·外科统治门》。

【组成】阿魏 藤黄各五钱 乳香 没药各一两(用烧红热砖两块,上下夹之,踏净油,取净末各五钱) 蓖麻子肉一两五钱 松香三两五钱(用桑、槐、桃、柳、梅五样树头,扎好人水中,先煎数滚捞去,下松香煎半日,去火,下冷水,团结捞起,晒,研) 血标银朱 血竭各一两

【用法】将蓖麻肉先打烂,渐加松香各药,打干捶成膏,隔水煮烱,摊油银皮纸上,外托绵纸一层,听用。用时将膏药在热器上分开,贴之,忌火熏。贴前仰卧,贴后俯卧,贴左向右卧,贴右向左卧。

【功用】消坚,呼脓,拔毒。

【主治】一切痈疽、发背、对口、附骨、无名肿毒,无论阴阳,已成未成。

【加减】症重者,每料加真麝香二钱,苏合油四钱,其效更速。

【宜忌】孕妇忌贴。

38098 红玉膏

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】黄蜡 白蜡 乳香 没药各五钱 樟冰 血竭 轻粉 象皮各四钱 儿茶二钱 熟猪油四两

【用法】将二蜡融化,去滓,入前药末搅匀。先以葱白汤洗净患处,拭干后敷药,以纸盖之。勿令见风。

【主治】破伤溃烂,久不收口。

38099 红玉膏

【方源】《青囊秘传》。

【异名】千捶膏。

【组成】蓖麻子(去壳) 松香(葱汁煮) 四两 南星(研)五钱 半夏(研)五钱 乳

香(去油)五钱 银朱七八钱 没药(去油)五钱

【用法】上药捣成膏，看老嫩，以蓖麻肉增添。临用隔汤炖，摊贴。

【主治】一切无名肿毒。

38100 红玉膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】当归一两 红花三钱 赤芍三钱 白及三钱 防风三钱

【用法】用香油一斤，同上药共煎，煎枯去滓；入黄蜡二两，再入银朱一两，乳香五钱。用牙簪挑少许，擦鼻孔内。

【功用】祛腐生肌，定痛化虫，止痒消肿，化疗解毒。

【主治】鼻内干燥而痛，涕中带黑丝，及杨梅顽疮，结毒臃疮，不论大小诸毒。

38101 红末子

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】独活 何首乌 南星(制) 白芷 羌活 当归 骨碎补 苏木 牛膝 赤芍药 红花 川芎各二两 细辛 川乌(制) 桔梗 降真香 枫香 血竭 乳香 没药各一两

【用法】上为末。酒调下。

【主治】打扑伤损，折骨碎筋，瘀血肿痛，瘫痪顽痹，四肢痠疼，一切痛风。

【加减】骨折欲好之际，加自然铜(制)一两。

38102 红龙散

【方源】《幼幼新书》卷八引《谭氏殊圣》。

【组成】龙脑少许 朱砂半钱 龙齿二钱 天南星五钱(先须水浸七日，逐日换水，日满取出，切片，晒干，为末) 铅白霜三钱

【用法】上为极细末。每服一字，葱白、金银煎汤送下。连吃三两服，候惊汗出为妙。

【主治】小儿急慢惊风及四时伤寒，浑身壮热，唇口焦干，两目翻露，手足搐搦。

【宜忌】忌一切毒物。

38103 红龙散

【方源】《三因》卷二。

【组成】朱砂(别研) 五灵脂各半两 茯神(去心中木) 草薢各一两 全蝎半两 脑麝各一钱(别研)

【用法】上为末。每服二钱，酒调服。

【功用】开关窍。

【主治】中风。

38104 红龙散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】海金沙半两 朱砂二钱 脑 麝各半字 桂府滑石一两半

【用法】上为末。灯心汤调下。

【主治】小儿夹惊伤寒，额赤气粗，睡卧不安，及惊热，小便不通。

38105 红龙散

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】牙消一分(瓷盒子内固济，火煨通赤，先掘一地坑子，以甘草水洗令湿，纸衬药入坑子内一宿，取出研末) 朱砂(研)一钱 干蝎七个(微炒) 龙脑半钱

【用法】上为细末。每服半钱或一字，参苓汤调下。惊热者，冷水调下；热甚者，冷水研生地龙汁调下。

【主治】小儿壮热不解，及惊风热。

38106 红白丹

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】砒朱 鸡子清(调刷在猪血红纸上，晒干，烧灰)五分 雄黄 朱砂各一钱

【用法】上为末。吹少许。吐涎，勿令咽干。

【主治】小儿痘疹敷凉药不效，烂成深潭者。

38107 红白散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【异名】红绵散(《本事》卷五)。

【组成】白矾(熬令汁枯) 染胭脂各等分

【用法】上为细末。先以绵杖子缠去脓，用药半钱匕掺之。三两次即愈。

【主治】小儿耳聋，脓出久不愈者。

38108 红白散

《普济方》卷三六四。为方出《闫氏小儿方

论》，名见《卫生总微》卷十八“桃红散”之异名。见该条。

38109 红白散

【方源】《回春》卷五。

【组成】宫粉二钱 红碱一钱

【用法】上为极细末。用极辣葱捣汁和匀，烧酒调下。

【主治】心疼。

38110 红白散

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】辰砂 白矾各等分

【用法】三伏天内装入猪胆内，透风处阴干。每用一块，凉水研调送下。

【主治】中风痰厥，不省人事。

38111 红白散

【方源】《伤寒广要》卷八引《寿世仙丹》。

【组成】人中白 玄明粉各一钱 辰砂五钱

【用法】上为末。白沸汤或金银煎汤调下。

【主治】大烦大热，昼夜不退，神思昏迷，口干舌燥，一切热证，并瘟疫时症。

38112 红曲酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】红曲

【用法】浸酒煮，饮。

【主治】腹中及产后瘀血。

38113 红肉膏

【方源】《秘传外科方·李防御五痔方》。

【组成】辰砂一分 乳香半分（别研） 白矾一两 黄丹一分 巴豆三个 砒半两（用白矾铺底火煨，七分）

【用法】上为细末，每用二钱，斑蝥三个，香油一两，同煎至斑蝥、巴豆色赤为度，去二味，只用油调药末成膏。视痔大小贴之，一二日一次。换药至六七日，若焦黑则不用涂，未破用催药涂，已破用纸捻子任药入疮。

【主治】痔疮。

38114 红阳膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】麻油四两 黄占二两

【用法】上药烊化，候冷，加银朱三钱搅匀。摊贴。

【功用】呼脓去腐，润肌生肌。

38115 红豆丸

【方源】《医方类聚》卷一〇五引《施园端效方》。

【组成】丁香 胡椒 缩砂各二十一个 红豆十一粒

【用法】上为末，生姜汁为丸，如皂角子大。每服一丸，用大枣一个，去核，填药，面裹，慢火烧熟，空心细嚼，白汤送下，每日三次。

【主治】诸呕逆，膈气翻胃，吐食不止。

38116 红豆丸

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】麦蘖（炒） 半夏（汤泡七次） 砂仁 神曲（炒）各一两半 硃砂（醋化） 甘草 青皮（去瓢） 陈皮（去白） 郁金 红豆 藿香 棠球 蓬术各一两（煨） 良姜 荜茇各二两 丁香半两（不见火）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米饮或随物送下。病甚者日进三服。

【主治】飧泄。

38117 红豆散

《圣济总录》卷七十四。为《传家秘宝》卷三“玉粉散”之异名。见该条。

38118 红豆散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】麻黄根（炒）五钱 苦丁香五分 羌活（炒） 连翘（炒）各三分 红豆十个

【用法】上为细末。搐鼻。

【主治】湿气在头，头重如山。

38119 红豆散

【方源】《得效》卷九。

【组成】丁香 木香各三钱 缩砂 红豆 白姜 桂枝 陈皮 青皮 桔梗 胡椒各五钱

【用法】上为末。每服二钱，秋石汤调下。

【主治】身肿皮紧。

38120 红花丸

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】红花子一升(为末)

【用法】以好酒一升八合拌匀,晒干,再为末,用蜜和丸,如梧桐子大。空心服四十丸,用酒送下。或为散。每服三钱,空心用温酒调下。

【主治】妇人腹中血气刺痛,月事不通。

38121 红花汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】红花子一合(捶碎)

【用法】用水半升,煎百沸,去滓。分减服之。

【主治】①《伤寒总病论》:斑疮出不快。

②《准绳·幼科》:痘疮作渴。

【备考】《准绳·幼科》本方用红花或子,随意煎汤饮。

38122 红花汤

【方源】《永类铃方》卷二十一。

【组成】红花子 紫草茸各半两 蝉蜕一分

【用法】上咬咀。酒、水一中盏,煎,去滓温服。

【主治】小儿疮痘不出。

38123 红花汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】水芦花 茅香 红花 槐花 白鸡冠花各等分

【用法】水煎服。

【主治】诸般血病。

【宜忌】忌腥、滑、发气之物。

38124 红花汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】丝七(《痧症全书》卷下)、二十三号中孚方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】红花 蒲黄 青皮各一钱 香附四分 贝母二分 枳壳六分

【用法】水二钟,煎至七分,微温服。

【主治】痧证因子血瘀者。

38125 红花汤

《叶氏女科》卷一。为《胎产秘书·女科秘

要》卷三“红花散”之异名。见该条。

38126 红花汤

《叶氏女科》卷一。为《济阴纲目》卷二“行经红花汤”之异名。见该条。

38127 红花汤

【方源】《成方切用》卷十一。

【组成】升麻 前胡 桔梗 山楂 木通 荆芥 抚芎 甘草 灯心 红花 蝉蜕

【主治】小儿出痘疹,点如糖粳齐布,热甚口臭。

38128 红花汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】红花 琥珀 白芍 麝香 没药 当归 桂枝 桃仁 苏木

【主治】经行过期及不月。

38129 红花酊

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】藏红花一两 75%酒精十两

【用法】红花浸酒内七昼夜,去滓备用。外涂或用纱布蘸药罨包。

【功用】活血祛瘀,消肿止痛。

【主治】扭伤血肿,大面积灼伤,瘢痕。

38130 红花酊

【方源】《中药制剂汇编》。

【组成】红花五钱 当归四钱 赤芍四钱 紫草三钱 60%乙醇 500 毫升

【用法】将上药泡入乙醇内四至五天。局部按摩擦用。

【功用】活血,凉血,预防褥疮。

38131 红花酒

【方源】《医方考》卷六。

【组成】红花一两(炒)

【用法】清酒五爵,沃之温服。

【主治】产妇胞衣不下。

【方论选录】胞衣不下者,气弱而瘀血盈于胞也。故用清酒壮其气,红花败其瘀。

38132 红花散

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】红花一分 白矾一两(烧灰)

【用法】上为细末。每用少许纳耳中。

【主治】聤耳，累年脓水不绝，臭秽。

38133 红花散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】红花一两 诃黎勒三枚（兼核生用） 川朴消五两

【用法】上为粗末。每服三钱，以酒半中盏，水半中盏，煎至六分，去滓，入赤马通一合，温服，不拘时候。

【主治】吐血。

38134 红花散

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】红花 荷叶 姜黄各等分

【用法】上为末。加炒生姜，小便调下二钱。

【主治】伤寒产后，血晕欲绝。

38135 红花散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】干荷叶 牡丹皮 当归 红花 蒲黄（炒）各等分

【用法】上为细末。每服半两，酒煎和滓温服。如胞衣不下，另用榆白皮研末煎汤，调服半两。

【主治】妇人产后血晕，胞衣不下，血崩，月事不调，及远年干血气。

38136 红花散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】好红花（细擘） 苏枋木（捶碎） 当归各等分

【用法】上咬咀。每用一两，以水一升半，先煎花、木，然后入酒一盞，并当归再煎至半升，空心、食前分两次温服。二十服效。

【主治】妇人血膈，经脉不通。

38137 红花散

《普济方》卷二十五。即《中藏经·附方》“花红散”。见该条。

38138 红花散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】红花 连翘 当归 生地黄 紫草 大黄 甘草 赤芍药

【用法】加灯心、竹叶，水煎服。外以秦皮

汤洗眼。

【功用】《医宗金鉴》：清热散瘀。

【主治】小儿疹痘入眼，初觉眼中赤涩，疼痛泪出，怕日羞明难开，久发变为白膜。

【备考】《金鉴》本方用量：各五分。

38139 红花散

【方源】《胎产新书·女科秘要》卷三。

【异名】红花汤（《叶氏女科》卷一）。

【组成】红花 黄芩 苏木各八分 花粉六分

【用法】水煎，空心服。

【功效】推血下行。

【主治】妇人月经从口鼻出，五心发热，咳嗽气急。

【备考】先服红花散七帖，再服冬花散止嗽下气，不须五七帖即安。

38140 红花散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】红花一撮

【用法】酒一钟，煎数沸，入童便二盞，乘热灌下。

【主治】产后恶血上冲。

【加减】如去血过多，发晕者，加当归一两，川芎五钱煎服。

38141 红花散

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】当归一两 没药 红花 官桂 赤芍 苏木 青皮各二钱半

【主治】妇女血气。

38142 红花散

【方源】《名家方选》。

【组成】红花 忍冬各二钱半 黄芩 连翘各二分 槟榔一分半 木通 桔梗各一分 大黄三分

【用法】水煎服。

【功用】杀疳虫，消胎毒。

38143 红花散

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】头红花一两 真冰片五分 官桂（去粗皮）一钱 明朱砂一钱 白芷三钱 生

军五钱 当门麝四分 乳香五钱 儿茶二钱
全当归(晒干,研末)一两 血竭三钱 明
雄黄一钱 没药三钱

【用法】上药不见火,生研极细末,用瓷瓶封固收贮。每用三钱,一半用滴珠烧酒调敷伤处,血溢者不须敷;一半用黄酒冲服。如伤口较多者,外敷自宜加倍,伤轻者只须外敷,不用冲服。

【主治】金刃、跌打伤。

38144 红花散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】生香三钱 当归三钱 红花三钱
生地三钱 荆芥叶一钱五分 贝母一钱 茯苓二钱 黄柏二钱 菊花根三钱

【用法】内服。外用酒蜜捣菊花叶、芙蓉叶敷之。

【主治】足丫发及手丫发。

38145 红花散

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】红花一钱 归尾一两 没药二钱
苏本五分 甲珠一片 银花四钱 甘草五分

【主治】腿痛。

38146 红花散

【方源】《伤科方书》。

【组成】酒醉土鳖 醋煨古钱 炙乳香
炙没药 苏木节 巴霜各等分

【用法】上为末。一板一厘,水、酒调服。

【主治】刑杖伤。

38147 红花膏

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】水红花科一捆(熬膏一碗) 麝香三钱 阿魏三钱 血竭三钱 没药五钱 赤芍一两 当归一两

【用法】上为细末,入膏内搅匀,以青布摊贴患处。

【主治】癖疾。

38148 红吹药

【方源】《喉科紫珍集·补遗》。

【组成】熟软石膏五钱 生硬石膏三钱
冰片三分 朱砂二钱

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】口疮,咽喉实火。

【备考】本方为原书“三色吹药”之第一方。

38149 红吹散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】朱砂 2.5 克 月石 9 克 元明粉 9 克 乌贼骨 8 克 煅石膏 1.5 克 西瓜霜 3 克 冰片 1.5 克

【用法】以上各药逐次入乳钵内研成细末,装瓶,勿泄气。用吹药管吹入患处。

【功用】祛腐生新,利咽消肿。

【主治】口糜,口疳,舌碎,牙疳,咽喉病。

38150 红灵丹

【方源】《齐氏医案》卷六。

【异名】八宝红灵丹(《痧证汇要》卷一)、绛雪(《霍乱论》)、八宝红灵散(《慈禧光绪医方选议》)、红灵散(《中国药典》一部)。

【组成】明雄 朱砂 礞石 火消 月石各六钱 麝香 洋片各二分 佛金四十张

【用法】各制合研极细末,瓷瓶收贮,勿令泄气,轻重量用;或烧酒、冷水为丸,如梧桐子大。治感冒伤风,伤寒伤暑,用温茶送五丸;慢紧痧胀,稍冷茶下;中恶中毒,暴病五绝,将此丹水擦牙,下咽即活,重者三五丸,勿过,过服冷水解;九种心疼、腹痛、哮喘、痰嗽,温茶送下;牙痛,碎一丸放痛处;小儿急惊,五疳诸积,食伤饱胀,霍乱吐泻,用三丸或二丸,放舌尖上,和津嚼之,见麻,冷水吞,寒症用温茶;时症瘟疫,沿门传染,用银簪点大眼角中,男左女右;治一切痛疽疔毒,阴阳疮疖,痰核痰疱,以及蜂螫虫咬,初起未陷,用葱头酒煎加蜜开擦,阳疮加猪胆汁擦,吞下三五丸即消;妇女月经,或前或后,俱用黄酒送下五丸、七丸,取汗立效;佩之在身,不染瘟疫。

【主治】感冒伤风,伤寒伤暑,痧胀,中恶中毒,心疼腹痛,哮喘痰嗽,牙痛,小儿急惊,五疳诸积,食伤饱胀,霍乱吐泻,时症

瘟疫, 痈疽疔毒疮疖, 痰核痰疱, 蜂螫虫咬, 妇女月经不调

【宜忌】孕妇忌用。

38151 红灵丹

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】雄黄六钱 乳香六钱 煅月石一两 青礞石三钱 没药六钱 三梅三钱 火消六钱 朱砂二两 麝香一钱

【用法】除三梅、麝香外, 共研细末, 最后加三梅及麝香, 瓶装封固不出气, 备用。将药粉撒于一切膏药或药膏上, 再敷贴于患处。

【功用】活血止痛, 消坚化痰。

【主治】一切痈疽未溃者。

38152 红灵药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】滑石一两 银粉一两 轻粉一两 熟石膏四两

【用法】上为末。外用。

【主治】湿疹。

38153 红灵酒

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】生当归二两 红花一两 花椒一两 肉桂二两 樟脑五钱 细辛五钱 干姜一两

【用法】上药用 95% 酒精二市斤浸七天。用时以棉花球蘸药频擦。脱疽则涂擦患处以上的皮肤, 每日二至三次, 每次擦 20 分钟。

【功用】活血, 通络, 止痛。

【主治】冻疮未溃, 脱疽腐烂者。

38154 红灵散

【方源】《急救痧证全集》卷下。

【组成】辰砂一两 冰片二钱 明雄黄一两半 麝香二钱 蟾酥三钱

【用法】上为细末, 瓷瓶封固。临症茶调服一二分; 亦可吹鼻。

【主治】一切痧发, 胀痛呕泻。

38155 红灵散

《中国药典》一部。为《齐氏医案》卷六“红灵丹”之异名。见该条。

38156 红鸡膏

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】苏木一两 降香一两 当归五钱 川芎三钱 红花二钱 海藻六钱 海带六钱 夏枯草六钱 昆布六钱 连翘二钱 赤芍二钱 三棱五钱 莪术五钱 槟榔五钱 枳壳三钱 木香三钱 瓜蒌一个(全) 山甲二钱 皂刺二钱 银花六钱 元参六钱 香附四钱 橘红六钱 川贝四钱 南星四钱 半夏四钱 陈皮三钱 青皮三钱 桔梗二钱 牡蛎三钱 樟丹一斤半(后下) 香油三斤

【用法】先将香油熬开, 用红公鸡一个, 洗净, 油内炸枯, 再入上药炸枯, 去净渣, 入樟丹成膏; 候冷, 再加血竭(真)、儿茶、乳香(制)、没药(制)、阿魏各三钱(共研细末)入膏搅极匀, 装瓷罐, 埋地下, 去火毒。摊贴。

【主治】痰核, 瘰癧。

38157 红鸡膏

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】降香 全当归各四两 川山甲一两 血竭五钱 乳香 没药各一两 红公鸡一个

【用法】将公鸡去肉用骨, 用香油二斤炸五分钟; 再将降香、当归、川山甲下油五分钟; 再将血竭、乳香、没药下油, 共同炸黑取出; 再下章丹一斤收膏, 每张大的一两, 小的五钱。外贴患处。

【主治】筋骨疼痛, 麻木不仁, 跌打损伤, 妇女乳痈。

38158 红英丹

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】雄黄一分(细研) 朱砂一分(细研) 硫黄一分(细研) 天雄一分(生用, 去皮脐) 丁香一分 虎头骨一分(生用) 黄丹一分 赤小豆一升 麝香一钱(细研)

【用法】上为末, 拌匀, 用粟米饭为丸, 如小豆大。男左女右, 以绯绢系一丸于中指上。

【主治】劳疟。

38159 红枣丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】大红枣子四两（去皮核）

【用法】先煮红枣三滚，以枣汤洗净僵蚕，晒干为末二两，二味打和为丸。用红枣汤送下。

【主治】疮疖。

38160 红枣丸

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】红枣三斤

【用法】以杉木作柴煮之，煮熟剥皮去核，取烧过杉柴灰磨细末，和枣肉捣匀为丸，如弹子大。每日任意食之，不可间断，愈后再服一两月断根。外用虾蟆散。

【主治】杨梅结毒，疮毒满身，或服过轻粉及一切丹石隐药，致成结毒，穿顶穿鼻，溃烂不已，多年不愈者。

【宜忌】忌醋与辣椒，及一切发物半年。

【方论选录】红枣能解丹石之毒，杉木专祛湿热之侵。

38161 红枣散

【方源】《验方新编》卷一。

【组成】红枣四两（去核，烧枯） 明雄七钱五分（勿经火） 枯矾 真犀牛黄 牙色梅花冰片 铜绿（煅） 真麝香各一分

【用法】上为细末，收入瓷瓶，勿令出气。用时以红纸卷管吹入喉中，仰卧少时，吐出浓痰以多为妙；若烂喉痧，吹入过夜即安。

【主治】喉风，烂喉痧。

38162 红枣散

《囊秘喉书·医方》。为原书“紫袍”之异名。见该条。

38163 红枣膏

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】大红枣二个 乌梅一个 杏仁（去皮、尖）七粒

【用法】上药同捣为膏服。

【主治】妊娠心痛。

38164 红雨丹

【方源】《四圣悬枢》卷一。

【组成】柴胡四钱 黄芩 石膏 甘草

丹皮 生姜 元参 芍药各三钱

【用法】水煎，热服。覆衣，饮热稀粥，取微汗。

【主治】三日少阳温病，胸胁疼痛，耳聋，舌苦，咽干作渴者。

38165 红矾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】红矾（青矾半斤用纸包定，装入旧蒲鞋头内，又以一只上下合住，缚定，于炭火内煅通红为度，候冷取出即成） 香附各四两 猪苓 泽泻各二两 艾线一两（用醋一碗，罐内煮，取焙为末）

【用法】上药用陈米饭为丸，如梧桐子大，以四物汤料各一两，加木香三钱，研末为衣。每服五十丸，加至八九十丸，酒送下。

【主治】妇人黄肿。

38166 红矾散

《普济方》卷六十七。为原书卷三八一引《卫生家宝》“红铅散”之异名。见该条。

38167 红矾散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】大红枣（去核）五枚 明矾

【用法】将明矾纳入枣内，瓦上煅存性，研末。开水泡，炖热，时时润之。

【主治】烂眼弦，眼癬。

38168 红轮散

【方源】《永类铃方》卷二十。

【组成】牙消 寒水石（煅）各二两 麝香半钱 脑子半钱 朱砂二两 甘草一两（炙）

【用法】上为末。周岁儿一字，薄荷汤调下。

【主治】小儿惊热夜啼，涎壅心燥；并治中暑昏冒。

38169 红炉雪

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】滑石（飞） 礞石（煅）各五钱 硼砂二钱 牛黄 朱砂各五分 柿霜三钱 青黛一钱 冰片半分

【用法】上为末。淡姜汤调下。

【主治】痘疮自见点六七日，有痰者。

38170 红炉散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红东丹 12 克 煅炉甘石 12 克 血竭 12 克 象皮 12 克 松香 12 克 煅龙骨 12 克 氧化锌 125 克

【用法】上为细末，瓶贮。疮口清洁后，以毛笔蘸药涂之。再贴清凉膏。

【主治】下肢溃疡。

38171 红净药

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】红枣 绿矾 杏仁 胆矾少减白果肉

【用法】将红枣去核，嵌满绿矾，湿粗纸包裹，火内烧红透为度，勿令焦枯，取出，以杏仁等共打和研匀，阴干。临用时加黄柏、白芷、菊叶泡水同炖，取水洗净。

【主治】燥热眼癖。

38172 红油膏

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】凡士林十两 九一丹一两 东丹钱半

【用法】先将凡士林烊化，然后徐徐将两丹调入，和匀成膏。用时将药膏匀涂纱布上，贴患处。

【功用】防腐生肌。

【主治】溃疡不敛。

38173 红油膏

《中医皮肤病学简编》。为《外科全生集》卷四“红油”之异名。见该条。

38174 红油膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】红信 250 克 棉子油 2500 毫升 黄蜡 250~500 克

【用法】先将红信捣成细粒，与棉子油同放入大铜锅内，置煤球炉或炭火上，熬至红信呈桔黄色，离火待冷，取去药渣，再加温放入黄蜡（冬用 250 克，夏用 500 克）融化，离火，调至冷成膏。薄薄涂于患处一层。

【功用】润肤止痒。

【主治】银屑病，手癣，手足皲裂。

【宜忌】大面积银屑病勿用。

【备考】使用时先试涂一小片，观察有无过敏反应，如有反应即停用。

38175 红宝丹

《外科证治全书》卷五。为《仙传外科集验方》“洪宝丹”之异名。见该条。

38176 红柿粥

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】红柿不拘多少

【用法】下筛取汁，和糯米泔煮粥，和蜜尤好，任食之。或和粘米粉成泥，作粳团饼。

【功用】润心肺，止消渴，疗肺痿，清心热，开胃气，解酒热，安胃热，止口干，止吐血，补元气，补中益气。

38177 红药子

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】辰砂 乳香各四钱半（研） 硼砂一钱 明雄黄三钱 砒霜五钱 白矾六钱（火飞枯，研） 麝香三分 虢丹六钱

【用法】上为细末，入净锅内与黄蜡和匀。随疮孔窍大小深浅，临时作条子插入疮孔中，一日一换。约用三五次，令其毒肉净，却以膏药贴之。

【主治】痈疽，发背，毒肿，恶疮。

38178 红药膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生石膏 3500 克 樟丹 1500 克 芥子气 1 毫升 凡士林 5000 克

【用法】将芥子气缓慢滴入半凝固状态（30℃）的凡士林内，边滴边搅拌，然后加入生石膏及黄丹（均研极细末并过筛）。外用。

【主治】银屑病。

38179 红香粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红粉 5 克 冰片 4 克 薄荷脑 37 克 香脂 100 克

【用法】将红粉分为两等分，分别加入冰片及薄荷脑中，研细；把冰片、红粉加入香脂后，再加入薄荷脑、红粉，搅匀即成。外用。

【主治】酒渣鼻。

38180 红狮丹

【方源】《喉科指掌》卷一。

【组成】鹅不食草三分 北细辛六分 硼砂一钱五分 麝香一分 飞滑石二钱 朱砂一钱 通草一分 鸡内金五分(焙存性) 壁钱五分(炒存性) 青黛一钱 枯矾五分 冰片三分

【用法】上为细末。吹用。亦可吹鼻，作通关之用。

【功用】祛风消痰，清热败毒，消肿。

【主治】喉病，风症初起。

【加减】风痰不重，去细辛、鹅不食草，加青黛。

38181 红胜丹

《疡科捷径》卷上。为《医林绳墨大全》卷九“红粉霜”之异名。见该条。

38182 红桃丹

【方源】《外科十三方考》引《一壶天书》。

【组成】新出窑矿子石灰二两 银朱二钱 糯米若干粒

【用法】将石灰放新瓦上煨红，以碱水淬四五次，研细，加银朱一同入碱水调匀，再泡糯米在内。至米胀大如水晶色时，取米点疡上，日二三次，至愈为止。

【主治】马刀瘰癧未穿者。

【备考】此方腐蚀性极大，故点用时当极端注意，不可伤及好肉。

38183 红桃丹

【方源】《外科十三方考》引《一壶天书》。

【组成】新出窑矿子石灰四两 猫骨一具(煨存性) 白碱半酒杯 银朱三钱

【用法】上为细末，用冷水一碗，将药末投入搅匀，俟静置澄清时，再放糯米若干粒于药上，泡一宵。俟米胀如水晶色时，挑米点于患处。多点数次，其核自散。

【主治】马刀瘰癧未穿者。

【备考】此方腐蚀性极大，故点用时当极端注意，不可伤及好肉。

38184 红桃散

【方源】《幼幼新书》卷七引《婴童宝鉴》。

【组成】天南星二个(中心作窝，内入朱砂令满，用淡水调中心，末涂缝上，握地作坑，按天南星在坑内，灰盖定，以火烧，色变取出为末) 全蝎半分(末) 白附子(大者)一个 膩粉一钱

【用法】上为末。每服一字，用薄荷金银汤调下。

【主治】小儿体热夜啼，不乳食。

38185 红桃散

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】风化石灰一两(烧赤，细研为末) 朱砂一钱(细研为末，水飞)

【用法】上药都拌匀。用饭饮一大盏，入艾三五叶，煎二三沸，量轻重调一字或半钱与服。宜少用，多则难吃。

【主治】蛔虫心腹痛，发渴有时。

38186 红桃散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】石膏 寒水石各一两 脑 麝各半字

【用法】上为末。灯心汤调下，量大小加減服之。

【主治】小儿夹惊伤寒，头疼壮热，涎潮，惊悸多哭，气粗心烦；及治气壅，膈节不通。

38187 红莲散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】朱砂一钱 麝香一字 脑子少许 南星一两(姜汁浸一夕，煮干；皂角水一盞浸一夕，煮干；荆芥水一盞浸一夕，煮干。再焙)(一方有天麻一钱)

【用法】上为末。三岁儿服一字，薄荷汤调下。

【主治】小儿夹惊，咳嗽气急，体热惊悸。

38188 红铅散

【方源】《普济方》卷三八一引《卫生家宝》。

【异名】香矾散(原书同卷)、红矾散(原书卷六十七)。

【组成】绿矾不拘多少

【用法】上相矾色鲜明者入甘锅，用炭烧赤倾出，以好酒拌匀，再入锅，如此数遍，令色红，研作细末，入麝香少许。先以温浆水漱净，用指蘸药，有疳处擦之。

【主治】走马牙疳。

38189 红秫散

【方源】《普济方》卷二十六引《朱氏集验方》。

【组成】红秫黍根二两 篇蓄一两半 灯草一百根

【用法】上为散。每服五钱，用河水二盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】小便不通，上喘。

38190 红脩丹

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】赤石脂 干姜 肉豆蔻各一两

【用法】上为细末，白面糊为丸，如黍米大。每服十丸，食前米饮送下。

【主治】赤白痢久下不愈。

38191 红消散

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】红内消三钱 秦艽二钱 苍耳子三钱 紫花地丁五钱 石苇二钱 天花粉三钱 天门冬三钱 羌活二钱 炙甘草三钱 当归一两

【用法】水煎服。初发者二剂即消。

【主治】肩膈生阳痈。

【宜忌】已溃者忌服。

38192 红消散

【方源】《千金珍秘方选》引徐洵溪方。

【组成】炙蜈蚣（去头、足、尾） 血竭 水飞雄黄 乳香（去油） 没药（去油）各等分

【用法】上为极细末，生蜜为丸，如梧桐子大（以糯米粥为丸更妙）。薄荷汤送下一丸，重则三丸。

【主治】喉风，兼治无名肿毒。

38193 红消散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】樟水一两 银朱三钱

【用法】上为末，和匀收贮。用时以野菊花叶捣汁调搽。

【主治】游风丹毒。

38194 红润膏

《万氏家抄方》卷四。即原书同卷“白玉膏”加血竭一钱。见该条。

38195 红粉丹

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】龙脑（细研）一钱 南星（腊月酿牛胆中，百日内阴干者取末）一两 朱砂（细研，水飞） 坯子染胭脂 天竺黄末各一两

【用法】上研匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，人参汤化下。

【主治】小儿腑热，出疮疹不匀。

38196 红粉散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】蜜陀僧（煅） 龙骨各半两 胡粉二钱 铅丹一钱（炒紫色）

【用法】上为细末。搽去脓汁，用生油调涂，日三夜一。

【主治】粉铃疮，绕项赤烂多汁。

38197 红粉散

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】朱砂一钱 槟榔一钱 轻粉半钱

【用法】上为末。每服一字或半钱 薄荷煎汤调下。一服利，止后服。

【主治】小儿浑身虚肿，气喘不食。

【宜忌】忌生冷、坚硬之物。

38198 红粉散

【方源】《医方类聚》卷二六五引《烟霞圣效》。

【组成】轻粉 干胭脂

【用法】上为细末，无分两，以粉红为度。每用一二铤头，用儿孩乳汁同盛在小蛤蚧内，调匀，灌在耳中，侧卧。三二日一遍，其翳即退。

【主治】斑疹疳疮入眼，忽生翳膜。

38199 红粉散

《类证治裁》卷二。为《得效》卷九“止汗红

粉”之异名。见该条。

38200 红粉霜

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【异名】红粉(年氏《集验良方》卷六)、小升丹(《疡医大全》卷七)、三仙丹(《疡医大全》卷七)、红升丹(《疡科心得集·家用膏丹丸散方》)、红胜丹(《疡科捷径》卷上)、三仙升(《经验方》卷上)、三仙红升丹(《集成良方三百种》)。

【组成】水银 火消(晒干) 明矾(煨枯为末) 各一两

【用法】上药共和研匀一处。用小铁锅一口,烧去油净,将药安入中间,上盖圆瓷碗一个,覆密碗弦,上用大纸捻一条,水微湿,圈围封固,纸捻上再用筛尽香炉灰周围盖密,约有半碗高,再以香匙按紧。锅下架炭火,先文后武,升三炷线香为度,取起冷定,掀开盖碗,碗内药刮下即成。倘烧火时有些微烟气出,急将香匙按紧香灰,碗底须常以水刷之。用时以红粉霜少许掺于应贴膏药上,略烘热贴之,次日即收口。

【功用】①《医林绳墨大全》:生肌长肉收口。②《疡医大全》:提脓生肉。

【主治】脓疮,一切疮疡不愈者。

38201 红浆水

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】干胭脂一钱 铁浆水六钱

【用法】上药都拌匀。

【主治】天行眼。

38202 红娘丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】红娘子 福矾(枯) 全蝎 真石灰各等分

【用法】先将饼药盛于盏内,火上煎,候微沸即投石灰,次投诸药末即为丸,微干。以绵包丸安患处。

【主治】虫牙。

38203 红雪汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】红雪三分 赤马通三块 童子小便五合 生地黄汁一合

【用法】先以小便、地黄汁浸马通,绞取汁,再下红雪煎令消,分温二服。

【主治】产后血晕,烦闷,不识人,狂乱。

38204 红雪散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】红雪一两半 赤芍药半两 茜根半两(锉) 桂心一合 生干地黄一两 红兰花三分

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妇女脚气,脏腑气壅,胸膈满闷,脚膝烦疼。

【备考】方中桂心一合,《普济方》作“一两”。

38205 红雪散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】黄柏 黄连各一两半 黄丹三分(隔纸炒) 轻粉二钱

【用法】上为末。外用。

【功用】敛疮口,长肉

【主治】疮口溃后,烂肉、瘀脓日久不尽。

38206 红雪煎

《圣济总录》卷一一九。为《圣惠》卷九十五“红雪”之异名。见该条。

38207 红眼药

【方源】《中医眼科学》。

【组成】朱砂 生月石 制炉甘石 海螵蛸 冰片

【主治】胬肉攀睛。

38208 红铜片

【方源】《外科传薪集》。

【组成】硫黄四两 明矾二钱 红砒五分 土朱一钱

【用法】上为细末,将药入锅内熔化,倾出,做成锭子。每用以毛毡用香油磨下,涂疮上。

【主治】油脓瘰疮。

38209 红绵丹

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】蝎梢(炙黄) 辰砂各二钱半 牛黄一钱(另研) 赤足蜈蚣一条(酒浸,炙黄) 天南星(姜汁浸泡) 冰片 麝香各二分半 蛇含石(火煨,醋淬)半两

【用法】上为末,米糊为丸,如鸡头子大,金箔为衣。量儿大小,一岁半粒,薄荷汤磨化服,不拘时候。

【主治】小儿急、慢惊风,手足抽掣,目直涎壅,壮热气粗,及胎痫中风。

38210 红绵散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《灵苑方》。

【组成】麻黄半两 干蝎七个 天麻 甘草各一分(并干焙)

【用法】上为末。每服一钱,红绵一片,掺药于绵上,加生姜一片,大枣半个,同煎至半盏,去绵、姜、枣,冷服。

【功用】解表。

【主治】小儿伤寒壮热。

38211 红绵散

【方源】《圣济总录》卷二二。

【异名】红棉散(《普济方》卷六十九)。

【组成】柳絮一两 麝角(镑,煮过,焙)半两 海蛤(红者)半两 丹砂(研)半两 紫石英(研)半两 龙脑一两 白石英半两 凝水石(研)一两

【用法】上为散。每服半钱匕,揩牙良久漱口,不拘时候。

【主治】牙齿宣露疼痛,并齿浮动。

【备考】《普济方》有麝香、丹参,无麝角、丹砂。

38212 红绵散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《家宝》。

【组成】麻黄(去节,焙) 全蝎(炒) 甘草(炙) 大黄(湿纸裹,炮令熟,切,焙) 白附子 苏木(炒) 天麻(生)各一钱

【用法】上为末。婴儿一字,二三岁半钱,四五岁一钱,水一药注或半银盏,绵胭脂些子同煎十数沸,如无绵胭脂,只用绵少许裹

药,煎如前法,候绵带红色,去绵与服。

【主治】小儿单伤寒及夹惊伤寒。

38213 红绵散

【方源】《幼幼新书》卷十四引丁时发方。

【组成】麻黄半两(去节) 天麻 蝎 甘草(炙) 人参 白术各半钱

【用法】上为末。每服半钱,水六分,加葱白一寸,红绵裹,煎至四分服。

【主治】小儿伤寒咳嗽,头疼壮热,面红尿赤。

38214 红绵散

【方源】《幼幼新书》卷九引丁时发方。

【组成】天麻(炮) 麻黄(去节)各一分 全蝎 破故纸各一钱

【用法】上为末。每用半钱,水六分,红绵少许,煎至四分,温服。

【主治】小儿急、慢惊风,痢疾,吐泻不定。

38215 红绵散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《刘氏家传》。

【组成】全蝎 人参 茯苓 天麻各一分 麻黄(去节)半两 大辰砂一钱

【用法】上为细末。每服一钱,水少许,加薄荷叶同煎十沸,温服。

【功用】镇心。

【主治】小儿夹惊伤寒,吐逆躁闷,热渴,夜啼不睡。

38216 红绵散

《本事》卷五。为《圣济总录》卷一八一“红白散”之异名。见该条。

38217 红绵散

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】白僵蚕(去丝嘴)二两(炒) 天麻一两 天南星二两(切薄片,油焙黄) 苏木节二两半(别研)

【用法】上为细末。每服一钱,水一小盏,入绵少许,同煎至五分盏,去滓温服。

【主治】小儿风湿体热,头目不清。

【加减】伤风有表证发热者,加去节麻黄半钱;有里热,心躁烦渴者,加滑石末半钱。

【备考】《三因》有白术。

38218 红绵散

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】朱砂(研,水飞) 郁金 轻粉各一分 马牙消半两 麝香少许

【用法】上为细末。每服半钱,薄荷蜜水调下,不拘时候。

【主治】小儿大小便不通。

38219 红绵散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】信砒一钱 坯子胭脂三钱 麝香一字

【用法】上为末,以柳絮滚和匀。每用黄米少许,掺入耳中。如绕耳生疮,脓汁不愈者,以此敷疮上,纸片封之。

【主治】小儿聤耳,内生疮,或有脓汁。

38220 红绵散

《百一》卷十。为方出《阎氏小儿方论》,名见《卫生总微》卷十八“桃红散”之异名。见该条。

38221 红绵散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】全蝎(焙,去毒) 天麻(细锉,用好酒浸一宿,焙干) 天南星(炮,大者,取净) 各半两 麻黄七钱(去节) 人参(去芦) 一分(洗净,焙) 白附子二只(炮) 朱砂五钱(好者,入诸药杵和)

【用法】上为细末。一二岁每服用小半钱,三四岁每服一小钱,水用一灯盏,四岁用水小半盏,用白绵约一皂子大同煎,候绵色转红为度,却去绵不用,只服药汁。如发或惊搐紧,无时与服;如夹惊伤风,一日二服,申时临卧进两服,须臾即愈。

【主治】小儿夹惊伤风,浑身壮热,睡卧多惊,眼目上视,潮搐不定;并治一切惊风。

38222 红绵散

【方源】《普济方》卷三七〇引《傅氏治婴》。

【组成】天麻 人参 白附子 苏木 防风 羌活 荆芥 麻黄(去节) 全蝎(炒) 僵蚕 红花 紫草 茯苓 朱砂 麝

香 南星 甘草

【用法】上为散。每服一钱,加薄荷,金、银环,用绵子裹定同煎,以绵红为度。

【主治】小儿急惊初作,潮热发搐,手足拘掣,口眼斜,手身反张。

38223 红绵散

【方源】《普济方》卷五十五。

【异名】红散。

【组成】枯矾二钱 胭脂半钱 炉甘石(研)二钱 麝香少许

【用法】上为细末。用棉子缠缴耳中,令脓汁尽,别用绵子蘸药入耳;或干吹少许亦可。

【主治】聤耳出脓及黄汁。

38224 红绵散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】天麻 白附子 全蝎(去足) 僵蚕(炒,去丝嘴) 大黄(炮) 麻黄(去节) 甘草(炙) 朱砂 苏木(炒) 南星(炮) 各等分(一方无朱砂)

【用法】上为末。每服半钱,红绵少许,水半盏,煎至三分服。

【主治】小儿夹惊伤寒,头疼壮热,心烦气粗,惊悸。

38225 红绵散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【异名】天麻散(《奇效良方》卷六十五)。

【组成】天麻(炮) 荆芥穗各三钱 甘草(炙) 麻黄(去节) 各二分 全蝎七个

【用法】上为末。薄荷三叶,紫草三寸,入酒三五滴,同水煎,热服。如痘未出,再进一服,如二服不出,即非痘证。

【主治】小儿伤风伤寒,麻痘身热,发搐,疑是痘证。

【宜忌】《奇效良方》:有汗者不可服。

38226 红绵散

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【组成】全蝎五个(去毒) 麻黄(去节) 僵蚕(炒,去嘴) 川芎 白芷 天麻各二钱 甘草一钱 苏木一钱 桔梗二钱(一方

有防风、羌活、白附子、蝉退、茯苓、藿香、随加减)

【用法】上锉散。每服二钱，用绵包裹。煎服。

【功用】退热化痰。

【主治】伤风咳嗽，鼻塞流涕；亦治乳嗽。

【加减】有热，加荆芥。

38227 红绵散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】人参二钱半 天麻(洗) 僵蚕(炒) 麻黄(去节) 全蝎(去毒)各二钱 甘草(炙) 辰砂一钱半(另研)

【用法】上为末，然后入朱砂和匀，再研极细。每服半钱，用水半盏，煎数沸，入干胭脂少许，再煎一沸，候温服，不拘时候。

【主治】小儿四时感冒寒风，遍身发热，或变蒸诸惊，胎惊、丹毒等热，及急、慢惊风。

38228 红绵散

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】全蝎 天麻 苏木 麻黄 荆芥 朱砂 僵蚕 南星 干葛 胭脂各等分

【用法】绵包，加生姜、薄荷，水煎服。

【主治】小儿乳嗽。

【加减】有热，加防风。

38229 红绵散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【异名】红棉散(《医门八法》卷三)。

【组成】海螵蛸 枯矾各一钱 麝香一字 干胭脂五分

【用法】上为末。用管吹入耳中。

【主治】聾耳有脓及黄水。

38230 红绵散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】全蝎 麻黄 紫草 荆芥穗 蝉蜕 天麻 甘草 薄荷各等分

【用法】上锉。水煎，表证明显者调服六一散，痰甚者调服抱龙丸。

【主治】小儿外感风寒，发热惊搐。

38231 红绵散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】全蝎(炒) 天麻 蝉蜕 薄荷 甘草 紫草 防风 荆芥 羌活 僵蚕

【用法】上为末。白汤调服。

【主治】痘疹感寒发热，惊搐。

38232 红绵散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】煅龙骨 枯矾各三钱 海螵蛸 胭脂各一钱(烧灰) 飞丹二钱 冰片三分

【用法】上为细末。先以绵纸挽去脓，后吹之。

【主治】聾耳出脓。

38233 红椒丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】灵砂一两(细研) 人参 木香各二钱半 大香附子(杵净) 大红椒(去合口并子，焙出汗)各半两

【用法】上为末，糕糊为丸，如麻子大。每服二十丸，空心橘皮汤送下。

【主治】虚劳喘嗽，眩晕。

38234 红椒丸

【方源】《普济方》卷一六〇。

【组成】川椒 干姜 款冬花 紫菀各一两 礞石 附子 细辛 皂角各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十粒，米饮送下。

【主治】肾咳，恶寒。

38235 红棉散

《普济方》卷六十九。为《圣济总录》卷一二一“红绵散”之异名。见该条。

38236 红棉散

【方源】《寿世保元》卷六。

【异名】通耳红棉散(《全国中药成药处方集》兰州方)。

【组成】枯白矾五分 干胭脂粉二分半 麝香少许 片脑一分 熟炉甘石五分(一方以蚌竹粉易矾甘石)

【用法】上为末。先以棉杖子搨干脓水，另将鹅翎管子送药入耳底。

【功用】《全国中药成药处方集》：止痒，止痛。

【主治】①《寿世保元》：聤耳生脓并黄水。
②《全国中药成药处方集》：耳聋，流脓，疼痛，红肿，流黄水。

38237 红棉散

《医门八法》卷三。为《丹溪心法附余》卷十二“红绵散”之异名。见该条。

38238 红棉散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】枯矾面十六两 棉胭脂二张 冰片五钱

【用法】将胭脂泡水，染枯矾晾干，加冰片和匀，共研细粉，过筛，装瓶重一钱。先以药棉蘸净脓水，再涂患处。

【功用】收湿拔干，消肿解毒。

【主治】耳疮，耳底肿痛，破流脓水，浸淫不已。

38239 红散子

【方源】《普济方》卷一〇四引《护命方》。

【组成】半夏（姜汁煮一百沸）四铢 白附子 附子（炮，去皮脐） 细辛 干蝎（用生薄荷三两碎切，同炒令干，去薄荷不用） 藿香 白僵蚕（去丝） 天南星 芎藭 羌活 防风各一分

【用法】上为细末，入轻粉二十个，朱砂、灵砂各三铢，麝香、龙脑各二铢，同研令匀。每服半钱，小儿一匙，薄荷汤调下。

【主治】一切风痰，倒卧昏闷。

38240 红散子

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】蔓陀罗子 草乌头尖 麒麟竭 茄子花 蓖麻子（去壳，细研）各半两

【用法】上为细散，以好酒调如膏。于疮口上涂摩之，箭头自出。

【主治】中箭头。

38241 红散子

【方源】《幼幼新书》卷十引《刘氏家传》。

【组成】川天南星二两（以面裹炮，面熟为度） 桔梗 大防风 白芷 干蝎（使糯米炒焦为度）各半两 麝香半铢 灵砂一分 脑子一铢 甘草一两（生熟各半）

【用法】上为细末，次入麝香、脑子、灵砂，乳钵内细研，拌匀。每服一钱，食后、临卧金银汤点吃。

【功用】常服压惊。

【主治】小儿壮热发惊，痰壅，脚手心热，烦躁夜啼。天钩风亦可常服。

38242 红散子

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】蝎一分 防风 桔梗 茯苓 甘草各一两 白芷半两 天南星 麝香一铢 龙脑少许 朱砂一分

【用法】上为细末。每服半钱，食后薄荷汤调下。

【主治】风疾惊搐。

38243 红散子

【方源】《三因》卷六。

【组成】黄丹（炒色变）

【用法】上入好建茶，合和二钱匕，病当发日早晨白汤调下；或不入茶，温酒调下。

【主治】诸症。

38244 红散子

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】土朱不拘多少

【用法】上为极细末。米醋调下，时时进一二服。

【主治】哮喘，呀呷有声，睡卧不得。

38245 红散子

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】茜根半斤

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】丹毒及土虺咬伤。

38246 红缎膏

【方源】《理渝》。

【组成】川椒三两 韭子 蛇床子 附子 肉桂各一两 独蒜一斤

【用法】真香油二斤浸药熬，黄丹收膏。再用倭硫黄六钱、母丁香五钱、麝香一钱、独蒜丸如豆大，朱砂为衣；或用硫黄、丁香、胡椒、杏仁、麝，枣肉为丸；或用胡椒、硫黄，黄蜡为丸，每用一丸纳脐眼上，外贴本膏。

【主治】男子精寒，萎弱，白浊，遗精；女子子宫虚冷，赤白带下。亦治寒泻。

38247 红蓝散

【方源】《幼幼新书》卷三十三引张涣方。

【组成】红蓝花（洗，焙干） 黄柏（锉）各一两 乌鱼骨 黄芩各半两（上为细末）雄黄（水磨细研）半两 麝香一分（细研）

【用法】上药都拌匀。以绵缠搨药，塞耳中，日再换。

【主治】小儿聾耳久不愈。

【备考】本方方名，《准绳·幼科》引作“红蓝花散”。

38248 红蓝散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】川芎 当归（洗，焙） 蒲黄各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盞，加荷叶心一片，黑豆三十粒，同煎至七分，温服，不拘时候。

【功用】调顺气血。

【主治】产后虚烦渴躁，或乳脉欲行，头昏寒热。

【备考】本方方名，《普济方》引作“红蓝花散”。

38249 红蔻散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】红蔻 苍术 羌活 陈皮 厚朴 槟榔 枳壳 香附各一钱五分 姜皮 白术 砂仁各一钱 甘草八分 玄明粉 酒军各二钱 乌药一钱

【用法】水煎，蜂蜜半杯兑服。

【主治】酒毒，脐下气胀痛，二便不通。

38250 红蜡丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】丹砂（研令极细） 粉霜 硫黄各一分（三味同研） 巴豆（取不破者去皮，微用油炒，热汤洗去油，拭干）半两

【用法】上研如膏，熔黄蜡一两半和匀，旋为丸，如黍米大。米饮下二三丸；暴注水泻、

赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下；妇人血气，红花酒送下。

【主治】诸积泻痢，暴气泻，及妇人血气。

38251 红膏药

【方源】《济生》卷八。

【异名】红膏（《普济方》卷三三四）。

【组成】沥青 白胶香各二两 黄蜡三钱

【用法】上药于铤内煎化，量用麻油三钱许煎，滤于水盆中，揉成剂收之。每用于水内捻作饼子，随疮大小贴之，上敷以纸。

【主治】软痈及恶疮，风湿所搏，浑身疼痛。

【加减】加当归一两于内，煎令黄色，滤去滓，于水盆内取出药揉成剂，再加乳香末二钱，和为乳香膏尤佳；其加青黛者，即名青金膏；其加黄丹者，即名紫金膏。

【备考】方中黄蜡用量原缺，据《医方类聚》补。

38252 红膏药

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】沥青四两 黄丹三两 黄蜡半两 小油一两 心红少许

【用法】上先将蜡、沥青、小油同熔开，绵子滤净，入丹、红，用铤子搅匀。

【主治】疮疡。

38253 红膏药

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】松香一斤（用葱、姜汁各一碗煮过，入烛油四两化匀，再入红矾四两搅匀，离火后，再入后药） 川芎 三赖 白芷 黄连 黄柏各五钱 乳香 没药 孩儿茶 血竭 轻粉各一钱半

【用法】上为极细末，入油内搅匀，收用。外贴患处。

【功用】呼脓拔毒。

【主治】诸肿毒疮疖。

38254 红膏药

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄蜡一两 香油三钱 黄丹五钱

【用法】先将黄蜡融化，次下香油、黄丹，搅匀，再熬成膏，瓷器收贮。外贴。

【主治】诸疮毒及汤火金疮等伤。

38255 红膏药

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】黄丹（飞炒）二两 乳香 没药 儿茶 血竭 朱砂 樟脑 水银各一钱 麝香 片脑各一分 黄蜡 水牛油 猪油各一两

【用法】上为末，先以蜡融化，次入油和匀，候冷入末搅匀。油纸摊贴，疔疮作隔纸膏贴之。

【主治】杖疮及疔疮。

38256 红膏药

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】松香五斤（童便内浸三个月，取出晒干。如不能三个月，可将松香熔化，倾入童便内，取出，又熔化，倾入童便内，如此九次，再换水煮过）

【用法】第一次用葱十斤，取汁三碗，入锅内将松香化开，入麻油四两，搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第二次用生姜十斤，取汁三碗，入锅内，将松香化开，入麻油二两搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第三次用绿豆一升，煮汁三碗，入锅内，将松香化开，入麻油二两搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第四次用火酒一斤，入锅内，将松香化开，入麻油二两搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第五次用好醋一斤，入锅内，将松香化开，入麻油二两搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第六次用苍术、闹羊花、川乌、草乌、光乌、天南星、半夏各二两，水二十碗，煎汁五六碗，入锅内，将松香化开，入麻油四两搅匀，倾入水盆内，以手扯拔取起；第七次复将松香入净锅内熔化，候各汁收干为度，然后下自煨矾红细末四两，搅匀成膏，入钵封固。摊贴。

【主治】左癱右瘓，筋骨疼痛，漏肩风，跌

打损伤。

38257 红膏药

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】银朱（水飞，晒干）一钱 蓖麻仁二钱 嫩松香五钱 黄丹（水飞，晒干）一钱 轻粉五分

【用法】共捣如泥。治疗疮，以银针将疔疮头挑破，用此药作一小丸，如黄豆大，安膏药上，当中贴之，疔即拔出；或畏疼者，不必挑破，即以此膏摊开，如钱大贴之亦可；凡无名肿毒已破未破，不必挑动，均照拔疔之法用之；铜铁等物入疮入肉，亦用此红药一小丸，加别膏药上贴之自出。瘰癧未破者，用此药一小丸，加别膏药贴在最大之瘰癧上，或贴初起之瘰癧上亦可，贴后痒而微疼，至第三日启去，另换此药丸与膏药贴上，换至数次后，皮自微破，用瘦猪肉煮汤洗之（不用盐），或用金银花煎水洗亦可，再换此药，丸与膏药贴之，每二日一洗一换，贴至数日，瘰癧之根即粘在膏药上（根浅者易出，根深者功缓），出后仍用肉汤洗之，其余邻近未破之瘰癧仍用此药丸与别膏药贴在已破之瘰癧原口，照前治之，可以一一后此而出，如未破瘰癧相隔尚远，或有筋膜隔住，即在未破之处贴之，候各瘰癧拔尽，另用生肌膏药贴紧数日，收口而愈。

【功用】拔毒收功。

【主治】疔疮瘰癧及一切无名肿毒，并铜铁竹木瓦石入疮入肉。

【备考】此药初贴稍觉作痛，烦躁，亦属无妨。

38258 红膏药

【方源】《外科传薪集》。

【组成】蓖麻子（去壳）二斤 老松香一斤 绛丹五钱 麝香二钱

【用法】先将蓖麻子研烂，加松香打和；再加麝香，再打；看老嫩，老者加蓖麻子，嫩者加松香。外用。

【主治】《青囊秘传》：汗毛疽及一切疔肿。

【备考】《青囊秘传》本方用法：隔滾水炖烱，摊小膏药贴之。

38259 红膏药

【方源】《外科传薪集》

【异名】外科至宝千捶膏。

【组成】老松香半斤 东丹三钱 银朱一钱

【用法】用蓖麻子去壳，打成胶。外用。

【主治】疮疡。

38260 红膏药

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）

【组成】松香一两 潮脑五钱 白芷 大贝各二钱 轻粉 银朱各一钱 蜈蚣四条 冰片五分

【用法】上为细末，放盆内，以火炖成膏。贴患处。

【功用】消肿杀菌防腐。

【主治】疔毒疮疡，结核瘰癧，脚气（脚泡炎），一切外伤化脓痛痒等。

38261 红面酒

【方源】《回春》卷四。

【异名】不老汤。

【组成】胡桃仁（泡，去皮）四两 小红枣四两 白蜜四两 酥油二两 杏仁（泡，去皮尖，不用双仁，煮四五沸，晒干）一两

【用法】先以蜜、油溶开入自造好烧酒一金华坛，随将三药入酒内浸三七日。每早服二三杯。

【功用】补益。

38262 红潮散

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】红罗一个 真轻粉三钱 潮脑一钱

【用法】共捣烂。填满疮内，外用布包定，七日开看，疮平而愈。

【主治】湿毒瘰癧。

38263 红薯粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】新鲜红薯半斤 粳米二至三两 白糖适量

【用法】将红薯（以红紫皮黄心者为最好）洗净，连皮切成小块，加水与粳米同煮稀粥，待粥将成时，加入白糖适量，再煮二三沸即可。趁热服食。

【功用】健脾养胃，益气通乳。

【主治】维生素 A 缺乏症，夜盲症，大便带血，便秘，湿热黄疸。

【宜忌】糖尿病患者忌食，平素不能吃甜食的患者，不宜多食。

38264 红燕丹

【方源】《医宗说约》卷五。

【组成】大石燕一雌一雄（每个重二两者佳，倾入银罐中，上下用炭火煨红，淬入好醋中，如此九次） 明朱砂三钱（另研，水飞） 红曲（洗净）一两

【用法】上为极细末。周岁者每服三分，糖拌，不拘时候。

【功用】消疳化积。

【主治】①《医宗说约》：小儿疳积丁奚，骨瘦如柴，目闭溺赤，或腹中疼痛，或溺如米泔。②《一盘珠》：诸疳虫痛。

【临证举例】疳积 予表侄二三岁间患疳积症，头大身瘦，发热，溺如米泔，诸药不效，后闻药气即吐，束手无策，偶遇异人传此方和予糖果粥饭中，与之数服痊愈，后以此济人，无不效矣。

38265 红霞散

【方源】《普济方》卷三七五引《全婴方》。

【组成】天浆子（二十个）一钱半 僵蚕半两 全蝎三钱 麝香一字 朱砂一钱

【用法】上为细末。二岁一字，日三服，煎麻黄汤调下。汗出是效。

【主治】小儿急慢惊风，潮作涎盛，进退不定。

38266 红藤煎

【方源】《中医外科学讲义》（1960年）。

【组成】红藤二钱 地丁草一两 乳香三钱 没药三钱 连翘四钱 大黄一钱半 玄胡二钱 丹皮二钱 甘草一钱 银花四钱

【用法】水煎服。

【功用】通腑清热，行瘀止痛。

【主治】肠痈初起未化脓者。

38267 红千捶膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】嫩松香 500 克 银朱 105 克 蓖麻子肉 300 克 炙乳香 炙没药各 36 克 麝香 2.4 克

【用法】先将蓖麻子肉捣烂，然后加松香、乳香、没药、银朱捣千多次，最后加麝香（研细）再捣匀成硬膏，放陶罐内收藏。用时隔水炖烊，摊厚纸上，贴患处。

【功用】提毒拔脓。

【主治】疔、疮、疖，头未溃者，鳃腺头（穿掘性毛囊炎）。

38268 红内消散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】红何首乌半两 远志（水浸，取肉，醋姜汁焙） 赤茯苓 川芎 北梗 苦参 赤小豆 赤芍药 蔓荆子 威灵仙各三钱 生甘草半两

【用法】上为末。每服二钱，加麦门冬十四粒煎汤调下。

【主治】痈疽内蕴热，外发热者。

38269 红内消散

【方源】《咽喉脉证通论》。

【组成】大蜈蚣（去头足，切断，同米炒，以米黑为度） 乳香（去油尽） 血竭（另研） 雄黄 象贝母 穿山甲（炒） 没药（去油尽） 辰砂（水飞净）各等分 麝香（拣去毛皮，干研）少许

【用法】上为细末。每服七分，小儿减半，和煎药同服；酒下亦可。

【主治】咽喉一切诸证，并无名肿毒，已溃未溃，均可使用。

38270 红内消散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】红内消 当归 茄片（或茄蒂） 甘草 羌活 黄芩各五钱 麝香五分

【用法】上为末。每服二钱，生地黄煎汤调服。

【主治】丹毒，毒气入里，腹胀欲死。

38271 红内消散

【方源】方出《本草纲目》卷十八，名见《医部全录》卷四一六。

【组成】红内消

【用法】上为末。用龟尿调，点背上骨节，久久自安。

【主治】小儿龟背。

38272 红水眼药

【方源】《普济方》卷八十二。

【组成】胡椒 萆薢 干姜 回回黑呵子 诃子皮 银朱各五钱 海螵蛸 牡丹皮 丁香各四钱 芦荟 硼砂各一钱

【用法】上为细末。每用少许点眼。

【功用】止泪，去瘀肉。

【主治】息肉淫肤。险眦息肉，胀起攀丝白睛，隐涩妨闷。

38273 红平安散

《北京市中药成方选集》。为《良朋汇集》卷五“人马平安散”之异名。见该条。

38274 红玉饮子

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】干胭脂半钱 绿豆粉三钱

【用法】上研匀。新汲水调下。只一服立止。

【主治】疮气呕吐，恶心不止。

38275 红玉锭子

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】砒霜一块（皂角子大） 黄丹（煨过）少许 鲁土二钱

【用法】上为细末，糊饼和作剂子。经牙。

【主治】一切牙疳。

【备考】方中黄丹、鲁土用量原缺，据《普济方》补。

38276 红玉锭子

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】干胭脂 白矾（枯）各三钱 轻粉 砒霜 黄丹 脑子 麝香各少许

【用法】上为极细末，稠糊和锭子用之。

【功用】去歹肉，生肌。

【主治】疮疡。

【备考】本方方名，《中国医家大辞典》引作“红玉錠”。

38277 红芍药散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】红芍药一两 川大黄半两 甘草半两 地黄一两（干者）

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，煎至六分，食后临卧温服。

【主治】脾脏热，唇焦口气，引饮不止。

38278 红芍药散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】紫菀 桔梗 红芍药 苍术各等分

【用法】上为末，羊肝四两，劈开掺药三钱，麻扎定，火内烧令香熟。空心食之。大效后，用白汤下。五服安康。

【主治】心病口疮。

38279 红肉药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】京红粉五钱 上肉桂面五钱 雄精一钱 煨珍珠一钱

【功用】回阳生肌，活血提脓。

【主治】阴症窦道，瘰管，脓疡，瘰病，鼠疮，以及附骨阴疽，久溃不敛者。

【宜忌】阳症窦道及对汞剂过敏者禁用。

38280 红血药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】京红粉五钱 利马锥五钱 轻粉五钱 血竭一钱五分 乳香二钱 蟾酥适量

【功用】解毒化腐，活血定痛。

【主治】阳症或半阴半阳症，疔痛已溃，脓腐未净，引流不畅者。

【宜忌】肉芽新鲜及对汞剂过敏者禁用。

38281 红衣大泡

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】莪术 槟榔 锅灰 鹤虱各一两 雷丸 使君子肉各一两 广木香五钱 黑白

丑头末八两

【用法】上为细末。每服五钱，广木香汤送下。

【主治】远年近日积痞虫瘕。

38282 红豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】红豆蔻半两（去皮） 萆薢半两 桂心半两 白术半两 当归半两（研，微炒） 人参半两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白豆蔻三分（去皮） 干姜半两（炮裂，锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 川椒（去目及闭口者，微炒去汗）三分

【用法】上为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服三十丸，以生姜汤送下，不拘时候。

【主治】腹痛体冷，呕沫，不欲食。

38283 红豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】红豆蔻（去皮） 木香 缩砂仁 槟榔（锉） 诃黎勒（炮，用皮） 藿香叶 各一两 陈橘皮（去白，炒）二两 胡椒一分 萆薢半两 茴香子（炒香）一两半

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、食前生姜汤送下。

【主治】一切气，饮食不消。

38284 红豆蔻汤

《圣济总录》卷四十六。为《圣惠》卷五“红豆蔻散”之异名。见该条。

38285 红豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】红豆蔻汤（《圣济总录》卷四十六）。

【组成】红豆蔻三分（去皮） 白术三分 桂心三分 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参一两（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 诃黎勒三分（煨，用皮） 黄耆三分（锉） 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】脾胃气虚弱，不能饮食，食即妨闷，四肢少力，疼痛。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

38286 红豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】红豆蔻一两（去皮） 木香（半两） 当归三分（锉，微炒） 桂心半两 高良姜一两（锉） 芎藭三分 诃黎勒半两（煨，用皮） 草豆蔻六枚（去皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 白术半两 神曲三分（微炒令黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，同煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】脾脏冷气，攻心腹疼痛，宿食不消，及腹胁胀闷，不思饮食。

38287 红花子汤

【方源】《幼幼新书》（古籍本）卷十八引张涣方。

【异名】紫草散（《杨氏家藏方》卷十九）。

【组成】红花子 紫草茸各一两 麻黄（去根节） 升麻各半两

【用法】上为细末。每服半钱，煎薄荷汤，入酒一滴，同调下。

【功用】平调疮疹。

【主治】①《幼幼新书》：疮疹已出未出。②《杨氏家藏方》：疮疹已出，色不红润，身热喘急，神志昏困。

【备考】本方方名，原书入卫本作“红子汤”。

38288 红花子汤

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】红花子五合

【用法】上药炒微熟，研碎，以水一升，煎取七合，每用一匙头，徐徐呷之。

【主治】产后中风烦渴。

38289 红阿胶丸

【方源】《医方类聚》卷二三四引《王岳产书》。

【组成】红阿胶半两（炙） 木香一分 人参一分 麝香四铢（研入） 茵桂一分（生用） 龙脑二铢（研） 虎骨十铢（酥炙） 海桐皮十铢 麻黄半两 黄耆半两 白藓皮八铢 附子半两（炮令析，去皮） 茯苓十铢（去皮） 当归八铢 白芷八铢 半夏八铢（姜汁煮，洗去滑） 芎藭半两 蝉壳二十一个 犀角一分 天南星八铢（酒浸一夕） 白僵蚕一分 羚羊角一分 防风八铢 白花蛇一两（酒浸，酥炙，去骨） 乌蛇一两（酒浸，酥炙，去骨） 蜈蚣二十一个（去首足，麸炒） 桔梗八铢（去头） 干姜四铢（炮） 天麻一分

【用法】上锉细，焙过，捣罗为散，炼蜜合和，却入臼内捣一千杵，为丸如弹子大。每服一粒，空心无灰酒研下。产后日常服一粒，保无疾。

【功用】保安五脏，出颜色，强筋力。

【主治】产后十日至百日内，一切风并血虚，及丈夫急中风，并瘫痪风。

38290 红定眼药

【方源】《普济方》卷七十七。

【组成】珍珠（水飞） 枇杷叶各四钱 李子树胶 可铁刺（无，以红粉代之） 没药各二钱 血竭一钱 咱甫兰一钱 红石扁豆一钱（回回地面红石，如扁豆者） 炼酥铜（入火，醋炒酥）八钱 红珊瑚四钱（水飞过，研细末为用）

【用法】上为细末，鸡子清为锭。以女儿乳汁调匀，磨药汁，无时点之。

【功用】去血丝，定痒。

【主治】目飞血赤脉，赤烂及暴发眼。

38291 红粉纱条

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】红粉末 25 克 朱砂末 6 克 玉红

膏 125 克

【用法】上药熔化,用纱布剪成不同大小的块片,浸药内,经高压消毒后备用。用时直接敷于溃疡面,外用纱布、胶布固定。

【功用】提毒去腐。

【主治】溃疡。

38292 红粉纱条

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】京红粉一两五钱 利马锥一两 冰片一钱 凡士林半磅

【用法】上为极细末,与凡士林调配成膏,涂于纱布条。敷于患处。

【功用】化腐生肌。

38293 红粉药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】京红粉

【用法】按需要长度剪成小段,用镊子夹持插入疮口内,于疮口外留约 0.5~1 公分长为度。

【功用】化腐提毒,去瘀杀虫。

38294 红粉霜丹

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】火消 枯矾 硼砂 水银 皂矾(煅)各一两

【用法】上为细末,入罐内,烧酒拌匀,炒至黄色,再入朱砂五钱、雄黄三钱,封口,打火文武三炷香,约有灵药一两,配朱砂一两,乳匀,用绢包好贴体带一月,再入瓶收固。每服五厘,不可多用,车前子煎汤送下。

【主治】大人、小儿一切风痰。

38295 红黑二散

【方源】《永类铃方》卷二十二。

【组成】当归 川芎 白芷 陈皮 赤芍药 牡丹皮 茴香 柳桂各一两 嫩松香(蒸过,去毛) 杜当归各四两 生地黄二两(研红末) 草乌(酒、醋炒) 自然铜(酒、醋淬)各一两 苍术 良姜 骨碎补(制)各二两 杜独活四两 柘木炭 松香(加倍,作黑末。二药各作末)

【用法】随病轻重打和,茴香汤或姜、葱、酒调,常合《和剂》石南丸兼服。

【主治】诸损。

38296 红樨咽方

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】樨子(红者)不拘多少

【用法】上一味,卧时细嚼,先以咽津,后尽咽滓,用新水吞下。如无新者,只欲红,阴干为末用之。

【主治】诸骨哽在喉不出。

38297 红蓝花汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【异名】红蓝花散(《鸡峰》卷十六)。

【组成】红蓝花 木通(锉) 牡丹皮各一两 当归(切,炒) 土瓜根各半两 甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,入葱白一寸,同煎至七分,去滓,空心、食前温服。

【主治】妇人经月不通,小便赤涩,身体疼痛。

38298 红蓝花汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】红蓝花 苏枋木各半两(锉)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎取七分,去滓温服,相次再服。

【主治】产后血下少,运闷呕逆。

38299 红蓝花汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】红蓝花 生干地黄(焙)各一两 诃黎勒皮(煨黄色)五枚

【用法】上为粗末。每服二钱匕,以水酒共一盞,煎至七分,去滓温服,如人行三二里,再服。

【主治】产后血晕,气乘虚上冲,心闷绝。

38300 红蓝花汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】红蓝花二两 紫葛一两 芍药一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,

煎至八分，去滓，再入生地黄汁半合，更煎六七沸，温服，不拘时候。

【主治】产后血晕，心烦闷。

38301 红蓝花汤

《普济方》卷三四八。即《圣惠》卷八十“红蓝花煎”。见该条。

38302 红蓝花饮

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】红蓝花二两 伏龙肝三两（以水五升五合浸，滤取汁） 犀角（镑）一分 甜竹茹三分 白茅根（锉） 麦门冬（去心，锉）各半两

【用法】上将伏龙肝汁煎诸药，取六合，去滓，食后分三服，每服更入乱发灰一钱匕，和匀服。

【主治】吐血不止。

38303 红蓝花酒

【方源】《金匱》卷下。

【组成】红蓝花一两

【用法】以酒一大升，煎减半，顿服一半，未止，再服。

【功用】《金匱玉函经二注》：破血通经。

【主治】①《金匱》：妇人六十二种风，及腹中血气刺痛。②《中国医学大辞典》：瘀症。

【方论选录】《金匱要略心典》：妇人经尽产后，风邪最易袭入腹中，与血气相搏而作刺痛。红蓝花苦辛温，活血止痛，得酒尤良，不更用风药者，血行而风自去耳。

38304 红蓝花酒

【方源】方出《外台》卷三十四引《近效方》，名见《妇人良方》卷十八。

【组成】红蓝花三两（新者佳）

【用法】以无灰清酒半升，童子小便半大升，煮取一大盏，去滓，候稍冷服之。留滓再以新汲水一大升煮之良久服。

【主治】①《外台》引《近效方》：产后血晕绝，不识人，烦闷。②《妇人良方》：产后血晕，言语错乱，恶血不尽，腹中绞痛，或胎死腹中。

38305 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】红蓝花一两 犀角屑三分 茅根三分（锉） 麦门冬三分（去心） 伏龙肝半斤（以水五大盏浸，滤取汁）

【用法】上为散。每服三钱，以浸伏龙肝水一中盏，加竹茹一分，煎至六分，去滓，不拘时候，温服。

【主治】肺壅热，吐血不止。

38306 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】红蓝花一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 诃黎勒皮三分 羚羊角屑三分 黄芩三分 刺薊三分

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，下赤马通汁半合，更煎一两沸，不拘时候，温服。

【主治】热病吐血，心胸不利。

38307 红蓝花散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】红蓝花二两 伏龙肝一合 甘草半两（生用）

【用法】上为细末。每服二钱，食后煎竹茹汤调下。

【主治】心肺热极，吐血不止。

38308 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】红蓝花二两 伏龙肝一升（以水二升半浸，滤取汁） 乱发灰一两 甜竹茹三合

【用法】上为散。每服三钱，以伏龙肝水一中盏，煎至六分，去滓，频频温服。

【主治】心热，吐血不止。

38309 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】红蓝花一两 柴胡一两半（去苗） 羚羊角屑一两 赤芍药一两 桑根白皮二两（锉） 槟榔二两 紫苏茎叶一两 红雪二两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】妇人脚气，心神烦闷。

【备考】方中红雪用量原缺，据《普济方》补。

38310 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】红蓝花一两 柴胡一两半（去苗）当归一两 生干地黄一两 赤芍药一两 鬼箭羽一两 虎杖一两 大腹皮一两（锉）麦门冬一两（去心）土瓜根一两 地骨皮一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】妇人热劳，羸瘦，四肢少力，经脉不通。

【方论选录】《济阴纲目》：方中赤芍、虎杖、土瓜根皆破血通经，腹皮、枳壳宽胸理气；其他不过清心凉血解热而已。

38311 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】红蓝花一两 甘菊花 当归（锉，微炒） 芎藭 蓬莪术 赤芍药 鬼箭羽 桂心各半两 牛膝（去苗） 刘寄奴 赤茯苓 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 羚羊角屑各三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】产后寒热头痛，手足烦疼，恶露不快，心腹刺痛。

38312 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】红蓝花半两 礞砂一分（细研）桂心半两 菴藟子半两 生干地黄半两

【用法】上为细散。每服二钱，空心以热酒

调下。相次服至三服，必下恶物。

【主治】产后，血瘀积结为块，腹中疼痛，虚胀。

【备考】愈后，如产妇将息，勿令劳动。

38313 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】红蓝花一两 蓖麻子一两 桔楼根一两 生干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉） 菰根一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】产后烦渴不止。

38314 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】红蓝花半两 琥珀一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 瞿麦半两 当归一两（微炒） 桂心一两 延胡索三分 赤芍药半两 姜黄半两 牛膝半两（去苗） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 蓬莪术半两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】产后月水不通，腹肋刺痛，面色萎黄，时发烦热，不思饮食。

38315 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】红蓝花一两 当归一两（锉，微炒） 蒲黄一两 桂心一两 赤鲤鱼鳞一两（烧灰） 没药一两

【用法】上为细散。每服一钱，不拘时候，以温酒调下。

【主治】产后血晕，心闷，恶血不下。

38316 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】红蓝花一两 当归半两（锉，微炒） 紫葛三分（锉） 赤芍药三分 蒲黄半两 桂心半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，

煎至五分，去滓，次入童便、生地黄汁各一合，更煎一二沸，不拘时候温服。

【主治】产后血晕，心闷，烦乱不识人。

38317 红蓝花散

【方源】方出《圣惠》卷八十，名见《普济方》卷三四八。

【组成】红蓝花三合 荷叶三合

【用法】上为细散。每服一钱，不拘时候，以生姜汁调下。

【主治】产后血晕，烦闷，气喘急，不识人。

38318 红蓝花散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】红蓝花一分 当归半两（锉，微炒） 琥珀一分 没药半两 桂心三分 蒲黄一分

【用法】上为细散。每服一钱，不拘时候，以热酒调下。

【主治】产后血不散，小腹疼痛。

38319 红蓝花散

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】红蓝花（微熬过） 男子发（烧灰） 墨（烧通红） 麒麟竭（研） 蒲黄（隔纸炒）各一分

【用法】上为散。每服二钱匕，以童便三四分调服之。

【主治】妊娠堕胎后，血不出，奔心闷绝，不识人。

38320 红蓝花散

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】红蓝花 荷叶蒂各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，生藕汁调下。

【主治】产后恶血不下，血晕不识人。

38321 红蓝花散

《鸡峰》卷十六。为《圣济总录》卷一五一“红蓝花汤”之异名。见该条。

38322 红蓝花散

《普济方》卷三四七。即《杨氏家藏方》卷十六“红蓝散”。见该条。

38323 红蓝花散

《准绳·幼科》卷九。即《幼幼新书》卷三十

三引张涣方“红蓝散”。见该条。

38324 红蓝花煎

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】红蓝花半两 麒麟竭半两 硃砂一两（细研） 当归一两（锉，微炒） 赤鲤鱼鳞一两（烧灰） 青蛙一枚（去肠肚，炙令焦） 桂心一两

【用法】上为末。先以醋五升，于石锅中煎令沸，入诸药末，同熬如膏，取出，于瓷合内盛。每服一茶匙，不拘时候，以温酒送下。

【主治】产后腹脏有恶血结滞，疔刺疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“红蓝花汤”。

38325 红避瘟散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】香排草三斤 零陵香 甘松各四两八钱 白芷 公丁香 玫瑰花各十一两二钱 广木香九两六钱 檀香二斤九两六钱 色姜黄四两八钱

【用法】上为细末，兑入麝香三钱六分八厘，冰片二斤四两八钱，薄荷冰二斤四两八钱，甘油四斤九两六钱，朱砂面十一斤零六钱四分，研匀，收贮勿令泄气，装瓶备用。每服一分，白开水送下。

【功用】清暑散风，通窍止痛。

【主治】四时不正，呕吐恶心；夏令受暑，头目眩昏；伤风头痛；晕车晕船。

【宜忌】孕妇忌服。

38326 红玉生肌散

《便览》卷四。即原书同卷“生肌散”加龙骨、儿茶各一钱。见该条。

38327 红白痢症丸

【方源】《广州市地方药品标准规格汇编》。

【组成】诃子十六两 乌梅肉十六两 茶叶二两四钱 鸦胆子（去油）十六两 木香二两四钱

【用法】茶叶单放，余药共轧为细粉，用方中茶叶煎水泛为小丸。每服六分至一钱，小儿减半，日服二至三次，食前用温开水或白

糖水送服。

【功用】清热止痢。

【主治】红白痢疾，腹痛水泻。

【宜忌】忌烟、酒、腥荤、油腻之物。

38328 红白痢疾丸

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】木香(煨)四两八钱 黄芩二两 甘草四两 白芍三两 黄连(用吴萸十两泡，炒，再去萸)二十两

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每日服二次，每服一至二钱，温开水送下。

【主治】红白痢疾腹痛，里急后重。

【宜忌】勿食生冷荤腥。

38329 红花升麻散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】升麻 芍药 干葛 红花 苏木 黄芩 麻黄(去节) 甘草各等分

【用法】上为散。水煎服。

【主治】小儿疹痘、麻子，潮热焦啼，烦渴，寒凝难出者。

38330 红花归尾散

《医统》卷八十四。为《女科万金方》“红花当归饮”之异名。见该条。

38331 红花四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】四物汤加红花

【用法】水煎服。

【主治】妇人臂疼，又如瘫痪。

38332 红花四物汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】熟地(砂仁末拌)三钱 当归(酒炒)二钱 白术(净) 丹参(酒炒) 白芍(酒炒) 香附(酒炒) 各一钱五分 红花六分 川芎五分

【主治】经脉气血凝滞而痛胀者。

38333 红花当归丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】马鞭草八两 刘寄奴八两(二味共熬膏为丸) 当归三两 赤芍 牛膝(酒拌) 川芎 香附(醋炒) 丹皮(去皮) 甘

草各一两五钱 红花 白芷各七钱 官桂六钱 紫葳 苏木各三两 枳壳(炒)一两

【用法】上为末，以前膏入小糯米粉打糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，酒红花煎汁，空心送下。

【主治】妇人血虚虚竭，经候不调，或断不来，积瘀成块，腰腹刺痛，肢体羸瘦。

38334 红花当归汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】红花 当归 红曲 赤芍药 牡丹皮 青皮 桃仁 郁金 楂肉 泽兰叶 黑山栀

【主治】血积上焦，内伤胸痛。

38335 红花当归汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】红花 当归 芍药 玄参 茯苓 半夏 陈皮 山楂 厚朴 甘草

【主治】妇人饱闷，手足心热，咽中有痰。

38336 红花当归汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【异名】红花当归散(《女科秘要》卷三)。

【组成】红花 当归 牛膝 苏木各一钱 川芎五分 枳壳六分(麸炒) 莪术 赤芍 三棱 芫花各八分

【用法】水煎，临卧服。

【功用】破瘀血。

【主治】经来未尽腹痛。经来一半，余血未尽，腹中作痛，或发热，或不发热，乃气血俱实也。

38337 红花当归饮

【方源】《女科万金方》。

【异名】红花当归散(《局方》卷九续添诸局经验秘方)、凌霄花散(《玉机微义》卷四十九)、红花归尾散(《医统》卷八十四)、调经活血汤(《郑氏家传女科万金方》卷一)。

【组成】红花 当归 赤芍 牛膝 紫葳 官桂 甘草 白芷 苏木 寄奴

【用法】水酒各半煎，食后服。

【功用】逐瘀血，通经。

【主治】《局方》(续添诸局经验秘方): 妇人血脏虚竭, 或积瘀血, 经候不行; 或断续不定, 时作腹痛, 腰胯疼重, 攻刺小腹坚硬, 及室女月经不通。

【宜忌】《局方》(续添诸局经验秘方): 有孕不可服。

【备考】《局方》(续添诸局经验秘方)本方用: 刘寄奴草五两、当归(去芦)、牛膝(酒浸)、甘草(炙)、紫葳、红花、苏木(一本作莪术)各二两 赤芍药九两 肉桂(去粗皮)、白芷各一两半。各为细末。每服三钱, 热酒调下, 空心、临卧各一服。若血久不行, 浓煎红花酒调下。

38338 红花当归散

【方源】《女科万金方》。

【组成】柴胡 陈皮各三钱 当归六钱 川芎 赤芍药 熟地各五钱 小茴香 枳壳 三棱 干漆各二钱 玄胡索 厚朴 香附 黄芩 白术 红花各三钱 甘草一钱五分

【用法】上药分作八帖服, 更服加味八物汤七八帖。

【主治】妇人三十二三岁, 连年生育, 败血过多, 血虚脾胃弱, 盛热, 以致经水不匀, 或一月、或四十日、或二月, 不时肚痛, 腹中结块, 饮食少进, 困倦, 潮热往来, 恶心烦躁。

【加减】遍身疼, 加羌活三钱; 泄泻, 加肉蔻、粟壳各二钱; 咳嗽, 加杏仁、五味、桔梗、苏叶各三钱, 气急亦然。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有牛膝、生姜, 无干漆。

38339 红花当归散

《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。为《女科万金方》“红花当归饮”之异名。见该条。

38340 红花当归散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗)八分 川芎 赤芍药 熟地黄 香附各六分 枳壳五分 玄胡索五

分 厚朴(姜炒) 小茴香(酒炒) 柴胡 陈皮 三棱(醋炒)各四分 莪术(醋煨)四分 牛膝(去芦)四分 红花三分 甘草二分

【用法】上锉。生姜水煎, 空心热服, 兼用八物汤。

【主治】妇人三十一二岁, 年年生育, 败血过多, 血虚胃热, 以致经水不匀, 不时腹中疼痛结块, 饮食少进, 困倦目眩, 潮热往来, 五心烦躁。

38341 红花当归散

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】红花 当归 肉桂 牛膝 赤芍各一两 紫葳 苏木各二两

【用法】上为细末。每服二钱, 酒调下。

【主治】妇人月经不至, 腰腿疼痛。

38342 红花当归散

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】红花二分 当归八分 川芎 赤芍 熟地 黄芩 香附(童便制) 玄胡索 厚朴(姜制)各五分 小茴香 柴胡 陈皮 莪术 三棱 牛膝各四分 甘草三分 姜二片

【用法】水煎, 空心服一剂; 除去三棱、莪术, 再服二三剂; 次服八珍汤。

【主治】妇人廿九三十岁, 连年生育, 气散血虚胃热, 或因劳伤, 以致经脉不和, 或二、三月不行, 不时腹痛, 结成血块, 日倦夜热, 饮食不思, 此血虚胃热, 或由劳伤而致也。

【加减】如恶心、呕吐, 加砂仁、良姜各二分; 泄泻, 加肉豆蔻(煨)、粟壳各四分; 遍身痛, 加羌活、独活各四分; 咳嗽气急, 加杏仁(去皮尖)、五味子、桔梗、苏叶各四分。

38343 红花当归散

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】当归 红花 桃仁 玄胡 川芎 小茴 郁金

【用法】水煎服。

【主治】妇人经闭, 气血凝滞, 腹中结块,

腰腿重疼者。

38344 红花当归散

《女科秘要》卷三。为《叶氏女科》卷一“红花当归汤”之异名。见该条。

38345 红花血竭丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】没药半两（别研） 当归一两（酒浸一宿，焙干为末） 滴乳香（别研） 血竭（别研） 琥珀（别研） 各二钱半

【用法】上药并研匀，以红花二两，酒半升，熬红花色淡，滤去滓，再将红花酒熬成膏，搜和药末，丸如梧桐子大。每服十五丸，空心、食前煎枇杷叶汤送下。

【主治】妇人冲任不和，血海虚冷，经候不通，结成坚块，时作腹痛。

38346 红花苍柏丸

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《医部全录》卷一九三。

【组成】红花 牛膝（俱酒洗） 生地黄 黄柏 苍术 南星 龙胆草 川芎各等分

【主治】妇人足胫肿。

【备考】《医部全录》本方用法：上为末，酒糊为丸服。

38347 红花苏木汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】苏木 红花 桃仁 穿山甲 玄胡索 牡丹皮 红曲 香附 番降香 麦芽 通草 山楂 蒲黄 赤芍

【用法】加酒、醋、韭汁，水煎服。

【主治】因跌扑、负力，或大怒，或饮热，或吐衄血不尽，以致死血留于胁下，胃脘、腹中作疼，痛有常处，一块不移，日轻夜重，喜热恶冷，口干，或口中血腥气，午后微热，脉粗涩或芤者。

38348 红花胜金散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】红花 菊花 枳壳 茯苓 川芎 羌活 羚羊角 当归 款冬花 茂 红芍药 乌蛇 桂

【用法】上为细末。每服二钱，炒小麦酒调

下，不拘时候。

【主治】血虚寒热，头目昏眩，手足疼，心腹痛。

38349 红花活血汤

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】当归 川芎 桃仁 红花 苏木 乳香 没药

【用法】入韭汁半钟，水煎服。

【主治】胃中死血作痛。

38350 红花桃仁汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄柏一钱五分 生地黄一钱 泽泻八分 苍术六分 当归梢 汉防己 防风梢 猪苓各五分 麻黄二分 红花半分 桃仁十个

【用法】上锉，如麻子大。水三盏，煎至一盏，去滓，稍热、食前服之。

【功用】补北方，泻中央。

【主治】痔漏经年。因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。

【备考】《医学正传》有麻仁，无麻黄。

38351 红花桃仁汤

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】生地 当归 红花 防风 猪苓 各五分 苍术六分 泽泻八分 麻黄二分 黄柏一钱五分 木香二分

【用法】白水煎服。

【功用】补北方，泻中央。

【主治】痔漏如勾肠莲花、菱角翻花、珊瑚盘肠等痔，年久不愈者。

【备考】本方名红花桃仁汤；但方中无桃仁，疑脱。

38352 红花桃仁汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】大黄 枳壳 厚朴 桃仁 红花 赤芍药 当归尾

【主治】内伤死血停滞胁肋，胁肋作痛，或左或右，或左右皆痛，或左右攻冲，或时痛时止，或常痛不休，脉两关芤涩。

38353 红花桃仁汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】红花 桃仁 当归尾 赤芍药 泽兰叶 楂肉 丹皮 山梔

【主治】血分素热，又喜辛辣之物，伤其阴血，停积于中，而成内伤死血胃脘痛，日轻夜重，成唧唧作声，得寒则痛，得热暂缓，脉涩结。

38354 红花桃仁汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】红花 桃仁 赤芍药 当归尾 秦艽 独活

【主治】瘀血停滞，内伤腰痛，日轻夜重，痛定一处，不能转侧，尺脉扎涩。

38355 红花桃仁汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】红花 桃仁 丹皮 楂肉 赤芍药 泽兰 归尾 红曲

【主治】外感内伤吐血，血紫成块，胸痛；上焦蓄血，血臌腹胀不减，紫筋血缕在上者。

【加减】大便结，加酒煮大黄；血臌胸痛，加郁金，甚加韭汁；血臌胁痛，加青皮，甚加枳壳。

38356 红花桃仁汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】红花 桃仁 赤芍药 当归身

【功用】行血活血。

【主治】蓄血。

【加减】加山楂、香附，以散凝结；加山梔，以散热结；加韭汁，以散寒结。

38357 红花桃仁煎

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】红花 当归 桃仁 香附 延胡索 赤芍 川芎 乳香 丹参 青皮 生地

【功用】行血顺气。

【主治】妇人月水不通，瘀血凝滞。日久不治，则成癥瘕，有热结下焦而经闭者，有寒袭胞门而经闭者，此症必时时作痛，或少腹板急。

【加减】热，加酒炒大黄；寒，加肉桂、熟

艾。

【方论选录】是方红花、桃仁、青皮、延胡索、乳香皆行血；而四物养血，改生地、赤芍凉血破血；丹参去旧血生新血，必用香附佐之者，以行三焦也。

38358 红花散瘀汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归尾 皂角针 红花 苏木 僵蚕 连翘 石决明 穿山甲 乳香 贝母 各一钱 大黄三钱 牵牛二钱

【用法】水、酒各一碗，煎八分，空心服。行五六次，方吃稀粥补之。

【主治】鱼口便毒。因入房忍精，强固不泄，以致瘀精浊血凝结两胯或小腹之旁，结成肿痛，小水涩滞者。

38359 红桃四物汤

《医级》卷七。即《玉机微义》卷三十一引《元戎》“加味四物汤”。见该条。

38360 红铅造化丹

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】红铅二钱 人参 茯苓 山药各一两 甘草(炙) 枯矾各五钱 辰砂 寒食面各七钱五分 麝香八分 冰片六分 乳粉二钱(用头生男乳，每盘内用一小钟，晒干，共收用之)

【用法】上各研精细，方为一处共再细研；用白蜜二两，再同头生男乳一大杯，慢火重汤内用瓷碗顿蜜，滴水不散为度；候稍温而入前药，软硬得宜，为丸如龙眼核大，金箔为衣，瓷罐收用，或以蜡固亦妙。每用一丸，好热酒一杯化药，食远服之。用厚绵帛复暖患上，其热如蒸，疮必复起作痛，乃此丹之效也。大率心经之病石菖蒲，肝经之病用远志，脾经之病用生姜，肺经之病麦门冬，肾经之病五味子，各随五经之症，用五引煎汤化服。

【主治】痈疽元气不足，软陷不起发，或已发复被风寒内外所侵，以致疮毒下陷，变为阴塌不痛者，急宜服此；亦可转阴为阳，返

出毒气，复肿为吉；诸症呕吐、怔忡、泻痢，屡药不愈，异症并效。

38361 红粉生肌膏

【方源】《中医外科学》。

【组成】红粉5克（又名红升丹） 朱砂15克 生肌膏80克

【用法】上药均匀调成膏，加消毒纱布制成。外用。

【功用】化腐生肌。除去痠管管壁瘢痕组织及不良肉芽组织。

【主治】慢性顽固创面久不愈者。

38362 红黄霹雳散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白术五钱 薏仁九钱 芡实五钱 人参五钱 茵陈三钱 白芥子三钱 半夏三钱 泽泻三钱 附子一钱 黄芩三钱

【用法】水煎服。

【主治】遍身生疙瘩，或内如核块，或外似蘑菇、香草、木耳之状者。

38363 红雪通中散

《局方》卷六。为《圣惠》卷九十五“红雪”之异名。见该条。

38364 红雪通中散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】大青（别研）一两 消石五斤（煎药后下） 丹砂（别研）半两 桑根白皮一两 羚羊角（镑）半两 苏枋木二两 梔子仁十五枚 槐花一两 升麻一两半 淡竹叶一握 诃黎勒十五枚（去核） 大腹 槟榔各五枚（锉）

【用法】上药除别研丹砂、大青外，余为粗末，用水一斗浸一宿，煎至五升，去滓，入银石锅，即下消石、丹砂、大青，不住手搅，候减尽水，即成红雪。置瓷器中，三日取出，捣罗为末，却用瓷瓶子盛，不得泄气。每服二钱匕，小儿半钱匕，临卧用温水调下。

【主治】风疾，及一切滞闷不通，亦治伤寒。

38365 红绵龙骨散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】枯矾五分 龙骨五分 麝香五分 红绵灰三分（如无红绵，即用干胭脂灰）

【用法】上为末。先用绵球搅去脓秽，以药吹之。

【主治】耳溃。

38366 红蓝花饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】红蓝花半两 紫葛半两（锉） 赤芍药半两（锉） 生地黄汁三合（后下） 童子小便二合（后下） 蒲黄半两

【用法】以水一大盏，酒半盏，煎至八分，去滓，下地黄汁并小便，更煎三两沸，分温三服，不拘时候。

【主治】产后血气攻心，烦闷，气欲绝，不识人。

38367 红霞鹤顶丹

《青囊秘传》。为《良方汇录》“红霞鹤顶方”之异名。见该条。

38368 红霞鹤顶方

【方源】《良方汇录》。

【异名】红霞鹤顶丹（《青囊秘传》）。

【组成】血竭 儿茶 乳香（去油） 没药（去油） 银朱 铅粉各二两

【用法】上为细末。用时将麻油调，摊油纸上，油纸以针刺孔，贴于患处，外加膏药盖之。

【主治】痈疽发背，搭手，对口，肿毒。

38369 红花白芷防风饮

【方源】《医学从众录》卷七。

【组成】红花 白芷 防风各五钱 威灵仙三钱

【用法】酒煎服。取汗，三服全愈。

【主治】历节，四肢疼痛。

约

38370 约阴丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归 白术（炒） 芍药（酒炒） 生地 茯苓 地榆 黄芩 白石脂（醋煨，淬） 北五味 丹参 川续断各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【功用】《会约》：清热止血。

【主治】①《景岳全书》：妇人血海有热，经脉先期或过多者；或兼肾火而带浊不止；男、妇大肠血热便红等证。②《会约》：酒毒，湿热下血。

【加减】火甚者，倍用黄芩；兼肝肾之火甚者，仍加知母、黄柏各等分；大肠血热便红者，加黄连、防风各等分。

【备考】本方改为煎剂，名“约荣煎”（见《会约》）。

38371 约荣煎

《会约》卷十一。即《景岳全书》卷五十一“约阴丸”改为煎剂。见该条。

38372 约营煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 芍药 甘草 续断 地榆 黄芩 槐花 荆芥穗（炒焦） 乌梅二个

【用法】水一钟半，煎七分，食前服。

【主治】血热便血。无论脾胃、小肠、大肠、膀胱等证，皆宜用此。

【加减】如下焦火盛者，可加栀子、黄连、龙胆草之属；如气虚者，可加人参、白术；如

气陷者，加升麻、防风。

38373 约营煎

【方源】《会约》卷十一。

【组成】苍术 白芍 甘草 续断 地榆 黄芩 槐花 荆芥各一钱 升麻八分 乌梅二个

【主治】湿热下坠，疼痛肛脱。

【加减】如血热而燥者，去苍术，加生地。

38374 约精丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】白龙骨二两（研细） 新韭子（冬霜后采者）一斤（好酒浸一宿，次日捣细）

【用法】上为末，酒调糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【主治】小便中泄精不止。

38375 约精丸

【方源】《医方易简》卷九。

【组成】黄连 生地 归身 炙甘草 酸枣仁（去壳净炒，研） 茯神 远志肉 人参 石莲子肉各等分

【用法】上蜜丸，如梧桐子大。每早、晚各服二钱，淡盐汤送下。

【主治】梦遗，诸药不效者。